



M

1
179
HIPPOCRATIS
COI MEDICORVM

OMNIVM LONGE PRIN-
CIPIS, OPERA QVAE
apud nos extant
omnia.

PER IANVM CORNARIUM MED-
icum Physicum Latina lingua
conscrip̃ta.



Accessit index rerum copiosissimus.



LVGDVNI,
APVD ANT. VINCENTIVM.

M. D. LV.



HYPOCRATIS NOT MEDICORVM

ONIVM LONGE PLVS

QVAM OTIOSA VITA

QVOD NOBIS

OMNIA

DE LXXXIIII ANNO

DE LXXXIIII ANNO

DE LXXXIIII ANNO

5

DE LXXXIIII ANNO



DE LXXXIIII ANNO

DE LXXXIIII ANNO

DE LXXXIIII ANNO

12-2-N-24 e

NVNCVPATORIA.

cer, ac datum est, ego neminē prohibeo. Sed ficientio, Hippocratem istos fucatos ornatu auersari, & amare ut sicut in illa, ita in omni lingua, brevis & verbis, & sententijs, & cetera enī plenus ac gravis, clarius item ac dilucidus, quātum ad eius artem posteris, atlequi datur, & quod potissimum est, rectus legatur. In hoc si quid prestiti, quod volui sum assecutus: nec est quod verear ullos nasos, vel *ἐπὶ νεύματα*, quantūvis in cornu exacutos. Quo verò sciant studiosi aliquam huius operæ à nobis transactæ partem, Habent in hoc Latino Hippocrate librum De aëre, aquis, & locis, duplo auctum, & nisi fallor integrum: Habent libri de capitis vulneribus principium, quod in Græcis codicibus impressis deest: Habent librum verū *μοχλικόν*, id est Vectiarium eundemq; De ossibus inscriptum: quæ omnia in Græcis exemplaribus partim desiderantur, partim alieno loco posita, iustis locis restituta sunt. Quorum omnium gratiam ut vobis viri Augustenses medicinæ studiosos debere volo, ita nec pudebit, nec pigebit vos, spero summum medicum Hippocratem vestrae auctoritate tutam, vestro favore commendatum, in publica utilitatem: Regia Augustissimum Senatum voluminis declaratione, & inscriptione, & dedicatum prodijisse, Valete viri magnifici. Marci Hesslorum. Calendis Septembribus. Anno Christi M. D. xlv.

INDEX LIBRORVM IN HOC volumine contentorum.

Hippocratis vita ex Sorano,	De natura hominis.	23
folio	De salubri dieta, Polybi.	29
Hippocratis iusiurandum.	2 De genitura.	31
Lex Hippocratis.	3 De natura pueri seu foetus.	
De arte liber.	4 34.	
De veteri medicina.	8 De carnibus.	44
De medico.	16 De septimestri partu.	48
De decenti ornatu.	18 De octimestri partu.	52
P. aceptiones.	21 De superfœtatione.	53
		De exsect

I N D E X.

De exsectione foetus.	58	morbis mulierum adiecta	
De dentitione.	59	298.	
De corporum resectione.	60	De sterilibus.	301
De corde.	61	De morbis popularibus liber	
De glandulis.	62	primus.	310
De ossium natura.	65	Liber secundus.	320
De locis in homine.	71	Liber tertius.	328
De aëre, aquis, & locis.	83	Liber quartus.	338
De flatibus.	94	Liber quintus.	344
De medicamentis purganti-		Liber sextus.	354
bus.	98	Liber septimus.	363
De diætâ siue victus ratione,		De victus ratione in morbis	
liber primus.	98	acutis.	379
Liber secundus.	108	De iudicationibus.	396
Liber tertius.	118	De diebus iudicatorijs.	399
De insomnijs.	124	Prænotiones.	401
De alimento.	128	Prædictionum, liber primus,	
De humidorum vsu.	130	408.	
De humoribus.	133	Liber secundus.	413
De morbo sacro.	137	Coacæ prænotiones.	423
De morbis, liber primus.	143	De vulneribus capitis.	444
Liber secundus.	154	Chirurgiæ officina.	450
Liber tertius.	172	De fracturis.	454
Liber quartus.	180	De articulis,	469
De affectionibus.	192	De vlceribus.	498
De internis affectionibus.		De fistulis.	503
203.		De Hæmorrhoidibus.	505
De virginum morbis.	224	De visu.	507
De natura muliebri.	225	Aphorismi.	508
De morbis mulierum, liber		Hippocratis epistolæ.	520
primus.	242		
Liber secundus.	273		
Notha ad finē primi libri de		F I N I S.	

3 *Alimen*
Index

INDEX COPIOSISSIMVS IN
opera Hippocratis.



A Bortus grauiores quàm partus. 263.f	Acetabulorum vteri pituita plenorum curatio. 258.a
Abortus plurimi in primis quadraginta die bus. 49.b	Acida pituitosa. 81.e
Abortus deformes quando fiant. 37.f	<i>ἀποχρίν.</i> 116.f
Abortus sanatio. 168.e	Acyli. 114.c
Abortus variæ causæ. 251.a	Acuti morbi iudicium. 397.a
Abscessus tabidorū qui me- liores. 416.c	Ad hominis generationem semen ex omnibus & viri & mulieris membris ma- nat. 180.c
Abscessus iunioribus, quarta- næ senioribus magis fiunt 407.c	Admonitio sufficiens, rerum omnium vicissitudo. 528.f
Abscessus quo tēpore magis fiant. 407.c	Ad mulierē parere nequeun- tem medela. 305.d
Abscessus circa aures. 405. d 411. d e 428. f	Adolescens in foro decum- bentis historia. 330.e
Abscessus circa aurem. 398.b	Adolescēs in Melibœa ex ve- nere calfactus mortuus. 337.d
Abscessus in febribus. 134.e	Adolescēs multo meraco po- tus perijt. 352.f
Abscessus boni. 320.f	Adstringentia & corroboran- tia. 199.e
Abscessus humorum quid fa- ciat. 357.c	Aegri quæ sibi nocent quàm quæ iuuant assumere ma- lunt. 5.f
Aceti facultas. 132.a b. 113.a	Aegri quatuor signis seruan- tur. 314.c
Acetum mulsū quibus de- tur. 76.e	Aegris non semper creden- dum. 7.c
Acetum mulsū in morbis acutis quale esse oporteat. 386.b.	Aegro potenti omnia, modo non noxia, danda. 200.c
Acetum biliosus magis con- fert. 386.e	Aegrorum variæ historiar. 366.367.368.375.
Acetum mulieribus magis quàm viris aduersat. 386.e	Agrotorum sedecim narra- tio. 333.e
Acetabulorum pituita pleno rum curatio. 229.a	

INDEX.

- Aegroti varijs morbis corre
 pti. 321.e.f. 322.a.d. 325.a
 Aegrotus quis. 24.f
 Aegroti cur non pareant. 5.f
 Aegrotum quæ vexent. 23.e
 Aegrotantis ac medici error
 259.d.e
 Aegrotantis cupiditas. 22.d
 Aegrotantium varia historia.
 338.a.b. 339. & 340. 341.
 Aegrotantium victus. 202.f
 Aegrotorū quatuordecim va
 riæ agitatorū histor. 316.b
 Aegrotorū duodecim histo
 ria. 328.b. 329. 330. 331.
 Aequinoctium. 118.c
 Aes optimum. 105.e
 Aesculapius & Hercules in
 hominum vtilitatem nati
 538.f. 2.d
 Aetatis transmutatio. 337.e
 Aestas & hyems in fracturis
 quid poscat. 464.d
 Aestas bilem, ver autem san
 guinem parit. 136.a
 Aetatum singularum morbi
 512. a.b.
 Aetatum & locorum differē
 tiæ. 417.a.b. 106.e
 Aetas sana & morboſa. 106.
 a.b.
 Aetati cuiq; cōueniētia. 106.c
 Aetatum cognitio. 106.d
 Aetas omnium morborum
 capax quæ. 439.f
 Aetatis cuiusq; vitia. 529.e
 Aetates tabi obnoxia. 436.e
 Aegyptiæ terræ benignitas
 & fœcunditas. 51.c
 Aegyptij iter se similes. 90.e
 Aegyptij & Lybici Asiaticis
 similes. 89.b
 Affectus morbo neopolitano
 similes. 332.a
 Affectuū variorū causſæ. 11.c
 Africani cur non sanarētur.
 137.f
 Aglaidæ filia. 314.f
 Alia contrarijs alia similibus
 curantur. 80.f
 Alimentum vnde tale. 129.b
 Alimentum hominis, humor
 leuis. 188.b.c.d
 Alimentorum vnum genus,
 species verò plures. 128.d
 Alimento copiosiore qui e
 geant. 509.c
 Alimenta plura quando &
 quare adhibenda. 509.c
 Alui secessus quos enecauē
 rit. 332.f
 Alui liquidæ curatio. 389.f
 Alui fluxus varij. 311.c. 312.c
 408.b
 Alui profluvia. 420.c
 Alui egestiōes. 397.d.f. 403.c
 Alui solutio. 395.f. 298.f
 Aluum subducentia. 158.d
 Aluus plena, vel vacua quid
 efficiat. 189.a
 Aluus turbata, quibus sit ma
 lum. 145.f
 Aluus nimis soluta hominē
 enecat. 176.e
 Allij natura. 393.e. 113.b. 201.f
 Alumen melium. 500.f
 Amphictyones populi. 535.e.f
 Amygda

I N D E X.

Amygdala.	114.c	tia.	112.c.d
Anaxionis Abderitani histo- ria.	335.d	Animas vnā cum corporibus purgandas.	525.c
Anaxyridæ.	92.e	Anni partibus morbi pro- prij.	511.c.512.a
Andreas Hippocratem infa- mauit.	1.c	Anni constitutiones quæ sa- lubriores.	511.c
Androgyni, id est, effœmina- ti.	105.b	Anni quatuor partes.	118.d
Anethum.	113.c	Annus omnis, particeps. 4. qualiratum.	26.c
Anhelationis muliebris cu- ratio.	238.e	Antiquorum ac recentium morborum curatio.	79.e
Angina eiûsq; signa.	174.e	Antilochus & Aleuas.	321.d
Angina siue Cynanche.	155.f 159.e	Antiphonis ægri historia.	313.e
Angina & eius curatio.	78.f. 79.a.299.b	Apituita in aquam inter cu- tem transitus.	211.e
Angina qñ fiat.	388.f.389.b	Apium.	113.c.202.a
Angina secūda & tert.	160.b.c	Aphtha & ei⁹ curatio.	165.e.f
Anginæ vexatio.	360.c	Apollonij Abderitani histo- ria.	336.e.f
Anginæ varietas.	406.f.359.f	Apollo nomius.	138.c
Anginæ, lippitudinis, & ītesti- ni vulnerati curatio.	327.f	Apollinis responsum.	536.a
Anginosa cur moritur.	353.f. 366.e	Αποπληξία.	64.d
Anginosorum affectus.	323.a	Apoplexiæ vel Syderationis causæ.	97.c
Animā admiscetur animæ.	105.c	Απορία.	14.c
Animæ similitudo cum car- bonibus.	105.c	Apparentia quo tēpore fiant.	125.d
Anima in somnis vigilās nō est sui iuris.	124.f	Apparitiones in somnis.	517.f
Anima hoīs vsq; ad mortem semper producitur.	358.c	Appendices.	72.f.73.a
Anima quales ab æthere sūt fluxus somniat.	126.d	Apprehensio venarū brachij.	17.f
Animæ hominis qualitas & temperamentum.	101.d	Aqua potabilis.	130.c
Animalia quibus conseruen- tur.	135.c	Aqua in morbis acutis.	386.e
Animaliū & carniū differen-		Aqua curādis vulneribus qua- lis.	452.e
		Aquæ leuioris cognitio.	322.c
		Aquæ potus.	115.f

Onguis. 205.

†† 2

I N D E X.

Aquæ facultas.	112.f	Argumentis septis probatur	
Aqua calida oculis utilis.		potum in pulmones non	
132.e		deerrare.	191.f
Aqua frigida qb ⁹ pfit.	132.c e	Aristoteles & Plinius taxan-	
Aqua cœlestis.	179.e	tur.	43.a b
Aqua cur hyeme calida, a sta-		Aristochidis ægri historia.	
te frigida.	41.a	313.c	
Aqua fontis profundi qua-		Arithmetica vsus.	532.f
lis.	41.b	Arteria & vena caua.	45.b.
Aquæ quæ morbosæ, & quæ		60.d.66.d.67.b.68.c	
salubres.	85.c	Arteria vulnerata & curatio.	
Aquæ palustres.	85.c	166.e	
Aquæ potoribus familiares		Arteriæ conuulsæ curatio.	
morbi.	85.d e	204.b c	
Aquæ optimæ.	85.f.86.a	Arteria magna vētrem & in-	
Aquæ salsa.	85.f.86.b c	testina depascitur.	61.b c.
Aquæ pessimæ.	68.a	69.a.435.c	
Aquæ pluuiiales.	86.c d	Arteriæ à rene ortæ.	326.b
Aquæ ex niue & glacie om-		Articularis morbus eiusque	
nes malæ.	86.f	curatio.	198.c d
Aquæ inuestitiæ.	87.b	Articuli pulmonis cōuulsæ &	
Aquarū robur ex ventis.	87.b	curatio.	167.a
Aquarum per somnum bibe-		Articuli manus.	73.a
re quid significet.	128.a	Articuli pedum.	73.c
Aquarum & ciborum quali-		Articuli parui in corpore.	73.c
tas.	358.a.83.d	Articulorum generatio.	46.b
Aqua intercus ab hepate &		Articulorum tumores.	132.d
splene cum curatione.	212.	Articulorum curatio & repo-	
d e f.213.a b c d		sitio.	493.a.495.c.497.a
Aquæ inter cutē caussa.	212.a	Ars quid.	19.d
Aquilo qualis & Auster.	141.	Ars exercēdi corpora & me-	
e f		dicina contrariæ.	79.d
Arbor quī plantetur, & cre-		Ars tam nocētibus quàm etiā	
scat.	39.f	iuuantibus cōprobatur.	5.c
Arbor multum tenera fructū		Ars vaticinandi & medicina	
non producit.	40.d	ferè similes.	103.a
Arcturus.	88.d.311.c.313.f	Artes quæ probandæ.	19.a
Arcturi ortus.	118.b	Artis medicæ magna pars iu-	
Archigenes.	136.f	dicium.	337.f

Artium

102. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

INDEX.

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---|--------------------------|
| Artium variarum partes & officia. | 103.ab | 193.c.358.d | Aurifices. | 103.e |
| Artificum differentia. | 380.a | | Auster à similib. Boreæ natura regionibus spirat. | 109.d |
| Ascarides quando magis vident. | 320.c | | Austri facultates. | 109. |
| Ascaridum eiection. | 293.a | | Autumnus lethalis. | 313.b |
| Asiana pulchriora & maiora. | 88.e | | B | |
| Asianorum genus cur imbelles. | 90.b | | B Alnea quibus profint. | 387.d e |
| Asianorum & Europæorum differentia. | 90.a | | Balnea calida. | 115.b.29.f.124.a b.201.f |
| Asiatici imbelles & effœminati. | 89.a.90.a b | | Balnea frigida. | 115.c |
| Asparagus. | 113.d | | Balneorum vsus. | 387.b |
| Aspretudines culicum moribus similes. | 323.f | | Barbarorum victus ratio. | 9.f |
| Astra visa per somnũ splenda quid significant. | 126.c | | Beta refrigerat. | 123.e.113.e |
| Astrorum cognitio necessaria medico. | 100.a | | Biduum sine cibis viuatur. | 184.d |
| Astrorum exortus. | 88.d | | Bilis & pituita homini congeneritæ. | 144.b |
| Astrorum observatio utilis medicinæ. | 83.e | | Bilis corpus possidet. | 26.b |
| Astrorum iudicium. | 126.f | | Bilis educio. | 300.b |
| Atheniensium.2 historia. | 346.b | | Bilis, sanguis, pituita quomodo fiant. | 180.d |
| Atroxia. | 5.c | | Bilis per æstatẽ effectus. | 135.e |
| Atra bilis qualis. | 28.f | | Biliofæ ac pituitosæ mulieris signa. | 305.d |
| Attenuatio vnde. | 185.a | | Biliofi lassitudine affliguntur. | 74.a |
| Attoniti siue stupidi. | 107.d | | Bionis ægri historia. | 313.d f |
| Attriplex. | 113.d | | 322.f | |
| Auditus qui fiat. | 47.a.71.e | | Bitonis ægri historia. | 330.e |
| Auena comesta. | 111.b | | Blitum. | 113.e |
| Aures purulentæ. | 64.e | | Bona vel mala à medico facta. | 146.a b |
| Auriculæ fractura. | 480.c | | Bonis aut malis præter rationem factis nihil credendum. | 510.c |
| Auris dolor quando lethalis. | 406.d | | Boreas frigidus. | 109.c |
| Auris incisæ curatio. | 480.f | | Botri. | 114.b |
| Aurium doloris curatio. | 74.e | | | |

sed soluitur: qm bilis sm sang
 naz sanguine calidior dr: sel
 sm naz hõis nequaq: q2 insu
 vine cõsistit eius vita et non

†† 3
 mat q2 san
 guine for
 calidiorum

97 aer ye

Hilens st

ur non

afficiuntur

st hote.

s. c.

calenioso

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

curat

Brachij fracti coaptatio.

457.b

Brachij caput.

66.b

Brachij luxati signa.

472.d

Brachiū antrorsum & retror-
sum luxatū quale.

468.b c

Brassica.

113.e.202.b

C

CAdentes tam ex alto,
quàm ex plano quid

patiantur.

446.d

Cæcitatis signum.

399.e

Calamintha.

113.d

Calcanei cura in tibiæ fractu
ris.

462.b

Calculi varia causa.

190.f

Calculi quinque signa.

190.f

87.d

Calculi causa & curatio.

208.f

Calculi duo vel plures qui
fiant.

191.a

Calcul⁹ puerorū vñ fiat.

190.c

Calculi cur pueris fiant.

28.a

Calculi cū ferro similitudo.

190.e

Calidi seu ætheris vis & a-
ctio.

44.c

Calidus vel frigidus cur quis
fiat.

152.a

Calida aqua copiose vtētibz
quid accidere soleat.

131.b

Calidum hoc vel contra ne
sit, certum non est.

12.e

Calida apposita.

82.e

Calida spiritū emittunt.

34.f

Calidiores tenaciore habent
memoriam.

107.f

Calfactio.

131.a

Calfacientia sunt, dulcia, aci-
da, salsa, amara, austera &
carnosa.

114.f

Calor & frigus nō putrescit.

14.c

Calligenis curatio.

373.d

Caluiciei causa.

256.c

Caluus in Larissa quarto die
moritur.

335.a

Caluitij causa.

38.e

Calūnia, artis ignorātia.

4.b c

Canales an cruribus fractis
supponendi.

460.d

Cancris curatio.

328.a

Cancris occulti futuri signa &
curatio.

280.f

Cācri occulti nō curādi.

517.d

Canicula.

88.d

Canices vnde.

38.e

Cani à natiuitate.

38.e f

Cātharides.

217.d.227.a.229.

Carbunculi æstiu.

320.b

Carcinoma mulierem eneca
uit.

353.e.377.d.378.a

Carnes roborantes.

201.b

Carnes leuissimæ & graues.

201.e

Carnes fluxu laborantibus
dandæ.

277.e

Carnes piscesque dandi pitui
tos.

211.d

Caries ossis cap.

155.d.159.c d

Carnes conditæ.

114.c

Carnis cuiusque animalis fa-
cultates.

111.d e f.112.a

Carnium attracticum indi-
cia.

359.a

Carnosi oēs & iter se similes
qui Raphæos incolūt.

91.e

Carno

INDEX.

CAUSA
Nov. 30
6071 2015
713.134

INDEX.

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| le. | 452.e | Xuus. | 15.b |
| Cerebri corruptio cum curatione. | 173.d | Chirurgiæ officinæ quæ con-
ducant. | 450.d |
| Cerebri vsus & situs. | 533.b | Chirurgus prospicienda quæ. | 450.e |
| Cerebrum glandulæ simile. | 64.a b | Chirurgi man ⁹ & digiti qua-
les esse debeant. | 451.a |
| Cerebrum in vtero purgatur. | 139.c | Chœnix. | 179.f |
| Cerebri tumor cum curatione. | 172.e | Cholericæ affectiones quæ &
quando fiant. | 374.d |
| Cerebri situs ac sensus. | 444.f | Cibaria leuissima & graui-
a. | 200.e f |
| Cerebri venulæ superuomen-
tes. | 154.e | Cibaria describuntur. | 9.c |
| Cerebri repletio dolorosa e-
iusq; curatio. | 173.a | Cibi quantitas. | 81.b c |
| Cerebri corruptio. | 155.b | Cibi vel potus conferentes &
contra. | 201.a b |
| 158.e. 159.c | | Cibi & potus omnia irrigant
& augment. | 46.e |
| Cerebri ac capitis morbi, &
curationes. | 158.b c | Cibi quatenus medicamenta
sint | 98.d |
| Cerebri biliosi morbus & cu-
ratio. | Ibidem.d | Cibi distributio per singulas
ætates. | 130.a |
| Cerebri madētis signa, & cu-
ratio. | 157.d | Cibi quo tempore facilius co-
quantur. | 509.d |
| Cerebro, ossibus, dentibus,
neruis frigida inimica, ca-
lida verò amica. | 131.c d e | Cibi hora cū præterit quid
faciendum. | 11.b c |
| Cerebri membranę duæ. | 71.f | Cibis vexantibus quid agen-
dum. | 202.e |
| Cerebri affectiones. | 64.f | Cibi & labores vires habent
contrarias. | 99.f |
| Cerebrum quale. | 44.f | Cibi si mox in corpore gra-
ueolent, quid fieret. | 184.c |
| Cerebrum quorum sit causa | 142.b | Cibi si eodē die excernerentur,
quid eueniret. | Ibidē.e |
| Cerebrum quando infaniat. | Ibidem.c | Cibi plus æquo in ventriculo
retenti quid faciant. | Ibidē. |
| Cerebrum hominis duplex. | 139.a | Cibi perturbantes. | 12.d |
| Cervix. | 65.f | Cibi frigidissimi qui. | 358.f |
| Cherionis ægri historia. | 330.a | Cibi ac potus facultates mul-
tas | |
| Xerophonin. | 116.f | | |

INDEX.

A

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| tas ex terra trahunt. | 181.c | Clazomenius sanitati restitu- | |
| Cibi qui celeriter excernan- | | tus. | 318.e |
| tur. | 510.a | Cleanactides graui morbo li- | |
| Cibo non augeri, malum. | | beratus. | 317.f |
| 510.c | | Clyster mitissimus. | 211.a |
| Ciborum varietas. | 130.b.c | Cnicus. | 111.d |
| Ciborum varietas. | 359.a | Coagulum asininum. | 293.e |
| Ciborum facultates. | 128.e | Coccus cnidius. | 165.c |
| Ciborum ac potuum singu- | | Coci obsonia parant. | 103.d |
| lorum vis. | 110.a.202.a.c | Coctiones ac cruditates quid | |
| Ciborum comparatio. | 10.c | significent. | 312.e |
| Ciborū facultas quī cognos- | | Cœlestis vis qd efficiat. | 187.d |
| scatur. | 200.d | Cœli clementia & soli vber- | |
| Ciborum facultas multis cō- | | tas in Asia. | 88.f |
| paratur. | 103.c | Cognitio vera quid præster. | |
| Cibus sanorum ægrotis no- | | 19.e | |
| cet. | 10.b | Coitus voluptas vtriusq; est. | |
| Cibus sensim augendus. | 118.a | 32.d.115.c | |
| Cibus in vigore morbi dete- | | Coitus quibus profit. | 358.f |
| rior. | 384.c | Coitus ebrijs quid profit. | |
| Cibus quando morbum ge- | | 414.f | |
| neret. | 510.a | Coi singulis annis Hippocra- | |
| Cibus in tabido qualis. | 166.c | ti sacra faciēbant. | 1.c |
| Cicer album. | 111.c | Colli dolor pessimus. | 409.e |
| Ciceris facultas. | 393.f | 410.c | |
| Circuitus, constitutio & de- | | Columellæ vuluæ curatio. | |
| cretoria. | 134.d | 298.e | |
| Citharœdi. | 47.f | Collutio biliosa & pituitosa. | |
| Citra sanitatem nihil vtile ef- | | 270.d f.271.b | |
| se potest. | 120.b | Collutiōes purgatorię. | 270.e |
| Clauda membra quæ & quo- | | Collutiones variæ. | 298.c |
| modo fiant. | 418.e | Collutiones ad fluxus. | 294.b |
| Claudi vel cæci partus vnde | | Collutiones pudendi. | 240.d |
| fiant. | 49.f | Collutionum mensura. | 269.a |
| Claudicatio vnde. | 73.d | Colon. | 60.f |
| Claui culæ fractæ curatio. | | Color ossis capitis. | 444.d |
| 474.c.d.e.& causæ. | 465. | Colorum mutatione à corde. | |
| bef | | 70.e | |
| Claues pectoris. | 66.b.72.f | Comitiales morbi vnde. | |

INDEX.

- 388.e. 439.e.
 Comitialis morbus cur non
 magis diuinus quàm alij
 putandus sit. 137.b
 Comitialis morbi liberatio.
 510.f
 Comitium cur os spume-
 scat. 97.f.98.a
 Comitialis morbus senes ma-
 ximè tollit. 416.f
 Comitiales omnibus sensib⁹
 priuantur. 97.f
 Commotiones. 116.e
 Compressa à seipsis calidiora
 40.c d
 Conceptus in vtero qualis.
 47.f
 Conceptus signa. 48.a b.32.f
 Conceptus varietas. 53.a
 Conceptui tempus aptum.
 250.d
 Cōceptus quī paretur. 55.b c
 Cōceptus restauratio. 56.a b c
 Conceptum impediētia. 56.b
 420.e.240.b.266.b
 Conceptus qui vltra plenilu-
 nium fit. 53.b
 Conceptus fallacia quid por-
 tendat. 421.b
 Conceptus à quo morbo li-
 beret. 227.b
 Conceptus, partus, abortus &
 morborum decretorium.
 50.c
 Concepturæ mulieris signa
 varia. 302.b c
 Conceptus virgines à dely-
 rio liberat. 225.a
 Conceptorum summū. 307.b
 Concubitus mox à partu mu-
 lieri morbi est causa. 226.a
 Congeniti homini 4. primi
 humores. 25.e
 Conchyliā. 112.c
 Coniectores quæ non asse-
 quantur. 125.a b
 Coniugio permutato cur per-
 mutetur & soboles. 33.c
 Conformatio partus. 36.d e
 Conformationis in vtero tē-
 pus. 50.e
 Consideranda medico in vi-
 ctus ratione describenda.
 509.c d
 Consideranda initio morbi.
 340.c
 Consideranda in ægro quæ.
 391.a b c
 Cōsiderāda ī muliere sterili,
 & fluxu laborante. 274.d e
 Cōstantes homines. 107.a
 Cōstitutiones morborum &
 vigores quando magis aut
 minus, citius aut serius fiāt
 344.a
 Cōstitutiōis temporis pesti-
 lētis & morborū in ea graf-
 fantiū descriptio. 331.e.332
 Consuetudo victus multum
 potest. 382.d
 Contenta in manibus ac pe-
 dibus. 38.b
 Contraria tollunt contraria.
 94.c
 Contraria commissa non læ-
 dunt. 13.a
 Contusionis species. 445.d
 Conuulsiōis curatio. 79.f
 Conuulsiōes

*Corpora q̄ magis
noxia morbis
et 2 min.*

*Corpora q̄ magis
noxia morbis
et 2 min.*

Conuulsiones quibus vtilis.
534.a b

Conuulsio puerperæ. 326.f

Conuulsiones faciles quæ.
440.c

Cor quid. 61.d

Cordis ventriculi, siue sinus.
Ibidem.d e

Cor quale. 61.a.45.e.60.d.
66.d

Cordis latentes pelliculæ.
62.b

Cordis natura. 45.b

Cordis & præcordiorum fa-
cultates. 143.b

Cordis & arteriarum consen-
sus. 67.c

Cordis dolentis curatio.
321.e

Cordis alimētum vnde. 62.c

Cordis auriculæ. 61.f

Cor creatoris optimi summū
opificium. 62.a

Cor cur non afficiatur, caput
& lien multū. 183.e.182.e

Cor calidissimum. 45.c

Cor & venæ semper mouen-
tur. Ibid.

Cordis tunica. 61.a

Coriandrum. 113.c.202.a

Corpus quale. 71.d

Corpus humanū medici sub-
iectum. Ibid.d e

Corpus impurum puro ali-
mento læditur. 509.f

Corpora attenuata quomodo
reficienda. Ibidem

Corporis repentini labores.
384.e

Corpora formæ peregrinæ
visa quid velint. 127.f

Corpus post calidam frige-
scit magis, post frigidam
verò calefcit. 131.f

Corpus ac venæ in ictérico
quales. 217.c

Corpus quo pacto humores
4.ex cibis trahat. 180.c

Corruptio omnium mutua.
101.b

Corna. 114.a

Κωρυμβάχιν. 116.f

Costæ. 66.a.c.72.e

Costæ quando tempore coa-
lescant. 485.d

Cotylidonū natura. 307.ab

Coxa. 65.f

Coxendices. 73.b

Coxendicum dolor qua æta-
te affligat. 422.f

Cratiæ ægri historia.
313.f

Crapulæ morbi cum curatio
ne. 198.a

Cranonis populares morbi.
320.b

Crapula morborum parens.
393.b

Cratistonax. 315.

Criseorum calamitas quanta
535.e

Crysus primus murum con-
scendens. 536.d

Crisæi populi. 535.d

Critonis mors secūdo die ab
initio morbi. 318.d

Critobuli ægri historia.
313.e

Κρίσις

I N D E X.

- Kpiss quid. 23.e Cur Hippocrates capite te-
 Critis morborum acutorum. 2.a
 427.b Cur corde nō sapimus? 143.a
 Critiæ ægri historia. 313.f Curationis lassitudinis facul-
 Cubiti & tibiæ ossa qualia. 117.f
 467.c Curationes variæ. 327.c
 Cubiti repositio. Ibid.e Curatio ulcerū capitis. 156.f
 Cubiti ossa vbi fracta, quid Curatio morbi à capite. 156.
 agendum. 455.c c.d. *curatio 276. 78.*
 Cubiti luxati curatio. 476. Curatio cum quis sanis ocu-
 a b. lis non videt. 508.a
 Cucumeris agrestis facultas. Curatio anceps. 210.b
 358.f. 114.c b Curatio celeris. 121.c
 Cucumeris sylvestris radix. Curatio ex victus tatione.
 78.d 122.a
 Cucurbita. 113.e Cursus longi. 116.c
 Cucurbitulæ forma cur talis. Cursus vestiti. Ibid.d
 15.c. 17.d Cursus recti. Ibidem.
 Culpa ægrotantium medico Cursus circulares. Ibid.
 sæpe adscribitur. 20.f Custodia ac scientia multa
 Cum fœtus mortuus crus aut prægnantibus opus est.
 manum præmittit, quid 251.c
 agendum. 263.a Cutis capitis læsa periculosa.
 Cum morbus repullulat quid 444.a
 agendum. 157.b Cutis vstulata pilos non pro-
 Cū loc^o cucurbitulæ admotæ ducit. 38.d
 aperitur, quid agendū. 17.e Cydonia. 114.a
 Cum fœtus manum aut crus Cyceonis facultas. 110.e
 præmittit quid agas. 262.f
 Cuminum Aethiopicū. 179.d
 Cur modo mares, modo fœ-
 minæ gignantur. 33.a
 Cur de articulis scribat. 483.
 a b.
 Cur quædam natura sine la-
 tē sint, quædam eo ante
 tempus destituatur. 264.a
 Cur homo imparibus diebus
 moriatur. 186.a
 Debilitatis signa. 397.c
 Debilitas

cur in na...
ribz circa
adit cer
bru non
ingint fo
in mris insunt. 71.

I N D E X.

9

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------|
| Debilitas à partu. | 230.b | tia. | 530.f |
| Decimestres maximè educan-
tur. | 50.b | Democritus quæ in vita ri-
deat. | 528.a b |
| Decimestres, vndecimestres,
& septimestres quâdo pa-
riantur. | 52.f.53.a | Demonstratio iucûdior quæ
opere fit quàm quæ sermo-
ne. | 8.c |
| Decretoria febrium. | 400.f. | Dentati cur nascantur. | 46.c |
| 406.a b | | Dentes pueris quando rena-
scantur. | 48.e |
| Decretoria paria vel imparia | 315.f | Dētes posterius nascunt̃. | 46.c |
| Decretorij dies cur impares
tantum sint. | 185.d.186.d | Dentes pueris quando ena-
scantur. | 48.e |
| Decretum Atheniensium in
gratiā Hippocratis. | 534.c | Dentes stupeſcunt molarum
attritu. | 135.a |
| Decubitus qualis. | 401.e | Dentitionis varietas. | 59.e |
| Decubitus ægrotantium pro
morborū varietate eligen-
di sunt. | 20.f | Dentium generatio. | 46.c |
| Defrictionis potestas. | 453.a | Dentium ſtridor quid porten-
dat. | 402.a.409.b |
| Deglabratio quī fiat. | 299.f | Dentium dolor. | 193.e |
| Deligatio duplex. | 451.c | Deploratos non expedit tan-
gere. | 6.c |
| Deligatione in fracturis qui
non egeant. | 464.d | Deſidioſorū morbi & curatio | 122.d e f.123.b c d.124.b c |
| Deligatio pedis & manus cur
diuerſa. | 460.b | Deſidioſi copioſiore labore
quàm cibo egent. | 122.f |
| Deligamēta qualia eſſe oportet. | 451.f.452.b d.455.d | Deſidioſorum victus ratio. | 123.b d f.124.a |
| Deligandi modus. | 451.d.e. | Deſilientium ex alto curatio. | 458.a |
| 453.b.454.f | | Deſtillationis remediū. | 358.e |
| Deligatura, in qua duo maxi-
mè profunt. | 17.a b | Deſtillationis ſigna. | 13.e |
| Delyrij cauſſa. | 224.f | Deſtillationes oculorum. | 13.f |
| Delyrij vehementis ſigna. | 384.b c.391.d.509.f | Deterior victus meliori quā-
do præferendus. | 510.e |
| Delyrij curatio. | 225.a | Deus rerum humanarum po-
tiſſima cauſſa. | 225.b |
| Delyratio quibus proſit. | 359.
b c | Diarrhœa eiūſque curatio. | 197.f |
| Democritus inſanus putat̃. | 1.d | Dixta recta multum confert. | 107.d |
| Democriti de mundo ſenten- | | | |

*diarrhea
bris 324
5.3*

I N D E X.

| | | |
|---|---|---|
| 107.d | Dispositio hoīs bona. | 14.d |
| Diæta hominum perquiren-
da. | Dissectio & sedes idē. | 446.f |
| 83.d | Distentio maxima vbi fiat. | |
| Diebus imparibus omnis æ-
grotantia discernuntur. | 453.a | |
| 186.b | Distortiones faciei. | 422.d |
| Dierum obseruatio. | 50.c | Diuersa medicamenta men-
ses detrahētia. |
| Dies ac menses quātum pos-
sint. | 50.c d | 264. b c d e |
| Dierum parium obseruatio. | | Diuersa ex oculis cognitio. |
| Ibidem. d | | 327.c |
| Dies in crisi- bus cōsiderandi. | Diuersa eiusdem morbi cu-
ratio, vnde. | 150.e |
| 510.b | Diuersi terræ humores. | 181.c |
| Dies qui ossium repositionē
non admittant. | 466.a | Diuersitas cōsideranda. |
| Differētia inter Asiā & Eu-
ropam. | 88.e | 129.d |
| Difficultatis spirādi curatio. | | Diuersitas languentiū. |
| 274.c | | 414.a |
| Digitī tanquam rami postre-
mo disparātur. | 38.a b. 73.a | Diuersorum morborum cu-
ratio. |
| Digitorum articuli quot mo-
dis luxentur. | 497.c | 328.a b c |
| Digitī luxari repositio & cu-
ratio. | 477.a | Doctrina, vnā cum prudentia
comparanda. |
| Dignoscenda in principio. | | 3.d |
| 134. b c | | Dolor vnde. |
| Dilatio ab arte aliena. | 525.e | 15.f |
| Diligens inquisitio contrarij
ac certissimi remedij. | 11.f | Doloris sedatio. |
| Discenda etiā quæ malè suc-
cesserunt. | 484.e | 298.b |
| Disciplina nulla probatur,
quæ vitæ humanæ nō con-
ferat. | 18.f | Doloris hepatis solutio. |
| Disparationis ossium cubiti
signa. | 476.c | 436.f |
| Dispositio Athletica non est
a natura. | 129.f | Doloris & vlceris vterorum
curatio. |
| | | 298.d |
| | | Doloris subiti curatio. |
| | | 398.d |
| | | Dolores in lumbis & vesica
breues. |
| | | 209.c |
| | | Doloris circa lumbos aut co-
xam curatio. |
| | | 373.f |
| | | Doloribus circa caput quid
prosit. |
| | | 421.d |
| | | Dolores ex itinere qui. |
| | | 393.b |
| | | Dolor aurium magnus tertio
die hominem tollit. |
| | | 359.c |
| | | Doloris ad clauiculam cura-
tio. |
| | | 381.f |
| | | Doloris sub diaphragmate
curatio. |
| | | Ibidem. |
| | | Domorum structura. |
| | | 103.c |
| | | Dormientium consideratio. |
| | | 401.c |

401.e
Dormiens internis, vigilans
verò externis partibus ca-
lidior. 358.a
Dormire diu, quibus condu-
cit. 31.a
Dorsalis morbus cum cura-
tione. 167.f
Dorsi vlcus. 502.e
Dracon Theſſali frater. 537.e
Dromeada vxoris puerperæ
mors. 319.a b
Duorum victuum differētia.
10.b c

Δύπνοια. 69.c
Dysenteria eiusque curatio.
197.b f. 121.b. 300.c
Dysenteria in quæ degene-
ret mala. 392.e
Dysenterix mala quæ. 419.f
Dysuria cum delirio homi-
nem enecat. 157.b

E

E Brietatis morbus & cu-
ratio. 159.a b. 155.d
Edere aut bibere per somnū
quid sit. 127.f
Elementorum quatuor vires
& situs. 44.c
Epaminondas. 314.f
Epaminonis ægri historia.
313.e
Epicratis vxor graui morbo
liberata. 317.c d
Epiglottis. 61.b
Epileptici cur oculi distor-
queantur. 140.a
Epileptici cur os spumescat.
ibidem.b

Epileptici cur suffocentur.
140.b
Epileptici cur calcitrent pe-
dibus. ibid.
Epilepsia inueterata, incur-
bilis est. 141.d
Epileptici casuri fugiunt.
ibidem.
Epileptici ventorū mutatio
quid afferat. 141.e. 142.a
Epilepsia cur pueros suffocet
140.c
Cur adultos non occidat.
ibidem.e
Cur senes perimat. ibid.e
Cur dextram partem po-
tius occupet. ibidem.f
Cur verè periculosior sit.
141.b

Equestre certamen. 539.e
Equitatio continua quæ ma-
la afferat. 91.f. 92.d
Erasini Bootis historia. 318.c
Eratonis ægri historia. 313.d
Error medicorū in sorbitio-
ne exhibenda. 382.c
Errores ab initio commissi
facilius corriguntur. 383.f
Errores quando patent. 11.a
Eruca tichymalidis. 55.f
Eruum. 179.f. 111.e
Erysipelas. 145.f
Erysipelas pulmonis. 148.e.
& eius curatio. 167.c
Esus carniū in somno quid
velit. 127.f
Etesia. 311.c. 313.b. 123.d
Euacuatio dolorem excitat.
25.a

egressio clandestina 409.f

Euagon

INDEX.

- Euagon Diapharhis filius. 314.f
 iuxta natura quedam est. 23.a
 Eunuchi cur non coeant. 32.a
 Eunuchi in Scythia adorantur. 92.a
 Eunuchi non caluescunt. 38.e
 Europæi inter se dissimiles. 92.e
 Europæi bellicosiores quàm Asiatici. 93.a
 Europæi Asiaticis corporum forma magis inter se discrepant. 92.f
 Europæi cur seniores. ibid.
 Euryphon medicus. 1.d
 Euryanactis filia historia. 330.c
 Ex abortu morbi ac curatio. 354.a.b
 Exacerbationū indicia. 509.b
 Excrementa cur urinam odore referant. 171.d
 Exercitationis facultates. 185.b
 Exercitatorum morbi & curationes. 124.b.c.d
 Exercitationis in puluere & oleo differentia. 116.f
 Exercitationes desidiosorum. 122.c. 123.c.e. 124.a
 Exercitia. 30.e.f
 Exalatio humoris quomodo fiat. 186.f
 Ex morbis, anni temporibus & tempestatibus omnium fit coniectura. 136.b
 Ex partu fluxus curatio. 256.a
 Ex partu vomitus sanguinis curatio. ibidem.
 Ex rigore qui pereant. 423.e
 Excreationes in febribus quales. 513.e. 519.d
 F
 Fabæ alunt &c. 111.b
 Fabula de Amazonidibus. 487.c
 Faciei consideratio. 429.a.b
 Faciei ornamenta. 293.b
 Faciei singularum partium situs & utilitas. 533.c
 Facies bona in malistam magnis quàm parvis quid significet. 355.f
 Faciei rugas leuigatio. 293.b
 Facilitas quibus insit. 146.d
 Fames quo solvatur. 510.b
 Farinæ puræ & cum alijs mixtæ, facultas. 111.a
 Farina ordeï pleni. 179.e
 Fauces. 44.d
 Fauces cruentæ. 418.f
 Faucium exulceratio & inflammatio. 96.f
 Faucium dolor. 408.c. 410.a.f
 Faucium exulceratio. 406.e
 Faucium inflatio. 193.d
 Fauis sicci. 179.c
 Fauonius. 118.b
 Febrium quatuor species. 28.e
 Febrium differentia. 354.f
 Febrium duo genera. 95.c
 Febris communis & peculiaris causa. ibid.
 Febris ex mala diata. ibid.
 Febris ardens recidens. 398.b
 Febris interficiens, & eius curatio. 170.c
 Febris

*exacerbatio morbi
 exacerbatio morbi
 exacerbatio morbi
 exacerbatio morbi*

*exacerbatio morbi
 exacerbatio morbi
 exacerbatio morbi
 exacerbatio morbi*

| | |
|---|--|
| Febris continua & tertiana
cum curatione. 162. d e f | 189. c |
| Februm omnium propria &
species. 315. d e | Febres in gládularum tumo-
ribus exceptis diarijs ma-
læ. 324. d |
| Febris continuæ varietas.
ibidem. e | Febris singultiens cum cura-
tione. 169. e |
| Febres à bile & curatio. 162.
b c. | Febris à pinguiore tantū hu-
more. 186. c |
| Febris & vomitus contraria.
80. e f. | Febres in Perintho grassan-
tes. 323. e |
| Februm omnium caussa spi-
ritus transitus. 96. c | Fel. 66. d. 70. c |
| Februm effectus. 137. c | Femur. 73. b |
| Febre ardente quando mo-
riantur. 153. f | Femoris ossis fracti curatio.
461. c d. |
| Febris ardens, & curatio. 169
d. 173. e | Femur fractum quotum coa-
lescat. ibidem. |
| Febris ardentis constitutio.
332. c | Femur retrorsum luxatum.
489. a |
| Febris ardens quí fiat. 387. f.
388. b | Femoris luxati signa. 488. b |
| Febres erroneæ vnde fiant.
224. f | Femoris luxati repositio.
494. b |
| Febres erroneæ acutæ. 246. d | Femur átrorsū elapsū. 490. c |
| Febres incóstitates donec cōsti-
terint sinere oportet. 390. d | Femoris articulus quot mo-
dis excidat. 486. c d |
| Februi acutariū caussa. 509. c | Feræ magnæ in Riphæis mó-
tibus non nascuntur. 91. b |
| Febris continua. 397. f | Ferulæ quales esse deceat.
452. e. 469. c |
| Febris quartana & curatio.
163. a | Ferulæ quando apponendæ.
460. f. 463. d. 469. c |
| Febricitatiū medicamē. 99. a | Ferulæ quádo firmadæ. 456. c |
| Febris diurnæ signa. 510. c | Fibræ à ventre in vesicā. 73. d |
| Febris vexatis curatio. 78. b | Ficus. 114. b |
| Februm diuersæ species. 311.
d e. 315. d. 333. b | Ficus quibus profit post cibū.
122. a b. |
| Febres leues ac lethales. 396. d | Figmentum de morbo sacro
cur productum. 138. c |
| Febres hyberne obseruandæ.
194. f | Figura fracturarum commo-
dissima. 469. a |
| Febris post frigus quí fiat. | |

*febris y-
triculo
391. b.
morbi
ri ubi fia
ibidem*

INDEX.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|------------------|
| Figurarum summa. | 453.c | 273.e | |
| Filij Cydis ægri histo. | 364.d | Fluxus suppressi signa. | 259.e |
| Fissuræ carnis & intercus mor- | | Fluxus ex partu corripientis | |
| bus quî fiant. | 97.a | curatio. | 237.d |
| Fistulæ caussa & curatio. | 503. | Flux ⁹ pituitosus quid efficiat | |
| d e. 504. a b c. | | 247.b | |
| Fistulæ tam faciles quàm dif- | | Fluxus consuetudo. | 246.f |
| ficiles curatu. | 439.b | Fluxus albi signa ac curatio. | |
| Fistulæ pulmonis folium vel | | 228.d e f. 276.b. 277.b | |
| epiglottis quid faciat. | 191.f | Fluxus à partu aut labore cu- | |
| Flatus quid agat. | 15.f | ratio. | 275.d e. 276.a |
| Flatus omnium morborum | | Fluxus aquosi purgationes. | |
| caussa. | 98.b | 294.f | |
| Flatus in vteris purgatio. | 291. | Fœcunditatis præparatio. | |
| f. 292. b. 298. c | | 250.d | |
| Flatus in vterum quomodo | | Fœcunditatis experimētum. | |
| inducantur. | 308.d | 267.d | |
| Flumina quæ salubria. | 93.c | Fœmellæ procreatio etiā tri- | |
| Fluminis cursus per somnum | | plex. | 105.c |
| visus quid præsignet. | 127.b | Fœmina curex coitu magis | |
| Fluor cruentus ante partum | | valeat. | 32.e |
| periculum affert. | 54.d | Fœminæ corpus. | 65.b |
| Fluxio in aures. | 74.d | Fœminæ humidiores & frigi- | |
| Fluxio in oculos. | 74. f. 75. a | diores. | 106.e |
| Fuxiones de capite septem | | Fœminis quid in coitu acci- | |
| sunt. | 74. a | dat. | 32.d |
| Fluxiones à frigore ac calore | | Fœtu corrupto & secūdis non | |
| 73. e | | exeritib ⁹ qd sit agēdū. | 256.f |
| Fluxionis caussa. | 96.d | Fœtus conformatio. | 130. a |
| Fluxionis diuturnæ signa ac | | Fœtus qua parte existat. | 55. a |
| curatio. | 257. f | Fœtus in vtero quo tempore | |
| Fluxum resiccantia. | 294. e | moueat. | 38. f. 263. d |
| Fuxum sistentia, & dolorem | | Fœtus quomodo ex vtero pel- | |
| sedantia. | 293. f | latur. | 239. f |
| Fluxus diuersi, eorumq; cura | | Fœtus in vtero, aut mortui, | |
| tio. | 277. 278. a b. 239. b | aut debilis signa. | 251. e f |
| Fluxus vteri caussa ac curatio | | 54. d f | |
| 274. e f. 275. a | | Fœtus in vtero mortui expul- | |
| Fluxus diuersæ ætatis caussa. | | soria varia. | 273. b c. 308. a |
| | | Fœtus | |

I N D E X.

- Fœtus quo pacto erumpat. 37.c.42.b
 Fœtus in vtero per vmbilicū inspirat & respirat. 42.a
 Fœtus in vtero quomodo cre-
 scat. 35.f
 Fœtus in vtero terræ nascenti-
 bus comparatur. 41.f
 Fœtus immobilis expulsio. 268.f
 Fœtus in vtero qd agat. 45.d
 Folia viridia cum incendun-
 tur spirant. 35.a
 Fomenta calida dolorem mi-
 tigan. 96.d
 Fomenta vtilia. 107.e
 Fomenta pudendi. 240.f
 Fomenta diuersa ad fluxus. 294.a
 Fomentum ad vteros. 281.a.
 282.a.296.c
 Fomenta vterum durum pur-
 gantia. 297.c
 Fomentum ex stercore bu-
 bulo. 225.e
 Fontes.iiij.pleni semper cor-
 pori distribuūt.183.a.180.b
 Fontes , putei visi in somno,
 quid velint. 127.b
 Fontes humanæ naturæ. 61.f
 Foris aut intus quæ profint
 vel noceant. 135.b
 Fortuna bona,aut infortuniū
 omni morbo accedit. 4.f
 Fortuna sui iuris semper nec
 optanti sese offert. 81.f
 Fracturarum & luxationum
 curatio. 468.f
 Frictio. 23.a
 Frictio ex oleo & aqua. 117.a
 Frigefactio. 131.a
 Frigidæ noxa. 515.a.b
 Frigida sæpius vtentes quid
 patiantur. 131.b
 Frigida & humida aluū sub-
 ducunt. 81.e
 Frigidum calido est alimen-
 tum. 45.d.35.a
 Frigidum exulcerat. 324.a
 Frigus vehemēs quid faciat.
 356.d
 Frumentum & vinum inter
 se differunt. 202.d
 Fulcimenta quibus adhiben-
 da. 453.e
 Fullonum tubercula magna.
 374.c
 Furoris causā bilis redundās.
 527.b

G

- Galeancones quales.488.
 a.473.f
 Gargarismus. 159.f
 Gemellorū procreatio. 105.d
 Gemelli cur inter se similes.
 Ibidem.e
 Gemelli vno coitu fiunt. 43.e
 Gemelli aliquando masculus
 & fœmella generatur.43.f
 Gemellos gestans,eadem die
 parit,velut concepit. 54.e
 Geometriæ vtilitas. 532.f
 Generationes hoīs tres. 105.b
 Genituræ per venas via quo-
 modo fiat. 38.c
 Genuinus dolor. 25.a
 Genu luxatum faciliè reponi-
 tur. 73.c.467.c.

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| <i>Ames. 443</i> | Glandulæ quales. | 62.e f | Hepatis & partium interna- | |
| 430. | Glandulæ qua parte sint. | 63.b | rum descriptio. | 533.d |
| | Glandulæ periculosæ. | 473.c | Heracleius. | 315.a |
| | Glandulæ intestinorum qua- | | Heragoras. | 321.b |
| | les. | 64.a | Heraclidis ægri historia. | 313.c |
| | Glandulæ intestinorum ma- | | Herba brevis melior pecori- | |
| | iores. | 63.d | bus. | 471.f |
| | Glandulæ renum. | Ibidem. | Herbarum facultates à qua- | |
| | Glandulæ morbum generat. | | litatibus. | 113.e f |
| | Ibidem.f | | Hermocratis ægri historia. | |
| | Glandulæ & pili eiusdem uti | | 328.f | |
| | litatis participes. Ibidem.b | | Herophon graui morbo li- | |
| | Gnato. | 115.a | beratus. | 317.a |
| | Gracilium victus ratio. | 30.a | Heropythi Abderitani histo- | |
| | Grammatica. | 104.a | ria. | 335.e f |
| | Grauedinis curatio. | 300.a | Herpetes mitiores. | 417.f |
| | Graueolentiæ in pudendis cu- | | Herpetes quibus familiares. | |
| | ratio. | 238.d | Ibidem.c | |
| | Gratis nonnulli curandi. | 22.b | Hiatus præcedit febres. | 96.a |
| | Gulæ effigies. | 60.e.61.b | Hiantia nihil attrahunt. | 15.c |
| | Gutturis dolentis curatio. | | Hippace quid. | 91.a.187.c |
| 3 27e | H | | Hippocratis diuersa curandi | |
| | Habit ⁹ boni causa. | 185.c | ratio à Cnidij medicis. | |
| | Habitus bonus quando | | 379.b | |
| | mutandus. | 508.b | Hippocrates contemptor pe- | |
| | Hæmorrhoidum causa & cu- | | cuniarum. | 2.b |
| | ratio. | 505.f.506.a c f.507. | Hippocratis laus & genealo- | |
| | b.395.c | | gia. | 520.d |
| | Hæmorrhoidum cognitio. | | Hippocrati oblata ab Artax- | |
| | 506.b | | xerxe rege. | Ibidem.f |
| | Hæmorrhoidarum utilitas. | | Hippocratis ad Democritum | |
| | 136.d | | aditus | 526.c d |
| | Hæmorrhoidas patientes, à q- | | Hippocratis inuentum. | 120.b |
| | bus morbis tuti sint. | 357.b | Hirundo. | 118.b |
| | Hemitriteos eiusque signa. | | Homo humores quatuor sem- | |
| | 310.c | | per habet. | 26.c |
| | Hepar iaculo percussus sta- | | Homo totus ex natiuitate | |
| | tim moritur. | 15.f.351.b | morbus est. | 529.f |
| | Hepati infestissima. | 214.e | Homo quatuor locis purga- | |
| | <i>Hepar in thorace consistit.</i> | 7. | tur | |

INDEX.

13

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|
| tur. | 184.a | Humores quatuor in homine |
| Homo omnium artium par- | | imitantur quatuor anni tē |
| ticeps | 104.c | pōra. |
| Hominis temperamentum. | | Humorum impetus & ferocit- |
| Ibidem. | | tas. |
| Hominis fundamentum, seu | | Humorum qualitates. |
| materia. | 11.e f | Humorū quatuor sōtes. |
| Hominum species & colores | | Humores in corpore quo pa- |
| boni. | 417.b | cto minuantur. |
| Homines sicuti arbores nu- | | Humores, succiue & sapes |
| triantur. | 41.c.118.c | in homine. |
| Hominis calefacti historia. | | Humoris aquai in vtero si- |
| 319.b c | | gna ac curatio. |
| Hominum sancita mutabi- | | Hydropis duo genera ac cu- |
| lia. | 102.e | ratio. |
| Hormini semen. | 111.e | Hydropis causse. |
| Horrentes quales. | 424.b | Hydropis origo. |
| Horro qualis. | 151.f | uerlitas. |
| Horroris ante febres causse. | | Hydropis signa. |
| 95.f | | |
| Hortandus æger, vt bene spe | | Hydropis præcognitio. |
| ret. | 22.f | Hydropicorū curatio. |
| Humerorum dolor. | 422.e | |
| Humerorum luxatio. | 469.d | |
| Humeri luxati repositio. | 470 | |
| a b d. & vltio. | 473.a | |
| Humeri summi auulsi cura- | | |
| tio. | 474.a b | |
| Humida cōpressa magis, sic- | | |
| caminus putrescunt. | 40.c | |
| Humidæ magis supernæ par- | | |
| tes quàm infernæ. | 73.f | |
| Humidi quatuor species. | 32.c | |
| Humidum & liquidum calo- | | |
| ris quid habeat. | 46.a | |
| Humorum obseruatio & ef- | | |
| fectus. | 134.f | |
| Humorū differentia ex pon- | | |
| dere. | 187.f | |

*humorū nu-
meris 182
f. 180. d
24 f.*

*Hydropis
species 192*

*Humores temperantes
ess. 13.*

††† 3

I N D E X.

| | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| inuehat. | 84.a b c | Imperitia, malus thesaur ⁹ . | 3.e |
| Hyemales morbos æstas succedens transmutat. | 337.e | Imperiginis curatio. | 293.c |
| Hygea. | 2.d | Imperigines, leuæ, & lepræ unde fiant. | 423.d |
| Hyslopum. | 113.e | Incertæ morborū prædictiones quæ. | 510.a |
| I | | In cōceptus cupiditate quid agendum. | 104.e |
| I Cteri curatio. | 78.c | In Dealcis horto decumbentis historia. | 329.b |
| I Cterus niger & curatio. | 161.f | Indicationes variæ. | 314.e |
| Iecur. | 45.e.60.e.66.d | Indicia ex egestionibus. | 510.a.513.a.442.c |
| Ieiunium qui facilius ferant. | 509.b | Indicia ex atra bile. | 513.a |
| Ignarorū graphica depictio. | 4.c | Indicia crisis. | 509.f |
| Ignis. | 115.c | Indicia ex somno. | Ibid.e |
| Igni aquam superante quales fiant homines. | 107.e | Indicia ex febribus. | 513.e f |
| Ignis & aqua omnia constituunt. | 100.c d | | 514.a |
| Ignis & aqua quæ à seinuicē fecernant. | Ibid.e | In doloribus quid agendum. | 359.a |
| Ignis & aquæ vires. | Ibid.d e | Industria medicinæ cultura. | 3.e |
| Ignis humiditas in vena caua. | 102.c | In exacerbationibus obseruanda. | 134.c |
| Ignis quæ gubernet. | Ibid.d | Inexercitati cū laborant, quid patiantur. | 117.b c |
| Ignis tres partes. | Ibidem. | In Helide morbi populares. | 345.c |
| Ignis inimicus neruis. | 473.e | In febre acuta siticulosus vomitus ex aqua frigida prodest. | 345.a |
| Ignem sacrum ab vlceribus prohibentia. | 500.b | Inflationis parientis curatio. | 238.c |
| Ignorātia vbi malum. | 409.d | Inflammatio ad palatum. | 161.a |
| Ignorata à medicis. | 379.f | Inflammationis curatio. | 299.b |
| Ignis sine spiritu non viuit. | 94.f | Initio morbi purgandum esse. | 510.c |
| Illyrica pestilentia. | 537.d | | |
| Imagines præ oculis cursitantes. | 72.a | | |
| Impedimenta quominus ex æta victus ratio describi possit. | 118.b c | | |

impotentia 409 *425 inguinis dolor* *Infœcun*

*Jejunij in se
lin intermedia*

302

215 e

215 e

INDEX.

14

| | |
|--|-----------------------------|
| Infecundæ victus ratio & cures constitutio. | 313.a |
| tatio. | 56.d e f |
| In locis siccis nata. | 114.e |
| Inobediētia ægri causa mor-
tis. | 6.a |
| In Oeniadis morbi popula-
res. | 345.d f. 346. |
| In Perintho morbi populares
qui. | 323.d |
| Infantia citra medelam sana-
tur. | 525.e |
| Infantiæ aut cerebri corrupti
causæ. 2. & vtriusq; cogni-
tio. | 531.c |
| Infantiæ species. | 107.e |
| Infanientis signa. | 328.c |
| 408.d | |
| Infantiæ solutio. | 398.c |
| Inſita proprium fructum fe-
runt. | 41.e |
| In ſomnis quæ obueniant. | 124.f |
| Infomnia phreniticū. | 408.b |
| Infomnia quæ vexent. | 399.e |
| Infomnia & ebrietas animū
immutant. | 97.e |
| Instauratio faciliior quā fiat. | 509.f |
| Instrumenta. | 17.a |
| Instrumenti constructio. | 483.d |
| Insularum qualitas. | 109.b |
| Intelligentia & prudentia à
cerebro non à præcordijs. | 142.f |
| Intemperantia morientium,
mortis causa. | 5.e |
| In tempore quæ veniunt, bo-
na sunt. | 145.e |
| In Thaso qualis tertia tempo-
ris constitutio. | 313.a |
| Intestinorum morbi vnde. | 64.a |
| Intestinorum diuturna leui-
tas. | 322.e |
| Intestini recti inflammati cu-
ratio. | 504.d e |
| Instrumenta chirurgi in pro-
ptu sint & ministri. | 451.b |
| Instrumenta medico in prom-
ptu esse debent. | 20.b |
| Instrumentorum omnium for-
tissima quæ. | 465.f |
| Inuentio medicinæ. | 9.f. 8.f |
| Inuentum Hippocratis. | 128.b |
| Ionia regio & Peloponessus | 181.a |
| Irio. | 111.c |
| Ischiados causa & curatio. | 222.f. 77.c. 400.b. 198.b c |
| Iuuantia & lædētia. | 81.a |
| Iudicationes bonæ vel malæ | 316.a |
| Iudicium sine signo iudica-
tionis malum. | 324.d |
| Iuniores cur magis seniori-
bus afficiuntur. | 151.b c |
| Iunonis templum. | 310.f |
| Iuuenum victus ratio. | 29.e |
| Iusiurandum Hippocratis. | 2.d |

L

| | |
|------------------------------|-------|
| Abor viris quid cōferat. | 243.c |
| Labor quando noxius. | 510.a |
| Labor quando vlcera excitat. | 358.f |
| Labores cibos præcedant. | 358.b |

*Judicatio
quid. 194*

INDEX.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Labores in circuitibus. | 325.d | 317.e | |
| Labores subeundi in ætate. | 118.e f | Lateris tubercula quæ fiant. | |
| Laboris effectus. | 186.d.187.c | 149.d | |
| Laborum vis. | 115.e f | Lateris tuberculum, & eius | |
| Lac cur fiat. | 39.a | curatio. | 168.f |
| Lac nutrimentum. | 129.e | Laudandi potius quàm vitu- | |
| Lac alinum pro fero coqui | | perandi qui vel tantillum | |
| tur. | 277.d | vitam humanam adiuuat. | |
| Lac pustulas excitat. | 322.c | 99.d | |
| Lac extinctum quænam re- | | Lectus ægri qualis esse de- | |
| uocent. | 256.b | beat. | 384.e |
| Lactis facultas. | 110.e | Legumina in Aeno. | 357.f |
| Lactis copia quando. | 39.b | Leguminum facultates. | 193.f |
| Lactis procreatio. | 263.f | Legumina, arborei fructus et | |
| Lactis potus. | 209.d.222.d | similia spiritum habent | |
| Lactis varietas. | 130.a | 35.a | |
| Lactis suppressi remedia. | | Lenientia, exasperantia, clau- | |
| 239.d | | dentia, & aperientia vte- | |
| Lachryma calida & falsa. | | rum aut locellos. | 57.b |
| 419.b.342.f | | Lentes ætuosæ. | 111.c |
| Lachrymæ inuitæ fluentes. | | Lentis ac Lupini vires. | 393.f |
| 314.d | | Lethales alui egestionēs. | |
| Lachrymæ vltroneæ & inuo- | | 443.c | |
| luntariæ. | 354.e | Lethargus & eius curatio. | |
| Lactuca. | 113.c | 170.a.173.d | 420.e. |
| Læsiō ex aceto mulso. | 386.d | Lex Hippocratis. | 3.b |
| Lagopyrus. | 501.c | Leges sibi posuerūt homines | |
| Lapis Magnesiac. | 211.c | non intelligentes. | 102.e |
| Lapis in vesica quæ fiat. | 190.d | Libri Hippocratis in contro- | |
| Lapsus ab equo quid attule- | | uersiam adducti. | 2.b |
| rit. | 340.d | Libum vestitus. | 191.d |
| Larinx. | 66.d | Libya, Delos & Scythia pro | |
| Lassitudines spontaneæ mor- | | omnibus regionibus ponū | |
| bos denunciant. | 509.e | tur. | 407.f |
| Lassitudinis curatio. | 117.c.d | Lien. | 70.e |
| Lateris dolor, ex sputis bilio- | | Lienosorum signa. | 356.a |
| sis. | 410.c | Lienosi eorumque curatio. | |
| Lateris sinistri grauitas. | | 196.c | |
| | | Lienosi passiones. | 134.f.135.a |
| | | Libyria | 396. |
| | | 420. | Lien |

- Lienteria eiſque curatio. 197.c.299.f. Locum ſuum ſingula ſeruāt. 101.c.
- Lienterię ſymptomata. 437.c. Locuſ morborum differentiā facit. 94.c.
- Ligationum ſpecies. 451.c. Locuſ affectuſ ſpiritu occupatur, vnde rupturę. 97.2
- Ligna ardentia ſpiritu emittunt. 34.f. Locuſ ad diſciplinā aptuſ eſt velut eiſ nutrimentum. 3.c.
- Lignum medico paratū quale. 495.a. Locri populi. 535.d.
- Lini ſemen. 111.c. Lucis ratio. 16.c.
- Lingua ſaliuoſa. 399.c. Lucis ſpecies duę. 450.c.
- Linguae viſ. 103.d. Luſta. 116.c.
- Linguae affectuſ cauſſę & notę varię. 358.e. Lumborū dolor. 409.b & mala alia. 410.d.
- Linguae vocisq̃ diuerſitas. 321.b. Lumborum doloris curatio. 238.c. 27.
- Linguae obſcuritas vnde. 23.d. Lumbi aut latera vexata eorumq̃ curatio. 230.b.
- Linguae ſpaſmi & tremor. 408.d. 413.f. 429. Lumbrici lati quī naſcantur. 189.d.
- Linguae immobilitas. 323.a.b. Lumbrici rotūdi pariunt, nō autem lati. 189.e.f.
- Linimentum omnia educēſ. 297.b. Lumbricus longuſ. 190.a.
- Linſeola. 16.f. Lumbrici lati ſigna. 190.b.
- Linſea in deligaturis qualia. 452.a. 453.d. 455.d. Luna per ſomnū pati viſa qd portendat. 125.f.
- Linſeorū in deligaturis quantitas. 463.f. Lupinum. 111.c.
- Linſeorū ſubligationeſ duę. 452.d. Luxationum curatio. 472.c.
- Lippitudiniſ ſolutio. 398.f. Luxationiſ curationiſ communia. 476.c.
- Lippitudiniſ curatio. 508.a. 299.c. Luxationiſ ſumma. 491.b.
- Lippitudiniſ criſiſ. 419.a. Luxationiſ articulorum pedis curatio. 468.a.
- Loca corporiſ vacua. 7.a. Luxationiſ veteriſ reſoſitio. 471.c.
- Loca alta & ſquallida. 108.f. Luxationum mala. 459.f.
- Loca ſaucia curatuſ difficilia. 417.c. Luxuſ domeſticuſ prohibeſ. 16.f.
- Locorū mutatio quos inuēt. 359.c.
- Locuſ biliſ fel. 183.d.

linſeolę. 425.

††† 5

Locuſ ſani
246.80m
246.20m
Lumbricoz
epitę 27
009.390.
442.

M

454.C

lanuum latro quid porten-
dat. 402. a. 410. c

lare perturbatum in somno
quid velit. 127.b

Mare quibus proſit. 132.a

Marium corpus. 65.b

Mas & femella qui gignan-
tur. FO 4. c

Masculi in omni genere calidiores & sicciores sunt.

106.e

Mas aut femina quomodo
generetur. 57.a

Masculus dextris in vtero hē
ret. 327.f

Matutinae deambulationes.
116.b

Maxillæ solæ inter omnia of-
fa venulas habent. 46. de

Maxillæ luxatæ repositio ac
curatio. 477. a d

Meatus capitis septem, totq;

| | |
|----------------|-------|
| Huxiones. | 64.6 |
| Meconium quid. | 396.2 |
| Melasma quid. | 1 |

Medicina quid. 21 f. 4. e. 94. d
Medicinx antiquitas. 8. f
Medicine curatio. 21 f. 4. e. 94. d

Medicina qualis. 81.
Medicinae viæ seu partes.

Medica ars quibus constet.

312.1
Medicina cur sapientiæ so-

M Achinamenta quibus
partibus adhibean-
tur. 464.C

Macri signa. 321.C

Macrocephali. 89.c

Maculas solares purgantia.
293.C

Madefactio. 131.2

Meotis palus Europæ & Asiæ
terminus. 89.b.90.d

Magi & expiatores. 137.d

Magi vel venefici quales.
138.a

Mala odorata. 180.a

Malapunica. 114.b.202.a

Mala dulcia. 114.2

| | |
|----------------------|-------|
| Mala sylvestria. | 114.a |
| Mala ex usu veneris. | 356.d |

Malorum humorum caussa.
14.ab

Mala homini unde accidunt.
14.b

Malum ex articulo non repo
sito. 490.a

Malu a bono non fit nec contra. 154.e

Maligniora quæ derepente ap-
parent. 325.f
Maligniora quæ derepente ap-
parent.

Malienſis curru onuſto calca
ri hiſtorie

| | |
|-------------|-------|
| Malicorium. | 214.d |
| Mammæ. | 65.c |

Mammæ exasperatę curatio.

Mandibulæ. 72.c
Mantecis seu atrabilieris ad

contingat. §23.C

INDEX.

16

*medicines
rue de
275 14*

| | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ror. | 533.a | Medico cōsideranda ante cu- |
| Medicina varia. | 129.b | rationem. 5.f.20.d.401.c |
| Medica ars nihil cæteris si- | | Medici ad duos fines mili- |
| mile habet. | 7.e | tant. 525.e |
| Medicina diuisa in chirurgi- | | Medicū quæ nosse oporteat. |
| cen , pharmaceuticen & | 143.c | |
| diætericen. | 10.c | Medicus quæ præstare de- |
| Medica ars cur refelli non | | beat. 143.e |
| possit. | 5.e | Medicus deos potissimum |
| Medicina quæ doceat. | 81.f | colit. 19.f |
| Medicina constans & firma | | Medicus Philosophus deo æ- |
| tota. | 81.f | qualis. 19.e |
| Medicinæ pars potissima. | | Medicus qui laudandus. |
| 399.a | | 379.e |
| Medicina non statim scitur. | | Medicorum error in arenæ |
| 80.b | | iudicio. 208.f |
| Medicinæ voluptates & mo- | | Medicus assiduè legat. 23.c |
| lestiæ. | 94.ab | Medico quid agendum erga |
| Medicina morbos omnes nō | | ægotantes. 356.b.357.f |
| sanat. | 4.e | Medicus considerat morbos |
| Medicinæ artis præstantia & | | in corpore præualentes. |
| contemptus. | 3.b | 26.e |
| Medicinæ comparatio ad a- | | Medici præparatio ad articu- |
| griculturam. | 3.d | lorum repositiones. 459.c |
| Medica ars esse, & vera affir- | | Medico præstanda in fractu- |
| matur. | 8.e | ris. 454.a |
| Medicina ars est de rebus vel | | Medici imperiti taxantur. |
| morbis vulgo notis. | 9.b | 454.b |
| Medicinam homines coacti | | Medico curāda in capite vul- |
| sunt inquirere. | 9.b | nerato. 444.b |
| Medicus qualis esse debeat. | | Medicus morbum, vbi nouit |
| 16.c e | | facilè pellit. 7.d |
| Medici munus. | 312.f.401.a | Medicus etiam rudes sciscita |
| 508.d | | ri debet. 21.f |
| Medici munus in rectè tra- | | Medicus admonetur. 23.d |
| ctandis mulieribus. 225.e | | Medicus de quibus iniuste ar |
| Medico diligenter obseruan | | guatur. 146.c |
| da. | 361.d e f.362.10.a | Medicus ægros crebro inui- |
| 133.c d. | | sere debet. 20.e |
| | | Medici |

INDEX.

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Medici plures conuocandi. | do mouenda. 509.d e. 512.d |
| 22.e | Medicamenta nulla quando |
| Medicus de rebus vulgo no- | adhibenda. 509.d |
| tis tractat. 9.a | Medicamenta quibus nō ex- |
| Medicis non vtentes sanari | hibenda. 409 532.d |
| posse. 5.a | Medicamentum in repletio- |
| Medici fama multi, re pauci. | ne reijcitur. 121.d |
| 3.c | Medicamenta purgantia & |
| Medici personati. Ibidem. | sistentia non satis sunt ad |
| Medicus malus qd agat. 22.c | conualescentiam. 5.d |
| Medici nauium rectoribus | Medicandum perperam non |
| comparantur. 10.e | esse. 145.e |
| Medici alimentum salubre | Medicamēta sine fortuna, sed |
| excogitauerunt. 9.e | melius cum ea sanant. 82.a |
| Medicorum quorundam opi- | Medicamētum tetragonum. |
| nio. 24.b | 220.f |
| Medicamentorum vires & a- | Medicamentum sanguinem |
| ctio. 81.c. 191.c | sistens. 395.b |
| Medicamentorum modus. | Medulla ossis alimētū. 130.d |
| 324.b | Medulla spinæ, improprie |
| Medicamenta pro natura cu- | medulla. 45.a |
| iisque danda. 98.e | Medulla spinæ cur resicetur. |
| Medicamenta ad conceptum | 208.c d |
| 265.a d e f. 266.a. 272.c | Medullæ spinæ affectæ signa |
| Medicamenta conceptum re- | 418.e |
| parantia. 302.f | Mel. 113.b. 202.c |
| Medicamentum contra abor- | Mel Atticum. 223.b |
| tum. 55.d | Mel semicoctum. 82.f |
| Medicamenta valentia mor- | Melancholici & comitiales |
| bis acutis, debilia mitiori- | communicant. 362.d |
| bus exhibenda. 81.d | Melancholicum cacoëthes. |
| Medicamenta valentia ad vl- | 408.c |
| cera. 500.d c f | Melidia graui morbo libera- |
| Medicamenta, cruda adhuc | ta. 319.f |
| materia quæ noceât. 388.d | Melissus. 24.b |
| Medicamenta non adhiben- | Melos insula. 346.b |
| da. 79.b | Membra adnascantia. 51.b |
| Medicamenta danda. Ibid.c | Membrorum confirmatio. |
| Medicamentis quæ nā & quā- | 104.d |
| medicamēta casu reperta 200.c. | melancholice Membro |
| | curatio. 79. |

- Membrorum origo. 71.a.b
 Membrana tunica. 44.e.f
 Mens hominis obscura. 102.f
 Mens quando non fallitur. 399.b
 Mentis situs. 62.c
 Mente valere in morbis, bonum. 510.d
 Menses cur à natura inuenti. 302.f
 Menses quando pauciores qd agendum. 235.a.301.f
 Menses quos morbos extrudant. 440.c
 Menses mali qui. 439.c
 Menses educentia. 515.c
 Menses quibus diu permaneant. 354.c
 Menses diutius quàm quatuor diebus fluētes, malū. 245.f
 Menses diutius suppressi quos morbos excitent. 243.e
 Menses sex mensibus retenti incurabiles. 243.f
 Mēsiū varius affectus. 244.a.b
 Menses cum in pudendum non procedant. Ibidem.c
 Mensium modus & qualitas. 245.f
 Mensibus septem annis suppressis qd euenerit. 343.a
 Mensium bilioforum signa. 246.c
 Mensium pituitosorum effectus. 247.a
 Mensium plus iusto fluentiū curatio. 306.a.d.e
 Mensium prouocatio. 264.a
 Mensium purgatoria. 241.c
 Mensium suppressorum curatio. 238.a.f.239.a.244.c.229.a.b
 Mēsiū defectu mortua. 262.e
 Mēsiū cognitio. 271.b.247.d
 Menstrua diutius retinentibus quæ ægrotudines contingant. 36.c.d
 Menstruarum purgationum circuitus est. 325.e
 Menstruorū in iunioribus & senioribus differētia. 83.a
 Mentha. 113.d
 Meretrices quæ docuerunt. 48.a
 Mespila. 114.a
 Mesocolon. 66.d
 Meton vehementi febre correptus. 318.b
 Milium quid sistat. 321.e
 Milium alit. 111.c
 Militarium vlcerum curatio. 18.c
 Ministri quales ægrotis dandi. 21.a
 Mira & brevis tum humorū tum partium animalis enumeratio. 129.c
 Missio sanguinis vbi & quādo facienda. 17.c.d
 Missiones in hoīe bonæ. 14.d
 Modicis impleri & pluribus vacuari qui contingat. 115.a
 Molæ in vtero generatio & expulsio. 292.a
 Molæ conceptus causa, signa ac curatio. 307.b.c.363.c.d
 Mollitoria. 267.b
 Mollit

*missio sanguinis
 nis ea p...
 uon...
 co...
 152. x*

I N D E X.

| | | | |
|--|-------------------|---|---------------------------|
| Mollitoria vteri varia. | 296.c | bonum. | 510.d |
| Morbiditas. | 115.e.200.b | Morbus quando debilior & quando fortior. | 510.e |
| Moræ. | 113.f | Morbus facer quibus dijs tribuatur. | 138.c d e.143.c |
| <i>morbi in sanis debiles</i>
Morbus typhos dictus cum causis ac curatione. | 218.a b.219.a | Morbus facer sanabilis. | 138.f |
| <i>morbi in sanis sunt</i>
Morbus biliosus. | 223.c | Morbus deficcatorius & curatio. | 170.b |
| <i>morbi in sanis sunt</i>
Morbus sanguineus. Ibid.e.d | | Morbus iudicare quid. | 194.b |
| <i>morbi in sanis sunt</i>
Morbus liuidus & curatio. | 170.e | Morbi laterum causa & curatio. | Ibidem.a f |
| <i>morbus</i>
Morbus ructuosus eiusq; curatio. | 170.f | Morbi pituitosi causa & curatio. | 211.d |
| <i>quid 94 p</i>
Morbus pituitosus eiusq; curatio. | 171.b.223.c | Morbi crassi & hydropis eadem est curatio. | 222.e |
| Morbus magnus, à renū morbo. | 210.a | Morbi æstate vexantes eorūque curatio. | 195.a c |
| Morbus crassus sex annos vexat. | 222.e | Morbi hepatici causa, signa ac curatio. | 213. f.214. a b d e.215.b |
| Morbus locellorum. | 225.d | Morbi varij. | 332.e |
| Morbus ex abortu dolorem vicinis vteri partibus communicans. | 225.d | Morbi æstiuī & autumnales. | 310.e.311.c |
| <i>424.d,</i>
Morbus regius. 338.d.313.c. 373.d.396.e.398.a.400.c | | Morbi lethales. | 228.b c |
| Morbus regius acutus eiusq; curatio. | 175.a.180.a.198.e | Morbi qui ante pubertatem non fiunt. | 439.b |
| Morbus æstiuos hyems succedens soluit. | 337.e | Morbi natura. | 327.e |
| Morbus latentes opinio potius quàm ars iudicat. | 94.c | Morbi popularis cura. | 27.b c |
| Morbus imaginationis. | 64.d | Morbi ex mensibus suppressis. | 439.e |
| Morbus à venis ortus. | 62.c | Morbi post canem sydus qui. | 363.a b.364.365.&c. |
| Morbus niger eiusque curatio. | 172 a b c | Morbi ab spiritu fiunt. | 95.b |
| Morbus stercoris vomitū faciens. | 123.f | Morbi. II. à pituita cum curatione. | 199.a |
| Morbus corruptorius eiusq; curatio. | 172.d | Morbi cur obsecuri. | 7.b |
| Morbus aliquo modo affinis, | | Morbi obsecuri multi, manifesti pauci. | 6.e |
| | | Morbi ex ptu curatio. | 284.a |
| | | <i>morbi interni</i>
<i>per quos cognoscantur.</i> | Morbi 7. |

INDEX.

18

| | |
|---|---|
| Morbi paulatim accedunt. | Morborum acutorum natura. |
| 100.c | 195.a |
| Morbi cuiusq; vterorum sedatio. | Morborum causſæ aër & victus ratio. |
| 298.a | 27.a |
| Morbi vernaculi. | Morborum ex victus ratione curatio. |
| 84.e | 393.c |
| Morbi acuti vnde. | Morborum diuerſi effectus. |
| 399.d | 338.d.340.b |
| Morbi lethales. | Morborum omnium cõmunēs ſolutiones. |
| 151.d.144.c | 393.a |
| Morbi ex abortu cauſſa & curatio. | Morborum vteri ferè omnium curatio. |
| 259.f.260.d | 283.e |
| Morbi comitialis diuerſi affectus. | Morborum cognitio & obſervatio varia. |
| 139.f | 315.c.197.e |
| Morbi ex repletionē curatio & cõtra. | Morborum modi. |
| 510.b.120.f.122.b | 135.c |
| Morbi à capite orti. | Morborum effectus diuerſi. |
| 156.b | 130.f |
| Morbi partium anni. | Morborum omnium idem modus. |
| 135.e | 94.e |
| Morbi mutilantes. | Morborum duo genera. |
| 144.d | 534.a |
| Morbi longi. | Morborum natura medicus. |
| ibidem.e | 358.c |
| Morbi citò decernētes. | Morborum decreta. |
| ibid. | 185.c |
| Morbi in alios tranſeuntes. | Mores fieri. |
| ibidem. | 84.e |
| Morbi neceſſariò ex alijs ſuperuenientes. | Moribundis in Perintho quē acciderent. |
| ibidem.f | 324.b |
| Morbi acuti qui. | Mori appetentium curatio. |
| 379.e | 79.f |
| Morbi connutriti curatio. | Morituri & futuri ſuperſtites quibus noſcantur. |
| 358.d. | 408.e.f |
| Morbi dubij. | Morituri ex vulnerato capite ſigna. |
| 144.d | 449.e |
| Morbi ab hepate & ſplene. | Mors Hippocratis. |
| 321.d | 1.f |
| Morbi diebus imparibus iudicantur. | Mors quo tempore accidat. |
| 180.d | 327.e |
| Morborum cauſſæ. | Mors vnde contingat. |
| 186.e.187.f. | 51.a |
| 24.f.26.f.135. d. 144.b. | Mortis ſignum. |
| 193.a | 409.c.418.c |
| Morbi vnus ſigna ſeptē. ibi. | Morum diuerſa ratio in Europæis atque Aſianis. |
| Morborum tria principia. | 92.f |
| 187.a | 93.a |
| Morborum quinque craſſorum cauſſa & curationes. | |
| 221.a | |
| b.f.222.a d | |

*morborum
differentiæ
ſc.*

153. f.

INDEX.

- mensis* 93.a
mensis Mucus à natura. 73.d
mensis Muliebris menstrui causa. 243.c
mensis Mulier vterum gerens cur à
mensibus non doleat. 36.a
mensis Mulier præter naturam pin-
guis non concipit. 55.d
mensis Mulier qui prægnans fiat. 239.e.241.a
mensis Mulier cur sit viro calidior. 243.c
mensis Mulier ab vtero quo modo
stranguletur. 246.b.c
mensis Mulier concipere solita cur
non concipiat. 304.d
mensis Mulier bimestrem aut gran-
diorem foetum cur perdat. 55.d
mensis Mulier lienosa. 356.c
mensis Mulier Larissa decimo men-
se abortit. 346.c
mensis Mulier concipere cupiens. 349.f
mensis Mulieris non concipientis
purgatio. 241.d.305.a.247.c.250.a
mensis Mulieris à partu non purga-
ta curatio. 227.b
mensis Mulieris corpore malè habē-
te menses pauciores fluūt. 246.e
mensis Mulieris cibum, ob vteri do-
lorem, auersantis curatio. 237.c
mensis Mulieris semen retinētis sed
non concipientis curatio. 308.d
mensis Mulieris inuita abortum fa-
cientis curatio. 308.f
mensis Mulieris quæ diu non cōce-
pit, curatio. 237.d
mensis Mulieris præ obesitate non
cōcipientis curatio. 303.d f
305.f
mensis Mulieris decumbentis in lit-
tore historia. 319.d
mensis Mulieris apud Tifamenū de-
cumbentis historia. 330.f
mensis Mulieris à morbo vteri ob-
mutescentis curatio. 287.b
mensis Mulieri post viri congressum
quid agendum. 248.b
mensis Mulieri semen non cōtinen-
ti quid agendum. ibid.d
mensis Mulieres rariore carne & te-
neriore quàm viri. 243.a
mensis Mulieres cur steriles fiāt. 301.
b d.303.c.226.f. cur non cō-
cipiant. ibid.b f
mensis Mulieres crassæ cur nō con-
cipiant. 229.d
mensis Mulieres etiam hydropem
patiuntur. 192.d
mensis Mulieres quæ grauius è men-
sibus ægrotent. 242.e
mensis Mulieres à vatibus deceptæ
quid Dianæ consecrarent. 225.a
mensis Mulieres quæ paterentur. 313.e
mensis Mulieres in conceptu errant. 49.e
mensis Mulieres, quæ longius quàm
decem menses vterum ge-
stasse visæ sunt, falluntur. 42.d.
mensis Mulieres nihil aut parum la-
tis

- Otis habentes. 43.a
 Mulieres vterū nō gerētes à
 sup̄p̄sis mēfib⁹ dolēt. 36.b
 Mulieres menstruīs carētes
 non concipiunt. ibidem.
 Mulieres plūs vel minus in
 partu laborantes. 37.b
 Mulieres cur falsò seuerum
 gerere credant. 280.e
 Mulierū diuersæ naturæ, tū
 à coloribus, tum ab ætati
 bus petita. 225.c
 Mulierum affectus. 360.b
 Mulierum victus ratio. 30.e
 11.a c
 • Mulierū diuersi morbi. 341.e
 • Mulierū trium ægrotātium
 historia. 331. a b c
 Mulierum fœcunditatis co-
 gnitio. 420.c
 Mulierū Scythicarū formæ
 fluxæ. 91.e
 Mulierib⁹ iudicio p̄ditis de
 partub⁹ fides habēda. 49.d
 Mulieribus omniū morborū
 causæ vteri. 82.b
 Multi valetudinarij nascun-
 tur. 52.c
 Multi etiam imprudentes in
 medicinam incidunt. 5.a
 Multi priore cibo perierūt.
 9.d.
 Multa ex vnoquo modogi-
 gnantur. 39.e
 Mundi imitatio. 102.c
 Musculi solidiores. 130.c
 Musica. 103.c
 Mustum. 113.a
 Mutatio ciborū quī fieri de-
 beat. 382.c. 383.
 Mutatio subita & magna pe-
 riculosa. 383.b. 384.f
 Mutationes locorū ac victus
 morbos gignunt. 52.e
 Mutationes locorum, varios
 homines procreāt. 93.b.c.
 Mutationes mentem excitāt
 90.b
 Mutatiōes que cauēde. 357.a
 Mutationes tēporis & aeris
 morbos pariunt. 511.b
 Mutationes temporū obser-
 uandæ. 88.d
 Mutationes temporum mor-
 bos pariunt. 136.a
 Mutus cur fiat qui conitiali
 morbo corripitur. 139.f
 Muti vnde. 47.e
 Mutili à natiuitate curabi-
 les. 491.d
 Myli ægri historia. 313.d
 N
 Nares repletę nihil emū
 gentes. 120.c
 Nares humidas habētes qua-
 les sint. 359.d
 Narium qualitas. 71.e
 Nasi fracti curatio. 478.f
 479.b.
 Nasturcium. 113.c
 Natationes somniare quid
 velit. 127.d
 Natura facienda demon-
 strat. 8.a
 Natura repugante omnia
 irrita fiunt. 3.d
 Natura calidior quantum à
 cæteris variet. 108.a
 †††

INDEX.

| | |
|---|---|
| Natura in omnib' dux. 19. c | Neruum qualitas. 72. c |
| Natura ossium, neruorum,
venarum, carnis & aliorū
humorum, qui cognosca-
tur. 359. c | Nexus qua parte procedat.
451. d |
| Naturæ humanæ descriptio.
533. b | Nicodemi Abderitani histo-
ria. 336. a b |
| Naturæ actio. 7. f | Nihil temerè iudicādū. 355. e |
| Naturæ conatus & vis. 103. b | Nocumentum nullum à me
dico bono, aut ab arte me-
dica oritur. 5. d |
| Naturæ & morbi quib' aque
in potu salubres. 86. a | Nomæ, lethaliſſimæ. 417. f |
| Naturæ diuerſæ ignis & a-
quæ varia temperatura fi-
unt. 107. c | Nomina artibus. ex specie-
bus imposita. 4. d |
| Naturæ variæ varijs ſenſib'
percipiuntur. 107. c d | Nomina lege naturę indita.
4. e. |
| Naturæ calidioris victus ra-
tio. 107. f. 108. b | Non eadem via ſeminis &
vrinæ. 31. f. |
| Naturæ diuerſæ victus. 107. f
108. a | Noſſe morbos & curare e-
iuſdem eſt ſcientiæ. 7. c |
| Naturæ quæ nulla cura aut
victu mutantur. 108. c | Notæ ex collo & faucibus.
430. e |
| Naturæ ſaſtidium. 7. d | Notæ ex præcordijs & ven-
tre. 431. a b d. |
| Naturæ modum excedēs ni-
hil bonum. 509. e | Notæ ex lumbis. 432. a |
| Naturarum cognitio. 106. c | Notæ ex ſanguinis eruptio.
ne. ibidem. d |
| Nebri qui dicantur. 536. b | Notæ ex dentibus. 429. f |
| Nebula quid. 40. f | Notæ ex maxillis, labijs, gū-
giuis, ſputis & ſcreationi-
bus. 430. e |
| Neceſſaria medico futuro.
3. d | Notæ ex voce. ibidem. b |
| Nervus torpidus. 66. c | Notæ ex dysenteria. 437. c |
| Nervi quomodo facti. 44. d. | Notæ ex vrina. 441. a |
| Nervi ubi non ſunt. 72. d | Notæ ex ſputo. 434. e. 435. f |
| Nervi à cerebro. 68. c | Notæ ex prægnatib'. 439. d e |
| Nervi non lædendi. 473. c | Notæ ex varijs affectibus.
436. a b. 438. d |
| Nervi cur dolore minus af-
ſigantur. 15. f | Notæ ex puris miſtiōe. 415. c |
| Nervorū gñatio. 46. b. 66. e. | Notæ ex lethargo. 426. e |
| Nervorū diſtributio. 326. c d | Notæ ex vertigine. 421. f |

Notæ

nubriſis quæ

ſiat. 35. a.

*nutrimenti abundantioris
ſigna. 120.*

*rubrica 189
id 350 hida
cit 140*

*top 230
30*

- Notæ ex oculo rupto & pro
minente. 419.c
Notæ ex doloribus aurium.
428.c.d.f
Notæ ex morbo regio.
428.e
Nota vberioris alimenti.
509.f.
Notæ ex hydrope, tabe, po-
dagra & morbo sacro. 415.
d. 416.d.e.f
Nuces. 114.c
Nuclei. 114.b
Nyctalops qui curetur. 507.f
422.a. 359.f
Nyctalopice affectiones in
pueris. 360.b
O
Besorum victus ratio. 29.f
Obliuio malum. 409.d
Obliuio & nocturna vocife-
ratio vnde. 142.d
Obliuio dysenterici quæ.
364.a
Obliuionis causa. 531.c
Observanda in ægris. 343.d
324.b
Observanda medico in mor-
bis dignoscendis. 531.a.b
Observanda, ac cauenda cir-
ca victus rationem. 394.e
381.c
Observanda circa vlcera tra-
ctanda. 417.a
Observatio varia. 414.b
Observatio variorum peruti-
lis. 133.f. 134.a.b
Observatio præcipua in ocu-
lorum lippitudine. 419.f
Observatio in Typho mor-
bo. 218.e
Observationes morborum.
26.f
Observatiões præcipuæ. 414.e
Observatione digna. 99.f
100.a
Observatiōis modus ad præ-
dictionem. 414.c.d
Obsonium in renum morbis
209.f
Obsonia ex varijs intritis
præparata. 115.b
Occasiones temporum. 144.f
21.c
Occasiones morborum con-
siderandæ. 357.b
Occasiones curandi tempe-
stiuæ. 145.b
Intempestiuæ. Ibidem.c
Ochri siue phasioli. 111.b
Oëtimestris partus. 48.c
Oëtimestres non superstites
manent. 49.e
Oëtimestria & trimestria cur
non viuunt. 51.e. 52.a
Oculus totius corporis tem-
peraturæ index. 358.b
Oculi contractio mala. 410.a
Oculi corrupti qualitas & cu-
ratio. 507.c
Oculi humor. 47.d
Oculi fulgentes. 75.c
Oculi situs & utilitas. 533.b
Oculi distortio malū. 409.d
410.b
Oculorū doloris curat. 517.c
Oculorū consideratio. 429.c

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Oculorum medelæ. | 395.e | Opifex, naturæ vel artis in- | |
| Oculorum fluxiones. | 355.f | strumentis vtitur. | 6.b |
| Oculorum fluxionis in nares | | Opinio in medicina perni- | |
| auerſio optima. | 373.f | cioſa. | 19.d |
| Oculorum ſigna. | 354.f e | Opithoronos eiusq; curatio. | |
| Oculorū ſordes ſiccæ. | 419.a | 175.c d.400.a.224.a | |
| Oculorum tumor. Ibidem. | b | Oratio Hippocratis ad aram | |
| Oculorum notæ. | 399.d.401.d | conſiſtentis. | 534.e |
| Oculorum tumor. | 75.c | Oratio legati ad Athenien- | |
| Oculorum remedium. | 130.e | ſes. | 535.b |
| Oculorum tres tunicæ. | 71.e | Ordei facultas. | 110.b |
| Oculis nullum pharmacū ad- | | Ordeum Achileum. | 179.d |
| hibendum. | 75.c | Ordeum torrefactum. Ibid. | f |
| Oculis potius quàm opinio- | | Origanum. | 113.e |
| nibus credendum. | 100.f | Origo venarum & arteria- | |
| Oculis incōmodi cibi. | 373.f | rum. | 129.e |
| Ocymum. | 113.d.202.a | Oris malè olentis purgatio. | |
| Olera. | 201.f | 292.e | |
| Oleum & oleoſa. | 202.c | Oris vteri plus quàm in men- | |
| Oleum Aegyptiū albū. | 229.f | ſibus hiātis curatio. | 289.f |
| Oleum quibus vlceribus in- | | Oris vteri inflammati cura- | |
| utile ſit. | 499.c | tio. | 282.c.283.a |
| Oletum quodnam bonum. | | Oris vteri ſemen præ duritia | |
| 396.b | | non ſuſcipientis curatio. | |
| Olfactus cauſſa. | 47.b.71.e | 288.b c | |
| Olfactum malè afficientia. | | Oris vterorum occluſi cura- | |
| 133.f | | tio. | 235.f.289.c.307.f |
| Omentum quādo putreſcat. | | Oris vteri humidi curatio. | |
| 144.f | | 229.c | |
| Omne vnum eſt. Ibidem. | a | Os vteri ſiue vuluæ conclu- | |
| Omne incōcretū cauum. | 6.f | ſum. | 243.e d |
| Omnes doloris cauſſæ ad idē | | Oris uteri vlcerati curatio. | |
| referuntur. | 10.b | 237.f.239.b | |
| Omnia terræ naſcētla ſuæ ter- | | Os capitis duplex. | 444.d |
| ræ naturā ſequuntur. | 93.f | Os capitis tenuiſſimū quod. | |
| Omnis attenuatio laxat ac | | Ibidem.e | |
| corrugat cutem, renutri- | | Os eminens quando præſe- | |
| tio contra. | 357.a | candum. | 466.d |
| ὀφθαλμία. | 64.d.311.c | Os femoris quàm periculo- | |
| | | ſum | |

I N D E X.

| | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| sum. | 492.f | 104 a |
| Os intro cedit multis modis. | 445.e | Pallidorum curatio. 80.c.d.e |
| Os quæ patiat. | 46.d | Palpebrarum curatio. 507.f |
| Os sacrum. | 65.f.326.d | Palpebrarum ficus. 332.e |
| Os tibiæ eminens. | 492.e | Panacea. 2.d |
| Osculi vteri alio inclinati cu | | Panificia varia. 9.d.103.e |
| ratio. | 280.d | Panis varietas. 110.f |
| Ossa quæ fiant. | 44.f | Panis differetia. 12.a b.201.c |
| Ossa vnde. | 44.d | Panis calidus sitim, & alia in- |
| Ossa quare à proprijs locis | | ducit. 383.c.111.b |
| discedant. | 466.c | Papauer. 111.d.114.b |
| Ossa rupta minus periculosa | | Pupilla qualis. 47.c.d |
| quæ. | 449.a | παράδειγμα à cucumere. 33.f |
| Ossa puerorū qualia. Ibid.b | | παράδειγμα à rosa & allio. |
| Ossa digitorū, manus, pedis | | 180.c |
| & articularū. 65.e.& 66.c | | Paracynanche eiusque cura- |
| Osis maioris abscessus. 464.b | | ratio. 174.f |
| Osis rupturā ambiguam co- | | Partheniū microphilū. 501.b |
| gnoscendi ratio. 448.b.c | | Parij ægri historia. 333.e.f |
| Osis capitis confracti cura- | | Pariunt statuto tempore pe- |
| tio. 326.f | | cora. 43.c |
| Osis simplex fractura. 462.c | | Pars robustissima cur in coi- |
| Osis suppurati signa. 449.d | | tu secernatur. 31.f |
| Ossium cautorum actio. 38.a | | Partes mensis aliquot. 53.a |
| Ossiū, neruorū, carnis, cutis & | | Partes singulæ quæ nutrian- |
| venarū in corpe vsus. 68.d | | tur. 101.d.e.f |
| Ossium fractorū & eminen- | | Partiū iternarū feruor. 195.b |
| tium curatio. 465.e | | Partus qualis. 43.c |
| Ossium coactio. 465.e | | Partus septimestris. 48.c.e |
| Oscitationum assiduorum cu | | Partus gemellorum. 322.e |
| ratio. 324.f.355.b | | Partus quo morbo liberet. |
| Oues & capræ comitiales. | | 225.f |
| 141.c | | Partus cum vlcere in coxa no |
| Ouorum facultas. 112.e | | no mense editus. 346.c |
| Oui candidum. 179.f | | Partus cur non omnes robu- |
| P | | sti edantur. 33.e |
| Alati fluxio. 64.e | | Partus qñ periclitantur. 52.b |
| Palæstra & Pædotriba. | 50.2 | Partus macillenti ac tenues. |

parotidis, signa. 412.

pars em
morbus
quæ in
71.

primus exhibendi modus 540 tttt 3

I N D E X.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------------|------------|--------------------------|------|---------------------|------|---------------------------|-------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------------------|------|------------------|------|-------------------|-------|----------------------|---------|------------------|-------|----------|------|----------|------|--|--------|--|------|----------------------------|-------|---------|------|--------------------------------------|-------|---------|------|------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--|-------|--------------|-------|--|-------|---|-------|----------------------------------|-------|--|------------|--------------------|------|--|------|--------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|---|-------|-------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|------------|--|
| Partus septimo mense quid agat. | 49.b | Partus quo pacto educat. | 53.e | Partus quomodo edantur. | 53.e | Partus mortuus quo pacto educetur. | 53.f. 58.e | Partus varia similitudo. | 33.d | Partus acceleratio. | 43.b | Partus retinendi curatio. | 250.b | Partus difficultas qui tollatur. | 253.a b | Partus appropinquantis signa. | 252.f | Partus difficultas unde. | 252.d 84.e | Partus frustulatim extractio. | 58.e | Partus directio. | 59.a | Partus conceptio. | 102.a | Partum accelerantia. | 266.b c | Partum iuuantia. | 265.c | Patella. | 65.f | παθματα. | 15.b | Puris in utero semen corruptis purgatio. | 304.de | Pecora pręgnantia a potu & cibo pinguiora fiunt. | 39.b | Pectoris dorsiue diruptio. | 206.b | Pecten. | 69.d | Pectinis prę fluxu dolentis curatio. | 295.a | Pectus. | 66.b | Pectus in dorsum ruptum & curatio. | 169.c | Pedis cum manu collatio. | 457.e | Pedis & ossium eius fractorum curatio. | 457.e | Pedum tumor. | 502.e | Pedum calor febris solutionem denotat. | 389.e | Pedum frigiditas febrium accessum significat. | 389.e | Pedum torporem quid discutiatur. | 224.f | Pedibus manibusq; distentus ac tortus curatur. | 79.f. 80.a | Pellicula spumosa. | 68.f | Pellicula ab aere pręfrigido superinducitur. | 46.b | Pellium tinctorum. | 103.e | Penicilli plumbei preparatio & usus. | 281.c. 282.a. 304.a | Percussus in palpebra sine oculi lęsione sanatus. | 350.c | Perdiccas rex phthiusicus creditus. | 1.c | Perforationis modus quis. | 449.f | Perfrigeratio malę. | 409.d f | Periclis Abderitani historia. | 335.b | Periculũ mortis in pręgnante. | 252.a | Perinthus. | 320.d. 323.d. 134.f | Peripneumonia qui fiat. | 152.b d. 169.d | Peripneumonia & eius curatio. | 163.f. 164.b. 176.a. 193.f. 194.b. 392.d | Peripneumonia qui suffocet. | 153.f | Peripneumonia quid faciat. | 400.d | Peripneumoniacę affectiones. | 392.a | Peripneum. | |
|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------------|------------|--------------------------|------|---------------------|------|---------------------------|-------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------------------|------|------------------|------|-------------------|-------|----------------------|---------|------------------|-------|----------|------|----------|------|--|--------|--|------|----------------------------|-------|---------|------|--------------------------------------|-------|---------|------|------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--|-------|--------------|-------|--|-------|---|-------|----------------------------------|-------|--|------------|--------------------|------|--|------|--------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|---|-------|-------------------------------------|-----|---------------------------|-------|---------------------|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|------------|--|

Peripneumonia
INDEX.

| | |
|---|---|
| Peripneumoniae causae. 194.c | ria. 329.f |
| Peripneumoniae & pleuritis signa. 435.b | Philini uxoris puerperae Thasiae mors. 317.a b c |
| Peripneumoniae & pleuritis differentia. 75.e f | Philisci aegri historia. 313.e. 314.f. 316.c |
| Pernicies foeminarum. 409.f | Philonis filia cur mortua. 314.d |
| Pernionum curatio. 373.f | Phreneticus moritur. 334.f |
| Perpédenda in luxationibus. 471.d e | Phrenetici signa. 408.c |
| Perisarum bellu contra Graecos. 536.f | Phrenetici qui pereant. 153.f |
| Pestilentia obsidentiũ summa. 535.f | Phrenitis qui fiat. 153.c |
| Peteda in vulneribus capitis 418.a | Phrenitidis solutio. 398.c. 408.b |
| Petenda à diuturnas fluxiones patientibus. 421.b | Phrenitides cum curatione. 174.d. 193.f. 194.c f |
| Phagedænosus puer quæ passus sit. 339.f | Phthisis. 64.f |
| Phanocritus. 315.a | Φύματα. 63.a |
| Pharmacum daturus quid prius agat. 98.e f | Physicus hominis habitũ ac robur considerat. 306.f |
| Pharmacum quid agat. 25.e | Phylam Alexandri pellicem Perdiccas deperibat. 1.d |
| Pharmacũ post dolores dandum. 388.a. 196.f. 261.a | Physiognomia. 326.c |
| Pharmaca fortuna reperta. 200.c | Pilarum vsus in fracturis. 464.f |
| Pharmaca cautius exhibenda. 198.f | Pinguedo conceptum impediens, quomodo curada sit 56.f |
| Pharmagoræ aegri historia. 313.e | Pinguis signa. 321.e |
| Phasianorum descriptio. 89.f | Piper dentes iuuat. 359.e |
| Phasis incolæ. 89.e | Pira. 114.a |
| Phasis qui fluat. Ibidem.f | Pisa infant. 111.b |
| Pherecydis aegri historia. 374.e | Pisces, edulium leue. 201.f |
| Φλέγμα λευκόν. 196.b c | Pisces erronei. 112.b |
| Philistis in Thaso aegri historia. 317.a b c | Pisces grauiiores & leuiiores. Ibidem.b c |
| Philitides aegri historia. 374.e | Pisces salsi. Ibidem.c |
| Philitides aegri historia. 374.e | Piscium facultates. Ibidem.a b |
| Philitides aegri historia. 374.e | Pittacus. 321.c |
| Philitides aegri historia. 374.e | Pituita eiusque curatio. 210.e |
| Philitides aegri historia. 374.e | Pituita. 147.c |

425.

Philitides aegri historia
374.e

Philitides aegri historia
374.e

INDEX.

*Pituita
vires*

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Pituita cur hyeme augeatur. | 25.f | randum hyeme. | 119.b |
| Pituita alba eiusque curatio. | 171.d.398.e | Pluuia clemens visa in somno quid significet. | 126.e |
| Pituitæ ex ore ac naribus fluentis signa. | 253.e | Pneumonis siue pneumonia eiusque curatio. | 204.d |
| Pituitæeductio. | 300.a | Pneumoniz causa. | 205.b |
| Pituitæ vires. | 181.f | Podagra. | 198.d |
| Pituitosæ ac biliosæ mulieris purgatio. | 289.a | Podagra qui laborent. | 517.c. |
| Pituitosi & biliosi furores quales sint. | 142.c | & quando fiat. | 517.f |
| Pituitosi inedia facilius ferunt. | 383.a | Podagræ curatio & signa ex eadem. | 416.d |
| Planta spiritum habet. | 39.f | Podagræ medela. | 299.b |
| Pleiades. | 88.d.310.b | Podagrici morbi. | 397.c |
| Pleiadum occasus. | 339.b.c | Pœna quæ malis medicis irrogatur. | 3.c |
| 340.c | | Polenta ex ordeo. | 201.c |
| Pleiadum ortus. | 118.d | Polentæ recentes. | 111.b |
| Pleiadum occasus. Ibidem. | b | Polypus cum curatione. | 161. |
| Plenitudinis signa. | 120.d. | b c d e f.193.e | |
| 121.2 | | Poma. | 113.f.118.e |
| Plenitudinis curatio. | 120.d.e | Porcinæ carnis vires. | 394.a |
| 121.b c f.122.b 125.e | | Porrum. | 113.b.202.a |
| Pleuritis quæ fiat. | 152.b.c | Portulaca. | 113.d |
| Pleuritis quando enecat. | 153.f | Positio partis vulneratæ qualis. | 452.f |
| Pleuritis ex dorso eiusque curatio. | 177.c d e | Postrema in morbis qualia. | 314.b |
| Pleuritis sanguinea & curatio. | 178.b | Post canem febres quales. | 351.f |
| Pleuritis sicca, & eius curatio | 77.f.78.a | Post purgationem exhibenda. | 199.f |
| Pleuritis & eius curatio. | 163. | Post partum quæ eueniant. | 256.c.d. |
| b c d.177.a.193.f.731. | | Potestas mala res. | 539.b |
| Pleuritides sicca & biliosæ. | 177.b | Potio ad fluxum rubrum. | 293.c |
| πλήρωμα. | 150.a | Potio ad omnes morbos ab vteris ortos. | Ibidem.d |
| Plus quiescendum quam labor. | | Potio ad fluxum album. | 295.a |

Pleuritis

Pleuritis

Pleuritis

Pleuritis

Pleuritis

Pleuritis

Pleuritis

*Post eiaculationem
qualis cibis
quæritur. 392.99
383.b.*

345.

INDEX.

- 295.a
 Potiones mensium & secundarum purgatoriarum. 271.f.
 272.a
 Potiones refrigerantes in febre ardenti. 119.c d e f
 Potiones in promptu habenda. 20.c
 Potus via. 66.d
 Potus in pulmonem non devenit. 191.b
 Potissimum in fracturis curandis. 464.a. 462.c.
 463.b
 Prandium. 115.f
 Præcautio ad convulsionem. 30.e
 Præcisa, quæ non coalescant. 146.c
 Præcognitio & cognitio quid 120.c
 Præcordiorum inflammationes vnde. 388.c
 Præcordiorum dolor. 410.b
 Præcordiorum tumores. 397.b
 Præcordiorum notæ. 402.c d
 Prædicendum nihil quando. 414.b
 Prædicendum quid sit medicum. 413.c
 Prædicendum prudenter. 413.c
 Prædictio ex hæmorrhoidibus. Ibidem.d
 Prædictionis modi qui derideantur. Ibidem.a
 Prædictiones ex potu & cibo immodico. 414.a c
 Prædictiones exemplis confirmantur. 413.d
 Prædictiones ex stercore. 415.a b
 Prædictiones ex lippitudinis signis. 419.e
 Prægnans non vtens coitu, facilius parit. 54.e
 Prægnans vnde moriatur. 228.a
 Prægnans qui cognoscatur. 240.c
 Prægnans cur sit pallida. 252.e
 Prægnantis lienosæ affectus. Ibidem.b
 Prægnantis varia signa. 302.e d. 54.f. 55.c
 Prægnantis fœtum menstruum gestantis curatio. 229.c d.
 Prægnantes quando purganda. 512.d. 515.c d. 516.a b
 Prægnantium morbi. 250 e f. 251.c
 Prægnantibus terram vel carbo-
 nes edentibus quid eue-
 niat. 54.f. 55.a
 Præmium medico constituendum. 21.f. 22.a
 Prænotio futurorum qui pa-
 retur. 83.d e
 Præsentia bona & mala ex in-
 somnijs. 125.c
 Præsentia ex temporum qua-
 litate. 87.e f. 88.a b c
 Primiparæ magis in partu la-
 borant. 43.d
 Primus dies in ægro obseruā-

INDEX.

| | | | |
|---|-------------|--|-----------------------|
| Principium alimenti. | 129.e | Pudendi puerperæ obturati, causæ & signa. | 255.c |
| Principiū sanationis cur nul- lum. | 146.d | Pudendi exulcerati curatio. | 238.b f. 239.b. 240.c |
| Principia artis supponenda. | 44.b | Puellæ cur tardius confor- mentur. | 37.f |
| Priores artis medicæ taxan- tur. | 8.d | Puellæ à pueris quī differant. | 50.f |
| Procreatio diuersa. | 104.f | Puer à mulo percussus. | 349.e |
| Priuatorum hominū victus ratio in hyeme, vere, æsta- te, & autumnō. | 29.c d e | Puer in caput prius naturali- ter procedit. | 42.c. 43.d |
| Productionis & exacerbatio nis morbi causæ. | 336.f | Pueri cur semen non emit- tant. | 32.b |
| Profluuium alui diuturnum. | 398.e | Pueri situs in vtero. | 41.f |
| Profluuium alui. | 30.f. 197.d | Pueri quid peculiare à natu- ra habeant. | 50.f |
| Profluuium alui & vomitus quibus conferat. | 508.d | Pueri liuidi ac mortui expul- sio. | 268.f |
| Profluuij alui ex partu cura- tio. | 270.a | Pueri natura. | 327.d |
| Prominentiæ capitis priore parte. | 444.c | Pueri carnosī minus lactis su- gunt. | 59.d |
| Proprium medicæ artis. | 8.b | Pueri fugētes simul & meien- tes. | Ibidem.e |
| Prospicienda medico. | 83.b | Pueri modo parui, modo ma- gni nascuntur. | 33.f. 34. a |
| Prudens natura quātum pos- sit. | 31.d e | Pueri cur mutilati nascantur. | 34. a |
| Prudentis viri consideratio. | 31.c. | Pueri sani & integri fere sem- per ex mutilis nascuntur. | Ibidem.b |
| Prisana. | 179.e | Puerorum hydropicorum cu- ratio. | 77.f |
| Prisana integra | 169.f | Puerpera gemellarum Gyzi- cena mortua. | 337.b |
| Prisana quando exhibenda. | 380.c | Puerperæ plus satis purgatæ signa. | 255.b c |
| Prisanae laus. | Ibidem.b | Puerperæ recens enixæ cu- ratio. | 58.b c |
| Prisanae succus. | 179.f | Puerperæ diuersa purgatio. | 267.a |
| Prisanae conficiendæ ratio. | 380.e | | |
| Prisanae incommoda. | 380.f | | |
| Pubertatis causæ. | 38.c | | |

I N D E X.

- 267.a
Puerperæ Cyzicenz historia 337.b
Puerperæ in Thaso decumbentis historia. 334.b
Pueperæ in quæ mala facillè incident. 242.e f
Puerperæ non purgatæ curatio. 254.c d
Puerperæ non satis purgatæ affectus. 254.f
Puerperæ à secunda non liberatæ curatio. 256.c
Puerperæ cùm non bene purgantur periculum. 37.d
Puerperij purgationis mensura & color. 263.e
Puerperij purgationes. 266.d e. 253.e
Puerperij non purgati mala. 253.f. 254.c. 255.b
Pulegium. 180.b. 113.e
Pulmo. 45.e. 60.d. 129.e
Pulmo cordis calorem moderatur. 61.e
Pulmo cor humectat. 61.b
Pulmo tumens præ calore cù curatione. 174.a
Pulmo consumitur. 64.f
Pulmo cum nihil plenus expurgat, malum. 404.c
Pulmo repletus & curatio. 168.c
Pulmo ad latus prolapsus cù curatione. 168.d
Pulmonis arteria exulcerata venæve rupta. 203.a b
Pulmonis morbus & curatio. 166.d
Pulmonis suppurati signa. 176.c
Pulmonis inflammatio. 205.c d.
Pulmonis hydrops & eius curatio. 169.a
Pulmonis & arteriarum diversitas. 151.a
Pulmonis tuberculum. 149.a
Pulmonis tuberculum qui sanetur. Ibidem. b c
Pulmonis erysipelas, eiusque curatio 205.f
Pulsus venarum. 397.f
Pulsus & respiratio, signa sanitatis & morbi. 130.c
Pulsus circa tempora. 96.c
Pura omnia à deo dari quare per somnū vident. 126.e
Purgatio puerperæ in caput progressa quid efficiat. 255.e
Purgatio in faciem progressa. Ibidem. f
Purgatio qua parte ducenda. 509.d
Purgatio sursum aut deorsum quando fiat. 512.f
Purgatio ventris quibus viceribus prosit. 499.c
Purgationem quid præcedere oporteat. 509.f
Purgationes quot diebus fiant. 37.f
Purgationes menstruæ multæ unde fiant. 245.d
Purgationes diuersæ. 271.f
Purgationes quomodo astimandæ. 509.d
Purgatio

pulmo
191. d. 151. d.
77. f. 7. e.

INDEX.

Purgatorium molle aquam
& pituitam ducens. 242.c
Purgatorium ad multa.

271.c d

Purgatorium molliens. 241.e
242.c

Purgatorium tepidum. 242.f

Pus e pectore sectione vel v-
sione educitur. 204.f

Pus collectum quid faciat.

76.c

Pus qui fiat. 499.a

Pus ex tumore interiore qui
educatur. 164.e

Pus ulceris alimentum. 130.d

Pus optimum quale. 402.f

Puris emissio. 206.f

Pustula ex lassitudinibus.

340.f

Pustula totius corporis vn-
de. 227.f

Pustula lata. 355.e

Pythicum templum. 535.d

Pythionis aegri historia. 328.
de. 334.d

Q

Qua cura Hippocrates
graciam a pestilen-
tia liberauit. 1.e

Quae aduersa vel secunda for-
tuna fiant. 82.a

Quae aegre ac facile pariant.
53.d

Quae congelent. 115.f

Quae attenuentur & collique-
tur in hydropico. 192.a

Quaedam citius, quaedam po-
tius abeant. 388.d

sterius pariunt. 43.e

Quaedam opifici, quaedam o-
peribus imputanda. 6.d

Quae ex terra gignuntur quo
modo crescant. 39.d

Quae ex rupe ceciderat super-
stes mansit. 350.e

Quae generantur & pereunt,
commiscuntur & discer-
nuntur. 100.f. 101.a b c

Quae foetum expellant.

267.e f

Quae foetum perdere cona-
batur, mortua est. 350.e

Quae mulieres facilius sup-
pressos menses ferant.

242.f

Quae praestare debeat medi-
cus. 2.f

Quae prius conformentur.

51.f

Quae prospicienda medico.

12.b. 15.a

Quae recidivas faciant. 320.e

Quae sint morborum princi-
pia. 180.d

Quae sint in natura hominis.
24.f

Quae superfoetant. 53.c

Quae vulnera poscant. 17.a

Qualis panis & maza. 12.d

Qualitates fortissimae. 12.c

Quando in partu matres foe-
tus pereunt. 43.d

Quanto tempore brachium
fractum coalescat. 457.c

Quantum ab omnibus cole-
retur Hippocrates. 1.e f

Quare nonnulli ab alijs diffe-
rant.

generans
generatur
190. d

I N D E X

- rant. 90.d
- Quare hoc calidum, illud cōtra putatur. 12.f
- Quare morborum calor non statim cessat. 13.d
- Quartana quo tempore, & qua ætate grassetur. 28.f
- Quartana à quibus immunes præster. 359.b
- Quartana longæ, & breues quæ. 510.b
- Quartana diurnæ. 355.d
- Quartana erroneæ. 311.d
- Quartanas diurnas potio soluens. 532.d
- Quatenus medicina vituperetur. 4.f
- Quatuor paria neruorum. 27.d
- Quibus dijs supplicaretur. 126.f
- Quî calor, & frigus concipitur. 13.b
- Qui causas morborum probe nouit, potest cōmoda adferre remedia. 94.c
- Qui cito moriantur. 409.e
- Quicquid fit, finis alicuius gratia fit. 5.d.e
- Quid patiantur, diu à cibis abstinentes. 11.d
- Quid per niues gelûque iter facientibus accadat. 13.c
- Quid spectarint primi medicinæ inuentores. 12.b.c
- Quid primum obseruet medicus. 16.e. 20.a b d. 21.f
- Quid oporteat medicos scire. 14.d
- Quid sit homo & quomodo gignatur sciat medicus. 14.e
- Quies quibus conducatur. 31.b
- Qui ex ægris perirent in magna morborum multitudine. 314.e
- Qui humores singulis anni tēporibus augecant. 26.a
- Quis error in ægris. 10.e
- Qui probè augeantur. 52.d
- Qui sani diutius perseuerēt. 105.f
- Qui sine medicis à morbis conualescunt aliqua re sanantur. 5.b
- Quòd diutius quàm decem mensibus non contingat vterum gestare. 42.e
- Quo gestu inuisendus sit æger. 16.d
- Quomodo omnia gignantur. 24.e
- Quo pacto sua quisque fons facultate trahat. 183.c
- Quo plus cibi sumpsimus eo plus expetimus. 183.d
- Quota inedia. 48.b
- Quota ossium coalescentia. 130.b
- Quot morbos ex vteris fieri contingat. 284.e
- Quoto tēpore pedis ossa fracta sanescant. 457.f
- Quum partus non ritè prodit, quid agendum. 262.e
- Quum plus iusto comeditur quid agendum. 202.d

Radix

I N D E X.

R

R Adix humanorū mor-
borum caput. 534.b

Raphianus. 113.c

Rapum. 113.e

Rariō cur de humano victu
scribat. 99.c

Ratiocinatio. 21.c

Recidiua quid portendat.
427.a

Reciduiarum caussa. 509.f

Recte & nō recte quæ fiant.
145.c.d.e

Regij morbi quatuor cum si-
gnis & curationibus. 216.e
217.a.b.f

Regio sterilis quales gignat.
93.d

Regio montosa quales pro-
ferat. 93.e

Regio alta quales producat.
93.d

Regio pinguis quos gignat.
93.e

Regiones insalubres. 109.f

Regionum situs & natura.
108.e.f

Regionum inter se differen-
tia. 89.b

Reijcitur à schola Hippocra-
tes falsa secta imbutus. 23.f

Relicta post iudicationem,
recidiuas facere solent.
324.f. 355.c

Remedia singulis exhiben-
da. 78.c

Remedia secundas ac men-
ses educentia 230.c.d. 231
232. 233. 234

Remedia solum disciplina ac
natura inueniuntur. 6.c

Remedium quibus tanquam
desperatis nullum adhi-
beatur. 277.f

Renes 45.f. 60.c. 66.d

Renum affectus quibus sa-
nentur. 361.b

Renum morbi quatuor. 208.
e. 209.a.b.c

Repletionis mala. 121.b

Repositio per scalam. 470.f

Repositio optima. 470.f
471.e

Responsio aduersus eos qui
mortuos medicis assignat.
c.e

Rigor lethalis. 513.e

Rigor in morbis vnde. 151
d.e

Rigoris caussa. 188.f

Rigoris ex partu aut abortu
curatio. 238.c

Rigores vnde incipiant. 356.
e. 325.c

Riphæi montes. 91.a

Robur accarnem producen-
tia. 200.f

Robusti ex robustis cur non
generentur. 33.e

Rumex. 113.d

Ruptiones quæ fiant. 149.e.f

Ruptura. 79.f

Ruta. 113.d

S

S Acer morbus. 84.d.e

Sacer morbus quæ fiat.
97.c.e

INDEX.

97. ce
 Sacer morbus pituitosis acci-
 dit. 138. f. 139. c
 Sacer morbus cur nō diuinus
 fit. 138. a
 Sagitta percussus præter om-
 nem opinionem sanatus.
 350. b
 Salaminus anchora vulnera-
 tus. 349. e
 Salina suppressa & curatio.
 159. f. 160. a
 Salua. 113. d
 Salutis & mortis causa. 185. f
 188. b
 Sanguis in somno intro ma-
 gis fugit. 358. f
 Sanguis ex naribus fluēs qui-
 bus proficit. 359. d
 Sanguis albus ex glandulis
 erumpit. 62. f
 Sanguis cur circa neruos cō-
 pingatur. 245. c
 Sanguis quomodo mittēdus.
 394. f
 Sanguis coagulatur. 45. f
 Sanguis diutius in vtero re-
 tentus totum corpus affi-
 cit. 36. b
 Sanguis prudentiam iuuat.
 97. d
 Sanguis putris in pus cōuer-
 titur. 96. f
 Sanguis calidus natura non
 est. 62. e
 Sanguis quomodo sistatur.
 158. f
 Sanguis serofus in quibus fiat.
 356. a

Sanguis ex naribus quibus
 erumpat, & pueris quādo
 incipiat. 356. f
 Sanguinis fluxio in vlceri-
 bus quid faciat. 499. b. 411. f.
 Sanguinis effectus & vis.
 97. e f.
 Sanguinis & aliorum humo-
 rum varietas. 129. f. 130. b
 Sanguinis vomitus causa &
 curatio. 270. a
 Sanguinis venarum suppres-
 siones quę faciant. 360. d e
 Sanguinis eruptions malæ
 quæ. 412. b. 411. c d e.
 Sanguinem ex partu vomen-
 tis curatio. 237. d
 Sanguinem ex vteris fluen-
 tem sustentia. 293. e
 Sanguinem ex naribus sistē-
 tia. 293. e
 Sanitas quī contingat. 184. a
 Sanitas & mors vnde contin-
 gent. 50. c
 Sanitatis exercitatio qualis.
 358. a
 Sanitatis & mortis causa
 cui attribuitur. 530. e. 531. e
 Sanitati qui restituantur &
 & qui non. 422. d
 Sanitati conducentia. 200. f
 Sanus quis. 24. f
 Sapa. 113. a
 Saperna. 215. d
 Sapientia qualis describen-
 da. 19. e f
 Sapientix author aer. 142. e
 Sapientix & desipientix causæ
 & signa. 106. f
 Sapientia

*Sanguis calidus
 natura 151. & 153. b
 Ol. p. 62.*

*sed solentur: q2 sanguis
 sm. sm. nōz. frigidus est
 sed in hoīs. nōz. calidus
 est.*

INDEX.

| | | | |
|--|-----------|---|---------------|
| Sapientissima anima & memoria valentissima prædita. | 107.a | Sectio. | 17.b |
| Sapientum victus & exercitatio. | 107.b | Secundam quæ educant. | 267. |
| Sata quomodo nascantur. | 39.c | b.268.a b.515.f.54.a. | |
| Satyrus pollutione mortuus est. | 362.c | Secundæ relictæ causâ. | 256.e.f. |
| Sauromata. | 90.d | Secundarum hærentium expulsiô. | 237.f.239.a c |
| Sauciati signa. | 447.a | Sedes teli quid, & eius species. | 445.f |
| Scapulæ. | 66.b.72.f | Sedis procidentia. | 420.c |
| Sciencia facili ac feliciter discitur. | 81.f | Sedis procidentis varia curatio. | 505.a b |
| Scientiæ votum ac opus. | 4.b | Sedis ex partu laborantis curatio. | 257.b.270.a |
| Scientiæ & opinionis differentia. | 3.f | Segnities. | 115.e. |
| Screatio phrenitici. | 408.b | Semel cibum sumere in die quos & quando oporteat. | 30.f |
| Scripturo de humano victu necessaria. | 99.e. f | Semel cibum capere quando conducatur. | 123.f |
| Scymnus. | 315.a | Semen lini. | 179.a |
| Scytharum gens fulua. | 91.e | Semen cur spumescat. | 31.e |
| Scythia gens infœcunda. | 91.a | Semen fauo simile. | 66.d |
| Scyticum hominum genus. | 90.d | Semen in vtero cum permanserit quid agat. | 34.e.35.b |
| Scytæ Nomades qui viuant. | 90.f | Semen masculum & foemineum introq; inesse. | 33.a |
| Scytharum ditissimi potius quam pauperes steriles cur efficiantur. | 92.c | Semen in pellicula tanquam ouum continetur. | 35.d |
| Scythæ minimè ad coitum valentes. | 92.e | Semen genitale ab omnibus corporis partibus procedit. | 89.d |
| Scythiæ mulieres vnde steriles. | 91.f | Seminis, quod in vtero sex dies extiterat, forma. | 35.c d |
| Scythæ Eunuchi muliebria officia subeuntes. | 92.a | Seminis genitalis varietas diuersas efficit formas. | 92.f |
| Secretio morbi causâ. | 120.f | Seminis in vtero putrescētis curatio. | 249.b |
| | | Seminis statim post coitum fluentis | |

Scythæ doler 425

- fluētis caussa & curatio. 248.f
 Siccum corpus citius humi-
 do ægrotat & dolet. 71.b
 Sideratio. 412.f 64.d
 Sideratus morbus vel homo.
 155.e.159.d.
 Signa ab Erysipelate. 406.f 148.f
 Signa ægrotantis. 129.c
 Signa bene curati & deliga-
 ti. 455.e.f
 Signa bonæ fidei. 404.d.&
 malæ.e
 Signa breui morituri. 397.f
 Signa ex angina. 433.d.e
 Signa ex colore. 421.f
 Signa ex conuulsione. 514.e
 Signa ex decubitu. 438.d.e
 Signa ex distentione & sudo
 re. 433.d.440.f
 Signa ex doloribus circa ar-
 ticulos. 423.b
 Signa ex hæmorrhoidæ & cõ-
 uulsione. 433.b.c
 Signa ex hydropæ. 437.a
 Signa ex lienteria. 420.a
 eiusque curatio.b
 Signa ex lingua. 408.b. 429.e
 Signa ex lippitudine. 418.f
 Signa ex morbis acutis. 427.
 b.c
 Signa ex oculis. 409.b
 Signa ex pallore. 422.a
 Signa ex perfrigeratione.
 423.f.
 Signa ex pleuritide. 434.a
 Signa ex pupillarum colore.
 419.d
 Signa ex sanguinis mictione
 415.c
 Signa ex soporosis affectio-
 ttttt
- Senes paucis fomitibus opus
 habent. 505.c
 Seniores & iuniores à quib⁹
 suppurationib⁹ magis mo-
 riantur. 405.f
 Seniorum & juniorum affe-
 ctiones. 150.f
 Senum victus ratio. 29.f
 Senum morbus & curatio.
 159.a
 Sensus maximus circa thora-
 cem. 70.e
 Sensus humanus septem figu-
 ris contingit. 104.a
 Sententiæ variæ de hominis
 natura. 24.a
 Septenarij annorum in cor-
 poribus præualent. 51.b
 Septimestres cures dantur.
 49.a
 Septimestres cur pauci super-
 stites maneat. 49.b
 Septimestres alij plus, alij mi-
 nus afficiuntur. 49.b
 Septum transfuersum. 60.f
 68.c
 Sermonis facultas. 47.e.
 Siccantia alimenta. 200.a
 Siccitates multæ post fauo-
 nium. 353.b

INDEX.

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------|
| nibus. | 428.a b c | Silphium vbi nascatur. | 181.b |
| Signa ex spiritu. | 430.d | Similago. | 111.a |
| Signa ex solene sano. | 422.c | Similitudo genituræ obser- | |
| Signa ex spiritus varia. | 344.f | uanda. | 36.f |
| Signa ex tæbe. | 436.e | Similitudinem iuuantia. | |
| Signa ex timore & tristitia | | 51.d | |
| sine cāssa. | 423.f | Simulatores & deceptores. | |
| ex ignorantia & obliuio- | | 104.b | |
| ne. | ibidem.f | Sinapi. | 113.c |
| ex rigoribus soporosis. | | Singula naturam suam con- | |
| ibidem f | 424.a b | seruant. | 81.c |
| ex horroribus. | 424.a b | Singultus quando malus. | |
| ex vrina suppressa. | ibi- | 408.e | |
| dem.c | | Singultus curatio. | 391.f |
| Signa ex varijs capitis dolo- | | Si re vna homo cōstaret nun- | |
| ribus. | 427.d e. 428.a | quam doleret. | 24.c |
| Signa ex varijs affectibus, | | Sitis quando mala. | 409.c |
| maximè febribus & phre- | | Smegma. | 261.d |
| nitide. | 424.d. 425. 426. | Sol. | 115.c |
| Signa ex voce. | 409.b | Sol fructus coquit. | 39.f |
| Signa ex vomitu. | 440.d | Sol, luna, cœlum, ac stelle per | |
| Signa ex vrinis. | 397.c d | insomnium visæ quid si- | |
| 514.c | | gnificent. | 125.d |
| Signa ex vrina crassa. | 415.c | Sol pati visus per somnum | |
| Signa inhaerentium telorum | | quid significet. | 125.f |
| in corpore. | 18.d | Solanum. | 113.d |
| Signa maris & fœminæ in | | Solstitium æstiuum. | 118.f |
| utero. | 302.d | Solstitium brumale. | 311.c |
| Signa mortis & vitæ. | 358.b | 315.a. 338.d. 118.b | |
| 165.b | | Solum mutare in longis mor- | |
| Signa obseruanda. | 129.d | bis, bonum. | 358.c |
| Signa suppuratorum & tabi- | | Somnia diligenter obseruan- | |
| dorum. | 416.c | da. | 125.b |
| Signum venularum cerebri | | Somnia ueneris quibus fiant. | |
| superuomentium. | 155.a | 31.f. 22.a | |
| Sileni ægri historia. | 313.c d | Somniare vestes & calceamē- | |
| 314.f. 316.f | | ta. | 127.d |
| Silentium in febribus perni- | | Somniantium curatio. | 127.d |
| ciosum. | 409.c | Somniare mortuos quid sit. | |

Soporosi 408. 127.e

Singultus in moribus. 518.f.

I N D E X.

28

| | | | | |
|-------|--|-------------|--|---------------|
| 117.e | Somnij Hippocratis interpre-
ratio. | 525.a | Spiritus densus quid signifi-
cer. | 402.a |
| | Somniorum diuerforum cō-
sideratio & curatio. | 128 a b | Spiritus omnia inter cœlum
& terram replet. | 94.f |
| | Somniorum diuerforum ob-
seruatio. | 126.a | Spiritus semper adducitur vel
exhalat. | 95.b |
| | Somnus. | 115.e | Spiritus varietas. | 355.b |
| | Somnus frigefacit. | 97.d | Spiritus vocem edit. | 47.f |
| | Somnus hydropici qualis. | 403.b | Spiritus vsus quàm sit neces-
sarius. | 95.a |
| | Somnus interdiu vitādus ple-
thorico. | 120.d | Splen. | 45.f.60.f |
| | Somnus quando est medela. | 358.a | Splen turgidus. | 77.d |
| | Sonitus aurium vnde. | 139.d | Splen tumefactus quid effi-
ciat. | 182.d |
| | | 358.a | Splenis morbi quinque, co-
rumque curationes. | 215.
216.a |
| | Sopor vbi malus. | 409.d | Splenis natura. | 259.a |
| | Soranus Cous. | 1.c | Splenis vehementer dolentis
curatio. | 278.c |
| | Sorba. | 114.a | Splenis curatio. | 77.e |
| | Sorbitio in vasi pulmonis ru-
ptis. | 204.a | Splenem attenuantia. | 215.c |
| | Sorbitiones. | 399.e | Spleniorum delectus. | 452.c |
| | Sorbitiones validæ. | 200.c | Spleniorum numerus. | 464.c |
| | Sorbitionibus quando vten-
dum. | 385.a | Splendidi viri quī generen-
tur. | 105.a |
| | Sordes aurium quid porten-
dant. | 358.e | Spongiformes, lien, pulmo,
& mamma. | 15.d |
| | Spasmi solutio. | 398.f.400.a | Sponte sua quæ in morbis
fiunt, tum bona, tum mala. | 145.e |
| | Species fortunæ nuda. | 5.a | Sputi consideratio. | 404.b |
| | Specillum quale. | 56.c | Sputi cruenti impedimētum. | 357.c |
| | Speſtanda in vulnerato capi-
te. | 446.b.449.b | Sputum in pleuriticis, & pe-
ripneumonicis quale. | 434.d |
| | Spina. | 65.d | Sputum fluidum à sanguine.
ibidem.e | |
| | Spina gibbosa. | 481.d | | |
| | Spinæ natura pernoſcenda. | 482.c | | |
| | Spinæ obliquatæ enratio. | 483.cd | | |

Spiritus

272. a

40. a.

Splendide

oculis no-

cet. 10. f. 500

1.

I N D E X

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| Sputa quæ mala. | 404.c | 397.c.c. <i>ma. a. 441 a</i> | |
| Sputa rotunda quid agant. | | Sudor multus quando malus. | |
| 359.d. 757.6. | | 409.c | |
| Sputum subcruentum & liuidum. | 153.d | Sudoris caussa. | 151.f |
| Statuarij. | 103.f | Sudores. | 115.c |
| Stercus quî fiat. | 46.e | Sudores in febribus. | 513.c |
| Stercus omnium quale esse debeat. | 415.a | Sudores in diebus iudicatorijs. | 519.f |
| Steriles vnde fiant. | 242.f | Sudores qui excitentur. | 96.b |
| Sterilitatis naturalis caussa. | | Sudores qui boni. | 396.b &c |
| 301.c | | contra. | 402.b |
| Sterilitatis fluentibus etiam menstruis curatio. | 238.d | Suffitus varij ad fluxus. | 294.c |
| Stomachus. | 60.f | Suffimentum vteri. | 292.c |
| Stomachus vteri. | 302.c | Suffocationis ab vtero caussa. | 246.a |
| Stomachus os vuluæ. | 53.d | Suffocationis ab vtero curatio. | 229. f. 278. e. 295. b c. 295. f. 296. a. 239. c. 252. c. 257. c |
| <i>σώματα.</i> | 61.f | Suffocationis curatio. | 214.c |
| Strangulationis ab vtero cognitio. | 395.f | Suillæ carnis facultas. | 394.a |
| Stranguria. | 156.c. 311.d | Sulphij facultas. | 393.f |
| Stranguria quare inflammationis intestinis succedat. | | Superfætationes quomodo fiant. | 105.e |
| 504.f | | Supercilia. | 72.e |
| Stranguriæ solutio. | 328.a. | Superstites ex suppuratis & contra. | 405.c |
| 238.b. 297.c. 298.d | | Superstites post partum. | 50.a |
| Stranguriæ signa & curatio ex sorbitionibus, potionibus & victus ratione. | 273. f. 274. a b | Superuenientia quomodo vribus adæquentur. | 188.a |
| Strumæ quos corripiat. | 417.b | Suppurati. | 74.b. 75.f |
| Succi dulcioris sunt quæ iuxta aquas nascuntur. | 525.d | Suppuratus à vulnere. | 150.b |
| Succorum facultates. | 128.f | Suppurationis caussa. | 147.d. |
| Succorum seu saporum consideratio. | 16.a | 150.d | |
| Sudor sani. | 397.f | Suppurationis curatio. | 395.d |
| Sudor decretorius. | 397.a | Suppurationes diuersæ. | |
| Sudor frigidus pessimus. | | 404.d | |
| | | Suppurationis principiū considerandum. | 404.f |

429. suum dolo Suppurat

- Suppurationis signa. 76.c 165.a e
435.c
Suppurati pulmonis signa. 146.e f
Suppuratorum remedia. 76.f
Suppuratorum signa. 405.a
Suppurati vteri causa & auxilium. 55.f
Suppuratus venter superior quot modis fiat. 147.e f 148.a b
Surditas in quibus malum. 408.f
Surditatis curatio. 373.b
Surditatis mala. 429.a
Sutor subula læsus perijt. 350.a
Sutura capitis longior & breuior. 444.c
Suturæ capitis h. literæ similes. 444.d
Suturæ capitis diuersæ. 444.b.72.e
Suturæ x. literæ similes. 444.d
Syderatus eiusque curatio. 173.c.359.f
Syderationes repentinæ malæ. 409.f
Syluestria omnia prius fuerunt. 181.c
- T
- T**Abes. 74.b.76.a b 64.c
Tabes sicca. 69.c
Tabes spinea & eius signa. 76.d. & curatio. 77.d
Tabes mulierum. 416.b
Tabes dorsalis, & eius curatio. 166.b e
Tabes erronea. 311.a
Tabes grauissima. 333.c
Tabis tres species. 206.f
Tabis triplicis causæ & curationes. 207.a b c
Tabis curatio in secundo, tertio ac quarto mense. 208.a b
Tabidi à quibus male habeant. 361.a
Tabidi quo tempore moriantur. 416.b
Tabidorum bona signa. 416.a
Tabidorum forma. 333.c
Tabidorum curatio. 77.a
Ταχύνειν. 69.c
Taxantur qui de ciborum facultate iudicauerant. 110.a
Thasiz mulieris morosa historia. 336.c
Telebuli ægri historia. 313.c
Telorum varietas. 446.f
Temeni neptis mors. 321.a
Temeton bonum non est. 14.f
Temperaturæ diuersæ. 199.e
Templum Herculis. 334.d
Templum Apollinis. 336.c
Tempus quid. 21.c
Tempus calidius quibus vlnneribus profit. 499.d
Tempus concubitus. 249.e f
Tempus coaugmentationis in vtero. 37.a

INDEX.

| | |
|---|---|
| Temporis in sex partes diu-
sio. 118.c | cur, expelluntur. 184.b |
| Temporis autores, sol & lu-
na. 51.e | Tetani mala. 398.a. & species.
399.f |
| Temporum & hominum va-
rietas. 89.c. 310.b | Tetani tres eorumque cura-
tio. 223.e. f. 175.b |
| Tempora cur periculosa.
444.f | Tetanus lumborum. 392.e |
| Temporum dolores quid por-
tendant. 422.b | Thasij morbi. 310.b. 311.b |
| Temporū varietas quos pro-
ducat. 93.d | Theatrum Epigenis. 314.e |
| Terebella aqua frigida sæpe
intingenda. 450.a | Thessalus Dracoque Hippo-
cratis filij. 2.c |
| Terra æstate rara & levis.
40.e | Thymbra. 113.e |
| Terra qualis. 102.c | Thymum. 113.e |
| Terra omnem habet humo-
rem. 39.c | Tibia. 73.c |
| Terræ qualitas. 83.d | Tibiæ ossis luxati curatio.
492.a. b. 459.a |
| Terræ facultates infinitæ.
181.c | Tibiæ ossis vtriusque fracti
curatio. 459.f |
| Terræ vires. 180.c | Tibiæ ossa duo. 458.f |
| Terræ motus circa solstitium
hybernum. 340.e | Tibiæ ossa quanto tempore
coalescant. 460.f |
| Terræ inferiora cur hyeme
calida, æstate frigida sint.
40.b | Timiditas & virilitas vnde.
93.a |
| Terræ motus vel domus in
somnia quid significet.
127.c | Tinesmus. 197.e |
| Terræ inundationem som-
niare quid velit. 127.c | Tinnitus aurium qualis. 408.d |
| Terram nigrā somniare quid
præsignet. 127.c | Tritici facultas. 110.e |
| Terroris ac timoris causa.
142.c | Tonsillarū vlcera. 59.f. 60.a. b |
| Tertianæ naturales. 355.d | Tonsillæ ac vicinæ partes.
156.a. b. 160.f. 63.e |
| Tertio quoque die quæ sumū-
tur, expelluntur. 184.b | Torpori pruriginoso quid
prosit. 421.e. f |
| | Tosta vel assata. 114.d |
| | Tremorem crurum ac pallo-
rem quæ faciant. 135.b |
| | Tremuli & gibbosi vñ. 139.e |
| | Tres morborum observatio-
nes. 399.b. c |
| | Triduo excernenda sunt ex-
crementa. 184.c |
| | Trifolium. 180.a |
| | Tripli |

Terra motus

340

Erhana per tres jares. 424

INDEX.

Eussis unde oritur: 191.2

30

Triplicia nutrimenta omni-
um animantium corpora su-
stentant. 94.e

Trichiasis curatio, 395.c

Trygis, id est Tragus. 111.b

Tuberculum ventris ab igna
ris male sectum. 244.c

Tuberculum sub lingua, vel
hypoglossis. 161.a

Tuberculum lateris. 206.c

Tuberculum in pulmone &
eius curatio. 168.a

Tubercula bona & mala. 354.
d. 198.f

Tubercula circa aures, qui-
bus fierent. 310.c. 313.d.
314. d. 315. a. 340. d. 357. d
363.f

Tuberculorum in pulmone
suppuratio & curatio. 212.b

Tumor narium. 74.d

Tumoris circa poplitem aut
alia partem curatio. 461.f

Tumoris causa. 187.c

Tumoris interioris signa &
curatio. 164.d

Tumores ad atticulos. 354.d

Tumores quid portendant.
355.a

Tumores præter naturam e-
leuati prauum. 325.f

Tussis cum febre. 312.a b

Tussis pueri qui discutiatur.
298.f

Tussis sedatio, testium tumor
& contra. 320.f

Tussis varietas. 360.a

Tussis sicca curatio. 327.a
355.d. 361.a

tumor circa aures. 499.

Tussis circa solstitia hyber-
na. 359.f

Tussis hyeme flantibus au-
stinis. 352.c

Tussicula aurium abscessus
mollit. 411.e

Tussientes ex manuum agi-
tatione. 344.c

Typhi morbi causa. 219.c d

Typhi color qui leniatur.
218.o

V

Vacuacionis faciendæ fi-
gnum. 509.f

Valetudinis signa. 390.f

Validis edulijs alij facile vtū
tur, alij læduntur. 9.d

Varietas rerum in Asia. 88.f

Variae sententiæ de sumendis
cibis. 11.a

Variorum affectuum enume-
ratio. 372.b

Varix testium quid possit. 326.c

Varix interior. 147.c d

Varicis curatio. 147.d

Varices tibiae. 503.a

Velocitas & tarditas vbi ad-
hibenda est. 17.b c

Vena iecoralis. 139.a. 152
f. 68.a

Vena splenica. 139.b. 152.c

Vena nervosa. 69.d

Vena humeralis. 68.f

Vena mammalis. 68.f

Vena principalis. 69.a

Vena ex sinistris partibus.
70.d

Vena conuulsa calefcit. 150.a

Vena magna. 60.f

tttt 4

*varix pul-
monis 208-147*

venae 185.6

vena cava

pneumonia

incidenda

venae sectio

quot dantur

res regunt

388. b.

venae sectio

re dicitur

INDEX.

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| Vena cordis. | 67.a | 68.a.69.f.70.a b c.72.a b |
| Vena pulmonem occupans. | 69.c | Venarū quatuor paria. 67.d |
| Venæ costarum. | 66.f | Venarum varij colores. 357.b |
| Venæ signum cordis sinistrū | | Venarum descensus. 67.d |
| perflant, arteria verò alte- | | Venarum in fœminis distri- |
| rum. | 62.a | butio. 69.c |
| Venæ sinistra morbus & cu- | | Venarum temporum confide- |
| ratio. | 210.d | ratio. 355.c |
| Venæ iugulares. | 182.e.183.e | Venulæ & arteriæ totius cor- |
| Venæ crassæ. | 67.c d.139.a | poris. 45.c |
| Venæ in spinam insertæ. | | Venulæ oculorum. 71.e |
| 69.c | | Venulæ in osse. 444.e |
| Venæ capitis quadripartitæ. | | Venter humidus. 102.b |
| 68.e.71.f | | Venter. 60.f |
| Venæ in lignum insertæ. | | Ventris morbi. 312.c |
| 68.c | | Ventris tubercula. 397.b |
| Venæ à ventre. | 67.f | 402.c |
| Venæ sectio. | Ibidem | Ventris obdurati solutio. |
| Venæ hepatis & aliarum di- | | 292.a |
| stributio. | 325.f.326.a b | Ventris quotidiana purgatio |
| Venæ & arteriæ pulmonis ru- | | quā fiat. 207.f |
| ptæ curatio. | 203.c.204.b | Ventris diuersitas. 202.c |
| Venæ ruptæ signa. | 147.b | Ventris combusti curatio. |
| Venæ rhenum. | 66.f | 214.f |
| Venæ post aures sectæ sterili- | | Ventrem superiorem nō mo- |
| tatem inferunt. | 92.b | uendum. 279.a |
| Venæ iuxta aures incisæ pro | | Ventrem infernum non tur- |
| creationem tollunt. | 32.b | bandum. 280.e |
| Venæ plures supra sunt quàm | | Ventrem ac vrinam subducē |
| infra. | 73.f | tia. 199.e |
| Venarum distributio. | 27.f | Ventrem perturbantia. 211.c |
| Venarum natura. | ibidem.d | Ventres quando calidiores. |
| Venarum multarum & ner- | | 509.c |
| uorum actio. | 7.a | Ventres humini quando de- |
| Venarum ex omnibus corpo- | | siccantur, & contra. 510.a |
| ris partibus in pudendum | | Ventriculus infernus qui sup |
| concurfus. | 31.e | purefcet. 148.d |
| Venarum distributio. | 67.a | Ventriculus animalibus, quæ |
| | | terra plantis præstat. 135.c |
| | | Ventr |

| | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| Ventriculi qualitas. Ibidem | 529.d | Vertebrae. | 66.c |
| Ventriculi corporis sunt plures. | 6.f | Vertigo vnde. | 155.a |
| Ventriculi cum hydria colla tio. | 135.c | Verticula spinæ. | 480.f |
| Ventri finitio & vis. | 94.f | Verticula obliquata. | 484.e |
| Ventri qui vtilis & qui inutilis. | 109.e | Vesica. | 44.e.60.e.15.d |
| Venti ab vrsis Riphæis perpetui. | 91.b | Vesicæ signa. | 406.a |
| Venti mediterranei sicci. | 109.f | Vetita à magis. | 137.d e |
| Venti montani insalubres. Ibidem. | | Via qua medico procedendū sit. | 21.d |
| Ventorum natura & facultas. | 109.b.511.b | Viētus humidus quibus conferat. | 509.e |
| Vētorum cum animalibus similitudo. | 109.c | Viētus simplex securior ad sanitatem. | 382.d |
| Ventorum qualitas. 83.b.135.f | | Viētus ab æquinoctio ad hyemem. | 120.a |
| Ventorum cæterarumq; rerū necessaria observatio. 135.f | 136.a | Viētus hyemalis. | 118.d e |
| Venus vnde augeatur. | 39.c | Viētus ratio in fracturis & vlceribus. | 456.e.457.d |
| Veratri purgatio. | 358.f | Viētus refocillās vires. 260.a | |
| Veratrum quibus proffit, & cōtra. | 531.a.532.a b | Viētus debilis ac robustus quis? | 358.a e |
| Veratrū quādo piculosū. | 512.f | Viētus ratio post potiones. | 261.c |
| Veratro purgādi quibus à capite fluxio fertur. | 393.a | Viētus siccus. | 201.c |
| Veritas in arte medica non semper attingitur. | 11.e | Viētus æstatis. | 118.d e |
| Veritatis nullum testimoniū. | 530.d | Viētus hydropici à pituita. | 211.f |
| Veris ac æstatis mutata tēperatura. | 311.e.313.a b | Viētus ratio conceptum iuuans. | 303.d |
| Vermes stercorarij. | 55.f | Viētus tenuis quibus imperā dus. | 508.f |
| Versutia malorum infinita. | 529.a | Viētus consuetus etiam si malus fuerit, facilior, & contra. | 383.c |
| Versutiarum causa auaritia. | | Viētus ratio somniantium. | 125.e |
| | | Vigilia. | 115.e |

INDEX.

| | | | |
|--|---------|--------------------------------|-----------|
| Vigilia immodica. | 385.b | Virginibus cur interdum nec | |
| Vigor ætatis. | 23.d | genitura nec mēstrua sint. | |
| <i>Vinum ex ca</i>
<i>Vindicta 114.f</i> Vinum Mendesium. | 208.c | 38.c | |
| Vinum dulce, austerum. | | Viriles & mignanimi leges | |
| 131.b | | aufferantur. | 90.c |
| Vinum acidum. | 113.a | Virtutis labor infania iudi- | |
| Vinum alimentum. | 129.c | catur. | 530.e |
| Vinum Coum. | 215.d | Visa diuersa quæ sanitatem | |
| Vinum Thasium. | 179.f | præsignant. | 126.f |
| Vinum Mendacum. | 210.a.d | Visio Hippocratis. | 524.e.f |
| Vinum quī extenuetur. | 201. | Visus quī hebetetur. | 154.c |
| d.202.b | | Visus quo alatur. | 71.e.72.a |
| Vinum aquosum quas partes | | Visus causa. | 47.c |
| iuuēt. | 185.d | Vita hominis septem dierum | |
| Vini albi facultas. | 385.c | est. | 47.f.78.b |
| Vini dulcis facultas. | 385.b | Vita Hippocratis. | 1.a |
| Vini fului vsus. | 385.c | Vitæ modus. | 118.c |
| Vina quæ alium subducunt. | | Vlcus cur tardius, aut nunquā | |
| 201.a | | sanescat. | 150.c |
| Vina alba aquosa. | 179.c | Vlcus ferinum. | 78.e |
| Vinorum differentiæ & fa- | | Vlcus mortiferum. | 79.b |
| cultates. | 112.f | Vlcus vteri cur cito curandū. | |
| Vir in coitu cur maiore volu- | | 301.d | |
| ptate afficiatur. | 32.c | Vlceris cum igni sacro mixti | |
| Vires singulorū simplicium | | purgatio. | 499.c |
| quī detrahantur & augean- | | Vlceris in capite curatio- | |
| tur. | 114.d | 447.c d.448.e.449.f | |
| Virgæ corneæ. | 464.f | Vlceris in ore curatio. | 371.c |
| Virgo lata manu in sinciput | | Vlceris in vtero & ore ei⁹ cu | |
| percussa periit. | 350.d | ratio. | 273.a |
| Virginis Larissæ historia. | | Vlceris pus cum vrina confer | |
| 336.d | | tur. | 397.a.b |
| Virginis Abderitanæ historia | | Vlcere in alterutra parte exi- | |
| 335.c | | stente, quid patiatur. | 420.f |
| Virginis à mēstruis dolen- | | Vlcere sanato locus qualis. | |
| tis curatio. | 58.a | 420.f | |
| Virgines cur delyrent. | 224.d | Vlcera ac tubercula iudican- | |
| Virgarum numerus & dispo- | | tia febres. | 357.b |
| sitio in fracturis. | 465.a | Vlcera capitis vnde. | 154.d |
| | | Vlcera | |

- Vlcera fame curanda. 79.d
 Vlcera maligna quæ. 361.b
 Vlcera ne inflammētur quid
 agendum. 498.f
 Vlcera pueris vtilia. 139.d
 Vlcera quæ non coeant.
 499.e
 Vlcera secanda quæ. 447.e
 Vlcerum curatio. 473.e.
 498.e
 Vlcerum in pudendis cura-
 tio. 238.d.239.b
 Vlcerum mutilata curatio.
 18.c
 Vlcerum pudendi curatio.
 272.f.273.b
 Vlcerum quatuor viæ. 18.b
 Vmbilicus 43.d
 Vmbilicus quando non sta-
 tim secandus. 54.e
 Vmbilicus abruptus, aut re-
 cisus ante tempus. 54.c
 Vmbilicus trahit secundam.
 Ibidem.b
 Vmbilici tormina. 133.f
 Vmbilici vsus. 52.e
 Vmbra. 115.c
 Vnctio. Ibidem
 Vngues cur densi. 38.b
 Vngues quando puero de-
 sunt. 53.e
 Vnguium generatio. 46.c
 Vocis exercitatio. 122.e
 Vocis interceptiones. 408.e
 Vocis interceptæ causâ & cu-
 ratio. 388.d
 Vocis labor & cæterorū quid
 ferat. 360.a
 Vocis restitutio. 327.a
 Vocis maximæ causâ.
 358.b
 Volfella. 18.a
 Volucris ad hominem colla-
 tio. 42.b
 Volucrum abundantia quan-
 do? 358.b
 Voluptas coeuntium. 69.e
 Voluulus arcuatus. 220.f
 Voluulus quando desperatus.
 176.a
 Voluuli morbi eorumque cu-
 ratio. 220.b.c.d.175.e.
 196.e
 Voluulus redit etiâ post duos
 annos 220.e
 Voluulus hæmatites. 220.f
 Vomitionis causâ. 153.d
 Vomitionis remediū. 299.a
 Vomitionis modus. 118.f
 Vomitus. 79. 115.d.123.e
 Vomitus bonus quis & con-
 tra. 404.b.408.c.
 409.c
 Vomitus præparatio. 327.b
 Vomitus quī fiat. 210.b
 Vomitus quomodo cietur.
 30.c.d
 Vomitus quī pronocet. 261.c
 Vomitus sanguinis quibus
 profit. 440.c
 Vomitus ventrem soluit &
 sistit. 115.d
 Vrbes aquas salâs habentes.
 84.a
 Urbis calidæ situs. 83.f
 Urbium situs. 83.c.84.c.f.
 85.a.b.c
 Urina magis morbos indi-
 cat.

uolucris
Alimentum
du in oao
ex ista 43

173.f

uomitus signa
- 407

410.

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| cat. | 8.b | Vteri ad cor progressi cura- | |
| Vrina delirium soluēs, qua- | | tio. | 238.c.395.d |
| lis. | 359.d | Vteri ad caput conuerſi signa | |
| Vrina bona quæ. | 396.c.403.e | accuratio. | 237.c |
| Vrina genitali ſemini ſimi- | | Vteri ad crura & pedes con- | |
| lis. | 356.a | uerſi curatio. | 237.c.287.a |
| Vrina rubra. | 66.f | Vteri ad hepar conuerſi cura | |
| Vrina cruenta. | 342.b | tio. | 279.c.d |
| Vrina turbata quibus inno- | | Vteri ad inguina incumben- | |
| xia. | 411.c | tis curatio. | 296.b |
| Vrina multa vnde fiat. | 154.b | Vteri ad latus allapſus cura- | |
| Vrina copioſior quā pro po- | | tio. | 235.e.280.a |
| tus ingeſti ratione. | 333.a | Vteri ad lumbos procedentis | |
| Vrina qualis & ex ea ſigna. | | ſigna & curatio. | 228.c. |
| 415.b | | 280.b.295.e | |
| Vrina craſſa vnde fiat. | 153.c | Vteri ad præcordia conſiſten | |
| Vrinæ diuerſitas. | 28.d | tis curatio. | 279.b |
| Vrinæ crudæ. | 398.b | Vteri ad ſedem conuerſi cu- | |
| Vrinæ interceptio. | 409.b | ratio. | 237.f.284.f |
| 410.f.411.b | | Vteri ad ventrem nutantis | |
| Vrinæ morborum ſoluentes. | | curatio. | 237.b |
| 397.a | | Vteri ad viſcera conuerſi cu- | |
| Vrinæ clandeſtinæ. | 408.e | ratio. | 238.f.295.c.e |
| Vrinæ ſuppreſſæ. | 354.c | Vteri affecti curatio. | 82.c.d.e |
| Vrinæ malæ. | 409.c | Vteri affecti cauſa & ſigna. | |
| Vrinæ craſſæ effectus. | 136.f | 373.b | |
| Vrinarum cognitio. | 390.d | Vteri commoti & prolapſi | |
| Vrinarum varietas. | 339.c | curatio. | 236.e.238.f.281.d |
| Vſtio quæ. | 208.e.205.f.17.b | Vteri concluſi curatio. | 238.f. |
| Vſtionis ferramenta qualia. | | 280.e.288.e.f.289.d | |
| 473.a | | Vteri cū prociderint curatio. | |
| Vſus egregius magiſter. | 94.c | 226.a.280.c.286.b.287.a. | |
| Vterus. | 15.d | 296.d.58.b | |
| Vterus ad hepar accedens | | Vteri deſiccati curatio. | 230.c |
| quid faciat. | 225.f.296.a | Vteri dolentis curatio. | 239.a |
| Vteri à grumo ſanguinis affe- | | b.d.290.f.292.e | |
| cti curatio. | 236.c.d.289.d | Vteri ex partu vlcerati cura- | |
| Vteri ab vlceribus inflamma | | tio. | 256.f.257.f.260.e. |
| ti. | 246.f | 261.b.d.e.f.262.b | |

Vteri

I N D E X.

- Vteri ex partu inflammati cu-
 ratio. 257.a b d e. 270.b
 Vteri ex partu dolentis cura-
 tio. 257.c
 Vteri ex partu ad dextrā con-
 uersi curatio. 285.b
 Vteri ad sinistram declinan-
 tis curatio. Ibidem.c
 Vteri transuersi vel obliqui
 curatio. Ibidem.
 Vteri extra naturam progres-
 si causa & curatio. Ibidem
 e f
 Vteri vlcerati & foras prola-
 pfi curatio. 286.e. 308.a
 Vteri huc & illuc vagantis cu-
 ratio. 286.f
 Vteri erysipelas, eiusque cu-
 ratio. 227.f. 291.a
 Vteri fixi curatio. 230.a
 Vteri gracilis curatio. 305.e
 Vteri inflammati morbi peri-
 culosi signa ac curatio. 227.d. 230. a b. 238.a. 239.a.
 290.b c
 Vteri inflammati & aliorum
 affectuum curatio. 279.e f
 Vteri inflati curatio. 236.b
 238.c. 287.d. 295.e
 Vteri in callū indurati caus-
 sæ ac curationes. 287.d e
 Vteri in coxam decumbentis
 curatio. 515.f
 Vteri leuigati curatio. 237.a
 301.c
 Vteri leuitatis signa. 250.b
 Vteri molestiæ. 82.b
 Vteri obdurati curatio. 235.c.
 d. 249.f. 287.d. 288.d
 Vteri obliqui curatio. 236.a
 Vteri obtorti curatio. 236.d.
 248.f. 301.c
 Vteri oris angusti mala. 255.b
 Vteri oris obdurati curatio.
 229.d. 288.e. 305.f
 Vteri oris pinguis curatio.
 249.a
 Vteri plus æquo aperti cura-
 tio. 290.a
 Vteri præ duritia non concip-
 ientis curatio. 241.b
 Vteri præter naturā hiantis
 signa & curatio. 228.b.
 289.e. 236.f. 249.a. 301.e
 Vteri procidentię causa ac
 curatio. 287.b
 Vteri purgatorium. 241.a
 Vteri puerperæ inflati cura-
 tio. 252.f
 Vteri purgationes. 237.e.
 239.d. 248.a. 307.d
 Vteri qualitas bona. 420.d
 Vteri refrigerati curatio.
 292.e
 Vteri sani non concipientis
 curatio. 248.e
 Vteri semen non recipientis
 purgatio. 292.c
 Vteri semen nō continentis,
 & eructatis curatio. 309.a
 Vteri siccioris & humidioris
 curatio. 249.c.d
 Vteri transmoti curatio. 238.
 a. f. 239. a. 284. e. 287. b.
 295.f
 Vteri vlcerati signa. 254. b.
 255.a. 259.e. 260.c
 Vterum gerentis victus ra-
 tio.
*utrum gerentis victus ra-
 tio. 420.
 utrum gerentibus paucior sanguis
 inest 252*

I N D E X.

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------|
| tio. | 228.a | Vux passz. | 179.e |
| Vterum gerentibus octauus mensis grauis. | 49.c | Vulnus carne replētia. | 199.d |
| Vterū purgantia. | 57.b c d e f | Vulnus quando non lauandum. | 327.b |
| Vteri cū adglutinati fuerint. quid agendum sit. | 226.d | Vulnus circa sinciput cur periculosius. | 444.e |
| Vteri quibus rebus facilè propellantur. | 285.a | Vulnus refrigerantia. | 199.c |
| Vteri vbi extra pudēdum exciderint, quid agendum. | 226.b.239.b.285.c.286.b c.309.c d | Vulnus omne quietē poscit. | 498.f |
| Vterorum affectorum remedia. | 237.e | Vulneris in capite modi ac species. | 445.c d |
| Vterorum, cum ad coxā decurrerint, curatio. | 226.f.283.e.284.b d.305.f | Vulneris obseruatio. | 418.d |
| Vterorum fomenta. | 241.b | Vulnera magis lethalia quæ. | 417.c d |
| Vterorū oris cōplicati signa & curatio. | 226.e f.286.d | Vulnera curanda. | 417.e |
| Vterorū pituita oppletorū, signa & curatio. | 227.c.257.f | Vulnera lethalia. | 439.a |
| Vterorum variij morbi. | 244.f | Vulnera non lethalia. | 439.a |
| Vterorum dolor qui sedetur. | 297.f | Vulnera fortia sine tumore, malum. | 325.e |
| Vteros aperientia & purgantia medicamenta. | 242.b | Vulneratorum curatio. | 199.c |
| Vtilitas in dignoscendis somnijs. | 125.a | Vxoris Hermoptolemi agræ historia. | 366.b |
| Vua morbus. | 156.a.160.e | | |
| Vux tumor. | 193.d | | |

X

X Enophanis ægri historia. 313.f

Z

Z Oilo ex tussi matura quæ contigerint. 324.c

F I N I S.

A HIPPOCRATIS

COI VITA EX SORANO,

IANO CORNARIO MEDI-

CO PHYSCO IN-

terprete.



Ippocrates genere Cous fuit, Heraclidæ & Praxitheæ filia Phenaretos filius. Ad Herculem autem & Aesculapium originē generis sui referebat, ab alteroq; se vigesimū, ab altero decimūnonum se numerabat. Eius autem genealogia Eratosthenes mentionem facit, & Pherecydes, & Apol-

Iodorus, Arius item Tarsensis. Cæterum parentis sui Heraclidæ discipulus fuit, deinde Herodici, & ut quidam tradunt, Gorgiam Leontinum rhetorem audiuit, & Democritum Philosophum Abderiten. Floruit temporibus Peloponnesiacis, natus (velut Istomachus in primo de Hippocratis secta tradit) primo octogesimæ Olympiadis anno. Soranus verò Cous: qui Coorum bibliothecas perscrutatus est, addit, sub Abriadæ monarchia, Agriani mensis septima & vicesima die, in qua etiam vsque in hunc diem Coos Hippocrati omnia sacra facere tradit. Porro quum in arte medica totòque disciplinarum orbe exercitatisimus esset, functis vita parentibus, ex patria discessit, ut quidem malignè de eo Andreas in eo quem de Medicinæ origine scripsit libro prodit, propterea quòd publicam Cnidiorum bibliothecam igne concremasset. Alij autem eo proposito eum patriam reliquisse dicunt, ut rei medicæ effectus & successum per multos locos cognosceret, & in his varijs modis exercitaretur. Quemadmodum verò Soranus Cous narrat, Somnus deus eum per somnium admonuit, quo se ad Thessalorum regionem inhabitandam conferret. Cæterum per omnem Græciam Medicinæ gloria omnibus admirationi fuit, adeò ut etiam à Perdicca Macedonū rege, qui tæbe laborare puta-

a batur,

Coi singulis annis

Hippocratis parentas bant.

Andreas Hippocratis infamavit.

Soranus Cous.

Perdiccas phisicus credens.

HIPPOCRATIS VITA.

Euryphon batur, vocatus publicè sit, ad ipsumque vnà cum *Euryphon-* D
medicus. te, qui ipso ætate maior erat, peruenit animique hunc regis affectum esse certis signis deprehendit. Post mortem enim Alexandri parentis, vnā ex pellicum eius numero *Phyla* E
æandri pel- *Phylam* nomine *Perdiccas* deperibat, ad quam quum rem
lex & Per- ipsam *Hippocrates* detulisset, postea ex illius cōspectu omni
dicca ada- no illum mutari obseruauit, atque ita morbo depulso regem
mata. conseruauit. Vocatus est & *Abderam* quo præsens ipse *De-*
Democri- mocritum ab insania liberaret, atque eo sanato à tota vrbe
us insanus pestem depelleret. Quin & in *Illyricum* plurimāsque bar-
putatur. baras terras peste ingruente, & illarum gentium regibus
Qua cura ipsum ad se vocantibus, quum à legatis ipsorum qui venti in
Græciam & illis regionibus vigerent, didicisset, ipsos re infecta dimisit.
pestilentia At verò quum prudenti ratiocinatione pestem in *Atticam*
liberauit. grassaturam præuidisset, futurum id prædixit, & tum ciui-
Artaxer- tatum, tum discipulorum curam gessit, intantumque Græciæ
xes Helle- amator fuit, vt quum ipsius nominis celebritas vsque ad
sponsi hip- Persas diuulgaretur, atque ea gratia ab *Artaxerxe* per *Hista-*
parchor. nidem *Hellepontum* præfectum, magnis muneribus & pre-
Quantū ab cibus vt ad ipsum veniret inuitaretur, ob honestatem, argen-
omnibus co tique contemptum, ac Græciæ amorem, regi id denegarit,
lertur Hip quemadmodum & hoc ex epistola eius ad illum manifestè
pocrates. ostenditur. Propriam porro patriam liberauit, quum *Athe-*
Mors hip- nienses ei bellum illaturi essent, *Thessalis* ad auxilium fe-
pocratis. rendum rogatis. Quapropter splendidos honores apud *Coos* B
consequutus est: imò & apud *Thessalos* *Argiuosque* & *Athe-*
nenses, qui eum *Eleusinijs* sacris secundum ab *Hercule* pu-
blice initiarunt, & ciuem conscripserunt, atque in *Prytaneo*
alimentatum ipsi, tum posteris eius dederunt. Liberaliter
autem & minime inuidiose studiosos artem edocuit, decen-
ti iureiurando prius adstrictos. Vita functus est apud *Larissæos*,
quando & *Democritus* obiisse traditur, atque alij qui-
dem nonagesimo ætatis suæ anno, alij octogesimoquinto,
alii centesimoquarto, quidam verò centesimonono, deces-
sisse tradunt. Sepultus autem est inter *Gyrtionem* & *Larissam*,
vbi vsque in hunc diem monumentum eius cernitur, in
quo sanè ad multum tempus examen apum mellificantium
erat quo melle ad infantum oris vluscula iuxta tumulum
illito, nutrices ea facile persanabant. Porro in multis ima-
ginibus

A ginibus velato capite pingitur, vt quidam aiunt pileo, quod nobilitatis signum est: nam hoc modo etiam Vlysses Pileatus cernitur: Alij autem pallio velatum dicunt, atque ex his aliqui decoris gratia id fieri asserunt, quandoquidem caluus erat: aliqui verò ob capitis imbecillitatem id fieri perhibent, aliqui autem significanter id ab eo factum volunt, nimirum quod principem rationalis animæ sedem probè munitam & contactam esse oporteat. Alij signum peregrinationes amantis esse ferunt: alij verò rursus obscuritatem scriptorum ipsius per hoc significari contendunt. Alij postremum in testificationem id fieri volunt, quòd etiam sanitatis tempore ea quæ lædere possunt cauere debeamus. **Q**uamquam quidam affirmant, quòd in administratione rerum gerendarum, ne quod à circumfuso pallio manus ipsius impedirentur, id ipsum complicatum in caput reijcere consueuerit. Cæterum de scriptis ipsius multa dissensio est, quare fit vt quum alia alij opinentur, non facile sit de ipsis certum quid pronunciare, ob multas præsertim causas quæ iudicij certitudinem obfuscant: velut est primum quidem cognomen. Secundo quòd dictionis characterem possibile sit seruare. Tertio quòd vnus & idem modo robustiore, modo remissiore dictione per ætatem vtatur: neque desunt etiam aliæ præter has causas, si referre libeat. Pecuniarum autem penitus contemptor fuit, moribusque sanctis, ac Græcorum amator, quare etiam gentiles suos summa diligentia curauit, adeò vt à peste omnes ipsorum ciuitates liberarit, quem admodum supra dixi. Vnde & splendidos honores non apud Coos tantum, sed & apud Argiuos & Athenienses est consecutus. Filios à morte reliquit duos, Thessalum & Dracorem, discipulorum verò magnum numerum. Clarissimi verò ipsius filij fuisse perhibentur.

*Cur capite
velato cernatur.*

*Libri Hippocratis in
controuersiam adduciti.*

*Thessalus
Dracore
Hippocratis filij.*

2 2 Hippoc

HIPPOCRATIS ^D

COI IVSIVRANDVM, IANO

CORNARI MEDICO PHY-

SICO IN

prete.

★

*Apollo
Aescula-
pius.
Hygeia.
Panaccia.*



POLLINEM medicum, & Aesculapii, Hygeamque ac Panaceam iuro, deosque omnes, itemque deas testes facio, me hoc iusiurandum, & hanc contestationem conscriptam pro viribus & iudicio meo integrè seruaturum esse. Præceptorem sanè qui me hanc edocuit artem, parentum loco habiturum, vitam

communicaturum, eaque quibus opus habuerit impertiturum: eos item qui ex eo nati sunt pro fratribus masculis iudicaturum, artemque hanc si discere voluerint, absque mercede & pacto edoctrum: præceptionum, ac auditio-
num, reliquæque totius disciplinæ participes facturum, tum meos, tum præceptoris mei filios, imò & discipulos qui mihi scripto cauerint, & medico iureiurando addicti fuerint, alij vero præter hos nulli. Cæterum quod ad ægros attinet sanandos, diætam ipsis constituam pro facultate & iudicio meo commodam, omneque detrimentum & iniuriam ab eis prohibebo. Neque vero vllius preces apud me adeò validæ fuerint, vt cuipiam venenum sim propinaturus, neque etiam ad hanc rem consilium dabo. Similiter autem neque mulieri talum vuluæ subditicium, ad corrum-
pendum conceptum, vel fœtum dabo. Porro præterea & sanctè vitam & artem meam conseruabo. Nec vero calculo laborantes secabo, sed viris chirurgiæ operarijs eius rei faciendæ locum dabo. In quascunque autem domos ingrediar, ob vtilitatem agrotantium intrabo, ab omni-
que iniuria voluntaria inferenda, & corruptione cum alia, tum præsertim operum venereorum abstinebo, siue muliebria, siue virilia, liberorumve hominum aut seruo-
rum

*Quæ præ-
stet medi-
cus.*

Arum corporea mihi contigerint curanda. Quæcunque vero inter curandum videro aut audiero, imò etiam ad medicandum non adhibitus, in communi hominum vita cognouerò, ea si quidem efferre non contulerit, tacebo: & tanquã arcana apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum mihi inter seruanti, & non confundenti, contingat & vita & arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari. Transgredienti autem & peieranti, his contraria eueniant.

B HIPPOCRATIS

COI LEX, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHE SI-

CO INTER-

prete.

★



Medicina omnium artium præclarissima est. Verum propter ignorantiam eorum qui eam exercent, & ob vulgi ruditatem, quòd tales pro medicis iudicat & habet, iam eò res deuenit, vt omnium artium longè vilissima censeatur. At vero hoc peccatum ob hanc potissimum

*Medicæ
artis præ-
stantia.*

causam mihi committi videtur. Soli nanque Medicinæ nulla pœna in rebus publicis statuta est, præterquam ignominia, verum hæc ipsa non afficit, neque contingit eos qui ex composito personam ipsius induerunt. Similimi enim huiusmodi Medici sunt personis quæ in tragædijs introducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi autem verè non sunt. Sic & Medici fama quidem & nomine multi, re autem & opere valde pauci. Quisquis enim Medicinæ scientiam sibi vere cõparare volet, eum his ducibus voti sui com-
potem fieri oportet, Natura, Doctrina, Loco studijs apto, In-

*Quæ pœna
malis medi-
cis irroga-
tur.*

HIPPOCRATIS LEX.

Necessaria stitutione à puero, Industria, & Tempore. Primum quidem **D**
medico futu igitur omnium Natura opus est. Natura enim repugnante,
ro. irrita omnia sunt. Si verò natura ad optima viam demon-

Disciplina
cōparatio
ad agricul-
turam.

stret, artis Doctrina facile contingit, quam sanè cum pruden-
 tia sibi comparare oportet, ita vt à puero institutio accedat,
 atque id in Loco à natura ad disciplinam apto. Amplius au-
 tem & industriam adhibere oportet: eamque ad multum
 omnino tempus, quo disciplina ipsa insita, feliciter & cum
 profectu fructus suos producat. Qualis enim eorum quæ ter-
 ra producit consideratio est, eiusmodi etiam disciplinæ Me-
 dicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra, velut
 ager est, dogmata præceptorum, velut semina sunt. Institu-
 tionem à puero cum eo conuenit, quòd opportuno tempore se-
 mina in aruum cadere oportet. Locus autem in quo discipli-
 na contingit, est velut ambiens aër, à quo è terra nascentibus
 nutrimentum accedit. Industria autem, cultura est. Tempus
 postremum hæc omnia corroborat, vt perfectè enutriantur.
 His igitur ad artem medicam allatis, & vera ipsius cogni-
 tione comparata, tandem per vrbes obambulando, non ser-
 mone tantum sed & opere medicos haberi conuenit. Impe-
 ritia verò malus thesaurus est & infelices opes his qui eam
 repositam habent, & insomnium, aut potius somnium diur-
 num, & maximè verum, alacritatis fiduciaque ac veræ exul-
 tationis expers, timiditatisque & audaciæ nutritrix. Timiditas
 equidem impotentiam, Audacia verò Ignorantiam artis si-
 gnificat. Duo enim sunt, Scientia & Opinio, quarum altera
 quidem scire facit, altera verò ignorare. Cæterum res sacræ
 sacris hominibus demonstrantur, prophanis id fas non est,
 prius quàm scientiæ orgijs intrentur.

Sciētia mul-
tum differt
à persuasio-
ne.

Hippocratis

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE ARTE,

IANIS COMITARIO ME

DUO PRISTICO IN

TERPRETE.



VNT quidam qui artem putant, reliquas artes turpiter incessendo dehonestare, atque id quidem veluti putant non transigunt, ut ego sane assero, sed propriam cognitionem ac scientiam ambitiose ostentant. Mihi verò inuenire aliquid eorum quæ nondum inuenta sunt, quod ipsum notum quàm occultum

esse præstet, scientiæ votum ac opus esse videtur. Similiterque & semiperfecta ad finem perducere & absolvere. At verò verborum inhonestorum arte ad ea quæ ab alijs inuenta sunt confundenda, promptum esse, nihil quidem corrigendo: eorum verò qui aliquid sciunt inuenta apud ignaros calumniando, non sanè scientiæ votum aut opus esse videtur: sed proditio magis nature suæ aut ignorantia artis. Solis enim artis ignaris hoc ipsum factum conuenit, qui contentiose quidem gestiunt ac conantur, nequaquam verò possunt malicie sufficere, ad hoc ut aliorum opera quæ quidem recta sunt, calumniemur, quæ verò non recta sunt, reprehendant. Eos quidē igitur qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus hæc curæ sunt, quorūque id interest, & præstare hoc possunt, prohibeant. Præsens vero sermo his qui medicinam eo modo inuadunt aduersabitur, confidens quidem & animatus propter utilitatem eorum quos insectatur: copiosus verò ob artem, qua præstat & auxiliatur: potens autem ob sapientiam, qua est eruditus. In vniuersum itaque nulla videtur mihi ars esse quæ non existat. absurdum

Scientia notum ac opus

*Ignarorum
graphica de
pictio.*

HIPPOCRATIS LIBER

dum enim est aliquid esse putare quod non est, quoniam eorum quæ non sunt, quānam substantia conspecta aliquis denuntiare possit quod sint? Si enim non existentia videre non datur, quemadmodum existentia, haud equidem scio quomodo quis mente concipere queat ea quæ non sunt, quemadmodum ea quæ sunt, quæ certè oculis videre est, menteq; intelligere quod sunt. Verum ut ea nec videas nec intelligas, non similiter contingere potest. Sed existentia quidem semper videntur ac cognoscuntur: non existentia autem, neque videntur neque cognoscuntur. Cognoscuntur itaque demonstratis iam artibus, & nulla est ars quæ nō ex specie quadam rerum videatur, arbitrórq; sanè ego etiā nomina artibus ex speciebus accipi & imponi. Absurdū enim est existimare ex nominibus species rerū germinare & prouenire, imo etiam impossibile existit. Nomina enim lege quadā naturæ indita sunt, Species autem rerum non lege sancitæ sunt, sed naturæ germina existunt, atq; hæc quidem si quis ex prædictis non ad plenum intelligat, in alijs sermonibus fortassis clarius edocebitur. De Medicina verò, utpote de qua hic institutus est sermo, claram demonstrationem faciam, & primū sanè definiam quod sentio, Medicinā esse morbos ab ægris in totum tollere, & morborū vehementes imperus obtundere, & eorum qui à morbis viçti sunt curationē non aggredi, quum id in cōfesso sit, quòd Medicina tales sanare nō possit. Quomodo igitur hæc Medicina faciat, & quali omnino facultate præstet, de hoc iam reliquum sermonem instituā. Caterū in artis demonstratione simul etiam sermonem illorum qui eam dehonestare contendunt, quatenus quisq; eorū sibi quid transegisse visus est, reuellā. Principium itaq; sermonis hoc erit, cui omnes assensuros scio. Quòd quidem aliqui à medicina curati sanitati restituuntur, cōtinentur. Quòd verò non omnes ob hoc iam ars ipsa vituperatur: aiuntq; hi qui eam peius incessunt, quòd hi qui à morbis apprehenduntur, eosque euadunt, fortunæ ope euadāt, & non auxilio ipsius artis. Ego verò non priuabo quidem ipse fortunā tanquam nihil operæ precij faciat, puto enim morbis qui male curantur ut prius infortunium accedere: qui verò bene, eos bonam fortunam nancisci. Postea verò interrogo: quomodo possibile est sanatos aliud quam artem causari, siquidem eius vsu & mi

Medicina
quid.

Medicina
mala omnia non sanant.

Quatenus
medicina
non probetur.

- A** & ministerio sunt sanati? Nudam enim fortune speciem eos respicere ac sequi noluisse, ex hoc apparet, quod seipsum arti concediderunt quare à gratia fortunæ referenda liberi sunt: ab ea verò quæ arti debetur minimè se vindicare possunt, quo minus ei sanitatem acceptam ferant. In hoc enim quod se ei commiserunt ac cōcrediderunt, palam est ipsos speciem eius esse contemplatos, vim verò eius patrato opere cognoverunt. Dicit sanè hic aduersarius, quod multi iam ægri etiā citra medicorū vsum sunt sanati: & ego id dicentibus credo. Videtur autē mihi omnino fieri posse, vt & qui medicis non vli sunt in medicinam inciderint, non tamē vt scierint quod in ipsa rectum fuerit, & quod non rectum: alioqui cōtigisset
- Species fortunæ nuda.*
- B** vt seipsum eodē penitus modo curassent, quo curati fuissent, si medicos adhibuissent. & hoc tandem magnum signū est substantiæ ipsius artis, nempe artē esse, & quidem magnam, quando sanè etiam hi qui eam esse non putant, per ipsam seruati apparent. Valde enim necessarium est nosse, eos qui medicis etiam non sunt vli, si ægrotauerunt & conualuerunt, quod aut facientes aliquid, aut non faciētes sanati sunt. Aut enim inedia, aut edacitate, aut vberiore potu, aut siti, aut balneis, aut illuue, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut vigilia, aut his omnibus promiscuè vtentes, cōualuerunt. Et sanè propterea quod opem senserunt, valde necessarium est ipsos nosse, quod fuerit aliquid quod opem tulerit. Et rursus si quid detrimenti acceperunt, necesse est & detrimentū nosse,
- Medicis non utentes non negat posse sanari.*
- C** & quod fuerit aliquid quod damnum dedit ac læsit. Non enim quiuis cognoscere potest ea quæ commoditate & detrimento sunt disparata. Si igitur is qui ægrotauit, siue laudare, siue vituperare nouerit quid ex diæta, per quam conualuit, omnia hæc Medicinæ esse comperiet, & sunt nihil minus ea quæ damno fuerunt, quàm ea quæ opem tulerunt, in testimonium arti, quod ars ipsa sit. Quæ enim profuerunt, ob rectum vsum profuerunt: quæ verò nocuerunt, ob id quod non rectè usurpata sunt, nocuerunt. Atqui vbi rectum, & non rectum vtrunque suum finem habet, quomodo quis hoc artem esse neget? Hoc enim ego artis expertus esse dico, vbi neque rectum neque non rectum aliquid existit. Vbi verò vtrūque horum inest, quomodo hoc non artis opus, sed potius inartificialitatis existat? Amplius autem si ex pharmacis pur-
- Qui sine medicis sanantur, aliqua re sanantur.*
- artixia.*

Medicamentis purgantibus, & aluum sistentibus solū, tum Medicina, tum Me- D
ta purgantia, & sistē
tia nō satis
sunt ad con-
ualescentiā.

dicis sanationem facerent, infirmus sanē sermo meus merito iudicaretur. Nunc verò hi qui inter medicos maximè laudati sunt, & diata, & alijs medicaminum formis sanant, quas ne idiota quidem artis ignarus si audiat, vedum Medicus artis esse negare queat. Vbi igitur nihil neque in ipsis bonis medicis, neque in arte medica inutile est, sed in plurimis eorum quæ ex terra nascuntur, & eorum etiam quæ fiunt, species & formæ insunt medelarum & pharmacorum: non est quod amplius aliquis eorum qui sine medico conualuerunt, casum spontaneum vero sermone vehere possit tanquā causam suæ sanationis. Spontaneum equidem nihil esse apparet ac deprehenditur. Omne enim quod fit, propter quid fieri comperitur, atque etiam in singulis adeò propter quid fieri videtur. Spontaneum verò nullam substantiā habere comperitur, sed nudum tantum nomen. Medicina autem tum ex

Medica
ars cur re-
felli nō pos-
sit.

his quæ propter quid de industria excogitata sunt, esse adparet, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare his quidem qui fortunæ sanitatem acceptam ferant, artique derogant, hæc quæ dixi respondere quis possit. Cæterum eos qui ob morientium calamitatem, artem demoliri contendunt, miror quānam memorabili ratione commoti, intemperantiam quidem morientium causam mortis non statuunt, scientiam verò eorum qui medicinam exercent, accusant: tanquam sanē Medici quidem ea quæ non conveniant, imperare possint, ægri verò quæ imperata sunt, transgredi non possint. Atqui longè magis rationi cōsentaneum est, ægros non posse facere quæ imperantur, quā medicos

Quid contra eos qui morituros medicis assignant, dicat.

Quid medicus consideret ante curam.

Cur lægnes non parant.

non convenientia iubere. Medici nanque sana mente sanōque corpore rem aggredientes, & præsentia considerant & de præteritis similiter iuxta præsentia ratiocinantur, intantum etiam ut aliquando palam gloriari soleant ægri, se illorum opera sanitati restitutos esse. Aegri verò neque qua parte laborent, neque ob quam causam laborent, neque quid ex præsentibus futurū sit, neque quid ex horum similibus fieri scientes, medici imperio subiacent, dolentes quidē ob præsentia, timentes autem futura: & pleni quidem morbo, inanes autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, quā quæ ad sanitatem faciunt assumere malunt, mori quidē non aman-

tes,

- A** res, sed tolerare tamen non potentes. Hoc modo autem affectos, utrum verisimilius est, hos à medicis imperata facere, an alia facere quæ medici non iusserunt? aut medicos tales quales superiori sermone declaravi, non conuenientia imperare? Nónne multò magis hos quidem quæ conueniant iubere: illos autem temerè & impotenter nolle obedire? atque sic inobedientes in mortem incidere? Quæ sanè qui non rectè considerant, causas ad hos qui inculpabiles sunt, referunt: eos verò qui maximè accusandi sunt, à culpa liberant & defendunt. Porro sunt item quidam qui ob eos qui victis à morbis curam adhibere nolunt, medicinam ipsam reprehendunt, dicuntque quòd morbi quos sanare aggrediuntur illi, *Dānatur ars medica, quinetiam cū deploratos non curat.*
- B** per seiplos fuissent sanati: qui verò auxilio opus habent, eos non contingūt. Oportebat autem, inquit, siquidem ars erat, omnibus æquè morbis sanitatem afferre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarentur, quòd ipsorum talia dicentium, non ut delirantium curam habeant, meritò sanè successerint magis, quàm quòd illa reprehendunt. Si quis enim ab arte potentiam in ea quæ non proficitur, aut à natura facultatem in ea ad quæ nata non est, exigat: is ignorat insaniam dementiæ potius quàm ignorantie conuenire. Quorum enim instrumentorum siue naturæ, siue artium facultatem obrinemus, per ea sanè opifices esse possumus, per alia verò minime licet. quū igitur homo morbo afficitur qui vehementior est quàm medicinæ instrumenta, ne sperare quidem oportet ut à medicina exuperetur. *quā est incurabilis morbus*
- C** dem oportet ut à medicina exuperetur. Exempli enim gratia, Inter ea quæ in medicina vrendi vim habēt, ignis extremè vrit, verum eo minus etiā alia multa. An verò ex eis præstantiora leuioribus morbos curare non possint nondum satis constat, valentissimos autē morbos potentissima etiā instrumenta curare non posse, quomodo non sit manifestum? Quæ enim ignis nō efficit, quomodo ea quæ ab illo non sunt domita non ostendant, quòd alia arte opus habeant, & nō ea in qua ignis instrumentum existit? Idem sentio & de alijs instrumentis quæcunq; medicinæ opus adiuuant, quorum omnium singulatim successum si nō assequitur medicus, vim affectionis accusare oportet, mea quidē sententia, non ipsam artem. Qui igitur eos reprehēdunt qui victis à morbo manū adhibere recusant, hortantur etiā ut ea quæ nō conueniunt attingant,
- Deploratos nō expedit tangere.*

attingant, non minus quàm ea quæ contingere interest ar- **D**
tis, quod quum faciunt, his quidem qui nomine medici sunt,
admirationi sunt: ab his vero qui arte præstant, deridentur.
Nec vero adeo desipientes huius artis experti sunt: neque vi-
tuperatoribus neque laudatoribus indigent, sed ratione,
ad quam sanè actiones opificum absolutæ, plene sunt, & quæ
ab ea destitutæ, mancæ. Amplius vero etiam defectus ali-

*Quædã ar-
ti quædam
artifici dā-
da.*

*Mala pa-
temia pau-
ca sunt, con-
tra quæ nō
patent mul-
ta.*

quos quidem opificibus imputare oportet. aliquos vero ipsis
operibus. Quæ quidem igitur ad alias artes pertinent aliud
tempus, aliudque sermonem requirunt. Quæ vero ad medi-
cinam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidem su-
periori sermone ostendimus, partim vero præsentī oratione
docebimus. Sunt enim his qui hanc artem probe norunt, **E**
morbi partim non in obscuro positi, & non multi: partim
non in manifesto loco hærentes, & multi sunt. Qui enim ad
interna vētuntur, in obscuro siti sunt. Qui vero ad super-
ficiem corporis erumpunt aut tumescunt, manifesti sunt. ex-
hibent enim sese ut tum visu, tum tactu, & soliditas & humi-
ditas ipsorum percipiatur, & qui calidi sint quique frigidi

*morbi dī-
ferentē*

sentiātur, qui sanè singulorum aut præsentia aut absentia ta-
les existunt. atque horum quidem omnium in omnibus cer-
tas ac infallibiles medelas esse oportet, non ob id quod faci-
les sint, sed quod certo inuento consent. Neque verò à qui-
busvis volentibus inveniuntur, sed ab his qui volunt item-
que possunt, possunt autem quibus tum disciplina non emi-
nus sed prope & largiter contigit, tum natura non infelix li-
beraliter accessit. Ad manifestos quidem igitur morbos hoc **F**
modo artem diuite facultate præditam esse oportet. Neque
verò ad minus manifestos eam inopē ac dubiam hære con-
uenit. Sunt autem morbi minus aperti, quique ad os, quique

*morbi oscu-
ri. Corporis
ubi ventriculi
sunt.*

ad ventriculum sunt conuersi. Habet autem corpus non vnū
vētriculum sed plures. Duo enim sunt qui cibum suscipiunt
& demittunt, alijque præter hos plures, quos norunt hi qui-
bus hæc res curæ fuit. Quæcunque enim membra carnem in
orbem circumsitam habent, quam musculum appellant, ea om-
nia ventriculum habent. Omne enim inconcretū & quod
non coaluit, siue pellicula siue carne contegatur, cauum est.
Impletur autem dum sanum est flatu, dum agrotat sanie.
Habent itaque brachia talem carnē, habent & fœmora, ha-
bent

A bēt suā. Quin & in macilēis & ex carnib. partibus eiusmo-
 di caro inest, similiter vt in carnosīs esse demonstratum est.
 Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur, &
 capitis circulus, in quo cerebrum concluditur: ipsumq; adeo
 dorsum, ad quod pulmo vergit, horum membrorum nullum
 est quod non & ipsum vacuum sit, ac multis segmentis ple-
 num ac quasi discriminatum existat, quæ parum abest vt va-
 sa existant, quorum tamen aliqua habentem lædunt, aliqua
 vero etiam profunt. Præter hæc autem & venæ multæ, &
~~nerui non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti liga-~~
~~mentum sunt articulorum: ipsi etiam articuli in quibus os-~~
~~sium quæ mouentur commissuræ inuoluuntur:~~ & horū nul-
B lum est quod non subspumosum sit, & circa se forulos ha-
 beat, quos sanies prodit, quæ deductis ipsis, multa & magno
 multorum mœrore egreditur. Ex prædictis itaque omnibus
 nullum est quod oculis conspicienti videre ac cognoscere
 contingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt:
 & ab arte quoque obscura esse iudicata sunt, non tamē quod
 obscura permaneant & nos vincant, sed quantum possibile
 est cognoscantur & superentur: possibile autem est quantum
 ægrorum naturæ ad considerandum conferunt, & quantum
 eorum qui perscrutaturi sunt naturæ ad perscrutandum apte
 sunt. Cum multo enim labore, & non modico tempore præ
 oculis videntur & cognoscuntur. Quæcunque enim oculo-
C rum conspectum effugiunt, ea mentis oculis obtinentur &
 superantur. Quæcunque vero ob id quod non statim cogno-
 scantur ægri mala perpetiuntur, ea non ad medicos curan-
 tes ipsos, tanquam ad ipsorum autores referenda sunt, sed ad
 naturam ipsius ægri, itidemque ipsius morbi. Medicus enim
 quum non possit malum neque visu assequi, neque audien-
 do ex aliorum narrationib. cognoscere, ratiocinatione ipsum
 persequitur. Etenim ipsi quoque ægri qui obscuro morbo
 laborant, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex opi-
 nione magis quàm scientia narrant. Nam si sciuisent, in
 ipsos sanē medicos non incidissent, quum eiusdem scientiæ
 sit morborum causas nosse, & morbos ipsos omnib. medi-
 camentis quæ augescere morbum prohibent, curare posse.
 Quando igitur neque ex ægri narrationib. ad infallibilem
 certitudinem peruenire possit, aliò certe respicere medicum
 necesse

*Loca cor-
 poris uan-
 ua.*

*Venæ, nerui
 quid faciāt.*

*Quæ causa
 cur non co-
 gnoscantur
 morbi sta-
 tim.*

*Causæ mor-
 borum non
 statim co-
 gnoscuntur.*

*Languen-
 tib. non sem-
 per creden-
 dum.*

Quid studeat natu-
ra.

Medicus
cum mor-
bi noui, fa-
cile pellit.

ide infra
94.

Medica
ars nihil ca-
reris simile
habet.

per quod mor-
bi inferunt
ignot. Natura
quid agat,
uidetur.

necessè est. Quare huius tarditatis non ars ipsa, sed corporum **D**
natura causa existit. Hæc enim malum sentiens, mederi ma-
gnopere gestit, considerans tamè ne temeritate magis quàm
consilio, & vi facilitate magis quàm violentia medeatur.
Medicus verò si quidem suffecerit ad cognoscendum, suffi-
ciet etiam ad sanandum. Si verò is in quo morbus cogno-
scitur, superetur, ob id sanè quòd serius medicum accersit,
aut ob morbi celeritatem peribit. Si enim ex æquo proces-
serit morbus cum medicina, velocior non est. Si verò præ-
occupauerit, velocior omnino existit. præoccupat autem tum
propter corporum angustiam, in qua non in conspectu in-
habitantes morbi, tum propter ægrorum negligentiam. Dif-
ferunt enim & cunctantur, atque ubi iam à morbis ipsis ap-
prehensi sunt, tum demum curari volunt ac expetunt. **E**
Quare artis potentiam magis ex merito admiremur, si quem ex
clandestino morbo ægrum restituat, quàm si impossibilibus
& desperatis opem ferre molitur. Nequaquam vero in vlla
aliqua iam inuentarum artium tale quiddam inest, sed quæ
ex eis igne opificium exercent, igne non præsentem, ociosæ
sunt. Vbi verò illum contigerunt, operosæ. Quæ item tracta-
bili rerum materia artem suam exercent, veluti aliæ quidem
lignis, aliæ corijs, aliæ sculpendo tum ære, tum ferro, alijsq;
similibus rebus earum quàm plurimæ. Opera porro quæ ex
hac materia, & cū huius materiæ instrumentis sunt, tam etsi
facile retractari ac corrigi possunt, tamen nō magis voloci-
tate quàm velut decet perficiuntur, neque defunctoriè trans-
filiuntur, verum si quod instrumentū desit, interim quiescūt, **F**
quanquam etiam illis cunctatio & tarditas ad opus commo-
dius absoluendum impedimento sit: attamen opus laudatur
& præfertur. Medicina verò aliquibus quidem ex suppura-
tione thoracis, aliquibus verò iuxta hepatis & renes, alijs au-
tem per omnes corporis ventriculos ægrotantibus, eorum
omnium inspiciendi potentia priuata est: quod ipsum apud
omnes in confesso existit, alias tamen facultates coadiutric-
es adinuenit. Vocis nimirum claritatem & tarditatem, itē-
que fluxiones quæ singulis locis per quos exitus eis dantur,
destillare consueuerunt, quarum modo odores, modo colo-
res, deinde etiam ponderatam tenuitatem, accrassitiem ob-
seruat, ex eisquæ signa tum eorum quæ ægri iam perpetu-
tur, tum

- A** tur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum verò hæc significationem de se præbeant, neque ipsa natura voluntaria dimittat, vires anplius ac necessitates medicina ipsa inuenit, quibus natura coacta indemnis tamen concedat. Natura autem stimulata & impulsæ, artis peritis quæ facienda sunt demonstrat. Cogit autem partim coactum in nobis calorem, pituitam per ciborum ac potuum acrimoniam diffundere, quo intelligat quid sibi visum sit de illis, quæ vt viderentur ipsa machinata est: partim verò spiritum velut delatorem, tum vijs arduis, tū cursibus accusare ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens ac excludens, humorum calidorum exhalationem perficit. Sunt præterea quæ per vesicam pergressa magis morbum ostendere possunt, quàm quæ per carnem exhalant. Inuenit igitur & tales potiones itemque cibos, qui calidiores aliàs calefacientibus existentes, illaque & eliquant, & profluere faciunt, quæ sanè non profluxissent si non hoc modo tractata fuissent. Alia itaque ex alijs, & alia per alia prodeunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum produnt, vt nihil miri sit ipsis serius fidem haberi, & medendi conatus ac aggressiones tardiores esse, quum sic per peregrinas interpretationes ad medendi scientiam accognitione medici perueniant ac erudiantur. Quòd igitur & rationes in seipsa plenas & ad ferendum auxilium abundantes habeat medicina, & quòd morbis qui corrigi non possunt meritò auxiliares manus negat, aut si fortè opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum iam habitus sermo manifestum facit, tum etiam artis peritorum demonstrationes palam documentum præbent, quas sanè ex operibus iucundius quàm ex sermonibus ostendunt: vtpote qui dicendo non magnopere exercitati, multitudini fidem sinceriores ex his quæ videat quàm quæ audiat facere malint.

Locum magis morbos indicat.

Proprium artis medicæ.

Hippocratis

HIPPOCRATIS ^D

COI LIBER DE VETERI ME-

DICINA, IANO CORNARIO

INTERPRETE

intelligit.

*Priores ar-
tis medica
scriptores
taxantur.*



*Medicam
artem esse,
& ueram
assuetat.*

*Medicina
antiquitas.*

*Certa esse
inuenta in
bac arte.*

Vicunque de medicina dicere aut scribere aggressi, dicendi scopum sibiipsis ac fundamentum supposuerunt, calidum aut frigidum, aut humidum aut siccum, aut aliud quodcunque voluerint, rem in compendium contrahentes, principiū causæ, tum morborum, tum mortis, hominibus omnibus idem, vnum aut duo proponentes, hi in multis quæ dicunt manifestò errasse deprehenduntur. Iustior autem querela est de arte, qua omnes in maximis vtuntur, & bonos artifices maximè colunt. Sunt autē opifices alij viles, alij longè præstantes, quòd sanè si nō esset omnino medicina, neque in ipsa obseruationes essent, neque quicquam inuentorū, nō vtrique extaret, sed omnes æqualiter eius ignari & inexpertī essent, & per fortunam omnes ægrotorum res gubernarētur. Nunc verò res nō sic se habet, sed quemadmodum aliarū omnium ^F artium opifices multum inter se differunt, tum manu, tum mente, sic etiam in medicina. Quapropter non censeo ego ipsam inani fundamento indigere, velut obscura & dubia. de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamento vti. Velut si quis de sublimibus in aëre rebus, aut de subterraneis dicat, & quomodo habeant sciat, tamen neque dicenti, neque audientibus manifestum satis fuerit verane sint an secus. Neque enim est ad quod quis se conferat, cuique innitatur vt veritatem cognoscat. Medicina autē iam ab antiquo existit, & principiū & via inuenta, per quam inuenta & multa & probè habentia comperta sunt, per multū adeo tempus, & reliqua deinceps inuenientur, si quis sufficiens sit, & iam inuentorū gnarus, ex his ad perquirendū procedat. Quicūq; ^E vero

- A** verò his reiectis ac omnibus reprobatis, alia via aliaque forma inquirere conatur, & quid inuenisse gloriatur, falsus est & fallitur. Impossibile enim id est, verum ob quas necessitates impossibile sit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrans quòd ars existat. Ex hoc autem palam fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri. Videtur autem mihi maximè, de hac arte dicturum oportere vulgo ac plebeis hominibus nota dicere. Neque enim de alio quopiam, neque querere neque dicere conuenit, quàm de affectionibus, ex quibus illi ipsi ægrotant. Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiones condiscere, quomodo fiunt ac desinunt & quibus occasionibus augescunt ac deficiunt, quum idiotæ sint non est facile, verum ab alio inuentas ac proditas, procliuè. Nihil enim libentius quisque recordatur quàm quæ sibi ipsi accidisse audit. Si quis autem idiotarum sententia destitueretur, & audientes non afficiet, ille etiam veritatis compos non fiet, & propterea neque fundamèto neque scopo opus habet. Et enim Ars medica neque inueta ab initio fuisset, neque quæ sita. Nihil enim ea opus erat ægrotis hominibus, si eadem diætæ vterentur, & assumerent quæ sani edunt ac bibunt, imò etiam alterius diætæ vsus eis profuisset, si non alia fuissent his meliora. Nunc autem ipsa necessitas homines coegit Medicinam inquirere ac inuenire. Quoniam ægrotis eadem in cibo assumentibus quæ sani solent, non fuit vtile, velut neque nunc vtile existit. Quin vt rem altius expendamus, neque ipsam sanorum diætam ac alimoniam quæ nunc vtuntur, inuentam fuisse censeo, si suffecisset homini idem cibus ac potus, qui boui ac equo, & omnibus alijs præter hominē, veluti sunt ex terra nascentia, fructusque ac herbæ & fœnum. Ex his enim nutriuntur, & augescunt, & illæsi degunt, nō indigentes alia diætā. Quanquam ego sanè ab initio etiā hominem tali victu vsu esse putem. Quæ verò nunc inueta sunt edulia, multa arte excogitata & multo tēpore producta esse mihi videntur, quum multa & grauia, ex forti ac ferino victu homines paterentur, qui intemperatus, & magnas vires habens ingerebatur. qualia sanè etiam nunc ex ipso paterentur, doloribus vehementibus & morbis obnoxij, & breui etiam morti. Verisimile est autem hæc mala tunc minus perpeffos ipsos esse, propter consuetudinem: quanquam etiam tunc ve-

*De rebus
cōmunibus
tractat me
dicina.*

*Medica
ars est de
rebus mora
bisue vulgo
notis.*

*Quæ de ci
uarijs dicat
aspicito.*

HIPPOCRATIS LIBER

Multi prio hemēter afflicti sint, & cōsentaneū est plurimos & debiliore **D**
re cibo peri natura p̄ditos periisse, eos, verò qui victū illū superare pote
bant. rāt longiori tēpore durasse ac restitisse. Quēadmodū etiam

Panificia
uaria.

nūc ex validis edulijs aliqui facillē liberant, aliqui cū multis doloribus ac malis. Ob hāc itaq; necessitatem etiā illi mihi videntur quæsiuisse victū naturæ cōuenientem, & inuenisse hunc, quo nunc vtimur. Ex tritico igitur macerato, & à cortice purgato, molitoq; ac cribrato, & subactō, ac affato, panem fecerunt. Ex ordeo verò mazā, aliāq; multa ex hoc excogitātes, coxerunt, & assarunt, & miscuerunt, fortiāque & intēperata, debilibus temperarunt, effingentes omnia iuxta hominis naturam ac vires, quæ quidem fortiora essent, ab ipsa

Medici hūc
cibum exco
gitarunt.

naturā non posse superari, si ingesta essent, existimantes : ab his ipsis quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudicantes: cōtrā ab his quæ natura domare posset, alimentū & augmentum & sanitatē. Porro inuento huic quodnā iustius aut magis conuenienti nomen quis imposuerit quā medicinæ? quandoquidem ad hominis sanitatem alimentumq; ac salutem inuentum est, in permutationē illius victus ex quo dolores & morbi fiunt. Si verò ars ipsa esse non putatur, nihil absurdi est. Nā cuius nemo ignarus est, sed scientes omnes, ob usum & necessitatem eius non conuenit aliquentē appellari. Atqui inuentum ipsum & magnum & multæ artis ac considerationis existit. Quintiam in hunc vsq; diem exercitiorum & reparandarum virium curam gerentes, semper

Principia
medicinæ.
Barbarorū
victus.

aliquid amplius adinueniunt, iuxta eandē viam investigantes quod quis edens ac bibens maximē superet, ac seipso fortior euadat. Consideremus itaque & confessam ab omnibus medicinam, eam videlicet quæ propter ægros inuenta est, an & nomen & artifices habeat, & ipsa dominari ipsis velit, & vnde tandem initium sumpsit. Mihi equidem, velut in principio dixi, nemo ne quæsiuisse quidem medicinam videtur, si idem victus & ægrotis & sanis conuenisset. Itaque vsque in hunc diem hi qui medicina non vtuntur Barbari ac Græcis confines, eodem modo quo sani victitant ad voluptatem, & à nulla re quam concupiscunt, abstinēt, neque quicquam deuītant. Caterū qui Medicinam quæsiuerunt ac inuenērunt eandem cū illis de quibus superiori sermone dictū est, sententiam habuerunt, & primū quidem ex his ipsis cibis copiam

A copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerunt. Quum verò ipsis aliquādo hoc ad aliquos ægros sufficeret, palamq; fieret quòd prodesset, non tamen omnibus, sed essent quidā ita habentes, vt neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sanè quopiā tales indigere illis visū sunt, sorbitionesque inuenerūt pauca ex fortibus multa aqua permiscen-
B tes, & robur ipsum tēperatura ac coctura detrahentes. Quòd si qui neque sorbitiones superare possent, his detraxerūt etiam ipsas, & ad potiones peruenerunt, obseruaruntque vt & hæc tum vsu, tum copia moderatè haberent, & neque plures quàm oportet, neque meraciore & intēperatiorē, neque de festuosiores offerentes. Probè autē nosse oportet quibus sorbitiones in morbis non cōducunt. Nam statim vbi hoc fecerint exacerbantur ipsis febres ac dolores, & manifestum fit, quòd assumptū morbo quidem alimentum ac incrementum præbet, corpori vero tabes & infirmitas existit. Quicūque vero homines in hac affectione existentes siccum cibum assument, aut mazā, aut panē, etiam si valde modicū, decuplo magis & manifestius lædūtur, quàm si sorbitione vsi essent, ob nullā aliā causā quam fortitudinē edulij ad affectionē, in quo sorbere cōducit, edere autē non. Si enim plura comederit, plus utique lædetur: si verò pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque dolores causæ ad idē reducuntur, nimirū fortissima edulia maximè & manifestissimè hominē ledere, siue sanus sit, siue ægrotus. Quid igitur aliud cogitasse videri queat hic appellatus Medicus, & cōfessus artifex, qui agrorum diætā ac victū adinuenit, quàm ille qui ab initio omnibus hominibus victū quo nūc vtimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornauit? Mihi eqdē videt idē modus, & vnū quoddā ac simile esse inuētū. Hic enim ea q̄ natura humana sana superare nō potuit incidētia & ingesta, ppter feritatē intēperantiāq; ille verò qualicūq; tandē vnus cuiusq; affectionē teneret, vt superare nō posset, eadē detrahēre quæsiuit ac institit. Quid hoc ab illo differt? præterq̄ qd̄ multiplicior & variegatior ac maioris negotij est hæc species. Verū principiū fuit illa quæ prius est pducta. Si verò q̄s cōsideret quæ sit ægrotorū diætā, cōparatione ad sanorū diætā facta, is inueniet hanc ægris nocentiorē quàm eam quæ ferarum est & aliorum animalium sanis. Etenim vir laborās morbo neq; dif-

*Sorbitionē
& potionū
inuenio.*

*Quid observa-
uandū me-
dicis.*

*Cibus sanorū
languē-
tib. obest.*

*Duorū ho-
rum nutri-
catuum dis-
ferentia.*

*Medicina
in Cibura-
giam, phar-
macuticā,
& Diaue-
cen.*

*Ciborum
cōparatio.*

HIPPOCRATIS LIBER

ficili & intolerabili, neque rursus leui & despicabili, si panē D
 aut carnem, aut aliud quid ex his quæ sani edentes iuuantur,
 comedere volet, nō multū, sed multo minus quàm sanus po-
 terat, contingat autem vt nec sit qui eum delinquere admo-
 neat. Alius contra sanus naturam habens non omnino debi-
 lem, neque tursus fortem, si comederit quid eorum quæ bos
 aut equus comedens iuuatur, & edat sane eruum aut ordeum,
 aut aliud quid huiuscemodi, non multum, sed multo minus
 quàm potest. Sanus vtique qui hoc fecerit, minus & dolebit
 & periclitabitur quàm ægrotus ille, qui panē aut mazā intē-
 pestiue ingessit. Hæc itaque omnia signa sunt, quòd ipsa ars
 medica via ac methodo quæ sita inueniri possit. Si quidem
 igitur simpliciter, velut aliqui putant, quæ fortiora sunt, no- E
 cerent, quæ debiliora, prodesse & nutrire, tum ægrū, tū
 sanum, facilis sanè res erat. Multum enim de securo detra-
 here oportebat vt ad debilissimum deduceretur. Nūc autem
 non minus delictum, nec minus lædit hominem, si pauciora
 & defectuosiora quàm satis est, assumantur. Fames enim ma-
 gnā potentiā in naturā hominis habet & sanandi & debili-
 tandi & occidendi. Multa verò etiam alia mala, diuersa qui-
 dem ab his quæ ex repletionem sunt, non minus autem gra-
 uia, vacuationis sunt, quapropter multo variegatior eit, &
 maiorem diligentiam requirit. Oportet enim modum aliquē
 coniectare. Modum autem neque pondus, neque numerum
 aliquem, ad quem referas cognosces: certitudinem enim ex-
actam non reperies aliā quàm corporis sensum. Quapropter F
operosum est ita exactè cōdiscere vt parum in alterutrā par-
tem delinquas: quanquā ego etiā cum medicum vehementer
laudarim, qui parum delinquit. Certitudinem autem exactā
 raro videre contingit. Quare plerique Medici eadē quæ ma-
 li gubernatores in se admittere mihi videntur. Etenim illi
 quum in tranquillitate gubernantes delinquant, non fiunt
 manifesti: quum verò deprehenderit ipsos ventus magnus
 & tempestas, palām iam conspicui sunt omnibus hominibus,
 quod ignorantia & culpa erroris sui nauem perdiderunt. Sic
 sanè etiam mali & plurimi medici, quum curāt homines ni-
 hil graue patiētes, in quos si quis etiam maximè delinquat,
 nihil graue faciat. Sunt autē multi tales morbi, & multo se-
 pius q̄ graues hominibus accidunt. In talibus sane delinquen-
 tes, non

Quis erret
in agrotis.

et ius dy-
zeticū in-
cometū est
omniū in-
uicissim

Medicos
nauium re-
storibus cō-
parat.

- A** tes, non fiunt manifesti idiotis hominis. Vbi verò obrigerit *Quando er*
 magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum deli- *ror patet.*
 cta & ars omnibus in conspicuò sunt. Neq; enim longè ab-
 sunt singulorum pœnæ ac cruces, sed breui adsunt. Quod au-
 tem non minores afflictiones ab intempestiua vacuatione
 quàm à repletione hominibus cõtینگant, probè discemus si
 in sanis rem expenderim⁹. Sunt itaque aliqui ipsorum qui-
 bus semel in die cibum capere conducit, & hoc propter vti-
 litatem sic obseruant. Alij etiam prandent, propter eandem
 necessitatem, sic enim ipsis conducit: Sed & quidam nō pro-
 pter vtilitatem, sed aut ob voluptatē, aut ob alium aliquem
 casum alterutrum faciunt. Plurimorū enim hominum nihil
 interest vtrum tandem faciant, siue semel tantum edant siue
 etiam prandeant, hac consuetudine vti. Sunt autem quidam
 qui non possint extra vtilitatem facientes facillè degere, sed
 contingit vtrisque ipsorum, per diem vnum atque eum non
 ociosè permutatibus, immēsa afflictio. Alteri enim si pransi *Repl. hominis*
fuerint, idque eis non conducit, statim graues & corpore se- *vixit*
gnes fiunt, itēmq; mente pigri, hiatūq; ac oscitatione & dor-
mitatione & siti pleni. Si verò etiam insuper cœnauerint, &
 flatus, & tormina, & aluus effringitur, & multis magni mor-
 bi principiū hoc fuit, si eosdē cibos quos semel insumere cō-
 sueuerunt, bis assumant, & nihil his ampli⁹. Alteri verò si
 prandere consueuerunt, idque ipsis conducit, & non pransi
 fuerint, mox vbi tempus præterierit, statim impotentia vehe-
 mēs, tremor, animi deliquiū, postea oculi pallidi, vrina cras-
 sa & calida, os amarum, & viscera pendere ipsis videntur, ver-
 rigo, iracundia, tristitia. hæc autem omnia vbi cœnare tenta-
 uerint. deinde autē pransuri cōsumere nō possunt quæ pri⁹
 cœnarunt. atq; hæc ipsa cū tormine ac strepitu descendētia
 aluum concludunt, ipsiq; agrè dormiunt, insomniāq; con-
 turbata ac tumultuosa habent, plerisq; verò etiam horū hoc
 magni morbi principium fuit. Cōsiderare porrò oportet ob-
 quas causas hæc ipsis acciderūt. Et sanè puto his qui semel ci-
 bum sumere cōsueuerunt, q̃ non expectauerunt iustum tem-
 pus, donec ipsorum vēter pridie ingestos cibos perfectè con-
 sumpsisset & exuperasset, euacuatusque esset ac quieuiisset,
 sed in feruentem adhuc & fermentatum nouos ingesserunt.
 Eiusmodi autē ventres multò tardius concoquunt, & maiori

ab epistola
in remota

Cū hora ci
bi præterit,
quid fiat ui
deo.

Cur uariæ
hi afficiantur.

HIPPOCRATIS LIBER

opus habent cessatione ac quiete. His verò qui prandere assueti fuerunt, q̄ non vbi citissimè alimento corpus indigebat, & iam priora consumpta erant, nec habebat aliquā amplius fruitionem, statim ipsi nouum alimentum suppeditatum est: deficit autem & cōsumitur præ fame. Nā omnia que

Qui diu cibo abstinet, quid patiantur.

tales homines perpeti dixi, fami imputo. Dico autem etiam alios omnes homines, qui duos aut tres dies in ediam pertulerint, eadem passuros esse, quæ de impransis dixi. Cæterum tales naturas quæ citò & fortiter eiusmodi delictis offenduntur, imbecilliores alijs esse censeo, proximus est autem imbecillis languenti: verum imbecillior est languens, & plus laborare contingit ipsum, vbi iustum tempus non est assequu-

Cur nō semper in arte medica attingitur veritas.

tus. Quum itaque eiusmodi exacta certitudo circa artem existat, difficile est semper quod rectissimum est assequi. Multę autem species in Medicina ad tantam certitudinem perueniunt, de quibus dicetur. Non censeo itaque propter hoc artem velut non existentem, neq; probè inuestigatā, veterem oportere reijci, quòd non habeat circa omnia certitudinem exactā. Verum multò magis propterea quòd propinqua est recto, simulque ratione possit ad ipsum peruenire, admirari oportere censeo ea quæ ex multa ignoratā sunt eruta & inuenta, quòd probè & rectè adinuenta sunt, & non à fortuna

Suppositū hominis, materiduc.

aut casu. Porro ad eos qui nouo modo artē ex scopis ac fundamentis suppositis quærunt, sermonem reducere volo. Si enim calidum est aut frigidum, aut siccū, aut humidū, quod hominem lædit, & oportet rectè medentem auxiliari, calido quidem in frigidum permutato, frigido verò in calidum, sicco in humidum, humido in siccum contingat mihi homo non fortis naturæ, sed ex debilioribus, hic autem triticum edat quòd ex area sustulit crudum & non elaboratum, & carnes crudas, & bibat aquam. Hoc victu vtens satis scio quòd multa & grauia perpetiatur, Nam & doloribus vexabitur, & corpus debile euadet, & venter corrumpetur, & multò tempore viuere non poterit. Quòd igitur auxilium præparare oportet sic habenti? calidum an frigidum, vel siccum, vel humidū? simplex enim est quodcūque ex istis. Si enim id quod ipsum lædit aliquod ex his est, contrario soluere oportet ac liberare, quæadmodū ipsoꝝ sermo testatur. Atqui certissimū & manifestissimū medicamentum est, victum quo utebatur

Hoc confideto.

Potissimū auxilium.

aufferre,

A auferre & pro tritico panem dare, pro crudis verò carnibus coctas, insuperq; vinum propinare. His permutatis impossibile est non fieri sanum, nisi penitus fuerit tempore ac victu corruptus. Quid itaq; dicemus? Num quòd ipsi à frigido afflicto calida hæc oblata auxilium tulerunt, aut contrà? Equidem opinor me multam hæsitationem interrogato præbiturum esse. Nam qui panem ex tritico parauit, calidum, aut frigidum, aut siccum, aut humidum abstulit: panis enim & in ignem & in aquam datur, & multis alijs elaboratus est, quorum singula propriam vim & naturam habet, & aliqua quidem à natura in ipso existentia abiicit, alijs autè temperatur ac permiscetur. Sed & hoc scio, quòd in corpus hominis re-

Panis differtentia.

Maxa.

Quæ prospicienda me dico.

B fert, panis purus, aut cui nihil fursurum decessit, & ex tritico non decorticato, aut decorticato, & multa aqua subactus, aut contrà, & superassatus aut crudior, aliq; præterea infinita. Similiter etiam de maza, & singulorum adeò vires magnæ, alteraq; alteri nihil simile habet. Quicumq; autè hæc nō cōsiderans nō nouit, haud scio quo modo ille affectiones in homine cognoscere possit: ab vnoquoque enim horū afficitur & alteratur homo, vel hoc, vel alio modo, & ex his omnis vita & sano, & ex morbo cōualescenti, & ægroto. Nihil igitur utilius neque magis necessariū quàm hæc cognouisse: quod & probè & conuenienti ratiocinatione inuestigantes, iuxta hominis naturam hæc primi inuentores inuenerunt, iudica-

*Quid spectant pri-
mi artis in-
uentores.*

C modum etiam est receptum. Non enim siccum neque humidum, neque calidum, neque frigidum, neque aliud quicquam ex his putauerunt hominem lædere, neque aliquo horū homini opus esse opinati sunt, sed quod in vnoquoque forte & humana natura potentius est, quòdque non possit superare, hoc ipsum lædere duxerunt: & hoc auferre quæsiuerunt. fortissimum autem est inter dulcia, dulcissimum, inter amara, amarissimum, inter acida, acidissimum. & in omnibus adeò rebus vigor ipse ac summum. Hæc enim & in homine inesse viderunt, & hominē lædere. Inest enim in homine & amarū & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & fluidum, & alia infinita, omnigenas facultates habētia copiāque ac robur. Atque hæc quidem iuxta ac inter se temperata, neque cōspicua sunt, neque hominē lædunt. Vbi verò quid horū secretū

*Quæ ualenti-
ssima.*

*Qui humores
succie
& sapes
sint in ho-
mine.*

HIPPOCRATIS LIBER

fuerit, atque ipsum in seipso fuerit, tunc & conspicuum est, D
& hominem lædit. Quin & ex cibis quicunque nobis incō-
modi sunt, & ingesti hominem lædunt: horum vnusquisque
aut amarus est & meracus ac intemperatus, aut salſus, aut a-
cidus, aut alius quis intemperatus & fortis: & propterea tur-
bamur ab ipsis, quemadmodum etiam ab his quæ ex corpo-
re excernūtur. Omnia autem quæ edit aut bibit homo, talia

*Quæ per-
turbent.*

*Qualis pa-
nis, puls,
mazæus.*

edulia palām est minimè hoc intemperato, & dissidente ac
excedente succo participare, velut sunt panis & maza & his
similia, quibus adſuetus est homo plurimis & semper vt: ex-
ceptis his quæ ad voluptatem ac delicias condiuntur ac præ-
parantur: & ab his plurimis in hominem ingestis turbatio
ac secretio corporis facultatū minimè contingit. Verū robur E
& augmentum, ac alimētum præsertim, per nihil aliud cōtin-
git quā quod probe temperatum est, & nihil habet intē-
peratum, neque forte, sed totum vnum factum est & simplex
& non forte. Et valde sanè dubito ego, quōnam modo hi qui
talem sermonem proferunt, & artem ex hac via ad scopum
abducunt, curaturi sint homines, quemadmodum proponūt.

*Calidum,
hoc, vel con-
tra nescit,
cerum non
est.*

Non enim est ipsis, velut ego opinor, inuentum quid, ipsum
in seipso calidum, aut frigidum, aut siccum, aut humidum,
quod nulla alia specie communicaret. Verū arbitror eos-
dem potus ac cibos ipsis esse, quibus omnes vtimur. Appo-
nunt autem alij quidem, quod sit calidus, alij frigidus, alij
quod siccus, alij humidus. Quoniam illud sanè dubium est,
imperare ægroto calidum quid assumere: statim enim inter F
rogabit quid sit illud, vt nugas producere necesse sit, aut ad

*Quare hoc
calidum il-
lud contra
putatur.*

aliquid eorum quæ sunt cōfugere. Si autē est calidum quod-
dam acerbum existens, aliud vero calidum fluidum, aliud ca-
lidum tenue, sunt enim & alia calida etiam alias vires sub-
contrarias sibi ipsis habentia, quod igitur ipsoꝝ assumere
oportebit? calidum & acerbum, an calidum & fluidum, aut
simul frigidum & acerbū? Nam & hoc est, itemquē frigidū
& fluidum. Etenim quod ego scio, totum cōtrarium ab vtro
que ipsoꝝ euenit, idque non solum in homine, sed etiam
in corio ac ligno, & alijs multis rebus quæ magis stupidum
sensum habent quā homo. Nō enim calidum est quod ma-
gnam vim habet, sed ipsum acerbum & fluidum, & alia quæ
à me relata sunt, tum in homine, tum extra hominem, siue
edantur,

A edantur, siue bibantur, siue forinsecus illinatur, aut quomodocunque formata adhibeantur. Frigiditatem autem & caliditatem ego omnium facultatum minimè potètes esse in corpore existimo, ob has sanè causas. Quo equidem tempore ipsa inter se permixta simul frigidum ac calidum fuerint, non lædunt. Temperamentum enim & moderatio contingit frigido à calido, & vicissim calido à frigido. Vbi verò seorsim vtrunque secretum fuerit, tunc affligit. In hoc itaque tempore quum frigidum intus generatur, & cito hominem affligit, primum propter hoc ipsum adest calidum inde adeò ex homine ipso, nullo alio auxilio, neque præparatione opus habens, atque hoc & in sanis hominibus & in

B ægrotis operatur. Itaque si quis sanus hyeme corpus perfrigerare velit, aut frigidæ lotionē, aut alio quopiam modo, quanto id amplius fecerit, si modo non omnino corpus congeletur, vbi vestimēta acceperit, & sub tegmen venerit, magis & amplius corpore calefcit. Rursus si quis fortiter cal fieri velit, aut calido lauacro, aut multo igne, inde verò eandem vestem habens in eodem loco conuersari, in quo perfrigeratus, multo apparebit frigidior, & longe horridior, quàm aliquis qui præ estu ventilationem admisit, & sibi ipsi frigus præparauit, atque sic ex hoc modo recreatus est. Nam qui hoc facit, decuplo maiorem æstum ac ardorem percipit, quàm is qui nihil tale facit. Verum sunt adhuc testimonia multo maiora. Quicumque per niuem aut

C aliud frigus iter facientes, excellenter frigescunt aut pedibus aut manibus aut capite, vbi se continuerint in noctem, quum cooperti fuerint & in tepore extiterint, ab æstu & pruritu vexantur, quibusdam etiam bullæ velut ambustis ab igne exurgunt, neque prius hoc patiuntur quàm calfiant: adeò promptè vtrunque ipsorum ad alterum accedit. possem & alta innumera recensere. Cæterum circa ægrotos, nōne quibus rigor contingit, his acutissima febris relucet? sed non adeò fortiter, verum pauco tempore quiescens, & aliàs ferè innoxia, & quo tempore affuerit, percalida, & per totum corpus penetrans, desinens maximè in pedes, vbi sanè rigor & frigus validissimum diutissimè durauit. Rursus quum sudor prodierit & febris decesserit, multò magis frigescit æger, quàm si ne apprehendisset,

*Contraria
cōmixta nō
lædunt.*

*Qui calor,
& frigus
cōcipiatur.*

*Quid per
niues gelus
q̃ cunibus
eueniat.*

*Quorū mor-
borū calor
non statim
cessat.*

set quidem ab initio. Cui igitur breui adeo contrarium accedit, cuique vis adimitur sua sponte, quidnam ab hoc malum aut graue fiat? aut quid opus est multo ad hoc auxilio? Verum dixerit aliquis, Qui ardenti febre febricitant, itemque peripneumonij, & alijs fortibus morbis, non cito ex calore liberantur, neque adest hic frigidum aduersus calidum. Atqui ego hoc maximum signum esse puto, quod non propter calidum simpliciter homines febricitent, neque hoc sit simpliciter afflictionis causa: sed est & amarum ac calidum idem, & calidum ac acidum, & falsum ac calidum, & alia infinita, & rursus frigidum cum alijs facultatibus coniunctum. hac itaque sunt quæ ledunt, simul adest autem & calidum robore participans, nimirum ducens & exacerbans & augens simul cum illis, verum nullam potentiam, maiorem quam conuenit videlicet, habens. Atque hæc quidem sic se habent. Signa porro primum quidem manifestissima producemus, quorum omnes iam sæpe experientiam sumpsimus. Itaque quibuscunque nostrum grauedo innascitur, & fluxus per nares mouetur, hic ut plurimum acrior est eo qui prius erat, & quotidie ex naribus prodibat, & tumescere facit nasum, & exurit calentem & extreme ignitum. si verò manum admou eas, & diutius perseuerauerit, etiam exulceratur locus minimè carnosus & durus existens. Sedatur autem aliquo modo ardor in naribus, non quum fluxus prodit, & inflammatio consistit: sed postquam fluxus crassior & minus acris, concoctusque & magis permixtus priore fuerit, tunc sanè iam etiam ardor cessat. Rursus autem alijs ex frigidity ipsa sola manifestè grauedo fit, nullo alio accedente. Omnibus autem liberatio hæc est, ut ex frigidity quidem affecti percalhant, ex ardore verò perfrigerentur, atque hæc breui accedunt, & concoctione

*Destillatio
num signa.*

*humores ten-
perantes*

*Destillatio
nes oculorū*

nulla opus habent. Reliquæ autem omnes fluxiones quas propter humorum acrimonias & intemperantias ego fieri sentio, restituantur & curantur, ubi temperatæ fuerint & concoctæ. Rursus quæcunque fluxiones ad oculos vertuntur ut fortes & omnigenas acrimonias habentes, exulcerant quidem palpebras, erodunt autem aliquorum genas, & sub oculis partes: ad quasunque tandem influxerint, rumpunt etiam & peredunt eam quæ oculum ambit tunicam. dolores autem

- A** autem & ardor, & inflammatio extrema adfunt aliquandiu, donec fluxiones fuerint concoctæ, & crassiores redditæ, & lemæ ab ipsis extiterint. Fit autem concoctio, ex permixtione, temperaturæque mutua, & quasi coctura. Quinetiam fluxiones in fauces delabentes, ex quibus raucedines fiunt, angina, erysipelata, peripneumoniæ: Omnes hæc primùm quidem falsæ & humidæ acrésque descendunt, & in talibus morbi firmanantur. Vbi verò crassiores & maturiores factæ fuerint, & ab omni acrimonia liberatæ, tunc iam & febres, & alia hominem lædentiæ soluuntur. Oportet autem utique causas vniuscuiusque ea putare, quæ quum adfunt, talem modum fieri necesse est, quum permutantur in aliud
- B** temperamentum, cessare. Quando igitur ab ipsa caliditate sincera, aut frigiditate fluxiones contigerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanè sedabuntur, ubi ex frigido in calidum permutatæ fuerint. & ex calido in frigidum. Permutantur autem eo quem dixi modo. Amplius porro etiam alia quæcunque mala homo patitur, omnia à facultatum potentijs proficiuntur. Itaque quum amaritudo quædam diffusa fuerit, quàm bilem flauam appellare solemus, quales statim anxietates & æstus & impotentia occurrant? Verùm ubi liberati fuerimus ab illa & purgati, aut sponte, aut per medicamentum, si modò tempestiue quid ipsorum fiat, manifestè & à doloribus & à calore liberamur. Quanto autem tempore eadem eleuata fuerit, &
- C** cruda & meraca ac intemperata, nulla arte neque dolores, neque febres sedare possis. Et quos quidem acuta acrisque ac æruginosa bilis affligit, quales mox rabies, & morsus viscerum ac pectoris, & desperatio? Non sedantur autem hæc priusquàm eadem expurgeretur & prosternatur, & alijs permisceatur. Concoqui autem & permutari, attenuarique ac crassescere in humorum speciem, per multas & omnigenas species contingit. Quapropter & iudicationes, & numeri temporum, in talibus multum possunt. Hæc verò omnia minimè contingit calidum aut frigidum perpeti. neque enim hoc putrescere neque crassescere poterit. Quid autem ipsum esse diceremus? & temperamentum ipsorum est, verùtamen inter ipsa mutuo vim habēs, quoniam nulli alij permixtū calidum, desinit esse calidum, quàm

*Causa
Rheuma.*

concoctio p. m. d. e.

Causa bonorum malorum.

Mala homini unde accidunt.

anoxia.

Calor & frigus non putrescit.

HIPPOCRATIS LIBER

Quæ in ho-
mine mystic
bona.

Homini
bona dispo-
suo.
Quid oporteat medi-
cos scire.

& com

Quid sit ho-
mo & quo-
modo gi-
gnatur sciat
medicus.

Caseus esu
malus.

Temetō bo
num nō est.

Casus ma-
lus est.

A & cōmouetur, in his quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic potens est, eo magis verisimile est ipsos malè affligi. Si verò toti humanæ naturæ malus esset, omnes vtiq̃ læderet. Hæc autem si quis nouisset, nō incurreret ea neque sanè pateretur. In refectionibus conualescentiū ex morbis, insuperq̃ in longis egritudinibus, multæ conturbationes & præuaticationes fiunt, partim sua sponte, partim à quibuscūq̃ temere admissis. Noui autem medicos multos velut idiotas, qui vbi illi die aliqua noui quippiam fecissent, velut si lauissent, aut deambulassent, aut quid alienum comedissent, atq; hæc omnia melius esset adhibuisse quàm non, nihilominus tamen causam alicui ex his cōtribuebāt, verā quidem causam ignorātes, & fortassis id quod

*Medico
quid prospiciendum.*

B commodissimum erat damnantes. Quod ipsum certe facere nō oportet, sed scire quid balneum intempestiue adhibitum operetur, quid item fatigatio & lassitudo. Nunquā enim eadem afflictio ab his provenit, neque etiam ex repletione, neque ex cibotali vel tali. Quisquis igitur hæc non cognosceret quomodo singula se habeant ad hominem comparata, is neque cognoscere quæ ab ipsis fiunt potest, neque rectè vti. Cæterum & hæc cognoscere oportere mihi vident, nimirū quæ affectiones homini ex facultatibus ac potentijs, quæ item ex figuris adueniunt. Quod autem dico tale est, Nempe facultatem quidem esse, humorum summas vires ac robur nosse. Figuras autem dico quæ in ipso homine insunt, Aliæ enim cauæ sunt, & ex amplitudine in arctum coactæ, aliæ expansæ,

*παθήματα.
δυσάμειν
χίματα.
χυμός.
Figura
scematidae.*

C aliæ solidæ & rotundæ, aliæ latæ & penfiles, aliæ extentæ, aliæ lōgæ, aliæ densæ, aliæ raræ & hiantes, aliæ spōgiformes ac molles. Quæ igitur ex his trahere ad sese allicereq̃ humiditatem ex reliquo corpore maximè possunt? Num cauæ & expansæ, an solidæ & rotundæ, aut cauæ & in arctum ex amplitudine coactæ? Equidem puto tales esse, quæ ex cauitate & amplitudine in arctum sunt coactæ, Id quòd ex manifestis forinsecus condiscere oportet, partim quidem quòd ore hians nihil sanè humoris attraxeris, vbi verò labra foras produxeris, contraxerisq; ac compresseris, insuperq̃ fistulam admoueris, facilè sanè attraxeris quicquid volueris. partim verò quòd cucurbitæ quæ corpori adponi solent, ex amplitudine in angustia arctatæ ad hoc factæ sunt, ad trahē-

*Patētia nō
sorbent.*

*Cucurbitula
læ forma
cur talis.*

dum

HIPPOCRATIS LIBER

*Caput uesi-
ca, & ute-
rus.*

*Lien, pul-
mo, māmā.*

Hepar.

*Flatus quid
agat.*

*Dolor uni-
de.*

*Nervi cur
non tā cre-
bro dolent.*

dum uidelicet & alliciēdum ex carne. Sunt autē & alia mul- **D**
ta eiusmodi. Verū intra hominē natura & figura talia,
sunt vesica, & caput, & uterus in mulieribus: atque hæc ma-
nifestē maximē trahunt, & semper plena sunt attractæ humi-
ditatis. At verō cauæ & expansæ figuræ, influentē quidem hu-
morem maximē omnium susceperint, non autē similiter ar-
traxerint. Solidæ autem & rotundæ, neque attraxerint, neq;
susceperint: dilabitur enim & non habet sedem, in qua ma-
neat. Spongiformes verō & molles, velut lien, pulmo, & māmā,
ubi admotæ maximē fuerint & adhæserint, ebibunt, du-
raque fiunt ac augescunt humore accedente, maximē pulmo.
Non enim in ventriculo inest, in quo humorem extrinsecus
contineat ipse ventriculus in quo est humor, vt quotidie ex- **E**
hauriatur, sed quum biberit & susceperit ipse in seipsum hu-
morem, & vacua & rara ac parua penitus explentur, & pro ra-
ro ac molli, durus ac densus euadit, & neque concoquit, ne-
que dimittit. Atq; hæc patitur propter figuræ naturā. Quæ-
cunque autem flatum & reuolutiones operantur in corpore,
ea in cauis ac amplis, veluti ventre ac pectore, strepitum ac
sonitum facere solet. Etenim quod non sic repleant vt stent,
sed habēt transmutationes & motus, necesse est vt ab ipsis &
strepitus & manifestæ commotiones fiant. Quæcunque ve-
rō carnosæ sunt & mollia, in talibus torpores & excrescen-
tia, velut in trucidatis fiunt. Cæterum quum inciderit flatus
in latum ac renitens, & aliquid ipsi restiterit, idque natura
fuerit neque fortē, vt aduersus violentiam durare possit, & **F**
nihil mali pati: neque molle & rarum, vt excipere ac cedere
queat: verum tenerum & floridum & sanguineum ac den-
sum, velut hepar, quod propter densitatem quidem ac latitu-
dinem resistit ac non cedit, flatus verō subiens augescit ac for-
tior euadit, & aduersum reluctans maximē impetū facit. pro-
pter teneritudinem autem & sanguineitatem, absque dolo-
ribus esse non potest, & propter has causas, dolores acutissi-
mi ac frequentissimi circa eum locum contingunt, suppura-
tionesque ac tubercula plurima. Fiunt etiam circa septum
transuersum fortiter, sed multominus. Distentio enim septi
transuersi lata est & renitens, natura autem neruosa & ro-
bustior, quapropter minus dolore affligitur: fiunt tamen &
dolores & tubercula circa ipsum. Multæ verō etiā aliæ & ex-
tra &

A tra & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differunt: quod ad affectiones pertinet, tum ægroto, tū sano: velut capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut breuia, ventres longi aut rotūdi, pectoris & costarum latitudines aut angustia, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet quatenus differant, quo causas singulorum cognitas probè obserues. De potentijs autem humorum perspectum habere oportet, quid singuli ipsorum in homine facere possint quæadmodum etiam prius dictū est, quomodo cognationes inter se habeant. Quod dico tale est, An videlicet dulcis humor in aliam speciem mutetur, non à contemperamento, sed ipse desciscēs & immutatus ab eo, qualis primum fuerat, amarus aut salus, aut acerbus, aut acidus. Sit sanè acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maxime incommodus fuerit: si vtrique dulcis, omnium commodissimus existit. Id quod si quis forinsecus querens consequi possit, is semper quod melius est ex omnib⁹ eligere queat. Optimum autem est, quod longissimè ab incommodo abest.

Capitis & colli differentia.

Succorū saporemue cōsideratio.

humor acidus, malus, dulcis vero bonus.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MEDICO,

IANO CORNARIO MEDI-

CO PHYSICO

interprete.



Hic liber Medici gubernatio est, & præceptum quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidem gubernationem esse putamus, vt videat quo bono colore, & bona, ac carnosā corporis habitudine præditus sit, iuxta existentem in ipso naturam. Vulgus enim existimat eos qui non sic bene dispositum corpus habent, neque alijs bene prospicere posse. Deinde vt opinionem capter apud ipsum vulgus vestitu decoro, & vnguentis odoratis, non suspectum odorem ad omnia habentibus. Inde enim ægrotos iucunde affici contingit. Postea animaduertere

Medicus qualis esse debeat.

HIPPOCRATIS LIBER

*Quo gestu
eundus
est æger.*

*Qualis de-
beat esse me-
dicus.*

*Quid pri-
mum obser-
uet medicus
Luminis
ratio.*

*Luxum do-
mesticum
prohibet.
Linteola.*

tere ipsum oportet ut animum habeat modestum, non so- D
lum quod ad taciturnitatem attinet, sed etiam circa reli-
quam vitam probe compositum. Maxime enim ad opinio-
nem ac auctoritatem comparandam conducit, bonis ac ho-
nestis moribus præditum esse. Nam quum talis fuerit, omni-
bus venerandus ac humanus iudicabitur. Promptitudo enim
temeraria, & facilitas contemnentur, etiam si valde com-
moda existant. Scopum autem præfigere oportet potesta-
tem facultatum suarum. Nam eadem ab iisdem non abun-
dantibus boni consuluntur. Figuram faciei habeat medita-
bundam ac subtristem, non tamen amarulentè. Contumax
enim esse videbitur & homines odio habens. Qui verò in-
risum exolutus est, ac nimium hilaris, onerosus iudicatur. E
Hoc itaque vitandum est vel maxime. Iustum autem ad
omnem conuersationem esse conuenit. Iustitia enim mul-
tum auxiliatur. Non exigua autem commercia ægris cum
medico sunt. Nam seipsum medicis subditos faciunt, & omni
hora vxoribus, virginibus, & opibus maximi precij, illi oc-
currunt. continenter igitur ad omnia hæc se habere oportet
animo itaque ac corpore sic dispositum esse conuenit. Porro
præcepta ad artem medicam, per quæ artificiosus esse vide-
bitur, ab initio cōsiderabimus ex quo primum homo disce-
re incipit. Quæ igitur in officina medica curantur, ferè ad
discientes pertinent. Primum quidem locum domus habere
oportet, qui sanè talis sit, ut neque ventus ad ipsum accedens
molestus sit, neque sol, neque splendor infestet. Lux enim F
splendida medentibus quidem non est molesta, non simili-
ter autem ægrotantibus. Itaque talem splendorem penitus
fugere oportet, per quem oculos ægrotare contingit. Tale
igitur præceptum de luce obseruetur. Deinde ut nequaquam
faciem aduersam splendori habeat. Infestat enim visum de-
bilem, omnis autem occasio sufficiens est ad debiles oculos
conturbandos. Luce itaque hoc modo vtendum est. Sellæ
autem æquales altitudinæ sint quantum eius fieri potest, ut
in ipsis ægri collocentur. Aeramento exceptis instrumentis,
nullo vtatur. Ornatus enim onerosus mihi esse videtur, tali-
bus vas uti, Aqua exhibenda est ægris potabilis & pura. Ex-
terforijs vtendum est puris ac mollibus, ad oculos quidem,
lintheis, ad vulnera vero, spongijs. hæc enim per se probè au-
xiliari

- A** xiliari videntur. Omnia autem ritè fabrefacta ad vsum esse oportet, magnitudine, grauitate, ac tenuitate. Quæ verò offeruntur omnia considerare oportet vt conferant, maximè si ægrotæ parti adhibebuntur. Talia autem sunt, ligamenta & medicamenta, & lintea circa vulnus, & cataplasinata. hæc enim longissimo tempore circa ægrotantes locos sunt. At verò ablatio horum, refrigeratioque ac mundificatio & aquarum affusio, paucio tempore absoluuntur. Diligenter autem considerare quid horum faciendum sit oportet, & vbi magis aut minus ea adhibere conuenit. Vtrorumq; enim vsus opportunis, itemq; negligentia, magnam differentiam habet. Est autè ppria & genuina medicinæ deligatio, ex qua æger opem sentit. Maximè autem profunt duo hæc, quibus vtendum est, cōprimere videlicet vbi oportet, & remissè deligare. Iuxta horæ verò tempus, quando integrè oporteat & nō, videndum est, vt neque debili, neque fortiore alterum horum vtaris. Concinnas autem deligationes ad spectaculum comparatas, & nihil iuuantes, reprobare oportet. Onerosæ enim sunt, & omnino petulantes, sæpe verò etiam damnum dederūt. Quærit autem æger non ornatū, sed auxilium. Cæterum in chirurgis quæ per sectionē aut vstionem fiunt, velocitas ac tarditas æqualem laudem merētur. Est enim vtriusque vsus. Nam in quibus per vnicam sectionem chirurgia absoluitur, velocem dissectionem facere oportet. cū enim contingat eos qui secantur dolere, id quod dolorem affert, quàm minimo tempore adesse conuenit, quod ipsum continget veloci sectione facta. Vbi verò multas sectiones fieri necesse est, tarda chirurgia vtendum est. Velox enim continuū & multum dolorē inducit. Tardus verò & intermit-tens, requiem aliquam his qui curantur, exhibet. Idem de instrumentis quoque dici potest. Gladiolis enim acutis ac latis vti, non in omnibus similiter præcipimus. Nam partes quædam sunt corporis, quæ celerem sanguinis fluxum habēt, & non facile est eum sistere, Tales autem sunt varices, & quædam aliæ venæ. Itaque in talibus angustas sectiones facere oportet, neq; enim possibile est, vt fluxus in his sistatur. Cōducit autem aliquando à talibus sanguinis detractionem facere. At verò ad locos non periculosos, & circa quos non tenuis est sanguis, latioribus gladiolis vtendum est: sic enim

*Instrumenta**Quæ vulne
ra possunt.**Deligatio.
Duo quæ
his profunt.* *Sectio,
vstioq;.**Celeritas et
tarditas ubi
adhibenda
est.**Missio san
guinis ubi
& quando
facienda.*

*Cucurbitulae
modus.*

*Cum locus
cucurbitulae
admoventur
aperitur quid
agas.*

*captatio ve-
narum bra-
chij.*

sanguis prodierit, aliter nequaquam. valde autem turpe est **D**
non contingere ad chirurgiam quod velis. Cucurbitarum por-
ro duo modi commodi existunt. Quando enim fluxus pro-
cul ab apparente carne compactus fuerit, circulum ipsius bre-
uem esse oportet, ipsamque non ventrosam, sed prolixam par-
te ad manum vergente, non grauem. Quae enim talis est, in
directum trahet, & serosos humores separatos ac distantes
probe ad carnem attrahet. Maiore autem dolore per carnem
disperso, in reliquis quidem consimilem cucurbitam esse o-
portet, sed circulum magnū. Sic enim ex plurimis partibus
id quod dolorem facit educere comperies, ad locum conue-
nientem. Neque enim magnum esse circulum putant, si nō **E**
ex pluribus locis caro comprehendatur ac contrahatur. At
si gravis sit, ad supernos locos repit, infernē autē magis de-
tractionem facit, ut saepe morbi relinquuntur. Lati itaque cir-
culi, una cum incumbentibus fluxionibus, & longē distanti-
bus à supernis locis, multa simul attrahunt de alia carne. Cō-
tingit igitur humiditatem inde detractam, apponi collecto
infernē sub cucurbita seroso humori, & quae quidem infestāt,
relinqui: quae verò nihil molestant, detrahi. Magnitudinem
porro cucurbitae quae cōmoda sit, iuxta corporis partes qui-
bus admoventur oportuerit, coniectare oportet. Vbi verò sca-
rificationem subter cucurbitam adhibere velis, sanguinem
scarificatorum locorum conspicuum esse oportet, aliās neque
circulum attractum scarificare ac pertundere oportet. Debi- **F**
lior enim est caro loci dolore affecti. Scalpris autem incur-
uis, in summo non valde angustis utendum est. Aliquando
enim serosi ac saniosi humores viscosi ac crassi veniunt: pe-
riculum igitur est, ne in fissuris subsint, ubi arctae fuerint
incussae. Porro venas in brachijs, funiculorum apprehensio-
nibus constringere oportet. Caro enim contegens in multis
non probae coaptata est venae, ubi enim lubrica fuerit caro,
non cōtingit sectiones utrorumque iuxta seipsas fieri. Nam
venam contactam insufflari contingit, & sanguinis fluxum
impediri. multis verò etiam propter hoc pus congregatur.
Quapropter duo nocumenta talis chirurgia inducit, secto
quidem dolorem, secanti verò multam ignominiam. Idem
in omnibus venis fieri praeceptum est. Haec quidē igitur ne-
cessaria sunt in officina medica instrumēta, & circa quorum
vsum

- A** vsus artificiosum esse oportet addiscentem. Volsellis autem *Volsella*
tum dentium, tum vuarum, quilibet vti potest. simplex enim
vsus ipsorum esse videtur. Cæterum de tuberculis & vlceri-
bus quæ maiorum morborum sunt, amplius videndū est. Tu-
bercula equidem deprehendere & dissoluere posse, maximè
artificiosum habetur, itemque collectiones ipsorum impedi-
re. Consequens est, ea in conspicuum & quam breuissimum
locum contrahere, & compagem ipsam æqualem per totum
tuberculum facere: vbi enim inæqualiter se habuerit, pericu-
lum est vt rūpatur, & vlcus ægrè curabile reddatur. ex aqua-
re itaq; oportet similiterq; rotū maturū facere & neq; prius
diducere, neque sinere vt sponte rumpat. Quæ verò maturū
B facere æqualiter possunt, in alijs libris relata sunt. At verò vl-
cera quatuor vias habere videtur. Vnā in profundū, hæc autē
sunt fistulosa, & quæ sanie plena sunt, ac intus excauata. Alte-
ram in altum, quæ videlicet carne superexcrescūt. Tertia via
est in latitudinē, atque hæc sunt quæ appellātur serpiginosa.
Quarta via est quæ sola secūdum naturam motus esse vide-
tur. Carnis itaque calamitates hæc sunt, omnes autē commu-
nem rationem habent ad hoc quod ipsis conducit: & signa
quidem horum in alijs relata sunt, itemque qua vtendū sit cu-
ratione, per quæ autem concretum dissoluatur, similiterque
id quod carne excrecente repletū, aut cauum factū est, aut
quod in latitudinem iter fecit, de his omnibus in alijs scri-
ptis nostris abundè dictum est. Amplius verò de Cataplas-
C matis sic res habet. Linteorum quæ imponuntur ac induntur
alicubi in morbo, vsus exactus esse videtur, & est sanè vlce-
ri conueniens linteolorum impositio. Verūm cataplasmate
per ambitū vlceris vtaris. Nam hīc vsus cataplasmatismatis & ar-
tificiosus est, & multum prodesse potest. Videtur enim vlceri
opitulari vis eorum quæ circumponantur. Linteum autē cō-
terendum est ac emolliendum. Verūm partibus extra vulnus
circumsitis cataplasma prodest. Talem igitur ipsorum vsum
esse oportet. Porro de temporum occasionibus, quando sin-
gulis horum vtendum est, & quomodo præscriptorum vires
condiscere oporteat, in præsens relictum est. Talia enim lon-
gè præstantissima in studio Medicinæ sunt, & procul in arte
iam progressi existunt. His consequens est chirurgia vulne-
rum in militia acceptorum, circa extractionē telorum. Nam

*Vlcerū qua-
tuor viae.*

*Vlcerū vul-
nerūue mu-
tila curatio.*

*Quæ præ-
termittat per-
pende.*

*Militarium
vulnerū cu-
ratio.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Signa inhe-
rentium se-
porum.*

In urbanis cōversationibus modicus horum vsus existit. Ra- D
ro enim per omne tempus ciuiles ac hostiles expeditiones
sunt. huiusmodi autem sæpe ac frequentissimè circa exter-
nas militias fieri solent. Qui igitur hac chirurgia vti volet,
eum militare oportet, & externos exercitus sequi. Sic enim
exercitatus fieri poterit ad eiusmodi vsum ac necessitatem.
Quòd verò circa hæc artificiosissimum esse mihi videtur, re-
feretur. Etenim signa exquirere ac inuenire telorum in cor-
pore existentium, maxima artis & chirurgiæ huc pertinen-
tis pars existit. Vbi enim hoc cognitum fuerit, non relinqui
potest vulneratus ex ignorantia neglectus, quum non conue-
nienter tractetur. Solus autem is qui signorum expertus est,
hanc chirurgiam ritè aggredietur. Verum de his omnibus in E
alijs scriptum habetur.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE DECEN-

TI ORNATV, IANO COR-

NARIO MEDICO PHYSICQ
interprete.

*

*Disciplina
nulla proba-
tur, nisi quæ
ad uitæ hu-
manam fa-
cit.*



NON sine ratione faciunt, qui sapientiam F
ad multa vtilem esse prætendunt, eam vi-
delicet quæ inter homines existit. Multæ
enim ad superfluam curiositatem factæ ap-
parent, dico autem eas quæ de nulla re vti-
li differunt. Assumi autem vtique possunt
etiam harum partes ad illas, vel propterea
quòd neque ociositas est, neque malitia. Ocium enim &
ignauia malitiam quærunt, & ad eam distrahuntur, vigi-
lantia vero & mens ad aliquid intentata, trahunt ad se quid
eorum quæ ad vitæ honestatem pertinent, etiam ex dispu-
tationibus nihil vtile tractantibus. Gratiofior est enim sa-
pientia,

- A** pientia, & ab alijs quibusdam in artem constituta, artem videlicet ad parandum honestum ornatum ac opinionem. Omnes enim non cum turpi lucro & turpitudine consistunt. Et illis methodus quædam est artificialis quæ operatur: quod si non innocenter fiat, raptores sunt. adolescentes enim in ipsos incidunt, verum in vigore constituti, propter verecundiam, videntes ipsos idiotas ducunt. Senes vero propter amarulentiam, legislationem in ipsos constituunt, ex ciuitatibus videlicet expulsionem. Hi enim sunt qui fora frequentant, ruditate ac inscitia sua imponentes, & in circulis ciuitatum versantes. Cognouerit autem quis ex vestitu & alijs lineamentis. Quamuis enim fuerint splendide ornati, multo magis fugiendi sunt, & a conspicientibus odio habendi. Qui vero contrario modo se gerunt, frugi homines iudicandi sunt, quibus non est excogitatus apparatus, neque superflua curiositas. Ex vestitu enim cognoscas, & decenti in ipso ornatu ac frugalitate, non ad superfluitatem parato, sed magis ad bonam opinionem, & meditationem, animumque intra se compositum, & ad perfectionem. Imò quocunque vestitu ac ornatu, tales sunt minimè diffuentes, non curiosi, amarulenti ad occursum & obuiam itiones, appositi ad responsiones, graues aduersus resistentes, ad sui similes solertes, & familiares, ac affabiles, temperati ad omnes, ad seditiones taciturni, ad tacendum animo obfirmato & continentes, ad tempus appositi, & ad occasionem arripiendam accommodati, ad victum frugales & contenti, patientes ad temporis expectationem, ad sermones expediti, omne demonstratum proferentes, suauiloquentia vtentes, gratijs affecti, & gloria horum omnium corroborati ac fortificati, ad veritatem ac demonstrationem audentes ac confisi. Principalissimum quidem igitur horum omnium prædictorum est Natura. Nam si hæc affuerit his qui artibus animum applicant, per omnia prædicta penetrare poterunt. Incognita enim utilitas, tum in sapientia, tum in arte adhibita, ad principium capiendum edoceri potest. Natura autem defluit & confunditur cum sapientia, ad cognoscendum ea quæ ab ipsa natura facta sunt. Etenim in vtrisque sermonibus multi conuicti, nullatenus vtrisque rebus vsi sunt ad demonstrationem. postquam igitur quispiam ipsorum expenderit ad veritatem ea quæ retulimus, nullatenus naturæ

*Artes quæ
probantur*

*medici rari
rari*

*veri medici
signa*

*Dux nature
ra in cunctis
est.*

HIPPOCRATIS LIBER

Quid ars.

*Persuasio
in his peri-
culosa.*

*Cognitio
uera quid
faciat.*

*Medicus
philosophus
est deo æ
qualis.
Sapientia
qualis.*

*Medicus
deos potissi-
mum colit.*

bona ipsis procedent. Comperiuntur itaque hi non consimi- **D**
li cū illis via progressi, quapropter denudati, omnem in-
duūt maliciam ac ignominiam. honestus est enim ex opere
quod quis edoctus est sermo. Quicquid enim artificiosè fa-
ctum est, ex ratione prolatū est ac productū. Quicquid autē
artificiosè dictum est, non autem factū, methodi inartificia-
lis demonstratiuum existit. Nam putare quidem non autem
facere, ignoratiæ & inartificialitatis signū est. Opinio enim
maxime in Medicina in crimen vertitur eam adhibentibus:
his verò qui ea in se vfi sunt, perniciem affert. Etenim si sibi-
ipsis in sermonibus persuaserint, & opus ex disciplina se sci-
re putauerint, quemadmodum aurum adulterinum in igne
iudicatum, tales seipfos esse demonstrant. quanquam talis **E**
prædictio nihil commouet ad prudentiam eos qui sunt eius-
dem generis. quod autē rectus sit finis, cognitio manifestum
facit. Tempus porrò etiam artem facilem ac peruiam facit,
aut in consimilē viam incidentibus processus manifestos fa-
cit. Quapropter singula prædicta suscipere oportet, & sapien-
tiam transferre ad medicinam, & medicinam ad sapiētiam.
Medicus enim philosophus, est deo equalis. Neq; enim mul-
ta est inter ipsas differentia. Nam omnia quæ ad sapientiam
requiruntur, insunt in medicina: argenti contemptus, reue-
rentia, verecundia, habitus submissus, autoritas, iudicium,
quies, obuiam itio, mūdicia, doctrina, cognitio ad vitam vti-
lium ac necessariarū purificationū, alienitas à mercimonijs,
alienitas à superstitione, præminētia diuina. Habent enim **F**
quæcunq; habent ad coercendam intemperantiam, insitiā,
auaritiam, concupiscentiam, rapināsq; ac impudentiam. Hec
enim est cognitio accedētium, & vsus eorū quæ ad amicitia
pertinent, & quomodo ad liberos, ac quasq; res se gerere
oporteat: quatenus igitur cū hac societate habet, sapientia
quædā est. Nā & plurima ex his etiā medicus habet. Etenim
sciētia de dijs vel maximè animo ipsius implexa est. Etenim
in alijs affectionibus, & in symptomatis accidentibus, Medi-
cina erga deos valde reuerēter se habere comperitur. Medici
verò deis concedunt. Non enim est potentia in ipsa redun-
dans. Nā & hi multa quidem aggrediuntur, multa verò etiā
per seipsa ipsis superantur. Quæ verò nunc possidet Medici-
na, hinc exhibebit. Quæ enim via ipsius sit in sapientia, ha-
cenus

Actenus dictum est. Nam & illis ipsis hoc modo se res habet.

Quæ verò putant, & consentunt ac profitentur, sic habent.

Quæ circa corpora adsunt & adueniunt, quæ sanè per omnē ipsam artem procedunt, dum illa transformantur aut transmutantur. Quæ item per chirurgiam sanant. Et quæ auxilijs

& medelis aut victu curantur. Summa verò horum omnium

tendat ad horum cognitionem. Quum igitur relata omnia

tali modo se habeant, cōuenit vt Medicus comitatem quan-

dam sibi adiunctā habeat. Austeritas enim & sanis, & agris,

difficilē accessum præbet. Maxime verò adseruare ipsum se-

ipsum cōuenit, vt ne multas corporis partes ostendat, neque

cum imperitis multa fabulei, sed necessaria. Hoc enim vio-

Blencia esse cōsuevit, ad curationis prouocationē. Facere autē

nihil horū debet valde curiose, neque ex imaginatione. Hæc

verò omnia cōsiderato, quo tibi præparata sint ad abundan-

tiam, prout opus fuerit. Sin minus, instante necessitate sem-

per penuria fuerit. Procurare autem oportet hæc in medici-

na, cum omni submissione: de frictione, & illitione, & perfu-

sione, ad manuum cōcinnitatem: de linamentis vulsis, de sple-

nijs, de ligamentis, de his quæ pro temporis cōstitutione re-

quiruntur, de medicamētis ad vulnera, & ocularia, & ex his

ea quæ ad singula genera pertinent: quo tibi præparata sint

& instrumēta, & machinæ, & cōsequenter ferrū. Nam in his

penuria detrimentosa est, & artem mancā facit. Sit autem ti-

bi alter apparatus simpliciter ad peregrinationes instructus,

Cad manus promptus. Expeditissimus autē per methodi ratio-

nem. Neq; enim fieri potest vt medicus omnia percurrat. Fir-

ma item memoria teneto medicamēta, & simplices faculta-

tes, & descriptas, si modo tales extant. Sint & in memoria ti-

bi morborum curationes, & harum modi, quorupliciter &

quomodo in singulis se habent. Hoc enim principium est in

Medicina, & medium, & finis. Præparata quoq; tibi sint ma-

lagmatum genera ad singulos vsus. Potiones quæ incidere

possunt, ex descriptione præparata iuxta genera. In prōptu

sint & quæ ad medicationē pertinent ad purgationes, sum-

pta de locis congruis, & parata eo quo conuenit modo, iuxta

genera, & magnitudines, ad vetustatem ferendam curata.

Recentia verò iuxta temporis occasionē: & alia iuxta ratio-

nem. His autem tibi præparatis hoc commodi erit, vt vbi ad

*Medicina
iuxta partes
ue.*

*Medico
quid obiectu
uandum.*

*Quæ potiss
simū curet.
Instrumenta
ta medico
in promptu
esse debent.*

*op. m. inf.
71. 14. 15.
Potiones in
prōptu ha
benda.*

*qm 2 ac
cōtēnt lo*

*o. 7. 11. 12.
et 14. 15.*

*71. sed qd ad
71. 14. 15. 16.*

quas

HIPP. DE DECENTI ORNATV.

Quid præcogitandū. ægrotum introieris, animo incertus non sis, quū appositè ha-
D
beas singula ad id quod faciendū est. Antea verò hoc cogni-
tum habeas quod facere oportet, quàm ad ægrum ingredia-
ris. Pleraq; enim neq; ratiocinatione, sed auxilio rerū opus
habent. Itaq; euentum ex experientia prius discernere oportet.

Quæ præstare debet at medicus. Est enim hoc gloriosum, & facile cognosci potest. In in-
gressu verò meminisse conuenit & selsionis, & habitus sub-
missi, amictus cōpositi, autoritatis, breuiloquentiæ, vt nihil
cum perturbatione facias, assēssus, diligentia, respōsionis ad
ea quæ occurrunt, & ad tumultus fientēs compescendos con-
stantia apud teipsum, increpationis ad turbas castigandas,
promptitudinis ad ministeria. Et ad hæc memor sis primi ap-
paratus. Sin minus, reliqua citra errorem fiant, quæ ad prom-
ptitudinem parandam præcipiuntur. Ingressu vtere frequen-
ter, visita diligentius, his quæ à deceptis per errorem fiunt
occurrens, vt mutantur. Facilius enim cognosces, simulq; ex-
peditiō eris. Instabilia enim sunt quæ in humidis consistunt.

Medicus ægros crebro inuisere debeat. Quapropter etiā facile & à natura, & à fortuna transmutan-
tur. Neglecta enim ea quæ circa temporis occasionem admi-
nistrare oportebat, impetu suo progressa occupant ac peri-
munt. Non enim est quod opem ferat. Multa enim sunt quæ
simul mali aliquid faciunt. Nam quod singulatim iuxta con-
sequentia fit, magis opportunum & frequētius est. Obserua-
re autem oportet ægrotorum quoque peccata, per quæ multi
sæpe mentiti sunt in assumendis his quæ ingerēda exhiben-
tur, postquā exosas potiones non accipientes, aut pharmacis
F
datis, aut alia curatione adhibita, perempti sunt. Et factum
quidem hoc non ad ipsorum confessiōem vertitur, verū
Medico culpa imputatur. Considerare verò oportet etiā de-
cubitus, quosdā ex ipsis iuxta anni tempus, quosdā iuxta ge-
nera. Quidam enim in altis sedibus, quidam in subterraneis
ac tenebrosis decumbūt. Strepitus quoq; & odores, maximè
vini, deterior enim hic est: fugere ac transmutare oportet. Et
omnia hæc facere placidè, expeditè, cum ministerio, ita vt
pleraq; ægroto occultes, & hikari ac sereno vultu ipsum con-
soleris: quo à suis illum cupiditatibus auertas, simul cum
amarulentia & contraria instantia increpando, simulq; cum
commonefactione ac dexteritate suscipiēdo ac consolando,
non tamen vt quicquam futurorum aut præsentiū ipsis in-
dices.

*ideo malis
habitis*

Culpa ægrotantium medicis sæpe ascribi solet.

Habitatio- nes languen- tū pro ua- rietate mor- borū eligen- dæ sunt.

A dices. Pleriq; enim ob hanc causam, in vtranlibet partem cōpulsi sunt, propter relatum videlicet prædictionem præsensium aut futurorum. Sit autem ex discipulis aliquis præsens, qui instet vt præceptis non amarulente vtatur, & quod mandatum est, faciat. Deligito autem ex ipsis eos qui iam in arte progressum fecerūt, quò ea quæ utilia sunt addant, aut securè offerant, vt & in interuallis nihil te lateat. At verò impeditis nunquam quicquam procurandum committes. Sin minus, eius quod malè factum est, vituperium in te recidet, si non ambigùe res habeat, ex quibus id quod recta methodo tractatum est, procedet, & vituperationem tibi non afferet. Sed & quod factū fuerit, ad genus referetur. Proinde omnia hac prædicito in his quæ sūt, his quibus ea cognouisse propositum est. His igitur ita habentibus, ad bonam existimationem ac decentem ornatum, & in sapientia, & in medicina, & in alijs artibus: oportet medicum distinctis partibus, de quibus diximus, semper vtrisque amictum, ea conseruare ac custodire, & tradere ac facere. Quum enim apud omnes homines inelyta sint, conseruantur. Et qui per ipsa procedunt, celebres sunt à parentibus & liberis. Et si quidam ipsum non multa cognitione præditi sint, ab ipsis tamen rebus ad intelligentiam deueniunt.

Quales ministri aegrotis dandi sint.

HIPPOCRATIS

C COI PRAECEPTIONES,

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

Interprete.

*



Tempus est in quo occasio est, Occasio verò in qua tempus non multum. Medela tempore, aliquando etiam occasione contingit. Hæc sanè nosse oportet, & non ratiocinationi prius probabili intentum curam aggredi, sed exercitationi cum ratione. Ratiocinatio enim memoria quædam est, quæ componit ea quæ per sensum

Tempus quid. Occasio.

Ratiocinatio.



c 5

sunt percepta. Imaginatione enim cōcepta est euidenter. Sen- **D**
 sus autē perpeſſus iam delegator eſt eorū quæ ſubiacent ac
 obueniūt, ad ipſam cogitationē. Qui verō ſenſus ſæpe mala
 perpeſſus eſt, & ſuſcepit, quibus, quādo, qualiter, leſus ſit ob-
 ſeruans, & in ſeipſum reponēs recordatur. Collaudo quidem
 igitur etiā ratiocinationem, ſi quidem ex fortuita occaſione
 initium faciat, & delationem in morbū ex apparētibus per-
 ſequatur. Si enim ex his quæ palām perficiūtur, ratiocinatio
 initium fecerit, in mentis potentia eſſe cōperitur, ita vt ipſa
 ab alijs ſingula aſſumat. Proinde ſtatuendū eſt naturā à mul-
 tis ac omnigenis rebus moueri ac doceri, ita vt violētia quæ-
 dam ſubſit. Mens autē vbi ab ipſa accepit, velut dixi, poſtea
 ad veritatē perducit. Si verō non ex euidenti aggreſſione, ve- **E**
 rūm ex probabili rationis ſigmento, ſæpe grauē & mole-
 ſtam inuehit affectionem. Tales autem inuiam viam arripi-
 unt. Quid enim tandem erat mali, ſi mercedem auferrent hi
 qui medicinæ opera malē adminiſtrant? Nunc verō ægrotis
 qui extra culpā ſunt, nō ſufficiēs eſſe apparet violētia morbi,
 niſi Medici quoq; imperitia accedat. Et de his quidē hæc di-
 cta ſatis ſint. At his quæ ex ſola ratione perficiuntur, ſuū nō
 datur: verūm his quæ ex operis indicatione. Fallax enim eſt
 & ad errorem procliuiſ affirmatio, quæ ſit cum garrulitate.
 Quapropter in vniuerſum his quæ ſunt, inhærere oportet,
 & circa hæc vel maximē verſari, ſi quis facile ac minimē de-
 linquētem habitū, quē ſanē Medicinā appellamus, ſibi com-
 parare volet. Valde enim magnā vtilitatē afferet, tum egro- **P**
 tantibus, tum horū artiſtibus. Non tamē cunctādū eſt & ab
 idiotis inquirere, ſi quid conferre viſum fuerit ad curationis
 occaſionē. Sic em̄ arbitror vniuerſam artē cōmonſtratā eſſe,
 eo quod ex vnoquoq; ſine obſeruatio facta eſt, & cōſonantia
 in idem cōcurrerit. Attēdere igitur oportet fortuitę occaſio-
 ni, quæ plerunq; ſe offert, atq; hoc cum vtilitate ac leni pro-
 greſſione potius, quā cū promiſſione, & excuſatiōe ea quæ
 ſit cū actione. Vtilis eſt autē & varia prædeſtinatio eorū quæ
 egroto offerunt. Non enim aſſeuerare oportet, quod aliquid
 ſolū exhibitū proderit. Omnes em̄ affectiones, propter mul-
 tas caſuum circumſtantias ac mutationes, mora quadam diu-
 tiore adhærent. Et hoc ſanē admonitione opus habuerit, ad
 diligenter cōſiderationem faciendam. Si enim à mercede
 incep

Qua uia me
 dico proce-
 dendum ſit.

medicina

quidam

84.4 Medicus

rudes etiam
 ſciſcitari de-
 bet.

Quid potius
 ſimū obſer-
 uandum.

Merces cō-

- A** inceperis: cōducit enim hoc vniuerso negotio: ægroto qui- *stituenda me*
dem huiusmodi cogitationē inducis, q̄ videlicet nō ipso re- *dico.*
lieto abibis. Si verò non pacisceris, q̄ ipsum negliges, & de
quibusdam in rem præsentem nō admonebis. Curare igitur
oportet de cōstituenda mercede. Inutilē enim esse putamus
eiusmodi ægroti ipsius cogitationē, multò aut̄ magis in mor-
bo acuto. Morbi autem celeritas tēporis occasionē non præ-
bens ad reuersionem, non impellit bonum Medicū ad quæ-
rendū suā cōmoditatem, sed vt magis existimationis suæ ra-
tionem habeat. Itaq; tunc melius est vt seruat̄ exprobrēt,
quàm vt letaliter affectos præcōrurhet. Quāquā aliqui ægro-
ti id expetunt, hospitij ius, & faciem mali depulsionē produ-
B centes, digni quidē qui negligantur, nō tamen qui affligan-
tur. Quapropter his te meritò opponēs, cū bolidis iactu in
maris turbati fluctibus iter faciētibus. Qui enim bonus Me-
dicus est, is per Iouē fide magis quā duricia medetur. Quare
in principio totā affectionē indagare oportet, & quādā sug-
gerere conducentia ad curationem, curarēq; ægroto, & non
negligere. At verò remunerationis exigendæ acerbiter, ab-
sque præparatē ad disciplinā cupiditate, hortor vt ne val-
de inducas, sed & ad opulentiā & facultates respicias. Quan- *Gratis nō*
doque verò etiā gratis cures, ita vt gratitudinis memoriā po- *nunquā cum*
torem, quā præsenti existimationē auferas. Si verò occasio *randum.*
ferendæ opis se obtulerit, & peregrino, & egeno, maximē ta-
libus opituleris. Si enim affuerit erga homines amor, adest
C etiam amor erga artem. Quidā enim ægrotantes vbi perce-
perunt affectionem circa se nō esse in tuto, per Medici pro-
bitatem ac mansuetudinem gloriantur sanitati restitutos se
esse. Laudabile est autem, ægrorum quidē curam gerere, gra-
tia sanitatis: sanorum verò curam suscipere, ea gratia vt sine
morbis degant. Sed & sanorum cura habenda est, gratia bo-
ni ac decori ornatus. Qui igitur in profundo ignorantia ar-
tis versantur, prædicta minimē perceperint. Nā hi quum sint
non initiati, miserabilesq; ac subito exaltati: fortunæ tamen
indigi, à diuitibus quibusdam, ex angustijs remissionem ac- *Quid ma-*
quirūt, semp̄que ob opera gloriātes, & in deterius dilaben- *lus medicus*
tes deliciātur, artis sinceritatē negligētes, ob quā bonus Me- *agat.*
dicus, qui ab artis cōiunctiōe socius artis appellatur, in vigo-
re esse possit. Hic aut̄ medelas citra delictū facili perficiens,
nihil

*Languen-
tis cupidi-
tas.*

*Medici plu-
res cur con-
uocandi.*

*Vi bene spe-
ret hortan-
dus agro-
tus.*

nihil horum transilierit, non præ facultatis inopia. Non enim infidus est velut in iniustitia. Nam ad curationē hi non accedunt, vbi affectionem perniciosam esse vident, vitantes aliorum medicorum superinductionem, laudantes ægrotos propter prauī auxiliij odium. At ægotantes afflictī natant in vtraque improbitate, eo quod potiori in arte curationi seipsos non commiserunt ad finem vsque. Remissio enim morbi alicuius magnum ægroto refugium præbet. Quapropter sanam affectionem cupientes, eundem vsum semper admittere nō volunt, medici varietati se assimilantes. Sumptuum equidem opulentia ægroti carent, morum improbitate adorantes, & ingrati fientes. Quum autem consequi possunt vt ditentur, de mercede asseueranter affirmant, sani esse volentes, quæstum nimirum ex vsura, aut agricultura affore producentes, & postea de ipsis quæstum facere negligentes. Et de huiusmodi quidem declaratione hæc sufficiant. Remissio enim & intensio ægotantis, medicam administrationem requirunt. Nec verò indecore se ille geret medicus, qui in rei præsentis angustia circa ægrum aliquem, & imperitia tenebras offundēte, alios quoque accersere iusserit, quo ex communi consideratione, res circa ægrum inquirantur ac cognoscantur, & illi cooperatores fiant ad auxiliij ferendi facultatem. Nam in afflictionis assiduitate, angelcente affectione, ob consilij inopiam, plurima ad rem præsentem effugiunt. In eiusmodi igitur temporis occasione confidendum est. Nunquàm enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa iudicat. Et de hoc nunquam contendere oportet affirmando, ac mutuis inter se cōuicijs decertando. Hoc enim iureiurando affirmare possim, quòd Medici ratiocinatio nunquam alteri inuidere poterit. Imbecillis enim hoc modo apparuerit. Sed hæc magis expeditè faciunt hi qui circa forensia negotia ac quæstus versantur. Quamquam neque falsò hoc cognitum fertur, quòd in omni copia, inopia inest. At verò cū his omnibus magnum signum substantiæ artis apparuerit, si quis rectè medicans, ab eiusmodi compellatione non destiterit, iubens ægrotos mente non turbari, in eo quòd ad salutis tempus peruenire gestiunt. Hoc enim non inutile esse ducimus, & hoc sanè præcipiens non peccabit. Ipsi enim ægroti propter dolorificam affectionē desperantes, seipsos vita exuunt.

Qui verò

A Qui verò agrū sibi cōmissum habet, si artis inuenta demonstrauerit, cōseruans non mutans naturā, præsentiē auferet remunerationem, aut cōtrā, fidem suam statim amittet. Hominis enim bonus habitus natura quædam est, quæ motū non alienum ex natura acquisiuit, sed valde cōgrua est, & spiritu, & calore, & humorū concoctione vndiquaq; , & vniuersā vitæ ratione, & alijs omnibus cōposita ac cōstructa : si nō aliquis ex natiuitate, aut ab initio defectus fuerit. Si verò etiā quis fuerit, is si exilis est, conandū est vt subiectæ naturæ assimiletur. præter naturā enim est id quod imminutū est, etiā per tempus. Porro fugienda est & frictio per lintea sudaria, propter parandā medendi autoritatem. Itemq; odor curiosè

infixa natura quædam est.

Frictio.

B ascitus. Propter multā enim peregrinitatem, in calumniā incidēs: propter modicā verò, decentem ornatū consequeris. In parte enim dolor modicus: in toto, multus. Gratiitudinem autem qua hominibus cōplaceas, non tollo. Digna enim est medico præsidio. At verò appositionis per instrumēta, & indicationis eorum quæ significant, & eiusmodi rerū memoriā adesse oportet. Si verò etiam vulgi gratia velis dissertationē ad audiendum te facere, non valde gloriōsè id captes: nō tamen cum testimonio ac ostentatione poëtica. Impotentiam enim industrij laboris ostēdit. Auerfor enim ad alium vsum transferri industriā cum labore partam, quæ propterea in se ipsa sola gratiosæ sectæ electionem habet. Cōsequeris enim instar fuci promptam cum comitatus deductione elationem.

C Optanda est & eiusmodi dispositio quæ aliena sit ab eo quod quis grandis iam natu discat. Hoc enim præsentiū quidē nihil perficit, absentium verò tolerabilis memoria existit. Fit itaq; omnia tentans infortunium, cum recēti perniciē, quæ negligit decorum, & in præfinitis terminis, & in professione, & in maximis iuramētis deorum gratia factis: dum Medicus præest morbo, cū assidua lectione, instructioneq; imperitorum fugitiuorū, ita vt sermones trāslatiuos imitetur, qui etiā antea quā in morbo incertus animo esset, collecti fuerunt. Taliū igitur vbi etiā præfectus essem, nō sanè in collectitia curatione id facerē. Verū cōfidenter auxilium peterem. Cognitionis enim decoræ scientia in his dispersa est. Quū igitur hi necessariò sint inscij ac imprudentes, hortor eos vt cōmodam habeāt exercitationē, post dogmatū cognitionis

HIPPOCRATIS LIBER

tionis penuriā. Quis enim multifidam dogmatū sectionē se
verē cognoscere posse sperarit, citra exercitationis constan-
tiam? Quapropter hoc admoneo, vt dicentibus quidē atten-
dant, facientibus autem incumbant, & contractam victus ra-
tionem non diu præscribant. Aegrotantis enim diuturnam
concupiscentiam erigit indulgentia quoque, in morbo diu-
turno. Si quis cæco animum aduertat, velut res magni timo-
ris cauendus est, & gratia desperanda, per quam vuitas con-
stat. Aeris repētina turbatio vitanda est. Vigor ætatis omnia
habet gratiosa, Decrepita verò ætas, vice versa. Obscuritas lin-
guæ non satis claræ fit, aut propter affectionem, aut propter
Lingua ob aures, ita vt priusquam priora enunciarit, alia adijciat: aut
securitas un- priusquam id quod mente concepit dicat, alia insuper cogi-
det. & quæ quidem citra affectionem visibilem appellatam,
contingit linguæ obscuritas, his maximè qui artium studio
tenentur, accidit. Aetati etiam quum paruum est aliquando
subiectum, valde magna vis inest. In morbo tranquillitas,
longitudinem significat. Iudicatio verò est morbi exolutio.
Parua causa medelis exoluitur, nisi quid circa locum princi-
palem affectum fuerit. Quandoquidem affectio per consen-
sum à tristitia inducta vexat, quidam sanè ex alterius consen-
su vexantur. Vociferatio affligit. Fortis laboris studium sub-
terfugiendū est. Maritimus locus ad sanitatē commodus est.

*Vigor æta-
tis.*

*Lingua ob
securitas un-
de.*

ægris quid

*Quæ uexat
ægrorum.*

*Loco ad sa-
nitatem
modum
x alia natura
habet, ubi in
suis salubris est*

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE NATURA HO-

MINIS, IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO IN-

terprete.



VICVNQVE de natura humana amplius
differentes audire consuevit, quàm eius ad
medicinam pertinet, huic non est com-
modum hunc meum sermonem audire.
Neque enim omnino ex toto aërem dico
hominem esse, neq; ignem, neque aquam,
neque terram, neque quicquam aliud, quia non manife-
stum

- A**stum est vnum in homine esse: sed volentibus tamen hæc *Sententiæ*
dicere permitto. At verò talia dicentes, mihi non rectè rem *uariæ de ho-*
cognoscere videntur. Sententiam enim eandem omnes in- *minis natu-*
eunt, verùm non eadem dicunt, sententiæ tamen epilogum *ra.*
eundem faciunt. Aiunt tamen vnum quid esse, quodcunque
tandem est, & id ipsum esse vnum ac totum, iuxta nomina
autem non consentiunt. Est enim alius ex ipsis aërem esse,
hoc vnum ac totū dicit, alius ignē, alius aquam, alius terrā,
& addit vnusquisq; ad sermonem suum testimonia ac signa
quæ nullius momenti existunt. Quia enim eadem sententia
omnes vtuntur, dicunt autem nō eadem, manifestum facit
quòd neq; cognoscunt ipsa: quod ex eo vel maximè quis co-
Bgnouerit, qui ipsorum disceptationibus interfuerit. Nā cūm
ijdem viri inter se disceptant, ijdem auditoribus præsen-
tibus, nunquam ter consequēter idem homo vincit in eodem
sermone, sed modò hic, modò alius supērat, cuicunque fuerit
lingua maximè fluida ac populo grata. Atqui iustū erat, vt is
qui de rebus se rectè cognoscere pronunciaret, semper sermo-
nem suum victorē statueret, si quidem vera cognosceret, ac
rectè sentiret ac iudicaret. Verū huiusmodi homines vident
mihi seipso oppugnare in verbis sermonū suorū, præ stulti-
tia, & Melissi sermonē approbare. De his igitur sufficiūt mi-
hi quæ retuli. At verò ex medicis quidam dicunt, q̃ homo
sanguis solū est, alij ex ipsis bilē aiunt hominē esse, aliqui
pituitam, epilogum autem & ipsi omnes eundem faciunt.
- C**Vnum enim quid esse dicunt, quodcunq; cuiq; ipsoꝝ nomi-
nare visum est, & id ipsum vnum existens, speciem ac vim
transmutare, coactum à calido ac frigido, fieriq; & dulce, &
amarum & album, & nigrū, & omnigenū quid aliud. Mihi
verò neq; hæc sic se habere vident. Plurimi quidē igitur ta-
lia quædā, & amplius his proxima pronunciant. Ego autem
dico, si vnū esset homo, nunquā sanè doleret. Neq; enim es-
set vnde doleret vnum existens. Si verò etiā doleret, necesse
esset & quòd mederetur ac sanaret vnū esse. Nunc verò plu-
ra sunt. Multa enim sunt in corpore existentia, quæ quum
mutuò præter naturam calfiunt & frigesunt, siccanturq; &
humectātur, morbos pariunt. Quare multæ quidem species
morborum sunt, multaq; etiam medela ipsoꝝ existit. Atq;
ego sanè censeo eum qui hominē sanguinē solū esse dicit,
& nihil

*Melissus.
Medicorū
opinio.*

*Si re una
homo cōsta-
ret, non lan-
gueret.
Morborū
causa.*

& nihil aliud, demonstrare debere, ipsum non transmutare **D**
speciem, neque omnigenum fieri, vel saltem horam aliquam
anni, aut hominis ætatē, in qua sanguis solus in homine in-
esse appareat. Verisimile est enim vnum aliquod esse tem-
pus, in quo appareat ipsum in seipso vnum existens. Eadem
censeo etiam de eo qui pituitam solam esse dicit, & qui bil-
lem. Ego enim demonstrabo ea quæ hominem esse dixerō,
& iuxta receptum morem, & iuxta naturam, quod semper eā
ipsa similia sūt, & in iuvene, & in sene, & tempore frigido
æquē ac calido. Exhibebo insuper signa, & necessitates osten-
dam, per quas vnumquodque augetur ac minuitur in cor-
pore. Primum quidem igitur, necesse est generationem fieri
non ab vno, Quomodo enim vnum existens, aliud quid ge- **E**
nerarit, si non alicui misceatur? Deinde neque generarint, si
non eiusdem generis existentia misceantur, & quæ eandem
vim habeant, neque sanē nobis similia perficerentur. Et rur-
sus, Si non calidum ac frigidum, & siccum ac humidum, mo-
deratē ac æqualiter inter se haberent, sed alterum alterum
multum præcelleret, & fortius debiliore præstaret, genera-
tio fieri non posset. Proinde quomodo verisimile est, ab vno
quid generari, quum neque à pluribus generetur, nisi habue-
rint temperamentum inter se probē conueniens? Necesse
itaque est tali existente natura, cum aliorum omnium, tum
humana, non vnum esse hominem, sed singula quæ ad gene-
rationem eius conferunt, vim quandam in corpore habere,
eam videlicet, quam contribuerunt. Et rursus necesse est se- **F**
cedere singula in suam ipsorum naturam, homine moriente
humidum nimirū ad humidum, siccum ad siccum, calidum
ad calidum, frigidum ad frigidum. Talis autē & animalium
est natura, & aliorum omnium, generanturque similiter om-
nia, & occidunt similiter omnia. Cōstat enim natura ipso-
rum ex his prædictis omnibus, & desinit iuxta prædicta, in
id vnumquodque vnde est compactum secedens. At verò cor-
pus hominis habet in seipso sanguinem, & pituitam, & bilē
duplicem, flauam videlicet & nigram. atque hæc sunt ipsi cor-
poris natura, & per hæc & ægrotat, & sanus est. Sanus equidē
maximē est, vbi temperamentum hæc inter se habuerint
moderatum, tum facultate, tum copia, & vbi maximē fuerint
permixta. Ægrotat autem cum horum quid minus aut am-
plius

Qui omnia
gignantur.

33. 135. Quæ i cor-
pore sunt.

135. 135. Languoris
causa.

14. 135. Sanus quis

80. 135. Ægrotus

187. 135. Ægrotus

193. 135. Ægrotus

A plius fuerit, aut separatur in corpore, & non fuerit reliquis omnibus contemperatum. Necesse est enim quum quid horum secretum fuerit, & per se steterit, nō solum eum locum vnde secessit, morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat, & in quē propter nimiam copiam diffusum est, dolore ac morbo vexari. Etenim quum quid horum extra corpus effluerit amplius quā redundat, euacuatio ipsa dolorē exhibet. Rursus itaque si idem intus fecerit euacuationem, & transi-
tionem, & ab alijs secretionē, geminatum dolorē exhibere necesse est, velut dictum est, nempe & vnde secessit, & vbi receptum redundat. Dixi porrō, quācūq; hominem esse dixero, semper demonstraturum me esse, quod talia sint & iuxta receptum morem ac opinionē, & iuxta naturā. Et dico sanē esse sanguinem, & pituitam, & bilem flauam ac nigram: & horum primū quidem iuxta receptam opinionem nomina distincta esse dico, & nulli ipsorū idem nomen esse. deinde species iuxta natura separatas esse, & neq; pituitam similem esse sanguini, neq; sanguinem bili, neq; bilem pituitæ. Quo enim modo hæc inter se similia sint, quorū neque colores similes videntibus apparent, neque ad manuum tactū similitudo aliqua esse deprehēditur? Neque enim similiter calida sunt, neque frigida, neque sicca, neque humida. Quum itaque intantum inter se discrepent, tum specie, tum facultate, necesse est ipsa non vnū esse, quandoquidem neque ignis & aqua idem sunt. Quod autem hæc omnia non vnum sunt,
C sed vnumquodque ipsorum vim & naturam suam habet, vel hinc cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamentum dederis, quod pituitam ducit, pituitam tibi vomet, & si pharmacum dederis bilem ducēs, bilem tibi vomet, Eadem ratione & bilem atram purgabit, si medicamentum exhibueris quoddam bilem atram ducit. Quoddam si ipsi partem aliquā sauciariis, vt vulnus fiat, effluet ipsi sanguis, atque hæc omnia faciet tibi totam diem ac noctem, & hyeme & æstate, donec spiritum in sese trahere potens fuerit, potens autem erit donec aliquo horum congenitorum fuerit priuatus. Congenita autem sunt prædicta. Quomodo enim non congenita essent? Primum etenim manifestum est hominem in seipso hæc omnia semper habere, donec vixerit. Deinde nata sunt ex homine hæc omnia habente. Postea nutrita sunt in ho-

mine hæc omnia habente, quæ videlicet ego nunc dico ac demonstrō. Qui verò dicunt, quòd vnum est homo, videntur mihi hoc consilio vti esse. Nimirum quum viderint eos qui medicamenta hauserunt in superpurgationibus interiisse, alios quidem bilem vomentes, alios pituitam, vnumquodq; horum hominem esse putauerunt, quod vidissent his purgatum interiisse. Et qui sanguinem dicunt hominem esse, eodē consilio vtuntur. Nam quum vident iugulatos homines, & sanguinem ex corpore ipsorum effluentem, hunc ipsum animam in homine esse putant. atque his testimonijs sanè omnes vtuntur in sermonibus suis. Atqui primū quidem in superpurgationibus, nemo vnquam mortuus est bile sola purgatus. Verū quum quis pharmacum biberit, quòd bilē deducit, primū bilem vomet, deinde pituitā, postea per vim etiam atram bilem, postremū moribundus etiam sanguinem purum vomet. Eadem perpetiuntur à medicamentis pituitam ducentibus. Primū enim pituitam vomēt, deinde bilem flauam, postea atram, morientes autem sanguinem purum, & in hoc mox vitam finiunt. Etenim pharmacum vbi corpus intrauerit, primum quidem ducit id quod ex omnibus in corpore existentibus, sibi maximè secundum naturam familiare fuerit, deinde verò etiā alia trahit ac purgat. Quemadmodum ex terra nascentiā & in ipsam plantata ac feminata, vbi in terram peruenerint, vnumquodque trahit id quod naturæ suæ familiare in terra existit. Inest autem in terra & acidum, & amarum, & dulce, & salsum, & omnigenum. Primū itaque plurimum eius trahit in seipsum, quod sibi ipsi iuxta naturam maximè familiare fuerit, deinde trahit etiam reliqua. Huiusmodi sanè quiddam etiam pharmaca in corpore faciunt. Quæcunque enim bilem ducunt, primum meracissimam bilem purgant, postea verò mixtam. Et rursus pituitæ pharmaca, primum meracissimam pituitam ducunt, postea mixtam. Et iugulatis primū quidem sanguis calidissimus & ruberrimus profluit, deinde pituitosior ac biliosior. Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc enim hyemi maximè secundum naturam conuenit ex omnibus in corpore existentibus. Frigidissima enim existit. Si erga autem quòd pituita frigidissima est, hæc sunt. Si enim pituitam & bilem & sanguinem contingere libuerit, pituitam

*Pharmacū
quid agat.*

*Pituita cur
hyeme ui-
geat.*

Atram sanè frigidissimam esse comperies, quanvis viscosissima sit, & per vim maximè post bilem atram trahatur. quæ verò per vim trahuntur, calidiora fiunt, à violentia coacta, sed tamen suprâ hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quòd autem hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quòd homines pituitosissima & spuunt & emungūt hyeme, & tumores laxi albissimi sūt maximè hoc tempore, itemque reliqui morbi pituitosi. Cæterùm vere pituita quidem adhuc fortis in corpore manet, sed sanguis augefcit. Nam & frigora remittunt, & imbres superveniunt. Sanguis autem iuxta hæc augefcit, ab imbris videlicet & calidorum dierum tempore. Hæc enim anni pars maximè iuxta naturam ipsi convenit, ut quæ calida

B & humida existat. Signa autem hinc colligere licet. Quòd homines Vere & æstate maximè dysenterijs corripuntur, & sanguis ex naribus ipsis fluit, & calidissimi ac ruberrimi. At verò æstate sanguis adhuc viger, & bilis in corpore elevari, & usque in autumnum porrigitur. In autumnò verò sanguis modicus fit, contrarium enim eius naturæ id tempus existit. Bilis autem per æstatem ac autumnum corpus possidet, id quòd inde cognoscere potes: quòd homines sua sponte hoc tempore bilem vomunt, & in medicamentorum portionibus biliosiora purgantur. Manifestum fit & febris, & hominum caloribus. Pituita autem æstate debilior seipsa est. Contrarium est enim naturæ eius id tempus, calidum enim est & siccum. Sanguis verò autumnò paucissimus fit in homine, Siccus enim est autumnus, & hominem iam frigefacere incipit. Atra porrò bilis autumnò & plurima & fortissima est. Postquam autem hyems apprehenderit, bilis flava perfrigerata modica fit, & pituita rursus augetur, tum ob pluviarum copiam, tum propter longitudinem noctium. Corpus quidem igitur humanum hæc omnia semper habet, verum pro temporis circumstantia, aliquando plura seipsis fiunt, aliquando pauciora, singula tum iuxta partem ac copiam, tum iuxta naturam. Quemadmodum enim annus omnis omnium particeps est, & caliditatum & frigiditatum, & siccitatum ac humiditatum. Neque enim quicquam horum ne minimo quidem tempore consisteret ac duraret, citra omnia ea quæ in hoc mūdo insunt, verum si unū aliquod deficeret,

Qui humores per singula tempora uigant.

Sanguis

Bilis corpori dominatur.

atra bilis

HIPPOCRATIS LIBER

omnia sanè abolerentur : ex eadem enim necessitate omnia **D**
 consistunt & mutuò aluntur. Sic etiam si quid ex homine de-
 ficeret ex his quæ ipsi congenita sunt, non sanè viuere posset
 homo. In anno autem aliquando quidem hyems maximè vi-
 get, aliquando ver, modò æstas, modo autumnus, Sic etiam in
 homine, aliquândo pituita præualet, aliquândo sanguis, aliquân-
 do bilis primū quidem flaua, deinde etiam nigra appellata.
 quorum omniū euidentissimum testimonium hinc habes. Si
 enim eidem homini idem pharmacum quater in anno dare
 velis, vomer tibi hyeme quidē pituitosissima, Vere autē hu-
 midissima, æstate biliosissima, autumno nigerrima. Itaque
 quum hæc sic se habeant, quicumque morbi hyeme augescūt,
 æstate desinere solent, quicūque verò æstate augescunt, hye- **E**
 me finire consueuerunt, nisi certo dierum circuitu discedant.
 de circuitu autem rursus dicam. Quicūque autem morbi Ve-
 re fiunt, ad autumnū eorum discessum fore expectare opor-
 tet, Quicumque postremū autūnales morbi sunt, eorū disces-
 sum necesse est Vere fieri. Quicumque verò morbus hæc tē-
 pora trāsgressus fuerit, eum annuum fore scire oportet. Por-
 rō Medicum sic aduersus morbos instare oportet, prout vnū-
 quodque horum in corpore præualet, iuxta tempus sibi ipsi
 maximè natura conueniens existens.

*Medicus
 hæc omnia
 cōsiderato.*

*Addititia sunt hæc, non genuina Hippocratis, ut ait
 Galenus.*

Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, quòd quoscunque **F**
 morbos repletio parat, euacuatio sanat : & quicumq; ex eua-
 cuatione fiunt morbi, repletio sanat. quicūque verò à labore
 fiunt, quies sanat. qui autē ab ocio gignuntur, labor sanat. In
 summa, Medicum scire oportet, opponere se contrarium in-
 stantibus & morbis, & naturis, & tēporibus, & ætatibus, & di-
 stendētia soluere, & soluta distendere, Sic enim vel maximè
 morbum sedauerit, & mihi sanè hoc ipsum sanatio esse vide-
 tur, Morbi partim ex diætis, partim ex spiritu, quem adtra-
 hentes viuimus, fiunt. Vtrorūque cognitionem sic facere
 oportet. Quādo ab vno morbo multi homines corripiuntur
 eodem tempore, causam ad id quod communissimum est, &
 quo maximè omnes vtimur, referre oportet. Est autem hoc
 spiritus & aër quem inspirando trahimus. Manifestum est
 enim

*Observatio-
 nes morbo-
 rum.
 Morbi un-
 de oriantur.*

- A** enim iam, quod diæta vniuscuiusque nostrum, caussa nō est, quum morbus omnes consequenter contingat, & iuniores, & seniores, mulierēsque ac viros, & tam vinolētos quā aqua potores, & tam miazā edentes, quā panē vescētēs, & tam multum laborātēs, quā parum. nequaquā igitur diæta caussa fuerit, quum homines diuersa victus ratione vtētes ab eodem morbo corripuntur. Quum verò omnis generis morbi sunt eodem tēpore, palā est victus singulos singulis causas esse, & curam sanē facere oportet ex contrario instando aduersus morbi causam, quemadmodum & alibi à me relatū est, & victus rationem permutare. Conspicuum est enim diætā qua homo vti consuevit, non esse ipsi comodā, aut
- B** in totum, aut magna ex parte, aut vnum saltem quoddam ex ipsa: quod vbi cognoueris transmutare oportet, habitūque consideratione naturæ hominis, & ætatis, & speciei, horæque anni & modi ipsius morbi, curationem facere, aliquando detrahendo, aliquando apponendo, & quemadmodum iamdudum à me dictum est, ad singulas ætates, & horas, & species, ac morbos respiciendo, tum in exhibendis pharmacis, tum in constituenda diæta. At verò quum vnius morbi popularis grassatio consistit, manifestum est diætā non esse culpabilē, sed quē trahimus spiritū in causā esse: palamque est insuper eum ipsum spiritum siue aërem morbosā aliquā exhalationem habere. Eo itaque tempore homines in hunc modum commonefacere oportet, Nimirum vt diætā non permutent, quia morbi causā non existunt, verū vt videant quo corpus habeant quā minimæ molis ac debilissimum: detrahendi insuper sunt cibi ac potus quibus vti consueuerunt, idque paulatim facere oportet: Nam si quis citò diætā permutet, periculum est etiam à permutatione aliquid in corpore nouatum iri. Quapropter victu solito quidem vtendum est, vbi hominem nihil lādere videtur. prouidendum verò vt quā paucissimus aëris influxus in corpus ingrediatur, & vt ille ipse quā peregrinissimus existat. Regionum etiam locos in quibus morbus consistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minimè multò ac denso spiritu homines opus habuerint. Porro quicumque morbi à fortissima corporis parte sunt, grauissimi existunt. Etenim si isthic vbi initium sum-

*Medela
morbi pas-
sim uigena-
tis.*

pferint,permanferint, necesse est fortiffima parte laborante, totum corpus laborare. Et fi à validiffima ad quãdam debiliorem tranfierint, difficulter foluuntur. Quicunque à debilioribus partibus ad fortiores tranfierint, commodius folui poffunt. Nam influentia à vi ipfarum facilè confumuntur. Venæ craffiffimæ fic fe habent. Quatuor paria ipfarum funt in corpore, & vnum quidem à capite retrò per ceruicem, forinfecus ab vtraque fpinæ parte ad coxendices & in crura progreditur, deinde per furas & malleolos forinfecus ad pedes peruenit. Oportet igitur venæ fectiones, in doloribus dorfì ac coxendicum, de poplitibus facere & de malleolis forinfecus. Alterum par principium ex capite iuxta aures habet per ceruicem, & fphagitides appellantur, hoc eft iugulares. deferunturque vtrinque iuxta fpinam intrinfecus ad lumbos, in teftes ac femora, & per poplites ex interna parte, deinde per furas ad malleolos intrinfecus & in pedes. Quapropter in doloribus lumborum ac teftium, venæ fectionem de poplitibus ac malleolis facere intrinfecus. Tertium par venarum ex temporibus per ceruicem fub fcapulas tendit, & ad pulmonem defertur, altera quidem à dextris ad finiftram partem, altera verò à finiftris ad dextram, & dextra quidem fub mammam abit & in fplenem, & in rhenem, finiftra verò in dextram partem tendit à pulmone fub mammam & in hepar, & in rhenem. Vtraque autem in rectum inteftinum ac podicem definit. Quartum par à prior capitis parte & oculis, fub ceruicem ad clauiculas deuenit, deinde fuper brachia fupernè in flexuras, poftèa per cubitos in manuum iuncturas ac digitos. deinde à digitis rurfus, per cubitos ac manus fupernè in flexuras, & per brachiorum infernam partem ad alas, vnde fupernè à lateribus altera in lienem peruenit, altera in iecur, poftèa fuprà ventrem vtraque in pudendum definit. Et craffiffimæ quidem venæ fic fe habent. Sunt autem & ex ventriculo venæ per corpus multæ & omnigene, per quas corpori alimentum accedit. ferunt autem à craffis venis, in ventriculum ac reliquum corpus, & ab externis & ab internis, & inter fe mutuo diftribuunt internæ extrinfecis, ac viciffim extrinfecæ internis. Venæ igitur fectiones iuxta prædictum fermonem facere oportet. Enitendum eft autem vt fectiones quàm

De uenarum natura.

Quatuor paria uenarum.

Mifio fan guinis.

Venarum digestio.

- A** quàm longissimè à locis faciamus, vbi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic enim mutatio minimè magnā de repente fiet, & consuetudinem remouebit, vt non amplius in eundem locum colligatur. Quicumq; pus multum spuunt, citra febrem, & quibuscunq; in vrina pus multum subidit, citra dolorem, & quibuscunq; alui recrementa cruenta, velut in dysenterijs, & tardè ac diutinè prodeuntia, velut in iuuenibus quinque & triginta annorum, atque etiam senioribus, his omnibus ex eadem causa morbi fiunt. Necesse est enim hos labori deditos, ac exercitationis studiosos, & corpore operarios in iuuentute fuisse, postea verò reiectis laboribus, molli carne & multum à priore differente carnosos redditos esse, & corpus multū discrepans habere, vt id quod prius extitit cum eo quod nunc adepti sunt, nulla parte consentiat. **B** Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic dispositos, euestigio quidē effugiūt, postea autē à morbo progressu tēporis corpus colliquescit, & serosi ac saniosi humoris species per venas, qua parte maxime ampla fuerint, fluit. Siquidem igitur in interiorem ventriculum procefferit, ferè qualis in corpore inest, tale etiam recrementum prodit. Quum enim decliuis sit via, non multo tempore hæret in intestino. Quibuscunq; autem in pectus influxerit, suppurati sūnt. Nimirum purgatione accliuui existente, & multo tempore in pectore immorans putrescit, & purulenta redditur. quibuscunq; verò eadem serosi humoris species in vesicam proruperit, à loci caliditate, calida & alba fit, & segregatur, & quod quidem rarissimum est, superstat, crassissimum verò infra mergitur, quod sanè pus appellatur. **C** Fiunt autem & calculi pueris, propter huius loci caliditatem itemq; totius corporis. Viris autem calculi non generantur, propter corporis frigiditatem. Nam id probè nosse oportet, quod homo primis diebus calidissimus est sui respectu, vltimis frigidissimus. Necesse est enim augescens, & ad vim procedens corpus calidum esse. Vbi autem inceperit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimum euadit. Et iuxta hanc rationem, quantò amplius primis diebus homo auge-
scit, tantò calidior existit, & quantò plus vltimis diebus marcescit, tantò frigidiores esse necesse est. Sani autem sūnt suæ sponte illi prædicto modo dispositi ac affecti, plurimi qui-

HIPPOCRATIS LIBER

dem ab hora qua liquefcere incipiunt, quinto & quadrage- **D**
fimo die. Qui verò hoc tempus transgreffi fuerint, anno fi-
nito fua fpon te conualefcunt, nifi quid aliud mali grauioris
hominem infeftet. Quicunq; morbi fenfim ex modici tem-
poris cauffa funt, & quorum cauffa cognitu faciles funt, fe-
curiffimi appellari poffunt. Curationem itaque ipforum in-
ftituere oportet, vt cauffa morbi nos opponamus. Sic enim
foluitur vtique id quod morbum in corpore fecit. Quibuf-
cunq; arenofa aut tofi in vrinis fubfident, his initio tuber-
cula circa craffam venam enata funt, & fuppurata. Poftea ve-
rò tuberculis non citò effractis, tofi ex pure coaliti funt, qui
per venam foras exprimuntur vnà cum vrina. Quibufcunq;
verò cruentæ vrinæ funt, his venæ laborant. Quibufcunq; **E**
autem in vrina craffa exiftente, caruncula parua capilli
formes fimul prodeunt, eas à rhenibus prodire noffe o-
portet, & ab artriticiis. Quibus verò pura vrina eft, & aliàs
atque aliàs velut furfures in vrina innatât, horum vefica fca-
biofa exiftit. Febres plurimæ à bile funt. Species ipfarum
quatuor funt, præter eas quæ ab occultis doloribus genera-
tur. Nomina ipfarum funt: Continens, Quotidiana. Tertia-
na, Quartana. Continens itaque appellata, à plurima ac me-
raciffima bile prouenit, & iudicationes quàm breuiffimo
tempore facit. Corpus enim nullo tempore perfrigeratum
citò colliquefcit, nimirum à multa caliditate calfactû. Quo-
tidiana verò poft continentem à plurima bile generatur, &
præ reliquis celerrimè difcedit, verùm longior eft continen **F**
te, quanto à pauciore bile prouenit, & propterea quòd re-
quiem habet in ipfa corpus, In continente verò non quiefcit
villo tempore. Tertianæ autem longior eft quàm quotidiana
& à pauciore bile gignitur. Quanto verò longiori tempore
in tertiana corpus quiefcit quàm in quotidiana, tanto diu-
turnior hæc febris eft quàm quotidiana. At verò quartanæ
reliquæ iuxta eandem rationem habent, fed tertianis diu-
turniores funt, quanto pauciore bilis parte participant, vn-
de caliditas augetur, & propterea quod corpus in ipsis plus
perfrige fcit, id quod ab atra bile ipsis contingit fupfluè
adeò vt agrè frigus depelli poffit. Atra enim bilis inter o-
mnes corporis humores vifcofiffima eft, & fedes diuturnif-
simas facit. Quod autem quartanæ febres atra bilis parti-
cipes

*Lotij diuer
fitas.*

*Quatuor fe
bris species*

*Quatuor p^o de
feb. diuer
cap. 5. de
antiqui
na effe
feb. g^o &
feb. m^o f^o*

*Qualis a-
tra bilis.*

A cipes sint, vel hinc condiscere licet. Autumno enim maximè *Quo tempo*
homines à quartanis corripuntur, & in ætate à quinque & *re & qua*
viginti annis, vsque ad quadragesimum quintum. Hæc au- *etate, quar*
tem ætas præ omnibus alijs maximè à bile atra infestatur *tana igitur*
& autumnus tempus omnium anni temporum ad eandem ap-
pulsissimum est. Quicumque autem extra hoc tempus & æta-
tem à quartana corripuntur, pro certo scire oportet eam fe-
brem non fore diuturnam, nisi quid aliud grauioris mali ho-
minem infestauerit.

B DE SALVBRI DI-
AETA LIBER IANO
CORNARIO MEDI-
CO PHYSICO IN-
TERPRETE.

Addititius est ad librum De natura hominis, Polibi,
Hippocratis discipuli, ait Galenus.

C



Diotas & priuatos homines hac dixta *Priuatoru*
vti oportet. Hyeme quidem comede- *homini ui-*
re quàm plurima, bibere autem quàm *ctus in hye*
parcissimè. Sit potus vinum quàm me- *me.*
racissimum: cibi, panis, & obsonia as-
sata omnia. Oleribus quàm paucissi-
mis hoc tempore vtendum est, Sic e-
nim corpus maximè siccum ac calidum
reddetur. Vbi verò ver apprehenderit, tunc sanè potum am- *In Ver.*
pliozem assumere oportet, vinum dilutius & paulatim: ci-
bis quoque mollioribus ac paucioribus tum vtendum est: &
ablato pane, mazam exhibere, & iuxta eandem rationem
obsonia detrahare, & ex assatis omnia cocta facere. Ole-
ribus verò paucis tunc vti oportet, donec ad ætatem per-

uerit ut in summum medicum
comprobatum hz. ita quoad mediam ætatem
ratio ne requirit, frigidiorē sicut et humidiorē
ut ad huiusmodi calidiorē et sicciorē sanguinem
ad ætatem

HIPPOCRATIS LIBER

ueniat homo, cibus mollioribus vtendo, & obsonijs coctis, & D
oleribus tam crudis quàm coctis, similiterq; potibus quàm
dilutissimis ac plurimis: ita tamen vt paulatim non de re-
pentè his vtatur, ne videlicet magna mutatio fiat. At verò
æstate maza molli nutriatur, & potu aquoso ac multo, ob-
sonijs omnibus coctis. Sic autem his vbi æstas fuerit, vti o-
porter, vt frigidum sit corpus & molle. Tempus enim cal-
lidum est & siccum, & facit corpora æstuosa & squallida.
Quapropter tali studio auxiliari oportet. Iuxta eandem ve-
rò rationem, quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere
ad æstatem deducendus est, cibo quidem detracto, potu ve-
ro aucto. Sic quoque contraria faciendo ex æstate ad hye-
mem perducatur.

In autumno.

In autumno verò rursus cibi plures exhibendi sunt & sicciores, & obsonia iuxta eandem rationem, E
potus verò pauciores & meraciores, quo etiam hyems bona

In hyeme.

fiat, & homo in ipsa vtatur potibus meracioribus ac paucis, cibis verò quàm plurimis ac siccissimis. Sic enim & maximè
sanus fuerit, & minimè frigore impetetur. Nam tempus hoc

*Carnosorum
natura.*

valde frigidum ac humidum existit. Porro habitibus corpo-
rum carnosus & mollibus ac rubris, plurimo anni tempore
siccioribus diætis vti conducit. Humida enim est ipso-
rum natura. Verùm duros & graciles, fuluosque ac nigros humi-
diore diætâ maiore temporis parte viciare oportet.

*Iuuenum
victus.*

Corpora enim talia sicca existunt. Sed & iuuenibus corporibus,
mollioribus & humidioribus diætis vti confert. Nam ætas
ipso-
rum sicca est, & corpora compacta sunt. Seniores autem F

*Senum
victus.*

siccioris victus modo, maiori temporis parte degere oportet.
Corpora enim in hac ætate humida sunt, & mollia ac frigi-
da. Oportet igitur & ad ætatem, & ad tempus anni, & ad
corporum species ac habitus, diætas constituere, ita vt con-
sistentibus & caloribus, & frigoribus nos opponamus, Sic
enim maximè sani fuerint. Quin & ambulandum hyeme

*alij legunt
aut no. per se
ambulandum*

Balneæ.

quidem velociter est, æstate autem leniter, nisi per solis æ-
stus iter faciendum sit. Oportet autem & carnosos citius
ambulare, graciles verò tardius. Balneis quoque multis æ-
state vtendum est, hyeme paucioribus, Gracilibus autem
magis expedit lauari, quàm carnosis. Vestes autem puras
induere hyeme oportet: oleo imbutas ac sordidas, æstate.

*Obesorum
victus.*

Cæterùm pingues, & qui graciles fieri volunt, omnes la-
bores

A bores ieiuni facere debent, & cibos assumere anhelantes adhuc ex fatigatione, & non refrigerati, præpoto vino diluto, & non valde frigido, & obsonia præparata assumere ex sesamis, aut condimentis hortensibus, & alijs huiusmodi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur, sic enim à quàm paucissimis impleri poterint. Sed & semel in die cibum sumere, & illotum manere, & stratum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum eius maxime fieri potest. Quicunque verò graciles sunt, & pingues fieri volunt, tum alia his quæ dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet. At verò vomitibus, & alui per infusa elotionibus hoc modo vtendum

*Gracilium.
& macilentorum uictus.*

B est. Sex menses hybernos vomendum est, Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa caput fiunt, & regionem eam quæ est suprâ septum transuersum. Quum verò æstas ac calor fuerit, infusis vtendum est. Hora enim hæc æstiuosa est, & corpus biliosius, & lumbi ac genua grauantur, & calores oboriuntur, & in ventre tormina fiunt. Quapropter corpus perfrigerare oportet, & quæ in sublime eleuantur, inferne subducere ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus ac humidioribus falsiora & tenuiora, pro siccis verò & gracilibus ac debilioribus, pinguiora ac crassiora. Crassa autem & pingua infusa sunt quæ ex lacte fiunt, & cicerum decoctum, & alia huiusmodi. Tenuia verò & falsa, sunt muria & aqua

C marina, & eiusmodi. At verò vomitus sic facere oportet. Quicunque homines crassi ac pingues sunt, & non graciles, ieiuni vomant à cursu aut ambulatione cita, iuxta meridiem. Sit autem dimidia hemina hyssopi in aqua congio contriti, atque hoc ebibat affuso aceto & adiecto sale, quo iucundius euadat. Bibat autem primum sensim ac lentius, postea amplius & citius. Qui verò graciliores sunt ac debiliores, à cibis vomitum faciant hoc modo. Lotus calida præbibat meri heminam, deinde cibos omnigenos edat, & neque dum cibum sumit, neque à cibo bibat, sed continue se donec quatuor stadia quis percurrat, deinde vina tria permixta ipsi in potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primum quidem meracius, & paulatim, & per multum temporis spatium. deinde verò dilutius, & citius, & multum.

*Vomitibus
qui cietur.*

X *austera enim adhiæt at* Quicunque

*in stramenta per quæ vomitus fit, crebroscent,
dulcet at vomiti in ætate et humores diffundat
ante deum, et quæ ventriculo sunt illata, detergat*

HIPPOCRATIS LIBER

Quicumque autem bis in mense vomere consuevit, huic me- **D**
 lius est ut consequenter in duobus diebus vomat, quam per
 quintum & decimum. Verum aliqui penitus contrarium fa-
 ciunt. Quibuscunque verò commodum est reuomere cibos,
 aut quibus alui non probum transitum habent, his omnibus
 conducit sæpe in die comedere, & omnigenis edulij vti, &
 obsonijs varijs modis præparatis, vinumque bibere duplex
 aut triplex. Qui verò reuomunt cibos aut aluos habent hu-
 mectas, his omnibus contrarium huiusmodi facere cōducit.
 Cæterum puerulos infantes per multum tempus in aqua ca-
 lida madefacere oportet, & vinum bibendum dare aquosum,
 & non penitus frigidum. Dandum est & id vinum quod mi-
 nimè ventrem eleuet ac inflat. Hæc autem facere oportet, ut **E**
 & conuulsionibus minùs corripiantur, & maiores fiant, ac
 mellorem calorem adipiscantur. Mulieres porro siccioris mo-
 di dicta vti oportet. Nam & cibi sicciores ad muliebriū car-
 nium molliciem cōmodiores sunt, & meraciores potus præ-
 stabiliores sunt ad vteros ac foetuum nutrimenta. Qui exer-
 citijs vtuntur, hyeme currere ac luctari debent. Aestate verò
 luctari quidem parum, currere autem minimè, sed multum
 deambulare secundum ventum ac frigus. Quicumque ex cur-
 sibus fatigati fuerint, eos luctari oportet. Qui verò ex lucta-
 tionibus fatigantur, eos currere expedit. Sic enim laborans, fatigata
 corporis parte vel maximè cal fieri componique ac recreari
 queat. Quosunque exercitijs vtentes alui profluuiā corripi-
 unt, & recrementa ciborum speciem referentia ac cruda ha-
 bent, his exercitiorum nō minus quam tertiam partem de-
 trahere oportet, & ciborum dimidium saltem exhibere. Pa-
 lam est enim quod ventriculus confouere non potest, quo
 ciborum multitudo cōcoquatur. Sint autē his cibi, panis quā
 maximè assatus in vino intritus, & potus quā parcissimi ac
 meracissimi, & deambulationibus à cibo ne vtantur. Opor-
 tet autē sub hoc tēpus semel dūtaxat in die cibū sumere. Sic
 enim quā maximè concalescit ventriculus, & ea quæ inge-
 sta sunt exsuperauerit. Fit hic profluuij alui modus maximè
 his corporibus quæ densam carnē habent, quum ad carniū
 esum homo cogitur, natura eiusmodi existente. Venæ enim
 densatæ cibos ingestos nō suscipiunt. Est autem hæc natura
 acuta, & in vtrāque partem vertitur, & ad modicum tempus
viget

*X Muliebris
 uictus.
 natura huius
 Exercitiorum
 ut sunt huius
 do autem non
 sic autem sunt
 si vero sunt
 breui sunt
 multum ex
 cessant,
 quæ in
 portionem non
 trahi possunt
 dare expedit*

A viget bona habitudo in talibus corporib. At verò rariores ac hirsutiores corporum species ac habitus, tum carniū esum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonæ habitudines ipsis fiunt diuturniores. Quicumque postridie cibos eructant, & præcordia ipsis eleuantur, vt pote cibus crudis & incoctis existentibus, his longiori quidem tempore dormire cōducit, verū & alijs laboribus corpora ipsorum cogere oportet, Vinum autem meracius & amplius bibant, & cibus paucioribus sub id tempus vtantur. Palām est enim quōd ventriculus præ imbecillitate ac frigiditate, ciborum multitudinem concoquere non potest. Quosunque verò sitis corripuerit, his & cibi & labores detrahendi sunt, & vinum bibant aquosum & quā frigidissimum. **B** Quibuscunque autē dolores fiunt ex visceribus, siue ex exercitijs, siue ex aliquo alio labore, his quiescere conducit cibus abstinentes, portione autem vtantur, quæ quā parcissimē in corpus assumpta, plurimam vrinam ducat, quo venæ visceribus insitæ non distendantur repletæ. Ex talibus enim tubercula oboriuntur, ab febres. Quibuscunque verò morbi à cerebro fiunt, torpor primum caput occupat, & frequenter mingit æger, & reliqua velut in vrinæ stillicidio perpetitur, atque hæc sanē ad dies nouem patitur. Et si quidem erumpat per nares aut aures aqua siue mucus, à morbo liberatur, & vrinæ stillicidium sedatur. Mingit autem multum, & citra dolorem, idque albū, donec viginti præterierint dies, & capitis dolor hominem relinquit. **C** Intendenti autem oculos splendor occultatur. Porro virum prudentem id secum reputare oportet, quōd res preciosissima est sanitas, & proinde scire vt ex suo ipsius consilio in morbis vtilitatem percipiat.

HIPPO

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE GENI-

TVRA, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHYSICO

interprete.

Hic à Galeno Polybi esse perhibetur.

*Providens
natura quā-
tum possit
hinc perspi-
cito.*



Ex quidem omnia corroborat. Verum ge-
nitura viri provenit ab omni humido,
quod in corpore existit, ita ut id quod ro-
bustissimum est, secernatur. Argumentum
autem eius, quod robustissimum scerni-
tur, hoc est: quod à Veneris usu paucula
adeo re emissa, imbecilles reddimur. Ha-

*Cur semen
spumescat.*

*Pars ualen-
tissima
cur in coitu
excernatur.*

*Nō eadem
via seminis
& loquij.
Somnia Ve-*

bet autem res hoc modo. Venæ & nervi ab omni corpore in
puendum vergunt, quibus dum aliquantulum teruntur,
& calefcunt ac implentur, velut pruritus incidit, & ex hoc
toto corpori voluptas ac caliditas accedit. Quum vero pu-
endum teritur, & homo movetur, humidum in corpore ca-
lescit, ac diffunditur, & à motu conquassatur, ac spumescit:
quemadmodum etiam alij humores omnes conquassati spu-
mescunt. Sic autem in homine ab humido spumefcente, id
quod robustissimū est ac pinguisimū secernitur, & ad me-
dullam spinalem venit. Tendunt enim in hanc ex omni cor-
poris viæ, & diffundunt ex cerebro in lumbos, ac in totum
corpus, & in medullam: & ex ipsa medulla procedunt viæ, ut
& ad ipsam humidum perferatur, & ex ipsa secedat. Postquā
autem ad hanc medullam genitura pervenerit, procedit ad
rhenes, hac enim via tendit per venas: & si rhenes fuerint
exulcerati, aliquando etiam sanguis simul deferitur: à rheni-
bus autem transit per medios testes in puendum. Procedit
autem non qua vrina, verum alia ipsi via est illi contigua. Et
sanè qui somnia venerea habent, propterea per somnum ge-
nituram effundunt, quum humidum in corpore diffusum &
calfact

F

- A** calfactum fuerit, & siue ex labore, siue alia quapiam re spuerit, dum ab ipso secernitur, coitus imaginem repræsentat. Habet enim humiditas hæc similiter vt in coeuntibus. Sed non est mihi de his qui per somnum semen emittunt, & de toto morbo quid est, & quæ operatur, & quare coitus locum expleat, sermo: atq; hæc quidem de hoc dicta sufficiunt. *neris cur
stant.*
- Cæterum eunuchi propterea non coeunt, quia genituræ transitus ipsis sublatus est. Est enim per ipsos testes via eius, & nerui tenues ac crebri ex testibus in pudendum tendunt, quibus & eleuatur, & demittitur: atque hi nerui in exsectione dum castrantur, rescinduntur; quapropter non sunt utiles eunuchi. Nam neruis ipsorum extritis, genituræ via ob- *Castri
cur non
coeant.*
- B** turata est. Callus enim obducitur testibus, & nerui duri ac torpentes à callo facti, pudendum neque tendere, neque laxare possunt. Quibuscunque verò iuxta aures venæ sectæ sunt, hi coeunt quidam & genituram emittunt, verum modicam & debilem ac infæcundam. Nam plurima genituræ pars à capite iuxta aures in spinalem medullam procedit. Ipse autem transitus, cicatrice sectioni inducta, consolidatus est. At verò pueris venulæ tenues & repletæ existentes, genituræ transitum impediunt, & pueris ipsis non similiter accedit, & propterea neq; conquassatur in corpore humidum, ad genituræ secretiorem. Quin & virginibus quousque iuenculæ fuerint, menses non procedunt, propter eandem causam. Postquam autem adoleuerint & virgo & puer, venæ in pudendum pueri tendentes, itemque virginis in uterum, amplæ fiunt præ augmento, & oscula ipsarum aperiuntur, & via ac transitus per angustias cōtingit, & humidum tunc etiam agitationem habet. Nam spatiositas ipsi tunc ab agitatione ac conquassatione contingit: & puero sanè procedit genitura vbi plenè puber fuerit ob hanc causam, itemque virgini menses. Atque hæc mihi sic demonstrata sunt. Porro genituram dico à toto corpore secerni, & à solidis, & à mollibus partibus, & ab humido omni in toto corpore. Sunt autem humidi species quatuor, Sanguis, Bilis, Aqua, & Pituita. Tot enim species congenitas homo in seipso habet, & ab his morbi fiunt, aut etiam ex morbis discretiones. Et hæc quidem dicta sunt à me, de genitura, unde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura non est, &

*Secundum
aures uenæ
incisæ, pro-
creationem
tollunt.*

*Cur pueri
& puellæ
nihil demis-
sunt.*

*Quatuor
corporis hu-
mores.*

HIPPOCRATIS LIBER

Qui fœmi- nis in coitu fiat. est, & quare non est, & de mensibus virginum, & quod mu- D
lieribus in coitu, dum conficitur ac teritur pudendum, &
uteri mouentur, velut pruritus in ipsos incidat, & quod reli-
quo corpori voluptas ac caliditas accedat. Emittere autem &
mulier à corpore genituram, aliquando in ipsum uterum, qui
sanè inde humidus euadit: aliquando foras, si uterus magis

Coitus vo- luptas utro rumq; est. quàm opportunum est hiarit. Et delectatur mulier vbi coire
inceperit per omne tempus, donec vir semen emiserit. Et si
quidem appetit viro commisceri, prius quàm vir emittit, &
de cætero non similiter delectatur. Si verò nō appetit, simul
cum viro delectari desinit: & habet res hoc modo, quemad-
modum si quis in feruentem aquam, alterā frigidam infun-
dat, illa feruere cessat. Sic genitura viri in uterum illapsa, ca-
liditatem & voluptatem mulieris extinguit. Exilit autē vo-
luptas & caliditas simul cum genitura in uteros illabēte, de-
inde desinit: quemadmodum si quis in flammam vinum in-
fundat, primum quidem contingit flammam exilire, & per
modicum tempus augeri, ad vini infusionem, deinde desine-
re. Ita etiam mulieri caliditas exilit ad genituram viri: de-
inde desinit. Cæterū multò minus delectatur fœmina quàm
vir in coitu, & vir etiam tempore longiore. Propterea autem
vir magis delectatur, secernitur ipsi de repente ab humi-
do, fortiori turbatione ac agitatione quàm mulieri. Habet
autē & hæc res hoc modo. Mulieres si cum viris coeant, ma-
gis sanæ sunt: si non, minus. Nā & uteri simul humidi fiunt
in cōmixtione: qui enim sicci sunt magis, quàm cōuenit, for-
titer contrahuntur: vbi verò fortiter cōtrahuntur, dolorem
corpori afferunt: & simul coitus sanguinem calfaciens ac hu-
medans, viam faciliorem mensibus facit. Mensibus autē nō
precedentibus, corpora fœminarū morbosa fiunt. Quapro-
pter autem morbosa fiunt, in muliebribus morbis referetur.

Conceptus signum.

Et de his quidem hæcenus. Postquam autem coiuit mulier,
si quidem conceptura non est intra seipsam, pro more foras
procedet genitura ab utrisque, vbi fœmina volet. Si verò cō-
ceptura est, non procedit foras, sed manet in utero genitura.
Nam uteri susceptam & conclusam in sese continent, osculo
nimirum ipsorum præ humiditate contracto ac concluso si-
mulque permiscetur, tum quæ à viro venit, tum quæ à mu-
liere emissa est. Quod si fœmina partus perita sit, & cogno-
uerit

Auerit quando genitura non exciderit, sed intus manserit, sciet qua die intra seipsam concepit. Habes autem & hoc sic. Quandoque quidem fortius est semen à muliere emissum, aliquando verò debilius. Similiter etiam quod viri emittit. Et est tum in viro foemineum itemque masculum semen, tum itidem in muliere. Fortior autem masculus foemina est. necesse est igitur ipsum à fortiore semine generari, habetque res hoc modo. Si ab utrisque semen fortius prodierit, masculus erit partus: si verò debile, foemina nascetur. Vtrum autem multitudine ac copia præualuerit, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multò plus fuerit debilis seminis quàm fortioris, superatur fortè, & debili permixtum, in foeminam transit. Si verò plus fuerit fortis seminis quàm debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodum si quis ceram & adipem misceat, & de adipe tamen plus coniiciat, eaquæ ad ignem liquefaciat, Quandiu quidem liquida fuerint, non apparet vtrum tandem horum superet, vbi verò congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quòd adeps ceram copia exuperat. Sic habet etiam masculi & foeminae genitura. Quòd verò & in foemina, & in viro, genitura foeminea sit ac mascula, ex manifestis factis coniectare licet. Multæ enim mulieres iam foeminas pepererunt ex proprijs viris, verùm ad alios viros transgressæ masculos genuerunt. Et viri illi ipsi apud quos mulieres foeminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi, masculos genuerunt: & quibus masculus sexus gignebatur, alijs foeminis permixti foemineam sobolem genuerunt. Atque hæc sanè ratio declarat tum virum, tum foeminam, & foemineam, & masculam genituram habere. Nam apud quos viros, foeminas pariebant, superabatur fortius semen à copia debilioris, & gignebantur foemellæ. Apud quod verò masculos pariebant, superabatur debilius, & gignebantur mares. procedit autem non semper ab eodem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed aliàs alià, atque sic etiam in muliere res habet, vt minimè mirandum sit, easdem foeminas, eisdemque viros, sobolem masculam & foemineam producere. Habet autem & in brutis geniturae foemineæ ac masculæ ratio eodem modo. Et in ipsa genitura egreditur & foemineum, & masculinum

Semen masculu & foemineum in utroq; inesse

Cur mares modo foeminae modo gignantur.

Cur permixto coniugio permixtae soboles.

Partus si multitudinis varietas. ab omni corpore, & à debilibus debilis, & à fortibus fortis: **D**
& necesse est sic in partum distribui. Et ex quacunque corpo-
ris viri parte plus prodierit in genituram, quàm mulieris,
partus ille magis similis erit patri. Vndecunq; verò à corpo-
re mulieris plus venerit, magis assimilabitur matri. Est au-
tem impossibile, partum per omnia matri similem esse, &
patri nihil: aut vice versa, neque alteri quicquam similem
esse: sed vtrisque necesse est in aliquo similem esse, siquidem
ab vtrisque corporibus semen in partum procedit. Vter au-
tem tandem plus contulerit ad similitudinem, & à pluribus
corporis regionibus, illi magis similis est. Contingitque
aliquando vt filia nata maiori ex parte, magis similis sit
patri quàm matri, & filius natus aliquando magis simi- **E**
lis est matri quàm patri. Atque hæc tam multa à me re-
lata declarant superiorem sermonem, Quòd & in muliere,
& in viro tum mascula, tum foeminea genitura existat. Con-
tingit autem & hoc. Quandoque partus tennes & debiles
generantur, ex patre & matre crassis ac robustis: & si qui-
dem multis iam generatis pueris tale quid contingat, ma-
nifestum est quòd fœtus in vtero ægrotavit, & ab vtero
quid de suo ipsius incremento foras prodiiit, vtero nimi-
rum amplius hiante: & propterea debilis factus est. Vnum-
quodque autem animal iuxta proprium robur ægrotat. Si
verò omnes pueri nati debiles fuerint, vteri ipsi in causa
sunt, angustiores quàm oportet existentes. Si enim non ha-
buerint spaciositatem, in qua fœtus nutriri possit, necesse **F**
est ipsum tenuem fieri, vtpote qui non habeat satis amplum
locum ad incrementum capiendum. Si verò habeat satis am-
plum locum, & non ægrotet, verisimile est ex magnis pa-
rentibus magnam sobolem generari. Habet autem hoc
modo, Quemadmodum si quis cucumerem qui iam de-
floruit, sit autem adhuc tenellus, & in cucumerario adhuc ad-
hæreat, ponat ac immittat in vas angustum, æqualis ac simi-
lis euadet cavitati ipsius vasis. Si verò quis eundem in vas
amplum indet, quòd verisimile sit cucumeris capax esse, sed
non valde multo maius quàm pro cucumeris natura, æqua-
lis itidem ac similis erit cucumis vasis ampli cavitati. Nam
in augeſcendo cum vasis cavitare contendit. & ferme omnia
nascentia sic habent, quomodo quis ipsa cogat. Sic sanè &
in pue

Cur non ualidi ex ualidis gignantur.

Cur omnes partus non ualidi edantur.

*παραδέρ-
μα δ' cucu-
mere.*

Cur modo parui modo magni nascentur.

A in puero se res habet. Si enim spatiositas ipsi contigerit in augescendo, maior euadet: si verò angustia, minor. At verò mutilum in vtero puerum, sentio aut contusum ex matris vterum gestantis plaga, aut eiusdem lapsu, aut alio quopiam violento affectu matri accidente, mutilatum esse. Quam verò parte mater plagas acceperit, ea puer mutilatur. Si verò amplius contundatur fœtus, ita ut pellicula ipsum continens rumpatur, perditur fœtus. Quin & alia huiuscemodi causa pueri mutilantur. Quum in vtero iuxta locum in quo mutilatus est fœtus, angustia fuerit, necesse est corpus quod in angustia mouetur mutilari, iuxta illum locum. Quemadmodum etiam arbores quæcunque in terra sunt, &

Cur mutilati.

B non habent satis amplum locum, verum à lapide, aut aliqua alia re impediuntur, quum emergunt, obliquæ ac tortuosæ sunt, aut hac parte crassæ, altera tenues. Sic accidit etiam circa puerum, si in vtero iuxta aliquam corporis partem, angustior altera vteri pars altera fuerit, Cæterum quòd ex mutilatis hominibus sani & integri gignantur pueri, ut plurimum contingere solet. Habet enim mutilatum, numero omnia quæ sanum. Vbi verò morbus aliquis ipsis, & humido ipforum acciderit, à quo semen prouenit (quatuor sanè quum species sint humidi, quæ naturaliter in corpore existunt) genituram non totam exhibent, debiliorem autem, iuxta mutilatam partem. Quare nihil miri mihi videtur, si etiam mutilentur, quemadmodum parens. Et hæc mihi de hoc dicta sufficiant. Redibo autem rursus retro ad sermonem quem dicere reliqui.

Semper ferme sani ex integri ex mutis nascuntur.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE NATV- RA PVERI SIVE FOETVS,

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO IN-
TERPRETE.

Et de hoc Galenus dubitat Hippocratisne
an Polybi sit.

*Quid agat
semē in uul-
ua cum re-
mansit.*



*Cur omnia
ardētia spi-
rituum emit-
tunt.*

*Ligna uiri
dia cum ar-
dent cur fla-
tū spirituum
ne emittāt.*

I genitura ab vtrisque permanferit in vte-
ro mulieris, primum quidem simul misce-
tur, utpote muliere non quiescente, coacer-
uaturque ac crassa per calorem euadit. De-
inde spiritum cōcipit, nempe in calido exi-
stens, & postea matre spirante. Deinde vbi
spiritu repleta fuerit, viam hic ipse sibi ipsi

foras facit, & per mediā genituram spiritus erumpit. Quum
autē spiritui calido via foras facta est, rursus alius frigidus à
matre inspirat, atq; hoc facit per omne tēpus. Calescit enim
utpote in calido existens, & frigidum spiritū concipit à ma-
tre spirante. Omnia autem quæ calescunt spiritum habent.
Spiritus autē erumpit & sibi ipsi viā facit, ac foras procedit.
Id autē quod calescit rursus in seipsum aliū spiritum frigidū
trahit per fissuram vnde nutritur. Atque hoc cōtingit etiam
in lignis, & in folijs, cibisque ac potibus, si fortiter caleant.

Eius rei notionem ligna ardentia exhibent: omnia enim li-
gna hoc faciunt, maxime verò subuiridia. Emittūt enim spi-
ritum iuxta sectionem. Spiritus autem quum foras procedit,
circum casurā volutatur, id quod semper fieri videmus. Ma-
nifesta igitur est ratiocinatio de spiritu, quod calidus existēs
in ligno, attrahit alterum frigidum à quo nutritur, & à se-
ipso dimittit. Nam si nō alterum pro eo quem à se dimittit
attraheret,

HIPPOCRATIS LIBER

*mulier manet
serat.*

mationis redderetur. Audierat autem cantrix ipsa, qualia **D**
mulieres inter se dicunt, quòd quādo mulier conceptura
est in ventre, genitura non egreditur, sed intus manet.
Auditis autem his atque intellectis, hoc semper obserua-
uit, & quum quandoque sentiret genituram non exeun-
tem, dominæ exposuit, & sermo statim ad me peruenit.
Ego verò quum audissem, iussi ipsam ad terram saltare,
& postquā septies iam exsiliisset, genitura in terram pro-
fluxit, & strepitus factus est, atque illa conspecta ipsa ad-
mirata est. Qualis autem erat ego referam: velut si quis
ouo crudo externam testam circum circa adimat, in in-
terna verò pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus qui-
dem talis erat, & vt abundè dicam, ruber erat liquor & **E**
rotundus. In pellicula vero fibræ quædam albæ ac crassæ
inesse videbantur, cum cruore crasso & rubro obuolutæ:

*Semen in
membrana
nulli itaquā
cum con-
matur.*

circum autem pelliculam foris cruenta vestigia instar su-
gillatorum, iuxta medium verò tenue quid eminebat, quod
mihi vmbilicus esse videbatur, & per illum sanè spiratio-
nem extra & introprimum facere apparebat: quin & pel-
licula genituram ambiens ac complectens, tota ex illo ten-
debatur. Talem sanè ego genituram sex dierum existen-
tem vidi. Referam autem & aliam dinotionem, omni cu-
pienti de hoc scire, qui mihi paulo post hanc manifestè ap-
paruit, & testimonio esse potest omni meo sermoni, quod
verus est, quantum homini de huiusmodi re dicere da-
tur. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Quòd genitura in **F**
pellicula est, & spiritum habet intro & foras, & augetur à
matre sanguine in vterum descendente. Menses enim non
prodeunt, vbi mulier conceperit intra seipsam, si puer sa-
nus fuerit, & permanere debet, nisi in quibusdam primo
mense modicam sui indicationem faciant. Verùm sanguis
à toto corpore mulieris descendens, in orbem forinsecus
pelliculam circumstat, Simulque cum spiritu sanguis in-
tra per pelliculam trahitur, qua parte perforata est, & à
genitura distat, congelaturque & futuro animali augmen-
tum præbet. Quum autem tempus accesserit, rursus a-
liæ pelliculæ intra primam pelliculam tenues & multæ
circuntenduntur, eo modo quo prima pellicula facta
fuit. Sunt autem & hæ ab vmbilico extentæ, & inter se
mutua

*Status in
utero quomo-
do crescat.*

*Quo sensim
crescit for-
tus.*

A mutua ligamenta habent. Quum verò iam hoc factum est, ex descendente à matre sanguine & congelato, caro fit. Iuxta mediam autem carnem umbilicus distat, per quem spirat, & alimentum ac incrementum capit. At verò mulier quum vterum gerit, à mensibus non prodeuntibus propterea non dolet, quod sanguis non cōturbatur, acervatim abire solitus singulis mensibus, sed procedit sensim & modicè citra dolorem, quotidie in vterum ipsum, & quod inest intus in vtero augetur. Singulis autem diebus ea gratia procedit, & non semel per mensem, quòd genitura in vtero existens semper à corpore trahit, prout vires, tum ipsa, tum spiratio habet. Et primum quidè modica spiratio fit, & sanguis modicus à matre procedit. Quum verò spiratio amplior redditur, magis sanguinem trahit, & vberior is in vterum descendit. Atqui vterum non gestantibus, ubi menses non prodierint, propterea dolor oboritur. Primum quidem sanguis in corpore singulis mensibus turbatur ab huiusmodi necessitate, quòd mensis à mense multum differt, & secundum frigiditatem, & caliditatem. atque hoc percipit mulieris corpus, humidius enim est quàm virile. Vbi autem turbatus est sanguis, & venas implevit, ab ipso descendit, qualis ab initio naturæ fuit. Quare si quidem euacuatur à sanguine mulier, in ventre concipit: si verò repleta fuerit, non. Nam vacuis vteris, & venis à sanguine factis, mulieres in se fœtus concipiunt. Etenim post menstrui sanguinis purgationē mulieres in ventre concipiunt. Causa iam dicta est. Quando autem conturbatus & secretus sanguis foras non procedit, sed in vteros, vteri autem non hiauerint, tunc sanè à sanguine diutius immorante vteri calefcentes, reliquo corpori calorem transmittunt, quandoque etiam sanguinem in venas corporis distribuunt, ut & venæ repletæ doleant, & tumores laxos producant. Quandoque etiam periculum est ne claudicatio ex hoc inducatur. Aliquando & vesicam obsident, premuntque ac claudunt vesicam, & urinæ stillicidium inducunt. Aliquando pleni quoque sanguinis existentes vteri procidunt, aut ad coxendices, aut lumbos, & dolorem exhibent. Aliquando ubi sanguis quinque aut sex menses in vteris moram traxit, putrefactus pus fit, & quibusdam pus per pudendum exit. Sunt etiam quibus circa inguen velut tuber-

*Fœmina cū
uterū gestat
menstruis
cur non lan-
guet*

*Mulieres
quæ graui-
dæ nō sunt,
& mēstruis
carent, cur
male habēt*

*Fœmina
mēstruis ca-
rentes non
conciunt.*

*Sanguis in
vulvis reten-
tus totū cor-
pus afficit.*

*Menstruū
diutius re-
tinentibus,*

HIPPOCRATIS LIBER

*quæ agritu-
dines cõm-
gant.* culum fit, illique suppuratum exit. Sed & alia multa huius- **D**
cemodi mala mulieribus fiunt, vbi lunares purgationes non
procedunt. Sed quid opus est ea hic recensere? Referuntur
enim in muliebribus morbis. Verùm iam repetito eo quod
reliqui, sermonem absolvam. Quum autem generatur

*Caro cū gi-
gnitur quid
fiat.*

caro, tunc pellicula augescente in vtero sanguine, etiam
ipsæ augentur ac sinuantur, & præsertim externæ. Et san-
guis à matre descendens, quem sanè caro spirans attraxerit,
in incrementum cedit, & si utilis non sit, in sinus pellicula-
rum secernitur: & vbi sinuatæ factæ fuerint, ac sanguinem

*Χορῖον.
Conforma-
tio partus.*

susceperint, tunc iam secunda appellatur. Et tantum de hoc
mihi dictum sit. Cæterum caro augescens à spiritu articu-
latur, & abit in hac vnūquodque simile ad simile, densum ad **E**
densum, rarum ad rarū, humidū ad humidū. & vnumquod-
que in propriam regionem abit, iuxta cognationem, ad id
à quo genitum est: & quæcunque à densis genita sunt, densa
sunt: & quæcunque ab humidis, humida: & reliqua iuxta
eandem rationem fiunt in incremento. Et ossa durescunt à
calore conglutinata. Et sanè ramificantur velut arbor, &
tum interna, tum externa corporis, adhuc melius articulan-
tur: Ipsumque caput distantiā acquirat ab humeris, & bra-
chia ac cubiti à lateribus: & crura inter se disparantur: & ner-
ui exiliunt circum naturas articularum: & os per se diduci-
tur, & nasus, & aures eminent in carne, ac perforantur: & ocu-
li implentur humore puro, & pudendum cōspicuum sit verū
tandem sit: & viscera coarticulantur: & iam etiam superius **F**

*Similitudi-
nem hanc cõ-
sidera.*

partibus spirationem facit, tum ore, tum naribus: & venter
inflatur, & intestina inflata supernè, per vmbilicum spiritum
assumunt, ac disperdunt: & in podicem via fit à ventre ac in-
testinis foras, & in vesicam via foras. Atque hæc omnia à spi-
ritu coarticulantur, Nam inflata disparantur omnia, iuxta
cognationem. Etenim si velis fistulam vesicæ alligare, & per
fistulam immittere in vesicam, terram & harenam, & plum-
bi tenuia ramenta, insuperque infusa aqua in fistulam infla-
re, primum quidem illa aquæ permiscetur, deinde verò tem-
poris progressu inflata secedent, & abibit plumbum ad plu-
bum, harena ad harenam, terra ad terram. Et si quis ipsa a-
refieri permittat, & distracta vesica contempletur, inueniet
simile ad simile progressum esse. Sic sanè etiam genitura &
caro

A caro coarticulatur, & vnumquodque in ipsa simile ad simile abit. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt, & factus iam est puer, & ad hoc peruenit scemella quidem in quadraginta & duobus diebus vt longissimè, primam coagmentationem ac coarticulationem accipiens. Masculus verò vt longissimè, in triginta diebus. Vt plurimum enim hoc tempore, aut paulò breuiore, aut paulò longiore, articulatio ipsis contingit. Nam & purgatio fit à partu vt plurimum, in scemellis quidem, diebus quadraginta & duobus: atq; hæc tardissima est, & perfecta. Vacauerit autem periculo, etià si in viginti quinque diebus purgetur. In masculo verò purgatio fit diebus triginta: atq; hæc tardissima est, & perfecta. Citra tamen periculum fuerit, etiam si in viginti diebus mulier purgetur. Po-

*Tempus cō
formatiōis
in utero.*

B stremit autem tempore purgatio quàm paucissima procedit, & in iunioribus paucioribus diebus purgantur, in senioribus verò pluribus. Cæterum maximè laborant ac dolent in partu, & partus purgationibus mulieres primiparæ, & quæ rarius pariunt, magis dolent, quàm quæ sæpius. Atqui purgationes à partu mulieribus ea gratia fiunt, quòd primo tempore vsque ad dies quadraginta duos in scemella, in masculo verò ad dies triginta, paucissimus sanguis in augmentum pueri descendit. Ab hoc autem tempore copiosior, donec pariat. Oportet itaque purgationem reddi in toto puerperij tempore, & foras exire ac respondere pro dierum ratione ac proportionem. Principium autem huiusmodi pur-

*Quæ femi
næ plus mi
nusue in
partu, puer
perioq; la
borent.*

C gationis tale mulieri fit: Dum ex partu laborat, conturbatur sanguis mulieri, & à forti pueri motu vehementer calefcit. Conturbatus autem, primus quidem foras prodit. Deinde puer, post puerum verò, mucus crassus sanguinolentus, & deductio contingit huic, quemadmodum aquæ effusæ in mensa. Postea post illum per omnes dies purgatio procedit, vsque ad prædictum tempus, copia Atticæ heminæ vnus & dimidiæ primùm, aut paulò plus minúsve, pro eius temporis ratione, donec desinat. Procedit autem sanguis velut à vitima, si sana est, & sana futura est mulier, & statim congelatur. Si verò mulier sana non est, neque sana futura est, purgatio paucior procedit, & specie deterior, & non citò congelatur. Id verò hoc modo habet. Si mulier vterum gestans morbum habuerit nō cognatum, in puerperij purgatione perit.

*Quo pacto
fetus erum
pat.*

*qn mulie
post purg
atione fu
tura est*

HIPPOCRATIS LIBER

*Puer per
cum no ple-
ne purgan-
tur, pericli-
tantur.*

*Purgatio-
nes quot die-
bus fiant.*

*Quādo ab-
ortus infor-
mes.*

*Puella cur-
tardius con-
formetur.*

Si verò non purgetur in prioribus diebus vterum gerens, ita **D**
rim sana existens, aut etiam non, commoueat autem ipsa
purgatio siue à pharmacis, siue sua sponte de repente, iuxta
dierum rationem procedet, quibus non vna vice procedit.
Si enim non purgetur mulier à purgationibus partus, mor-
bus magnus ipsam corripiet, & periculum vitæ incurret, nisi
citò curetur, & quis conuenientem ipsi purgationem indu-
cat. Hæc propterea produxi, vt ostenderem quod in pueris
membrorum discretio longissima contingit, in fœmella in
quadraginta duobus diebus, in masculo in triginta. Argu-
mento est purgatio à partu, quæ in fœmella fit in quadragin-
ta duobus diebus, in masculo in triginta, vt tardissime con-
tingat. Reperam autem iterum eandem rem iisdem verbis, **E**
maioris lucis ac declarationis gratia. Dico enim rationem
rependi, quod genituræ in vtero existenti paucissimus san-
guis à matre in vterum venit, si fœmineam genituram ha-
beat, in quadraginta duobus diebus, in his enim coarticulan-
tur puerorum membra: ab hoc verò tempore copiosior san-
guis venit. Et in masculo rursus iuxta rationem dierum tri-
ginta. Quod verò hæc vera sint, etiam alterum testimonium
adeſt, hoc modo habens, Primis diebus vbi genitura in vte-
ros illapſa est, paucissimus sanguis à muliere in vteros venit,
deinde copiosior. Si enim acruatim & multus semel veni-
ret, genitura spirationem habere non posset, sed sanguine
multo accedente suffocaretur: Rependitur autem in purga-
tione vice versa, purgatio enim puerperij in primis diebus **F**
plurima procedit, deinde paucior, donec desinat. Multæ au-
tem mulieres puerum masculum iam perdiderunt paulò
antè trigessimum diem, & inarticulatus apparuit. Qui verò
posterius perditum sunt, aut simul cum trigesimo die, om-
nes articulati apparuerunt. In fœmella itidem iuxta ratio-
nem quadraginta duorum dierum habet. Nam vbi his ab-
solutis perditur, articulatio membrorum apparet. Siue autē
prius, siue posterius perdetur puer, iuxta hanc rationem ap-
paret. Nam & secundum rationem, & necessitatem, articula-
tio contingit in fœmella, in diebus quadraginta duobus, in
masculo in triginta. Testimoniū enim præbent abortus pue-
rorum, & à partu purgationes. Quod autem fœmella poste-
rius conformatur ac coarticulatur, caussa hæc est: quod ge-
nitura

A nitura foeminea debilior est ac humidior quam mascula, & iuxta hanc rationē necesse est posteriùs conformari foemellam quam masculum, atque ea gratia etiam purgatio diuturnior est in foemella quam masculo. Redibo autem rursus retrò vnde digressus sum. Postquā iam articulatus fuerit puer, speciebus membrorum ipsius augescantibus, tunc & ossa duriora fiant, & cauātur, atque hæc à spiritu fiunt. Caua autem existētia trahunt ad sese à carnibus quod in sanguine est pinguisimum: & progressu temporis ramificantur rursus extremitates ossium, quemadmodum arboris extremitates postremum ramos spargunt, sic & in puero digiti manuum ac pedū inter se disparantur. In ipsis autem extremitatibus vngues enascuntur. Desinunt autē venæ hominis omnes in digitos manū ac pedum. Et crassissimæ quidē sunt venæ totius corporis, venæ capitis, deinde crurū, & brachiorum ac cubitorum. In pedibus autē & manibus, tenuissimæ ac densissimæ & plurimæ venæ sunt. Nerui itē tenuissimi ac densissimi & plurimi, & ossa magnitudine minima, atq; hæc maxime in digitis manū ac pedum existunt. Verū ex digitis, utpote ossa densa ac parua habētibus, venas itidem ac nervos, sic etiam vngues tenues ac densi nascūtur, & intercipiunt ac concludūt venarū extremitates, ut ne amplius augescant, neque altera alteri premineat: ut nihil miri sit vngues in extrema corporis parte densissimos esse, ex densissimis enim constant. Simul autē cum vnguibus etiā capilli in capite radicantur. Cæterū pilorū natura hoc modo se habet, Oriuntur quidem maximi ac plurimi, qua corporis parte cuticula rarissima est, & vbi pilus moderatū humorē in alimentū habet: & vbi cuticula posterius rara sit, ibi etiā pili posterius nascūtur, velut in mento, & pube, & sicubi aliās pili nascuntur. Simul enim ut genitura prodit, etiā caro rarefcit, & cuticula & venæ aperiuntur magis quam priori tēpore. Nam dum adhuc puer est, & venæ tenues existunt, nō procedit per ipsas genitura, eadem ratio de mensibus virginū est: Simul autē ut via fit & genituræ, & menstruis virginibus, etiā pilos emittit puer, tum pueri, tum virginis, rara nimirum cuticula reddita, simulque pilus moderatam humiditatem in alimentum habet, & non pauciorē. Sic verò & in mento viri cōtingit. Rara enim sit cuticula, procedente in ipsam de capite humiditate,

Simul

*Cava ossa
quid agāt.*

*Digitum tena
qua ramu
sculi postre
mo discernū
tur.*

*Quæ in ped
dib. & man
ib. nascunt.*

*Cur densi
ungues.*

*Capillus pi
lus quolo
co frutice.*

*Seminis
per venas
qua quando
fiat.*

*Virgūculis
cur interdū
mensēs non
sint.*

*Fubertatis
causam.*

HIPPOCRATIS LIBER

Simul enim & in coitu, simulq; interiecto tēpore, pilus moderatam humiditatem in alimentum habet, & tunc maxime, quum tempus contingit humiditati de capite descendenti in coitu, ad mentum à pectore distās. Signum autem eius quod in rarissimis cuticulę partibus pili enascūtur: si quis velit inurere cutem, & pustulam tantum facere, eamq; sanare, cutis densa reddita per cicatricē pilos nō producet. Quicunque verò Eunuchi dum pueri sunt, fiunt, propterea neque in pube, neque in mento pilos producant, leuēsq; tori existunt, quod via genituræ non facta, cuticulam non rarefacit per totam superficiem. Intercepta est enim ac conclusa genituræ via, quemadmodum paulo ante à me relatū est. At verò mulieres leues fiunt, & mēto, & corpore, quod in coitu ipsarum humiditas non similiter agitata velut viri, cuticulam raram non facit. Quicūque autem calui fiunt, hi sanē pituitosi sunt. & pituita in capite ipsorum simul cum coitu agitata & calfacta, ad cuticulam allabens pilorum radices exurit, & defluūt pili. Verum Eunuchi propterea calui non fiunt, quod vehementem motum non faciant, neque pituita in coitu calfacta pilorum radices exurit. Cæterum cani ob id fiunt quod longo tempore pertrāsente in homine humiditate, albissimū eius secernitur, & ad cuticulā allabitur, & pilus albidiorē humiditatem trahēs albidior fit quā priorī tempore, itēque ipsa cuticula, præsertim vbi cani sunt, albidior alia euadit. Et quicunque ex natiuitate canum quid in capite habēt, etiā illis cuticula summa vbi cani sunt, reliqua albidior existit. Illic enim albissima est humiditas. Habet autē res hoc modo, Qualemunque humiditatem caro attraxerit, siue albam, siue rufam, seu nigrā, tali colore etiam pilus inficitur. Atq; hæc de hoc dicta sunt, Redibo autem rursus ad sermonem relictum. Quum itaque extremitates corporis pueri foras ramos sparserint, & ungues ac pili radices egerint, tunc iam etiam mouetur, & tēpus ad hoc fit, masculo quidē menses tres, fœmellæ verò quatuor. Sic enim vt plurimum cōtingit. Sunt autem aliqui pueri qui ante hoc tempus mouētur. Mouetur autem primū masculus, quia fortior est quā fœmella: & primū quoque conformatur masculus. nam à fortiore & crassiore genitura fit. Quum autem mouetur fœtus, tunc sanē lac indicationem sui, matri præbet. Mammæ enim attolluntur

*Cute ustula
ta pilus nō
fructuat Eu
nuchi quare
non pubes
cant.*

*Caluiij
caussa.*

*Eunuchi
non calue
scunt.
Canicies
cur.*

*Canī cur
in ortu.*

*Quotus in
utero fixus
mouetur.*

D

E

F

- A** attoluntur, & papillæ gliscunt ac turgent: Lac verò non prodit: & in mulieribus densam carnem habentibus, lac posterius significationem de se præbet ac prodit, in rarū verò carnem habentibus, prius. Lac autem ob huiusmodi necessitatē *Lac cur fiat.* fit. Quum vteri tumidi præ puero sunt, ventrem mulieris comprimūt: eius autem pleni vbi compressio cōtigerit, pinguisimum de cibis ac potibus foras proslit, in omentum ac carnem. Quemadmodū si quis corium illinat multo oleo, & imbibere permittat, & vbi imbibit, corium ipsum premat, oleū vtique exilierit foras ex corio compresso. Sic etiam si venter pinguitudinē in se habeat à cibis ac potibus, comprimatūrque; ab vteris, pinguitudo proslit in omentū ac carnem. Et si raræ carnis mulier fuerit, citius percipit eius persultationem: si non, posterius. Quin & pecora prægnantia si non ægrotēt, *Pecora grauida potu & cibo magis pinguescunt.* ab eodem potu ac cibo pinguiora propterea fiunt. Similiter autē & mulier. Et à pinguitudine calfacta ac alba existente, quod edulcatū est à caliditate, quæ ab vteris accessit, expressum venit in mammas, & in vteros quoque parum venit, per easdem venas. Tendunt enim & in mammas & in vteros venulæ hæ, & cōsimiles aliæ. Et vbi peruenerit in vteros de lacte, puer ipso paululum fruitur, Mammæ verò suscepto lacte impletæ attoluntur. Et vbi peperit mulier principio motus facto, lac in mamas ipsas procedit, si lactauerit. Sic enim res habet. Dum mammæ lactant ac exugunt, venulæ in mamas ampliores fiunt, ampliores autē factæ, à ventre pinguitudinē *Salacitas uiris unde.* trahentes, in mammas distribuūt. Nam & vir si multū coeat, venæ ampliores redditæ, Venerē magis inducunt. Habet autem & hoc eo modo: Alimentum & augmentum puerorū fit, vbi ea quæ à matre veniunt, in vteros processerint, & prout mater habet iuxta sanitatem aut debilitatem, sic & puer habet. Quemadmodum etiam quæ in terra crescunt, à terra nutriuntur, & prout terra habuerit, sic etiam nascentia in terra habent. Etenim semen vbi deiectum fuerit in terram, humiditate quadam ab ipsa impletur. Habet enim in se terra omnigenum humorem, vt nascētia nutrire possit: impletū autem humore semē, inflatur & intumescit, & vis quæ in semine leuissima est, ab humore condensari cogitur, condensata autem à spiritu vis, & humore folia producente, semen rumpit, & primū folia foras emergunt. Vbi verò emerferint, quū non

Lac cur fiat.

τῇ ὁμοιότητι probatur.

Pecora grauida potu & cibo magis pinguescunt.

Lactis copia quādo.

Salacitas uiris unde.

Quomodo fata nascuntur.

HIPPOCRATIS LIBER

non amplius ab humore in semine existēte folia nutriri pos- **D**
 sint, rumpitur infernè semen, itemq; folia, & semen à folijs
 coactū, vim suam ad inferna demittit, quæ videlicet in ipso
 restat propter grauitatem, & fiunt radices ex folijs distēta.
 Postquàm autem planta iam firmiter radices infernè egerit,
 & alimentum à terra sumit, tunc sanè totum euanescit, & in
 plantam consumitur, præter corticē, qui solidissimus existit.
 Rursus autem cortex in terra putrefactus progressu tempo-
 ris euanidus fit, & quædam folia ramos producant. Ex semi-
 ne itaque tanquam ex humido nata plāta, donec quidem te-
 nera & aquosa fuerit, in augmētum supernè ac infernè pro-
 cedens, fructum excludere non potest. Non enim vim habet
 fortem ac pinguem, ex qua semen condensari queat. Vbi ve **E**
 rò solidior facta est, & progressu temporis radices egerit, tūc
 iam & venas habet amplas, tum ad supernā, tum ad infernā
 partem: & tunc sanè nō amplius aquosum ex terra trahit ali-
 mentum, sed crassus & pinguius ac copiosius quod calfactū
 à sole efferuescit in extremitates, & fit fructus iuxta cognā-
 tionē, ex quali etiam generatus est. Multus autē ex modico
 propterea fit, quòd singula ex terra nascentia maiorem vim
 ex terra, quàm ex eo vnde generata sunt, trahunt, & efferue-
 scunt non secundum vnum, sed secundum multa. Quum au-
 tem fructus prodierit, à plāta sua nutritur. Planta enim à ter-
 ra trahens, fructui transmittit. Sol autem fructum coquit, &
 solidum facit, quod aquosius in ipso est, ad sese trahens. Atq;
 hæc mihi dicta sunt de his quæ ex semine nascuntur à terra **F**
 & aqua. Cæterū ex plantarijs ab arboribus arbores fiunt, hoc
 modo. Ramus vulnus habet, qua parte ab arbore defractus
 est, in infima ad terrā parte, vnde radices prodeunt. Pangitur
 autē, & in terrā demittitur, hoc modo: Quum planta quæ
 in terra existit, humorem acceperit à terra, tumescit & spiri-
 tum habet, quæ verò pars supra terram eminent, nondum. Spi-
 ritus autem & humor condensans in inferna plantæ parte
 vim, quātum eius grauissimum est, in infernam partē erum-
 pit, & ex ipso radices teneræ fiūt. Postquam autem in infer-
 nam partem receptus fuerit, tunc iam ex radice humore tra-
 hit, & parti supra terram eminenti transmittit: & tunc sanè
 rursus superna pars intumescit, ac spiritum habet, & quātum
 ex vi in planta leue inest, id ipsum congregatum geminat,
 ac fo

*Quæ terra
gignuntur,
quomodo
procedant.*

*Cur multa
ex uno gi-
gnantur.*

*Arbor qui
plantatur,
crescitur.*

A ac folia producit, & iam in supernam partem augmentum facit, itemq; in infernam. Sic itaq; contrarium contingit circa germinationem, in his quæ ex semine, & in his quæ ex plantarijs proveniunt. Ex semine enim prius folium emergit, deinde radices in infernam partem demittuntur. Verum arbor primum radices agit, deinde folia acquirit, propterea quod in semine ipso humoris copia inest, & in terra quum totum insit, alimentum inest primum folio sufficiens, unde folium nutritur, donec radicetur. Verum in ramo non sic fit. Non enim gignitur ex altero, unde folium primum alimentum habeat, sed ipse ramus est, & velut arbor habet, & multa eius pars supra terram eminet. Quare quum supra terram existat, humore impleri non potest, nisi ex inferna parte magna quadam vis procedens in supernam humorem distribuat. Et plantarium primo necesse est sibi ipsi alimentum sufficere à terra in radices, deinde ubi sic à terra attraxit, sursum distribuere, & folia ad germen & augmentum concitare. Quum autem augmentum cepit planta, à tali necessitate ramos spargit, quæ referam. Quum plus humoris ipsi accesserit ex terra attracti erumpit præ multitudine, qua parte quam plurimus fuerit, & hac parte planta ramos emittit: augetur autem & in amplitudinem, & in supernam, & infernam partem, propterea quod inferna terre pars hyeme quidem calida est, æstate autem frigida. Atque hoc propterea contingit, quod terra humida est in hyeme, præ aqua de cælo delabente, & comprimitur in seipsam, utpote humore grauiore existente: densior autem ab hoc ipso est, & nullam transpirationem habet. Non enim amplius magna raritas ipsi inest: & propter hoc inferna terre pars hyeme calida est. Nam & finum densius accumulatum, intus calidius est, quam quod rarum existit & aliàs, humecta ac compressa, à seipsis concalescunt, & breui à calore valde exusta putrescunt. neque enim perineat spiritus per ipsa, nimirum quum densa existunt. Si verò sicca fuerint, ac rare posita, multominus calescunt ac putrescunt. Atque sic sanè frumentum ac hordeum humidum, ac madefactum, intus calidius est, quam si siccum sit, & rare positum. Et vestes pelliceæ colligatæ ac fortiter compactæ, à seipsis comburuntur, velut ego vidi, quemadmodum ab igne exustæ. Sed & alia si quis velit considerare, Omnia quæ comprimuntur à seipsis, calidio

*Cur herbe
& arbores
contrario
modo coa-
lescant.*

*Cur terra
inferiora
hyeme calida,
æstate
frigida sint.
Cur humi-
da cum coa-
lescantur
calescant.*

HIPPOCRATIS LIBER

calidiora reperiet, quàm quæ rarè posita sunt. Non enim ha-
 bent vnde frigiditatem inspirent à ventis. Sic etiam inferna
 terræ pars cùm plena sit, & ipsa à seipsa comprimatur, nimi-
 rum grauis ac densa existens, ab humiditate in hyeme cale-
 scit, nullam enim caliditatis perspirationem habet. Sed vbi
 de cœlo aqua cadit in ipsam, quum spiritus prodierit ab ipsa
 in terra, non vltius penetrat, vtpote terra densa existente,
 sed spiritus retrò ad aquam abit: & propterea fontes ac ma-
 rinæ aquæ, hyeme calidiores sunt, & auctiores quàm æstate,
 quia spiritus dum exhalat, retrò abit ad aquam, quum terra
 densior existat, & per se spiritum nō transmittat. Et aqua mul-
 ta existens quæ contigerit, ea perumpens procedit, & viam
 sibi ipsi ampliorem facit, quàm si modica existat. Aqua enim
 in terra non consistit, sed semper in decliue procedit. Si autē
 spiritum ab aqua prodeuntem terra per se hyeme transmit-
 tat, paucior aqua ex ipsa procederet, & fontes hyeme magni
 non essent. Atq; hæc omnia in hoc dicta à me sunt, quòd ter-
 ræ inferna pars calidior esse apparet hyeme, quàm æstate.
 Nunc autem dicere volo, quòd æstate frigidior quàm hye-
 me, inferna terræ pars esse videtur. Terra æstate rara est &
 leuis, nimirum sole vehementius irruente, & ab ipsa humida-
 tes ad sese attrahente. Habet autē terra in se semper aquam
 plus aut minus. Spiritus autem omnes nobis sunt ab aqua. Id
 quod sic se habet, vnde cōiectare possis, demonstrabo. Etenim
 ab omnibus fluminibus ac nebulis spiritus semper procedūt.
 Est autem nebula aqua in aëre cohærens & continua. Et tūc
 sanè terra rara est ac leuis æstate, & aqua in se habet, & aqua
 in decliue fluit, procedente autem aqua semper inde alius ex
 alio spiritus exhalat. Qui verò exhalat, per terram abit leuē
 ac raram existētem, & frigiditatē terræ inducit, & ipsa aqua
 simul perfrigeratur. Habet autē sic, Quemadmodum si quis
 aquam in vtre existentē fortiter comprimāt, & per punctu-
 ram acus, vel paulò maiorem, perspirationem aquæ faciat,
 & ipsum vtrē in sublimi suspēdat, nullus spiritus per foramē
 procedat, sed aqua, non enim habet spaciositatem per quam
 aqua spiritum emittat. Sic sanè se habet etiam hyeme aqua
 in terra. Si autem aquæ in vtre locum satis amplum feceris,
 & vtrē in sublimi suspenderis, spiritus per foramē procedet.
 Locum enim spiritus habet ab aqua mora, procedendi per
 vtre,

Mare &
 fontes cur
 hyeme calen-
 scant, & ur-
 geant.

Spiritus
 at feris
 Nebula

quid.

τὸ μωρόν
 confirmat.

A utrem, & propterea per foramen spiritus transit. Sic sanè se habet etià æstate aqua in terra. Satis amplum enim locū habet, nimirum terra rara existente, & sole ab ipsa humorē ad se trahente, & pertrāsit spiritus, utpote qui frigidus existit, ab aqua per ipsam raram existentem ac leuem. Ob hoc itaq; inferna ipsius pars æstate frigida existit, & aqua ipsa adhuc magis quā spiritus, qui in terra frigidus existit, & ipsa in seipsam, & in terra, spiritum emittit. Sed & aqua quæ hauritur in puteo, spiritum semper mouet, velut flabellum, atque hoc ipsum aquæ frigiditatē inducit. Quæ verò nō hauritur æstate, sed stans densa existit, nō similiter spiritū in se à terra suscipit, neque in terram à seipsa distribuit, & simul à sole & aëre in puteo non disperso, sed stante ac firmato, primum superficies ipsius calefit, deinde alia eius pars ad aliam deorsum caliditatem distribuit, & propterea aqua quæ æstate nō hauritur, calidior est ea quæ hauritur. Quin & fontes valde profundi æstate semper frigidi existunt: & aqua hausta hyeme, terra calida existente, ex tali fonte, statim quidem calida est, ubi verò tēpus progressum fuerit, frigida est ab aëre videlicet frigiditate existēte talis facta. Perflatur enim à vento, & spiritus per ipsam pertransit. Quēadmodum etiam aqua quæ æstate hauritur, ubi hausta fuerit, statim frigida est, calida autē fit postea, propterea q̃ terra rara existēte, & spiritu in ipsa existente, perfrigeratur: Vbi autem haustæ tēpus accesserit, stabilis fit, & calida cōspicitur. Calefit enim ab aëre calido existente, quemadmodum & aqua quæ non hauritur in puteo æstate, ob hoc ipsum calida redditur. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Repetam autem rursus quòd æstate inferna terræ pars frigida est, hyeme verò calida. Superna autem vice versa. Et oportet arbori non duo calida simul accedere, neque duo frigida simul, si sana esse debet. Verū si quidem ex superna caliditas accesserit, ex inferna frigiditate ipsi accedere oportet, & vice versa, si ex superna parte accedat frigiditas, ex inferna caliditatem ipsi contingere oportet. Et radices ubi attraxerint, arbori transmittunt, & arbor vicissim radicibus: atque sic & frigidi & calidi conseruatio contingit. Quemadmodum homini ingestis cibis inventrem, qui dum concōquuntur calefaciunt, perfrigerationem à potu facere oportet. Sic & arbori contrarium rependi oportet, ex infer-

*Cur aqua
hyeme cali-
da, æstate
friget.*

*et cur aqua
quæ in est
nō hauritur
est cali-
da quæ hauritur*

*Fontis alii
qualis aqua*

*Homines
sicuti arbo-
res nutria-
tur.*

*hinc pro-
prie q̃ arbori*

potu cibū

et sic ne

cessaret

na parte ad supernam, & vicissim, & augetur arbor, & in su- **D**
 pernam, & in infernam partem, propterea quòd alimentum
 ex inferna & superna ipsi accedit. Et quandiu quidem vehe-
 menter tenera fuerit arbor, fructum non producit. Non enim
 est in ipsa pinguis vis, neq; crassa, quæ ad fructum conferre
 possit. Progressu autem temporis venæ in ipsa dilatata, pin-
 guem ac crassam influxionem ex terra in ipsam faciunt, sol
 autem ipsam diffundens, ebulire facit utpote leuem existen-
 tem, in extremitates, & fructum producere, & tenuem qui-
 dem humiditatem à fructu sol aufert, crassam autem conco-
 quens & calefaciens edulcat. At verò arbores non fructiferae,
 in se pinguitudinem tantam non habent, quantum eius in
 fructum est expendendum. Omnis arbor autem quum per tē **E**
 pus solida facta fuerit, & ex inferna parte radices firmit,
 iam penitus cōstanter augetur desinit. Quicumque verò in
 arbores, ab alijs arboribus oculos indiderunt, & arbores in ar-
 boribus enatae viuunt, & fructificant non similem fructu ar-
 boribus, quibus insite sunt, id ipsum tali modo cōtingit. Ocu-
lus primum quidem germinat. Alimentum enim habet pri-
mum ab arbore, ex qua ablatum est, deinde ab ea, in quam in-
situs est. Vbi autem germinauerit, sic in arborem radices te-
 nues à se demittit, & primum humore fruitur in arbore, in
 quam insitus est, existente, deinde tēpore accedere, demittit
 radices in terrā, per eam in quā insitus est, & fruitur humore
 quem à terra trahit, & alimentum inde ipsi contingit, ut non
 mirum sit, insitas arbores, alios fructus producere, à terra enim **F**
 viuunt. Hæc mihi de arboribus & fructibus dicta sunt ea gra-
 tia, quòd indignum mihi factum videbatur, & ne poteram
 quidem, hæc tractationē semiperfectam relinquere. Redibo
 nunc rursus retrò ad illum sermonem, cuius gratia à me hæc
 de istis relata sunt. Censeo enim terræ nascentia omnia viue-
 re ex terræ humore, & qualem terra humore in seipsa habet,
 talem etiam nascētia ex ipsa habere. Sic etiam puer viuit de
 matre in vteris, & quali mater sanitate prædita est, talē etiā
 puer habet. Quòd si quis cōsiderare velit ea quæ de his dicta
 sunt, ab initio vsque in finem, inueniet naturam omnem cō-
 similem esse, & ex terra nascētium & hominū. Et hæc mihi
 de hac dicta sunt. Cæterum puer in vteris existens manus ap-
 pud genas habet, caput autē prope pedes: & nō datur probè
 ac cer

*Cur insitas
sui fructu
ferant.*

*Partus ter-
renis com-
paratur.*

*Pueri situs
in utero.*

A ac certo cognoscere, etiam si puerum in utero videas. utrum caput sursum habeat, an deorsum. Verum ex umbilico pellicule tentæ sunt ipsum continentes. Nunc autem referam dinotionem, quam paulo ante me demonstraturum dixi, quantum humanæ menti possibile est manifestum existentem, omni qui de hoc cognoscere velit, quod genitura in pellicula est, & quod iuxta medium ipsius umbilicus est, & per illum sanè, primò spiritum in seipsam trahit, & foras emittit. & quod ex umbilico pelliculæ tentæ sunt. Sed & aliâ pueri naturam, quam dixi, sic totâ habere usque in finem reperiet, quomodo videlicet à me in his sermonibus declaratum est, si quis testimonijs, & ocularibus inspectionibus à me producendis uti velit. Etenim si quis ova viginti aut plura, quo pulli ex ipsis excudant gallinis duabus aut pluribus subijcere velit, & singulis diebus à secunda exordièdo, usque ad ultimam qua excudetur pullus ex ovo, subtrahere, confringere, ac videre, inueniet omnia se habere iuxta meum sermonem, quomodo volucris naturam, ad humanam conferre oportet. Quod enim pelliculæ ex umbilico tentæ sunt, & reliqua quæ de puero dicta sunt, sic se habere in ovo volucris reperies, ab initio in finem. Atqui si quis nondum vidit, mirabitur in volucris ovo umbilicum inesse. Atque hæc sic habet, & sic à me relata sunt. Quando verò mulieri partus appropinquat, tunc puero se mouere, & manibus ac pedibus calcitrante, pelliculam quandam internam rumpi contingit, rupta autem una, etiam aliæ debiliorem vim habent, & rumpuntur primùm quidam illi contiguae & coherentes, postea extrema. Quum autem ruptæ fuerint pelliculæ, tunc foetus à vinculo exoluitur, & agitated foras procedit. Neque enim amplius robur habet pelliculis amissis, neque uteri amplius puerum continere possunt, pelliculis velut dixi amissis, & ab ipsis abruptis, Cohæret enim pelliculæ etiâ uteris, ubi circum puerum obuoluuntur, non adeò vi valida ac multa. Quando autem procedit puer, violat & dilatat uteros in exitu, utpote teneros existentes. Procedit autem in caput, si secundum naturam prodierit. Grauiissimæ enim sunt ipsi supernæ partes, si ex umbilico perpédantur. Quum autem in utero est, magis continens existit usque ad pellicularum rupturam simul cum decimo mense, quando partus matri propinquat, & adest. Si verò violentam affectionem perpetiatur puer, etiam ante

*Per ouum
hoc confir-
mat.*

*Quo pacto
puer erum-
pat.*

*Caput
prius exit
si naturalis
ter exeat.*

HIPPOCRATIS LIBER

præfinitū tempus ruptis pelliculis prodit. Quin & si alimen-
tum à matre prius puero defecerit, etiā sic partus matri prius
aduenit, & ante decimū mensem puer prodit. Cæterum quæ
longius quàm decē mēſium tempus vterum geſtare ſibi vi-
ſæ ſunt: nam hoc iam ſæpe audiui, illæ ipſæ hoc modo quem
dicturus ſum deceptæ ſunt. Quum vteri ſpiritū acceperint in
ſeiſpos, à ventre flatum exhibente, eleuantur ac intumeſcūt,

*Quæ pluſ-
quam decē
menſes ge-
ſtaſſe viden-
tar, cur, ſul-
lantur.*

contingit enim hoc. Videntur ſanè ſibi mulieres tunc conce-
piſſe. Præterea ſi menſes non procedentes, congregati fue-
rint in vtero, & diutius maſerint, ſemper perſuūt in vteros,
aliquando vnà cum flatu à ventre, aliquando etiam caleſcen-
tes, & ſanè tunc quoq; in vtero habere mulieres ſibi vidētur,
nimirum menſibus non prodeuntibus, & vteris eleuatis. De-
inde aliquando menſes ſua ſponte erumpunt, aut alijs ſuper-
uenientibus à corpore in vteros, & priores protrudentibus,
& ſtatus egreditur, & multis iam ſtatim poſt mēſium purga-
tionem vteri hiant, & ad pudendum vertuntur, & tunc viris
præmixtæ, ad ſe genituram concipiunt, eadem die aut o-
mnino in paucis. Exiſtimant autem inexpertæ harū rerum
ac rationum, etiam illo tempore ſe in vtero habuiſſe, quādo

*Cur pluſ-
quam decē
menſes par-
tus in vtero
eſſe nō poſ-
ſit.*

menſes non prodibant ipſis, & vteri erant eleuati ac tumen-
tes. Quòd autem non diutius quàm decem menſibus cōtin-
gat vterum geſtare, ego demonſtrabo. Alimentū & augmen-
tum quod à matre deſcendit, non amplius ſufficiens eſt pue-
ro, vbi decē menſes præterierint, & fœtus auctus fuerit. Tra-
hit enim quod dulciſſimum eſt in ſanguine ad ſeſe, ſimulq; etiam lacte modicè fruitur. Quum autem hæc ipſi rariora ac
pauciora ſint, & puer plenus ac maturus exiſtat, copioſius ali-
mentum deſiderans calcitrat, ac pelliculas rumpens, ini-
tium partus matri inducit. & hoc perpetiuntur magis mu-
lieres primiparæ: deficit enim pueris alimentum, vt ad deci-
mum vſque mensem ſufficere non poſſit. deficit autem per
hunc modum. Sunt quædā mulieres quibus ſufficientes men-
ſes purgantur, quædam quibus pauciores: hoc ipſum ſi ſem-
per fiat, in natura, & genere, maternum ipſis exiſtit. Quæ ve-
rò menſes paucos demittunt, hæc etiam pueris poſtremò tē-
pore, vbi iam maturi fuerint, alimentum rariuſ exhibentes,
ipſos calcitrare faciunt, vt & ante decimum prodire feſti-
nent. Modicus enim ſanguis à iuueniculis ac nouellis matri-
bus

*Cur nutri-
mentum an-
te decimum
mensem pue-
ro in vtero
deficiat.*

E

F

- A** bus procedit: vt plurimum verò cōtingit tales mulieres etiā sine lactē esse, quæ paucos menses demittunt. Sicciores enim sunt, & densiorem carnem habēt. Huic autem rationi, quòd videlicet deficiente alimento prodit puer, etiā si nō aliqua violenta affectio ipsi accidat, etiā hoc testimonio esse potest. Volucris ex oui luteo nascitur, hoc modo. Incubante matre ouum calefcit, & quod in ouo inest à matre mouetur, calefcens autem id quod in ouo inest, spiritum habet, & alterum frigidum ab aère per ouum attrahit. Ouum enim adeò rarum est, vt spiritum qui attrahitur sufficientem ei quod intus est transmittat: & augetur volucris in ouo, & coarticulatur modo eodem ac cōsimili velut puer, quemadmodum
- B** iam antea à me relatum est. Nascitur autem ex luteo oui volucris, alimentum verò & augmentum habet ex albo, quod in ouo est. atque hoc iam omnibus manifestum factum est, qui animum aduerterunt. Vbi autem deficit alimentum pullo ex ouo, non habens id sufficiens vnde viuat, fortiter mouetur in ouo vberius alimentum quærens, & pelliculæ circum dirumpuntur, & vbi mater sentit pullum vehementer motum, putamen exalpens ipsum excludit. atque hæc fieri solent in viginti diebus, & manifestū est quod ita se habent. Vbi enim exclusa est volucris, nullus humor in oui testis inest, qui sanè memorabilis existat, expensus est enim in pullum. Sic etiam vbi auctus fuerit puer, mater non ampliùs sufficiens alimentum ipsi exhibere potest. Vberius itaque præsentente alimentum puer quærens, calcitrando pelliculas dirumpit, & à vinculo exolutus simul foras prodit. atque hæc vt longissimè in decem mensibus fiunt. Et secundum hanc rationem etiam pecoribus ac feris partus aduenit, in tēpore quo singula pariunt, non tardius. Etenim vnicuique animali necesse est tempus esse, in quo alimentum fœtui rariùs erit, & deficiet, & partus adest. Et quæ quidem paucius alimentum pueris præbent, citiùs pariunt. Quæ verò vberius, posteriùs. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Porro diruptis pelliculis, si pueri momentum in caput inclinatum prædominabitur, mulier faciliè parit. Si autè obliquus, aut in pedes procedet, contingit enim hoc sæpe si momentum huc inclinarit, siue præ vteriorum spaciositate, siue si mater in labore ex partu primùm non quieuit: & si sic procedet, mulier difficulter pa-

*Quæ parit
lactis ha-
beant,*

*Hoc cōtra
Plinium &
Aristotelem
esse uideatur.*

*Partus quæ
do accelera-
tur.*

*Pecora si
militer ena-
tuntur.*

*Cui quæ-
dā tardius
quædā cele-
rius pariat.
Partus qua-
lis.*

A lus gigni. In vtrum verò rursus humidiorē ac debiliorem, illic fœmella generatur. Si vero in vtrunque fortis ingreditur, ambo masculi fient. Sin debilis, ambo fœmellæ. Atque hic sermo sic relatus totus finem habet.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE CAR-

NIBVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

B

*



Go ad hunc vsque sermonem commu-
nibus sententijs vtor, tum aliorum
qui me præcesserunt, tum etiam meis.
Necesse enim est commune principij
sententijs supponere eum qui velit hæc
de arte medica tractationem compo-
nere. Verùm de rebus sublimibus in
aëre ac cœlo, neque opus habeo dice-

re, nisi quòd quantum ad hominem & reliqua animantia
quæ sunt, & nata sunt, pertinet, demonstrabo, & quòd ani-
ma sunt, & quòd sanitas, & quòd morbus, & quòd in homi-
ne malum ac bonum, & vnde moritur. Nunc autē ipse meas
sententias profero. Et videtur sanè mihi id quòd calidum vo-
camus, immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & au-
dire, & scire omnia tum præsentia, tum futura. Huius igitur
plurima pars, quum turbata essent omnia, in supernā circun-
ferentiam secessit. Et videntur mihi ipsum veteres Aëthera
nominasse. Altera pars inferna, appellatur Terra, frigidum
quid & siccū, & multis motionibus obnoxiiū, & in hac sanè
multum calidi inest. Tertiā pars aëris, medium loci occupa-
uit, calidū quid ac humidum existens. Quarta verò pars ter-
ra proximum locum cepit, humidissimum quid ac crassis-
simum. Hæc itaq; quū turbata essent, & in orbem circūtiol-
uerentur, multa calidi pars in terra cœclusa est, alibi maior,
alibi minor, alibi valde pauca, alibi copia multa: & tempo-

*de quibus
tractat
medicus*

*Calidū eadē
lōrue sol
aether quid
possit*

Terra.

Aër.

Aqua.

HIPPOCRATIS LIBER

ris progressu terra à calido arefacta, hæc conclusa in ipsa pu D
tredines faciunt veluti tuniculas, & quantum quidem ex pu
tredine terræ pingue fuit, & minimum humoris habuit, id

Ossa unde. & in ossa mutatum. Quæ verò glutinosiora fuerunt, & frigi-
ditate participarunt, ea calefacta exuri non potuerunt, ne-

Nervi quomodo facti. que verò liquida fieri, propterea speciem alieniorem ab alijs acceperunt, & nervi solidi facti sunt. Neque enim mul-
tum frigiditatis ipsis inerat. Verum venæ frigiditatis mul-
tum habebant, atque eius frigidi quantum circumcirca glu-
tinosissimum erat, à calido exassatum, membrana euasit. frigi-
dum verò quod erat, à calido superatum, dissolutum est,

Membrana. & ob id liquidum factum. Iuxta eandem autem rationem
etiam fauces, & stomachus siue gula & venter, & intestina

Fauces. in podicem vsque, caua facta sunt. Quum enim frigidum
Stomachus semper caleseat, quantum eius circumcirca glutinosum e-
intestina, rat, exassatum est, & membrana tunica facta est. Quod ve-
uenter usq; rò intra frigidum erat, colliquatum est, & factum est liqui-
ad anũ cau- dum. Non enim erat in ipso, neque pingue, neque glutino-
ua cur. sum multum. Iuxta eandem rationem etiam vesica. Multum
Vesica, frigidum quod ipsum circumcirca conclusit, à calido calfa-
ctum, dissolutum est, & euasit liquidum, quum neque pin-
gue, neque glutinosum in ipso esset: quod verò supererat, tu-
nica euasit. Sed & de alijs quæ caua sunt eodem modo res se

habet. Vbi enim plus glutinosi quàm pinguis erat, membra
na tunica facta est. Vbi verò pinguis plus quàm glutinosi, os-
sa facta sunt. Eadem ratio & ossium est. Vbi quidem non in-
erat glutinosi, verum pinguis & frigidi, citius exusta sunt
propter pinguitudinem, atque hæc ossa durissima & rigidissi-
ma existunt. Vbi verò pingue & glutinosum similia sunt,
hæc ossa antrosa sunt. Et de his quidem sic habet. Frigidum
quidem congelat, Calidum autem diffundit, in multo verò
tempore etiam exsiccat. Vbi autem pinguitudinis aliquid af-
fuerit, citius exurit & siccatur. Vbi verò glutinosum affuerit
frigido, citra pinguitudinem exuri non vult, sed tempore ca-
lescens congelatur. Caterum cerebrum sedes & metropolis
est frigidi ac glutinosi. Calidum verò pinguis sedes & me-
tropolis est. Quod enim calefcit primum omnium quum dif-
funditur pingue fit. Et propterea cerebrum, quia minimum

Ossa qui fine cauaq;

Cerebrum
quale.

ping

- A** pinguitudinis habet, plurimum verò glutinositatis, à calido exuri non potest, sed tempore tunicam, membranam crassam accepit, circum membranam verò ossa, quantum calidum superauit, & in quibus pinguitudo erat. Sed & medulla spinalis appellata, à cerebro descendit, & non est in ipso, neque pinguis, neque glutinosi multum, quemadmodum & cerebro. & propterea neque nomen medullæ iuste possidet. Non enim est alij medullæ similis, quæ in alijs ossibus inest. Sola enim membranas habet, quas alia medulla non habet. Signa porro horum manifesta sunt. Si quis enim nervosa & glutinosa, itemque alia assare velit, alia quidem cito assantur. Verum nervosa & glutinosa assari non volunt, minimum enim pinguitudinis habent. Pinguisimum autem & vnguinofum celerrimè assatur. At vero viscera sic mihi constituta esse videntur: nam de venis prius à me dictum est. Cor multum glutinosi ac frigidi habet, & à calido calfactum, caro euasit dura & viscosa, & membrana circum ipsum, & cauum factum est, non quemadmodum venæ: & situm est in capite venæ cauitissimæ. Duæ enim sunt cauæ venæ à corde, alteri nomen est arteria, alteri vena caua, iuxta quam cor situm habet. Et plus habet calidi arteria, quàm vena caua, & spiritum condit ac conseruat. Verum præter has duas venas, etiam aliæ in corpore sunt. Cauissima autem vena, ad quam cor situm est, per ventrem omnem transit, & per septum transuersum, & in vtrūque rhenem finditur, & in limbis finditur, & exilit tum in alias partes, tum in crus vtrūque, Sed & supra cor ad ceruicem, partim in dextram, partim in sinistram, & tunc in caput ascendit, & in temporibus finditur vtrūque. Possunt autè & numero maximæ venæ dici. Verum in summa, à vena caua, & ab arteria, aliæ venæ per totum corpus fissæ sunt, cauitissimæ autem sunt prope cor, & ceruicem ac caput, & infra cor vsque ad coxendices. Et calidum plurimum in venis accorde inest. & propterea spiritum cor habet, vtpote quod omnium intra hominem membrorum calidissimum existat. Procliue est autem condiscere, quod spiritus calidus est. Cor & venæ cauæ semper mouentur, & plurimum calidi in venis inest, & propterea spiritum cor trahit, ex omnibus in homine maximè calidum existens.

*Medulla
spinæ cur
proprie me-
dulla nō sit*

*Cordis na-
tura.*

*Arteria
venæq̃ alte-
ra magna
unde.*

*Venulæ cor-
poris unde
ueniant.*

*Cor calidū
est.*

*Cor & ue-
næ semper
agitantur.*

HIPPOCRATIS LIBER

*in ignem
comprobat.* Potest etiam aliter cognosci. Si quis ignem in domo accen- **D**
dere velit, quum ventus non inspirat, flamma mouetur ali-
quando magis, aliquando minus. Sed & lucerna accensa &
ardens, eodem modo mouetur, modò magis, modò mi-
nus, vento nullo mouente, quem sane nos spirantem co-
gnoscere possumus, & alimentum calido frigidum existit.
*Frigus ca-
lore nutrit.* Caterum puer in vtero comprimens labra ex vtero matris
fugit, & tum alimentum, tum spiritum, cordi intro trahit,
vbi sanè mater respirauit. Est enim hoc calidissimum in pue-
ro, & hoc calidum etiam reliquo corpori, & alijs omnibus
*Puerulus in
utero quid
faciat.* partibus motum præbet. Si verò quis interroget quomodo
hoc quis sciat, quòd puer in vtero trahit & fugit: illi sic re-
spondendum est. Pueri nascuntur sterco in intestinis ha- **E**
Cõfirmat. bentes, & vbi nati fuerint celerrimè ventrem, tum homi-
nes, tum pecora exonerant. Atqui non haberent sterco,
nisi in vtero suxissent, Imò neque mammam statim ven-
tum est sugere nosset, si non in vtero suxisset. Et de motu
cordis ac venarum sic habet. Porro pulmò iuxta cor ita na-
tus est. Cor ex humido quòd glutinosissimum erat calfaci-
Pulmò. ens cito exsiccauit, veluti spumam, fecitque antrosum, & ve-
nulas multas in ipso. Venulas autem ideo fecit. Quantum
enim in glutinoso inerat frigidi, id ipsum quidem à calido
colliquatum est, & liquidum euasit. Ab ipso verò glutino-
Iecur. fo, tunica facta est. At verò Iecur sic compactum est, Quum
vna cum calido multum humidi conclusum esset, extra gluti-
Cõfirmat. nosum ac pingue, frigidum superauit calidum, & conge- **F**
latum est. Huius signum hoc est: Quando quis victimam
mactat, donec calidus fuerit, liquidus est sanguis, postquam
autem perfrigeratus est, congelatur. Si verò quis ipsum con-
quasset, & fibras eximat, non congelatur, fibræ enim frigi-
*Sanguis
quare coa-
guletur.* dæ sunt & glutinosæ. Splen autem hoc modo constitutus
est. Cum calido & glutinoso conclusum fuit, calidum qui-
Splen. dem plurimum, frigidi autem minimum, tantum solum-
modo quantum ad glutinosi compactionem satis erat: sunt
autem id fibræ in splene existentes, & propter has fibras,
Renes. mollis est splen, & fibrosus. Renes porro sic producti sunt,
Parum glutinosi, parum calidi, multum frigidi conclusum
fuit, & ab hoc congelatum est, & durissimum viscus eua-
sit, & minimè rubrum, quia non multum calidi simul con-
stitit.

- A** stitit. Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem con- *Caro.*
stituit & compegit ac fecit carnem, glutinosum autem in
foramina transiit, in foraminibus autem his humidum est,
velut in venis magnis. Calidum autem in toto corpore est,
plurimum verò & humidi in corpore est, & frigidi multum
in humido: tantum autem est frigidi, quantum congelare
humidum ac liquidum potest, sed superatur à calido, qua- *Humidum*
re etiam ab ipso diffunditur: Quòd verò humidum cali- *liquidumue*
dum est, hac demonstratione confirmatur. Si quis corpus *caloris quid*
hominis secet, vbicunque velit, sanguis calidus fluat, &
quandiu sanè calidus fuerit, liquidus erit, postquam verò
refrigeratus est, tum ab intrinseco frigido, tum extrinse-
B co, pellicula fit & membrana, & si quis hac pellicula detra *Tuniculam*
cta, modico tempore sinat, aliam pelliculam factam vide- *spiritus aer*
bit, si verò quis hanc semper adimat, alia rursus pellicula *ue & fri-*
è frigido generatur. Cæterum ea gratia plura dixi, vt osten- *gus semper*
deram, quòd extremum corporis ad aerem conuersum, ne- *superindu-*
cessario pelliculam induit, præ frigido & ventis impeten- *cit.* ✱
tibus. At verò articuli sic generati sunt. Quum ossa facta *Articuli*
essent, quæcunque quidem ex ipsis pingua erant, celerrimè *iuncturæ.*
exusta sunt, quemadmodum etiam prius dictum superiore
sermone. Quantum autem ex ipsis glutinosum erat, id-
ipsum exuri non poterat, sed medio inter vstum & sicca-
tum loco contentum, à calido in nervos, & saliuam ac mu- *Nervi.*
cum transiit. quantum autem ex glutinoso liquidissimum
C erat, hoc calfactum crassius redditum est, vtpote liquidum *Vngues.*
existens, & ex hoc saliuam facta est. verum ex illo glutinoso
vngues producti sunt. Etenim ab ossibus & articulis semper *Dentes.*
liquidissimum ipsorum discedens, glutinosum redditur, & à
calido siccatum ac arefactum, foras in vngues delegatur. Den-
tes autem posterius generantur ex hac causa. Ex ossibus ca-
pitis ac maxillarum incrementum fit glutinosi, & quod ex
pingui, inest à calido siccatum exurit, & fiunt dentes reli-
quis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest. Et primi qui-
dè dentes nascuntur à victu in vtero, & postquam natus fue- *Dentati cur*
rit puero lactenti à lacte. Vbi verò hi exciderint à cibis & po- *nascantur.*
ribus, excidunt autem, vbi ad annos primi alimenti perue-
nerint, quibusdam etiā prius, si à morbido alimento nati fue-
rint. Plurimis verò quum septē annos impleuerūt. Qui verò
postea

HIPPOCRATIS LIBER

postea enascuntur simul consenescent, nisi præ morbo perfo- **D**
 rentur. Caterum dentes propterea posterius alijs nascuntur.
Maxilla so- In maxilla venæ sunt, & hæ huic ossi soli inter omnia ossa,
le ossi uen- ex inferno ventre alimentum præbent. Ossa verò tale au-
nulas habet gmentum dant, qualia existunt, sed & alia omnia tale augmen-
uentericu- tum reddunt, qualia ipsa existunt. Etenim venæ ex ventre ac
lusq. intestinis, in quæ cibi ac potus colliguntur, postquam hi fue-
 rint calfacti, tenuissimum ac liquidissimum trahunt, crassissi-
 mum autem & sæx isthic relinquitur, computresciturque & fit
 stercus in inferioribus intestinis. Tenuissimum verò trahunt
 venæ ex ventre ac intestinis, quæ supra ieiunum intestinum
 existunt, atque hoc calfactis iam cibis. Vbi autem ieiunum
 intestinum transferint, & in inferiora intestina collecti fue- **E**
 rint, stercus fiunt. At verò alimentum ubi accesserit, vnum-
 quodque talem speciem unicuique reddit, qualia sanè erant.
Cibus & Singula enim ab alimento irrigata augmentum capiunt, ea
potus oia ir- lidum, & frigidum, & glutinosum & pingue, & dulce & ama-
rigant, con- rum, & ossa & alia vniuersa quæ in homine insunt. Et ob id
seruant & dentes posterius nascuntur. Dictum autem à me prius est,
augent. quod solæ ex ossibus maxillæ, ipsæ in seipsis venas habent.
 & ob id alimentum amplius in ipsas quàm in alia ossa trahi-
 tur, & quia vberius alimentum, & densiorem influxum ha-
 bent, augmentum ipsæ à seipsis tale pariunt, quales sanè ipsæ
 existunt, atque hoc donec homo integer augeat: augeat
 autem ubi conspicuus euadit, conspicuus verò fit maxime à
 septennio, usque ad decimum quartum annum. & in hoc tem- **F**
 pore, tum maximi ex dentibus, tum alij omnes nascuntur,
 postquam exciderint hi qui ab alimento in vtero nati sunt.
 Augeat autem & in tertium annorum septenarium, in quo
 adulescens fit, usque ad quartum & quintum septenarium.
 Quin & in quarto septenario dentes enascuntur, plerisque
 hominibus duo, qui sapietia dentes appellatur. Porro capilli
 sic nascuntur. Ossa sunt & cerebrum à quibus tale augmen-
 tum venit, utpote glutinoso circumcirca existente, quemad-
 modum & neruis, & pinguitudinis nihil inest. Si enim pin-
 guitudo affuisset, ex calido sanè exusta esset. Fortassis autem
 mirabitur quis quod etiam sub alis & in pube pili multi, &
 quibusdam in toto corpore existunt. Verum hic sermo de eo
 est, quod ubicunque in corpore glutinosum est, ibi pili à ca-
 lore

- A**lore fiunt. Auditus autē inde contingit, foramina auriū ad os durum & siccum lapidi simile pertingūt. Iam verò ad ipsum os est cavitās antrofa. Strepitus autem ad durum firmantur, os autem cauum resonat per durum. Pellicula verò in aure iuxta os durum tenuis est, velut aranei tela, & omnium pellicularum siccissima. Quòd autem id quod siccissimū est maximè resonat, multa signa sunt. Quum igitur plurimū resonuit, maximè audimus. Et sunt quidam qui de natura scribētes prodiderunt, quòd cerebrum est quòd sonum edit. hoc autem fieri non potest. Ipsum enim cerebrum humidum est, & membrana siue tunica circum ipsum humida est & crassa, itemque circum tunicam ossa. Nullum igitur humidum resonat, sed sicca, resonantia autem auditum faciunt. Olfacit porrò cerebrum humidum existens, aridorum odorem vnā cum aëre, per corpuscula chartilaginosa ipsum trahens. Cerebrum enim in cavitatem nasi pertingit, atque hac parte non est ante ipsum os aliquod, sed chartilago mollis velut spongia, neque caro, neque ossiculum: & vbi quidem cavitās nasi sicca fuerit, ipsum seipso exactius arida olfacit. Aquam enim non olfacit, humidior est enim quā cerebrum, nisi sit putrefacta. Putrefacta enim aqua crassior fit, & alia omnia. Quū verò nares humectæ fuerint, olfacere non possunt. Nō enim aërem attrahit cerebrum ipsum ad seipsum. Similiter etiam vbi cerebrum ipsum de seipso plurimum liquefecerit, in palatum, & fauces, & pulmonem, ac reliquum ventrem: cognoscunt autem hoc homines, & ex capite destillare dicunt, destillat autem & in reliquū corpus. Et est modus eius calidus. At verò visus propterea contingit: à cerebri membrana vena in vtrunque oculum per os descendit: per has duas venulas, quòd est glutinosissimi tenuissimum de cerebro percolatur & propterea ipsam circum ipsum oculum tunicam talem facit, quale est ipsum oculi pellucidum, quòd ad aërem vergit, ad quòd venti ac flatus irruunt, eadem planè ratione quemadmodum de alijs membranis ac tunicis dixi. Sunt autem multæ hæ tunicae præ oculis pellucidæ, quales ipsi existunt. Huic enim pellucido lumen & omnia splendida relucet, per hoc igitur relucens videt: quòd verò non splendidū est, neque relucet, per hoc non videt. Verum reliquum quòd circum oculos est album, caro est. Quæ verò pupilla oculi

*Auditus
qui fit.*

*Odoratus
caussa.*

*Visus qui
fit.*

*Visus quæ
caussa sit.*

*Pupilla quæ
lis.*

appella

- A** diebus habet quæcunque corpus habere debet. Mirari autem quis possit, quomodo ego id sciam. Verum multa ego vidi hoc modo. Meretrices publicæ quæ sæpius de seipſis periculum fecerunt, ubi cum viris rem habuerint, sciunt quando in ventre concipiant, & postea conceptum intra se perdunt. Postquam autem iam perditus est, elabitur velut caruncula. Hanc carunculam in aquam coniectam si conspiciatus consideraueris, omnia membra habere reperiēs, & oculorum regiones, & aures, & manus & manuum digitos, & crura, & pedes & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. Satis etiam manifestum est harum rerum peritis, quod mulier quum in ventre concepit, *Meretrices quæ docuerunt.*
- B** statim horret, & calor, & dentium stridor consequitur, & conualſio occupat tum articulos, tum totum corpus, & vetrum segnities ac torpor. Et quæ puræ sunt, hoc perpetiuntur. Quæ verò crassæ & mucosæ hoc perpetiuntur, pleræque ex his mulieribus non percipiunt, nec cognoscunt. Certè quatenus mihi ostenderunt, hoc ipsum se cognouisse, eatenus scio ac prodo. Quòd verò vita hominis septem *Conceptus signa.*
- C** enim intestinum in his diebus concreuit, moriunturque etiam illi. Sed & ex hoc coniectare licet, hominis vitam septem dierum esse, etiam ex hoc manifestum redditur. Si quis in septem diebus nihil edere aut bibere velit, plerique quidem in ipsis moriuntur. Sunt autem qui ipsos transmittunt, & tamen moriuntur. Sunt etiam quidam qui persuasi sunt ut ne desperarent seipsos fame conficientes, sed comederent ac biberent: verum venter non amplius suscipit. Ieiunum *Quota inedia.*
- C** enim intestinum in his diebus concreuit, moriunturque etiam illi. Sed & ex hoc coniectare licet, hominis vitam septem dierum esse. Puer septimestri partu, natus, pro ratione natus est, & viuit, & rationem talis habet, ac numerum ad hebdomadas ac septenarium exactum. Octimestris autem natus nullus vnquam vixit. Nouem verò mensium & decem dierum partus fit, & viuit, & habet ad hebdomadas numerum exactum. Quatuor enim denarij hebdomadam, dies sunt ducenti & octoginta. In denarium autem hebdomadam septuaginta dies incurrunt. Habet autem & septimestris partus tres denarios siue decadas hebdomadam, & in vnaquaq; decade septuaginta dies. Tres verò hebdomadam decades, ex toto sunt dies ducenti ac decem. Quin & morbi acutissimi sic hominibus fiunt, præteritis diebus hebdomadis *Septimestris partus*
- Prænotio morborum.*
- dumid

HIPPOCRATIS LIBER

*Capitis ul-
cera.*

*Dentes pue-
ris quando
renascuntur*

dimidia, aut vnus, in quibus iudicantur, & moriuntur aut D
sani euadūt: & tertij generis in vndecim diebus, hoc est vna
& dimidia hebdomade: & quarti in duabus hebdomadis. &
quinti in duodeuiginti diebus, hoc est duabus & dimidia
hebdomadis. At verò alij morbi non habent vt certa senten-
tia pronuntiari possit, quanto tempore homines ab ipsis fa-
ni euadant. ad eundem modum etiam vlcera magna in ca-
pite ac reliquo corpore: quarto die inflammari incipiunt, in
septem autē inflammatio sedatur, aut etiam quatuor & de-
cem, aut duodeuiginti. Si quis autem diligenter medeatur,
& vulnera in capite magna in hoc tempore non sedentur,
homines moriuntur. Caterum inexpertus quispiam mirari
queat, quòd septimestris puer nascatur. Ego quidem igitur E
hoc ipsum vidi, & quidem frequenter. Si autem hoc depre-
hendere vult, facile est obstetrices adire, quæ parientibus ad-
sunt, & ex ipsis percuntari. Est autem & aliud signum. Pueri
septem annis præteritis dentes explent. Et in septem annis
sunt & ratione & numero exactè hebdomades trecentæ ac
sexaginta. Necessitatem autem naturæ, quapropter in septē
hæc singula dispendentur, ego alijs locis declarabo.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE SEPTIME-

STRI PARTVIANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

*Macrobius
& Galenus
in Epide-
miarum cō-
mentarijs
hoc disserit.*



Septimestres autem nascuntur diebus cen-
tum & octuaginta duobus ac dimidio, &
insuper accedente diei particula. Si enim
primi mēsis dies quindecim supputaueris,
deinde quinque mensium, dies centū qua-
draginta septem ac dimidium: In vndese-
xaginta enim diebus quàm proximi duo menses perficiun-
tur.

- A** tur. his igitur sic habentibus, ad septimum mensem supersunt dies non plures quàm viginti. Et est tota summa dimidij anni, vnà cum aliquantula diei parte. Quum itaque ad hoc perfectionis principium partus peruenerit, maturescēte foetu, & robore multum augeſcente, in perfectione magis quàm alijs temporibus pelliculæ in quibus ab initio nutritus fuit, quemadmodum spicarum membranæ laxantur, ad id coactæ antequàm fructus perfectè matureſcat: & fortissi mi ac plenissimi foetus violantes ac dirumpentes pelliculas, partum fieri cogūt, & plurimis ex his pereunt. Quum enim parui ſint, transmutatione maiore quàm alij vtuntur, & quadraginta dierum afflictionem perferre coguntur, ex vtero
- B** egressi, id quod etiam in decimestris multos peremit. Sunt autem ex his septimestribus qui etiam superstites manent, ex multis pauci. Propterea quòd ratio & tempus in quod e nutriti sunt in vtero, cōstitit, vt omnium particepes ſint, quorum etiam perfectissimi participes existunt, maximè qui ſuperſtites manent, & processerunt de matre prius pariente, vtpote in octauo mense egrotaturi. Si enim in his laboribus succedant, vt in conspicuum prodeat puer, impossibile est ſuperſtitē eſſe, ob prædictas affectiones, quas ego octimestres perimere dico, Imò etiam multos decimestres. Cæterū multi foetus septimestris ætatis, quum pelliculæ laxantur, ſecedunt in id quod cedit, & hic alimentum ſumunt, primos qui dem quadraginta dies laborantes, alij plus, alij minus: propter permutationem autem ex locis & pelliculis quæ ipſos aluerunt, transmutantur, & pro vmbilico, trahunt & transſumunt etiam per matrem labores. Pelliculæ enim dum tenduntur, & vmbilicus conuulſus, dolores matri inducunt. Et foetus ex antiquo vinculo exſolutus, grauior redditur. Multę verò mulieres etiam febricitant his cōtingentibus, quædam etiam pereunt vnà cum foetibus, verū omnes in breui ex hoc contaminantur ac inquinantur. Aiunt autem & octonos menses difficilimè vteros ferre, rectè id dicentes. Est autē octauus mensis non ſolūm hoc tempus, ſed & dies accedunt à septimo mense, & à nono, & ab ipſo anno. Verūm dies non ſimiliter, neque dicunt, neque cognoscunt mulieres. Decipiūtur enim ex eo q̃ non eodem modo ſunt, ſed aliquando à septimo mense plures dies accedunt ad quadraginta, aliquādo

*Cur septi
mestres edā
tur.*

*Cur pauci
septimestres
uiuunt.*

*Cur plus
minúsque qui
dam septi
mestres par
tus afficiā
tur.*

*Cur octa
uus mensis
grauis ſit.
Cur femi
næ in conce
pus errent.*

HIPPOCRATIS LIBER

à nono Tunc enim fieri necesse est, prout contigerit mulie- D
rem in ventre concipere, tum mense, tum tempore. Mensis
autem octauus minime dubius est, secundum hunc enim cōtin
git, ut iudicatio difficilis existat. Et mea sententia pars etiā
in vndecimo mense, mensis est, ut hic satis memorabilis exi-
stat. Porro mulieribus de partibus fidem derogare nō opor-
tet, dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper profe-
runt. Neq; enim aut opere, aut sermone persuasæ sunt, sed ex
eo quod cognouerunt in corporibus suis cōtigisse. Licet au-
tem & volentibus aliud dicere, Quæ verò iudicio præditæ
sunt, & victoriā de hac sententia pronunciant, semper dicūt
ac testātur, nasci septimestres, & octimestres, & nouimestres,
& decimestres, & vndecimestres: & ex his octimestres nō su E
perstites manere. Dicunt autem & abortus plurimos in pri-
mis quadraginta diebus fieri, sed & reliqua conscripta his
accidere, in quadragenarijs, ac in singulis mensibus fieri di-
cunt. Quum autem septimo mense pelliculæ dirumpatur, &
fœtus secesserit, labores qui circa octauum mensem, & sextū
quadragenarium, in partu fieri traduntur, corripunt. hoc au-
tem tēpore præterito, quibus bene futurū est, inflammations
tum fœtus, tum matris exoluūtur, ut venter molliatur, & tu-
mor à præcordijs & laterū mollitudine descendat ad locos
inferiores, ad facilem partus tempore progressionem. & se-
ptimo sanè quadragenario plurimo tēpore fœtus isthic exi-
stunt. Nam loci ipsis molles sunt, & transmotiones ipsis fa-
ciliores ac frequentiores fiunt, & propterea ad partū magis F
solubiles consistunt, & mulieres per hos vltimos dies ex to-
to quadragenario facilius vteros ferunt, donec cōtigerit fœ-
tum verti. Postea verò dolores partus ac labores incūbunt,
donec à puero & à secunda mulier liberetur. Quæcunq; verò
mulieres multos pueros pepererunt, & quidam ex ipsis clau-
di natus est, aut cæcus, aut aliud quoddā malū habens, aiunt
in hoc puero octauum mensem ipsas difficilius transegisse,
quā in his quos pepererūt nihil mali habētes. Fœtus enim
mancus in octauo mense fortiter agrotauit, ut etiā morbus
abscessum ac ablationem siue mutilationē alicuius partis fe-
cerit, quemadmodum etiā viris fortes morbi faciūt. Qui ve-
rò fœtus in alio tēpore fortiter egrotāt, pereunt prius quā
ipsis abscessus eiusmodi fiat. Quicunque autem octimestres
fœtus

*Quid agat
partus septi-
mo mense.*

*Quare clau-
di, cæcie
partus edā-
tur.*

- A** fetus non valde ægrotant, sed iuxta vnam aliquam partem, ex secessu afflictionem pertulerunt, quadraginta quidē dies in imbecillitate transigūt, vt plurimū in vtero, propter prædictas necessitates, sani autem fiunt. Quicunq; autem natus fuerit in his quadraginta diebus, eum impossibile est superstitem manere, ægrotanti enim adhuc ipsi in vtero transmutationes & afflictiones post partum accedunt. Quicunq; verò ægrotans in vtero ad nonū mensem peruenerit, & in hoc mense natus fuerit, superstes erit. Et superuiuūt quidem non minūs hi quā septimestres, verū pauci etiam ex his educantur. Neq; enim crassitudinem habent, quā perfectissimi habent, & labores in vtero non diu antè tolerauerunt, vt tenues euaserint. Seruabitur autem vel maximè talis puer, si nouem mensium fuerit in exitu, fortior autem euadet etiā is, qui plurimū abest à morbis, qui octimestribus accidere solent. Qui enim in septem quadragenarijs nascuntur, decimestres appellari, ob id maximè educantur, quòd fortissimi sunt, & plurimū à vulgariū puerorū tempore absunt, in quo affliguntur quadraginta ægrotantes diebus, circa octauum mensem. Declarant autem de morbis & afflictionibus octimestrium, etiam nouimestres tenues nascētes. Iuxta multitudinem enim temporis, etiam magnitudo corporis cōtingit, ex morborū afflictione progressus, & non velut septimestres carnosi gignuntur, & crassitudinem probè coaltam habentes, vt qui tempus quo in vtero gestabantur sine morbis transegerunt. Verū enim uerò conceptus, & abortus, & partus mulieribus in eo tempore, in quo etiam morbi, & sanitas, & mors omnibus hominibus fiūt, hæc verò omnia partim secundum dies, partim secundum menses, partim secundum dierum quadragenarios, partim secundum annum, significationem sui præbent. In omnibus enim his temporibus insunt ad vnumquēq; & vtilia multa, & hostilia multa. Ex vtilibus igitur, sanitas & augmentū contingit, ex contrarijs, morbi & mors. Dies quidem igitur maximè insignes in plurimis sunt, primi & septimi, multū potentes in morbis, & multū in foetibus. Nam plurimi abortus in his diebus fiunt, nominantur autem tales effluxus, non abortus. Verū alij dies intra quadagesimum insignes quidem minūs sunt, multi verò iudicant. Carterū in mensibus, eadem quæ

*Qui post
enixum ui-
uant.*

*Cur maci-
lenti fiant.*

*Decime
stres cur
educantur.*

*Conceptus
& cætero-
rum decre-
torium.*

*Quæ faciāt
hæc.*

*Dierū ob-
seruatio.*

*Quantū di-
es & men-
ses possint.*

HIPPOCRATIS LIBER

in diebus fiunt, iuxta rationem insunt. Menses enim mulie-
ribus sanis singulis mensibus apparent, tanquam peculiarem
in corporibus vim mensis habeat. Vnde sanè septimi men-
ses his quæ uterum gestant, foetus in principium perfectio-
nis constituunt. Pueris verò ubi septem menses à natiuitate

*Dierū pa-
rium obser-
uatio.*

impleuerunt, tum alia vtilia in corporibus fiunt, tum dentes
in eo tempore apparere incipiunt. Eadem ratio est etiam in
decretorijs diebus, si quidē fortassis vnà cū his quos recensui
cōiungere, quis velit historiae ac cognitionis gratia referen-
tur. Etenim medicum qui ægrotorum salutem rectè conie-
ctare volet, animaduertere quidem oportet & contemplari
omnes dies, ex paribus verò decimum quartū, & vigesimum
octauum, & quadagesimum secundum. Hic enim terminus E

*Conforma-
tionis tem-
pus in ute-
ro.*

ponitur à quibusdā pro harmoniæ ratione, & integer ac per-
fectus numerus, verū ob quā causam, longius fuerit in
præsenti exequi. cōtemplari autem sic oportet per ternarios
ac quaternarios, ternarijs quidē omnibus copulatis, quater-
narios autem, duobus ad duos connexis. At verò quadrage-
narij primū in foetibus iudicāt. Quisquis enim primos qua-
draginta dies trāsmiserit, abortus effugit ex omni causa con-
tingentes, plures autem fiunt in primò quadragenario abor-
tus, quā in alijs omnibus. Hoc autem tempore præterito,
foetus fortiores sunt, & ipsorum corporis per singula mem-
bra discretio fit: & masculorum quidem partes omnes valde
conspiciæ sunt foemellæ verò in hoc tempus, carnes appa-
rent exortus ac processus solū habentes. Similia enim lon-

*Qui puellæ
d pueris dif-
ferant.*

gius tempus in simili sunt, & tardius discernuntur, propter
consuetudinem & amicitia: quanquam aliàs quum à matre
segregatæ fuerint, filia citius quā filij pubescāt, & sapiant,
ac senescant, propter corporum imbecillitatem, & victus ra-
tionem. Alter quadragenarius est, in quo circa octauū men-
sem foetus in vtero ægrotant, de quibus hic totus sermo in-
stitutus est. Tertius est, in quo ubi nascantur pueri etiā ma-
lè afflicti, si effugerint quadraginta dies, apparent magis ro-
busti ac sapientes. Nam & splendores clarius vident, & stre-
pitum audiunt, quod prius non potuerunt, tanquam incre-
mentum habeat hoc tempus, cū iuxta alia, tum iuxta sa-
pientiam ex corpore elucescentem. Peculiarem quidem sa-
pientiam in corpore inesse manifestū est, in prima sanè die.

*Quid sua-
piè natura
pueri sa-
ciant.*

Nam

- A** Nam in somnis, statim ubi nati sunt pueri, ridere & plorare videntur. Vigilantes quoque sua sponte statim rident ac plorant, prius quam quadraginta dies transeant. Non rident autem, etiam si titillentur ac irritentur, priusquam hoc ipsum tempus transeat. hebetantur enim vires in muccis: quanquam mors etiam per fatum sit sorte designata. ut hoc exēplo omnibus sit, quod omnia existentia quæ naturam ex iisdem habent, transmutationes per tempora venientia habeant. Declaratur autem in singulis, quum alia nascantur, alia corrumpantur. Porro anno finiente multi quidem morbi sunt, multæ etiam sanitates, iuxta temporis rationem, ad menses, & ad singulos dies. Septenarijs autem annorum, cum alia multa insignia corporibus fiunt, tum dentes pueris excidunt, & alij nascuntur. Quæ enim in corporibus fiunt, ea scribam.

Mors & cætera cur fiant.

Septimana in corporibus praua lent.

Principium autem huius septimestris in alijs codicibus sic habebatur.

- D**E septimestribus autem quidam sic dicit, quod negotium oculis nondum vidi, sed tantum audiui. Quo autem modo mihi fieri posse videatur, declarabo. Multæ naturæ mutationes, conuersiones, & excessus in animalibus & arbutis, cæterisque; satis, sponteue nascentibus auo perpetuo, longoque; sunt: nam alicubi iam formina & mas multis manibus, oculis auribusque; cōformati, natique; sunt, variisque; alijs formis, concreta ora, & ossa alij habentes mirandam naturæ præuaricationem, mutationem, & excessum. cuncta enim temporibus labentibus & discreta, & cōfusa & peculiaria perficiuntur. Nam secundum priscam generationem, cum omnia animantia condita & creata sunt, sic conformata fuerunt. Scitoque etiam nunc eodem modo & per eadem secundum leges & ritè cuncta conformari nascique; posse. Mihi verò (quemadmodum homini circa septimestria definienti datur) hæc statim specie, pro coeli, terraque; benignitate, quemadmodum fructus oriri videntur. Quod videre est in Aegypto, ubi omnia perfecta nascuntur, & perficiuntur, multa etiam & per annum totum omniisque; tempore terræ benignitate, calorisque; circumaggeratione, Nilive inundatione scaturiunt. Simili modo & circa animantia septimestriaque; perfecta vitaliaque; illic omnia

De mēbris agnascētib.

Terra Aegyptiæ fecunditas.

HIPPOCRATIS LIBER

Quid ad si- nascuntur. Quamobrem si quæ conceptura est, uti sibi successus **D**
militudinem sionem pariat, bene habeat, virq; ad eam rem demittendam
faciat. promptus, præstoque sit, corpus siue corporis alueus creatur
& perficitur. Collatio enim & concordia, validaq; necessitas
& vis cogit, uti perficiatur & adolescat suo satori non dissi-
mille. Nam si maior minorue, & dissimilis forma & figura
sit, illi unde orta est perfecta non haberetur. Quare dicito, sta-
tuitoue, medium quid esse in magno negotio, conformatio-
nem rysmônve. Si ergo cōformatio aliqua ad homines per-
uentura est, leni & miti modo perueniat necesse est, perq; ho-
minum commoda: si minùs, quidam præpubescunt & præ-
senescunt, quemadmodum qui præsenescunt, & si ritè & se-
cundum legem fiat. Conformatioq; cōtabescit, & ad ossium **E**
commoda, fibrarum venarum, neruorum, viscerum, intesti-
norum, vteri, cæterorumque perfectionem conuertitur. Sed
Cur o'stime forsitan aliqui perent, cur octimestria, & trimestria non vi-
stres & tri- uant? quoniam fluxi paruuliq; sunt, quædam enim sic æuum,
mes tres non & ætatem nacta sunt & per similia conformari & discerni
uiuunt. consueuerunt, quemadmodum quæ in terra feruntur & plan-
tātur. quædam enim pluribus, quædam paucioribus diebus
nascuntur secundum tempus. Tempus autem solis & lunæ
circuitu perficitur, & sequitur, nec etiam vndecimestres, nec
Temporis duodecimestres secundum eandem rationem horum viuēt.
autores sol donec pueruli sunt: nihil enim præter sua vestigia & natu-
& luna sunt. ram sit, aut adolescit, nec etiam si quid fabulentur. Sed cuius-
que conformatio, forma figuræve, & similitudo, siue rysmos, **F**
secundum naturalem legem perficitur, & ritè finitur. Nam
Quæ prius naturalis machinatio cuncta in oculos, vel aures, vel nares,
conformen- vel os transfert: quæ conformationibus his continetur, vel
tur. per alias concrectiones, syncrisisve absomit. Quare nūc periti
cū sint, conceptus omnes noscent quæ prius excogitauī.

Hippocratis.

AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE OCTI-

MESTRI PARTV, IA.

CORNARIO ME-
DICO PHYSICO
interprete.



DE octimestri partu sic sentio. Impos- *Cur octi-*
sibile esse vt duas cōsequenter succe- *mestria nō*
dētes afflictiones pueri ferre possint, *uiuant.*
& propterea octimestres non supersti-
tes manere. Cōtingit enim ipsos con-
sequenter affligi, tum ea quæ in vtero
fit afflictione, tum ea quæ in partu ac-
cedit, & ob id nullus octimestris vita

lis est. Insuper & decimestres appellatos, in septē quadrage-
narijs dierum magis in lucem edi sentio, & maximè contin-
gere vt educuntur. Nam perfectissimus est foetus in primis
quadraginta diebus, vbi verò plures accesserint, perit. Cogū-
tur enim multa in paucō tempore assumentes ac perferētes,
multum agrotare, ex quibus mors consequitur, incipit autē
laborare puer ante partum, & interitus periculum subit, quū

Quādo pas-
tus periculi-
tatur.

C in vtero vertitur. Producentur enim omnes sursum habētes
caput, pariuntur autē multi in caput, & securius discedunt ac
liberantur his qui in pedes pariuntur. Flexibiles enim corpo-
ris partes non impedimēto sunt, puero in caput exeunte. Ve-
rū quū in pedes prodierit, obturamenta cōtingunt. Ver-
siones scilicet in vtero, & alia pericula, & vmbilici puerorum
iam saepe circa colla apparuerūt. Si enim iuxta partē quam-
cunque vmbilicus fuerit in vtero porrectus, magis hac parte
puer vmbilici circūactionē, dum vertitur, faciet, quā circa
cervicē. Si verò iuxta humerū, vmbilici circūactionē retra-
hit, hoc autē vbi fit, etiā matrē magis laborare necesse est, &
puerū aut perire, aut difficilius exire. Quare multi iam pueri
principiū morbi intus nacti prodire, & cōsequenter alij pe-
rierunt, alij morbidī superuixerunt. Quicunq; verò probe ac

Melius in
caput exe-
unt.

Multi de
ventre mor-
bos trahunt

HIPPOCRATIS LIBER

*Qui probe
coalescant.*

tuto prodierint, & in conspiciuum exierint, de repente ex ne-
cessitate in ventre liberati, & crassiores ac maiores, quā pro-
ratione statim existunt, his non ex augmēto, sed laxo tumo-
re id contingit, & multi sani ex his pereunt. Si enim tumor
non residat citius quā tertio die, aut paulo serius, morbi ex
ipso fiunt. Quare etiam alimenta ac respirationes periculo-
se mutantur. Si quid enim morbidum inducunt per os & per
nares inducunt: & pro eo quod tanta ingerantur edulia quan-
ta sufficiūt, & ea etiā non superentur, multo plura ingerunt:
ut necesse sit & cogantur prae ingestorum copia, & prae ipsa
adeo affectione, qua pueri corpus afflictum est, alia quidem
per os & nares rursus exire, alia verò per intestinum ac vesi-
cam inferne transire, antea nullo horum ita cōtingente. Sed

E

& pro flatibus ac spiritibus, & humoribus ita cognatis, cum
quibus necesse est in vtero consuetudinem ac beniuolentiā
habuisse omnibus peregrinis vitur, crudioribus ac siccio-
ribus, & minus māsuetis, ut necesse sit dolores abortiri mul-
tos, plerisque etiam mortes: quandoquidem etiam viris trans-
mutationes locorum ac victus, morbos faciunt. Eadem ratio
est & de vestibus. Pro eo enim quod carne & humoribus in-
duti fuerunt, isque tepidis ac liquidis & cognatis, tales vestes
pueri induunt quales ipsi viri. At verò umbilicus per quē ali-
menti ac spiritus ingressus pueris cōtingunt, solus ex omni
corpore vtero adhæret, & per hunc introitus ac ingressus in-
gredientiū particeps sit, reliquæ partes cōiunctæ, & nō prius
apertæ sunt, quā ubi in exitu fuerit puer ex ventre. Quū autē

F

in exitu fuerit, reliquæ omnes aperiuntur, verum umbilicus
attenuatur, & cōiunct ac resiccatur. Quemadmodū autem in
his quæ ex terra nascuntur, fructus pleni ac maturi secernun-
tur, ac decidunt, iuxta discriminationem qua parte inhæret:
Sic etiam pueris maturis ac perfectis, umbilicus quidem con-
niuet ac clauditur, reliqua verò aperiuntur, ut & ingredien-
tia suscipiant, & exitus habeant secundum naturā, quibus ne-
cesse est viuentes uti. Singula enim separantur, iuxta modū
quo agmina congregantur repētia: optima autem sunt, quæ
maximè soli connutrita sunt. Ceterum decimestres & vnde-

*Mutatio lo-
ci & cibo-
rū quid pos-
sit.*

*Proprietas
umbilici.*

*Decime-
stres & un-
decimestres
& septime-*

cimestres partus, ex septem quadragenarijs eodē modo fiūt,
velut ex dimidio anno septimestres. Plurimis enim mulieri-
bus necessarium est in ventre concipere, post menstrua pur-
gamen

- A** gamenta, vbi ab his exolutæ fuerint. Oportet igitur mulieri *stres quādo*
tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio continget: & hoc *pariantur.*
tempus quibus breuissimum sit, tres sunt dies, Plerisque au- *Concepius*
tem multo plures. Sunt autem & alia multa impedimenta *uarietas.*
etiam in viris, ex quibus conceptus retardatur. Oportet autē
vel maximē hoc considerare. Quōd nouilunium quod dies
vnus existit, exactissimē trigesima mensis pars est. duo autē
dies, fermē quindecima mensis pars sunt. Tres verō dies, pars
mensis decima sunt, & reliqua iuxta horum rationem. & nō
est possibile in paucioribus partibus fieri, neque menstru-
rum solutionem, neque fœtum conceptionem. Ex his igi-
tur omnibus necessarium est plerasq; mulieres circa plenilū
B nium, & vltra in ventre concipere, vt ducenti & octoginta
dies, sæpe vndecimum mensem apprehendere videantur, tot
enim dies septem quadragenarios constituunt. Nam quum
vltra plenilunium mulier concipit, necesse est eum conceptū
vndecimum mensem attingere ac apprehendere, quo ad vl-
timum circuitum perueniat.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE SV- PERFOETATIONE, IANQ

CORNARIO MEDICO
PHYSICO INTER-
PRETE.



Quū superfoetarit mulier, si primum *Quæ supersu-*
puerum in medio vteri habuerit, su- *conciplant.*
perfoetatio elabitur, à primo ac veteri
expulsa. Si verò in altero cornu superfoe-
tationem habuerit, posterius ipsam in-
super parit non vitalem, nimirū vitali-
tate vbi vterus laxatus & humectus fue-
rit exsoluta. Si verò non statim secedat
superfoetatio, dolores exhibet, & fluxum fœtidum, ac febrē:
& facies intumescit, tibiæq; ac pedes, & si pereat, cibū auer-

HIPPOCRATIS LIBER

satur donec exciderit. Superfœtant autem mulieres, quarum D
stomachus id est vteri os, post primum cœceptum non clau-
ditur ita valde, idque apparentibus signis constat, clauditur
autem post superfœtationes quæ posterius insuper pariu-
tur. Si superfœtatio nondum partium discriminationem ha-
beat, sed caro sit, non quidem intumescit, sed putrescit do-
nec ex vtero exeat. Si cui exeat secunda pueri in vtero, prius-

*Quæ non fa-
cile & con-
trapariant.
Stomachus
iuluae.*

*Quando un-
gues desunt
puero.*

*Quo pacto
partus edu-
catur.*

*Quo pacto
partus edu-
catur.*

*Quomodo
partus mor-
tuus educe-
tur.*

quam puer foras procedere incipit, ægre parit: & magis ad-
huc periculose, si caput non præcedat. Si verò alicui vna cum
secunda puer foras exierit, & ad stomachum, id est os vteri
progressus, rupta secunda emerferit, magis facile parit. Item-
que si puer quidem foras prodit, secunda verò adhærescit, &
seipsam retrahit, atque isthuc manet. Quum puer non vita-
lis futurus nascitur, caro ipsius vngues supereminet, vngues E
verò tum in manibus, tum in pedibus deficiunt. Quum vi-
tali puero nascente manus præminuerit, primum retro re-
trudenda est, donec retruseris: & si ambæ præminuerint,
ambas retrudes, Et si crura præminuerit, etiam hoc repelles.
Vbi verò ambo crura in propatulo manserint, neque aliò
processerint, fomento uti opus est, à quo humectissimus v-
terus reddatur. habeat autem odorem ipsum fomentum. Et
quum caput in propatulo fuerit, reliquum verò corpus in-
tus erit, etiam sic fomento vteris. Et quum pars corporis in
vtero, pars in pudendis, pars extra pudenda intumescit ac
manet, etiam sic fomentum adhibebis. Et si quidem à fo-
mento processerit, satis est: sin minus, os vteri elaterio cras-
so aqua diluto oblines, quo partum producat. Sed & à poti-
bus ac cibis partus promouendus est, & pudenda ipsa cerato
illinenda, si sicciora quàm ex re est, esse tibi videbuntur.
Quum pueri capite ex stomacho apparere, reliquum corpus
procedere non vult. puer autem mortuus est, digitos aqua
madefactos inter stomachum ac caput immittito, & in or-
bem circumducito, deinde subditum sub mentum digitorum
in os intrudito, ac foras trahito. Quum verò reliquum cor-
pus extra pudenda fuerit, caput autem intus, in pedes videli-
cet prodeunte factu, postquam digitos in orbem circumdu-
xeris, ambas manus inter stomachum ac caput aqua præma-
defactas immittito ac extrahito. Si verò extra stomachum
fuerit, verum intra pudenda, immisis manibus apprehen-
sum

- A** sum capite educito. Si porrò foetus intus maneat mortuus, & non possit neque sponte, neque per medicamenta iuxta naturam excidere, manu cerato maximè lubricante vncta, deinde in vterum intrusa, humeros à collo magni digiti conamine deducito. Oportet autem ad huiusmodi etiam vnguem instrumentum in magno digito habere, & distractione facta manus educere, deinde rursus immissa manu, ventrem diffindere, & ex diffisso intestina sensim eximere: deinde his exemptis latera confringere, quo confidens corpusculum leuius ac expeditius fiat, & facilius exeat non tumidum existens. Cæterùm si secunda non facilè excidat, maximè quidem ad foetum appendere sinenda est, & puerpera
- B** velut super sella ventri exonerando destinata, lasanum græci vocant, locanda. Sit autem in altum extructa sella, vel simile quiddam, quo foetus dependēs gravitate sua secundam simul extrahat. ~~Sensum autem hoc faciendum est~~, nō violenter, ne præter naturam diuulsa, inflammationem inducat. Substernere igitur lanas molles quàm maximè recens carminatas foetui oportet, quo paulatim remittant ac confidant, Aut vtres duos copulatos aqua plenos supponere, & suprà vtres lanas insternere, & suprà has puerum. deinde vtrunque vtrum stilo perforare, quo paulatim aqua effluat, effluente autem aqua, vtres remittunt ac confidunt, confidentibus autem vtribus, foetus vmbilicum attrahit, vmbilicus verò attrahit secundam. Si verò suprà lasanum, vel simile quiddam puerpera sedere nequeat, super reclinatam sellam perforatam collocetur. Si verò adeò debilis est, vt omnino sedere non possit, lectum, quàm erectissimum à capitis partibus struemus, vt deorsum declinet ac repat, & sic foetus gravitas quàm maximè simul secundam trahat. Verùm puerperam sub alis, foris ad lectum fascia, aut loro lato ac molli, alligare oportet, vt ne quum erectus sit lectus, corpus ipsius deorsum feratur. Iuxta eundem autem modum etiam si vmbilicus abruptus sit, aut etiam ante tempus recisus, moderatè grauib. ponderibus appensis, secundæ eductionem facere oportet, Optima enim hæc curatio in talibus existit, & minimè lædit. Si cui puer in vtero immoriatur, & non egrediat. ur humido vtero existēte, & quum iā nō habeat ampliùs humiditatē, sed siccatus fuerit vterus, primū quidē intumescit
- puer,

*Secūda qui
extrahatur.*

*Quid faciat
umbilicus
ruptus, uel
ante tēpus
abscisus.*

HIPPOCRATIS LIBER

puer, deinde colliquescunt ac putrescunt carnes, forasque ef-
fluunt, postremum autem ossa procedunt : & fluxus aliquan- D
do corripit, si non prius moriatur. Quū puer immortalis fue-
rit, tum alijs signis coniectare id licet, tum iubere, vt aliquā-
do in dextro latere iaceat, aliquando in sinistrum transmu-
tet. Translabitur enim in vtero puer eo quod mulier se vertit,
velut lapis aut aliud quiddam, si mortuus fuerit, & pectinem
frigidum mulier habet. Si verò viuat, & pecten calidus est, &
venter totus translabitur vna cum reliquo corpore extētus,
& in ipso nihil translabitur absq; reliquo corpore. Si cui
ex partu laboranti fluxus multus sanguinolentus citra dolo-
rem, ante puerum prodeat, periculum est puerum mortuum
exoluumdum esse, & non vitalem processurum. Prægnanti- E
bus mulieribus plerisque stomachus vteri propè extat an-
te partum. Mulier prægnans si non coitu utatur, facilius à
partu liberabitur. Quæ gemellos gestat, eadem die parit
velut concepit, habet autem utrosque pueros in vna secun-
da. Muliere agrè pariente, si puer in genitalibus locis hæ-
reat, & non facile exeat, sed cum labore ac medici machina-
mentis, tales pueri modicæ vitæ sunt. horum vmbilicum se-
care non oportet, priusquàm mingant, aut sternutent, aut vo-
ciferentur, sed sinendi sunt, & mulier proximè apud puerum
permaneat, & si sitierit, aquam mulsam bibat, & si vmbilicus
infletur velut stomachus, & moueatur aut puer sternutet, aut
vocem rumpat, tunc sanè secetur dum puer respirat, si verò
non infletur vmbilicus, neque moueatur tempore acceden- F
te viuet. Prægnantem mulierem si aliter non cognoscas,
oculi tracti & cauiore sunt, & candidum oculorum albedi-
nis naturam non habet, sed liuidius existit. Si qua partui
vicina sit, & oculos cauos habeat, & facies intumescat, & ipsa
rota itemque pedes tument, vt velut à pituita alba appre-
hensa appareat, & habeat aures albas, & summum nasum al-
bum, & labia liuida, ea ipsa mortuos gestat quos pariet, aut
viuos prauæ, & nō vitales, & exangues, vtpote morbosos, aut
prius peperit non vitales. Huic sanguis in aquositate con-
uersus est. Oportet igitur tali post partum odorata in vuluā
appondere, & comedere ipsam ac bibere odorata. & primum
in facie nasus summus insignis euadit, ac colorem recipit. Si
qua prægnans terram edere concupiscat, aut carbones, eaque
edit, in

**Partus im-
mortui si-
gna.**

**Cum fluor
eructus par-
tum præce-
dit, pericu-
lum est.**

**Quæ facile
pariant.**

**Quādo um-
bilicus non
statim secā-
dus est.**

**Signa gra-
uida.**

**Quæ pari-
tū mortuum
gestet.**

**Quom gra-
uida ter-**

- A** edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum à talibus apparet. Mulierem id nosse expedit, vtra mamma ipsi maior est, illic enim fœtus existit. Similiter autem & oculum considerabit. Maior enim & splendidior omnino erit intra palpebram, etiam eius partis cuius mamma maior existit. Si cui ab apposis in vuluam non valde fortibus, dolores in articulos perueniant, & stridor dentium corripiat, & membris tendatur, ac oscitat, hâc magis cœcepisse spes est, quàm eam quæ nihil tale pariat. Mulier quæ præter naturam crassa est, ac pinguis, & pituita repleta, non cœcipit hoc tempore. Quæ verò ex natura talis est, horum gratia concipit, si non aliud quiddam ipsam impediat. Mulieribus plerisque quum menses apparituri sunt, stomachus vteri in seipsum contrahitur, magis quàm alias. Mulier quæ facillè concipiebat, si prægnans esse desijt, bis per annû à manibus ac cruribus venam secari sinat. Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint: quum verò prægnans est, desinunt, conceptu autè ab vtero exoluto rursus insunt, odorata & bibere, & ad vteri os apponere conducit. Quum mulieri alicui conceptus gratia medeberis, ubi purgata esse videbitur, & os vteri rectè habuerit, lauetur, & caput confricetur, nullo autem vngvine illinatur, deinde linteam inodorum lotum circum capillos ipsos circumdatum, reticulo loto aut nihil olenti obliget, ita vt primùm linteam ipsum capiti imponatur, postea quiescat galbano ad vteri stomachum appposito, quod coctum ac molitû sit ad ignem, & non ad solem. Deinde manè deposito reticulo cùm linteo, verticem suum alicui olfaciendum exhibeat, & si quidem oluerit, probè purgata est, sin minus, malè. Hæc autem ieiuna faciat, & si non fecunda fuerit, nunquam olebit, neque purgata, neque aliàs, & si prægnanti idem medicamentum apponatur, neque sic probè olebit. Quæ verò prægnans futura est frequenter, & facillè concipit, ac sana existit, etiam si non apposueris neque purgaueris, vertex ipsius olebit, aliud verò nihil. Vbi autem omnia probè videbuntur, & ad virum accedere oportuerit, mulier ipsa ieiuna sit, Vir autè non ebrius, frigida lotus, & commodo alimento nutritus. Et si cognouerit mulier genituram se cœcepisse eo tempore virum non accedat, sed quiescat. Cognoscat autem si quidem vir se emisisse

ram vel car
bones edut,
quid ene-
nial.

Quæ parte
sit partus.

Crassa
præter na-
turam cur-
non concipi-
piani.

Conceptus
quæ parietur.

11
NOTES

21
NOTES

HIPPOCRATIS LIBER

emississe dixerit, ipsa verò præ siccitate ignorauerit. Si verò D
vterus rursus in pudenda genituram reddat, ipsaque hume-

*Cur quædã
partus bi-
mestres, vel
maiores
perdant.*

ta fiant, rursus cum viro coeat, donec concipiat. Mulier
quæ concipit quidem, perdit autem fœtus bimestres, exactè
in eodem tempore, & neque priùs, neque posterius, atq; hoc
iterum atque iterum perpeffa fuerit, imò si etiam trimestres
aut quadriestres, siue verustiores perdiderit, iuxta eundem
modum, Talibus vteri puero augefcente, & bimestre aut tri-
mestre, aut quantũcunque tempus transgrediente, si quando
etiam aliàs augefcit, in maiorem amplitudinem non porri-
guntur, ita vt non ampliùs sufficiãt capiendò fœtui, sed pro-

Medela.

pterea perditur eodem tempore. Huic cucumerarium medi-
camentum in vterum dare oportet, ipsumque distendere ac E
inflare pharmacis apposititijs hisce. Cucumeris syluestris
medulla contundatur ac cribretur, deinde modicum de ipsa
melle cocto copiosiori misceatur, addito sulphio modico: sit
autem velut dixi, mel coctum, hoc circum specillum obli-
natur, crassitudine formata quantam vteri stomachus suscipere
potest: apponatur autem ad os vteri, & impellatur quo in in-
ternam vteri partem penetret. Quum verò colliquerit me-
dicamentum, specillum extrahatur. Sed & elateriũ hoc mo-
do præparatum apponere potes, Similiterq; colocynthidem
syluestrem. Per hoc autẽ tempus edat allia quàm plurima, &
sulphij caulem, & quicquid flatum in ventre inducit. Hoc ap-
posititium pharmacum per tertiam diem apponatur, donec,
probè habere visa fuerit, copia quantam vterus admittit. In F

*Purulentæ
vulvæ caus-
sa & me-
dela.*

teriectis diebus, mollientibus vtendum est: postquàm autem
ex mollientibus præparatum fuerit os vteri, post mensium
apparitionem vbi sicca fuerit, cum viro commisceatur. Si cui
vterus suppuratus fiat, aut post partũ, aut ex abortu, aut quo-
modocunque aliàs, & non in vase alio ac tunica, velut in tu-
berculo solet, pus fuerit: huic conducit specillum vnetorium
in vteri os demittere. Minus enim opus fuerit vstura, si ad spe-
cillum processerit, deinde erucas à thymalide colliges: ha-
bent autem velut aculeos quosdam, quos leniter rescindes,
ne pabulum internum ex ipsis elabatur, deinde siccabis ipsas
in sole, ac teres. Vermes quoque stercorarios similiter in so-
le siccabis ac teres, & erucæ quidem pondus duorum obolo-
rum Aeginæorum, vermium verò duplum miscebis, modico
aniso

*Eruca ti-
thymalidis.*

Scarabæi.

- A** aniso addito, aut aliquo eius generis. Nam mali odoris medicamentum euadit. Hæc autem læuia facta ac contrita vino albo odorato diluito, Et postquam biberit, grauitas accedit, & torpor in ventrem irruit. Si itaque accedit, aquam mulsam modicam insuper bibat. Si qua liberis carens, imprægnatione ac puerorum generatione indigeat, atque ea iam prægnans fuit ac peperit, & hoc ipsi contingat, aut quum stomachus vteri siccus, aut summa parte affectus, aut conclusus fuerit, aut non rectè habuerit, sed ad coxëdicem alterum distortus, aut ad rectum intestinum occultatus, aut in seipsum contractus fuerit, aut labium stomachi sibi ipsi vtcunq; incubuerit, aut stomachus vteri asper & callosus fuerit: durus autem fit, & à conclusionē, & à callositate: his menses non apparēt, aut pauciores quàm oportet, & per longius tempus apparēt. Sunt autem in quibus etiam menses iuxta corporis sanitatē, & vterorum exitum reperiuntur, imò consueto & iusto modo, & stomacho vteri præ caliditate ac humiditate mensium non valde læso. Verùm genituram non suscipit propter hæc læsionem, quæ impedit susceptionem, stomacho non rectè habente. Huic per totum corpus fomentum adhibere oportet, & pharmacum bibendum dare, ac corpore primùm purgatam ac mundam reddere, siue supernè & infernè opus habuerit, siue supernè solum. Et si quidem supernè purgans medicamentum dederis, fomentū ante purgationem non præmittes. Verùm fomentum adhibebis infernè purgaturus. Si verò supernè purgante medicamento non egere videbitur, præmisso fomento, infernè purgans bibendum dato. Cùm autem probè purgatum esse corpus videbitur postea vtero fomentum adhibeto, frequentes infusus ipsis adornans, si ita conferre videbitur. Immittes autem in fomentum, cupressi ramēta, & lauri folia cōtusa, lauabisq; multa & calida aqua. Vbi verò recens lauta fuerit, & fomentū admiserit, vteri os dilatabis specillo stanneo, corrigesq; vbi opus fuerit: potes & plūbeo vti, initio per paruum factō, deinde crassiore adhibito si suscipere potest, donec rectè habere videbitur. Intinges autem specilla in mollitorio quopiam diluto, aut etiam liquido reddito, si conferre videbitur. Specilla ipsa retrò caua faciendā sunt, deinde circū ligna longiora adaptāda, sicq; ipsis vtendū. Cæterū hoc tēpore bibat, in vino albo odorato dulci

*Conceptus
reparatio.*

*Quæ conce-
ptum impe-
diant.
Medela.*

*Specillum
quale in his
vult esse, mi-
detto.*

HIPPOCRATIS LIBER

dulci & quàm suauissimo decoctam tædam quàm pinguisi
mam, in tenuia segmenta concisam, & apiij semen cõtusum,
& cumini Aethiopici semen, & thus quàm optimum, ex hoc
bibat ieiuna copia quanta moderata esse videbitur, tot die-
bus quot latis habere videbitur. Et edat catulos coctos, & po
lypum in vino dulci coctũ, iusculumq; ipsum bibat, & bras
sicam coctam, Vinum autem albũ insuper bibat, & ne sitiat,
& calida bis per diem lauet. A cibis autem hoc tẽpore absti
neat, ab eo verò tempore si quidem processerit per stoma
chum, & quid purgationis foris apparuerit adhuc de potione
bibendum est vnum atq; alterum diem, & à specillorum vsu
desistendum, ac conandum. vt vteri apposititijs medicamen
tis purgentur. Cuicumque autem stomacho recto, ac magno **E**
& sano existente, ac probè habente, & in loco vbi conuenit
& oportet sito, menses non apparuerint ex toto, aut paucio
res, & per longius tempus, & non sani, morbum ipsum inue
stigabis quemcunq; tandem vteri habent, & si corpus quoq;
aliquid conferat, causam perscrutaberis ob quam non concipit:
& hæc sic habeant, & curationem facies si medelam sus
cipere volet, initio à fortibus factò, prout opportunum vi
sum fuerit, ita vt desinas in molliorum vsu, donec vterus vi
sus tibi fuerit probè esse purgatus, & stomachus recto statu
esse constitutus, & ritè situs. Si verò à potu ac medicamento
menses non processerint, etiam si moderato tempore id bi
berit, nequaquam à potu cessandum est: vbi verò probè ha
buerit, specillorũ vsu os stomachi molliendum est, & facien
dum vt hier, ac viam præbeat appposito medicamento, idque **F**
pharmacis suffitui aptis ac mollientibus perficies. Quum au
tem satis suffitum ac mollitum esse videbitur, appposito me
dicamento subdititio vteri purgationem facies, donec ritè
habere videbitur, à mollibus ad fortiora progressu factò, ita
vt rursus in mollibus ac odoratis desinas. Nam pleraque ex
fortibus medicamentis stomachum exulcerant ac corrodũt.
Deinde verò tum stomachum ad rectum statum ac sanitatẽ
redigito, quo aptus sit ad suscipiendam genituram, tum vte
rum siccum reddito, & statum immittito. Si mulier præ pin
guitudine vterũ ad cõcipiendũ læsum habere videatur, atte
nuatio quàm maximè, & gracilitas inducatur, suprà reliquã
curam. Tempus porrò vernum aptissimum est ad concipien
dum

*Stomachus
locellorum.*

*Cum pin
guedo cõce
ptum impe
dit, quid a
gendum sit.*

- A** dum. Vir autem non sit ebrius, neque vinum albū bibat, sed quod fortissimum est ac meracissimum, itemq; edulia fortissima, & calida non lauet: robustus autem sit, & sanus, & à cibis abstineat ad rem non conferentibus. Et vbi marem generare voluerit, mensibus desinentibus aut defectis misceatur, & quā penitissime intrudat, donec defauiat. Vbi verò foemellam generare volet, quum plurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat, ac dextrum testem obliget, quantum id tolerare poterit: sed si marē generare expectat, sinister testis obligandus erit. Stomachus vteri à suffimētis quidem, vbi conclusus fuerit, hians redditur, ab emollientibus verò mollescit. Suffire autem oportet, loti corticem, lauri semen siue baccas, & folia eiusdem viridia contusa, thus myrrham, artemisiæ semen aut folia: item anisum & adipem aut ceram simul contusa, sulphur, cupressi semen, peucedani radicem, myrti folia viridia contusa, fibri testem, asini masculi stercus, allia, styracem, adipem suillum. sed & si distortum os vteri fuerit, his suffiendum est. Sic quidem igitur hians redditur ac conuertitur. Mollire autem per hæc vteri os oportet, sandaracham videlicet, adipem caprinum, fici succum, silphij succum, cyclamini succum, Thapsiam, succum tithymalli, cardamoni semen, herbam quæ peplos appellatur, fibri testem, lini semen, nitrum, ari radicem, staphidem syluestrem, calamithæ folia viridia, herbæ lanariæ siue struthij semen scillæ internam partem.

C *Medicamenta emollientia, & ad ciendum idonea, quo fortis purgatio fiat.*

Thapsiæ radicem, medullam bouis, adipem anserinum, rosaceum, hæc trita ac feruesfacta per quatrimum apponat, & bibat porri succum, ac vinū dulce album. Item resinam, & oleum tepidum, cuminū, nitrum, mel, sordida lana excipiat, & per quatrimum vtatur, bibatq; apij semen, & thuris nucleos quinque, & cuminū Aethiopicum in vino albo meraco dulci, lauetq; bis per diem. Item myrrham, thus, fel bouis resinam terebinthinā, aut netopon siue metopium vnguentum, horum singulorū æqualem mensurā misceat, & in lana pura, aut linteo tenui apponat. Intingat autē linteū in vnguento albo Aegyptio odorato, & filo obligatū, à balneo subdet,

Quo modo mas foeminae generandus.

Simile quid præcipit Columella in ouibus.

Quæ leniāt asperent, claudant aperiantque uulua, locellosue.

Medicamina purgantia locellos.

Diuersa locellorū purgantia.

HIPPOCRATIS LIBER

& polypum plagis molitum edat, & apij ac asparagi semen D
ac vinum album bibat, ter in die ieiuna existens. Aut myr-
rham, caliam, thus, cinamomum, netopum, singulorum equas
portiones lana exceptas, aut in glandes redactas apponat.

Aut cucurbitæ sylvestris interiora, cuminum tostum, ane-
thi semen, cupressi radicem, trita ac melle cocto subacta in
glandes cogito, easque subdendas exhibeto, & bibat Pæoniæ
radicem, apij semen, ac silphij succum, cum vino. Sed & Bul-
bium ipsum subditum purgat. Item myrrham primariam,
& florem æris modicum in vino albo odorato subdat.

Medicamenta subdititia ad uterum pur- gandum conuenientissima.

E
A Ccipe æris florem ac nitri tertiam partem, melleque
cocto subacta in glandulas iustæ magnitudinis ac cras-
situdinis redige, atque sic ad vteri osculum appone. si verò
fortius facere velis, elaterium ammisce, ad florem solum, &
hoc modo coactas glandulas subdendas præbe. Potes & ra-
mulorum fici corticem derafum ac tenuiter tritum ammi-
scere, quum os vteri siccius esse videbitur, dimidia portione
eodem modo. Aliud. Elaterium & æris florem trita,
duabus floris partibus, vna elaterij acceptis, dilue, & cycla-
minum tritum prout oportunum videbitur ammisce, & in
lana simul coacta subde.

Glandulæ album fluxum purgantes.

F
A Rtemisiam herbam, nitrum, cyclaminum semiaridum
cuminum, subde. Alia. Artemisiam herbam viri-
dem tritam, & myrrhæ tertiam partem, ammixto vino odo-
rato, in lana alba obuolue, eamque vino tinctam apponendâ
præbe. Vbi verò hiauerit vterus, nitrum, cucumeris sylue-
stris medullam, cyclaminum semiaridum, in lana appone.

Subdititia omnis generis purgare potentia.

S Taphidem sylvestrem viridem tritam, artemisiæ herbæ
folia trita, melle cocto excipe, & in umbra siccata in glan-
dulas coge, ac subdendas exhibe. Aliud. Florem æris, &
alumem Aegyptium cum cyclamino dilue, & velut priora
melle cocto excipe, aut in carinam inde, cum modica myr-
rha. Aliud. Cyclaminum tritam vino albo odorato am-
mixto, in linteo tenuissimo puro obliga, & subdendâ præbe.

Aliud

A Aliud. Cyclaminum semiaridum, nitrum, cantharidas, adipem, sandarachen, subde.

De uirgine.

SI virgini menses maturi non prodeant, multum & febricitat, & dolet, & sitit, & esurit, & vomit, & furit, & rursus resipiscit: vterus mouetur, & quum ad viscera vertitur, vomitus, ac febris, & delirium accedit, vbi vero sedatur vterus, & hæc quiescunt, esurit, ac sitit, & febris lenis, hepialon græci dicunt, tenet, Huic pelles agninas calidas ad ventrem apponere oportet, & suffitum facere in ipsa pudenda quàm penitissimè, ita vt super amphoræ collo desideat, & fumum admittat. **B** Fiat autem suffitus ex myrrha magnitudine fabæ, & thuris dupla portione, ammixta etiam zea fresa, hæc simul suffire debet, & in ignem immittere maximè dum ieiuna est, & multa calida lauare.

Medicamentum subdititium.

A Lumen Aegyptium emollitum lana inuolutum subdat. Aliud. Artemisiâ tritam, & vino albo subactam, apponendam præbe.

Puerperæ recens enixæ.

Rosaceum, myrrham, ceram, mixta in lana apponenda præbe. Vbi autem vterus ipsi prociderit, acida & acerbâ offerenda sunt, tum potanda, tum foris adhibenda. Item **C** ficum nigram, allium, nitrum, cuminum, hæc omnia tenuiter trita in lana apponenda dato. Aliud. Sepiæ testam tufam, & vino imbutam, cum leporinis pilis, lana excipe, & apponendam præbe. Si verò post partum vterus doleat, ptisanam, & porrum, ac adipem caprinum coquat, indeque modicum sorbeat. Subdititium medicamentum. Nitrum, cuminum, ficum, omnium æquas portiones subde. *Cum uter-
us pro-
cidit.*

Subdititium purgans & molliens.

Netopum, rosaceum vnguentum, adipem anserinum, linteis tenuibus excipe. Si menses multi prodeunt, *Fabius
Caluus' le-* Paxonix grana nigra bis septè numero, in vini cyathis duobus bibenda præbe. Si verò vteri frequenter prolabantur, *git, Si men-
jes multi nō
prodeunt.* vteros aqua tepida madefacies, ipsam verò mulierem supinam reclinabis, miscebisque mali corium, gallam, & rhoem prodeunt.

HIPPOCRATIS LIBER

rubram, hisque in vino albo tritis vteros illines, ac immit- **D**
tes. Postea lauri folia in vino austero bibenda dabis. Quam au-
tem mulier prægnans menses profuos habet, sterco asini
siccum, & rubricam, ac sepiæ testam, trita simulque linteo
illigata apponat, si verò secunda non purgetur, elaterij oboli
Attici pondus in vini albi Cyathi mensura tritum biben-
dum præbe, & purgabitur.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE EXECTIONE

NE FOETVS, IANO COR

PHYSICO PHY-

INTER

PRETE.

E

*Partus fru-
stulatum ex-
tractio.*



DE his qui non iuxta naturalem modum pa-
riuntur, sed excinduntur, hoc modò se res ha-
bet. Primùm quidẽ Sindone suprà mulierem
iniecta, eam suprà mammas circumdato, & ca-
put obuelato, ne videns quòd facturum es ti-
meat ac exhorrescat. Si itaque foetus oblique prolapsus ma-
num protensam habuerit, manu apprehensa foras producere
quàm maximè conare, & brachium ipsum excoriato, atque
vbi os brachij denudaueris, squatinæ pellem circũ duos ma- **F**
nus digitos obligato, ne caro lubricitate sua elabatur. Dein-
de verò carnem circa humerum rescinde, ipsumque iuxta
iuncturam exime, post ea caput iuxta naturã protrusum fo-
ras producere tenta, foetũ verò ipsum intrò protrudito, fer-
ramento per latus & costas, siue clauiculam adacto, quo fla-
tum emittat foetus, & confidat ac contrahatur, atq; ipsi faci-
lior exitus pateat. Cæterum caput si fieri potest iuxta natu-
ram extrahe, sin minùs, confringe: atque sic foetum vnà sub-
extrahe. Postea calida largè perfusam, & oleo illitã decum-
bere iubeto, pedum situ alternatim variato. Bibat autem vi-
num dulce, album, meracius temperatum. Sed & resina mel-
le trita ac vino ammixta, in potu præbeatur. De cæterò verò
curanda est, velut dixi, iuxta ea quæ relata sunt. Quum verò
parienti

- A** parienti mulieri foetus obliquè prolapsus fuerit: id quod contingit dum vertitur puer, & vmbilicus circum collum obuoluitur, & exitum foetus impedit, & caput in coxendicem incumbit, & manus vt plurimum foras prominet, quod ipsum mortui foetus signum est. Quibus autem manus non exerta est, vt plurimum viuunt foetus, periculum autem etiam hoc modo est. Alique enim purgamenta ante partum mittunt, & necesse est cognoscere ex eo partum siccum, & cum dolore laboriosum esse. Quibus autem purgamenta ante partum non prodeunt, hæc in pariendo facilius liberantur. Concutere porro oportet hoc modo. Sindone substrata mulierem reclinabis, & aliam superiniicies, quo pudendum ipsius sit obuelatum, obtoluesque sindonem circum vtrunque crus & circum vtranque manum. Mulieres autem duæ vtrunque crus apprehendant, & aliæ duæ vtranque manum, deinde concutiant validè ipsam tenentes non minus quàm decies. Postea in lectum reclinetur mulier in caput, ita vt crura sursum vergant, & mulieres omnes ipsum pedibus corripiant, manibus dimissis, saepeque concutiant, ac reiectionem in humeros faciant in lecto, quo foetus in spaciosiorem locum retrusus vertatur, & naturaliter prodire possit. Et si dictamnū creticum habueris, ipsum bibendum dabis: sin minus, fibri testem in vinum chium derades. Si verò vteri foras prodierint, siue ex dolore, siue ex partu, si quidem iuenculæ fuerint, aggressiorem facito: sin minus, finito. Aggressio autem hoc modo fiat. Pelliculam vteri iuxta naturalem modum & obliquè incisam, linteo confricato donec inflammetur, & illinito phocæ oleo siue adipe, aut pice, aut mali punici flore integito, & molles spongas vino resperfas apponito, & ex humeris ipsas alligato. Mulier verò decumbat cruribus quàm maxime sursum versus porrectis. Moderatis autem edulij vescatur.

*Parus dire
ctio.*

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE DENTI-

TIONE, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-


SICÒ INTER-

PRET.

*

*Carnosi,
minis lac-
tis hau-
riunt.*

*Dēitionis
maritas.*



Veri natura habitiores, non pro carno-
sitatis ratione etiam lac sugunt. Vora-
ces verò & multum lactis trahentes, **E**
non pro ratione carnosi fiunt. Pueri su-
gentes si multum mingant, minimè an-
niculi fiunt. Quibus aluus multum
profluit, & bene concoquunt, hi sanio-
res sunt.

Quibus modicè profluit, & voraces sunt, & non pro
ratione similiter nutriuntur, morboſi. Quib⁹ multū lactosum
reuomitur, his aluus ſupprimitur. Quibus in dēitione aluus
ampliùs ſubducit, min⁹ cōuelluntur, quā quibus parū. Qui-
bus in dentitione febris acuta accedit, parum conuelluntur.
Quicumque dentientes habitiores manent, & altiore ſomno
vtuntur, periculum eſt ne conuulſione corripiantur. Qui
hyeme dentiunt, reliquis ſimilibus exiſtentibus, meliùs libe-
rantur. Non omnes in dentitione conuulſi moriuntur, ſed **F**
multi etiam ſeruantur. Qui cū tuiſſicula dētiunt, tardius
dentes produciunt, in perpuñctione autē magis gracileſcunt.

Quicumque in dentiendo hyemem habent, ſi attente tra-
ctentur, dentitionē faciliùs ferunt. Qui plus mingunt quā
egerunt, pro ratione habitiores ſunt. Qui non pro ratione
mingunt, verū aluus frequenter cruda à pueris egeſſit, mor-
boſi ſunt. Qui bene dormiūt, & habitiores ſunt, multū ali-
mentum adſumūt, idq; adiacet, nō ſufficienter diſtributum.

Qui dū ſugunt interim cibū adſumūt, faciliùs ablaſtatio-
nē ferunt. Qui ſæpè cruenta ac cruda per aluum egerunt,
plurimi in febre ſomniculoſi ſunt. Vlcerà in tonſillis *citra*
febrē facta, ſecuriora ſunt. Quibus infātib⁹ in ſugendo
tuiſſis inſtat, vuā maiore habere ſolēt. Quibus citò in tōſillis
vlcerà

*Tonſillarū
ulcerà.*

A vlcera serpentia confidunt, febribus ac tussi permanentibus, periculum est rursus generanda esse vlcera recurrentia. Vl-cera tonsillarum in infantibus periculosa. Pueris memorabi-lis magnitudinis, si vlcera in tonsillis sint, & deglutire pos-sint, salutis signū est. Quum verò maiores prioribus, deglu-tire in tonsillarum vlceribus non possunt, his multam bilem reuomi, aut per aluum prodire, periculosum est. In vlceribus tonsillarum si quid arenosum inest, non bonum. In tonsilla-rum vlceribus post prima tempora, pituitam per os effluere, si prius non fuit, commodum est, & tamen reducenda est. Si verò incipiat, & omnino remittat, gaudendum est. Si autem non sic effluat, vereri oportet. Qui tonsillas destillatione ve-xatas habent, his aluus amplius subducta, siccas tussēs soluit. Verū pueris si quid concocti supernè prodierit, amplius sol-uit. Vl-cera multo tempore in tonsillis citra augmentū ma-nentia, ante quintum aut sextam diem periculosa non sunt. Sugentes qui multum lactis adsumunt, ut plurimum sonni-culosi sunt. Sugentes qui non probè aluntur, macilenti fi-unt, & ægrè vires recolligunt. Vl-cera in tonsillis ætate fa-cta, peiora sunt quàm alijs temporibus, citius enim proser-punt. Vl-cera in tonsillis circa vuam proserpentia, in his qui seruantur vocem alterant. Vl-cera proserpentia circa fauces, grauiora & magis acuta, ut plurimum spirandi difficultatem inducunt.

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE COR- PORVM RESECTIONE,

IANO CORNARIO
MEDICO PHY-
SICO IN-
terprete.

*

Arteria.

Pulmo.

Cor.

*Magna ue-
na.*

Hepar.

Rhenes.

Vesica.

Gula.

Stomachus

Septum.

Lien.

Venter.

Colon.



Rteria ex vtraq; faucium parte exortum fa-
ciens, in summitatem pulmonis definit, cir-
culis composita consimilibus rotundis, in E
superficie se mutuo cōtingentibus. Ipse au-
tem pulmo testitudinē coadimplet, in sini-
stram cōuersus, quinq; apices habens, quos
lobos & summitates vocant, cinereo colore præditus, notis
cauernosis cōpunctus, naturaq; antrosus existens. Ad mediū
verò ipsius cor situm est, rotundius ac oblongius quàm in o-
mnibus animalibus. A corde verò ad hepar multa chartila-
ginosa arteria procedit, & cum ipsa vena magna appellata,
per quam totū corpus nutritur. Hepar autem similitudinem
quidē cum omnibus alijs habet, verū sanguinolentius quam
alia existit, apices habens duos, quos portas appellant, in de-
xtris locis sitas. Ab hoc verò obliqua vena infernē ad rhenes
tendit. Rhenes autē consimiles colore, malorum speciē præ F
se ferunt. Ab his canales obliqui ac fermē triangulares in
summum vesicæ apicem tendunt. Vesica autem tota neruo-
sa est, magna; ac latē se extendens capacitas intra eam à na-
tura disposita est. Et has sex partes intus per medium corpus
natura disposuit. Gula autem à lingua principium faciens, in
ventrē definit, quam sanē Græci etiā œsophagum, & stoma-
chum, id est os ventris, significanter appellant. Cæterum
à spina retro hepar, septū transversum productum est. Ex la-
tere verò notho, sinistro videlicet, lien initio sumpto extētus
est ad humani vestigij similitudinē. Venter autē hepatis ad-
iacens iuxta sinistram partem, totus quidē est neruosus. A ven-
tre verò extat intestinum ventri consimile, longum cubito-
rum non minus duodecim, pampino formiter in sinibus in-
uolu

A uolutum, quod aliqui colū vocant, per quod alimenti delatio contingit. A colo autem situm est rectū ac princeps intestinum postremū, carnem copiosam habens, & in summū anū desinens. Reliqua porrò natura ipsa ordinauit ac disposuit.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE COR-

DE, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

INTERPRETE:

B

*



Or figura velut pyramis est, colore autem abundè puniceum, & tunicam leuem circū datā habet, & est in ipsa humor modicus velut vrina, vt putare possis in vesica cor diuersari. Facta est autem ea gratia, vt sanū in custodia florescat. Habet autem humi-

Cor quale cordis unguis.

ditatem tantā quantā satis est æstuanti in medelam. Cæterū hunc humorem cor emingit, bibendo ipsum assumens ac cōsumens, pulmonis nimirū potū lambens. Eetnim homo multo maximā partē in ventrem bibit. Gula enim siue stomā-

Paulo cor benectas.

chus velut infundibulum, potus copiam & quæcunq; volumus excipit. Bibit autem & in guttur ac arteriam, minus vero & quantum latere possit per rimam illapsū, Operculū enim exactum epiglossis, lingula siue minor lingua appellata, ne permiserit quidem aliquid amplioris potus penetrare.

Stomachi effigies.

Signum autē huius rei, hoc est: Si quis enim aquam cæruleo colore, aut rubrica temperatā, sitienti valde bibēdā dederit, maximè sui, hoc em̄ pecus non est curiosum, neq; mundiciei deditū. Deinde dum adhuc bibit ipsius guttur reseceat, hoc colore ipsum tinctū reperiet: sed nō est cuiusuis hæc chirurgiæ aggressio. Nequaquā igitur fides nostra suspecta esse debet de potu, quòd homini in guttur vergat. Sed quomodo aqua acernatim irruens, turbationē ac tussim multā exhibet: propterea inquā, quòd cōtra respirationē fertur. Quod enim per rimā illabatur, tanquā iuxta parietē delabens, aeris elationi

Epiglossis

Beatus ab exemplo.

HIPPOCRATIS LIBER

non instat, sed leuem ac lubricā quādamviā humectatio ipsi D
præbet. Hūc itaq; humorē cor de pulmone vnā cum aère ab-
ducit. Aërem quidē igitur vbi in medelā celsit, necessariō o-
portet retrō per eandē viam qua adduxit reijcere. Verū hu-
morem partim in culeū ac vaginā suā expuit, partim rursus
vnā cum aère foras propellit. Quapropter etiā palatū eleuat,
quū spiritus recurrit. Meritō autē recurrit. Non enī humanæ
naturæ alimēta hæc sunt. Quomodo enim hominis alimētū
sunt vērū & aqua cruda? sed sunt magis cognatæ affectionis
castigatio & medela. Porro vt ad institutū sermonē reuerta-

Cor quid.
Cordis ven-
triculi, siue
sinus. mur. Cor musculus est valde fortis nō neruo, sed densitate ac
cōstrictione carnis, & duos vētriculos habet discretos in vno
amiculo, abvtraq; parte vnū. Nihil autē inter se similes sunt, E

Alter enim in dextris ad osculū situs est, contingēs alterā ve-
nam. Alter in sinistris. Totū enim cor in his sedē suā firma-
uit. Sed ille etiā omnino amplioris ventris, & magis inanis
quā alter est, neq; extremitatē cordis attingit, sed caudā eius
ambit, solidus item est, veluti extrinsecus assutus. Alter autē
subter sinistrā mammā maximē in directū situs est, vbi etiā
saltus ipsius significationē sui præbet. Amiculum autē habet
crassum itemq; foueā. Foueæ enim speciē præ se fert similē
mortario. Sed enim hic etiam pulmonē subit cum mansue-
tutine, & circunietu ipsius, caloris intemperantiā castigat.

Pulmo cor
dis calorem
moderatur. Etenim pulmo natura frigidus est, sed & inspiratione perfri-
geratur. Ambo autē densi ac asperi sunt interna sui parte, &
velut subcorrosi, magisq; sinister quā dexter. Nam intrus F
Cordis si-
nus quales. natura ignis nō est in dextro. Quare mirū est sinistrū asperio-
rē fieri, vbi intemperatū aërē inspirauerit. Quapropter etiā
roboris caloris custodiēdi gratia crassius intrus cōstrict⁹ est.

Σομῆτα. Oscula autē ipsis non sunt aperta, nisi si quis cordis auriculas
præsecet, aut caput cordis præcidat. Si autē quis præsecet, ap-
parebūt duplicia oscula in duobus vētriculis. Crassa enī vena

Fons uitæ
humani. ex altero excurrrens visum decipit, si fuerit resecta. Hi fontes
sunt humanæ naturæ, & hic flumina sunt quibus totū corpus
irrigatur: atq; hi etiā vitam homini cōferunt, & vbi resiccati

Cordis au-
ricular. fuerint, homo moritur. At verō prope exortū venarū, corpus-
cula circū vētriculos cōsurgunt, mollia cauernosa, quæ auri-
culæ appellātur. Non sunt autē foramina auriū, nō enim cla-
morē exaudiūt. Verū sunt organa quib⁹ natura aërē rapit. Et
sanē

A sanè videtur mihi boni ac præstatis artificis opificium esse.

Quum enim considerasset figuram solidam futuram ipsius visceris, propter sanguinis ex venis effusi collectionem ac concretionem, deinde attractorium ipsum esse totum vidisset, folles ipsi opposuit, quemadmodum fabri ferrarij fornacibus solent, quo per ipsos spiritum apprehenderet. Signum autem sermonis hoc est. Etenim cor videas ex toto ventilari, aures verò priuatim tum inflari, tum considerare ac contrahi. Et propter hoc etiam dico, quod venæ quidem operantur respirationem in sinistrum ventriculum, arteria autem in alterum. Molle enim magis attrahit, & incrementum capit. Oportebat autem nobis magis incumbentia cordis tegmina perfrigerari. Est enim calor non in dextris: quare propter hanc affectionem, non acceperunt amplum organum, ut ne in totum ab ingrediente aëre superarentur. Restant dicendæ cordis pelliculæ latentes, opus dignissimum cognitione. Sunt enim & aliæ quædā in ventriculis pelliculæ, velut araneorum telæ extensæ, quæ undique oscula cingunt, & strias ac segmenta in solidum cor inferunt. Hæ mihi nervi ipsius visceris & vasorum principia aortis esse videntur, est autem ipsarum par vnum. Caterum osculis singulis tres pelliculæ subornatæ sunt, rotundæ in summo, velut circulus semisectus. Et qui rei intelligentes sunt, admirantur, quomodo oscula & aortarum fines claudunt. Et si quis veteris, eximendi cor mortui, moris gnarus, aliam auferat, aliam reclinet, neque aqua, neque flatus immixtus in cor penetrarit: atque hæ magis in sinistri ventriculi osculis exactius, & meritò sanè subornatæ sunt. Mens enim hominis in sinistro ventriculo insita est, & relinquæ animæ imperat.

B Nutritur autem neque cibus neque potibus à ventre, sed pura & illustri substantia ex sanguinis discretionem nata, Adsumit autem alimentum ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittens, & depascens, velut ex ventre intestinorum alimentum non naturale existat. Quo verò non in mora sit, qui in arteria est in fluctatione constitutus cibus, viam in ipsam occludit. Magna enim alteria ventrem depascitur ac intestina, plenaque est alimento non principali. Quod autem non nutritur sanguine apparente, & quæ videmus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestum existit.

C Macta

*Creatoris
optimi sum-
mum opi-
ficiū cor.*

*Venæ si-
num sinis-
trum per-
flant.*

*Arteria
magna
dextrorum.*

*Cordis res-
liqua.*

Vena aorta.

*Cor nihil
afficitur.
Mentis si-
tus.*

*Arteria
magna ven-
trem de-
pascitur.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Arteria
parua.*

Maſtato enim animali, & ſiniſtro vetriculo diſſecto, tota de-
ſolata apparet, modico ſeroſo humore excepto, flauaque bi-
le, ac pelliculis, de quibus iam mihi dictū eſt. Arteria autem
altera ſanguine non eſt deſtituta neque ventriculus dexter.
Hoc quidem igitur vas cauſſa fuit, mea ſanè ſententia, vt pel-
liculæ producerentur. Id verò quod ex dextro fertur ventri-
culo etiam ipſum quidem commiſſura pellicularum claudi-
tur, verū non valde ſalutis præ imbecillitate. Sed aperitur qui-
dem in pulmonis vaſa, ſanguinem exhibens iſtis in alimen-
tum, clauditur autem in cor, non tamen conſeſſim, quo in-
grediatur quidem aer, non autem multus. Debilis enim eſt
hic calor, frigiditatis facultate ſuperatus. Sanguis enim non
eſt natura calidus, neque enim alia aliqua aqua, ſed caleſcit,
Multis autem videtur natura calidus eſſe. Et de corde ſanè
alia dicta ſint.

*Sanguis ca-
lidus natu-
raliter non
eſt.*

HIPPOCRATIS COI LIBER DE GLAN-

DVLIS, IANO COR-
NARIO MEDICO PHY-
SICO INTER-
PRETE.

*

*Glandulae
guales.*

*Sanguis al-
bus de glan-
dulis ma-
nat.*



E Glandularum tota natura ſic ha-
bet. Natura iſtis eſt ſpongioſa, Sunt
enim raræ & pingues, & neque car-
nes ſunt reliquo corpori ſimiles, ne-
que aliud quid ſimile corpori, Sed
friabiles ſunt, & venas multas habēt.
Si verò diſſeces, ſanguis larguſerum
pit, ſpecie albus & velut pituita. Tan-
genti autem velut lanè apparent. Et
ſi multa vi ipſas digitis cōpreſſeris, glādula humorem oleo-
ſum remittit qui & ipſe conteritur vt plurimum, ac diſperit.
Aegrotant autem non valde, ſed vnā cum reliquo corpore.
Quum

F

- A** Quum verò proprio morbo ægrotât: nam parū etiā cum reliquo corpore ægrotât: morbi tubercula sūt, & strumæ resulant, & febris corpus occupat. Perpetiuntur autē hæc, vbi humiditate repletæ fuerint, ex reliquo corpore in ipsas influente. Influit autem ex reliquo corpore per venas, quæ per ipsas extantæ sunt multæ & cauæ, vt humor quæcunq; tandem traxerint, facîle in ipsas sequatur. Et si multa ac morbosa fuerit fluxio, glandulæ reliquū corpus in se distendunt, atq; sic febris incenditur, & eleuantur ac inflammâtur glandulæ. Cæterum glandulæ in corpore sunt plures siue maiores, in cauis ipsius partibus, quàm in articulis, & quæcunq; in alijs humectis ac sanguinolentis locis consistunt: atque illæ quidem, vt
- B** quodd supernè in cauas partes influit, suscipiētes in se trahant, hæc verò vt rursus nascentē præ laboribus humiditatē in articulis, si quam articuli remittant, eius multitudinē susceperint: & sic nimia humectatio in corpore non inest. Nam si etiam quid gignatur humiditatis, nō statim nimia humectatio inde successerit. Reflectitur enim & consumitur tum multa, tum modica, in ipsas glandulas, atq; sic reliqui corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentū hoc est ipsis coalescens. Quare vbi cœnosæ partes sunt & humectæ, ibi etiā glandulæ. Cuius signū est. Quodd vbi est glādula, ibi etiā pili. Natura enim facit glandulas & pilos, vtraque eadem vtilitate participantes, illas quidem vt quodd influit, velut antea dictum est, suscipiant. Pili verò ex glandulis opportunitatem habentes nascuntur & augescunt, colligentes id quod in extremitates redundat ac effervescit. Vbi autē corpus siccum est, neque glandula, neq; pilus inest. At verò teneræ & exercitijs deditæ & humectæ partes, glandulosæ sunt ac pilosæ. Glandulæ porro sunt ab vtraque aurium parte iuxta iugulares colli venas, & pili etiam ibidem. Item sub alis vtrinque & glandulæ & pili sunt. Inguina & pubes similiter vt alæ, & glandulas & pilos habent. Et hæc quidem caue corporis partes sunt, & ad humoris redundantiam expositæ. Nam & laborât hæc, & ex omnibus corporis partibus maximè mouentur. Reliquæ verò glandulas tantum habent, velut intestina. Habent enim & hæc glandulas in omentum maiores: pilos autem nō habent. Nam & in cœnosis ac humectis terræ locis, semen nō nascitur, neq; suprâ terram ascendere conatur,

φύματα.

Qua parte
sint glandulæ.Sata ubi
non nascuntur.

HIPPOCRATIS LIBER

*Viscerum
glandulae
magnae
sunt.*

*Rhenum
glandulae.*

*Tonsillae.
Caput quae
li.*

*Quando
glandulae
vexant.*

natur, sed per redundantiam putrescit ac suffocatur. Violat **D**
enim semen, violat autē & in intestinis copia ac multitudo
humoris, & pilos enasci non sinit. Glandulae autē in intesti-
nis maiores sunt, quā alibi in corpore, & pascuntur hume-
stationem nimiam ex intestinis exprimentes. Intestina verò
ex vasis in omentum suscipiunt ac remittunt humiditatem.
Omentum autem in glandulas distribuit. Habent praeerea
etiam rhenes glandulas, Nam & hi multa humiditate exsa-
tiantur. Maiores verò etiam hac parte quā aliae glandulae
existunt. Influens enim humor in rhenes nō imbibitur, sed
perfluit infrā in vesicā. Quare quicquid eius lucrifaciunt de
canalibus, hoc ad se trahunt. Sed & aliae in corpore glandu-
lae sunt paruae valde, Verū non volo hunc sermonē longius **E**
euagari permittere, Nam earū quae alicuius momenti sunt
gratia, hoc scriptum institutum est. Nunc itaq; sermone pro-
gressum faciam, & dicam de tota natura glandularum colli.

Collum ab utraque sui parte hinc & hinc glandulas habet,
& vocantur haec glandulae tonsillae, in hunc usum atque utili-
tatem. Caput supra situm est, sursum cauum ac rotundum
existens, & humiditatem ex reliquo corpore complectens, &
corpus simul vapores omnis generis sursum in caput demit-
tit, quos caput rursus retro dimittit. Non enim immorari ac
manere potest id quod influit, non habēs vbi sedem firmet.
Nisi tunc caput aegrotet. Tunc enim non remittit, sed isthic
retinet. Postquā verò attractionem remiserit in glandulas
fluxio vergit, & nihil molestat, donec pauca & moderata flu- **F**
xio fuerit, & ipsae glandulae validae ac potentes extiterint. Si
enim multa & acris influxerit, manseritque acris & glutino-
sa, inflammatur ac intumescit & collum distenditur, atque sic
ad aurem progreditur, & si quidem in utranque partem pro-
cesserit, utraque auris: sin ad alteram, altera tantum aegrotat.
Si autem pituitosa, & multa ac lenta fuerit fluxio, etiam sic
inflammatur, & inflammatio quum instabilis humor existat,
strumas pessimum colli morbum generat. In alas autem etiā
tunc quid confluit. Sed vbi copiosi fuerint acres & serosi hu-
mores, etiam sic in ipsis tubercula producuntur. Sed & in in-
guinibus glandula à partibus supra sitis humiditatem trahet,
Sed vbi multitudo eius occupauerit, inguina intumescit,
& suppurantur, ac inflammatur, similiter ut alae ac collum.

Atque

A Atque hæc sanè tum bona, tum mala glandulæ exhibere videntur. & de his quidem hæc suffecerint. Porro intestina multam facietatem ex cibis ac potibus habent, & præterea humiditatem sub cuticula habent. Sed & hæc tota reflectitur ac consumitur in glandulas, similiter velut superior. Morbos autem nō facit ferè, quemadmodum in articulis contingit. Frequentes enim glandulæ & expassæ, ac non cauæ sunt, & altera alterius multitudine non multum fruitur, & aliàs si qua etiam plus habere velit, copiam eius habere non potest, Sed quod in paucas ac singulas confluit in articulis, id in multas hic diuiditur, & æqualitas ipsis existit. Caput etiam ipsum glandulas habet, cerebrum nimirum simile glandulæ. Est enim cerebrum album ac friabile, quemadmodum etiam glandulæ. Et ob id in commoditatem capitis glandulas facit, & per relatas à me cerebrum auxilium ferens humiditatem aufert, & in extremitates foras ablegat per fluxiones ex magna parte. Maius autem est cerebrum quàm aliæ glandulæ, & capilli etiam maiores quàm alij pili. Maius enim est cerebrum, & in amplo spacio in capite situm est. Facit autem morbos & minores, & maiores, quàm aliæ glandulæ facit autem quum in infernas corporis partes redundantiã ac superfluitatem suam ablegarit. Fluxiones porro de capite vsque ad secretionem contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per nares, atque hæc tres sunt, & aliæ per palatum in guttur, & in gulam, & alia per venas in

*Viscerum
mala unde.*

*Glandulæ
intestinae
quales.*

B medullam spinalem, & in sanguinè. Quæ omnes septem numero existunt, hæc fluxiones cerebri sordes ac purgumenta discedentes existunt, & si non discefferint, morbus ipsi inde oboritur. Sic autem & reliquo corpori aliqui morbi accedunt, si intrò abierint ac discefferint hæc fluxiones, & non foras. Et rursus turbatio multa oboritur, si hianter ac affatim attrahat, & acrem quidem fluxionem cerebrum demittat, quæ in fluxiones corrodit & exulcerat. Et si id quod cerebro influit copiosum fuerit, fluxio descendens non desinet, donec multitudinem influentis exhauserit atque sic id quod influit foras demittens, & aliud suscipiens, ac semper in consimili statu cōsistens, & humores trahit, & morbos facit. Ambo autè magno tædio ac molestia naturam frangunt quæ si fuerit affecta, dolorosa afflictio existit. Affectiones enim

*Cerebrum,
glandulæ
simile.*

*Septem ca-
pitis mea-
tus fluores-
que.*

74

enim

HIPPOCRATIS LIBER

enim naturæ sunt prædictæ fluxiones, & multitudinē mole- D
ste ferunt, & morsum ac rosiōnē perceprant, ex eo quo præ-
ter rationem & non consuetum existit. Cerebrum autem cla-
dem perfert, etiam ipsum nō sanum existens, sed si quidem
rodatur, turbationem multam sustinet, & mens desipit, & ce-
rebrum conuellit ac distrahit totum hominem, qui in seipso
vocem nō edit, ac suffocatur, & hæc affectio sideratio ac græ-
cè apoplexia appellatur. Aliquando verò acris quidē non est
fluxio, sed copiosa in cerebrū irruens, ipsum affligit, & mens
perturbatur, & homo circum ambulat, aliena cogitās, & alie-
na videns, perferēs morbi mores, visis, risu, & peregrinis ima-
ginationibus. Alia fluxio ad oculos ophthalmia Græcis, La-
tinè lippitudo appellatur, & oculi in ipsa intumescunt: Si ve- E
rò ad nares defluxio fiat, arroductur nares, & nihil aliud gra-
ue accedit: nam vię ipsarum amplæ sunt, & sibi auxiliari pos-
sunt, insuperque non compactum est quod ab ipsis discedit.

*Sideratio,
ἀποπληξία
morbus in-
maginosus
ὀφθαλμία.*

*Purulentæ
aures.*

At verò aures intortus quidem meatus & angustus, cere-
brum autem prope ipsum ipsis auribus apprimitur. Aegro-
tans verò hoc morbo, plurima excernit, & auris à frequenti
fluxione per tempus vexatur, & pus graueolens effluit. Sic et-
iam fluxiones ad oculos foris conspicuæ sunt, & non lethales
in totum. Si verò fluxio retrò processerit per palatum,

*Palati de-
stillatio.*

& in ventrem pituita peruenerit, fluunt quidem horum ven-
tres, non autem agrotant. Si verò internè maneat pituita,
affectiones voluulosæ sunt diuturnæ. Alijs autem si per pa-
latum in guttur multa fluxio cōtingat, vt plurimum morbi F
tabis oriūtur, replentur enim pulmones pituita, atq; ea ipsa
pus fit, id quod pulmones exedit, & agrori non faciliē super-
stitēs manent, & mens medici si bonus & prudens est, vt plu-
rimum causam intelligit. Alius morbus oritur ex defluxio-
ne capitis per venas in spinalem medullam. Inde autem in
sacrum os impetū facit, quo medulla ipsa fluxionem perdu-
cit, & in coxendicum acetabula siue iuncturas deponit: & si
tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo cōtabescit,
& viuere non expetit. Statim enim scapulæ dolent, amboq;
pedes ac crura consequuntur, & semper tādē pereunt mul-
to tempore curati: atque sic deflorescit homo ac moritur.

*Tabes.
Pulmo qui
consumatur*

Phthisis.

*Cerebri a-
lia mala.*

Hæc mihi de fluxionibus capitis dicta sunt. Sunt autem
affectiones cerebri, etiam alij morbi, deliria, insania, omnia
pericu

A periculosa, & ægrotat cerebrum, & aliæ glandulæ. Habet enim & dolorem, & alius congressus corporis hic contingit. Quin & glandulæ in pectoribus mamme appellatur, & attolluntur ac lac faciunt, aliquibus verò lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, viri vero non faciunt. Mulieribus enim rara est gládularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab utero accedit ad mamas, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sanè exprimit ac sursum mittit omentum, ad supernas partus ab ipso fœtu coarctatum. Verùm maribus locorum angustia, & corporis insuper densitas conducit ad hoc, ut glandulæ non sint magnæ, Mas enim plenus est, & velut palliū densus, tum ad visum, tum ad tactum: fœmina verò rara & laxa, & velut fluida, tum ad visum, tum ad tactum. Quare humiditatem non remittit id quod est rarum & molle. Mas autem non amplius quid eius susceperit, quum densus existat ac coherens & compactus, sed & labor corpus ipsius corroborat, ut non sit locus ubi redundantia ac superfluitates recipiat. Atq; hoc modo cogit ac concludit hæc ratio, & pectora, & mammas, & reliquum corpus mulieribus laxa ac mollia esse tum ob otium ac segnitiam, tum ob alia prædicta, Viris autē vice versa. Porro faciunt etiam mammae tubercula ac inflammationes, lac ipsum putrefacientes. Commoda autem habēt superioribus similia, & reliqui corporis redundantiam auferunt, testimonium abundē præbēt mulieres, quibus morbus, aut alia quædam calamitas mammas adimit. Nam & vox ipsarum aspera redditur, & humores in gulam feruntur, & multo spūto vexantur, & caput dolent, & ab his ægrotat. Lac enim proficiscens ac influens ab utero, quemadmodum etiā antea in superna vasa transibat, quum propria vasa non habeat, nec reperiat utpote ipsis per mammarum adeptionem priuatum, in principales corporis partes incurrit, cor videlicet ac pulmonem, atque sic suffocantur.

Mamma.

*Mariū corpus quale.
Fœminæ corpus.*

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE OSSIVM NA-

~~TURA~~ MOCHLICVS, ID EST

VECTIARIVS, IANO COR-

NARIO MEDICO

PHYSICO

IN-

terprete.

*

*Manus pe-
disq; ossa
cruculi.*



ssum natura hæc est. Digitorū quidē
ossa ac articuli simplicia sunt. Manus au- E
tem & pedis multa alia, alio modo coar-
ticulata. Maxima verò suprema parte,
Calcanei vero vnū, velut extra apparet.
Ad ipsum autem posteriores tendines
tēdunt. Tibiæ verò duo sunt, quæ super-

nē ac infernē coherent. Iuxta medium verò distant. Paruum
est quod extrinsecus est, iuxta paruum digitū paulò tenuius.
Plurimū autem hac parte distant, & minore momento iuxta
genū: & tendo ex ipso enascitur, qui circa poplitem foris est.
Habent autem infernē communem appendicē, ad quam pes
mouetur. Aliam varò supernē habent appendicem, in qua fe-
moris articulus mouetur simpliciter, & expeditè in longitu-
dinem, specie nodosa, patellam habens. Ipsum autem femur F
foras, & in anteriore parte incuruum est. Caput autem eius
appendix est rotunda, ex qua nervus, qui in coxa acetabulo

est, nascitur. Subobliquus autem etiam hic annexus est, mi-
nus verò quàm brachium. Coxa verò magno verticulo, quod
iuxta os sacrum est, ex ligamento cartilagineo ac nervoso
adhæret. Spina verò à sacro osse, vsq; ad magnū verticulum
gibbosa est, & vesica, & genitura, & recti intestini pars incli-
nata, in hac parte est. Inde verò vsque ad septum transuer-
sum peruenit, in directum repanda est, & muscoli lumba-
res hac parte existunt. Hinc verò vsque ad magnum verticu-
lum, quod supra supernas humeri partes est, è directo gibbo-
sa est. Inuò magis esse videtur quàm est. Nam posteriores os-
sū propagines hac parte altissimę sunt. Cervicis autē articu-
lus

Patella.

Coxa.

Os sacrum

Spina.

Cervix.

- A** lus repandus est. Verticula verò intrinsecus inter se æqualia sunt: ab externis autem chartilaginibus ac nervis continentur. Coarticulatio verò ipsorum in posteriore medullæ spinalis parte est. A posteriore autem parte exortu acutum habent, qui appendicem habet chartilaginiosam, vnde nervorū propago prona fertur: quemadmodum etiam musculi à ceruice ad lumbos adnascuntur, costarum ac spinæ medium ex-
Costæ.
- B** plentes. Costæ verò iuxta discriminationes verticulorū, nervo annexæ sunt à ceruice vsque ad lumbos intrinsecus. Ab anteriore autem parte, iuxta pectus, laxam ac mollem summam partem habentes, specie præ cunctis animalibus maxime obtorta. Hac enim parte angustissimā molem homo habet. Qua verò parte costæ non sunt, exortus obliquus, brevis & latus, ad singula verticula nervo annexus est. At verò pectus coharens ipsum sibi ipsi, discriminationes habet obli-
Pectus.
- quas, qua parte costæ annexæ sunt. Laxum autem est & chartilagineum: claviculæ verò rotundæ sunt ad anteriore partem, ad pectus quidem breves motus habentes, ad summum verò humerum frequentiores. Summus autem humerus ex scapulis nascitur, in plerisque dissimiliter. Scapula ad spinam chartilaginea est, reliqua parte laxa, inæqualem partem foras habens, ceruicem verò & acetabulum habet chartilagineum, ex quo costæ motum habet. Facile autem ut inter ossa exoluitur, brachio excepto. Huius autem caput ex nervo ex acetabulo dependet, chartilaginis laxæ rotundam
Claves pectoris.
- C** appendicem habens. Ipsum verò brachium incurvum foras, & anteriore parte obliquum, non rectum est ad acetabulum. Pars verò ad cubiti gibbum lata est, & nodosa, & repagulo similis, & solida, posteriore parte caua, in qua cornix inest ex cubito, quum manus fuerit extenta. Ad hanc etiam torpidus nervus, qui ex cubiti ossium discriminatione media enascitur, perficitur ac terminatur. Ossa manus viginti septem sunt, pedis viginti quatuor. Colli vsque ad magnum verticulum septem, lumbi quinque, spinæ viginti, capitis vnà cum oculorum ossibus octo. In vniuersum nonaginta vnum, cum vnguibus verò centum ac vndecim. Ceterum ut nos ipsi ex hominis ossibus didicimus, verticula supra claviculam vnà cum magno septem sunt. Iuxta costas autem tot quot costæ sunt, duodecim videlicet. Iuxta laterum mollitudinem
Scapula.
- Caput humeri.*
- Nervus torpidus.*
- Manus, pedis, cæterorumq; ossa.*
- Vertebrae Costæ.*

HIPPOCRATIS LIBER

Semen geni verò forinsecus vbi coxendices, in lumbis quinque. Semen **D**
rale fauo si- porro velut fauus ab vtraque vesicæ parte est. Ex ipsis au-
mile. tem rhenibus venæ ab vtraq; meatus urinæ parte, in puden-
Potus quò dum tendunt. Potus per fauces ac gulam: larynx enim qui
tendat. caput arteriæ est, in pulmonem ac arteriam tendit: ab his in
Larynx. summam vesicam. Hepatis extremitates quinque sunt, su-
Hepar. per quarta autem extremitate fel incumbit, quod osculum
Fel. ad septum transversum, & cor, ac pulmonem profert. Cir-
Cor, cum cor pellicula est. Intestina crassa homo maiora quàm
Mesocolon. canis habet, dependent autem ex Mesenterij membrana,
Rhenes. quæ Mesocolon hac parte vocatur, Mesocolon autem ex ner-
Arteria. uis de spina sub ventrem. Rhenes ex nervis de spina. Arteriæ
 fons cognatus cor est. Vena tendit per septum transversum, **E**
 hepar, splenem, rhenes, ad coxendicem, circa suram ad sum-
 mum pedem. Altera autem ex corde sub alas, claviculas, iu-
 gula, caput, nasum, frontem, iuxta aures, humeros, dorsum, pe-
 ctus, ventrem per cubitum. Aliæ verò per alias ad cubitum
 ad summam manum. Nervorum exortus ab occipitio vs-
 que ad spinam, ad coxendicem, in pudenda, in femora, pe-
 des, tibias, in manus. Alij in brachia, partim in carnes, par-
 tim ad fibulam, in magnum digitum, partim ex carnibus in
 alios digitos. Alij ad scapulas, pectus, ventrem, ossa, ligamen-
 ta. A pudendo verò ad princeps intestinum ac podicem, ace-
 tabula coxarum, partim supra femur, partim infra ad genua.
 Inde alius ad genu extentus ad tendinem, pernam, pedes,
 alius ad fibulam, alius in rhenes. Ipsæ porro venæ in vtran- **F**
Vena rhe- que partem bifariam maximè finduntur, partim ab vna vtri-
num. usque rhenis parte, partim ab altera: & perforatæ sunt in rhe-
 nes. Habent autem cordis formam ipsi rhenes. Nam etiam
 ipsi ventriculos habent. Ad verò Rhen caavam sui partem ad
 venas magnas habens situs est, Vnde enascuntur ex ipso ve-
 næ in vesicam, qua parte potus trahitur per venas in rhenes,
 & per ipsa intestina per quæ procedit. Deinde verò velut per
 qualum, per rhenes aqua percolatur. Spongiforme enim est
 ipsorum corpus ad vesicam, & hic percolatur ac secernitur à
 sanguine urina, quapropter etiam rubra existit. Neque enim
Urina qua- in rhenes aliæ procedunt venæ quàm quæ dictæ sunt, neque
re rubeat. est alius locus vbi potus colliquescat, quantum ego novi.
Venæ co- Venæ circa costas tendentes, subter vnamquamque costam
 sunt,

- A** sunt, non à capite, inferius etiam ab arteria. Arteria quidem *staturum.*
 igitur subtermeans in costas distribuit. A crassa verò vena à
 corde recurrit vna in sinistram partem inclusa. Deinde hæc *Vena cor-*
 quidem per medias vertebrae vsque ad summâs costas meat, *dis.*
 non ex æquo distribuens costis à dextris ac sinistris ramos
 ac segmenta sua. Alia verò æquos quidem, verum supernè in
 dextris finditur. Caterùm iuxta vtranque clausculam duæ *Venarum*
 venæ sursum, duæ sub pectus, partim ad dextas, partim ad *digestio.*
 sinistras, ramos siue segmenta, spargunt, illæ quidem magis
 ad cervicē, duæ verò alteræ magis ad cor, partim ad dextas,
 partim ad sinistras, ab vtraque parte iuxta costas, & sub ipsis
 velut inferiores scinduntur, donec recurrenti infernè à cor-
 de commiscuntur. At verò sanguiflua vena ab arteria hac, *Arteria.*
 propterea finditur, quòd sublimis hic est per cor means. In-
 frà verò costas vena sanguiflua crassa appellata, verticulis
 rursus seipsam ingerit, & hic adhæret, & non ampliùs pen-
 det, velut supernè per hepar meâs. Est autem iuxta lumbum
 quidem supernè arteria, infrà autem sanguiflua, ab hepate
 per septum tràsuerfum sublimis veniens, & ad dextram cor-
 dis fertur vsque ad clauiculas simplex, præter quàm quan-
 tum cum corde communicat, iuxta vasa quidem in ipso ma-
 gis in superficie fissa, verum iuxta vasa in ventriculo cordis
 penetrans, postea à corde ad sinistram se demittit, & sim-
 plex ad spinam rursus currit, ad supernâ quidem corporis vs-
 que ad supremas costas, & ramos à seipsa habet iuxta vnam-
 que costam extensos iuxta naturam vsque ad pectoris
 commissuram, & in sinistram; & in dextram; & rectitudo
 ipsius magis ad verticulu est, quàm arteriæ extensio, itémq;
 venæ ab hepate venientis. Ad inferiorem verò cordis par-
 tem, recta extensio ab ipsa magis ad verticulu est, quàm ar-
 teriæ extensio altera, quæ iuxta cor & in infernas partes se-
 pti transuersi ad spinam appensas conuersa est. Inde verò ra-
 mi in vnamquaq; rectitudinem inferuntur, per ossa & car-
 nes mutuo transeunt. At verò venæ crassæ sic habent. Ex
 oculo iuxta supercilium per dorsum iuxta pulmonem sub pe-
 ctore, altera ex dextra in sinistram, altera ex sinistra in dextram
 transit. & quæ quidem ex sinistra venit, per hepar in rhenem
 ac testiculum descendit, Quæ verò ex dextra, in splenem &
 rhenem ac testem, his autem osculum est ipsum pudendum.

*Tenor arte-
riæ & cor-
dis.*

A dextra verò mánna in sinistram coxendicem, & in crus descendit, & rursus à sinistra in dextram. Oculus verò dexter, ex sinistro venam suscipit, itemque testiculus. Iuxta eundem modum rursus sinister ex dextro. Crassissimę porro venę in hunc modum se habent. Quatuor paria sunt in corpore. & aliquę quidem ex ipsis, à capite retrò per ceruicem foris iuxta spinam ab vtraque parte ad coxendices perueniunt, & ad crura, deinde per tibias ad malleolorum partes externas, ac in pedes procedunt. Oportet igitur venę sectiones in doloribus in dorso, ac in coxendicibus, à poplitibus facere & à malleolis forinsecus. Alterę verò venę ex capite iuxta aures per ceruicem, sphagitides, id est iugulares appellatę, intrinsecus iuxta spinam, ab vtraque parte iuxta lumbos procedunt in testes, & in femora, & per poplites ab interna parte, Deinde per tibias ad malleolos intrinsecus, & ad pedes.

Oportet igitur venę sectiones facere ad dolores lumborum ac testium, à poplitibus ac malleolis intrinsecus. Tertię venę ex temporibus per ceruicem in scapulas procedunt, deinde in pulmonem deferuntur, & perueniunt altera quidem à dextris in sinistras sub mammam, in splenē & in rhenem. Altera verò à sinistris in dextras ex pulmone sub mammam in hepar & in rhenem, desinunt autē ambę hę in intestinum rectum ac podicem: Quartę autem venę ab anteriore capitis parte ac oculis, sub ceruicē & sub clauiculas procedunt. Deinde à brachijs supernę sub curuaturas, postea per cubitos, ad manuum iuncturas ac digitos. Postea rursus à digitis, per manuum pectora, hoc est volas, & per cubitos in curuaturas, & per brachiorum infernam partē ad alas, & ex costis supernę, altera quidem in splenē procedit, altera in hepar, deinde supra ventrem ambę in pudendum desinunt. Et crassę quidem venę hoc modo se habent. Sunt autem & à ventre venę per corpus multę & omnigenę, per quas alimentum corpori venit, procedunt autem & à crassis venis in vřtrem ac reliquum corpus, & ab extremis, & ab intimis, & inter se mutuò distribuunt, internę foras, externę intro.

Venę igitur sectiones facere oportet iuxta hos modos. Operamque dare oportet, vt quàm longissimę à locis, vbi dolores fieri solent ac sanguis colligi, secemus. Sic enim minimę mutatio magna de repente fiet, & consuetudinem transuleris, vt

*Venarum
quatuor pa-
ria.
Venarum
descensus.*

Secundę.

Tertię.

Quartę.

*Venę alię
ex his man-
nantes.*

*Sanguinis
mitigandi ra-
tio.*

- A** leris, vt ne ampliùs in eundem locum colligatur. Cæterùm Hepatitis vena in lumbo vsq; ad magnū verticulum, inferne etiam verticulis se ingerit, inde sublimis eleuata per hepar, & per septum transuersum in cor: & hæc quidem recta ad clauiculas procedit. Inde verò aliæ quidē ad collum, aliæ ad scapulas, aliæ deorsum reflexæ iuxta verticula ac costas declinant, à sinistris quidem vna prope clauiculas, ex dextris autem in quendam ipsarum locum. Alia verò vtrinque deflexa. Alia paulò inferius deflexa, vbi illa quidem deficit, costas se ingerit, donec ad venam in ipsum cor accesserit ad sinistras deflexa. Infra autem decurua ad vertebrae descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari, ingerens se costis reliquis omnibus, & hinc atque hinc ramos iuxta singulas spargens quum vna existat; à corde quidem in locum quendam in sinistris magis existens, deinde infra arteriam, donec consumatur & perueniat eo, vbi hepatitis eleuata est, priusquam autem eo venit, iuxta extremas duas costas bifida fit & altera pars hinc, altera inde ad vertebrae progressa consumitur. Altera verò recta à corde ad clauiculas tendens, supra arteriam est, & ab hac (quemadmodum & ea quæ iuxta lumbū infra arteriam est) in hepar exilit, partim in portas, & extremitatem, partim in reliquum consequenter procedit paulò infra septum transuersum. Septum autem transuersum hepatis adnatum est, vt non facile separari possit. Duplices autem venæ à clauiculis, alteræ hinc, alteræ inde, sub pectus ad pubem ac pectinem tendunt, quò verò inde, nondum noui. Septum verò transuersum iuxta verticulum infra costas, ea parte qua rhen ex arteria confurgit. Arteriæ verò ex rhene oriuntur, hinc & hinc ab arteria neruum habentes. Et hac parte in recurrente à corde hepatitis desinit. Ab hepatitide verò per septum transuersum maximæ duæ, altera hinc, altera inde sublimes feruntur. Multifidæ autem per septum sunt, & circum ipsum innascuntur. Verùm supra septum hæc magis conspicuæ sunt. Duo autem crassi nerui, à cerebro sub os magni verticuli superne, & magis ad gulam, ab vtraque arteriæ parte vterque progrediens, inter se committuntur, vt vni similes existant, Deinde verticula ad septū transuersum hic sunt vbi desinunt. Et quidam dubij, ad hepar & splenem ab hac societate tendere ipsos putauerunt. Alius

Hepatis vena.

Venarū distributio

Arteriæ

Nerui à cerebro.

HIPPOCRATIS LIBER

neruus vtrinq; ex ventriculis iuxta clauiculā ad spinam tendit, ex obliquo verticulorum, & se in costas ingerit: atque hi quemadmodum venæ per septum transuersum ad mesenterium mihi tendere videntur. vbi autem hæc deficiunt, rursus hinc vbi septum exoritur, ab eo continui ac coherentes existentes, iuxta medium infra arteriam, de cætero ad verticula se ingerunt quemadmodum venæ, donec totum sacrum os pergressi consumuntur. Ossā corpori stabilitatem, & rectitudinem, ac speciem exhibent. Nerui flexionem & contractionem ac distentionem. Carnes & cutis omnium colligationem ac constructionem. Venæ per corpus diffusæ spiritum & fluxum ac motum exhibent, ab vna multæ germinantes, atque hæc vna vnde oriatur, & vbi desinat, non scio, E Circulo enim factō principium non inuenitur. Cæterum rami ac germina ipsius vnde pendeant, & qua parte corporis desinant, & quod vna his consentit, & in quibus locis corporis extentæ sunt, ego declarabo. Circa caput iuxta medium ex obliquo circumlita est vena lata & tenuis, non multi sanguinis, In cerebrum enim iuxta commissuras multæ tenues venulæ radices egerunt, & circum totum caput extētæ sunt, vsque ad frontem ac tempora. Ipsa autem in rectum extenditur retro caput forinsecus iuxta spinæ cutem, inde verò circa externā ac internam venā ex his quæ in iugulis sunt, demittitur. Vltra aures autem subfissa à gena forinsecus tendit crassa. Ab hac in linguam multæ & tenues procedunt, excepta ea quæ sub linguam & sub maxillares dentes fertur. F Ipsa autem crassa per clauiculam descendit sub scapulas: & hac parte ab ipsa germinat per neruum subter summam humeri partem siue cuticulam, Vena humeralis appellata. Ipsa autem sanguiflua est & sanguine plena, & agre curatur, si rûpatur aut conuellatur. Ab altera enim parte neruus latus ipsam ambit, ab altera chartilago, medium verò locum ipsa tenet, & pellicula spumosa. Quum igitur locus non sit carnosus, facîle rumpitur, & carnem circum nasci non cōtingit. & si sanguis in hanc partem subtercurrat, nactus spaciosum locum non discedit, sed induratur. Induratus autem morbum & dolorem exhibet. Atque hæc quidem finit vbi prius dixi. Illa verò sub scapulas germina emittit sub mammas densatum & tenuium ac variè implicatarum inter se venularum, & per

*Quid ossa,
nerui, caro,
cutis, uenæ
corpori
præstent.*

Vena capitis.

*Capitis uenæ quadri-
peritiæ.*

*Vena sub
lingua.*

*Pellicula
spumosa.*

*Mammæ
rum uena.*

A & per humeralem venam, prætergrediens chartilaginem, ipsam subter subattingens ad brachiū tendit, musculum in sinistra habens. Dextra autem ipsa finditur circa humerum, & cubiti supernam partem. Inde verò cubitum vtrunq; pene trans, postea manus iuncturam, inde autem defluens per totam manum variè vagans radices agit. Cæterum principalis vena iuxta spinam sparsa, per dorsum, & iugulum, ac guttur, in cor inferitur, & de seipsa venam magnam multorum osculorum in corde producit, inde verò in os procedens fistulam facit, quæ sanè arteria appellatur, per pulmonem transiens, pauci sanguinis ac multi spiritus existens. Propter spaciositatem enim ac raritatem visceris, multis locis per pulmonē deriuatur, cætera verò chartilaginosa facta est. Quapropter sane etiam si quid in has vias pulmonis delatum fuerit ex insueris, vel in potu, vel in spiritus ac sanguinis transitu, utpote venis talibus existentibus, & viscere spongiformi, ac multum humorem suscipere potente, & sursum procedente: tum humorum ingressorum lex constituta est, tum sanguis amplius per has venas non multus continetur, neq; multum constringitur, & non cito procedens, illabentia non educit. Ipsis autem non subductis, sed intus manentibus, callosa con-
B crescit duricies. Sic autem destruitur alimēti accessio ac ingestio, quum hac parte arteriæ capitis accessus ad externas partes existat. Interceptis verò transitibus per callosam duriciem, velocitas ac difficultas spirandi oboritur, quum neque
C emittere neq; attrahere spiritum facile possint. Ex huiusmodi autem tales morbi fiunt, velut sunt anhelationes, & tabes sicca. Si verò humor amplior in ipsis consistens præualuerit, ut crassifactus spissari non possit, & pulmonem putrem facit, & vicinas ipsi partes, fiuntque suppurati ac tabidi. Fiunt autem hi morbi etiam ob alias causas. Inde porro hæc vena pulmonem occupat, & per extremitates duas magnas intro conuersas, sub septum transversum extenta est ad spinā, alba ac nervosa, venulas per reliquum condensatum corpus spargens. hinc autem per verticula densis venulis in spinalem medullam inferitur, ac instar hederæ implicatur. Et alia quidem venæ in corpus distributæ: ex omnibus partibus ad spinam tendentes, vnaquæque quod tenuissimum ac sincerissimum est colligens hic eructat. Hæc verò velut præ-

Vena principalis.

Arteria magna.

*Ἰσχυρία
ἀσπνία.
Tabes sicca*

*Vena quæ
pulmonem
petit.*

ses imposita per demissas plicationes in idem cogit. Inde D
verò etiam in rhenes radices agit, tenuibus ac fibrosis venu-
lis iuxta spuriam costam. hinc autem tendens condensatur, post-
eaque etiam nervosa fit ad princeps intestinum ac podicem,
comprimensque musculos adstrictorios ipsi inseritur. In ve-
sicam etiam, & testes, ac adstites radices agit, multiplicibus
implicatis tenuibusque ac solidis & fibrosis venis. Inde ve-
rò crassissima ac rectissima ipsius pars rursus conuersa in cau-
lem transit, hoc est pudendum. In reflexu autem in illa ipsa
adaptatur. Et per pectinem supra subter cutem ventris & ip-
sius venæ, procedunt venæ ad eas quæ deorsum tendunt,
quæ in seipsas mutuo deriuantur. Penetrant autem & per pu-
dendum venæ crassæ, & tenues, & densæ, & curuæ. At verò E
in foeminis illa ipsa in vteros tendit, & in vesicam ac urinæ
meatum. hinc autem recta procedit, & mulieribus quidem
circa vteros pendet, masculis verò circa testes disseminatur.
Ob hanc autem naturam ipsa vena etiam plurima fecunda
ac genitalia concipit. A plurimis enim ac sincerissimis par-
tibus connutrita, paucique sanguinis existens ac caua, & den-
sa instar nerui, ac spiritu referta, intentaque à pudendo, de-
missas ad spinam venulas cogit: hæ verò velut cucurbita
medicinali in seipsas coactæ, omnia in supernam venam e-
mittunt. Confluit autem & ex alijs corporis partibus in
hanc, verum multo maxima pars velut dictum est, de me-
dulla hac colligitur. Voluptas verò accedit, vena hac geni-
tura expleta, Quum igitur soleat reliquo tempore modici F
sanguinis ac multi spiritus esse, repleta & calfacta & semine
deorsum confluente, ea quæ in seipsa habet constringit. Spi-
ritus autem in ipsa existens, & præfens violètia, & e-
ditas, & venarum vndiquaque concitatio, titillationem inducit.
Illa autem quæ à seipsa germinant, per deorsum & iugu-
lum iuxta spinam sparsa, multis venulis costas intertexit, &
verticula per carnes alternatim condensat, ut & probe nutri-
ta & sanguine plena existat. Ipsa autem iuxta eoxendicem ac
nates meat, per musculum sub foemore submersa, à natibus ve-
rò iuxta acetabulum femoris iuxta caput in venam perfora-
ta est, quæ femori respirationem exhibet, trans femur autem
iuxta flexuram ad genu. Alteram verò iuxta inguina de-
mittit frequentibus radicibus, & agrè transeuntem. Hæc ve-
rò per

*Vena ner-
uosa fit.*

*Caulis pu-
dendorum.*

Pecten.

*Foeminis
qui distri-
buantur ve-
næ hæ.*

*Voluptas
coëuntibus
qui fiat.*

*Venarum di-
uersa distri-
butio.*

- A** rò per musculum tendens, & circa genu disseminatur, & per ossis tibialis summitatē venam de se in fistulam cauat, quæ medullam nutrit, & deriuatur per infimam tibiam, iuxta pedis illigationem ac connexionem. Ipsa autem per patellam genu ad interna per tibiæ musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur, intus crassa & sanguine plena, atque hic circa malleolum, & tendinem, venas ægrè cognoscibiles producit ac inuoluit. Ipsa verò infra ad pedem, sub summum pedem decurrit, & hic se implectens, & in magnum digitum innitens, duplam sanguine refertam venam supernè sub cutem ex summo pede reflectit, & apparet sane crassifacta iuxta externam malleoli partem, ac sursum
- B** spargitur iuxta oppositum tibiæ radium. Iuxta suram autem velut fundam facit. Inde extenditur iuxta internam genu partem. Immittit etiam patellæ venas, & iuxta internam patellæ partem quæ caua est, venam implicat, quàm si quis doleat, celerrimè biliosum seorsum ac saniosum humorem colligit. procedit autem ipsa iuxta internam genu cavitatem. Distribuit etiam de se in poplites multas inaplicatas venas, Quæ inde tendentes iuxta nervos sub femore, radices agunt in testes, & in rectum intestinum ac podicem, & circa os sacrum attenuatæ vnitæ circuntenduntur. Illa verò procedens iuxta internam genu cavitatem, sursum iuxta internam femoris partem, in inguen transit, & per coxendicem vltra ad spinam & lumbum foras veniens, crassa & lata ac sanguine plena sursum porrigitur ad hepar, & vbi bifidam produxit sanguine refertā venam, dextram hepatis extremitatem, ad rhenem occupat, Rursus verò subter hepar dispersa in venam crassam funditur. Fissa verò in crassitudinem hepatis inseritur, & altera quidem ipsius pars in superficie visceris extat, in qua etiam est fel, habetque multas radices instar cirrhorum ac plicationum per hepar dispersas. altera verò pars per internas ipsius partes deriuatur.
- Dux autem venæ inter duas latas extremitates explicantur, & vna quidem per vertices ac cutem penetrans ex umbilico effertur. Altera verò premens spinam, in rhenem, ac vesicam, & pudendum, velut ancoris iactis inseritur. Verum ex coxendice incipiens ascendere ad pubem, multas vagabundas producit venas, & costas ac verticula ad spinā illigat, & propa

HIPPOCRATIS LIBER

& propagines suas multipliciter per venas transmittit, & intestina ac ventrem inuoluit. Et alia quidem à pube ad mammas, & suprà mentum, & summos humeros exporrecta dinagantur. Alia verò procedens iuxta crassitudinem hepatis,

*Vena quæ
de sinistris
dextra ten-
dit.*

vbi fel in fistulam coëgit, sursum sub spinam dispergitur, per septum transuersum itinere facto. Cæterum vena ex sinistris partibus, in reliquis quidem iuxta eandem naturam, velut ea quæ in dextris, radices agit. Verum ex sinistris emergens in hepar non se ingerit, sed in splenem inferitur, iuxta caput quod in crassitudine ipsius consistit. Inde verò internas splenis partes subit, ipsasque vepulis sanguinolentis instar aranearum telæ intertextit. Hic verò totus ex omento eleuatur, venulis ex seipso sanguine plenum ipsum red-

Lien.

dens. Quæ verò à capite splenis ad spinam accedunt, per septum transuersum penetrant. Inde verò sursum & dextra & sinistra sub pulmonem extenduntur. Quæ autem sanguine plenæ sunt, sub ipsum & in ipsum corriuantur. Quæ verò pauci sanguinis & tenues à pulmone intrinsecus procedentes, qui natura raris existit, utpote ab ipso emulctæ, in cor frinantur circa auriculas ipsius, & in cauitates internas diffusiunt. Ingerunt autem & priores in ipsum. Etenim in angustia transitus situm est, velut ex omni corpore habenas habens,

*Sensus cor-
poris totius
cur in pe-
ctore.*

Quapropter ex omni corpore maximè circa thoracem sensus existit. Colorum quoque mutationes corde adstringente venas ac laxante fiunt. Laxante quidem igitur rubicundi colores fiunt, & bene colorati ac pellucidi, constringente verò, virides cum pallore & liuidi. Verum tales euariant iuxta præsentem in vnoquoque colores.

Hippocratis

A HIPPOCRATIS

COI LIBER DE LOCIS

IN HOMINE, IANŌ COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*



Mihi quidem videtur principium corpo-
ris nullū esse, sed omnia similiter prin-
cipium, & omnia finis. Circulo enim
scripto principium non reperitur. Simi-
liter etiam morborum in toto corpore.
Quod enim siccius est, morbos magis
recipere, ac magis dolere, à natura so-

*Membra
hominis
qualia.*

*morbos, &
quodammodo
corpus sic.*

*cum magis
morbo ob-
noxium
quodammodo
humidum.*

let. Humidum verò minus. Morbus
enim qui in sicco est, stabilitur & non cessat. Qui verò in
humido, diffluit, & aliàs aliam corporis partem occupat, &
semper transmigrans requiem facit, & citiùs quoque seda-
tur, utpote nō stabilitus. Corporis autem singulæ partes al-
tera alteri, ubi hinc aut illinc processerit, morbum statim

facit, venter capiti, caput carnibus ac ventri, & reliquæ om-
nes iuxta eandem rationem, quemadmodum venter capiti
& caput carnibus ac ventri. Etenim quum venter egestio-
nem moderatam non fecerit, & in ipsum cibus ingeratur,
humiditate ciborum ingestorum corpus irrigat. Ipsa autem
humiditas à ventre obstructa, acruatim ad caput viam fa-
cit, & ubi ad caput peruenerit, à valis in capite non recepta,
fluit quocunque contigerit, & circum circa caput, & in cere-
brum per os tenue, & partim quidem os ipsum subit, partim
verò circum cerebrum per os tenue. Et si quidem in ven-
trem rursus peruenerit, ventri morbum inducit. Si verò ad
aliam aliquam partem incubuerit, illi ipsi morbum facit.
Ita etiam reliquæ partes altera alteri morbum inducit, &
optimum fuerit sic curare ægrotas per has quæ morbos fa-
ciunt. Sic enim quam optime principium ægrotantis quis sa-

nauerit.

*quo morbo
per os in
ducit*

*unde cum
pro ratione
da*

HIPPOCRATIS LIBER

Corpus
quale.

nauerit. Corpus porro ipsum sibiipſi idem ac ſimile eſt, & D
ex iſdem compositum eſt. Similiter autem habet & paruas
& magnas partes, itemq; infernas ac ſupernas. Et ſi quis mi-
nimam corporis partem acceptam male afficere velit, totum
corpus affectionem ſentiet, qualiscunque tandem ea fuerit:
propterea quod minima corporis pars omnia habet quæ-
cunque & maxima. Insuper quicquid tandem minima pars
pertulerit, ad gentilitatem reſert ac transfert, vnaquæque ad
ſuam, ſiue bonum ſiue malum id fuerit, & propterea corpus
& dolet, & lætatur, cum minima gente, quia in minima om-
nes inſunt partes, & hæc ad gentiles ſibiipſis ſingula tranſ-

Corpus hu-
manu me-
dici mate-
ria eſt.
Auditus.

ſerunt, & omnia denunciant. Cæterum natura corporis,
principium ſermonis in arte medica, primum perforata eſt E
qua parte audimus. Etenim vacua circum circa aures, non
aliud inaudiunt quàm ſtrepitum & clamorem, Quicquid au-
tem per membranam in cerebrum peruenerit, id liquido &
clare auditur. Ob id etiam foramen ſolum per membranam

Odoratus
Narium
qualitas.

circum cerebrum extentam eſt, In nares autem non ineſt fo-
ramen, verum mollis laxitas velut ſpongia & propterea per
longiorem diſtantiã audit quàm olfacit, odor enim ab ol-
factu longè diſpergitur. Et in oculos venulæ tenues ad vi-

Viſus quo
paſcatur.
Tres oculo-
rum tuni-
culæ.

ſum ex cerebro per ambientem membranam feruntur. Hæ
autem venulæ viſum olunt humore de cerebra puriſſimo,
qui etiam in oculis apparet. Eadem venæ etiam viſum ex-
tinguunt, vbi fuerint reſiccatae. Membranæ autem tres ſunt
quæ oculos cuſtodiant. Superna quidem craſſior, media te- F
nuior, tertia tenuis, quæ humorem conſeruat. Ex his ſuper-
na & craſſiſſima ſi lædatur ac mutiletur morbos facit. Me-
dia verò etiam ipſa periculosa eſt, & vbi rupta fuerit promi-
net foras, velut veſica. Tertia autem tenuiſſima omnino pe-
riculosa eſt, quæ humorem conſeruat. Membranæ cerebri

Cerebri
duæ men-
branae.
Venulæ ca-
pitis.

duæ ſunt, altera ſuperna craſſior, altera tenuis cerebrum at-
tingens, non ampliùs eadem permanens, poſtquàm fuerit
vulnerata. Venæ autem tranſeunt ad verticem per carnem
venientes ad oſſiculum, feruntur & per carnem duæ ex ver-
tice rectà, qua parte ſupercilia clauduntur, & deſinunt ad
angulos oculorum. Vna autem à vertice ad naſum fertur, &
in vtranque naſi cartilaginem ſinditur. Aliæ verò duæ ve-
næ iuxta tempora feruntur, in medio temporum & aurium,

quæ

- A** quæ premunt oculos, & semper pulsant, Solæ enim hæ ex venis sanguine nō rigantur, sed auertitur ex ipsis sanguis. Qui autem auertitur influenti occurrit, & qui quidem auertitur volens discedere, qui verò supernè influit volens infrà procedere, hic impelluntur ac diffunduntur ac mutuò circumagitantur, & pulsus venis exhibent. Visus humore de cerebro nutritur, quum autem quid eius de venis acceperit, fluxione turbatur, & humor ipse nō apparet, & ob oculos moueri ipsi videntur aliquando velut auicularum imagines, aliquando velut lentes nigræ, & nihil exactè iuxta rei veritatem videre potest. Aliæ duæ venæ in medio aurium & aliarum venarum, quæ feruntur ad aures, & premunt aures. Aliæ duæ
- B** venæ ex oris conclusione in aures feruntur. Quædam verò infrà ad corpus conuertuntur: duæ quidem venæ iuxta tēdines colli feruntur & iuxta verticula, & desinunt in rhenes, hæ autem etiam in testes penetrant, & quum hæ affectæ fuerint homo sanguinem mingit. Aliæ duæ venæ à vertice ad humeros feruntur, & sanè humerales vocantur. Aliæ duæ venæ à vertice iuxta aures, ab anteriore colli parte vtrinque ad cauam appellatam venam feruntur. Caua autem vena finitur quidem velut gula, consistit autem inter gulam & guttur siue arteriam, ferturque per ceptum transuersum & per cor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intrò, & disparationes in femoribus facit, & ad tibia inus fertur ad malleolos. Hæ & infœcundum faciunt hominem, quum fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt.

*Quæ imae
gunculas
præ oculis
cursitantes
creant.*

*Venarum
digestio.*

C Ex caua autē vena producitur quædā in sinistram manū, fertur autem subter splenem ad sinistri lateris mollitudinē, vnde splen propagatur, per omentum, & finem sortitur ad thoracem. Producitur autem iuxta septum, & cum humerali comanittitur subter cubiti articulum: atque hæc splenis gratia secatur. Alia etiam ad dextram manum eodem modo à caua producitur. Communicant autem omnes venæ, & cōfluunt inter se mutuò, & aliæ quidem sibiipsis per se cōmittuntur ac coincidunt, aliæ verò per venulas à venis extentas. Quæ autem carnes nutriunt, ea parte inter se confluunt. Et quicūq; morbus à venis oritur leuior est quàm qui à neruis. diffiuit enim vnà cum humore qui in venis inest, & nō qui-

*Neruorum
qualitas.*

sicci

HIPPOCRATIS LIBER

sicci sunt, & ventricosos siue cavitates non habent, & ad ossa consistunt, & maxima ex parte ab ossibus nutriuntur. Nutriuntur & à carnibus, & volorem ac robur inter ossa ac carnem medium habent: & humidiores quidem sunt ac carnosiores quàm ossa, sicciores autem ac magis ossei quàm carnes. Quicumque autem morbus in ipsos peruenierit, roboratur & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere. Maxime verò impetunt ipsos distentiones, & alij morbi à quibus tremor corpus occupat, & qui temere ipsum faciunt. Nervi autem premunt articulos, extentique sunt per totum corpus. Robusti autem maxime & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucissimæ carnes sunt. Et corpus quidem omne nervis plenum est. Verùm circa faciem & caput non sunt nervi, sed fibræ consimiles nervis, inter ossa & carnes, tenuiores & solidiores. Capita suturas habent, alia tres, alia quatuor, & quæ quidem quatuor habent, his sunt vtrique iuxta aures, & tertia ab anteriore, quarta à posteriore capitis parte. Sic quidem in capite quòd quatuor habet, in eo verò quòd tres, iuxta aures vtrique sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore verò parte sutura nulla est, velut in eo quòd quatuor habet. Saniores autem capite sunt, qui plures suturas habent. Inter supercilia os descendit ac transit, & mandibularum clausura in medio mento, & superne ad caput est. Verticula alij plura, alij pauciora habent. Qui pauciora habent, his duodeuiginti sunt. horum alia sursum ad caput, alia deorsum ad sedem tendunt. Costæ septem à posteriore corporis parte, ad verticula connectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur. Claviculæ articulos habent, alios in medio pectoris iuxta guttur, atque hic coarticulatæ sunt, alios verò ad humeros, reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adhærent. Scapulæ verò ad membrana brachij siue totius manus coarticulantur, incumbētes in ipsum os quòd in membro est. Iuxta os autē appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adnascentes, infra coarticulatæ sunt. Quæ verò in cubiti flexura sunt, infra quidem radio coarticulatæ sunt, iuxta os natura cauum existens, supra autem radium paululum, in cubiti gibbum, & tunc tum os, tum radius in idem commissæ, articulum in cubiti gibbo faciunt.

Iuxta

Nervi ubi non sunt. Capitis sutura.

Supercilia. Mandibula.

Costæ.

Clavicula pectoris. Scapulæ.

Appendices.

E

F

A Iuxta vñam verò appendices prodeunt tenues valde quatuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbum quidem duæ appendices consistentes, suprà ex ossè hærent, hæc cum ossè cohærentes, iuxta ossis articulum in cubiti gibbum coarticulantur. Quæ verò infrà sitæ sunt, & intus reclinatæ, hæc utræq; cōmittuntur ad radium ex supernis à membro procedentē, & intus ad membrum coarticulantur, & radium appellatum faciunt hæc sibiipsis intus in cubito cōmissæ. Infra autē ad manū os articulum habet. Appēdices verò hac parte teneræ existentes, duæ quidem non exeunt in articulū. Superna autē & inferna, cum ossè coarticalantur ad manum.

Appendices quatuor

B Cæterum manus articulos multos habent. Quæcūq; enim ossa inter se cōmittuntur, omnia articulos faciunt. Dignati articulos habent multos, unusquisq; tres. Vnum ad vnguē, in medio vnguis & nodosæ prominentiæ, alterum in ipsa nodosa, prominentia, qua parte etiam digitos consecret. Tertium qua parte digitus à manu exoritur. At verò in coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellantur, & femora in hos inarticulata sunt. Iuxta femora autem appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neque ab altera parte, sed ad os ad femur inseruntur. Femur autem supernè ubi in acetabulum ingruit, bifidum est huiusmodi bicipitate. In ea quidem parte quæ intrò inclinata est, in summitate rotundum est ac leue, quæ etiam in acetabulum ingreditur. Altera autem bicipitatis pars exterior, magis foras prominet, & inferius apparet ad nates, & coxendix appellatur. Ad genu verò os femoris taliter biceps est. Bicipitio autem huic os tibia appellata, velut in cardine adaptatum est, suprà adaptatum autem Mola siue patella incumbit, quæ humiditatem à carne in articulum expassum descendere prohibet. Iuxta tibiā autē appendices duæ procedunt, quæ infernè ad malleolos pedis finiunt, supernè ad genu, nō autem perveniūt ad articulum.

Manus articuli.

Digitus.

Coxēdices.

Femur.

Genu.

Tibia.

Ad pedē verò tibia iuxta malleolos articulū habet, & aliū infra malleolos. Et in pedibus articuli multi quæadmodū & in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedū eodem numero sunt, ac pari modo habent. Articuli insuper multi in corpore parvi sunt, nō similiter omnibus, sed alij alijs. Hi autē qui scripti hic sunt, omnibus simi-

Pedum articuli.

Mucus.

liter habent. Aliæ etiam venæ alijs sunt, sed non memora- **D**
biles. Mucus omnibus à natura est, & cum hic purus fuerit
articuli sani sunt, & bene moueri possunt, utpote lubrici in-
ter seipsos. Labor autem & dolor fit, ubi à carne humiditas
fluxerit vitiosa. Primum enim articulus stabilitur, Nō enim
lubrica est humiditas quæ de carne influxit. Deinde ut mul-
ta, & valde sparsa, & ex carne non irrigata, semper resiccatur.
& ut multa existens, & articulo ipsam non capiente, effluit:
& malè stabilita eleuat nervos, quibus articulus colligatur,
ipsoque inconnexos ac dissolutos facit. & propterea claudi
fiunt, quum hoc magis fit, magis: quum minus, minus. In ven-
trem porro ea quæ comeduntur ac bibuntur procedunt. Ex
ventre autem, fibræ in vesicam, qua parte humorem percol- **E**
lat, extenæ sunt. Fluxiones autem, & perfrigerata valde
carne, & percalfacta fiunt, ac superinflammata. Fluxiones
propter frigus fiunt, quum caro in capite, & venæ tensæ fue-
rint. Hæ enim horrente carne, & ad angustias perueniente,
adstrictæq; ac excludente, humiditatem exprimunt. Et simul
carnes ipsæ contra exprimunt, ad angustias peruenientes: &
capilli sursum erecti fiunt, utpote simul vndiquaque fortiter
compressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum
quocunque contigerit fluit. Fluit autem etiam propter
caliditatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, &
humor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim hu-
mor calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit, Maxime ve-
rò ubi valde fuerit inflammatum propter hanc fluit causam. **F**

Calor cūa

Carnes valde plenæ factæ quum capere non possint, fluit
humor qui capi non potuit, fluit autem quocunque contige-
rit. Vbi verò semel fluidæ factæ fuerint fluxiones, diffuunt
ad locum quò tandem contigerit, donec transitus fluxionis
compressi fuerint propter gracilitatem. Quum autem cor-
pus fuerit resiccatum, & alioqui corpus ipsum sibiipsi com-
municans sit, etiam quum siccum est, diducit, & concipit ac
ducit, ubicunque humor tandem obrigerit: ducere autem
ipsum non difficile est, utpote corpore vacuo, & non in-
tumescente, præ gracilitate. Aliquando autem infernæ
partes siccæ fiunt, supernæ verò humidæ. Magis autem su-
perna vasa humida sunt. Venæ enim plures supra sunt quàm
infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent.
Ducit

*Claudica-
tio unde.**Ventriculi
uenule quæ
vesicam pe-
tunt.**Fluxiones
frigore ma-
gis fiunt.**Cur supe-
riora hume-
scant magis.*

- A** Ducit itaque sicca corporis pars humiditatem ex capite, & simul transitus magis ducenti patent, quàm ei quæ ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucrificiunt, & simul humores à natura deorsum procedere solent, si vel modica quædam necessitas contingat. Fluxiones de capite septem sunt, in nares, in aures, in oculos, atque hæc ex capite fluxiones ob oculos conspicuæ existunt. Postquam autem in thoracem fluxerit præ frigore, bilis fit. Magis autem in thoracem præ frigore fluit, propterea quòd facilis est fluxio ad guttur, utpote non contactum, præ frigore verò à bile infestati propterea lassitudine affliguntur, quia carnes quum bilem habuerint, non quiescunt, sed concutiuntur, & concussæ laborant ac delassantur, utpote velut in itinere faciendo concussæ, & suppurati fiunt quum in thoracem fluxerit, itemque tabidi. Quum verò in medullam fluxio contigerit, tabes occulta ac inconspicua oboritur. Quum autem retrò ad vertebras, & in carnes defluerit, hydrops fit. Id quod ex hoc cognoscere datur. Siccæ enim anteriores partes sunt, caput videlicet, & nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, fiuntque cum virore pallidi, itemque reliquum corpus: & nihil expuit homo, etiamsi multum fluat. Fluxus enim per mediâ carnem retrò fluens, & ab anteriore auersus, anteriores partes siccas facit, posteriorum verò carnem irrigat, & magis eam quæ intus est ad ventrem, quàm quæ foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidum est, quàm intus, & angustiores meatus ac foramina habet. Quare sanè quum tenuia sint foramina, constringuntur, ipsaque sibiipsis medentur, & fluxus nullus hac transire potest. Intus verò foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habent, fluxus verò utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se habens, influit & carnes humiditate replet. Sed & humiditas à cibis in idem procedens corrumpitur, corrupta autem ipsa præ ammixture, & simul cum ipsa ea quæ à capite defluit, corpus nutriunt. Carnes verò multo humore nutritæ, & morbofo augescētes, hydrope plenæ sunt. Si autem modicus fluxus fuerit, coxendicum & articularum diuturnam affectionem facit, ubi fluere cessauerit. Nam ut modicus, & undique ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugium facit. Fiunt præ-

*Septē fluo-
ris descen-
sus.*

*Biliofi man-
gis lassitu-
dine affli-
guntur.
Purulentu-
Tabidi.
Hydrops.*

HIPPOCRATIS LIBER

tereà articulorum ac coxendicum affectiones, à talibus mor-
bis sanatis, quum morbum quidem efficiens sanatur, in car-
ne verò quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus
intrò, neque foras, sed ad cutem egressum tuberculum utri-
que fecerit, fugit autem in id quod cedit, articulos videli-
cet, & aut articulorum, aut coxendicum affectiones inducit.

*Cum nares
tument.*

Si porrò intumuerint nares, & pituita plenæ fuerint, at-
que ea compacta, oportet pituitam compactam ac congela-
tam attenuare aut fomentis, aut medicamento, & non auer-
tere. Si enim fluxus auersus aliò procedet, omnino maiorem

*Cum aures
fluxio pe-
tis*

morbum faciet. Quum verò in aures fluxerit, primùm do-
lorem exhibet, violenter enim procedit: dolorem autem ex-
hibet, donec in fistulam redactus fuerit. Vbi autè fluere con-
sueuerit, non ampliùs dolorem facit. Ei verò quem dolor af-
fligit medicamentū natura calidum, tepidum factum & ne-
topo dilutum, infundendum est, & retrò cucurbita medica

*Cucurbitu-
la quo loco
in hoc dān-
da.*

affigenda, si sinistra auris doluerit, ad dextram, sin dextra, ad
sinistram, non autem scarificando pertundere oportet, sed
ut trahat solum sinenda est. Si verò per hæc dolor non sede-

Quæ potio,

tur, frigefacientia à natura frigida infundantur, & medica-
mentum potandum præbeatur, quòd secessum deorsum fa-
ciat, sursum autem non, quandoquidem vomitus non auxi-
liatur: & de cætero frigidis vtendum est, & semper non sa-
nantes variare oportet modum, & si quidem peius reddi-
derit malum, ad contrarium te conuerte: si verò ad sanita-
tem tendat, omnino nihil ab his quæ adhibentur auferre
oportet, neque quicquam aliud addere aut apponere. Si ve-
rò iam in fistulam redactus fuerit, & multa purulenta sanies
fluxerit, quæ graueolens sit, sic facere oportet. Spongiam
siccante quopiam sicco medicamento imbue, & in aurem
quàm penitissimè inde, & in nares purgatoriū medicamen-
tum mitte, quo ea quæ priùs in aures fluebant, in nares ferā-
tur, & non id quod morbosum est in caput rursus recedat.

*Cum oculi
fluore ue-
xantur.*

Cæterum vbi in oculos fluxio processerit, oculi inflam-
mantur & tument. Sic autem affectum hominem medica-
mento liquido, aut sicco inspersili curare oportet. Si verò sta-
tim inflammati fuerint, nihil omnino illine, sed aut fortissi-
mo quàm infimè vrito, aut alio quopiam aluum subducente
medicamento attenuato, vitando ne vomitum facias. Si ve-
rò la

A rō velut lapilli subtercurrerint, medicamētum illines quod plurimam lachrymam ducere potest, & reliquum corpus humectabis ac tumidum facies, quo oculi humidiores fiant ac colluantur, vt lachrymam adstrictam ac compactam decurrere facias. Quum autē in oculos paulatim fluxerit, & pruritum fecerit, sic affectum molli medicamēto illines, quod sic curare potest, simulq; modicam lachrymam ducere, & ad nares medicamentum adhibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem vtens. Sit autem tale medicamentum, quod non plus quam acetabulum per nares deducat, idque paulatim: quod verò oculis adhibetur resiccat, vt quod oculorum pharmacum resiccat ac obstruxerit, id ipsum ad nares feratur.

B Medicamenta caput purgantia, quæ quidem fortia sunt, à toto capite ducunt. quæ verò debilia, ab oculis & hinc à vicinis naso partibus. Si autem à carne & ossē, muco inter os & carnem subsistente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestum sit quod inde profluit. Cutis in capite compressa cedit, & vlcera in capite enascuntur, & oculi lachrymantur, & palpebræ nō exulcerantur, neq; mordax est fluxus, nec visum hebetat, sed homo ipse acutius videt. Fluxus enim non est saluus, vtpote non de cerebro, sed magis mucosus. Hunc sic sanare oportet. Medicamento caput purgandum est non fortī, & corpus attenuandum, & cibis & medicamentis infrā corpus subducentibus, donec attenuato corpore fluxus resiccat, aut medicamento in nares indito emoueat. Verū ad ipsos oculos nullum pharmacum adhibendum est. Si verò neque sic sanus fiat, caput secare donec ad os perueneris oportet, nō superficialibus neque transuersis aut obliquis fissuris incusis vsquequo ad os ipsum pertigeris, frequenter autē secare oportet, vt compactus humor citius prodeat per vlcera effluens, & simul vt frequentes sectiones, extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res succedat. Si verò hæc non commoda fuerint, & fluxus non eluitur, vt elutus acutè cerne re faciat, semper ab incumbente oculi magis splendescentes fiunt, & acutus visus hominis extinguatur. Si in visum, in humore purum cruentus aliquis humor ingreditur, huic visus intra oculum non rotundus esse apparet, propterea quod in quocunque inest cruentus humor, id ipsum non ap-

Medela.

Cū fulgent oculi.

HIPPOCRATIS LIBER

paret. huic itaque deficit vt visus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moueri ipsi videntur, & nihil reuera videt. Hu

Medela.

Medela. 289. 5. Tumor oculorum. 383. 2. Tumor oculorum. 383. 2. Tumor oculorum.

ius venas visum prementes exurere oportet, quæ videlicet semper pulsant, & inter aurem ac tempora consistunt: & vbi has obturaueris, oculis pharmaca quæ humectant adhibe, & lachrymam quàm plurimam prolecta, quo id quod in oculis compactum est, & morbum facit, eluatur. Si verò oculus rumpatur, mollibus medicamentis & acerbis vtendum est, vt vlcus adstrictum in angustum coeat, & cicatrix tenuis fiat. Si autem adhuc humoribus plenus fuerit, lachrymare oculo conducit. At verò quum in thoracem fluxerit, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit. dolor lateris molli

Peripneumonia, pleuritis qui differant.

litudinem occupat, & clauiculam eiusdem partis, & febris adest, & lingua supernè pallida ac viridis fit, & excreat compacta. huius morbi periculum septima aut nona die instat. Alia bilis. Quum ambo latera doluerint, reliqua autem similia velut in priore fuerint. Hæc quidem peripneumonia est. Illa verò pleuritis. Hæ autem propterea sunt. Quum in pulmonem fluxerit ex capite, per guttur, & aortas appellatas appendentes partes pulmonis, pulmo tanquam naturâ rarus & siccus, trahit in se humorem quantum eius capere potest, & vbi influxerit maior fit: & vbi quidem in totum fluxerit, extremitas eius maior reddita vtrumque latus contingit, & peripneumoniam pulmonis appellatum morbum, facit. quum verò alterum tantum, pleuritis id est costalis morbus fit. Peripneumonia multò periculosior est, & dolores multò fortiores sunt, qui ad laterum molli

Suppurati

litudinem & ad clauiculas tendunt, & lingua multò viridior ac pallidior, & fauces præ fluxione dolent, & lassitudo fortis occupat, & spiritus sexta aut septima die corripit. hūc si non septima die febris dimiserit, moritur aut suffocatur, aut vtrumque. Si verò nona die, duabus diebus interpositis, corripiat, vt plurimum etiam hic aut moritur, aut suppuratus euadit. Si verò duodecima die, suppuratus fit. Si quarta & decima, sanus fit. Et quicumque præ peripneumonia aut pleuritide suppurati sunt, non moriuntur, sed sani sunt. Suppurati vt plurimum sunt, quum fluxus in idem velut in bile contingit, sed in bile quidem multum defluit, & vbi defluit sedatur. Suppuratis verò minus defluit, & non sedatur.

Fiunt

- A** Fiunt etiam suppurati, quum minus exscreant quàm influit
 In pulmonem. Hoc enim quod in pulmone consistit, & quod
 influit, pus fit. Pus autem in pulmone & in thorace consistēs
 ac congregatum, vlcera & putrefacit, & postquam exulcera-
 ta fuerint, ab vlcerato influit, & quum exscreat caput simul
 concussum magis fluit, simulq; ex vlcerato in thorace ac pul-
 mone magis fluit, & vlcera agitata refringuntur, vt etiam si
 fluxus à capite cesset, is qui ab ipsis vlceribus venit sufficiens
 sit morbum facere. Fit præterea etiam ab vlcere suppara-
 tus, & leuior hic morbus existit. Fit etiā extra pulmonē, ma-
 xime quidem à ruptura, & vbi caro contusa fuerit. Iuxta hāc
 enim pus congregatur, & congregatum fluctuat, si quis cor-
 pus concutiat, & strepitum facit, & hæc vruntur. *Tabes.*
- B** Tabes autem fit quum in idem, velut in suppurato, fluxio fit per gut-
 tur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quæ
 pulmonē & guttur continent ac cōiungunt. Fluit autē in pul-
 monem frequenter & paulatim, & humiditatē in pulmone
 non multam facit. Resiccātū enim id quod influit, & in gut-
 ture cōpactum, vtpote quod non eluitur, sed paulatim influit
 ac detinetur, tussim excitat, & in aortis id quod influit deten-
 tum, vtpote quum angusta foramina aortæ habeant, angustū
 spiritui locum exhibet, & talem spiritū habere facit, qui ve-
 lut defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone ve-
 lut non vehementer humido existente, pruritus contingit.
 Quum verò multū de capite fluxerit, pruritus in pulmone
- C** non fit. Multum enim est quod in ipsū influit, & suppurati
 ex his tabidis siue phthisicis græcè appellatis fiunt, vbi cor-
 pus humectius factum fuerit, & contrā vbi siccus fuerit fa-
 ctum, ex suppuratis tabidi. Suppurati hoc modo cognoscun-
 tur. Lateris mollitudinē à principio dolor occupat. Quū ve-
 rò iam pus collectū est, & dolor similiter habet, & tussis fit, *Pus intus
quid faciat.*
 & pus exscreat, & spiritus corripit, Si verò nondū erupit pus,
 in lateris mollitudine concurritur, & velut in vtriculo strepi-
 tum facit. Si verò horum nihil adsit, suppuratus autem sit,
 ex his coniectare oportet. Spiritum multū habet, subrauco-
 siusq; loquitur, & pedes ad genua intumescūt, magis autem
 ab ea lateris mollitudinis parte, in qua pus est, & thorax con-
 curuatus est, & membrorum dissolutio fit, & sudor per totū
 corpus diffuit, & aliquādo sibiipsū videtur calidus esse, ali-

*Suppurato
signa*

HIPPOCRATIS LIBER

*Tabes spi-
na.*

*Pleuritidis
curatio.*

*Accū mul-
sum quibus
detur.*

*Purulentorū
medela.*

quando frigidus, & vngues circuntenti sunt, & alius calida D
fit. Ex his suppuratos cognoscere oportet. Porro quum re-
tro in spinam fluxio processerit, huic tabes fit eiusmodi.
Lumbos dolet, & anteriores capitis partes vacuæ videntur
ipsi esse. Bilis autem periculosa est, si icterus siue regius mor-
bus in oculis accedat, & in vnguibus liuiditas si fiat. & si cor-
pus vlcera habeat, & partes circa vlcera liuidæ sint, & quum
sudor non toto corpore erumpit, sed vna aliqua corporis par-
te, & quum febre adhuc existente excreat æger pallidum vi-
ride, aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum viride, ex-
creatione cesset. Sic autem quum inest, & non inest, cognosce-
re oportet. Quum inest, in faucibus respirantis strepit, & spi-
ritus periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, ex- E
creatione adhuc in pulmone hærente, & alius debili iam
existenti secessum facit. Hæc pleuritidis & peripneumonix
periculosa indicia existunt. Ceterum pleuritidem hoc modo
curare oportet. Febris sedanda non est per septem dies. Potu
utendum aut aceto mullo, aut aceto & aqua: hæc autem quam
plurima offerre oportet, quo humectatio fiat, eaq; facta ex-
creationem faciat: & dolor sedandus est calfactorijs medi-
camentis, & absorbendum dandum est quicquid excreationem
facit, & balneis utendum quarta die, quinta autem &
sexta oleum illinendum est. Septima lauandum est, si febris
dimittere non velit, quo præ balneo sudor contingat. Insu-
perq; & quinta & sexta fortissimis utendum est excreato-
rijs medicamentis, quo septimam diem quam facillime tran- F
figat. Si vero neq; septima die febris cesset, nona cessabit, si
non aliud quid periculosum accedat. Postquam autem fe-
bris dimiserit, sorbitiones quam debilissimæ offerantur. Si
verò euacuatio oboriatur, si quidem iuvenile adhuc est cor-
pus, potus auferendi sunt. Si verò febris dimisit, triticeis sor-
bitionibus vtaris, Et eodem modo peripneumoniam curato.
At verò suppuratis, caput purgare oportet non fortibus me-
dicamentis, sed paulatim auertere in nares, & simul edulij
ventrem subducentibus uti. Et quum principium morbi
nondum est, sed eò fluxus vertitur ac vergit, excreationem
facere, & tussim excitare, & medicamentis infusilibus in na-
res uti, & cibus simul ingestis. Quum autem excreationem
facere oportet, pluribus cibus & salis ac pinguibus utendum
est, &

A est, & vino austero, & quum sic habet tussis inducenda. Tabidos item eodē modo quod ad reliqua attinet curabis. præterquam quòd cibi non multi simul ingerendi sunt, & obsonia non plura quàm cibaria frumentacea, & vino inter edendum vtendū est aquoso, vt ne calfaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calfaciant in eodem tempore, & caliditate multum fluxum inducāt. Quum porrò per gulam fluxus in ventrē processerit, morbus infra sit, aliquando etiam superne. Huic si quidem in ventre dolor inerit, subducendus est primū medicamento aut succo, deinde pharmaco fortiore vtēdum est, cibis verò aluum subducentibus, donec dolor perseueret. Vbi verò dolor sedetur, **B** cibis validioribus vtatur. Eodem modo vbi morbus multos dies hæserit curabis. Si verò debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc offerri nō possint: primū quidem ptisanæ succo per clysterem infuso, alius eluenda est, post vbi per hunc purgari, aliquo ex adstringentium numero. Quum autem retrò in carnē iuxta vertebra fluxus illapsus hydropem fecerit, sic mederi oportet. Caro in collo inter venas crustis tribus vratur, & vbi vsseris, constringatur, & cicatrices quàm tenuissimæ inducantur, & vbi fluxum obturaris, medicamentum in nares adhibe, vt eò vertatur, & aliud rursus donec auertatur. & anteriores quidem capitis partes calfacito, posteriores verò perfrigerato. Et postquam anterioribus capitis partibus excalfactus fuerit, cibos edat quàm pituitosissimos, ac minimè ventrem subducentes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte quàm maximè dilatentur, Postea vbi obturaris & auerteris influxionem, si quid prius quàm curaris fluxum, in corpus peruenerit, sic mederi oportet. Si quidem magis ad cutem secesserit, externis partibus fomentum adhibebis. Si verò intrò ad ventrem, foris autem non conspicuum sit medicamentum bibendum dabis. Si verò in vtrunque partem, ab vtraque detrahes. Verū hoc studio habere oportet, vt proximum exitum facias, siue infernè siue superne, aut etiā alia aliqua corporis parte, vbi exitus sunt. Quū **C** coxëdicum morbus à fluxione fiat, cucurbitam medicam affigere oportet, & foras trahere, & nō scarificādo pertundere. & calfactorijs medicamētis in poru exhibitis intus calfacere, quo exitus fiat tum foras ad cutē per cucurbitæ tractio-

Tablæ ratio.

Hydrops qui cutem ur.

Ischiados medela.

HIPPOCRATIS LIBER

nem tum intus ad ventrem per caliditatem. Nam quum ob-
 turatus fuerit fluxus, & non habeat quò iter faciat, viam ad
 articulos facit, & in id quod cedit influit, & sic coxendicum
 morbum inducit. Tabes ex fluxione retrorsum. Qui hac af-
 fectus est, ei caput est purgandum debili medicamento, do-
 nec fluxus auertatur, diætâ autè vttere velut in tabe superio-
 re. Medicamentum potandum præbe Elateriũ deorsum pur-
 gans, & infernè aluum lacte infuso elue, de cætero fomentis
 vttere. Quum splen præ febre magnus factus fuerit, sit au-
 tem quum corpus attenuatur. Ex ijsdem enim & splen flore-
 scit, & corpus contabescit. Quum autem corpus tenuè fue-
 rit, & splen floruerit, & omentum simul cum corpore at-
 tenuatum fuerit pinguitudo in omento colliquescit. Vbi ve-
 rò vasa pinguitudine vacua facta fuerint, & à splene florente
 ac augescente in omentum defluerit, vtpote vicinum valde
 existens, & vt vasa habens eaq; vacua, excipit, & vbi morbus
 semel in corpore factus fuerit, ad id quod est morbosum ver-
 titur, nisi quis probè disponat ac curet. Nam etiam si quis be-
 ne tractet, periculo non vacat. Hunc sic sanare oportet. Me-
 dicamenta in potu exhibenda sunt quæ aquam purgent, &
 edulia quàm pituitosissima offerenda. Si verò neq; sic leuior
 fiat inurèdæ sunt crustæ quàm tenuissimæ, & quàm maximè
 in superficie quo aquam continere possis, circum circa vmbi-
 licum, & vnà in vmbilicũ, & emittere singulis diebus. Quũ
 enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet.
 Si enim successerit, sanum facies: sin minus, quod etiam aliàs
 futurum erat, id ipsum perpetitur. Cæterum in puero hydro-
 pem sic curare oportet. Partes tridæ & aqua plenæ aperi-
 dæ sunt scalpello, & frequenter ac parum educendum est.
 Educendum autem est à singulis corporis partibus, & fomen-
 tis vtendum, & semper locum apertum vnde eduxeris cal-
 factorio medicamento illines. Pleuritis sicca citra fluxum
 fit, quum pulmo valde exsiccatus fuerit præ siti necessaria.
 Pulmo enim natura siccus existens, vbi amplius quid quàm
 pro natura siccatus fuerit, gracilis fit, & impotēs redditus, &
 ad latus præ impotentia reclinatus, latus contingit, & post-
 quā contigerit ipsum humidũ existens, & cohæret & adgluti-
 natur, & pleuritidē hoc est lateris morbũ facit. Tunc verò &
 dolor fit in latere, & clauicula, & febris, & album excreat.
 huic

*Tabes spina-
 na & eius
 medela.*

*Lien turgi-
 dus.*

Medela.

*Hydropis
 curatio an-
 cept.*

*Pueri hy-
 dropici qui
 curentur.*

*Pleuritis
 sicca.*

*Pulmo sic-
 cus*

D

E

F

- A** hunc multis potibus curare oportet, & lauare, & doloris medicamentum præbere, & alia quæ exfereationem faciant. hic in septē diebus sanus fit, & morbus minime periculosus est, & cibos præbere non oportet. Febres porro propterea fiunt, quum corpore superinflammato carnes intumuerint, & pituita ac bilis cōclusa quienerint, & neq; refrigeretur quicquàm, neque exeat, neque moueatur, neq; aliud quid subeat. Quum itaq; lassitudo occuparit & febris ac repletio, lauare multa aqua oportet, & oleo illinere, & quàm maximè calfacere, quo caliditas aperto corpore, præ sudore egrediatur. consequenter autem hæc faciēda sunt per tres, aut quatuor dies: & si non sedetur ac cesset, pharmacum in potu exhibendum
- B** est quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, præterquam si quartana existat. Medicamentu tamen donec corpus floridum est ne propinato, non enim vacuantur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & euacuabitur. Febrienti cibum ne offeras, neque sorbitionibus subtus aluum ducas. In potu dabis aquam calidam, & aquā mulsam, & acetum cum aqua. hæc autem quàm plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens ac manens, ex corpore ægroto detrahet, & vel per vrinam eiiciet, vel exsudabit. Vndiquaque autem apertum, & respirans, ac motum corpus, id quod conducibile est, faciet. Quum verò gracilem existentem febris vrat, manifestum est quòd non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet ac tumidum facere, & si neque sic conducatur, palàm est quòd nō oportuerit febrem inducere. Hunc itaque medicamentum potare oportet quod educat, qua parte febris magis hæret, siue supernè siue infernè, & si quidem supernè hæreat, supernè, sin infernè, infernè. Nihil autē minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter: aut solum sic, fortibus quidem fortè, debilibus verò debile exhibeas. Ardores verò potionibus & sorbitionibus, quemadmodum febrem frigefactorio medicamento exoluere oportet, cammaro videlicet, aut alio quopiam huiusmodi: & si nausæa contrahat à frigefactorio, calfactorijs vtere consequenter. Vbi verò non cesset, frigefactorijs rursum vtere. Icterus siue regium morbu sic curare oportet. Quum susceperis nutritio, &
- balneis,

*Febres
de m
riti
vtr*

29. 193

*Cum febris
uexat quæ
agas.*

*Quæ media
camēta sin
gulis dāda.
Morbus re
gius quæ cu
ratur.*

HIPPOCRATIS LIBER

balneis, & pinguefacientibus, potibusque ac cibis humecta - D
to, per tres aut quatuor dies. Postquam autem humectatum
fuerit corpus, purgato & resiccato ipsum, pinguitudinemque
derepente exhaurito, & vndiquaque si possibile sit medica-
mentum adhibens, humiditatem educito, ad caput verò pur-
gatorio debili vtitor: & vrinam cientia bibenda dato, eaque
ante cibos hoc tempore quo turbatam humiditatem purga-
ueris in potu præbe, ne ab eo tēpore corpus nutriatur. Quum
verò attenuatum fuerit, etiam balneis purgato, & contusa cu-
cumeris syluestris radice, eaque in aquam coniecta, inde la-
uato. Cæterum medicamenta bilem ducentia ne propina-
to, ne corpus magis conturbes. Vbi verò siccū fuerit id quod
conturbatum fuit, nutrito, nullo aluum subducente medica- E
mento, neque vrinā ciente vtens, sed vino vinoso, & his quæ
rubicundiores hominem faciunt. Si verò viridis ac luteus
sit, rursus exhaurito, nequaquam verò siccato, vt ne is color
stabilis reddatur. Vlcus ferinum in corpus propterea ve-
nit. Postquam caro tumida & inflammata circū circa fue-
rit, & margines vlcis magni extiterint, & vlcus ipsum hu-
midum, & in vlcere sanies resiccata inerit, aut vlcus constri-
ctum fuerit. Sanies computrefaciens ab vlcere defluens, for-
as prodire à constricto ad carnem vlcere prohibetur. Caro
autem suscipit, vtpote eleuata existens ab inflammatione, &
quum in ipsam peruenerit sanies subterfluens, putrefacit &
attollit. Hunc medicamentis humectantibus ipsum vlcus F
illinere oportet, vt ex humectato vlcere fluxus foras effluat,
& non subter carnem. Influentia etiam in vlcus frigefacien-
tibus pharmacis illinēda sunt, quo perfrigerata caro, existat,
& non dirupta rursus fluxionem immittat. Sed & alia vlcera
frigefacientibus oblinenda sunt, & super ipsa humectantia
imponenda. Angina quàm cynanchen græci vocant à san-
guine fit, quum sanguis in venis quæ in collo sunt compactus
fuerit. Sic affectis à venis quæ in brachijs sunt, sanguinem
detrahes, & simul aluum infernè subduces, quo id quod mor-
bum exhibet, detrahatur. Lingua quoque quum magna vl-
cera habuerit, similiter curanda est. Morbos à principio
curare oportet, & si quidem à fluxionibus fiunt, primum flu-
xiones sedare. si verò ab alia causa, principium morbi sedare
ac curare: deinde id quod influxit, si quidem multum fuerit,
educere,

*Cucumeris
syluestris
radix.*

*Ferinum
ulcus.*

Angina.

*ordo curatio
1. 15*

A educere, sin modicum, per dietam moderari ac componere. Capitis fracturæ. Si quidē os fractum fuerit ac contritum, periculo vacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si verò rumpatur, & fissura fiat, periculosum est. Huic ferram adhibere oportet, ne in ossis scissuram sanies influens membranam cerebri putrefaciat. Nam vt per angustum intrans, non autem exiens affligit, & furere hominem facit. Huic itaque ferram adhibere oportet, vt sanies exitum habeat, non solū ingressum, ampla serratura facta. Medicamentis autem vtendum quæ humorem in sese trahunt, & lauandum. Febricitanti caput ne purgato, vt ne furiosus fiat. Calfaciunt enim caput pharmaca purgatiua, & sanè ad caliditatem febrilem accedens ea quæ in medicamento est, insaniam facit. Ex quacunq; causa malè affligēte quis atram bilem reuomuerit, moritur qui vulnus habet. Et qui ab euacuatione detinetur, & debilis est, & tenuis existens derepente siccus subsidit, moritur. Quum à caliditate detento, vluscula eruperint debili existenti circum circa liuida, moritur. Quum à morbo quopiam detento, debili iam existenti, liuida vluscula enata fuerint, mortale. Quum quis à medicamento potu superægrotarit, & infernè ac supernè ab ipso secesserit, vinum sorbeat primum quidem dilutum, deinde meracum frequenter, & sanabitur. Medicamentum autem neque euacuatium, neque vomitorium sumat. Bilis vbi sua sponte eruperit, aut infernè, aut

C supernè, difficilius sedatur. Quæ enim sponte procedit, præ violentia corpori facta impellitur. Si verò à medicamento fluat, non à gentilitatis cognatione violatur. Quum susceperis vinosum & vomentem, vomitum ne sedato. Vomitus enim euacuationem sedat, facilius autem vomitus postea sedabitur. Si verò debilis fuerit qui hæc patitur, somnificum medicamentum à vomitu præbebis. Sanguis quum morbum facit, dolorem exhibet, Pituita autem grauitatē vt plurimum. Morbum si quis non cognoscat, medicamentum bibendum præbeat non fortè. Si itaque leuior inde fiat, demonstrata via est, quod gracilitatē inducendo curandus est. Si verò non leuior reddatur, sed peius habeat, contraria facienda sunt. Si non profuerit gracilem facere, tumidum facere conducat, & frequenter permutare, ita vt hoc consilio utaris.

*Supra hæc
dicta apho.
respon. as
cor. 1. 10*

*Quæ vulnē
ra mala.*

*Quod medi
camentum
non dandū.*

*Quæ medi
camenta
danda.*

*libra et
corpora inter
morbos san-
ta
maior curis
s quam morbi
ma habenda*

ris. Si quis in morbis quid permutaturus est, forti quidem D
 ægroto, debili autem morbo, tunc quidem confidenter forti-
 ore quàm morbus est, medicamento vtendum est. Nam
 etiam si quid de sano abducatur una cum debili ac ægroto, nul-
 lum detrimentum est. Si verò morbum fortiozem, ægrotum
 autem debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ
 ipsum morbum superent & abducant, verum ægrotum nihilo
 debiliorem reddant. Ars exercitandi corpora, & Medicina
 contrariæ sunt. Ars enim exercendi corpora: gymnastice græ-
 cis appellata: non opus habet permutatione, sed Medicina.
 Sano enim non auxiliatur transmutatio ex præsentis statu,
 verum ægroto. Morbi quicunq; vlcera sunt, & super reliquum
 corpus eminent, eos simul cum medicamentis etiam fame cu- E
 rare oportet. Fluxione ex capite fluente vomitus conducit.
 Antiqui morbi difficilius curantur quàm recentes, verum

*Capitis flu-
rio.
Morbi ue-
tusti & re-
centes qui
curentur.*

morbo antiquos primùm recentes facere oportet. Vlcus
 callosum factum, eiecta primùm duritia per putrefactorium
 medicamentum, constringere deinde oportet. Pharmaca
 quæ tumefacere maximè solent, ea pura vlcera adstringunt.
 Quæ verò attenuant, ea purgant. Si verò quis constringat
 vlcera nondum matura, corpus ægrotum nutrit quod vlcus
 habuerit. Et si quidem adstringere oporteat vlcus ac im-
 plere, tumefacere prodest, etiam si in capite carnem velis.
 Renutrita enim à cibis caro, propulsat eam quæ à medica-
 mento putrefacta est, & simul cum natura debellat. Verum
 eleuatam aut leuem carnem, cibis gracilem reddere oportet. F

*Mori sta-
quentes qui
obit
ra cures.*

Tristes anxios & ægrotos, ac se strangulare volentes, man-
 dragoræ radice manè in potu data minore pondere quàm
 quod insanire facit, curabis. Conuulsioni sic mederi oportet.
 Ignis ab vtraque lecti parte succendatur, & mandragoræ
 radix in potu præbeat minor pondere quàm quod insa-
 niam facit. Et ad tendines posteriores sacculi calidi impo-
 nantur. A conuulsione si febris inuaserit, sedatur eadem die,
 aut sequenti, aut omnino tertia. A ruptura febris non corri-
 pit amplius quàm tres aut quatuor dies. Si verò corripiat, &
 quis putat se à ruptura habere, ab alia sanè quapiam causa cor-
 ripitur, & non oportet ipsam velut à ruptura curare. Quum
 homo manibus ac pedibus distentus ac tortus fuerit, insaniam
 sibi ipsi facit. Venam porrò sic vrere conuenit commodam
 ad

*Ruptura.
Manus pe-
desq; si tor-
quantur,
quid por-
tentant.*

A ad morbum, ex quocunque tandem quis ægrotarit. Si vſtus fuerit homo, & fluxerit ſanguis, ita vt hoc non periculofum ſit ipſi, ambo hæc facere licet. Si verò percufferis ipſam in dolore, cuius gratia vrebatur, non coaleſcit, verum fluxui prodeſt. Si enim peruſta fuerit, non fluit. Nam poſtquam peruſta eſt, extremitas vtræq; venæ recurrit, qua parte peruſta eſt, & exareſcit. Si verò quid relictum fuerit, præ relictò perfluente fluxum humectatur. At ſi ſanguis ex vena fluit, per tranſuerſum perurito. Si verò non ceſſet, ad hæc ſupra ac infra vtrinq; diſſecato, quo ſanguinis fluxus auertatur. Diductū enim facilius eſt medicamēto ſedare, quàm coaceruari.

B Doloris in capite gratia, ſanguinem de venis detrahit. Si verò non ſedetur, & diuturnus ſit, perure venas, & ſanus euadit. Si verò caput purgaueris, magis affliges. Medicinam citò diſcere nō eſt poſſibile, propterea quòd impoſſibile eſt ſtatam ac certam doctrinam in ipſa fieri, velut (verbi gratia)

*Capitis do-
loris mede-
la.*

Qui ſcribere didicit, iuxta vnum modum, quem omnes docent, nouit, & ſcientes omnes ſimiliter nouerunt, propterea quòd idem & ſimiliter factum, & nunc, & non nunc, non po- teſt fieri contrarium, ſed ſemper exactè ſimile eſt, & non opus habet occasione. Medicina verò & nunc, & ſtatim, non idem facit, & ad eundem contraria facit, & hæc etiam con- traria ſibiipſis. Primum aluum ſubducentia nō ſemper hoc faciunt, & aluum ſubducentia vtrunq; faciunt. Fortaſſis autē neque ſic ſe habent aluum ſubducentia, velut aluum ſiſten- tibus contraria. Reſtitante enim aluo, propter vehementem ſtabilitatem corpus intumeſcit, pituita in ventrem perue- niente, ſic ſtabilitas ſeceſſum facit. Vbi enim pituita in ven- trem ingreſſa fuerit, euacuatio contingit. Inſuper verò aluū ſubducentia ex natura, ſtabilitatem faciunt in ventre, ſi qui- dem non ſubducentia feceris, Si autem exoluatur, & hume- ctetur id quod morbum facit, poſtquam exolutum fuerit, ſa- nus euadit. Et ſic ventrem ſiſtentia, ſubducentibus ſtabilita- tem ventris faciunt, & viciffim ſubducentia ventrem, ſiſten- tibus. Eodem modo res ſe habet circa rubicundos & palli-

*Medicine
cur penitus
nō ſciatur.*

C dos. Nam & pituitola ac tumefacientia & pallidos faciunt, & boni coloris. Itemque attenuantia. vtriuſque autem me- dicamentum ſunt contraria contrario. Verbi cauſſa, Quum intumuerit pallidus exiſtens, exoluitur ſanè ſi quod medica-

Pallor.

ment

HIPPOCRATIS LIBER

mentum attenuans adhibitum fuerit. atque hic tumenti at- D
 tenuans opitulatur. Rursus autem quod aliquādo vtilitatem
 cœpit, nunc hic opitulanti opitulatur, quum sanè præ graci-
 litate decolor & pallidus factus fuerit. Si quis enim pituito-
 sum ac tumefaciens medicamentum exhibuerit, pallor seda-
 tur. Insuper verò etiam dolor, & propter frigiditatem fit,
 & propter caliditatem, & propter valde exuperans, & pro-
 pter imminutum. Et in perfrigeratis quidem natura extra
 corpus ad cutem, propter calfaciens valde, dolor fit. In cali-
 dis verò natura, propter frigidum. Et in siccis natura, si hu-
 mectentur. & in humidis natura, si resiccentur. In singulis e-
 nim quorum natura permutatur ac corrumpitur dolores sũt.
 Sananturq; dolores contrarijs, idq; etiam vnique morbo E
 proprium est. Nam in calidis natura propter frigiditatem
 ægrotantibus, dolores calefiunt. & reliqua iuxta hanc ratio-
 nem fiunt. Alius porro modus hic est, per similia morbus
 fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Velut, vrinæ
 stillicidium idem facit, si nō fit, & si fit, idem sedat. Et tussis
 eodem modo, velut vrinæ stillicidium, ab iisdem fit & sedat.

*Febris et vo-
 mitus medi-
 camenta nō
 curia.*

Alius rursus modus hic est. Febris quæ propter tumefactio-
 nem ex pituita fit, aliquando quidem ab iisdem fit, & seda-
 tur, aliquando autem à contrarijs. Aliquando enim si quis
 vult aqua calida lauare, & multum potum exhibere, sanus
 æger fit, & febris quæ propter tumefactionem facta est, pitui-
 tosis ac tumefactionem facientibus oblati, & adhibitis sa-
 nescit. Et si quis vult medicamentū bibendum dare, aluum F
 subducens & vomitorium eodem modo & à facientibus se-
 datur, & à sedantibus fit. Nam si quis homini vomēti, aquam
 multam bibendam dare velit, eluentur ea propter quæ vo-
 mit, vnā cum vomitu. Et sic quidem per vomitum vomitus
 sedatur. Rursus autem propterea quod sedatur, quia infernè
 procedere ipsi fecit, ex illo id quod intus est vomitum facit,
 & ambobus cōtrarijs modis homo sanus fit. Et si quidem sic
 in omnibus haberet, stata sanè ac certa medicina esset. Ita a-
 lia quidem contrarijs curare oportet, qualia tandem sint, &
 à qua causa fiant; alia verò similibus, qualia tandem sint, &
 à qua causa fiant. Huius autem rei causa corporis debilitas
 existit. Corpus enim à cibis æqualibus æqualiter nutritur, à
 corpore verò cibi superantur. Postquam verò plus aut minus
 in ipsum

Causa.

A in ipsum ingestum est, aut alia quæpiam transmutatio facta est, superatur, superant autem cibi. Et quum sanè superatur corpus ab his quæ ipsi offeruntur, florere hæc ipsa facit, & superant hæc simul corpus, & contraria ipsi faciunt. Et calida lauari, donec quidem corpus superat eius exhibitionem, florere corpus facit. Quum verò superatū fuerit, gracile corpus facit. Et coniuari similiter vt lauari facit. Hæc enim donec superatur florere corpus faciunt. Vbi verò superauerint, & alui secessus & varia vitia inducūt. Quum autem id quod offertur, transmutatur, necesse est & id cui offertur, transmutare. Etenim corpus transmutatum parum efficax ac potens est, & ab omnibus offensiones percipit. Hoc autem faciunt,

B & aluum subducentia: & florere ipsum facientia, gracile corpus faciunt, & reliqua omnia contraria his facientia. At verò Medicina breuem occasionem habet: & qui hoc nouit, illa stata ac certa habet: & scit quæ consueta sint, & quæ non consueta, ad quæ cognoscenda non est occasio in medicina, & quòd aluum subducentia, non subducentia fiunt, & reliqua quòd contraria sunt, & contrarijssima non contrarijssima. Occasio autem hæc est, vt cibos offeramus ea copia, quantam corpus cui offeruntur superare valeat. Nam si quis sic fecerit, omnino necesse cibum est aluum subducentem oblatum, subducentē esse, & pituitolum, pituitolum. Si igitur superauerit corpus ipsos cibos, neque morbus, neque contrarietas fit ex his quæ offeruntur, & hæc est occasio quam medicum nosse oportet. Quum verò occasionem supergressus fuerit, contrarium fit, & antequam ei excessum factum esse putant, consequens est vt caleseat. Donec enim corpus id quod oblatum est superauerit, corpus nutritur. Vbi verò hanc occasionem transmiserit, contrarium fit, nam attenuatur & gracilescit. Sed & alia omnia, & quæ tumefaciunt, donec quidem superauerit corpus, ampliusque pro occasione offeruntur, etiam iuxta naturam suam singula faciunt, & pituitosa siue tumefacientia tumefaciunt, vbi verò occasionem transmiserint, contraria sunt. Medicamēta sunt omnia quæ præsentem statum transmouent. Omnia autem fortiora trāsmouent. Licet autem si velis, medicamento transmutare, & rursus si velis, alimento ac cibo. Omnia verò ex præsentī statu transmutare, ægrotanti opitulatur. Si enim id quod morbu

*Quæ cor-
pus uiuent
& contra.*

*Qualis me-
dica ars.*

*Quando o-
mnia suam
naturā con-
seruant.
Medicamē-
ta quid fa-
ciant.*

HIPPOCRATIS LIBER

Capitulum 5
Capitulum XXI
facit, non transmoueris, augefcit. Medicamenta fortia à natura, in debilibus morbis dare non oportet, neque paucitate medicamenti, debilitas ipsius facienda est. Sed fortibus natura, fortibus pharmacis vtendum est, debilibus verò, pharmacis non fortibus. Neque partiendum est medicamentum, sed singulis secundum naturam, debilibus quidem debilia à natura, fortibus verò morbis, fortis naturæ pharmaca exhibenda sunt. Cæterum morbi ea parte qua proximi sunt, educendi sunt, & qua parte singulis exitus quam proximus est extrahendi. Aluum autem subducentia talia sunt, quæcunque lubrica & incisua sunt, & quæcunque in calidis attenuantur. Venter enim calidus est: & reliqua quæ falsuginosa sunt, & quæcunque ex talibus plurimum participant. Contra aluum non subducentia, sed sistentia sunt, quæ flatum exhibent, humida enim resiccata flatum faciunt: & quæ adstringunt, & quæ à calore compacta sunt, & friabilia, & sicca.

Acida pituitosa.
Omnia autem quæ foris extenuant, intra corpus assumpta tumefactionem inducunt, eadem autem & venter sistentia, & pituitosa, ac tumefacientia existunt. Et quæ aluum subducunt ac extenuant, cum calefacientibus eadem sunt. Insuper autem etiam acida pituitosa sunt. Omnia verò quæ frigefaciunt ea quæ in ventre sunt, talia aluum subducunt, ~~Item quæ frigida sunt, & quæ humida.~~ Quum autem non aluum subducentia fuerint, calfaciunt. Frigefaciunt autem & calida in ventrem assumpta, & citò secessum faciunt. Si verò secessum non faciant, calida in ventre existunt. Ex his quæcunque repletionem faciunt, maximè pituitosa sunt.

Medicina quæ.

Fortuna in his parum facit

Quæ verò plurima assumpta repletionem non faciunt, aluum subducunt. Medicina itaque mihi iam tota inuenta esse videtur, quæ sic habet, & quæ docet singulas & consuetudines, & occasiones. Qui enim sic medicinam nouit, minimè fortunam respicit, aut expectat, sed & citra fortunam, & cum fortuna, rectè faciet. Constans enim ac firma est tota medicina, & doctrinæ optimæ in ipsa compositæ, minimè fortuna egere apparent. Nam fortuna sui iuris est, & nullius imperio subest, neque optantis est ad ipsam peruenire. Scientia verò imperata facere cogitur, & facile est ipsam feliciter assequi, si quis sciens vti velit. Deinde verò quid opus est Medicinæ fortuna? Si enim morborum medicamenta clara sunt & manifesta, velut equidem

A equidem arbitror, nō expectant sanē fortunam ad sanandos *Medicamē*
 morbos si quidem sunt medicamenta. Si verò cū fortuna *ta sine for-*
 exhibere ipsa prodest, nō magis medicamenta quā ea quæ *tuna sanāt.*
 non sunt medicamenta, vñ cū fortuna adhibita sanos fa-
 ciunt. Quicunque verò fortunam ex Medicina, aut alia qua-
 piam arte expellit, dicitque eos qui probē rem aliquā sciunt
 fortuna non vtisis contrarium mihi iudicare videtur. Mihi *Quæ aduer-*
 enim soli hi fortunatē assequi, itemque infortunatē non as- *sa uel secun-*
 sequi videntur, qui rectē quid, & malē facere sciunt. *da fortuna*
Fortunatē enim assequi, est rectē facere, hoc autem hi qui sciunt *huic uideat-*
 faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non *ur.*
 rectē faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunate as-
B sequi possit? Si quid enim etiam assequatur, non memorabi-
 lem sanē successum habebit. Qui enim non rectē quid facit,
non fortunatē assequi poterit, quum reliqua quæ æquum est
facere non faciat. Morbi muliebres. Vteri omnium mor-
borum causæ sunt: hī enim vbi ex natura transmoti fuerint, *Vteri om-*
 morbos exhibent, siue ascenderint, siue descenderint. Et quū *nū morbo-*
 quidem vteri osculum suum non demittentes, & pudendi *rum causæ*
 eminentias non cōtingentes, transmoti fuerint foras, leuif- *femina.*
 simus morbus est. Quum verò in anteriorem partem promo- *Vteri mole-*
 ti fuerint, & osculum in pudendi eminentias ac labra immi- *stia.*
 serint, primū quidem ipso contactu dolorem vterus perci-
 pit ac exhibet: deinde obturatus, & velut operculo cōtectus,
 ex eo quod pudendi eminentijs incumbit, fluxus non con-
C tingit, qui mensium nomine venit. Hic verò fluxus congre-
 gatus, tumorem ac dolorem exhibet. Et si quidem infra de-
 scendens & auersus, in inguen se immiserit, dolorem exhi-
 bebit. Si verò sursum ascendens auersus & obturatus fuerit,
 etiam sic propter raritatem accoartationem dolorem ex-
 hibet. Quum verò propter hoc agrotarit, coxendicum ac ca-
 pitis dolorem facit. Vbi verò vteri impleti intumuerint,
 nihil fluit, & pleni fiunt: quum autem pleni facti fuerint, co-
 xendicesque contingunt, dolores exhibent, & in coxendi-
 ces, & in inguen, & velut pilæ in ventre discurrent, & caput
 dolore affligunt, modo altera ipsius parte, modo totum, pro-
 ut contingit ipsi morbus. Hæc itaque sic curanda sunt.

Si quidem descenderit solū, & illini possit, vtire quocū- *Medela.*
 que libet ex graecolentium genere, aut cedro, aut alij intri-

HIPPOCRATIS LIBER

to, myttoto græcis appellato, aut aliquo alio ex grauitè D
& malè olentium numero, eoq̃ suffutum facito, & fomen-
ta ne adhibeto, neque cibo neque potu vrinam ciente hoc
tempore vritor, neque calida lauato. Si autem sursum ascen-
derit, & non auersa fuerit, medicamentis apposititijs bene
olentibus, & quæ simul calfaciunt vtere. Velut sunt myrrha,
aut vnguentum, aut aliud quoddam odoratum simulq̃ cal-
factorium. Et his quidem subdititijs vteris, fomentū autem
ex infernis ex vino adhibebis, & calida aqua lauabis, & vri-
nam cientibus vteris. Ex hoc autem manifestum sit auersa sit
nécne. Si enim sursum progressa auersa nō fuerit, fluxus pro-
cedit. Si verò auersa sit, fluxus, menstrua appellata, non con-
tingit. Hunc morbum fomento primū tali curare opor- E
tet. In vinum grossos immittito, ipsumq̃ vinum calfacito,
& cucurbitam circū osculum vasis in quo calefit addito, hoc
modo: Cucurbitam per medium dissectam euacuato, &
summitate ipsius modice rescissa, velut in vtriculis fieri so-
let, hanc ipsam vasi velut operculum circumdato, quo odor
per angustiam means ad vterum perferatur. Insuper autem
& calida aqua fouere, & calfacientibus medicamentis sub-
dititijs vti oportet. Calfacientia autem sunt ea quæ du-
cunt ex superius relatis, itemq̃ hæc. Stercus bubulum, fel
bubulum, myrrha, alumen, galbanum, & si quod aliud eius-
modi est. Plurimis etiam ipsarum per purgantia infernè
medicamenta alius subducenda est, & per debilia quæ vo-
mitum faciunt, ne euacuatio ex superuacuatione fiat. Cæ- F
terū subdititias glandulas sic facere oportet, si fortes face-
re velis. Mel semicoctum facito, & ex præscriptis subditi-
tijs pharmacis ea quæ valde efficacia sunt immittito, & vbi
immiseris, glandulas formato instar earū quæ in sedem in-
duntur, verū longas facito has ac tenues. Mulierem verò
supinam reclinato, locis à pedibus lecti altiùs instratis, dein-
de apponito, & panniculo intecto, aut alia quadam re con-
simili calfacito, donec coilliescat. Si verò debiliore glandu-
lam subdere velis, in linteolum illigato. Sed & si humo-
re pleni vteri osculum tumidum habuerint, & nō fluxerint,
fluxionem facere oportet, & subdititijs pharmacis sanare,
itemq̃ fomentis velut scriptum est, ita faciendo velut in
priori fluxione suppressa. Quin & si in anteriorem partem
proced

*Calida ap-
posita.*

A procedens vterus auersus fuerit, fluxionem facere oportet, velut in superiore fluxione suppressa. Quum verò fluxus nimius fuerit, neque calida aqua, neque alio quopiam calfacere oportet, neque vrinam cientibus vri, neque cibis aluum subducentibus. Lecti autem partes à pedibus altiores esse oportet, vt ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Vtere autem simul etiam subdititijs adstringentibus. Fluxiones porrò quum confestim venerit purgatio statim subcruentæ fiunt, quum verò tardius prodierit, purulentæ. Et iunioribus subcruenta magis prodeunt. Seniores verò magis mucosa menstrua habent.

HIPPOCRATIS

COILIBER DE AERE, A-


QVIS ET LOCIS, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.

*



Qvicunque artem medicam integrè adse qui velit, primùm quidem tēporum anni rationē habere debet, quantū potentia quodlibet eorū valeat: nō enim simile quicquam in illis existit, verūm differunt inuicem propter varias quæ in eis sunt mutationes. Deinde ventorum ca-

*Quæ pro
spicienda
sunt medi
co.*

Venti.

lidorumq; & frigidorum, maximè qui ex his omnibus hominibus sunt cōmunes, & mox qui in vnaquaq; regione sunt indigenæ & proprii. Neq; verò negligentiorē se circa aquarum facultates cognoscendas exhibere conuenit. Quēmodum enim gustu differūt, & pondere ac latione, sic quoque virtute aliæ alijs longè præstāt. Quare si quis ad urbem sibi incognitā perueniat, circūspicere oportet eius situm, quo modo scilicet ad vētos, & solis exortus iaceat: nō enim æquales vires sunt, ad Septētrionem sitæ, & vergētis ad Austrum: neq; eius quæ solem exorientē, & quæ eundem occidentem

*Situs ur
bium.*

HIPPOCRATIS LIBER

Aquarum qualitas. spectat. Hæc itaque diligenter oportet perscrutari, ac simul quo modo habeant circa eam aque: num ne palustribus vtantur & mollibus, aut duris & ex sublimi loco prolabantibus, & scaturientibus ex petris, siue salis, & crudis. Terra etiam ipsa consideranda, nudane sit & aquis carens, aut densa & aquosa & anticoncaua sit & æstuosa, vel alta & frigida, hominum insuper diæta perquirenda, qua maximè capiantur.

Terra qualitas. An bibuli sint & lurcones & ocio dediti, aut exercitijs varijs vtentes, & tolerantes laborum, ciborumque plus adpetentes quàm poculorum. Ex his enim singula sunt inuestiganda. Nam qui hæc omnia probè, quantum fieri potest, cognouerit, aut horum plurima, cum non latere possunt quum in urbem etiam ignotam sibi peruenerit, neque morbi regioni peculiare & patrij, neque communis regionis natura, quæcunque tandem ea fuerit, vt non possit in cognoscendis morbis dubius hære, aut errare sicubi ad morborum medicationem adhibeatur. Quæ ambo illis euenire solent, qui non prius prouidi hæc diligenter cognouerunt. Quare qui ea studiosè rîngtus fuerit, vniuscuiusque temporis, ac anni futuri constitutionem prædicere poterit, qui videlicet morbi communi adfectione ciuitatem sint inuasuri tum æstate, tum hyeme, & quæcunque pericula vnique sint timenda ex diætæ ac victus immutatione: quum enim temporum mutationes, & astrorum ortus ac occasus obseruauerit, quemadmodum singula horum eueniant, prænoscet utique & de anno, qualis hic sit futurus: hoc nanque modo si quis rimatus fuerit ac procognouerit temporum occasiones, maximè de singulis sciet, vt plurimumque sanitatem adsequetur, & recta via procedet, non minima artis suæ gloria. Quod si cui hæc sublimiora videantur, is si ab hac sententia discedat, discedet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam ipsam Astronomiam, sed omnino plurimam, quum vnà cum temporibus & ventriculi in hominibus mutentur. Quomodo autem singula quæ diximus scrutari ac explorare oporteat, deinceps dicam manifestè. Quæcunque quidem ciuitas ad ventos sita est calidos, puto autem eos qui inter brumalem solis exortum itidemque occasum perflant, huic hi venti sunt peculiare. A Septentrionalibus autem ventis tuta ac protecta ea ciuitas existit. Aquæ verò eius multæ &

A tæ & subsalsæ sunt, & necessariò nō sublimes, æstate quidem calidæ, hyeme frigidæ. Et quæ quidem vrbes bene sitæ sunt ad solem, & ad ventos, & aquis bonis vtuntur, hæ minus à talibus mutationibus afficiuntur. Quæ verò aquis palustribus ac lacustribus vtuntur, & non bene sitæ sunt ad ventos, & ad solem, hæ magis. Et si quidem æstas sicca fuerit, citius sedantur morbi. Si verò pluuiosa, diurni fiunt: & phagedænas ad edentes ex omni occasione oboriri verisimile est, si vlcus fiat. Si verò hyems frigida sit, homines capita humida ac pituitosa habere par est: & ventres ipsorum frequenter exturbari, pituita à capite influente: & formas ipsorum vt plurimum debiliores esse: ipsosque ad edendum ac bibendum non appolitos esse. Nam qui capita debilia habent, non fuerint boni potores. Crapula enim magis grauat. Morbi verò hi ipsis vernaculi sunt. Primum quidem mulieres morbosæ, ac fluxionibus obnoxia sunt, deinde multæ steriles sunt ex morbo, non à natura, & frequenter abortiunt. Pueris verò incidunt conuulsiones ac anhelationes, quæ morbus puerorum, & sacer esse putantur. Viris autem dysenteria, & alui profluuia, & febres lenes, diurnæ, hybernæ, & pustulæ nocturnæ multæ, & hæmorrhoides in sede. Pleuritides autem, & peripneumonia, & febres ardentes, & quicunque acuti morbi putantur, non multum proueniunt. Non enim fieri potest vt isti morbi vigeant, vbi alui liquidæ existunt. Lippitudines verò oboriuntur humidæ, non graues, nec diurnæ: si non ex mutatione temporum morbus aliquis omnibus communis occupet. Et vbi quinquagesimum annum transgressi fuerint, defluxiones ex cerebro accedentes, homines semisyderatos faciunt, vbi caput derepente insolatum, aut frigore correptum fuerit. Atque hi quidem morbi ipsis vernaculi sunt: præterquam si morbus aliquis omnibus communis ex temporum mutatione oboriat, nam & huius participes fiunt. Quæcunque verò ciuitates his ex opposito sitæ sunt, ad ventos frigidos, inter occasum solis æstiuum, & orientem æstiuum: etiam ipsis hi venti vernaculi ac indigenæ sunt, ab austrò verò & calidis ventis protectæ sunt. Et de his vrbibus sic se res habet. Primum quidæ aquæ & duræ & frigida vt plurimum dulcescunt. Homines autem vegetos & siccos esse necesse est: & plures ventres infernos cru-

*Quæ vrbes
salsas ac
quas habet.*

*Hyems fri
gida quæ
mala inue
bat.*

HIPPOCRATIS LIBER

dos ac duros habere, supernos verò fluidiores: biliososq; ma D
gis quàm pituitosos esse. Capita verò sana ac dura habent, &
plerunq; vasa ipsis rumpuntur. Morbi autē populares ipsis hi
sunt, pleuritides & quos acutos esse receptum est. Necesse est
autem ita habere, quum alui durę existant, & suppurati mul
ti ex omni occasione fiunt. Huius autem causa est, corporis
extensio, ac ventris duricia. Siccitas enim & aquę frigiditas
facit vt vasa rumpantur. Edaces autem tales naturas esse ne
cesse est, & nō multū bibaces. Non enim fieri potest vt simul
multum edant ac bibant. Lippitudinesq; his fieri ex tempo
ris intervallo necesse est, duras autē ac vehemētes, & statim
oculos rumpi. Sanguinis item ex naribus fluxiones vehemē
tes ætate fieri iunioribus triginta annis. Morbos etiā sacros F
appellatos, paucos quidem, verū vehementes. Longę verò vi
tę magis quàm alios, hos homines esse par est: & vlcera nō
pituitosa oboriri, neq; efferari. Mores verò magis feros quā
mansuetos. Ac viris quidem hi morbi vernaculi sunt: præter
quàm si quis omnibus cōmunis ex temporum mutatione in
gruat. Ex mulieribus verò, primū quidē multę steriles fiūt,
propter aquas quę durę sunt ac crudę, & frigidę. Purgatio
nes enim mensium non contingunt commodę, sed paucae ac
prauę. Deinde pariunt difficulter, & non valde abortiunt.
Vbi verò pepererint, pueros nutrire non possunt. Lac enim
ab aquarū duricia ac cruditate extinguitur: & tabes frequen
tes à partu fiunt. Præ violentia enim ruptiones ac vulsuras
habent, pueris autem hydropes in testibus fiunt, quandiu E
parui fuerint, deinde ætatis progressu euanescent. Pubes
cunt autem serò in hac ciuitate. Et de calidis quidem ventis
ac frigidis, & vrbibus ad hos sitis, hoc modo velut dictū est,
res se habet. Quęcunq; verò ciuitates sitę sunt inter æsti
uos ac hybernos solis ortus: & quęcunq; ex opposito harū,
de his ita habet. Quę quidem ad orientem solem sitę sunt,
eas par est esse salubriores his quę ad septentrionem con
uersę sunt, & his quę ad calidos ventos sitę sunt, etiam si
stadium solum intersit. Primum enim moderatior est calidi
tas ac frigiditas. deinde aquas quę ad solis ortus sunt, omnes
splendidas esse necesse est, & odoratas, & molles, & amabi
les oriri in hac ciuitate. Sol enim emergens ac illustrans ip
sas castigat. Matutinum enim tempus ipse aer vt plurimum
semper

- A** semper occupat. Et hominum formæ boni coloris sunt, & magis floridæ, si non quis alius morbus prohibeat. Et clara voce præditi sunt homines, & ad iram ac intelligentiâ præstantiores septentrionalibus, si quidem & alia quæ in ipsa nascuntur meliora existunt. Et ciuitas quæ hoc modo sita est veri maximè similis est, iuxta caliditatis ac frigiditatis moderationem. Et morbi pauciores fiunt ac debiliores, simileque sunt morbis, qui in ciuitatibus ad ventos calidos conuersis oriuntur. Et scemina isthic valde fecundæ sunt, ac faciliè pariunt. Et de his quidem ita habet. Quæ verò ad occasus sitæ sunt, & ipsæ à ventis ab oriente spirantibus protectæ sunt, & tum calidi venti leuiter afflant, tum frigidi ab Vrsis præterflant: eas vrbes necesse est situ morbosissimo positas esse. Primum enim aquæ non sunt splendidæ. Causa verò est quòd aër matutinum tempus vtp plurimum occupat, qui aquæ immixtus claritatem eius disperdit. Sol enim priusquam eleuetur, non illustrat. Aestate verò, mane quidem auræ frigida spirant, & ros decedit. de cætero verò sol ad ipsas occidens, quàm maximè homines percoquit. Quapropter etiam decolores ac infirmos ipsos esse par est, & ex omnibus prædictis morbis participare. Nulla enim re ab ipsis separantur. Verisimileque est ipsos graui voce præditos ac raucos esse, propter aërem, eo quòd impurus plerunque isthic est, & morbosus. Neque enim ab aquilonaribus valde expurgatur. Non enim perseverant venti. Qui verò perseverant ad ipsis incumbunt, aquosissimi existunt. Nam venti occidentales, similes sunt autumnno. Et huiusmodi ciuitatis situs est ad diei mutationes, eo quòd multum temporis inter matutinum ac vespertinum intercedit. Et de ventis quidem qui commodi sunt ac incommodi ita se res habet. Cæterum de aquis deinceps narrare volo, quæ morbosæ sint, & quæ saluberrimæ: & quæ mala ab aqua fieri verisimile est, itemque quæ bona. Plurimam enim partem conferunt ad sanitatem. Quæcunque igitur palustres sunt, & stabiles ac lacustres, eas necesse est æstate esse calidas, ac crassas & olentes. Quum enim non defluant, sed aqua pluuiæ semper noua inferatur, & sol vrat, necesse est ipsas decolores esse, & prauas ac biliosas. Hyeme verò glaciatas & frigidas ac turbatas præniue ac glacie, vt pituitosissimæ ac raucosissimæ existant:

HIPPOCRATIS LIBER

Bibentibus autem splenes semper sint magni ac pleni: & v. D
 tres duri, tenues ac calidi. Humeri verò & claviculæ & facies
 attenuata. In splenem enim carnes colliquantur, quapro-
 pter graciles existunt. Edaces autem esse tales ac siticulo-
 sos par est, ventresque tum supernos, tum infernos, calidif-
 simos habere, vt etiam fortioribus medicamentis opus ha-
 beant. Atque hic morbus ipsis & æstate & hyeme familiaris
 est. Ad hæc etiam hydropes plurimi ac letalissimi fiunt.
 Aestate enim dysenteriarum multarum ac alui profluvia incidunt,
 & febres quartanarum diurnarum. Hi autem morbi prolongati,
 tales naturas ad hydropas deducunt ac occidunt. Et hi qui-
 dem morbi ipsis æstate fiunt. Hyeme verò iunioribus qui-
 dem peripneumoniæ, & insaniarum morbi, Senioribus verò, fe- E
 bres ardentes, propter ventris duriciem. Mulieribus autem,
 tumores oboriuntur, & pituita alba, & vix in ventre conci-
 piunt, ac difficulter pariunt, & foetus magnos ac tumidos, de-
 inde ex alimentis tabescentes ac deprauari fiunt. Et purga-
 tio commoda post partum mulieribus non cōtingit. Pueros
 verò herniarum accedit, & viris varices, & vlcera in tibia. Qua-
 re fieri non potest vt tales naturarum longæuæ sint, sed ante
 temporis aduentum senescunt. Præterea formicarum se in vte-
 ro habere putant, & vbi partus tempus adest, ventris moles
 illa ac plenitudo euanescit. Hoc autem contingit ex aqua
 quam vteri ex aqua concepta laborant. Atque has quidem a-
 quas ad omnem rem improbas esse censeo. Secundo verò lo-
 co eas quarum fontes è petris scaturiunt. Duras enim esse ne- F
 cesse est: aut isthic vbi calidarum aquarum existunt: aut ferrum na-
 scitur, aut æs, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alu-
 men, aut bitumen, aut nitrum. Hæc enim omnia præ vio-
 lentia caloris nascuntur. Non itaque ex huiusmodi terra a-
 quæ bonæ prodeunt, sed duræ & æstuosæ, quæ & difficulter
 minguntur, & ad alui egestionem contrariæ sunt. Optimarum
 verò sunt quæ ex sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt.
 Hæ enim & dulces sunt, & albæ, & vinum modicum ferre
 possunt, & hyeme calidæ sunt, æstate verò frigidæ. Tales
 enim fuerint ex profundissimis fontibus. Maxime verò lau-
 dare eas oportet, quarum fluxiones ad solis exortus erum-
 punt, & præsertim ad æstiuos. Necessè est enim odoratas
 esse ac leues. Quæcunque verò salsæ, & crudæ ac du-
 ræ sunt,

et hoc agim
 let ad illos
 calidus
 moribus
 patitur
 ut
 aqua quæ
 opima
 me illi calid
 calid a rem
 bus ad
 aqua sal
 res si se
 com des cōdentes
 sit lapis magnus in uesica: qm yij
 dicitur et in causa ut illi calculi in ue
 collecti agglutinetur et fiat un
 et hoc vitium corrumpit

A ræ sunt, ad hoc quidem vt eas omnes bibant, non bonæ sunt. Sunt tamen aliquæ naturæ, & morbi, quibus tales aquæ in potu commodæ sunt, de quibus statim dicam. Habet autem & de his hoc modo. Quæ quidem aquæ fontes suos ad orientes habent, hæ præ omnibus optimæ sunt. Secundum ab his locum habent, quæ inter æstiuos solis exortus ac occasus emergunt, & magis hæ quæ ad orientes. Tertio loco sunt, quæ inter occasus æstiuos ac hybernos scaturiunt. Pessimæ verò quæ ad austrum, & quæ inter æstiuum ortum & occasum. Et hæ quidem ad australes partes valde prauæ sunt, ad boreales verò meliores. His autem hoc modo vti conuenit. Quisquis sanus est ac valet, is nullum discrimen faciat, sed semper eam quæ præsens est bibat. Quicunque verò morbi gratia, eam quæ commodissima est bibere volet, is si ita fecerit, maximè sanitatem assequi poterit.

B Quorum quidem ventres duri sunt, & idonei ad hoc vt amburantur, his dulcissimæ & leuissimæ ac splendidissimæ conducunt. Quorum verò molles ventres, & humidi ac pituitosi sunt, his durissimæ & crudissimæ, ac subfalsæ aquæ conferunt. Sic enim maximè resiccati poterint. Quæcunque enim aquæ optimæ coctæ sunt, ac facillimè liquefcunt, eas par est & ventrem maximè exoluere ac eliquare. Quæ vero crudæ sunt, & minimè coctæ bonæ, hæ magis constringunt ventres ac resiccant. At enim mentiuntur homines de falsis aquis, propter imperitiām, in eo quod p̄r aluum secedere eamq; soluere putantur. Maximè enim contrariæ sunt ad alui egestionem ac secessum. Sunt enim crudæ, & coqui non possunt. Quare venter magis ab ipsis adstringitur quàm eliquatur. Et de fontanis quidē aquis hoc modo res se habet. De pluuiialibus autem, & quæ à niue fiunt, vt habeat, deinceps dicam. Aquæ igitur pluuiiales leuissimæ & dulcissimæ, & tenuissimæ ac splēdidissimæ sunt. Primum enim sol quod tenuissimum ac leuissimum est in aqua educit ac sursum rapit. Clarum autē hoc, ipsum mare facit. Quod enim falsum est isthic relinquitur, præ crassitudine ac grauitate, & fit mare. Quod verò tenuissimum est sol sursum rapit, præ leuitate. Rapit autem tale non solum ab aquis stagnantibus. sed etiam ex ipso mari, & ex omnibus in quibus aliquid humoris inest. Inest autem in omnibus rebus. Et ex ipsis hominibus tenuissimam ac leuissimam

HIPPOCRATIS LIBER

ac leuissimum humorem ducit. Eius rei maximū signum inde sumere licet, vbi homo vestibus indutus in sole iter fecerit, aut sederit. Quasunque enim corporis partes sol aspicit, hæ non exudant. Sol enim quicquid compareret sudoris sursum rapit. Quæ verò sub veste contactæ sunt, aut sub aliqua alia re, hæ exudant. Educitur enim ac domatur à sole sudor. Seruatur autem ex tegmētis, vt ne disperdatur à sole. Quum verò in vmbra deuenerit, totū corpus similiter sudore perfuit. Nō enim amplius sol affulget. Quapropter etiā ex omnibus aquis hæ citissimè putrescunt: & odorē malum pluuiæ aqua habet, eo quòd ex plurimis cōgregata est ac permixta, vt citissimè putrescat. Ad hæc verò, vbi rapta est & in sublime eleuata, dum circūfertur & ad aērē permiscetur, quod turbidum est in ipsa, ac noctem refert, id excernitur, ac decedit, & fit aër, & nebula. Quod verò tenuissimum est ac leuissimum in ipsa, hoc relinquitur ac dulcescit, dum à sole vritur ac coquitur. Fiunt autem & alia omnia quæ coquuntur semper dulcia. Quandiu igitur dispersa fuerit, & nōdum cōgregata, fertur sublimis. Vbi verò coaceruata fuerit, ac simul cōgregata derepente à ventis inter se aduersarijs: tunc deorsum prorumpit, qua parte plurima collecta fuerit, Tunc enim hoc magis fieri verisimile est, quum nebulas à vento stabilitatē non habente cōcitatas ac procedentes, derepente ventus contrarius, ac aliæ nebulæ reliserint: atque tunc quidem prima ipsius pars cōgregatur, quæ verò à posteriore parte sunt, insuper accedunt, & sic crassescunt, & nigrescunt, ac simul cōgregantur, & præ grauitate deorsum prorumpunt, & pluuiæ fiunt. Atque hæ quidem aquæ optimæ sunt secundum hanc rationem. Verū opus habent vt decoquantur, ac excolentur. Sin minùs, odorem prauum habēt, & raucedines & vocis grauitatem bibentibus inde accedere par est. At verò aquæ ex niue ac glacie fientes, omnes malæ sunt. Quum enim semel concretæ fuerint, nō amplius in pristinam naturam restituuntur. Sed quod quidem in ipsa clarum ac leue, & dulce est, excernitur ac disperditur. Quòd vero turbidissimū est ac ponderosissimū, relinquitur. Hoc verò cognoueris hoc modo. Si enim volueris hyemis tempore, vasculū certa aquæ mensura infusa, sub dio exponere, quo maximè congeletur: deinde postridie in locum calidum deportatum sinere, quo maximè

- A** maximè glacies liqueſcat, & vbi exoluta fuerit, aquam metiri: reperies aquam multo pauciorẽ. Atq; hoc ſignum eſt, quòd à cõgelatione id quod leuiſſimum ac tenuiſſimum eſt diſperditur, & non quod grauiffimum ac craſſiſſimũ exiſtit. Nõ enim hoc diſperdi poterit. Hac igitur de cauſa has aquas quæ à niue ac glacie eliquantur, peſſimas eſſe puto ad omnes res: Itemque eas quæ ad has ſequuntur. Atque ſic quidem de pluuialibus, & nivalibus, ac glacialibus aquis res ſe habet. Calculo verò maximè laborant homines, & ex rheumatiſmibus, & vrinæ ſtillicidio, & coxendicũ morbo corripiuntur, & herniæ ſunt, vbi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluminibus in quæ alia deferuntur: & de ſtagno, in quod fluxiones multæ ac omnis generis deueniunt. Et qui aquis inueſtitis vtuntur, quæ ex longo, & nõ breui locorũ interuallo afferuntur. Non enim fieri poteſt, vt alia aqua ſimilis ſit alij. Sed aliæ dulces ſunt, aliæ falſæ, & aluminofæ, aliæ de calidis fluunt. Vbi verò hæc ſimul inter ſe miſcetur, diſſident: & quæ fortiſſima eſt, ſemper ſuperat. Præualeat autẽ non ſemper eadem, ſed aliàs alia. Sed & ex ventis, alij quidem Boreas robur exhibet, alij verò Auſter, & de reliquis eadem ratio exiſtit. Talibus igitur neceſſe eſt limum & arenã in vaſis ſubſidere, & ab his ſi potentur, morbi prædicti ſunt. Quòd autẽ non omnibus, cõſequenter declarabo. Quorũ quidem aluus ſatis fluida eſt ac ſana, & veſica non ardens, neq; ſtomachus veſicæ valde coardeſcit, hi facile vrinam eiiciunt, & in veſica nihil iſtis congregatur. Quorum verò aluus ardens ac feruida fuerit, in his neceſſe eſt etiã veſicam idem perperi. Quum enim magis quàm pro natura fuerit calefacta, ſtomachus ipſius inflammatur. Vbi verò hæc perpetitur, vrinam non dimittit, ſed in ſeiſa concoquit & adurit: & quod quidem tenuiſſimum in ipſa eſt, excernitur: & quod puriſſimum eſt, tranſit & emingitur. Quod verò craſſiſſimum ac turbidiſſimum eſt, coaceruatur, & concreſcit primũ quidem parum, deinde maius fit. Dum enim voluitur ab vrinã, quicquid craſſum compactum fuerit, ad ſeiſum adaptat, atq; ſic augeſcit, & in toſum concreſcit. Et quum vrinã emittit, ad veſicæ ſtomachum allabitur ab vrinã impulſum, & vrinæ emiſſionem impedit, & dolorem vehementẽ exhibet. Quare pueri calculoſi fricant ac trahunt pudenda. Videtur enim iſtis cauſa
- miſt

HIPPOCRATIS LIBER

signa id
agnoscenda
pueri
culculo
orant
mulieres
caro
culculo in
ca non
Prognosti
ca ex tem
porum qua
litate.

et oia
vile
artificul
o:

missionis eo loco esse. Signum autē eius quod hæc ita se ha- D
bent, hoc est. Vrinā splendidissimā calculosi mingunt ad si-
militudinē feri, eo quod id quod crassissimum est ac biliosis-
simum isthic manet, & coaceruatur ac concrefcit. Et pleriq;
sanē hoc modo lapidem & calculum cōtrahunt, sit autē pue-
ris etiā ex lacte, si nō salubre id fuerit, sed valde calidū ac bi-
liosum. Ventrem enim percalefacit, & vesicam. Quare vrina
dum aduritur, hæc patitur, & sanē sentio melius esse pueris
vinū quā aquosissimum dare. Minus enim venas adurit ac
resiccāt. Muliebribus autem pudendis nō similiter cōtingit.
Meatus enim vrinæ in vesica brevis est & amplus, vt facilē
vrina impellatur. Neq; enim manu pudendum fricat, veluti
masculus, neq; vrinæ in vesica meatū contingit. Ad pudenda E
enim perforatus est. Et quia meatus sunt ampli, etiā plus bi-
bunt quā pueri. Et de his quidem sic res se habet, aut his
quā proximē. Cæterum de annis hoc modo cōsideratione
facta quis cognoscere possit, qualisnam annus sit futurus, sa-
lubrisne an morbosus. Si enim secundum rationē fiant signa
in astris occidentibus ac orientibus: & in autumno aquæ
fiant: & hyems sit moderata, & neq; valde clemens, neq; mo-
dum excedens frigiditate: & in verē ac æstate tempestiuē
pluat: sic sanē saluberrimum esse annū par est. Si verō hyems
quidem sicca sit, & borealis, ver autem pluuiosum & austra-
le, necesse est æstatem febriculosam fieri, & lippitudines in-
ducere. Quum enim æstus derepente accedat, terra humida
existente à vernis imbribus, & ab austro: necesse est æstū du- F
plicatū esse, & à terra irrigua ac calida, & à sole vrēte: quum
ventres in hominibus nondum cōstricti sint, neq; cerebrum
resiccātū. Non enim fieri potest, quū ver tale existat, vt cor-
pus & caro non humore fluida fiant, adeo vt febres acutissi-
mæ in omnes irruant, maximē autē in pituitosos. At dysen-
terias par est fieri & mulieribus, & viris humidioribus. Et si
quidem circa canis exortum accedat aqua ac tempestas, &
Etelæ spirauerint, spes est cessationis, & vt autūnus salubris
fiat. Sin minus periculum est ne & pueri, & mulieres morian-
tur: Minime verō senes: & ne qui superstites euadūt, in quar-
tanis desinant, & ex quartanis in hydropas. Si verō hyems
australis fiat, & pluuiosa, & clemens, ver autē boreale & siccū
& tempestuosum, primū quidem mulieres quæ vterū gestāt,
& partus

- A** & partus ipsis ad ver instat, abortum facturas esse verisimile est. Quæ vero etiam pepererint, impotētes ac morbosos pueros parere, ita vt aut statim pereant, aut tenues & debiles, ac morboſi viuant. Atq; hæc quidem mulieribus, reliquis verò dysenterias & lippitudines siccæ: & aliquibus defluxiones à capite in pulmonem. Pituitosis igitur dysenterias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente, propter naturæ humiditatem. Biliosis verò lippitudines siccæ, propter carnis caliditatem ac siccitatem. Valde autem senibus defluxiones, propter raritatem ac eliquationem venarum, adeò vt aliqui quidem derepente pereant, aliqui verò semisiderati, aut dextra aut sinistra parte fiant. Quæ enim hyems
- B** sit australis, & pluuiosa, ac calida, & corpus non adstringatur neque venæ, vere accedente boreali & sicco ac frigido, cerebrum postquam ipsum dissolui ac purgari contigit, à grauedine ac raucedine, tunc simul cum vere stabilitur ac cōstringitur. Quare derepente æstate accedente, & ardore ac mutatione cōtingente, hi morbi incidunt. Et intestinorum leuitates & aqua intercus ferè reliquis morbis desinentibus superueniunt, quum non queant facilè ventriculi à concepta humiditate exsiccari. Si autem ætas pluuiosa sit & austro multum perfletur similisque sequatur autumnus, necesse est hyemem morbidam esse, & his qui pituita abundant, & qui quædragessimum annum exceſſerunt febres ardentes fieri verisimile est, qui verò bile abūdant, costarum inflammationes & pulmonis, pleuritidas ac peripneumonias dictas. Si verò ætas sicca existat, & borealis, sequens verò autumnus pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemem expectare cōuenit, & cerebri corruptiones, ampliusq; raucedines, grauedines, & tussis, aliquibus etiam tabes. Quod si borealis sit autumnus ac siccus, ac neq; sub caniculā, neq; sub Arcturi occasum pluuiosus, confert pituitosis natura, & maximè qui natura sunt humida, & mulieribus. Biliosis autem infestissimū hoc tempus existit. Valde enim exsiccantur acciduntq; eis lippitudines aridæ, & febres acutæ, ac diurnæ, & aliquib' bilis atra, siquidem quod liquidissimum & aquosissimū in bile est cōsumitur: densissimū verò & acerrimū relinquitur, quod idem accidit secundum eandem rationem & circa sanguinem, unde hi morbi his accidunt, pituitosis autem hæc omnia commoda

HIPPOCRATIS LIBER

moda sunt. Exsiccantur enim & in hyemem perducuntur, minime humecti, sed resiccati. Hæc igitur si quis mente concipiet & considerabit, is præcognoscet plurima omnino quæ ex huiusmodi mutationibus sint futura. Maxime autem obsequare oportet magnas temporum mutationes, ut neque medicinas in illis libentes exhibeamus, neque vramus quæ circa ventrem, neque secemus, priusquam prætereant dies decem aut plures, & non pauciores. Periculosissima sunt etiam ambo solstitia, maxime verò æstiuum. Periculosum etiam æquinoctium utrumque, magis verò autumnale. Oportet autem & astrorum exortus considerare, præcipue canis, deinde arcturi, & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maxime diebus iudicantur, alijque perimunt, alij verò desinunt, aut in aliam speciem, aliumque statum transibunt. Et circa hæc quidem sicut dixi habet. Volo autem & de Asia & Europa demonstrare, quantum differant inter se per omnia, & de generum formis quid distent, & nihil inuicem simile habeant. Verum de omnibus si quis dicere velit in immensum excresceret sermo, quare de maximis, & plurimum differentibus diuersitatibus dicam, quantum saltem mihi in ea re est compertum. Ad dico quidem plurimum differre Asiam ab Europa secundum naturas omnium ex terra nascentium, itemque hominum. Longè enim pulchriora & maiora omnia nascuntur in Asia. Estque regio ipsa, hæc nostra multo mansuetior, sunt etiam hominum mores benigniores & cultiores. Causa verò horum est temporum anni temperata mixtura. Siquidem in medio solis exortu sita est ad auroram, à frigidity ac caliditate remotior. Incrementum autem & benignitatem inde proficisci omnibus in confesso est, quum nihil sit præcellens & cogens violenter, sed per omnia æqualitas vigeat, quanquam non habeant ubique per omnem Asiam omnia secundum eundem modum. Quæcumque enim in ea regio in medio sita est calidique & frigidi, ea omnium fertilissima existit, & arboribus refertissima & maxime serena, aquisque vititur & celestibus & ex terra promanantibus. Neque enim à calore combusta est valde, neque à squalore & aquarum inopia exsiccat, neque à frigore oblæditur. Verum austris perflatur & irrigua est, tum propter imbres multos, tum propter niues. Fructus autem suo tempore maturos multos in ea nasci par est, siue ex sparsis

Mutationes temporum obseruanda.

Canicula. Arcturus. Pleiades.

Differentia inter Asiā & Europā

Pulchriora maioraque sunt Asiāna, & cur.

Varietas rerum in Asiā

Cæli clementia & solis ubertas in Asiā.

A sparsis seminibus hi proueniant, siue terra ipsa per se sponte producat eorum plantas, quarum fructibus vtuntur homines, eas ex agrestibus cicures & domesticas facientes, & pro com-
moditate sua transplantantes. Pecora etiā ipsa pleniora proueniunt, quæ & pariunt sæpius & pulcherrimè educantur. Quin & homines habitiores esse ac specie pulcherrimos, & magnitudinis eximiae, minimeq; differentes, quantum ad formam ac corporum proceritatem attinet, constat. Certumq; est hanc regionem proximè accedere ad naturam ac temperaturam optimæ constitutionis, verum virilitatem, laboris tolerantiam, ac audaciam non verisimile est huic naturæ innas-
B ci, Sicut neque eiusdem neque diuersi generis constantes ac perpetui sunt amatores. Vincit enim in ipsis voluptas, quæ ratio est multiformes generari partus, præcipuè in feris. Atq; sic quidē de Aegyptijs ac Libycis mihi habere videtur. Qui verò ad dexteram hyberni ortus solis vsque ad Mæotidem paludem habitant: hic est enim Europæ & Asiæ terminus: sic habent. Multò maior diuersitas est inter illas ipsas gentes quàm de quibus iam dixi, quum propter varias temporū mutationes, tum ob regionis naturā, Habet autem eodem plane modo, quemadmodum & circa aliorum hominum terras accidit. Vbi enim tempora magnas mutationes faciūt & frequentissima, illic & regio agrestis & maximè inæqualis existit, inueniasque & montes plurimos & densos, itemq; campos & prata. Vbi autem non valde variant tempora, illic æqualissima regio est, quod idem & de hominibus ipsis est intelligendum. Si quis enim rectè consideret, videbit quorūdam naturam, mōtanis, syluosis ac asperis locis similem esse aliorum verò aquosa ac exilia loca referre: sicut quidam pratorū ac paludum naturam præ se ferunt, atque alij sunt à quorum planitiebus nudisq; ac siccis terris cōstitutio similis existit. Tempora enim quæ formarum naturam variant, sunt diuersa: quum ergo inter sese fuerint maximè diuersa, varias & multiplices formas producūt. Porro quæ parum inter se differunt gentes relinquam, Quæ autem plurimum non natura solum, sed & legibus & consuetudinibus discrepant, de illis referam quomodo habeant. Ac primum omnium de Macrocephalis, quum nulla omnino alia gens sit, quæ similia capita habeat. A principio quidem consuetudo in causa fuit, vt

*Asiatici
corporis ro-
bore non
præstant.*

*Europa et
Asia ter-
minus.
Gentes cur
inter se dif-
ferant.*

*Macroce-
phali.*

HIPPOCRATIS LIBER

tam longis capitibus essent. Nunc autem natura ipsa cum D
 consuetudine conspirauit, Siquidem generosissimum apud
 eos putatur, caput habere quàm maximè longum: consuetu-
 dinis autem hoc initium fuit. Quum recēs infans natus est,
 caput eius adhuc tenerum ac molle existēs, quàm celerrimè
 constringunt manibus, coaptansq̃ue cogunt in longitudinē
 augeri, quin & vinculis connectunt, ac aptis instrumētis col-
 ligant, quo rotunditas capitis prohibeatur, ac longitudo au-
 geatur. Ea consuetudo tantum efficit vt eiusmodi natura ca-
 pitum existeret. Temporis verò progressus natura quoq; ta-
 les produxit, vt non esset necesse consuetudine priore coge-
 re. Quum enim semen genitale ab omnibus corporis mem-
 bris procedat, à sanis quidem sanum, à morbidis morbosum E
 fiatq̃ue vt ex caluis calui gignantur, ex cæsijs cæsijs, & vt plu-
 rimum distortus distortum generet, eademq; ratio sit circa
 reliquas formas, quid prohiberet vt non ex Macrocephalis
 Macrocephali gignerentur? Nunc autem non nascuntur ita
 magnis capitibus quemadmodum prius, quum consuetudo
 nō amplius duret, per incuriam hominum intercepta. Et de
 his quidem hæc sufficiant. De illis autem qui phasim acco-
 lunt adijciam. Regio eorum palustris est, calida, aquosa & dē
 fa, imbresq̃ue in eam decidunt omnibus temporibus & ma-
 gni & impetuosius, homines verò ipsi vitam agunt in paludi-
 bus domosq; ligneas, & ex arundinibus in ipsis aquis habent
 extructas, neq; multum inde prodeunt, vt adeant vel empo-
 ria vel vrbes. Verū nauculis ex vno ligno fabrefactis per R
 meant sursum ac deorsum, habent enim fossas ac ductus a-
 quarum plurimos. Bibunt autem aquas calidas & stagnātes,
 quæ & à sole sunt putrefactæ, & ab imbriū casu auctæ. Ipseq;
 fluuius Phasis omniū fluuiorū stagnātissimus est, & qui len-
 tissimo cursu profluat: fructus autē qui illic nascuntur omnes
 insalubres sunt, euirati imperfectiq; præ multitudine aqua-
 rum, neque vnquam maturescunt. Atq; quum multus aer ab
 aquis regionem occupet, ob hanc ipsam causam, quòd ad for-
 mam ac corporū speciem attinet, Phasiani sunt à reliquis ho-
 minibus longè diuersi. Sunt enim magnitudine ingenti, ac
 corpulentia valde excellenti, neq; iuncturæ eorum vllæ neq;
 venæ comparent, pallidumq; præ se ferunt semper colorem,
 quemadmodum qui regio sunt obnoxij morbo: loquuntur
 autem

mo

*Phasis as-
cola.*

*Phasis qua-
liter fluat.*

*Phasiani
quales.*

A autem ut si qui alij omnium hominū grauissimè, nimirum aëre videntes non sereno, sed obscuro, & maximè humectato. Sunt insuper ad laborem à natura ipsa segniores, anniq; tempora non varias habent, neque ad æstum, neq; ad frigus permutationes. Venti autem eis sunt plurimi austrini omnes, præter vnū eius regionis propriū & indigenam, qui aliquando violentior ac molestior calidus existens spirat, quē Cenchrona patrio vocabulo appellant. Verū Boreas non valde ad eos pertransit, quòd si aliquando spiret, debilis tamē existit ac valde lenis. De natura ergo ac diuersitate & forma eorum qui Asiam & Europam incolunt, ita habet. Quòd autem timidiores, effœminatiores, ac imbelles præ Europæis

*Cur Asia
ni imbelles.*

B Asiani existant, moribusq; mansuetiores, tempora ipsa anni in causa sunt, quæ non magnas permutationes faciunt, neq; caloris, neque frigoris, sed semper æqualia permanent: vnde neq; mentes stupore percelluntur, neq; corpora fortè transformationem incurrunt. A quibus verisimile est iram exasperari, cognitionemq; & calorē ampliùs excitari, quàm si semper in eodem statu quis persistat. Mutationes enim sunt quæ hominis mentem semper excitant, neque sinunt quiescere. Propter quas sanè causas imbelles vniuersum Asianorum genus existit, atq; adhuc ampliùs propter leges. Multò maxima enim Asiæ pars sub regibus est. Vbi autem nō in sua potestate viuunt homines, neq; sui iuris sunt, sed dominis subiecti, ibi nō multū curiosi sunt quo modo se ad bellum adparent, imò magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis nō æqualia instant. Nam hi in militiā proficisci, laboresq; perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, vxoribus ac reliquis amicis: atq; siquidem viriliter & feliciter bellum gesserint, dominis inde commoda accedunt, eorumq; facultates inde augentur. Verū ipsis præter pericula & cædes nihil demeticur. Proinde neq; his hominibus regionē frequenter habitata esse necesse est, Imò eam propter inertiā bellicam ac otium à plerisque relinqui. Ut enim quisq; maximè à natura virilis & magnanimus est, ita plurimum eius animus leges auersatur: cuius rei magnum iudicium vel inde habere licet. Quòd quicumq; in Asia Græci itemq; Barbari dominis non subsunt, sed iure suo degunt, sibi ipsisque omnes labores

*Mentē qua
excitant.*

*Asiani
cur non bel-
lantes.*

*Fortes, le-
ges auers-
antur.*

HIPPOCRATIS LIBER

lucrificiunt. illi bellicosissimi omnium existunt. Periclitantur D enim ipsi sibi, virilitatisque premia ipsi reportant, sicut timiditatis ac ignaviae poenam luunt pariter. Inuenias autem & Asianos ipsos inter se plurimum differentes, generosiores alios, alios degeneres, quorum omnium causa ad temporum mutationes est referenda, quemadmodum & in praecedentibus dixi. Atque sic quidem habet in Asia. In Europa vero genus hominum est Scythicum, circa paludem habitans Maotim, quod à reliquis gentibus maxime differt, Sauromatae appellantur, Horum foeminae equites sunt, arcubus utuntur, ac sagittas iaculantur ex equis, cum hostibus congregantes, dum virgines existunt, neque deuirginantur prius, quam hostium tres confecerint, neque prius maritis cohabitant, quam sacra deo patrio more fecerint. Quod si qua sibi virum acceperit, ab equitatu libera est, nisi necessitas cogat communi expeditione omnes exarmari. Dexteram autem mammam non habent, Nam puellis adhuc infantibus matres aereo ipso instrumento in hunc usum parato, igneque candefacto eam auferunt, ac exurunt, ne iterum succrescere contingat, atque ut omnis vis ac robur in dextrum humerum & brachium deferatur. Ceterum reliqui Scythae quod ad formam adtinet, ipsi sibi similes sunt, alijs dissimiles. Sicut quoque Aegyptij ipsi inter se, praeterquam quod hi à vehemēti calore, illi ab intenso frigore sunt compressi. Verum solitudo quae Scythica dicitur, in planitie sita est, pratis abundans, sublimis & mediocriter aquosa. Sunt enim flumines in ea magni, in quos aqua ex capis per riuos deducitur. In hac itaque Scythae degunt, qui Nomades vocantur, propterea quod nullas habeant domos, sed in curribus habitant. Sunt autem currus ex quibus minimi quatuor rotis, reliqui sex circumaguntur. Sunt etiam luto obturati ac instar domorum fabrefacti, aliqui simplici, aliqui etiam triplici tabulato, Unde robur illis inest aduersus omnes iniurias aquarum, niuis ac ventorum propellendas. Trahunt currus aliquos quidem bouum paria duo, aliquos tria, atque hi cornibus carent, quum praefrigore regionis cornua eis non enascantur. In his itaque curribus degunt mulieres. In equis autem vehuntur viri. Sequuntur autem simul oves, boues & equi. Tandiu deinde in vno subsistunt loco, dum sufficit ipsis pecoribus pabulum, quo deficiente in aliam regionem commigrant.

Quare nonnulli ab alijs differant. Scythica gens. Maotis palus. Sauromatae.

nota

Aegyptij autem inter se similes. Scythae. Nomades quomodo uiuant.

E

F

- A** grant. Vescuntur autem ipsi carnibus cœctis, bibuntque lac equinum, comedunt etiam Hippacen, id autem est caseus *Hippacæ* equinus. Haftenus ergo de victu & moribus diximus, tempo *quid.* ribusque anni ac formis, quæ à reliquis hominibus longissimè sunt Scythiæ genti diuersæ. Ipsa enim sibi inter se gens similis existit quemadmodum & gens Aegyptiorum. Minimè autè fœcūda ea gens est, regioq; ipsa minimas feras enutrit, neq; numero, neque specie insignes. Sub ipsis enim Vrlis Riphæisq; montibus sita est, vnde Boreas spirat, Solque *Riphæi mō* ipse supremo æstiuo solstitio deficiens proximè accedit, ac *tes.* tum quidem exiguo tempore calefacit. Neque verò venti à calidis locis spirantes valde ad eam regionem penetrant, ni- *Qui uenti*
hic spirent.
- B** si parumper & debiles. Verum ab Vrlis venti procedentes sunt illic perpetui frigidi à niuibus, glacie imbrisque condensati. Qui nunquam à montibus decedunt, vt propterea etiam inhabitabiles fiant. Aërque ipse totum ferè diem nubilus campos occupat. Ipsi verò in humidis locis degunt. Et ferè perpetua est ipsis hyems, æstas autè paucissimis diebus atque illis non valde multa, Sunt enim planities eminentiores, & nudæ, neque vllis montibus circumseptæ, sed ferè sub ipsis Vrlis accliuës. Neque feræ nascuntur illic magnæ, sed *Curnō ma*
gna anima
lia illic gi
gnantur. quales possibile est sub ipsa terra cōtegi. Prohibet enim hyens & nuditas terræ, quæ & diuerticulis & vmbraculis caret, propter temporum anni mutationes, neque multas neq; fortes, sed similes semper, vel parū admodum diuariantes, vnde
- C** & formas corporum inter se similes habent, quum eodem vtantur victu & amictu, æstatis & hyemis tēpore, attrahuntque aërem aquosum cōdensatum, aquam insuper bibentes à niuibus & glacie resolutam, nullo etiam corporis exercitio accedente, quum non verisimile sit corpus aut animum vllis exercitationibus apta fieri, vbi non mutationes temporum sunt fortes. Propter quas causas formæ eorum sunt crassæ & carnosæ, Iuncturæ verò humectæ & inefficaces, ventriculique humidi omnes, maximè omnium tamen inferior aluius. Nequit enim ipsa exsiccari in eiusmodi quum regionis, tum naturæ & temporis constitutione. Sed pinguedine & nuditate carnis formæ inuicem sunt similes, masculorum masculis, & fœminarum fœmellis. Tempora enim quum sint inter se similia, nullas corruptiones, neque malignitates inferunt

Cur oēs hi
carnosi pin
guesq;.

Cur inter
se dissimilia
les.

HIPPOCRATIS LIBER

in seminis genitalis mixturam ac compactionem, nisi quid- **D**
dam aliud fortuito vel casu cōtingat, aut à morbo. Magnum
autem argumentum humiditatis corporum Sytharum hec
exhibebo. Multos enim ipsoꝝ, præcipue qui Nomades sunt,
reperias exustos humeros ac brachia habentes manuumque
iuncturas, pectora, coxas, & lumbos, nullā sanē aliam ob cau-
sam, nisi ob humoris & molliciei naturæ detractiōē. Nam
neque arcus intendere, neq; telum torquere possunt præ im-
potentia humiditatis humerorum, quum autem vruntur, hu-
mor ipse à iuncturis exoluitur, fiuntque corpora ipsoꝝ va-
lidiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articulorum
vſu potentia. Fluida verò fiunt ac lata primū propterea quòd
fascijs non colligantur, quemadmodum fieri solet in Aegy- **E**
pto. Deinde quòd non animaduertunt quomodocunque in-
ter equitandum equis infideant. Postrenum etiam propter
desidiā perpetuam. Masculi enim eorum antequā poten-
tes fiant equos conscendere, atque in illis vehi, plurimū tem-
poris desident in curribus, raroque prodeunt, vt inambulent,
propter exilia ac perpetuas circulationes. Muliebriū autem
corporum formæ ad miraculum vsque fluxæ existunt. Porro
Scytharū gens fului valde coloris existit propter frigus in-
gens. Non enim vehemens accedit ad eos sol, à frigore verò
albedo, exurit & fit fulua. Neque verò possibile est focun-
dam esse eorū naturam, quum viri minimè cupidi sint cum
foeminis commisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, ven-
trisq; mollitiā ac frigiditatem, quæ causæ adparent mini- **F**
mè viros ad coitum incitari. Accedit his lassitudo ex conti-
nua equitatione contracta, quæ eos ad commissionem reddit
impotentiores, atque hæ sunt causæ cur viri infocundiores
putentur. Mulieres pinguedo carnis & humiditas steriles fa-
cit, præ quibus vteri earum genitale semen nequeunt con-
tinere. Lunares namque purgationes eis non eueniūt quem-
admodum est necesse, sed minus & intempestiue per lon-
gius tēpus. Ipsumque amplius vteri os præ pinguedine con-
cluditur, vt nequeat semen suscipere. Sūt enim otiosæ & pin-
gues, ventresque earum frigidi & molles, vnde necessario se-
quitur non multum focūdā Scytharum gētem esse, cuius
rei famulæ earū indicatiū exhibent. Nam hæ viris misceri plu-
rimū gaudēt, in vteroq; conceptum continent, propter corpo-
ris

*Mulieres
Scythæ mol-
lissima.*

*Quid conti-
nua equita-
tio faciat.
In Scythia
cur mulieres
steriles.*

*Sterilitatis
altera caus-
sa.*

- A**ris exercitium frequens carnisq; gracilitatem. Amplius autem pluri Scythæ Eunuchi sunt, & muliebria officia ob-eunt, instarq; feminarum omnia faciunt, & loquuntur, vo-canturq; hi effæminati. Et regionis quidem incolæ causam ad Deum referunt, coluntque hos ipsos homines & adorant, sibiipsis timentes ne quid tale accidat. Mihi verò hi affe-ctus diuini quidem esse videntur, sicut & reliqui omnes, ne-que vllum aliquem alio esse diuiniorum aut humaniorum, sed diuinorum omnes, verum vnusquisque eorum suam pro-priam habet naturam, neque aliquis citra naturam accidit: Quare quomodo hic affectus contingat, vt mihi videre vi-deor, narrabo. Ab equitatione ipsa diurni eos corripiunt
- B**articulorum dolores. Nimirum propendentibus semper ex equis eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahuntur-que coxendices quum inualuerit morbus. Medicantur au-tem sibiipsis hoc modo. A principio morbi vtrâque venam retro aures incidunt, quo facto sanguine multo promanan-te, somnus eos corripit præ imbecillitate, sicque obdor-miscunt: quorum quidem aliqui depulso somno sani exur-gunt, aliqui verò minimè. Atque mihi sanè videntur ea me-dicatione seipsum perdere. Venæ enim retro aures sunt, quas si quis secet sterilitatem inferat his quibus secantur, quare id etiam ipsis ex earum incisione accidere certum est. Quando igitur postea vxores adeunt impotentesque se fa-ctos vident cum illis coire, primùm quidem nihil molestius cogitantes quiescunt, quum autem his aut ter, aut amplius frustra opus tentarunt, neque quicquam proficiunt, mox putant se Deum offendisse, in quem culpam reijciunt. In-duuntque se veste muliebri, palam se eunucos esse confi-rentes, ad mulierumque contubernia transeunt earum o-pera tractantes. Hoc itaque malo ditissimi Scytharum affi-ciuntur, minimè verò infimi. Imò qui maximè & genere & potentia prævalent ex nulla alia, quàm continuæ equi-tationis causa hoc perpetiuntur. Pauperes verò minus, quum non multum equitent. Vnde si hac affectio alijs diuinior censenda esset, non nobilissimis, non ditissimis Scytharum ferè solis accideret. Sed esset omnibus, æqualiter pe-culiaris. Imò magis inuaderet pauperes circa cultum deo-rum negligentiores, si saltem gaudent dii in hominum ad-

*Quæ uenæ
sectæ sterili-
tatem reddunt.*

*Cur ditio-
res potius
quàm pau-
peres hoc
patiuntur.*

HIPPOCRATIS LIBER

miratione constitui, & pro hoc beneficia hominibus retri- **D**
 buunt. Diuites enim sæpius dijs sacra faciunt, victimas offe-
 runt, statuas erigunt, coluntque, quum pecunijs abundant,
 pauperes autem minus id faciunt, quum non habeant. Quin
 etiam aliquando deos detestantur, qui eis opes non suppedi-
 tent, vt verisimilius esset, pauperes ac parum abundantes
 hoc malo propter crimina sua puniri, quàm diuites & qui
 opibus abundant. Verùm sicut & prius dixi, diuinus quidem
 hic affectus est, secundumque naturam accidit similiter vt
 alij omnes, neque alia eius causa quàm ea quam dixi, Scy-
 this existit. Simili autem modo & reliquis hominibus eue-
 nit. Vbi enim frequenter & continuè homines equitant: ibi
 plurimi à diuturnis doloribus articulorum, coxendicumque; **E**
 maximè & pedum corripiuntur, ad coitumque fiunt impo-
 tentes, quæ omnia mala Scytharum genti adsunt. Atque pro-
 pterea Scythæ omnium hominum minimè sunt ad coitum
 valentes. Et quòd Anaxyridas (braccarum siue fœminalium
 id genus est) semper habent, & plurimum temporis in e-
 quis delides degunt, vt neque manu tractare pudenda lice-
 at, atque præ frigore & lassitudine voluptatis ac iucundita-
 tis coeundi obliuiscantur, neque prius aliud sibi faciendum
 putent, quàm vt euirati fiant. Hactenus ergo de Scytharum
 gente recensui. Reliquum autem in Europa hominum
 genus valde inter se dissimile est & diuersum, tum quod ad
 magnitudinem adinet, tum quod ad formam, atque id pro-
 pter temporum mutationes contingit apud eos magnas & **F**
 frequentes. Sunt enim eis calores vehementes, & hyemes
 fortes, pluuiæ multæ, rursusque siccitas diutina, & venti
 plurimi, ex quibus multæ & omnimodæ fiunt transmuta-
 tiones. Neque à vero discrepat circa generationem has ip-
 sas mutationes sentiri, inque seminis genitalis coactione
 aliam, neque ex eodem etiam eandem, æstatis pariter vt
 hyemis, pluuioso vt sicco tempore, progigni. Eaque causa
 est, cur putem Europæos magis quàm Asianos secundum cor-
 porum formas inter se discrepare, & magnitudines diuer-
 sissimas in singulis adeo urbibus prouenire. Plures enim cor-
 ruptiones contingunt in seminis coactione, quum tempo-
 ra frequenter variant, quàm si eadem sunt & similia. Eadem
 autem morum ratio in vtrisque existit. Feritas, integritas, &
 audacia

*Cōtinua e-
 quitatio ubi
 que nocet.*

*Cur in Eu-
 ropa homi-
 nes inter se
 dissimiles
 sint.*

*Semins ge-
 nitalis ua-
 rietas uari-
 as formas
 reddit.*

*Cur seuior-
 es in Eu-
 ropæ.*

A audacia à natura Europæis innascitur. Frequentes enim mentis percussiones feritatem inducunt, mansuetudinem contra & benignitatem extirpant. Quare etiam magnanimos magis eos qui Europam incolunt Asianis iudico. Siquidem similitudo & æqualitas segnitiei parit. Mutatio autem & animus & corpus ad exercitationem excitat. Augetur itaque à desidia & ocio timiditas, ab exercitio verò & laboribus crescit virilitas. Vnde bellicosiores quoque Europæi extant, non ob hanc solum causam, sed & propter leges. Non enim regibus obediunt quemadmodum Asiani. Vbi enim sub regibus viuunt, ibi necesse est homines timidissimos esse, quæ admodum & suprâ ostendi. Seruitute nanque animi eorum pressi non libenter, neque volentes temere pro alijs se periculis exponunt. Europææ autem suo iure viuentes, quum pro seipsis pericula belli subeant, magna cupiditate feruntur, volentesque ac alacres difficultates omnes adgrediuntur, ipsique sibi ex re bene gesta præmia reportant, ut certum sit leges plurimum ad magnanimitatem conferre. Tota itaque & vniuersa res de Europa & Asia sic ut retuli habet. Cæterum Europa ipsa adhuc habet gentes inuicem differentes, non magnitudine & forma solum, sed & magnitudine ac fortitudine. Quæ verò in eis hanc diuersitatem faciant, in præcedentibus dixi dicamque amplius magis manifestè. Quicunque regionem montanam, asperam, nudam & non aquosam incolunt, his mutationes temporum contingunt magnæ & diuersæ, vnde & hominum formas magnas progigni conuenit, qui & ad laborem & ad viriliter agendum à natura præstent, quibusque feritas & immanitas non mediocriter à natura sint congenita. Qui verò loca concaua, pratensia & æstuosa habitant, ventosque calidos plus sentiunt quàm frigidos, & aquis vtuntur calidis, hi magni quidè esse non possunt, neque bene compositi & longi ac erecti, sed in amplitudinem à natura producti carnosius sunt, & capillis nigris. Imò & ipsi toti nigri magis quàm albi, & qui minus de pituita habeant quàm de bile. Virilitas autem & toleratia laboris non æquè ipsis à natura inest, nisi consuetudo accedat, & hæc in eis efficiat. Quod si flumina extent in ea regione, quæ stagnantes & pluuias aquas euehant, homines ipsi incolumes ac splendidi viuunt. Si verò flumina desint, aquasque puteo-

*Segnitiei
ubi magis
augeat.*

*Europæi
cur bellicosiores quàm
Asiani.*

Locorum uarietas uarios homines creat.

*Quæ flumina
salubria.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Quales gignat alta regio.
Sterilis quales.*

rum stagnantes & olentes bibant, necesse est ab ipsis illis aquis & ventrem ladi & splenem. Quicunque autem altam habitant regionem, planam, ventis expositam & aquosam, eorum formæ magnæ ac inuicem similes & erectæ. Animi quoq; eorum existunt mansuetiores, Qui uerò macra, aquis carentia, & nuda loca tenent, & quæ temporum mutationibus non sunt permixta, horum formas necesse est esse asperas & vegetas, flauas magis quàm nigras, mores etiã eorum rigidi sunt, pertinaces & contumaces. Vbi enim mutationes temporum contingunt frequentes, & plurimum inter se diuersæ, ibi & formas, & mores, & naturas reperias plurimum differentes. Temporum itaque varietates potissimæ sunt, quæ naturam ipsam permutant. Deinde etiã regio in qua

*Quales ubi tempestates uariant.
Pinguis regio quos gignat.*

multæ variationes sunt, postremum autem aquæ. Inuenias enim ferè semper & formas hominum & mores regionis naturæ compares. Nam ubi terra pinguis est & mollis, & aquosa, aquæ autem valde sublimes, ita ut æstate calidæ sint, & hyeme frigidæ, & temporum ratio aliàs probè conueniat, ibi & homines carnosî, articulis non adparentibus, humidî, laboris intolerantes, & ut plurimum maligni nascuntur. Sænitatesq; & somnolentia eis inest multa. Suntq; ad artes tractandas crassi, non acres aut subtiles. Vbi autem regio est nuda, natura munita & aspera, quæq; & à frigore hyberno prematur, & à sole æstiuo exuratur, ibi duros & robustos, & articulis probè disiunctis, vegetosq; & hirsutos reperias homines, & in quibus à natura laboris tolerantia, & vigilantia insit. Quiq; mores habeant pertinaces, ad iram proclines & contumaces, magisq; feritate participantès quàm mansuetudine. Insuper ad artes etiam acutiores & plus solertes, & ad res bellicas gerendas aptiores. Quin & omnia quæ à terra proueniunt, terræ ipsius naturam relipiunt & sequantur. Atque hætenus quidem maximè contrarias corporum naturas & formas diximus, è quibus coniectura facta, si quoq; reliqua consideraueris, nunquam à vero aberrabis.

Montosa quales.

HIPPO

A HIPPOCRATIS

COI LIBER DE FLATI-

BVS, IANO CORNARIO
MEDICO PHYSICO IN-
TERPRETE.



B

Vnt quædam artes, quæ illis quibus earum cognitio contingit, multum laboris ac molestiarum exhibent: illis verò qui earum usu indigent, iucundæ ac vtilis existunt. Imò ignaris etiam ac plebeis hominibus commune quoddam sunt bonum.

*Medicinæ
qualitas.*

His verò qui eas exercent planè molestæ. Ex harum artium numero est & ea quæ medicina appellatur. Medicus enim oculis perlustrat singula pericula, contrectat etiam nulla voluptate, & ex alieno malo proprias sibi demetit molestias.

Aegrotantes autem artis beneficio, à maximis malis liberantur, à morbis, à doloribus, à tristitia, à morte. Omnibus enim his euidens medicina auxiliatrix reperitur. Huius autem artis quæ vilia vulgo putantur, cognoscere difficile est. Quæ verò alicuius precij existunt, facile: atque vilia quidem soli medici norunt, vulgus ignorat. Non enim corporis, sed

*Vsus per-
tinet doctor
& magi-
ster sumus.*

animi opera existunt. Quæcunque quidem manuum operam exigunt, ad ea consuetudine perueniendum est, Est enim vsus ipse egregius manuum exercitator & magister. Verum de non adparentibus & difficillimis ægritudinibus planè opinio magis quam ars ipsa iudicat. In his ergo plurimum refert expertusne sit quis, an omni experientia carens. Vnum autem est horum omnium iudicium, hoc scilicet, Quæ tandem causa sit morborum, & quòd principium ac quasi fons sit, ex quo corpori mala omnia scaturiant. Si quis enim causas corporis affecti probe cognouit, potens est valde ea adferre, quæ corpori commodent, nimirum contraria corporibus morborum natura perspecta. Est enim maximè secundum naturam ipsa medicina. Quare statim ubi fames molestat, morbus sit.

*Morbi late-
tes grauesq;
opinionem non
arte censetur.*

*Quid pri-
mum in mor-
bis & quæ
medela.*

*Contraria
tollunt con-
traria.*

Quicquid
enim

HIPPOCRATIS LIBER

*morbus
quid*

enim homini molestiam ac tristitiam infert, hoc morbus vo
D
catur. Quòd ergo est famis remedium? hoc scilicet quod fa-
mem sedat, id autem facit cibus, eo ergo malum illud medi-
candum. Amplius autem ubi sitis urgeat, bibere compescit:
& rursus, repletioni euacuatio, euacuationis repletio, labori
quies succurrit, & quietis medelam ex labore reperias: atque
ut breuiter dicam, contraria cōtrariorum sunt medicamina.

*Medicina
quid. 4*

21

Medicina enim nihil aliud est nisi adpositio & ablatio. Ab-
latio quidem eorum quæ excedunt, adpositio verò eorum
quæ deficiunt: qui autem istud optimè facere potest, is opti-
mus medicus censebitur, quantumque quis ab hoc præstan-
do deficit, tantum deficit quoque ab ipsa arte. Atq; hæc qui-
dem præter institutum futuri sermonis à me dicta sunt. Mor
E

*Loci mor-
bos dissimi-
les faciunt.*

borum autem omnium vnus & idem modus est. Locus verò
ipse eorum differentiam facit. Quare videntur quidem mor-
bi inter se nihil simile habere, propter diuersitatem scilicet
locorum, quum sit tamè vna morborum omnium & species
& causa quoque eadem. Quæ autem hæc ipsa sit, in sermonis
huius progressu manifestum facere conabor. Corpora enim
omnia tum hominum, tum reliquorum quoque animatium
à triplici nutrimento sustentantur. Horum autem nutrimen-
torum nomina hæc sunt, cibus, porus, spiritus. Ac spiritus qui-
dem qui in corporibus sunt, flatus vocantur: qui verò extra
corpora existunt, aër. Qui sanè maximus est in omnibus quæ
corpori accidunt & autor & dominus. Quare operæ precium
est eius potentiam diligentius perspicere. Ventus enim ip-
E
sius aëris fluctus & vnda existit. Quando igitur multus aer
fortes fluctus facit, tū & arbores radicitus euelluntur, & ma-
re vndis exæstuat, spirituum potentia ita cogente, & naues
onerarias etiam & ingētes in altum disijciente. Talem ita-
que vim in ista exercet, etiam si oculis minimè sit cōspiciuus,
& tantum consideratione cognoscatur, & effectu suo fiat ma-
nifestus. Quid autem sine hoc sit tandem? aut cui rei nō ad-
est? Omne enim quòd inter cælum & terram est, spiritu re-
pletū est. Hic & hyemis & æstatis causa est. In hyeme quidè
frigidus & condensatus. In æstate autè mitis & tranquillus.
Quin & solis & lunæ, & astrorū omnium cursus per spiritum
procedunt. Etenim igni spiritus nutrimentum præbet, quo si
ignis priuetur, viuere nō possit. Et solis perpetuum cursum,

*Vetus quid
& quid pos-
sit.*

*Spiritus aë-
rēne cuncta
uigent.*

- A** aer perpetuus & tenuis conseruat. Verum neq; mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestu esse puto. Non enim viuere nataantia animantia possent, si non spiritu participarent: quomodo autem participarent, si non per aquam & ex aqua spiritum abtraherent? Et Lunæ hic fundamentum est, & terræ vehiculum, neque quicquam vsquam est spiritu vacuum. Atque hætenus quidem quantum aer alijs commodè diximus. Mortalibus autem vitæ, & morborum ægrotis, solus is est autor. Tantaq; omnibus corporibus spiritus necessitas extat, vt siquidem omnibus alijs abstineat homo, neq; cibum sumat, neq; potum, possit tamen dies duos vel tres & plures ducere, Si cui verò spiritus in corpus viæ interceptantur, in breui parte vnus diei intereat, vt vel hinc quæto vsus spiritus corpori sit liceat æstimare. Amplius autem ab omnibus operibus aliquando immunes quiescunt homines: multæ enim sunt mutationes in vita, verum ab hoc opere nulla omnibus mortalibus animantibus requies cõtingit, vt cessent spiritum adducere, ac rursum exhalare. Vides ergo ex his quæ dixi quanta cõmunio omnibus animantibus in fruendo aere existat. Subijciam igitur mox & illud, quod nõ aliunde vnuquam verisimile sit morbos euenire quàm inde, si is aut plus, aut minus, aut cumulator, aut morbidis sordibus inquinatior in corpus se ingerat. Sed hæc de vniuersa hac re dicta sufficiant. Ad ipsa nunc opera sermonem conuertens demonstrabo, omnes morbos ex hoc oriundos corporibus innasci, ac generari. Primùm autem à cõmunissimo morbo febrili exordium sumam, & qui omnium morborum comes est: præcipuè tamen ex inflàmatione & tensione abscessuum. Quod satis indicant sequentia offendicula, statim enim cum inflàmatione inguinum abscessus & febris consequitur. Sunt autem febrium genera duo, vt hoc quoque nunc attingam, quorum alterum commune omnibus pestis adpellatur, alterum propter malam dietam priuatim his contingit qui ea vtuntur, vtriusq; autem generis aer autor & causa existit. Cõmunis ergo febris propterea omnibus accidit, quod eundem spiritum omnes adtrahunt, fitque vt simili corpori similes spiritus similiter permixti, similes gignant febres. Sed est fortasse qui dicat vt quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim, Differt corpus

oxygenum spiritum
nisi
omnis
natura
spiritum
Spiritus cum
usus quam
necessarius
sua non
negabit
aut
ut
Spiritus
semper tra
bitur vel
emittitur.

Morbi uni
de.

febris.
Ergo omni
morbis
Febrium, id est
duo genera.
in 2º qd.

Communis
peculiarisq;
febris cau.
sa.

obiectio

respon.

HIPPOCRATIS LIBER

pus à corpore, natura à natura, & nutrimentū à nutrimento. D
Non enim omni animantium generi eadem aut non confe-
runt, aut commoda sunt, sed sunt alia alijs magis cōuenien-
tia. Quando igitur aër eiusmodi inquinamenti plenus est,
quibus humana natura offenditur, homines ægrotāt. Quan-
do verò alteri cuiuspiam animantiū generi aër inconueniens
est, tum morbus illud genus corripit. Qui ergo populares
sint morbi hactenus dictū sit, & quare, & quomodo, & qui-
bus, & vnde gignantur. Quomodo autē propter malam dia-
tam febris accidat deinceps exponam. Est autem mala diætā
hæc. Primum quidem quum quis plures cibos, liquidos aut
siccōs ingerit in corpus, quā ipsum corpus ferre queat, neq;
laborē aliquem ciborū saltem multitudini parem adiungit. E
Deinde quum varios & dissimiles inter se cibos adsumit, se-
ditionem enim mouent quæ sunt inæqualia, aliquaq; citius,
alia difficilius concoquuntur. Cū multorū autem ciborum
ingestione necesse est & multū spiritū ingredi. Omnia enim
quæ eduntur & bibuntur, spiritus in corpus inferūt, aliquan-
do plures, aliquando etiā pauciores. Id autem inde manifestū
fit, quòd plurimis eructationes post cibos & potus euenire
solent, discurrente nimirum aëre incluso, vbi perruperit bul-
las quibus fuerat inclusus. Quādo igitur corpus cibis exple-
tum est, ac spiritus quoq; multitudo vehementer excellit, ci-
biq; ventri diu immorantur, quum præ multitudine exire
nequeant, & inferior venter vel alius ipsa sit obturata, per
vniuersum corpus permeant flatus, sanguineq; plenas corpo-
ris partes maximè petentes eas in frigidant: in frigidatis au-
tem his locis vnde fontes & radices sanguinis prodeunt, per
vniuersum corpus horror cōsequitur: vniuerso autē sanguine
frigefacto, totum corpus horret. Quæ ratio est cur primum
horrores antè febres corpus cōcutiant, quantoq; maiore im-
petu multitudinis & frigiditatis ipsi flatus præcelluerint,
tanto maior sit & horror, à pluribus videlicet & frigidiori-
bus fortior, à paucioribus ac minus frigidis, minus etiā for-
tis. Cum horribus autem & tremores corporis accidunt,
secundum eundem planè modum. Sanguis enim præsentis
horroris timore percussus concurrit, ac penetrat per omne
corpus ad locos maximè calidos. Hi enim sunt eius saltus.
Decedente itaque ab extremis corporis partibus sanguine,
viscera

*Febris mali
nutricatus.*

*Horroris
tremorisq;
caussa.*

- A** viscera contremiscunt & carnes. Sunt autem quædam corporis partes sanguine plenz, quædam verò exangues. Exangues itaque propter frigus non tremunt, sed parumper commouentur quum calor ex eis defecerit. Sanguine autem abundantes propter sanguinis multitudinem & tremunt, & inflamationes suscitant. Nequit enim fieri vt sanguinis multitudo conquiescat. Hiatus etiam præcedere solet febres, siquidē multus aer conseruatus, cumulatim supernè petens commouet ac diducit os, quum per hoc facillimus ei exitus pateat. Quemadmodum enim ab aquis in lebere feruentibus vapor multus eleuatur: Sic & corpore calefacto penetrat per os aer conuolutus, & quadam vi erumpens. Amplius autem & articuli exoluuntur ante febres, calefacti enim nerui diducuntur. Quando autem cōgregatus fuerit cumulatim plurimus sanguis, calefit rursus ipse aer, qui antea sanguinem infrigidauit. Nimirum à calore multo victus, accensusque ac velut igneus factus per omne corpus calorem spargit, cooperante ei in hoc etiam ipso sanguine. Liquefit ergo quicquid ignea vis illa attrigerit, fitque inde spiritus. Qui cum ad meatus corporis irruerit, sudores fiunt. Siquidem spiritus compactus in aquam transmutatur, & per meatus penetrans extra prorumpit, eodem plana modo, quo à feruentibus aquis vapor eleuatus, si obstaculum habeat, ad quod impingere oportet, pinguescit ac cōdensatur, guttæque destillant ab his corporibus quibus vapor ipse fuit impactus. Insuper autem & dolores capitis simul cum febre accidunt, cuius rei hæc causa est. Sanguinis transitus in capite magna angustia coarctantur. Repleti enim sunt multo aëre. Cuius abundantia ac conclusio dolorem excitant in capite. Sanguis enim ipse natura calidus existens, vi coactus per angustam viam transire celerissime non potest, quum multa impedimento sunt obstacula, & oppilationes, quapropter etiam pulsus fiunt circa tempora. Hoc ergo modo, vt dixi, febres fiunt, & cum febribus dolores, ac aliæ quædam ægritudines. Porro sunt aliquæ aliæ infirmitates vtpote voluuli, agitationes intestinorū, tormina atque opilationes: quod autem hæ ipsæ omnes à flatibus causentur, nemini puto non manifestum esse. Omniū enim horum causa est spiritus transitus. Nam is quum contingit locos teneros, inconfuetos, ac prius intactos, quemadmodum
- spiculum

*Hiatus.**Sudores qui
creantur.**Capitis do
lor cum fe
bre cur fiat**oplen in lib
de cordi. in
grr aut
Pulsus tem
porum cur.*

HIPPOCRATIS LIBER

Calor fomentum si foris appositum quid faciat.
Distillatio nis causa.
Fauces qui exasperentur tussis fiat.
Sanguis cum putruit pus efficitur.
D
E
F
 spiculum infixum penetrans per carnem perrumpit, aliquando præcordia petens, aliquando ilia, Imò quandoque vtraque simul adfligens. Quare solent quidam calida fomenta extra adhibentes dolorem mitigare. Rarefacto enim corpore à calore fomentum spiritus inde exhalat, vt quies inde aliqua & mitigatio contingat dolorum. Sed dixerit fortassis quispiam, Quomodo ergo fluxus generantur per ipsos flatus? Et quonam modo sanguinis rupturarum circa pectus flatus autor & causa existit? Opinor autem ego me ista per hæc manifestè declaraturum. Quum igitur venæ circa caput aëre repletae sunt, primùm quidem caput ipsum propter flatus inclusos aggrauatur, deinde conuoluitur spiritus cum sanguine propter angustiam viarum, tenuissimum autè ipsius sanguinis per venas excluditur, atque id ipsum tenuissimum liquidum quum coaceruatur, per alios meatus fluit, & vbi tandem cumulatim progrediens constiterit, ibi constituitur & morbus. Si itaq; ad oculos peruenerit, sequitur eorum dolor. Si ad aures, morbus & illas occupat. Si ad nares, grauedinem generat. Si ad pectus, raucedinem. Pituita enim ipsa acris humoribus permixta, quocunque proruperit, maximè in non consuetos locos, eos exulcerat. Quòd si fauces teneras aliàs fluxus petiuerit, eas exasperat: spiritus enim qui fauces ingreditur, ad pectus vsque procedit, ac rursus effertur per eandem viam. Quum autem spiritus ingrediens in fluxum qui intus est inciderit, tussis gignitur, & repellitur sursum pituita. Quæ quum sic habeant, fauces exulcerantur, exasperantur & inflammantur, adtrahuntque calefactæ humorem de capite, caput autem rursus ab alijs corporis partibus adtrahens his transmittit. Quum igitur hic fluxus cõsuevit sic manare, implentur meatus, & transmittunt in pectus. Acris autem quum sit pituita carnem penetras, exulcerat ac perfringit venas. Ex quibus sanguis effusus in alienos sibi locos vbi inoram traxerit putrescit, ac in pus conuertitur, & neq; sursum potest conscendere, neque infra exire. Sursum non, nam non facilis est via humori ad ardua prodire, sicut neque alijs rebus, quæ aliquam admixtam secum habent grauitatem. Infra autem procedere prohibet septum transuersum. Quare sanè contingit fluxum aliquem citra spiritum rumpi, & aliquando quidem sua sponte, quandoque etiam propter dolores,

A res, Ac sponte quidem quum aër in venas vltro receptus sanguinis meatus coarctat. Multitudine nanque sua compressus sanguis meatus perfringit, qua eius copia maximè prorūpit. Effusione autem eius facta, venæ rursus spiritu complentur, & ex eo dolor sequitur. Necesse est enim affectum locum spiritu occupari, aliaque dictis similia fieri. Rupturę autem omnes fiunt hoc modo, Quum violentia quadā inuicem discedunt & finduntur carnes, fissuram subtercurrit spiritus, ac dolore adfigit: quum autem ipsi flatus carnes pergressi, meatus corporis rarefecerint, sequitur post flatus humiditas, cui viam iam antea aër præstrauit. Irriguo itaq; corpore ab humiditate facto, liquefiunt carnes, tumoresque in suras descendunt, atq; morbus fit, qui aqua intercus adpellatur. Maximū autem signum est, morbum hunc à flatibus generatum esse, quod iam sæpe aliqui hoc malo affecti exoluri sunt, & ab aqua euacuati. Atq; his quidem subito aqua ex ventre prorūpens multa adparet, post moram autem paucior fit. Cur verò hoc fiat satis manifestum est. Nam primū subito prorūpens aqua aëre plena est, is tumorem ac aceruum præ se fert ingentem, cum autem aëris spiritus euanuerit, remanet plane eadē aqua, & adparet quidem paucior, verū penitus eadem existit. Adijciam autem aliud adhuc signum. Si quis vniuersum ventrē penitus euacuet, nō tres procedunt dies rursus plenus fit. Quid ergo aliud quod impleat putandum est quā spiritus? Quid enim aliud tam repētē impleisset? Nam

Locus affectus spiritu uexatur.

Scissura carnis fragmentaque quæ fiunt et hydrops.

B neq; tantum potuum in corpus ingestum est, neque carnes in causa esse possunt, utpote antea liquefactæ. Superfunt autē ossa, nerui, chordæ, fibræ, à quorum nullo vllum aliquod

C quod augmentum potest prouenire. Ergo quomodo aqua intercus fiat iam sit dictum, & verò stupor attonitus vel sideratio à flatibus fiat, deinceps demonstrabo. Cum ergo flatus frigidi multi penetrant ac insident carnes, partes corporis stupidae fiunt, & siquidē plurimi flatus per vniuersum corpus discurrant, totus homo syderatur. Si per partē, pars illa percutitur, atq; vbi abierint flatus, cessat & morbus: quādiu autē permanserint, cōsistit & morbus, idq; sic habere indicat perpetuus syderatorū hiatus. Videtur autem mihi amplius & sacrū adpellatum morbum ab ipsis flatibus gigni: à quibus autem ratio

Syderationis apoplexiæ causa quæ.

Sacer morbus comicialis qui fiat.

nibus ego persuasus sum, illis ipsis & auscultaturos persuade-

HIPPOCRATIS LIBER

re conabor. Opinor autem inter omnia quæ in corpore sunt, **D**
Sanguis nihil magis ad prudentiã cõferre, quàm sanguinẽ. Hic ergo
quid possit. quũ in cõstanti habitu persistit, cõsistit & prudẽtia: sanguine
verò permutato, cõcidit simul & prudẽtia. Quod aut hæc ita
habeant, multa sunt testimonia. Ac primum quidem, qui om-
nibus animãtibus cõmunis est, hæc cõfirmat somnus. Quũ
Somnus em corpus inuasērit somnus, sanguis frigesit. *Qualis.* A natura enim
somno frigefaciēdi vis est. Infrigidato autem sanguine, lan-
guidiores sũt eius meatus: quod hinc palãm fit, quod corpo-
ra adgrauata reclinantur. Omnia enim grauiã natura ad fun-
dum deferuntur: & oculi ardent, & prudentia permutatur,
opinionesq; peregrinæ mentem occupant & exercent, quæ
Insomnia. sanẽ insomnia adpellantur. Quin & temulẽtis per ebrieta-
Temulẽtia tem aucto repẽte sanguine percellitur animus, & in animo
quoque sen- prudẽtia, fiuntq; præsentium malorum obliuiosi, ac futuro-
sus uariat. rum bonorum fœcunda spe beantur. Possem autem pluri-
ma eiusmodi cõgerere, in quibus sanguinis permutationes,
animi quoq; prudentiam permutat. Siquidẽ igitur penitus
totus conturbatus est sanguis, penitus & prudentia proster-
nitur. Affectus enim & cognitiones à consuetudine contin-
gunt: quum autem à cõsuetudine solita recedimus, aufertur
Sacer mor- nobis prudentia. Dico itaq; & sacrum morbum tum fieri,
bus qui fiat quum plurimus spiritus per omne corpus vniuerso sanguini
fuerit permixtus: tum enim multæ oppilationes fiunt multi
Sanguis fariam per omnes venas, quumq; in crassiores & pleniores
quid possit sanguine venas aër prodierit, progressusq; diutius maneat,
& faciat. prohibet sanguinis cursum, atq; alio quidem loco consistit,
alio lentius penetrat, alicubi adhuc tardius. Qua sanẽ inæ-
qualitate trãsitus sanguinis per corpus facta, omni genæ inæ-
qualitates per omne corpus contingunt. Omne enim cor-
pus vndiquaque contrahitur ac turbatur, nimirum corpore
partes suas ad tumultum ac conturbationem sanguinis sub-
ministrante, continguntq; ex sanguinis peruerfione, totius
omnino corporis subuerfiones. Eo enim quo corripuntur à
Comitiales morbo, tempore, neq; sentiunt quicquã, neque audiunt quæ
cur nihil sen- dicuntur, neque vident quæ fiunt, neque vlllos aliquos dolo-
tiant. res percipiunt. Sic nanque aër conturbatus sanguinem tur-
Comitiales bauit, ac conspurcauit. Spumaq; etiam per os illis excurrit,
cur os spu- neque id ab re est. Nam per iugulares venas aër tranfens,
mescat. penetrat

- A** penetrat quidem ipse, adducit autem simul secum quòd tenuissimum est in sanguine, id ipsum quum humidū sit, multa permixtione albescit. Tenuēs enim mēbranas purus permeans aēr pellucet, quapropter & alba spumæ omnes adparent. Porro liberantur aliquādo huic morbo obnoxij, maximē accedente hyeme. Quomodo autem id fiat, dicam. Quando varijs laboribus exercitatum corpus calefactum est, calefit & sanguis, qui calefactus, rursus calefacit & flatus, hi verò calefacti, dissoluuntur & ipsi, & compactum sanguinem dissoluunt simul, proceduntque ē corpore partim cū spiritu, partim cū pituita eiecti. Deferuente itaque spuma, & consistente sanguine, tranquillitateque per omne corpus facta, quiescit etiam morbus.
- B** Quare, vt dixi, flatus ipsi verē omnium istorum morborum omnimodæ existunt causæ. Cæteraque omnia quæ causæ videri queant, vel hos adiuuant, vel consequenter post hos in corporibus morbos generant. Hactenus ergo morborum omnium causas flatus esse demonstrauī. Id enim à principio receperā me facturum. Recensui autem spiritum ipsum, quum in alijs omnibus rebus potentem, tum maximē in animantium corporibus plurimum posse. Deduxi autem sermonem vsque ad morborum cognitionem, atque adeò ægritudinum singularum, in quibus verū argumentum huius sermonis est à me manifestatum. Quòd si pergerem singula ægritudinum genera recensendo ampliū corroborare, longius quidem sermo ipse extenderetur. Verus autem nihilominus futurus esset, & qui fidem suam omnibus probaret.
- Flatus quid faciant.*
- C**

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MEDICA-

MENTIS PURGANTIBVS,

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO IN-

TERPRETE.



Edicamentorum purgantiū res non D
ita se habet, quemadmodum vulgò
putatur. Eodem enim medicamen-
to purgantur & non purgantur.
Quandoque verò alia purgat quàm
quæ purgare solet. Aliquando ni-
mium purgat. Aliquando ea quæ
debet, facit. Quare fieri non potest
vt quis medicamentis confusus, ea

*Cibi quatenus
nobis
medentur.*

temerè exhibeat. Nam & cibos nos alentes, medicamen-
ta esse putandū est, verū minùs quàm illa. Homines enim
qui his rectè in cibo vtuntur, sani sunt: qui non rectè, ægro-
tant: qui verò modum excedunt, purgantur quidem velut E
à sinceris medicamentis, verū minùs & tardiùs quàm à
sinceris medicamentis. Clarum igitur est, quòd & hi medi-
camenta existunt. At verò hi tardiores, qui & familiares no-
bis sunt, & quotidie in corpus ingrediuntur, si temerè & ne-
gligenter exhibeantur, temerè homines turbant, & quo-
dammodo morbos inducunt. Quin & sinceros & acidos ci-
bos si quis citra delectum ac inconsideratè exhibeat, nihil

*Medica-
menta pro
natura cu-
iusque dan-
da.*

*Pharmacii
daturus
quid prius
agat.*

commodi perficient. Oportet igitur primū biliosis dare
quòd bilem purgat. Pituitosis quòd pituitam, hydropicis
quòd aquam, atrabiliarijs quòd bilem atram. Si verò extra
hæc purgaueris, quæ quidem purgari debent, non purgabis:
quæ verò nō debent, ea euacuabis. Quare in vtranq; partem F
peccabis. Quum itaq; pharmacum alicui dare voles, siue de-
orsum siue sursum purgans, interrogare ipsum oportet, an
priùs biberit medicamentum, & an alius ex deorsum pur-
gantibus cita sit, & celeriter obediatur, aut dura. Et si citam ac
facilem solutu esse dixerit, mollioribus & paucioribus medi-
camentis opus habet. Si verò dura fuerit, fortioribus indiget.
Idem modus in sursum purgantibus requiritur. At si nunquā
neque sursum, neque deorsum, se purgatum esse dixerit, ne-
que medicamentum bibisse: cognoscere oportet an ad ea
quæ sanus in corpus ingessit, alius deorsum solutu facilis fue-
rit, aut sursum versus apposita ad vomitionem, & an ad re-
pletionem aliquam alui profluuium ipsi successerit. Hæc o-
mnia interrogare oportet, quo rectè consulere possis. Tur-
pis enim est calamitas, medicamento purgante dato homi-
nem

A nem occidere. Quicumque igitur à febris fortibus cor-
ripiuntur, his medicamenta purgatoria dare non oportet,
donec remiserit febris. Sin minus, saltem non intra quatuor
decim dies. Carnes enim ipsorum & ventres, quum calidi
sint, medicamentum assument, & nihil depurgantur, & fe-
bris maior fit, & color euerititur, & morbi regij speciem præ-
se ferunt. Commota enim bile, & non purgata, non sorbere
vult æger, neque bibere, sed omnia abominatur, & plerunq;
perit. Si verò detinet medicamentum, ante meridiem nihil
purgatur: à meridie vero nimium purgatur, & perit. At si hæc
die superstes maneat, & vnà cum purgatione remittat febris
sanus fit. Quapropter in febribus vehementibus medica-
B menta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui o-
pus fuerit, infusum per clysterem adhibere potes, quotiescun-
que volueris. Hoc enim minoris periculi est. Iuxta eandem
rationem etiam tempore æstatis, à canis ortu, per dies quin-
quaginta vitare oportet, & non dare medicamentum, sed in-
fusum per clysterem vti. Idem enim periculi imminet.

*Febricitans
ti qualia me-
dicamenta
danda.*

ide 195

*quid agendum
in medicamentis
purgantibus
ut non nocu-
reus*

HIPPOCRATIS

COI DE DIAETA SI-

VE VICTVS RATIONE, LI-

BER PRIMVS, IANO
CORNARIO MEDICO
PHYSICO INTER-
PRETE

C



Quis mihi ex prioribus, quid de dia-
ta humana ad sanitatem conferente
scripserunt, rectè cognouisse ac om-
nia per totum, quantum humane men-
ti possibile est, conscripisse videret-
ur: satis esse mihi aliorum laboribus,
quos nossem rectè habere, vti, prout
singula vtilia esse viderentur. Nunc
verò multi quidem iam scripserunt,

*Ratio cuius
de humano
victu scri-
bat.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

nullus autem rectè nouit, quidnam fuerit ipsis scribendum. **D**
 Et alij quidem aliud assequuti sunt, Verùm totum nullus ad-
 huc ex prioribus. Immeritò autem vllus aliquis ipforum re-
 prehendatur, propter q̄ inuenire non potuerunt. Imo laudã-
 di potius omnes quòd inuestigare conati sunt. Itaque redar-
 guere ea quæ non rectè dicta sunt, minimè institui, Verùm
 his quæ sufficienter cognita sunt, testimonium præbere ani-
 mus est. Quæcunque quidem igitur rectè à prioribus di-
 cta sunt, vt non sit possibile me aliter conscribere, rectè con-
 scribam. Quæcunque verò non rectè dixerunt, si quidem re-
 darguam hæc quòd non sic se habent, nihil perfecero. verùm
 exponendo qua de caussa singula ipforum rectè mihi habe-
 re videntur, declarare volo. Propterea verò hunc sermo- **E**
 nem præpono, Quod multi homines vbi audierint aliquem
 prius de re aliqua exposuisse, eum qui de his posterius disse-
 rit non recipiunt, non cognoscentes quòd eiusdem intelli-
 gentiæ est, ea quæ rectè dicta sunt posse iudicare. Ego
 igitur velut dixi, rectè quidem dictis testimonium præbe-
 bo, quæ vero non rectè dicta sunt ac cognita, qualia sint de-
 clarabo. Quæ autem nullus ex prioribus explanare tenta-
 uit, ea etiam ipsa qualia sint demonstrabo. Porro eum qui
 de victu humano scripturus est, censeo primùm quidem to-
 tius hominis naturam nosse ac dijudicare oportere. Nosse
 quidem ex quibus ab initio constitutus est, dijudicare verò
 quæ in ipso partes dominium obtineant, Si enim constitu-
 tionem ab initio non cognoscet, & id quod in corpore do- **F**
 minatur, non poterit ea quæ homini conducunt offerre. hæc
 igitur scriptorem cognoscere oportet. Deinde verò ciborum
 ac potuū omniam, ex quibus victū habemus, facultatem, quā
 tandem singula habent & secundum naturam, & secundum
 necessitatem ac artem humanā. Oportet enim scire quomo-
 do fortii natura vim detrahare oporteat, & quomodo debi-
 libus robur per artē addere oporteat, prout singulorū occa-
 sio se obtulerit. Et si relata iam etiā cognouerit, nondū suf-
 ficiens est hominis curatio, propterea quòd homo edens sa-
nus esse non potest, nisi etiam laboret. Contrarias enim in-
 ter se vires habet cibi & labores. Verū inter se mixti conse-
 runt ad sanitatem. Labores enim ea quæ insunt cōsumere so-
 lēt, cibi aut & potus ea quæ euacuata sunt, explēt. Oportet autē
 velut

Potius lau-
 dadi, quam
 vituperandi
 qui aliquate-
 nus vitam
 adiuuant.

Quæ scire
 oportet qui
 de humano
 victu scribit

Quæ obser-
 uanda.

A velut par est laborum vim pernoscere, tum naturalium, tum eorum qui per vim fiunt, & qui ex ipsis carnes in augmentum præparant, & qui in defectum, & non solum hæc, sed etiã mensuram ac proportionem laborum ad multitudinem ciborum, & hominis naturam, & corporum staturas ac ætates, & ad tempora anni, & ad mutationes ventorum, & ad situs regionum in quibus degunt, & ad anni constitutionem ac statum. Sed & Astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes & excessus ciborum ac potuum, & ventorum, & totius mundi, ex quibus sane morbi hominibus oriuntur, observare sciat. Quum autem hæc omnia cognoverit nondum sufficiens inventum est. Siquidem enim supra hæc inuenta fuerit ciborum mensura, & laborum ad unamquamque naturam numerus, ita ut excessus neque supra, neque infra modum fiat, inuenta sanè exactè fuerit hominibus sanitas. Nunc verò prædicta quidem omnia inuenta sunt, qualia sint, hoc verò innire impossibile est. Si quid igitur præsens quis sit, & inspicat, cognoverit utique hominem exeuntem & in gymnasijs exercitantem, ut custodire sanum possit, alia detrahendo, alia apponendo. Verum non præsentì impossibile est cibos ac labores exactè præscribere. Nam quantum possibile est invenire à me iam relatum est. At enim etiã si valde parum defectuosiora quàm alia fiant, in multo tempore necesse est corpus ab excessu superari, & ad morbum peruenire. Alij itaque hucusque inquirere conati sunt, & neque hæc dixerunt ac prodiderunt. **A** me verò hæc inuenta sunt priusquàm homo ægrotet, ut ab excessu in utram tandem partem factus fuerit, prænotio contingat. Non enim repente morbi hominibus accedunt, sed paulatim collecti, acervatim apparent. Priusquàm igitur in homine sanitas à morbo superatur, quæ perpetuntur homines à me inventum est, & quomodo hæc in sanitatem restituere oportet. Hoc autem ubi accesserit ad ea quæ scripta sunt, ratiocinationum huius doctrinæ conatus perficitur. Constituuntur quidem igitur tum animantia alia omnia, tum homo ipse ex duobus differentiis quibus quidem facultate, concordibus verò & commodis usu, igne inquam, & aqua. Hæc autem ambo simul sufficietia sunt, tum alijs omnibus, tum mutuo sibi ipsis. Vtrumque verò seorsum, neque sibi ipsis, neque ulli alteri sufficiens est. Vim igitur ac facultatem utrumque

*Astrorum
ratio cognos-
cenda me-
dico*

*Morbi san-
sim pul-
lanti*

*Ignis & aqua
qua cuncta
gignunt*

HIPPOCRATIS LIBER I.

ipforum talem habet. Ignis enim omnia per omnia mouere D
 potest, Aqua verò omnia per omnia nutrire, Particularitè ve
 rò vtrunque superat & superatur, ad summum ac minimum,
 quantum eius fieri potest. Neutrum enim superare penitus
 potest, ob hanc sanè causam. Igni quidem vbi ad extremi
 tatem aquæ peruenierit, deficit alimentum : auertitur igitur
 eò vnde nutriri potest, Aquæ verò vbi ad extremitatem ignis
 peruenit, deficit motus. Sistitur itaque in hac, quum verò ste
 terit, nō amplius potens est, sed ab illabente igne in alimen
 tum consumitur. & propterea neutrum penitus superare po
 test. Si verò etiam alterutrū superetur, nihil sanè ex his quæ
 nunc sunt fuerit velut nunc habet. Quum autem sic semper
 se habeant, erunt & eadem & neutra, & neq; simul deficient. E
 Ignis igitur & aqua velut à me dictum est, sufficientia sunt
 omnibus per omnia ad summum ac minimum similiter.
 Cæterum vtrique horum hæc adsunt, Igni quidem calidi
 tas & siccitas, aquæ verò frigidas & humiditas. Habent au
 tem inter se mutuo, ignis ab aqua humiditatem. Inest enim
 ab aqua humiditas. Aqua verò ab igne siccitatem, Inest enim
 in aqua ab igne siccitas. Quum autem hæc sic habeant, mul
 tas & omnigenas formas ac species, tum seminum, tum ani
 malinum, à seinuicem secernunt, quæ nihil inter se simile ha
 bent, neque visu, neque facultate. Etenim quum nunquam si
 mul in eodem consistent, sed semper alterentur, necessarium
 est etiam ea quæ ab ipsis secernuntur ac producantur dissim
 ilia fieri. Equidem nullum omnino corpus perit, neque sit F
 quod prius non erat, Verum permixta & discreta alterantur
 Homines autem putant hoc quidem ex orco in lucem auctum
 generari, illud verò ex luce in orcum imminutum perire ac
 corrumpi. Oculis autem magis credere oportet quam opinio
 nibus. Ego verò hæc ex sententia exponam. Animalia enim
 sunt & illa & hæc, & neque animal mori possibile est nō cū
 omnibus, Vnde enim moriatur, neque quod non est gene
 rari, quum non sit vnde generetur. Sed augentur omnia ac
 minuuntur, ad summum & ad minimum, quantum eius fieri
 potest. Quid verò dicam generari & perire, vulgi gratia in
 terpretabor. hæc autem commisceri & discerni significare
 declaro. Habet autem res hoc modo. Generari & perire siue
 corrumpi, idem est. Idem est commisceri & secerni. Genera
 ri idem

Potest fieri
 ignis & aqua
 quæ.

Quæ ignis
 & aqua in
 ter se per
 mutant.

Quid gigni
 & perire.

in phy &
 physicis

Ari idem est quod commisceri. Perire corrumpique ac minui idem est quod secerni. vnumquodque ad omnia, & omnia ad vnumquodque idem sunt. Consuetudo enim in his naturæ contraria est. Seorsim autem omnia & diuina & humana sursum ac deorsum vicissitudinem habent ac transeunt, dies & nox ad summum ac minimū, Sic & Luna ad summum ac minimum. Ignis accessus est & aquæ. Sol ad longissimū ac breuissimum. Rursus hæc, & non hæc. Lux loui, tenebræ orco. Lux orco tenebræ loui. Accedunt transmutentur illa huc, hæc illuc, Omni tempore transigunt illa res horum, hæc autem illorum, & quæ quidem faciunt, non sciunt, quæ veræ faciunt, scire sibi videntur. & quæ quidem vident, non cognoscunt, attamen omnia ipsis hunc per diuinam necessitatem, & quæ volunt, & quæ non volunt. Accedentibus autem illis huc, his verò illuc, & inter se permixtis, vnumquodque destinatum fatū explet, & ad maius, & ad minus. Corruptio autē omnibus mutuo inter se est, maiori à minore, & minori à maiore. Et augetur maius à minore. Reliqua autē omnia, & hominis anima, & corpus velut anima, ornantur ac gubernantur. Irrepunt autem in hominem partes partium, tota totorum temperaturam habentia, ignis videlicet & aquæ, partim acceptura, partim datura, & quæ quidem accipiunt, plus faciunt, quæ verò dant, minus. Secant homines lignum per ferram, alter trahit, alter protrudit. Idem autem hoc faciunt, & minus facientes, plus laborant ac faciunt. Sic & hominis natura, aliud protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud accipit, & alij dat, ab alio accipit, & alij quidē tanto plus dat, ab alio verò nihil minus accipit. Locum autem vnumquodq; suum seruat, & quæ quidem ad minus eunt, ad minorem locum se cernuntur, quæ verò ad maius vadunt, permixta in maiorem ordinem mutantur. Peregrina verò non eosdē mores habentia, ex aliena regione protruduntur. Semper autem anima & maiora, & minora habens, suas ipsius partes circumambulat, non appositione, neq; detractione partium indigens, verū augmento & decremento earum quæ iam sunt opus habens. Locum verò vnicuique perficit, ad quem perueniant. & allabentia suscipiant. Non enim potest id quod non similes mores habet, in discordibus locis permanere. Oberrāt enim velut ignota, permixta verò inter se cognoscunt. Cōcors enim

HIPPOCRATIS LIB. I.

Qualis ho-
minis ani-
ma perspi-
citur.

concordi adhæret ac assidet, discordia autem rebellât, & pugnant, atque inter se dissident. Quapropter anima hominis, in homine augetur, in alio verò nullo, & aliorum magnorum animalium similiter. Quæcunque verò aliter ab alijs per vim secernuntur, de alijs quidem animalibus prætermittâ, de homine verò declarabo. Irrepat in hominem anima, ignis & aquæ temperamentum habens, partem corporis humani. Fœmellæ autem & masculi, & multi & omnigeni nutriuntur, Nutriuntur autem & auferuntur per dietam quæ homo utitur. Necesse est autem omnia quæ ingrediuntur partes habere, Cuiuscunque enim pars non inierit à principio, augeri non poterit, neque multo, neque modico alimento ingrediente. Non enim habet quod auferere faciat. Id verò quod omnia habet, auferunt, unumquodque in suo loco. Alimento autem ingrediente ab aqua & igne, sicco & humido, alia quidem intro coguntur, alia verò foras protruduntur. Quemadmodum fabri lignarii lignum serra dissecant, & alter quidem trahit, alter protrudit, idem sanè facientes; & qui deorsum premit, superiorem trahit, neque enim alias admitteret deorsum ire. Si verò violententer cogant, toto opere aberrabunt. Similiter & circa hominis alimentum se res habet. aliud trahit, aliud protrudit. intro autem coactum, foras repit. Si verò importune & violenter cogatur, omni successu priuabitur. Singula autem tanto tempore eundem ordinem habent, donec locus non amplius suscipiat, neque alimentum aquarum ac ignis sufficiens ad summum habeat. Postea ad extremam regionem transeunt & fœmellæ & masculi, eodem modo præ violentia & necessitate impulsæ. Quæcunque autem destinatum fatum expleuerint, ea primum secernuntur, ac simul commiscuntur. Singula enim secernuntur, omnia autem hæc commiscuntur. Postquam verò regionem permutauerint, & nati fuerint harmoniam recte habentem symphonias tres comprehensim penetrantes per omnia, viuunt & auferuntur iisdem quibus etiam antea, Si verò harmoniam non assequuti fuerint, neque graui acutis consona fiant, prima symphonia perit. Et si etiam secunda generetur, propterea quod unus per omnia corruptus est, omnis tonus vanus est. Non enim concentum habuerit, sed transitio fit ex maiore ad minus, ante destinatum fatum quod qui faciunt, non sciunt quid faciant. Cur autem utrique tum masculus, tum fœmina fiant,

A fiant, in sermonis progressu declarabo. Vter autem ipsorum *Partes cō-*
 harmoniam assequetur humidus existens mouetur ab igne, *posius.*
 motus autē viuificatur, & alimentū attrahet ab ingredien-
 tibus in mulierem cibis ac spiritu, primū quidem vndiqua
 que similiter, donec recenter rarus est. à motu autem & ignis
 ficeatur ac consolidatur, consolidatus autem & firmatus cir-
 cum circa densatur. Et ignis inclusus non amplius sufficiens
 alimētum attrahere potest, neque spiritum expellit, propter
 ambiētis corporis densitatem. Consumit enim humorem in
 tus existentem. Quæ igitur solida natura sunt in cōpacto ac
 siccō, ea non consumuntur ab igne in alimentum: sed valida
 ac robusta fiunt, & consistunt humore deficiente, atque hæc
 sanè ossa ac nerui nominantur. Ignis autem ex commixto ac
B moto humore corpus secundum naturam ordinat ac dispo-
 nit propter talem necessitatem. Nam per solidum & siccum
 non potest diutinos transitus facere, quia alimentum non ha-
 bent, per humida verò & mollia potest, hæc enim ipsius sunt
 alimentum, Inest autem & in his siccitas, quæ ab igne nō cō-
 sumitur, Hæc autem inter se congregantur mutuo. Ignis igi-
 tur penitissimè ad intima obturatus, & plurimus est, & maxi-
 mum exitum facit. Plurimus enim humor in ea parte inest,
 quæ venter appellatur, & excidit inde vbi alimentū non ha-
 bet foras, & exitum facit. Plurimus autem humor in vêtre in
 est, tum propter alimēti in gestione, tum propter concoctio-
 nem. Qua verò in relinquū corpusculu sūsus est ignis, triplices
 circuitus facit. Etenim quod humidissimū est in igne, in his
C locis quæ venæ cauz appellantur, existit. In media autē ho-
 rum id quod relinquitur est aquæ congregatū stabilitur, atq;
 ea vocantur carnes. In summa, ignis omnia quæ in corpore
 sunt, secundū suū ipsius modū exornauit, ad vniuersi imitati-
 onē, parua ad magna, & magna ad parua, Ventrē quidē maxi-
 mū, siccō & humido prōptuariū, vt det vībus, & accipiat ab
 omnibus, iuxta maris facultatē qd est animalū in ipso nutri-
 torum ac nutriri solitorū alimentū, discordiū verò pernicies.
 Circū hunc autē aquæ frigide & humide cōgregatio: transi-
 tus spiritus frigidi & calidi, ad terræ imitationē, omnia quæ
 in ipsum incidunt alterantis, Et alia quidem consumens, alia
 vero augens, atque tenuis ac ignis dispersionē fecit, in superq;
 non obscuri & apparētis à cōpacto secretionē, in quo delata
 omnia

*Venter.**Vene.**Caro.
Mundi imi-
tatio.**Terra quo-
lit.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Partes i-
gnis.*

*Leges cur
sibi fecerūt
nesciunt.*

*Vaticina-
tio & me-*

omnia in apertum perueniunt, singula iuxta destinatum fa- D
tū. In hoc verò triplices circuitus ignis fecit, inter se mutuo
intro ac foras terminantes, alios quidem ad cavitates humo-
rum lunæ facultate, alios vero ad externam circūferētiā,
ad ambientem soliditatē astrorum facultate. Medij verò &
intro & foras terminantes, calidissimū ac fortissimum ignē
habent, qui sanē omnibus dominatur, omnia secundum na-
turam gubernans, sine strepitu, tum ad visum, tum ad tactū.
In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmentum, Motus, Immi-
nutio, Permutatio, Somnus, Vigilia. Hic omnia p omnia gu-
bernat, & hæc, & illa, nunquam quiescens. At verò homi-
nes ex manifestis obscura considerare non nouerunt. Quum E
enim artibus vtantur similibus humanæ naturæ, id ipsum
ignorant. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorum imi-
tari, ita vt cognoscant quæ faciunt, & non cognoscant quæ
imitentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia existentia, et
omnia concordia, discordia existentia, quæ comprobamus,
non cōprobamus, æquitatem habentia, iniqua sunt. contra-
rius est modus singulorum ei quem confitentur. Lex enim &
natura, quibus omnia transigimus, nō confitentur quæ con-
fitentur. Legem enim posuerunt ac tulerunt homines ipsi
sibi sibiipsis, non cognoscentes de quibus tulerunt. Naturam ve-
rò omnes dij exornauerūt. Quæ igitur homines sancierūt,
nunquam eodem modo habent, neque rectē, neque non re-
ctē. Quæ verò dij sancierunt, semper rectē habent. Et recta F
ac non recta intantū differunt. Ego verò Artes hominis ma-
nifestas, affectionibus & manifestis, & obscuris, similes esse
declarabo. Vaticinatio tale quid est. Ex manifestis quidem
cognoscere obscura, ex obscuris verò manifesta, & ex præ-
sentibus futura, & ex mortuis viuencia. Et ea quæ intelli-
gi non possunt, vates intelligunt, qui quidē doctus est, semper
rectē, qui verò non doctus est, aliā aliter. Naturam hominis
etiam hæc quātum possibile est, imitantur. Vir mulieri con-
cumbens puerū facit, Hoc manifesto obscurum cognoscere
datur, quodd sic futurum est. Mens hominis obscura, cogno-
scens manifesta, ex puero in virum transit, hoc præsentī fu-
turum cognoscit. Non simile à morte vllum aliquod animal
existit, neque mortuo animal viuum. Venter quod intel-
ligi non potest nouit. per hunc enim intelligimus quod sitit
aut esu

A aut esurit. Hæ artis vaticinandi & humanæ naturæ affectiones, cognoscētibz quidem semper recte habent, verum non cognoscentibus aliàs alter. Artis fabrilis ferrariæ instrumenta ferrum circumliquant, flatu ignem fabri cogunt, & alimentum iam præfens auferunt, vbi verò rarefecerint, feriunt ac tundunt. Aquæ autem alimento ferrum rursus roboratur. Eadem patitur homo à pædotriba, præfens enim alimentū igne detrahitur, quum præ spiritu homo cogatur, rarefactus autem tunditur, atteritur, subuertitur. Aquæ autē aliunde accessione corroboratur ac fortis euadit. Et fulgones ideim transigunt, calcitrant, feriunt, destruentes, tundunt, trahunt destruentes, robustiora faciunt, deradentes supereminentia, & attexentes pulchriora reddunt. Eadem etiā homo perpetitur. Sutores coriatij tota in partes dissecant, rescindentes & pungentes, marcida ac lacera, sana & integra, faciunt, Et homo idem patitur. Ex totis partes secantur, & ex partibus compositis tota sunt. Punguntur & secantur à medicis marcida, sananturque ac viuic homo. Medicina id quod molestat, tollit, & id à quo homo ægrotat aufere, sanum facit. Natura eadem sua sponte nouit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia eiusmodi natura habet quæ medicinæ sunt. Fabri lignarij serra secantes, alter trahit, alter protrudit, Idem autem uterque facit, & in vtranque partem tendit. Idem terebrant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiore deorsum trahit, & minus facientes plus faciunt, naturamque hominis imitantur. Spiritus alter trahit, alter protrudit, Idem autem uterque facit, & in vtranque partem tendit. Cibi partim deorsum premuntur, partim sursum vergunt. Ab vna anima diuisa, plures & maiores, & minores & pauciores sunt. Aedificatores ex diuersa rebus vnā concordem facientes. sicca quidem humectantes, humida verò siccantes, & tota diuidentes, diuisa verò componentes, Si enim non sic contingeret, nihil priuatim ac proprium constitui posset: dixtam humanam in hoc imitantur. Nam & in hac sicca humectantes, & humida resiccantes, tota quidem diuidunt, diuisa verò componunt. Hæc omnia diuersa ac discordia existentia, cum natura concordant. Musices autem organum primum producere oportet, in quo harmonia quæ vult declarabit. Con-

dicina fr
re similes,
sunt.

Cibariorū
potestas
multis com-
paratur.
Domorum
structura.

Musica.

struct

HIPPOCRATIS LIBER I.

Arructiones ex ijsdem nō eadem sunt, ex acuto, ex graui, no- **D**
 mine quidem similibus, sono autem nō similibus. Quæ plu-
 rimū diuersa sunt, maximē concordant, & quæ minimū
 diuersa sunt, minimē concordant. Si verō quis similia omnia
 faciat, non inest delectatio. Plurimæ ac multiformes trans-
 mutationes, maximē delectant. **Coci** obsonia hominibus
 parant, omnis generis diuersa commiscentes, ex ijsdem non
 eadem, ad hominum cibum ac potum. Quōd si omnia simi-
 lia facerent, non haberent delectationem, & si in eodem
 etiam omnia construerent, non vtiq; rectē haberent. Pulsan-
 tur toni in musica partim supernē, partim infernē. **Lingua**
alis. musicam imitatur, cognoscens quidem dulcedinē & acorem
 eorum quæ allabuntur itemq; dissonantia, pulsatur autem so-
 nos supernē ac infernē, & neque ea quæ supernē pulsantur,
 si infernē pulsantur rectē habent, neque quæ infernē, si su-
 pernē. Quum autem lingua probē fuerit attemperata, sym-
 phonix delectatio contingit. Si verō discors fuerit ac incon-
 grua, molestia. **Corlarij.** Pellium tinctorum tendunt, terunt, pectinant,
 lauant. Eadem est puerorum curatio. Plicatores ac textores
 ducentes in orbem fila plicant, à principio in principium
 desinunt. Idem circuitus in corpore est, vnde incipit, in hoc
Aurifices. desinit. Aurum operantes, tundunt, lauant, molli igne li-
 quant, forti autem non conflatur, Vbi verō elaborarunt, ad
Panificiū. omnia vtuntur. Homo frumentum tundit, lauat, molit, &
 vbi igne coxit, vtitur, & forti quidē igne in corpore nō con-
Statuaria. flatur, verū molli ac lento. Statuarij imitationem corpo- **F**
 ris faciunt, anima excepta, mentem autem habentia non fa-
 ciunt, ex aqua & terra humida siccantes, & sicca humectan-
 tes, ab his quæ superabundant detrahunt, & ad ea quæ defi-
 ciunt apponunt, ex minimo ad maximum augentes. Eadem
 patitur homo, augefcit à minimo ad maximū, ex superabun-
 dantibus detrahens, & deficientibus apponens, sicca hume-
 ctans & humida siccans. **Figulina.** Figuli rotam versant, & neque re-
 trorsum, neque antrosum procedit, sed simul in veranque
 partem, Vniuersi hæc imitatrix circularis existit. In eadem
 autem quum iam circūfertur, omnis generis opera efficiunt,
 vt alterum altero in nulla re simile existat. Ex ijsdem homi-
 nes eadem patiuntur, itemque reliqua animalia in eadem
 circumferentia omnia operantur, & ex ijsdem nihil simile,
 ijsdem

- A** ijsdem instrumentis ex humidis sicca facientes, & ex siccis humida. Grammatica tale quid est, figurarum compositio, quæ signa ac notæ sunt humanæ vocis, faculas reuocandi in memoriam præterita, & quæ faciendæ sunt declarandi. Per septem figuras notitia contingit, Eadem omnia homo trāfigit, uel sciens literas, siue literatum rudis. Per septem figuras etiā sensus hominibus contingit. Auditus tonorum, Visus manifestorū, Nasus odoris, Lingua voluptatis & iniucunditatis, Os sermonis, Corpus tactus calidi aut frigidi, Spiritus transitus intro ac foras. Per hæc cognitio hominibus cōtingit. Palæstra & pædottibæ tale quiddam docent, præuaricari secundum leges, iniuriā facere iuste, defraudare, furari, rapere: violare honestissima ac turpissima. Qui hæc non facit, malus, qui hæc facit, bonus est. Ostentatio multorum ac vulgi est, desipientiæ hæc esse vident, & vnum ex vniuersis bonū iudicant, reliquos vero malos. Multi mirantur, pauci cognoscunt. Homines in forum progressi eadē perpetrant, defraudant videntes & ementes, Qui plurimū defraudauit in admiratione est. Bibentes & infanientes eadem perpetrant, currunt, luctantur, pugnant, furantur, defraudant. Vnus ex omnibus præfertur. Simulatores & deceptores alia ad scientes dicūt, & alia sentiunt, Iidem ereptāt, & irrepunt non iisdem. Inest autem homini, alia dicere, alia facere, & eundē nō esse eundem, & nūc aliam habere mentem, nūc rursus aliam. Sic quidē artes omnes cum humana natura communicant. Cæterū anima hominis, quemadmodum etiam antea à me dictum est, ignis & aquæ temperamentum habens, partes autem hominis, irrepit in omne animal quod sanè spirat, itēque in omnem hominem, & iuniorem, & seniore. Non autem similiter in omnibus auge scit, sed in iuuenibus corporibus, utpote celeri circunuolutio ne existente, & corpore auxili, expassæ & attenuatæ partes illæ animæ: in corporis augmentum consumuntur. In senioribus autem, utpote tardo existente motu, & corpore frigido in decrementū hominis cōsumunt. Quæcūq; autē corpora in vigore sunt, & in ætate fecūda, eas nutrire & augere possunt. Potētes autē homines, ut quisq; plurimos homines alere pōt, ita fortis iudicatur ac potens, vbi verò defecerint quos alat, imbecilior censetur. Sic etiā circa singula corpora

*Literaria.**Sensus humani.**Palæstra, & pædottibæ institutio. Hypocritæ. Procreatio.*

HIPPOCRATIS LIBER

res se habet. Quæcunque plurimas animas nutrire possunt, & ea fortiora sunt, vbi verò hæ discesserint, imbecilliora.

Quicquid igitur in aliud corpus ingressum fuerit, nō au-
gescit. Quicquid verò in fœminā, augetur, si ea quæ ipsi cō-
grua sunt, contingant. Discriminantur autem partes & au-
gescunt simul omnes, & neque prius altera alteris, neque po-

*Conforma-
tio mēbrorū*

sterius. Verum maiores natura priores apparent minoribus,
quum non priores existant. Non autem in æquali temporis
spatio omnes fœtus exornantur, sed alij citius, alij tardius,
prout singuli & ignē & alimētum fuerint nati. aliqui itaq;
in quadraginta ac tribus diebus scaturiunt ac formantur, ali-
qui in quatuor mensibus. Similiter etiam vitales fiunt ac gi-
gnūtur, aliqui citius, septimo mense perfectē: aliqui tardius, E
perfectē nono mense in lucem prodeunt, & ostendūt se tem-
peramentum habere, quod semper habebūt. Masculi igitur
& fœmellæ hoc modo gignuntur, quātum eius fieri potest.

*Qui mas et
fœmella gi-
gnantur.*

Caterū fœmellæ ab aqua magis, & à frigidis ac humi-
dis & mollibus augescunt tum cibus, tum potibus, itemque
studijs ac exercitijs. Masculi verò magis ab igne, à siccis vi-
delicet ac calidis cibus & reliqua diata. Si igitur fœmellam
parere velit, diata ad aquam vergente vtendum est. Si verò
masculum, exercitijs ac victu ad ignem tendente vtetur. Et
non solum virum hoc facere oportet, sed etiam mulierem.

*Quid in cō-
ceptu cupi-
ditate agen-
dum.*

Non enim solum quod à viro secernitur auctile est, sed etiā
quod à muliere, ob hanc sanè causam. Vtraque quidem pars
sufficientem motum non habet ad humoris multitudinem, F
vt quod influit consumat, & propter ignis debilitatem co-
agmentantur. Quum verò ambæ coinciderint, mutuò inter
se incurrunt & obuoluuntur, ignis ad ignem, & aqua simili-
ter. Siquidem igitur in sicco loco circumuoluitur ignis,
coillapsū aquam superat, & ab hoc ignis augetur, ne ab
illabente vnda extinguatur, aliumque accedentem susci-
piat ac sibi consociet. Si verò in humorem inciderit, statim
ab initio extinguatur ab illabente vnda, & in minorem or-
dinem dissoluitur. In vna autem die vniuscuiusque mentis,
consociare ac superare ea quæ accedunt potest, & hoc si co-
inciderint ab vtrisque in vnum locum. Consistere autem pos-
sunt inter se & fœmella & masculus, propterea quod anima
quidem idem est in omnibus animatis. Corpus autē vniuf-
cuiusque

*Procreatio
diuersa.*

- A** cuiusque differt. Anima quidem igitur semper similis, & in maiore, & in minore. Non enim alteratur neq; per naturā, neque per necessitatem. Corpus autē nunquam idem in vilo aliquo est, neque secundum naturam, neque ex necessitate, propterea quod partim secernatur in omnia, partim permisceatur ad omnia. Si quidem igitur mascula corpora ab utrisq; secreta fuerint, augescunt pro re præsentī, & sunt hi viri animis splendidi, & corpore fortes, si non à diætā postea detrimentum sentiant. Si vero à viro quidem masculum secernatur, à muliere verò fœmineum, & superauerit si ita cōtingat masculum, (Genitura enim ammiscetur ad fortiorē aut debiliorem, Non enim habet ex præsentibus aliquid ad quod familiarius secedere possit. Suscipit enim parua maiorem, & maior minorem. In commune autem super hæc quæ adsunt dominium exercent) corpus sanè masculum augetur,
- C** fœmineum vero minuitur, & in aliam sortem secernitur. Et hi quidem minus prioribus splendidi sunt, tamen quia masculum à viro superauit, viriles euadunt, & hoc nomen meriti habent. Si verò à muliere quidem masculum secretū fuerit, à viro autem muliebri, superauerit autem masculum, augetur eodē modo sicut prius, fœmineum verò minuitur. Et sunt hi Androgyni, id est viri effœminati, atq; sic rectē appellātur. Tres quidē igitur hæ sunt generationes hominum, differētes in eo quod magis aut minus tales sint, propter partium aquæ temperamentū, & alimenta, & institutiones, ac consuetudines. declarabo autē in progressu sermonis etiā de his. Cæterum fœmella eodem modo gignitur. Si enim ab utrisque fœmineū secretum fuerit, fœminosissimæ ac ingeniosissimæ fiēt. Si vero à muliere quidem fœmineum, à viro autem masculum, superauerit autem fœmineum, audaciores quidem prioribus fiēt, veruntamen ornatæ ac moderatæ etiā ipsæ. Si verò à viro quidem fœmineum, à muliere verò masculum secretum fuerit, & fœmineū superauerit, augetur eodem modo, & fiunt hæ audaciores adhuc prioribus, & viriles ac viragines nominantur. Si autem quis nō credat animam animæ admisceri, demens est. Si quis enim carbonēs ardentēs ad ardentēs adijciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebūt, & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicunque cor-

*Clarus uir
quando gi-
gnatur.*

*Semina-
res.*

*Fœmella
procrea-
tio.*

*Similitudo
animæ.*

*Gemellorū
procreatio.*

pore ignem susceperint, tale in omnibus erit. Vbi verò præ-
sens alimentum consumpserint, secernuntur ac obscurantur. **D**
Idē hoc anima hominis patitur. At verò quomodo gemi-
ni nascantur, hoc sermone declarabo. Equidem natura vtero-
rum in foeminis vt plurimum in caussa est. Si enim similiter
in vtrāq; partem iuxta osculum dispositi à natura fuerint,
& similiter hauerint, & à purgatiōe siccantur, alere possunt,
si semē viri cōceperint ita vt statim discindatur. Sic em̄ ne-
cesse est dispergi in vtrāq; vterum similiter. Siquidem igitur
multum semē ab vtrīsq; & fortē secretū fuerit, in vtrīsq;
locis augeri potest, dominium em̄ habet in alimentū quod
accedit. Si verò aliter cōtingat, gemini nō fiunt. Quī itaque
masculum ab vtrīsq; secretum fuerit, necessariū est in vtrīsq; **E**
masculos gigni, quum verò foemineum ab vtrīsq; foemelle
fiunt, quum autem alterum foemineum, alterū masculū fue-
rit, vtrū altero præualefcet, id ipsum augefcet pro ea ratione.

Cur similes

Similes porro inter se fiunt gemelli, ob hanc caussam. Pri-
mum quidem q̄ æquales sunt loci in quibus augefcunt. De-
inde q̄ simul secreti sunt. Postea quòd iisdem alimentis au-
gefcunt, vitalesq; in lucem prodeunt. Ceterum superfeca-
tiones hoc modo fiunt. Quum vteri calidi & sicci natu-
ra fuerint, ipsaq; mulier eiusmodi, & semen calidum ac siccū
illapsum fuerit, non fit amplius vlla aliqua humiditas in vte-
ris, quæ semen superillabens contineat. Quapropter cōstitit
ab initio ac viuit, perseverare autē non potest, sed etiam id
quod iam adest insuper corrumpit, quia non eadem vtrīsq; **F**
conferunt. Etenim quod tenuissimū est in aqua, & quod ra-
rissimū in igne, si in hominis corpore temperamentum ac-
ceperint, finissimum habitum constituunt. Propterea quod

*Superfecun-
dationes quo-
modo fiunt.*

neq; in temporū anni maximis mutationibus, neq; in regio-
num permutationibus, neq; in ciborū ac potuum alteratio-
nibus, aqua dēfissima euadit in aquæ impetuosius incurribus,
neq; ignis in ignis imperu. Possunt em̄ ambo & generatio-
nem & satietatē plurimā suscipere. Aēs mollissimum ac ra-
rissimum, plurimū temperamentū suscipit, ac optimum, eua-
dit. Eodem modo etiā quod tenuissimū est in aqua, ac rarissi-
mū in igne, vbi temperamentū acceperint. Qui igitur hāc
naturam habēt, sani perseverant omni tempore vsq; ad qua-
dragesimum annū, aliqui vero etiam vsq; ad extremā sene-
ctutem

*Qui sani
diutius per-
seuerent.*

A Autem. Qui verò à quadagesimo anno, à morbo aliquo correpti fuerint, nunquā ferme euadunt. Quæcunq; autem corpora ignis fortissimi, & aquæ densissimæ temperamentum acceperint, fortia & robusta fiunt, verū multa custodia opus habet. Magnas enim transmutationes in vtranq; partem habent, & in aquæ incurfibus in morbos incidunt, & in ignis cōsimiliter. Qui igitur eiusmodi naturā habet, eum victu vti conducibile est tēporibus anni contrario. Et aquæ quidē incurfū cōtingente, vti oportebit eū ab his quæ ab aqua sunt, paulatim pro temporū ratione discedendo. Porro vbi aquæ crassissimæ & ignis tenuissimi in corpore mixtura facta est, talia cōtingunt, ex quibus frigidam & humidam naturā cognoscere oportet. Talia enim corpora in hyeme morbosiora sunt, quā in æstate, & in verē quā in autūno. Caterū quodd ad ætates attinet, Sanissimi ex talibus pueri sunt. Deinde adolefcētes. Morbosissimi autem senes, & his vicini, hæ naturæ cito senescunt. Talibus in victu cōferunt quæ calfaciunt ac siccant, tum in cibis, tum in exercitijs, & externas corporis partes magis quā internas exercere conducit. Si verò humidissimū in igne, & densissimū in aqua, in corpore mixturā acceperint, ex his humidā ac calidam naturam cognoscere oportet. Laborant quidem ex morbis huiusmodi maxime in vere, minime in autumnō, quia in vere excessus est humiditatis, in autumnō vero symmetria & moderatio siccitatis. Ex ætatibus verò morbosissime sunt iuniores. Corpora autem citō augefcunt, & tales distillationibus obnoxij sunt. His cōducit exhibere quæcunq; siccant ac frigefaciūt, & in cibo, & in potu ac laboribus. Verū labores intra corpus his facere maxime cōfert. Si verò mixturā acceperint fortissimum in igne, & tenuissimū in aqua, sicca & calida est natura, & talibus morbus in ignis accessionibus contingit, sanitas verò in aquæ. Et in ætatibus vigētibz ad carnis bonam habitudinē, morbosissimi sunt, sanissimi autē senes. Ita etiā verisq; proximi. Diætæ quæ frigefaciunt ac humectant, & ex laboribus qui minime exalfaciunt ac colliquant, plurimam frigiditatē exhibebunt. Huiusmodi naturæ viuacissimæ ac sanissimæ existunt. Si autem mixturam acceperint corpora ignis rarissimi, & aquæ siccissimæ, sicca & frigida talis natura est, morbosa quidē in autūno, sana verò in verē, & vicinis

*Quæ etas
sana vel
contrā.*

*Quæ cuius
ætati conue
niant.*

*Naturarū
cognitio.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Cognitio
ætatum.*

*Quomodo
inter sese
ætates differant.*

*Tur mares
fœminis calidiores
sint.*

*Prudentia
qui præ-
sente.*

Qui præ-

temporibus. Similiter ætates ad annos quadraginta morbo-
fa, pueri sanissimi, ita & vtriusq; proximi. Diætæ his cōferunt
quæ calidæ existentes humectant, & labores sensim adhibiti
leuiter calfacientes, & non multū ab his quæ sunt auferen-
tes. De naturæ igitur cognitione sic à prima cōstitutione co-
gnoscere oportet. Cæterum ætates ipsæ ad seipsas hoc mo-
do habent. Puer itaq; ex calidis & humidis temperatus est,
quia ex his cōstitutus est, & in his augmentū accepit. Humi-
dissima igitur & calidissima sunt corpora proxima genera-
tioni, & augescūt quā plurimū, & quæ his proxima sunt
eodem modo. Adolescens autē calidus quidem est, quia ignis
impetus aquæ dominatur. Siccus autē, quia humidū ex pue-
ro consumptum est, partim in augmentū corporis, partim in
motum ignis, partim præ laboribus ac exercitijs. Vir quum
steterit iam corpus, siccus est & frigidus, quia caliditatis im-
petus non ampliū dominatur, sed stat corpus ab augmento
quiescens, ac perfrigeratū. Verūm ex adolescenti ætate siccitas
inest. Ab insequenti autē ætate & aquæ accessu, humiditas
tē nō habet, quapropter ex siccis & frigidis exuperatus est.

Senes autē frigidi sunt & humidi, quia ignis quidem re-
cessus cōtigit, aquæ autem accessus, & sicciorū quidem sublatio,
humidorum autem status. Ex omnibus autem masculi
calidiores sunt & sicciores, fœminæ verō humidiores ac fri-
gidiores. Propterea quod ab initio vtriusque in talibus geniti
sunt, & à talibus augescūt. Vbi verō in lucē editi sunt masculi,
victu ac diætā laboriosiore vtuntur, vt excalescant ac resic-
centur. Fœminæ verō humidioribus ac pigrioribus diætis
vtuntur, & caliditatis purgationē ex corpore singulis mensi-
sibus faciunt. Porro de animæ sapientia ac desipientia, hoc
modo se res habet. Quod humidissimum est in igne, & sic-
cissimum in aqua, si in corpore temperamentū acceperint, sa-
pientissima sunt. Quia ignis quidem habet humiditatem ab
aqua, aqua autem siccitatem ab igne, vterq; autem sic sufficien-
tissimus est. Neq; ignis alimētū indigentior multū procedit,
neque aqua motus indiga multū levis redditur. Sic itaque
vtraque & per se sufficientissima sunt, & inter se permixta.
Quod enim minimē vicinis indiget, hoc maximē præsentibus
obtēperat, velut ignis qui minimē mouetur, nō præ ne-
cessitate, & aqua quæ maximē, nō præ violētia. Ex his autem
anima

- A** anima temperata, sapientissima est, & memoria valentissima *denissimus*
 prædita. Si verò aliquo ascitamento vtens, alterutrum horum *memoria*
 augetur aut contabescat, desipientissima redditur, propter- *que tenacis-*
 ea quòd quum sic habeant sufficientissima existunt. Si au- *sima prædi-*
 tem ignis sincerissimi, itemq; aquæ temperamētum anima *ca.*
 fortitur, sit autē ignis paulo inferior ac defectuosior quā a-
 qua, sapientes quidē sunt etiam hi, verū defectuosiores quā
 in priore temperamento: propterea quòd ignis ab aqua su-
 peratur:& tardiorē motum faciens, legnius sensibus allabi-
 tur. constantes autem cum mansuetudine sunt eiusmodi ani- *Costantes.*
 mæ, ad quācūq; tandem rem animum applicuerint. Si ve-
 rò recto victu vtantur, & sapientiores & acutiores præter na-
 turam fieri queant. Talibus confert victu vti ad ignē ma-
 gis tendente, & nō repletionibus, neque ciborum, neque po-
 tum. Cursum itaque vtendum est velocibus, quo & corpus *Horum ula-*
 humore euacuetur, & humor amplius citius sistatur. Luctis *lus &*
 autem & fricationibus & eiusmodi exercitijs vti non condu- *exercitatio.*
 cit, vt ne meatus cauiore redditi repleantur. A talibus enim
 animæ motum grauari necesse est. Confert & deambulatio-
 nibus vti, tum à cœna, tum mane, itemque a curribus. A cœ-
 na quidem, quo alimentum siccius anima suscipiat ab ingre-
 dientibus ac ingestis. Mane verò, quo transitus humoris eua-
 cuentur, & meatus animæ non obturentur. Ab exercitijs ve-
 rò, vt ne in corpore relinquantur quod secretū est à cursu, ne-
 que animæ commisceatur, neque transitus obturet, neque a-
 limentum conturbet. Confert & vomitibus vti, quo corpus
 depurgetur, si quid defectuosius labores transegerunt. à vo-
 mitu autem paulatim adiiciendo cibus offerendus est, mini-
 mum ad quatuor dies. At vero vngi conducibilis est quā la-
 uari. Coitu vtendum est, aquæ accessibus contingentibus, fre-
 quentiore, in ignis autem impressionibus, pauciore. Por-
 rò si in aliqua anima defectuosiorē vim ignis accipiat quā
 aqua, eam tardiorē esse necesse est. & appellantur tales sto-
 lidi. Nam vt tardiore existente circuitu, sensus paulatim alla-
 buntur, & qui acuti existunt parum commiscuntur, propter
 circuitus tarditatē. Sensus enim animæ qui per visum ac au-
 ditum contingunt acuti sunt, qui verò per tactum, tardiores
 & facilius percipiuntur. hos quidem igitur percipiunt etiam
 tales nihilominus, velut sunt frigida & calida ac consimilia,

Horum ula-
lus &
exercitatio.

Cur his pla-
rimum labo-
randum sit.

Diuersa
natura.
Ignis & a-
que impe-
ratura di-
uersa sunt.

HIPPOCRATIS LIBER I.

Quæ verò per visum aut auditum percipere oportet, quæ nō prius sciunt, percipere non possunt. Si enim non commota fuerit anima ab igne allabente, non percipere poterit quale quid tandem sit. Tales igitur animæ non perpetuantur hoc ob celeritatem, Si autē recta diætā vtatur, etiam talis homo

Nutricus multum facit.

melior fieri possit. Conferunt itaque huic eadem quæ priori, Verum siccioribus ac paucioribus cibis vtetur, laboribus autem pluribus & acutioribus ac velocioribus. Confert & fomentis vti, & vomitibus à fomentis, & exhibitionibus ciborum à vomitibus ex longiori tempore, si defectuosius contigerint vomitus. Et sanè hæc faciens, sanior ac sapientior fuerit. Si verò amplius adhuc superetur ignis à præsent

Attoniti sunt stupidi. Tardus furor.

aqua, hos iam alij desipientes, alij attonitos siue stupidos appellant. Et hæc insaniæ quædam species tardior existit. hi plorant nemine molestante aut verberante, formidantque non formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se pertinentibus, & sentiunt ea quæ nō conueniunt sapientibus. Confert itaque his, fomentis vti, & à fomētis veratris expurgari, ac diætā vti quam prius dixi, indigetque talis homo attenuatione pulmonis ac siccitatē. Si autem aqua defectuosiorē vim accipiat quàm ignis, quum alias sincerum temperamentum habeant, sani sunt homines corporibus, & sapientes. Talis autem anima citò percipit allabentia, & non sæpe ab vna re ad aliam transit. Natura quidē igitur, talis animæ bonæ est. Melior autem reddetur rectæ diætæ vsu, & peior prauæ.

Cum ignis aquam superat quales fiunt.

Confert huic, diætæ vsus ad aquam magis vergentis, ita vt excessus vitet & ciborum, & potuum, & laborum. Vtetur & cursibus curuis & rectis reuertentibus, luctisquæ ac reliquis exercitijs, ita vt in nullo excessum faciat. Si enim sanum fuerit corpus, & non ab aliquo alio perturbetur, animi temperamentum sapiens existit. Si verò amplius aquæ vis ab igne superetur, tali homini necesse est tantò acutiorem animam esse, quanto citius mouetur, & ad sensus citius allabi, verum minus constantem priore, propterea quòd iudicat ea quæ obueniunt, & in pulmonem procedit ob celeritatem.

Naturæ huic nutriticus.

Confert tali homini diætā vti magis ad aquam vergente, quàm priori, & maza magis quàm pane, & piscibus magis quàm carnibus, & potu aquosiore, & Venere rariùs vtetur, & laboribus qui sunt maximè secundum naturam quàm

Diversæ naturæ nutritio.

- A** quàm plurimis, violentis autem vti non est necesse. Vetur & vomitibus paucioribus ex repletionibus, quo corpus quidem euacuatur, quàm minimè vero calefeat, Conducit etiam talibus ad sapièciam, vt minimè carnosì sint. Nam ad carnis bonam habitudinem, ardoris in inflammatione fieri necesse est. Quum autem tale quid huiusmodi anima perpetitur, ad insaniam adigitur, ex superata aqua adacta. Talibus confert actiones obire ac transigere à cibo accepto magis quàm ieiunis. Stabilior enim redditur anima alimento còmodo ammixto, quàm alimenti indiga. Si verò adhuc amplius superetur aqua ab igne, talis anima valde acuta est, & tales necesse est somnia videre, vocant autem ipsos subfuriosos. Nam res valde propinqua insanitæ est. Etenim à breui & incòmoda inflammatione insaniunt, & in ebrietatibus, & carnis bona habitudine, & præ carniùm esu. Verùm talem oportet ab his omnibus abstinere, itemq; à reliqua repletione, ac exercitijs violentis. In victu vtendum est Maza vino dulci non subacta, & oleribus coctis, sed non purgantibus, & pisciculis ex muria, & aquam bibere præstantissimum est, si fieri possit, sin minus, vinum molle & album quod aquæ sit proximum. Deambulationibus quoque multis mane vtendum, à cœna verò satis est exsurgere, quo cibi quidem non resicètur à deambulationibus post cœnam, corpus autem euacuatur à matutinis. Lauare autem magis conducit aqua tepida circumaffusa, quàm vngi. Confert & in ætate interdium somno vti breui non multo, vt ne corpus ab anni tempore resiceretur. Conueniens est etiam vere veratris purgare, formentis antea præparatos, deinde sensim ad diætam inducere, & neque hunc ieiunum actiones obire oportet. Et ex hac sanè cura, huiusmodi anima sapientissima fuerit. Sapientis quidem igitur ac desipientis animæ hoc temperamentum caussa est, quemadmodum à me scriptum est, potestque ex diætâ & melior, & deterior fieri. Cæterum cursus impetu igne præualecente, impossibilè forte fuerit aquæ aliquid apponere, Similiterq; aqua prævalente in temperamento, ignem augere. Ex his verò & sapientiores & desipientiores animæ sunt. At verò taliū nō amplius temperamentum est, qualis est, Iracundus, Segnis, Dolosus, Simplex, Infestus, Beniuolus. Taliū omnium natura meatuum per quos anima

*Quam uia
hæc natura
d carie
tis.*

*Qui nutrit
caus.*

*Que nulla
cura multum
tur.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

meat caussa est, per qualia enim vasa secedit, & ad qualia al-
labitur, & qualibus ammiscetur, talia sapiunt. Ob id itaque
impossibile est talia ex diæta transmutare. Naturam enim
obscuram transformare non est possibile. Similiter autem
& vocis qualiscunque tandem fuerit meatus spiritus caussa
sunt, per qualescunque enim aer mouetur, & ad qualescunque
allabitur, talem necesse est esse vocem: & hanc quidem tum
deteriorem, tum meliorem facere possibile est, quia leuior-
es ac breuiiores meatus spiritus facere possibile est. Verum
illa ex diæta alterare impossibile existit.

HIPPOCRATIS^E COI DE DIAETA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER II.

IANO CORNARIO ME-
DICO PHYSICO IN
TERPRETE.

*Regionum
qualitas.*



Regionum singularum situm & naturā
hoc modo cognoscere oportet. Et in
summa res hoc modo se habet. Regio ^F
ad meridiem sita calidior est, & siccior,
quā ea quæ ad septentriones iacet,
propterea quod soli propinquior est. Et
in his regionibus necesse est & homi-

Loca alia.

num genera, & nascentia ex terra, sicciora ac calidiora & for-
tiora esse, quā in contrarijs, velut Libyca gens ad ponticā,
& vtrisque vicinæ. Ipsa autem loca iuxta seipsa hoc modo ha-
bent. Alta & squallida & ad meridiē sita, sicciora sunt quā
cāpestria & æqualiter sita, propterea quod pauciores humo-
res habent, Illa enim stationem pro aqua pluuia non habēt,
hæc habent. At verò lacustria ac palustria humectant & cal-
faciunt. Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdata, &
non persilantur: humectant autē, quia nascentia ex terra qui-
bus

Abus homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus quem attrahimus crassior est, propter aquæ stationem ac immobilitatem. Verùm caua loca & non aquosa, siccant & calfaciunt. Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdantur. Siccant autem, tum propter alimenti siccitatem, tum quòd spiritus quem inspiramus siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentum sibi ipsi, quum non habeat alium humorem ad quem allapsus nutriatur. Vbi autem regionibus montes adiacent ad austrum, in his squallidi australes & morbos afflant. Vbi autem ab Aquilone montes adiacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. Vbi verò ab Aquilone caua loca viribus adiacent, ab æstiuis ventis calida & morbos haec regio existit, propterea quòd neque aquilo persans puram spiritus inductionem exhibet, neque ab æstiuis ventis perfrigeratur. *Qualitas insularum.* Caterùm insulae propinque continenti tempestuosiores sunt & agrè in ipsis hybernamus. Marinae verò hyeme tepidiores sunt, propterea quòd niues & glacies in continenti stationes habent, & ventos frigidos in vicinas insulas mittunt. Verùm insulae intra pelagus positae non habent in hyeme niuium stationem. Porro de ventis quam naturam ac facultatem singuli habent, hoc modo cognoscere oportet. *Ventorum natura.* Naturam quidem habent omnes venti humectandi ac frigefaciendi, tum animalium corpora, tum nascentia ex terra, ob hanc causam, Necesse est omnes ventos spirare à niue, à glacie, & gelu vehementi, & fluminibus, & stagnis, terraque humecta ac perfrigerata. Et fortiores quidem ventos, à maioribus & fortioribus, debiliores verò à minoribus & debilioribus. Quemadmodum enim animalibus spiritus inest, Sic etiam alijs omnibus, alijs quidem minor, alijs verò iuxta magnitudinem. Naturam quidem igitur habent humectandi ac frigefaciendi omnes venti, Verùm propter situm regionum ac locorum, per quæ venti ad singulas regiones accedunt, diuersi inter se sunt, frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores. Singulorum autem causam sic cognoscere oportet. Boreas siue aquilo frigidus spirat ac humidus, quia progreditur à talibus regionibus, meatque per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, neque aerem resiccans, humorem ebibit ac exhaurit, *Septentrio.* Quare

ad terram habitabilem accedit suam ipſius vim habens, vbi D
non per regionis ſitum corrumpitur. & his quidem qui pro-
ximè habitant frigidiffimus eſt, qui verò remotiſſimè, mini-
mè. Auſter autem à ſimilibus aquiloni natura regionibus

Auſter.

ſpirat. Ab Auſtrali enim polo ſpirans, & à niue multa gla-
cieque ac gelu fortibus procedens, neceſſariò his qui prope
ipſum illic habitant talis ſpirat, qualis nobis eſt Aquilo.

Verùm omnem non item ſimilis accedit regionem. Nam
quum per ſolis iter & in meridiem ſpiret, humiditas ipſius
à ſole ebibitur, & reſiccatus rareſcit, quapropter neceſſe
eſt ipſum calidum ac ſiccum huc accedere. In proximis igitur
regionibus neceſſe eſt ipſum talem vim calidam ac ſic-
cam exercere. & hoc ſanè in Libya facit, Nam & terræ na-
ſcentia exareſcunt, & homines latenter reſiccat, Quum e-

*Qualis ſit
auſter.*

nim non habeat nec mare, nec fluuium vnde humiditatem
accipiat, ex animantibus ac plantis humorem exhaurit. Vbi
vero pelagus tranſit, tanquam calidus & rarus exiſtens, mul-
ta humiditate regionem in quam illabitur implet, & neceſ-
ſe eſt ipſum calidum ac humidum eſſe, vbi non regionum ſi-
tus alterius qualitatis cauſa exiſtat. Eodem modo etiam
aliorum ventorum facultates ſe habent. Cæterum iuxta
ſingulas regiones venti hoc modo ſe habent. Venti ex ma-
ri in regiones illabentes, ſicciores quodammodo ſunt. Qui
verò à niue aut glacie, aut ſtagnis aut fluminibus procedūt,
omnes humectant ac frigefaciunt, tum plantas, tum animan-
tia, & ſanitatē corporibus exhibent qui non frigiditate ſu-

*Qui venti
boni ſunt.*

perexcellunt. Hi enim lædūt, propterea quod magnas muta-
tiones calidi ac frigidi in corporibus inducunt. Hæc au-
tem perpetiuntur hi qui in regionibus habitant paluſtribus
ac calidis, prope flumina magna. Reliqui verò venti qui à

*Loca non
ſana.*

prædictis ſpirant vtilēs ſunt, tum aerem purū ac ſincerum ex-
hibentes, tum animæ calori humiditatē præbentes. Quicū-
que verò venti ex terra accedunt, eos neceſſe eſt ſicciores eſ-
ſe, tum à ſole, tum à terra reſiccatos, Quum autem nō ha-
beant venti vnde alimentum trahant, à viuētibus humorem

*Cur medi-
terranei uē-
ti ſicci.*

trahentes, & plantas & animalia omnia lædunt. Et qui-
cunque venti relictis montibus ad vrbes accedunt, non ſo-
lū ſiccant, ſed etiam turbant ſpiritum quem inſpiramus, &
corpora hominum morboſa faciunt. Naturam quidem igitur

*Montani
venti.*

- A** tur & vim singulorum sic cognoscere oportet. Quomodo autem ad singulos se præparare oporteat, in sermonis progressu declarabo. At verò ciborum ac potuum singulorū vim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artem accessit, hoc modo cognoscere oportet. Quicūq; igitur in summa dicere aggressi sunt, aut de dulcium, aut pinguium, aut salforum, aut alterius cuiusdam consimilis facultate, non rectè iudicant. Non enim eandem vim habent, neque dulcia inter se, neque amara, neque vlla aliqua eiusmodi. Multa enim ex talibus sunt quæ & aluū emolliunt, & sistunt, siccantque & humectant. Similiter autem etiam in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itemque aluum movent, & urinam cient. Sunt quæ neutrum horum faciunt. Similiter & ex calfacientibus ac reliquis omnibus, alia aliam facultatem habēt. De omnibus quidem igitur impossibile est qualia nā sint declarare. Verū quā singularem vim habeant, docebo. Ordeum natura quidem frigidum est & siccum. Inest & purgatorium quiddam à succo palearum. Eius si-
gnum habebis si voles ordeum non purgatum coquere, Purgat enim is succus fortiter, Si verò decorticatū coxeris, perfrigerabit magis ac aluum sistet. Quum autem tostum fuerit, humor quidem purgatorius præ igne perit. Frigiditas autem & siccitas relinquitur. Quæcunque verò perfrigerare ac siccare oportet, id ipsum polentæ transigunt. *Maza* omnis generis sic vitimur, facultatem autē habet maza hæc talem,
- C** farina ex toto collatæ alimētum quidem minus habent, verū magis per aluum secedūt. Puræ autem magis nutriunt, minus verò per aluum secedunt. Maza prius subacta, respersa, vino dulci non emollita, leuem facit, & per aluum secedit, ac frigefacit. Et frigefacit quidem, quia frigida aqua madefacta est, per aluum autem secedit, quia citò concoquitur. leuem verò facit, quia multum alimenti cum flatu foras excernitur. Quum enim transitus alimenti angustiores sint, aliud insuper accedens non suscipiunt, & quod quidem cum flatu attenuatum est, foras excernitur, quod vero intus manet, flatum inducit, & partim supernè eructatur, partim infernè secedit. Multum itaque alimenti à corpore diffatur. Si verò velis mazam statim vt subacta est exhibere, talis rescicatoria est. Quum enim polenta sicca existat, & aqua sit
madefacta

*Quæ nō
sē priores
digessere.*

Ordeum.

Maza.

madefacta, atque sic præparata in ventrem illabatur, humorem ex ipso trahit calidum existentem. Solet enim calidum attrahere frigidum, & rursus frigidum calidum. Consumpto autem humore ex ventre necesse est siccare. Aqua verò quæ vnâ cum maza ingressa est, frigefacit. Quæcunq; igitur siccare oportet aut frigefacere, aut vêtis profluuium diffusum, aut alia quapiâ eiusmodi caliditate, maza efficax existit. At verò siccâ, vino dulci emollita ac trita maza, siccat quidem non similiter, propterea quòd vehementer est adstricta, alimentũ verò plurimum corpori præbet, Nam vt leniter liquescentis alimentum transitus suscipiunt. Per aluum quidem igitur tardè secedit, flatum autem non inducit, neque eructatur. Quæ verò & aqua, & vino dulci emollita ac prius subacta est, nutrit quidem minus, per aluum autem secedit, & flatum magis inducit. Cyceon autem solum in aqua quidem frigefacit ac nutrit, in vino verò calfacit ac nutrit, & aluũ sistit. In melle autem calfacit quidem minus ac nutrit, per aluum verò magis secedit, si non meracum mel fuerit: si minus. nõ secedit, sed aluum sistit. In lacte verò bene alunt omnes Cyceones hoc est farina. Veruntamẽ ouillum aluum sistit, caprinum verò magis per aluum secedit. Bubulum verò minus. Equinum autem & asininum magis secedunt. Triticum fortius est ordeo & magis nutrit, minus autẽ per aluum secedit, tum ipsum, tum succus. Panis autem ex tota farina collata, siccat & per aluum secedit. Purus autem magis nutrit, minus vero secedit. Ex ipsis porrò panibus, fermentatus quidem leuis est & secedit. Et leuis quidem est, quia à fermenti acore humiditas consumpta est, quæ sanè alimentum existit, secedit autem, quia cito concoquitur. Non fermentatus secedit quidem minus, nutrit autem magis. Qui succo subactus est, leuior est, & multum nutrit, ac per aluum secedit. Nutrit, quia purus est, leuis est, quia leuissimo subactus est, & fermentatus ac tostus ab eodem est: per aluum secedit, quia passo, & aluum mouente tritici parte, permixtus est. Ex ipsis autem panibus maximi maxime alũt, propterea quod minimè exuritur humiditas ab igne. Et furnacei panes magis alunt quã focarij & veruarij, propterea quod minus exuruntur ab igne. Clibano autẽ cocti & subcinericij siccissimi sunt, hi quidem propter cinerem, illi verò per testam humore priuati.

Similagi

Cyceon.

Lac.

Triticum.

*Panis uo
ritus,*

- A** Similaginei omnium horum fortissimi sunt, Et adhuc magis qui ex alica fiunt, valdeq; nutriunt, verum non similiter secedunt. Farina pura in aqua pota frigefacit, & lotura polli-
nis tritici. Purfurum succus coctus, leuis, per aluum secedit, *Farina.*
- Verum farinæ in lacte datæ magis per aluum secedunt, quàm in aqua, propter serum, & maximè inter alui mouen-
tia numerantur. Quæcunq; verò farinæ cum melle & oleo coquuntur, aut assantur, omnes æstuosæ sunt, & ructum cient. Et ructum quidem cient, quia probè alentes non secedunt. Aestuosæ autem sunt, quia pingua, & dulcia, & inter se con-
cordia, non eadem coctura indigentia, in eodem sunt. Similago & alica cocta, fortia sunt & alunt, nō tamen per alui
B secedunt. Trygis, id est, Tragus siue olyra, leuior est tritico, & quæ ex ipsa fiunt similiter vt ea quæ ex tritico parantur, & magis per aluum secedunt. Avena comesta humectat ac
perfrigerat, itemq; in sorbitione accepta. Polentæ ac farinæ recentes sicciores sunt vetustis, quia igni & præparationi propinquiore existūt. Vbi verò vetustæ fiunt, calor exhalat, & frigiditas inducitur. Panes calidi siccant, frigidi minùs, gracilitatem autem quandam inducunt. Fabæ alunt, aluum sistunt, & instant, quia meatus aliud insuper accedēs alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam alimen-
menti fecem habent. Pisi instant quidem minùs, per alui autem magis secedunt. Ochri siue cruiliæ, & dosichi siue phasioli ac siliquæ, hi magis per aluum secedunt, minùs instant, & probè alunt. Cicer album per aluum secedit, & per vrinam eiicitur, & alit. Et alit quidē, carnosum in ipso. Per vrinam verò eiicitur, dulce, per aluum autē secedit, salustiosum. Milij grana ac paleæ siccant, & ventrem sistunt, & cum sicubus, fortibus doloribus conferunt. Ipsum autem Milium coctum alit, nō tamen aluo secedit. Lentæ æstuosæ sunt & turbatiuæ, & neque per aluum secedunt, neque ipsam sistunt. Eruium aluum sistit, & robustum est, & crasse facit, & explet, & boni coloris hominem facit. Lini semen comestum alui sistit, habet & quiddam frigefactoriū. Hormini semen consimilia lini semini facit. Lupini natura robusti sunt & calidi, verū per præparationē leuiiores ac frigidiores fiūt, & aluo secedunt. Irio humectat & aluo secedit. Cucumeris semen per lociū magis abit quàm secessum.
- Exples**

*Farina.**Similago.
Trygh.**Avena.**Polenta re-
centes.**Panes ca-
lidi.**Faba.**Pisum.**Ochri.**Cicer.**Milium.**Lent.**Eruium.**Linum.**Hormini.**Lupinon.**Irio.**Cucumis.*

*Cnicus.
Papauer.*

*Caro cuius
que anima
hic.*

Caro autem.

Explet autem & crassefcit. Et secedit quidem per aluū, propter paleam externam, explet autē & crassefacit, propter carnem. Lotum verò secedit quidem verum minus, crassefacit autem & explet magis, humectat autem & vrit, propter pingue & oleosum. Coictus aluum mouet. Papauer aluū sistit, magis autem nigrum hoc facit, sed & album idem agit, alit autem & robustum est. Horum porro omnium succi carnis aluum mouēt, oportet itaq; in præparatione id obseruare, vt quæ ficcare velis, ab his succos detrahas, & carne vtaris. Quæ verò aluū mouere velis, vt succo copiosiore, carne verò pauciore & succulentiore vtaris. Ceterum de animalibus quæ in ciborum vsum veniunt, sic cognoscere oportet. Carnes Bubulæ robustæ sunt, & aluum sistunt, & ægrè in ventre concoquantur, propterea quòd crassi ac multi sanguinis est hoc animal, & carnes graues, itemq; sanguis, ac lac. Quorum autem animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorū etiam carnes consimiles sunt. Caprinæ carnes his leuiiores sunt, & magis aluo secedunt. Suillæ robor quidem magis quàm hæ corpori inducunt, multum autē aluo secedunt, propterea quòd tenues & modici sanguinis venas suæ habent, carnem verò multam. Agninæ leuiiores sunt ouillis, & hedinx caprinis, quia exanguiores sunt & humidiores. Quum enim sicca & robusta natura sint animalia, dum quidē teneræ sunt, aluo secedunt, vbi vero augmentū sumpserint, non similiter. Et vitulinæ carnes eodem modo se ad bubulas habent. Verum porcinae suilis grauiiores sunt. Quum enim animal sit natura carnosum & exangue, humiditatis excessum in tenella ætate habet. Quum igitur meatus superaccedens alimentum non suscipiant, intus manens calfacit ac perturbat ventrem. Asininæ carnes aluo secedunt, & pullorū adhuc magis. Equinæ leuiiores sunt. Caninæ calfaciunt ac siccant & robor inducunt, nō tamen aluo secedunt, catulinæ verò humectant & secedunt. Suis siluestris caro siccatur & robor exhibet, ac secedit. Cerui siccatur, minus autem secedit, magisque vrinam prolicat. Leporinæ sicca sunt & aluum sistunt, vrinæ autem circuitum quoddam faciunt. Vulpinæ humidiores sunt & vrinam cient. Et erinaceorū terrestrium carnes humidiores sunt ac vrinam cient. Porro de volucrum generibus sic res se habet. Omnia ferme volucrum genera sicciora sunt quàm

A quàm quadrupedia. Quæcunq; enim vesicam non habent, neque mingunt, neq; sputum aut saliuam fundunt, omnino siccæ sunt. Propter caliditatem enim ventris, humiditas ex corpore consumitur in alimentum caliditatis, quare neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt. Cui autem tales humiditates non insunt, id ipsum necessario siccatur. Siccissima igitur caro est palumbis, deinde columbæ, tertio loco perdix, ac galli, & turturis, Humidissima verò anseris. Semini leges autem volucres prædictis sicciores sunt. Verùm anatis carnes, & reliquarum auicularum quæ in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidæ sunt. At verò ex piscibus siccissimi sunt hi, scorpius, draco, callionymus, cuculus, glaucus, perca, thrissa. Leues autem sunt petrosi ferme omnes, velut turdus, phuca, elephetis, gobio. Tales autem & prædicti itidem, leuiiores sunt erronibus, Nam hi vt quiescentes raram ac leuem carnem habent, Errones autem & vndas verberantes laboribus fracti, solidiorem carnem habent. Torpedines autem & squatinæ ac Rhombi, & huiusmodi, sunt leuiiores. Quicunque verò pisces in lutosiis & aquosis locis alimenta habent, velut capitones, mugiles, anguillæ, & reliqui eiusmodi, grauiiores sunt, propterea quòd ab aqua & luto, & in his nascentibus, alimenta habent, à quibus etiam spiritus in hominem ingrediens ipsum lædit ac grauat.

Pisces.

B Fluuiatiles autem & palustres his adhuc grauiiores sunt. Polypi verò & sepiæ, & eiusmodi pisces, neque pisces velut videntur sunt, neque per aluum secedunt, quapropter etiam oculos comesti grauant. Iuscula tamen horum aluum mouent. Cæterum conchylia velut sunt pinæ, purpuræ, patellæ, buccina, ostrea, ipsa quidem siccæ sunt, succi autem ipsorum aluum mouent. Mituli verò & peccines ac tellinæ magis aluo secedunt. Vrticæ autem & chartilaginosi generis pisces, maxime humectant ac aluum mouent. Cæterum Erinaceorum oua, & locustarum humor, & musculi & vřæ, ac cæcri, magis quiddam fluuiatiles, sed & marini, aluum mouent & vrinam cient. Salsamētā siccant & attenuant, pleraque etiam aluum leniter mouent. Et salsamētis siccissima sunt marina, deinde fluuiatilia, Humidissima autem sunt palustria. Ex ipsis autem salsamētis pisces pericæ appellati valde siccæ sunt. Animalium porro cicurum ea quæ in syluis & agris pascuntur, sicciora sunt his quæ intra

Pisces erronei.

Pisces grauiiores, & contra.

Conchylia.

Saliti pisces.

Animalium & carniū diuersitas.

acdes

zdes nutriuntur, quia labore reficcatur, itemque prae sole ac frigore, & spiritu sicciore nutriuntur. Verum syluestria sicciora sunt mansuetis, & crudiura ac sylvarum materie pasta, itemque parum edacia, sicciora sunt edacibus. Et frugiuora herbiuoris sicciora sunt, Et frugiuora non frugiuoris, & paucicibibis multibibis, & sanguine referta exanguibus ac paucum sanguinem habentibus, & quae in vigore sunt vetustis valde ac iuuenulis, & mascula fortius mineis, & castrata non castratis, & nigra albis, & hirta nudis. Contraria vero his humidiora sunt. Ex ipsis autem animalibus carnes haec fortiores sunt, quae optime exercentur ac sanguinolentissima sunt, & in quibus recumbunt, Leuissima autem carnes sunt, quae minime exercentur, & in umbra degunt, & in intimis animalis parribus sitae sunt. Exanguium autem partium robustissima sunt, cerebrum & medulla. Leuissima vero carni partium partes sunt capitales, & sub ventre, musculi, pectines, pedes. Ex piscibus siccissima sunt supernae partes, leuissima sub ventre, Et capita ipsorum humidiora sunt, propter pinguedinem ac cerebrum. Oua volucrum robustum quid habet, & alunt, & inflant. Robustum quid habent, quia generatio est animalis. Alunt, quia hoc est pulli lac. Infant, quia ex parua mole in multa diffunduntur. Caseus robustus est & aestuosus & alit, Robustus quidem, quia proximus est generationi. Alit autem, quia carnosae reliquiae sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Aluum autem sistit, quia succo & coagulo compactus est. Aqua frigefacit. Vinum calidum est & siccum, Habet & purgatorium quiddam a materia. Vina nigra & austera sicciora sunt, & aluum non mouent, neque vrinam cient, neque saluam faciunt. Siccant autem & calefaciunt, humiditatem ex corpore consumentes. Mollia vero nigra humidiora sunt, & inflant atque aluum magis mouent. Dulcia nigra humidiora sunt, calefaciunt autem & inflant humiditatem inducentia. At vero alba & austera calefaciunt, magisque vrinam cient, quam aluum mouent. Noua viua aluum magis mouent, quia propiora musto sunt, itemque alunt, & odorata magis quam inodorata eiusdem aetatis, quia magis concocta sunt: & crassa magis quam tenuia. Verum tenuia dulcia magis vrinam cient, & aluum mouent, & humectant corpus & sanguinem debilem faciunt, & aduersarium corporis sanguinem in corpore augent.

*Oua quae
sunt.*

Caseus.

*vinum
nigrum.*

- A** reagent. Mustum inflat, & subducit, ac conturbat feruēs in ventre, & aluo secedit. Inflat quidem, quia calfacit, subducit autem ex corpore, quia purgat, cōturbat autem, quia feruet in vētre, atq; ita aluo secedit. Vina acida frigefaciūt, at tenuant & humectant. Frigefaciūt quidem & attenuant humiditatis euacuationem à corpore facientes, humectant autē per aquam vnā cum vino ingredientē. Acetum frigefacit, quia colliquans humiditatē in corpore consumit. Sistit autem magis quā mouet aluū, quia nō alit & acre est. Sapa calfacit & humectat ac subducit. Calfacit, quia vinosa est, humectat, quia alit, subducit quia dulcis est. Vinum recēs sub torculari expressum & nondum excolatum, humectat, subducit, & inflat, quia etiam mustum idem facit. Mel calidum est & siccum, si meracum sit, cū aqua autem humectat & aluum mouet biliosis, pituitosis verō sistit. Dulce verō vinum pituitosis magis aluo secedit. De oleribus porrò hoc modo res se habet. Allium calidum est, & aluum mouet & vrinā ciet corpori, oculis verō non est commodum. Multam enim corporis purgationem faciens, visum hebetat, aluum autem & vrinam mouet, propter vim purgatoriam: coctū debilius est quā crudum, statum autem inducit, propter spiritus intensionem. Ceba visui cōmoda est, corpori verō mala, quia calida & zestuosa est, & aluo secedit, & alimentū quidem nullum corpori præbet neq; vtilitatem, calfaciens autem siccatur propter succum. Porrū calfacit quidem minus, vrinam verō ciet, & aluum mouet, habet & quid purgatoriū, humectat autem & ructū acidum sedat. Præstat à reliquis cibis postremum ipsum edere. Raphanus siue radícula, humectat pituitam diffundēs sua acrimonia, folia minus prosunt, præterquam ad articulare morbum. Radix vitiosa est, innatās ac ægrè concoctilis. Nasturcium calidum est, & carnē liquat, sistit autem pituitam albam, quare vrinæ stillicidiū inducit. Sinapi calidum est & aluum mouet, sed & hoc vrinæ diffcultatem facit. Quin & Eruca idem facit. Coriandrum calidum est, & aluum sistit, & ructum acidum sedat, & somnum conciliat, si postremum edatur. Lactuca frigidissima est, prius quā succum habeat, debilitatem autem quandam corpori inducit. Anethum calidum est, & aluum sistit, & sternutamenta sedat olfactarum. Apium magis vrinā ciet

*Ocymum.**Ruta.**Asparagus.**Salua.**Solanum.**Portulaca.**Calamin-**cha.**Mintha.**Rumex.**Atriplex.**Brassica.**Cucurbita**Rapum.**Pulegium.**Origanum.**Thymum.**Hyssopum**Herbarum**uires.**Poma.**Mora.*

quàm aluum mouet, & radices magis quàm ipsum aluum mouent. *Ocymum* siccum est & calidum: & aluum sistit. *Ruta* urinam magis quàm aluum mouet, *Habet* & vim quandam condensandi, & ad medicamenta noxia commoda est preparata. *Asparagus* siccus est & aluum sistit. *Salua* sicca est & aluum sistit. *Solanum* frigefacit, & semen in somnis effundere non permittit. *Portulaca* fluuiatilis frigefacit, sale verò condita ac seruata, calfacit & purgat. *Calamintha* calfacit & purgat. *Mintha* calfacit & urinam ciens, & vomitus sistit. Et si quis semen eius saepe comedat, collicquescit ut quis dissuat, & arrigere prohibet, & corpus debile facit. *Rumex* calfacit ac aluum mouet. *Atriplex* humida est, non tamen aluum mouet. *Blitum* calidum est, non mouens aluum. *Brassica* calfacit ac aluum mouet, & biliosa ducit. *Betæ* succus quidem aluum mouet, ipsum autem aluum comestum sistit. Radices verò magis aluum mouent. **E**

Cucurbita frigefacit & humectat, & aluum mouet.

Rapum æstuosum est, humectat autem & conturbat corpus, non tamen aluum secedit, & urinam difficultatem inducit. *Pulegium* calfacit & aluum mouet. *Origanum* calfacit, & biliosa subducit. *Thymbra* similia origano efficit. *Thymum* calidum est, per aluum secedit & mingitur, ducit & pituitosa. *Hyssopum* calidum est & pituitam ducit. Porro syluestria olera, quæ os calfaciunt, & odorata sunt, ea calfaciunt & minguntur magis quàm per aluum secedunt. Quæ verò humidam habent naturam frigidamque ac fatuam, & odores graues, magis per aluum secedunt, quàm per urinam. Quæ autem acerba & austera sunt, aluum sistunt. Quæ acris & odorata sunt, urinam ciens. Quæ acris & sicca in ore sunt, ea omnia siccant. Quæ acida sunt, frigefaciunt. Cæterum succi urinam ciens sunt, crethmi, apij, alij cremor, cytisi, fœniculi, porri, adianti, solani, qui & frigefacit. Item scolopendrinum, mintha, seseli, caualides, hypericū, vrticæ. Aluum autem mouent & purgant, cicer, lenticula, ordeum, betæ brassica, mercurialis, sambucus, cnicus. Hæc omnia aluum magis mouent quàm urinam. At verò de pomis hoc modo serres habet. Quæ quidem seminibus referta sunt, ea magis aluum mouent, Item viridia magis quàm sicca. Verum vis & facultas ipsorum referatur. *Mora* calfaciunt

A calfaciunt & humectant ac aluo secedunt. Pira matura calfaciunt & humectant ac aluum mouent. Dura verò sistunt. Pira syluestria, hyberna, matura, aluum mouent ac purgant. Cruda verò sistunt. Mala dulcia aegre concoquuntur. Acida verò & matura, minùs. Cydonia adstringunt, & non mouent aluum. Succus autem malorum, vomitus sistunt & urinā cient. & ante vomitum odores ipsorum idem præstant. Mala syluestria aluum sistunt. Cocta comesta magis aluum mouent. Verum ad respirationem quæ erecta ceruice fit, & succi ipsorum, & ipsa quodque, hausta profunt. Sorba, Mespila & Corna, & quæcunque alia huius generis poma, aluum sistunt & acerbata sunt. Mali punici dulcis succus aluum mouet, habet autem quid æstuosum. Mala punica vinosa, minùs æstiosa sunt. Acida verò magis frigefactoria. Nuclei autem omnium sistunt. Cucumeres crudi, frigidi sunt & aegre concoctiles. Maturi autem & pepones, minguntur & per aluum secedunt. verum flatuosi sunt. Botri vuarum calidi sunt & humida, ac aluum mouent, maximè albi. Dulces quidè igitur calfaciunt fortiter, propterea quòd multum iam caliditatis habent. Im maturæ verò minùs calfaciunt, magis autem purgant potati.

Ficus & vuar passæ æstiosæ sunt, sed aluum mouent. Ficus viridis humectat & aluum mouet, ac calfacit, humectat, quia succo plena est. Calfacit, propter succum itidem, aluum mouet, propter succi dulcorem. Primæ ficus pessimæ sunt, quia succulentissimæ, optimæ autè sunt postremæ. Ficus arida æstiosa sunt, sed aluo secedunt. Amygdalæ æstiosæ sunt, verù probè nutriunt. Aestiosæ quidè sunt propter pinguitudinem, nutriunt autem propter carnositatem. Nuces rotundæ similes his sunt. Latæ verò maturæ probè alunt, & aluum mouent. Depuratæ verò etiam flatum inducunt. Tunice verò ipsarum aluum sistunt. Acyli ilicis glandes, & quercinæ fagineæ glandes, aluum sistunt crudæ & assatæ, coctæ verò minùs. Pingues carnes æstiosæ sunt, sed aluum mouent. Carnes conditæ ac asseruatæ in vino quidem siccant & alunt, & siccant quidem propter vinum, alunt autem propter carnem. In aceto autem asseruatæ calfaciunt quidem, verum minùs propter acetum, multum autem nutriunt. At verò sale seruatur minùs quidè alunt, humiditate per salem priuatæ, attenuant autem & siccant, ac sufficienter aluum mo-

Pira.

Mala dulcia.

Corna.

Sorba.

Mesp. Corna.

Mala punica.

Cucumis.

Pepones.

Pua.

Ficus.

Amygda.

Nuc.

Castanea.

Caro uariè.

côdica quid possit.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Qui utres
deinanur
& augean-
tur.

*opposita ut
inueniuntur
2^o. & alia
ap. Tosta*

In siccho
et nata.

*deligenter
consideran-
da hpc sunt*

uent. Ceterum vires singulorum detrahere, & addere ac D
augere, hoc modo oportet. Ex igne & aqua omnia consti-
tuuntur, & animalia, & terra nascuntur, & ex his augescunt, &
in hæc secernuntur ac resoluuntur: Fortium quidem igitur
eduliorum vim sæpe coquendo ac frigefaciendo detrahere
oportet, & vice versa augere. Humidorum autem torrendo
ac assando humiditatem eximere. Siccorum vero rigando
ac madesfaciendo. Salforum rigando & coquendo. Amaro-
rum & acrium dulcium mixtura. Acerborum pinguium rem-
peramento, & de reliquis omnibus ex prædictis iudicium fa-
cere oportet. Quæcunque tosta aut assata sunt, aluum ma-
gis sistunt quam cruda, propterea quod humiditas itemque
pinguitudo per ignem ablata sunt. Quum itaq; in ventrem E
inciderint, humiditatem ex ventre trahunt, & oscula venarum
concludunt siccantque ac calfaciunt, quare transitus humidi-
tatis sistunt. Quæ vero ex inaquosis ac siccis & æstuosis lo-
cis veniunt, ea omnia sicciora ac calidiora sunt, & robur am-
plius corpore exhibent, propterea quod pari mole ac copia
grauiora sunt & densiora, & maiorem redditum tribuunt, quam
quæ ex humidis & riguis ac frigidis. Hæc enim humidiora
sunt & leuiora ac frigidiora. Non igitur ipsius cibi & potus,
& animalium ipsorum vim nosse oportet, sed etiam patris vn-
de sunt. Quum igitur forte alimentum corpori offerre vo-
les, & ex iisdem cibis, his quæ ex inaquosis locis veniunt uten-
dum est, & cibis, & potibus, & animalibus. Vbi vero leuiore
& humidior, his quæ ex riguis veniunt vteris. Dulcia & P
acria, & salsa, & amara, & austera, & carnosa calfacere solent.
Item quæ sicca sunt, & quæ humida. Quæcunque igitur de
sicca parte plus in se habent, ea siccant & calfaciunt. Quæ ve-
rò humida partis plus habent, ea omnia calfacientia hume-
ctant, & aluum magis mouent quam sicca. Nam ubi alimentum
amplius corpori præbuerunt, reuulsionem in ventre faciunt,
& humectantia aluo secedunt. Quæ autem ex calfacientia
siccant, tum edulia, tum pocula, neq; saliuam, neque vrinam,
neq; secessum facientia, corpus siccant, idque ob hanc caus-
sam. Corpus calfactum humore vacuatur, & pars eius ab ipsis
cibis, pars in alimentum caloris ipsius animæ consumitur. Pars
etiam calfacta & attenuata per ipsum corpus expellitur. Dul-
cia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole mul-
tuma

A tùm diffunduntur. Calfacta autem & diffusa, caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. At verò acida, & acria, & austerà, & acerbà, & ex toto collata, & sicca, nō replent: propterea quod oscula venarum aperiunt & expurgant, & partim siccantia, partim mordentia ac adstringētia, humiditatē carnis horrere ac confidere & in modicam molem contrahi faciunt, atque ita vacuum multum in corpore fit. Quum igitur voles à modicis implere, aut à pluribus euacuare, talibus vtaris. Recentia omnia maiorem quàm alia fortitudinem habent, propterea quod propinquiora viuo sunt. Verum antiqua & marcida, magis quàm recentia aliu mouent, quia propiora putredini sunt. At verò cruda alunt &

*Qui pauca
faciens.*

B ructus cient, propterea quod quæ ignem coquere oportebat, ea venter transigit, debiliior quàm ingesta sunt existens. Ceterum obsonia ex varijs intritis præparata, æstuosa & humida sunt: propterea quod pinguis, & tōsta, & calida, & inæquales inter se vires habentia, in eodem coherant. Verum quæ in muria præparantur, meliora sunt, & non æstuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat & frigefacit, exhibet enim corpori humiditatem. Salsum autem balneum calfacit ac siccit. Quum enim natura calidum sit, trahit à corpore humiditatem. Calida autem balnea ieiunum attenuant ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatem de corpore auferunt, euacuata autem de carne humiditate, corpus perfrigeratur. à cibo accepto eadem calfaciunt, ac humectant, ea quæ supereminet in corpore diffundentia in maiorem molem. Balnea autem frigida vice versa, vacuo quidem corpore præbent quandam caliditatem. Vbi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahunt, & frigidum existens siccitate replent. Non lauari siccit quum humiditas consumatur. Similiter etiam vnctionis neglectus.

*Obsonia ex
intritis non
recondita.
Balnea.*

*Balnea ca-
lida.*

Frigida.

C vnctio verò calfacit, humectat, ac mollit. Sol & ignis siccant, propterea quod quum calida sint & sicca, humiditatem ex corpore trahunt. Vmbra & frigus moderatè humectat, dant enim magis quàm accipiunt. Sudores omnes abeuntes siccant & attenuat, humore ex corpore deficiente. Colus attenuat, humectat & calfacit, Calfacit quidem propter laborem & excretionem frigiditatis. Attenuat autem propter euacuationem: humectat, propter colliquationis reli-

Vnctio.

Sol, ignis

Vmbra.

Sudores.

Colus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

- Vomit.** quia in corpore præ labore. Vomitus attenuant propter D
cibi euacuationem, non tamen siccant, si quis postridie re-
ctè curet, sed humectant, propter repletionem & colliqua-
tionem carnis præ labore. Si verò quis sinat hæc postridie
consumi in alimentum caliditati, & diutius sensim adhibeat,
Vomit
uentrem mo-
uet, & mo-
ratur. siccant. Ventrem autem compactum vomitus soluit, & e-
gerentem magis quam oportet, sistit, illum quidem hume-
ctans, hunc verò siccans. Quum igitur aluum quis sistere
volet, auidè deuoratum cibum euomere oportet, priusquam
humescat & infra detrahatur, & magis acerbis & austeris e-
dulijis uti. Vbi verò soluere aluum quis velit, plurimo tem-
pore cibis immorari cōfert, & acribus, ac salis, & pinguibus
ac dulcibus, tum cibis, tum porcionibus uti. Somni ieiun- E
Somnus. num attenuant & frigefaciunt, si non longi fuerint, præsen-
tem humiditatem euacuantes. Qui verò magis calefaciunt,
colliquant carnem, & corpus diffundentes exoluunt, ac de-
biles faciunt, à cibo verò sumpto calfacientes humectant, ali-
mentum in corpus diffundentes, à matutinis autem deambu-
Vigilia. lationibus somnus maximè siccatur. Vigilia in exfatiatis ci-
bo noxia est, non permittens cibum liquari ac concoqui. Ie-
Segnicies. iunos autem attenuat quidem, verum minus lædit. Segni-
cies ac ocium humectat, & corpus debile facit. Anima enim
quiescens humiditatem ex corpore non consumit. Labor
Labor. siccatur, & corpus robustum facit. Semel in die cibum cape-
modestia. re attenuat, & siccatur, & aluum sistit, propterea quòd per ani-
mæ caliditatem humiditas ex ventre & carne consumitur. F
Prandium. Prandium contraria facit. Aquæ potus calidus attenuat,
potus aquæ similiter & frigidus. At verò & spiritus, & cibus, & potus, hu-
miditatem in corpore congelant, si excellenter frigida fue-
rint, & per cogelationem ac frigiditatem aluos sistunt. Nam
Quæ refri- animæ humiditatem superant. Rursus autem etiam cali-
gerent. ditatis excessus eandem congelant, in tantum ut diffundi ne-
queat. Quæcunque verò calfacientia corpus, & alimentum
non præbentia, carnem humiditate euacuant etiam exces-
sum non facientia, ea frigiditatem homini exhibent. Nam
præsentem humiditatem mota, flatu ab ipsa repletur ac perfri-
Labores. geratur. Cæterum quam vim labores habeant nunc expo-
nam. Sunt enim alij naturales, alij violenti. Naturales igitur
sunt. Visus labor auditus, vocis, curarum. Visus quidem igitur
talis

A talis vis est. Anima in id quod videtur intenta, mouetur & calefcit. Calfacta verò, euacuata humiditate ficcat. Per auditum verò allabente sono, anima concutitur & laborat, laborans autem calefcit & ficcat. Quæcunque fiunt hominibus in cura, anima etiam ab his calefcit ac ficcat, & humiditatem consumens laborat, & carnes attenuat, & hominē euacuat. Quicunque labores vocis fiunt, velut fermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam mouent, Mota autem ficcat & calefcit, & humiditatem in corpore consumit. At verò deambulationes etiam ipse maximè præ reliquis naturales fiunt, Habent autem quid violentum. Vis ipsarum talis est. Deambulatio à cœna & aluum, & corpus, & ventrem ficcat, ipsumque amarum fieri nō finit, ob hanc causam. Quū mouetur homo, calefcit corpus, itemque cibi. Attrahit igitur humiditatem caro, & aluum amarum fieri non finit. Corpus quidem igitur repletur, aluus verò attenuatur. Siccat autem eadem, ob hanc causam. Quum corpus mouetur & calefcit, quod tenuissimum est alimēti consumitur, partim per insitum calorem, partim verò vna cū flatu foras excernitur, partim etiam per lotium eijcitur. Quod verò siccissimū est de cibis relinquitur. Quare vnā cum aluo etiam caro reficatur. Matutinæ deambulationes attenuant, & partes circa caput leues, & agiles, ac promptas reddunt, & aluū soluūt. Attenuant quidem, quia motum corpus calefcit, & humiditas attenuatur ac purgatur, partim per spiritū ac flatum, partim vero emungitur & excreatur: sed & aliqua pars in alimentum caliditatis animæ consumitur. Aluum autē soluunt quia quum calida sit, frigidus spiritus supérne allabente, caliditas frigiditati cedit. Leues autem partes circa caput faciūt, ob hanc causam. Quum euacuata est aluus, ex reliquo corpore & capite humiditatem in seipsam attrahit, nimirū calidā existens. Euacuato autem capite, & visus & auditus depurgantur, & homines agiles fiunt. Deambulationes autem post exercitia, corpora pura reddunt, & attenuant, non permitientes carnis colliquationem fieri præ labore, sed ipsam depurgant. Cæterum cursus longi ac curui sensim facti, calfacientes carnem, concoquere ac diffundere possunt, & vim ciborum in carne concoquunt: verum corpora tardiora ac crassiora reddunt quàm cursus circulares. Et multa comedē.

Deambulationes.

Matutina deambulationes.

Deambulationes post exercitia. Cursus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

tibus commodiores sunt, & hyeme magis quàm æstate.

*Cursus au-
stii.*

Qui verò in veste sunt, eandem vim habent, magis autem exalfaciunt, & corpora humidiora faciunt, & decoloratio-
ra: quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in
eodem spiritu exercentur. Conferunt itaque & siccis, & car-
nolis qui carnem demoliri & abolere volunt, itemque senio-
ribus, propter corporis frigiditatem.

*Cursus res-
eti.*

Cursus autem recti
reuerentes, & equestres indefiniti, carnem minus diffun-
dunt, attenuant autem magis, propterea quod externis ani-
mæ partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne reuel-
lunt, & corpus attenuant ac siccant.

*Cursus cir-
culares.*

Circulares verò cursus
carnem minimè diffundunt, attenuant autem & distendunt
carnem & ventrem maximè, propterea quod acutissimo spi-
ritu videntes, humiditatem in seipsos celerrimè trahunt. At
verò concussiones siccant quidem derepente, non sunt au-
tem idoneæ, neque commodæ: nam convulsiones inducunt:
quia exalfactum corpus, cutem quidem fortiter attenuat,
carnem verò minus coagmentat quàm cursus circulares, car-
nem autem humore euacuant. Commotiones & alleuatio-
nes carnem quidem minimè exalfaciunt, corpus autem &
animam irritant, & spiritu euacuant.

Lucta.

Lucta & fricatio,
externis corporis partibus magis laborem exhibent: calfa-
ciunt autem carnem, & corroborant ac augeri faciunt, ob
hanc causam. Quæ ex natura solida sunt, conficta consi-
dunt ac coagmentantur, quæ verò caua sunt, augescunt.
Quod itaque densum est in carne, id confictum coagmen-
tatur, caua verò augescunt, itemque venæ. Nam carnes cal-
factæ ac siccatae, alimentum in seipsas per venas trahunt, de-
inde augescunt. Volutatio in puluere consimilia luctæ ef-
ficat. Magis autem siccatur propter puluerem, & minus incar-
nat. Micatio per summas manus attenuat, & carnes sur-
sum trahit. Follis, & manuum ad rythmum motus, con-
similia faciunt. Spiritus detentio, meatus disparare, & cu-
tem attenuare, & humiditatem sub cutem extrudere potest.

ἀλινδύειν.

Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quòd
pulis quidem est frigidus, oleum autem calidum. In hyeme
igitur oleum corpus magis auget, propterea quòd frigus
prohibet à corpore quid auferre. In æstate verò caliditatis
excessum faciens, carnem liquat: quum & à tempore, & o-
leo,

ἐργοχρίειν.

Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quòd
pulis quidem est frigidus, oleum autem calidum. In hyeme
igitur oleum corpus magis auget, propterea quòd frigus
prohibet à corpore quid auferre. In æstate verò caliditatis
excessum faciens, carnem liquat: quum & à tempore, & o-
leo,

*καρπομε-
χον, & χε-
ρὸν μιν.*

*Πιπλὺς ὁ
ἐλὲν quale.*

Aleo, ac labore, corpus calefiat. At verò pulvis qui inter exercendum accedit, in æstate quidem magis augeat. Nam refrigerans corpus, in excessum cal fieri non permittit. In hyeme verò frigus & algorem inducit. Morari in pulvere post exercitia in æstate, modico tempore, confert refrigerando. Verum longior mora superrefriget, & corpora dura ac lignosa efficit. Frictio ex oleo & aqua mollit, & non vehementer exal fieri finit. Porro de lassitudinibus quæ in corpore fiunt, hoc modo res se habet. Homines in exercitati ab omni labore lassantur. Nulla enim corporis pars exercitata est ad vllum aliquem laborem. Corpora autem exercitata, ab infuetis laboribus delassantur. Aliqua verò

*Cōfricatio
olei cum de
qua.*

B etiam à consuetis exercitijs lassantur, si modum exceßerint.

Species quidem igitur lassitudinum eiusmodi sunt. Vis autem ipsarum sic habet. Etenim in exercitati humidam carnem habentes, quum laborauerint corpore calefacto multam colliquationem remittunt. Quicquid igitur exsudaue-rit, aut cum corpore depurgatum fuerit, non exhibet magis laborem in corporis parte præter consuetudinem euacuata. Quicquid verò ab excretionibus intus remanserit, non solum huic laborem exhibet, sed etiam ei parti quæ humidi- tatem suscepit. Non enim commoda est corpori, sed infesta. Et in carnes quidem corporum non similiter congregatur, Verum in carnosas partes, quare his laborem exhibet, donec exiuerit. Tanquam enim circuitum non habens, quic-

*Desiderio
quid patium
sur.*

C scens calefit tum ipsa, tum quæ allabuntur. Si igitur multum fuerit quod excretum est, etiam sanum corpus exsuperat, ut totum concalescat, & febrem fortem inducit. Calefacto enim sanguine & attracto, celerem circuitum faciunt ea quæ in corpore sunt, & tum reliquum corpus præ spiritu purgatur, tum quod compactum est calefcens attenuatur, & simul ex carne foras sub cutem extruditur, atque hoc sudor calidus vocatur. Hoc autem excreto, & sanguis in naturalem statum restituitur, & febris remittit, & lassitudo sedatur maxime tertia die. Cæterum eiusmodi lassitudinem sic curare oportet, ut fomentis & balneis calidis id quod compactum est dissoluamus, & deambulationibus vehementibus depur- gemus, & modico cibo ac attenuationibus carnis euacuationem cogamus ac coagmentemus, & oleo sensim multo

HIPPOCRATIS LIBER II.

tempore fricemus, vt ne violententer excalescat. Vnguentis etiā D
tum exudatorijs, tum mollientibus, vngere ac mollire con-
ducit. At verò exercitatis, ab insuetis laboribus propterea
lassitudo contingit. Quum corpus nō fuerit laboribus exer-
citatum, necesse est carnem humidam esse ad eum locum, ad
quem non est adfuetus se laboribus exercere, quemadmodū
etiam ad singula exercitationum genera. Carnem igitur ne
cesse est colligari, & excerni, contidereque ac contrahi, ve-
lut priori. Confert autem hoc modo curari. Exercitationi-
bus vtendum est consuetis, quo id quod compactum est cale-
scens extenuetur ac depurgetur, & reliquum corpus non hu-
meſcetur, neque inexercitātū maneat. Vtile est & hunc bal-
neis calidis vti, itemque frictione similiter vt priorem. Ve-
rū fomentis nihil habet opus. Labores enim calfacientes
sufficiētes sunt attenuare & depurgare id quod compactum
est. Lassitudo autem à consuetis exercitijs hoc modo fit.
A moderato quidem labore lassitudo non mouetur. Quum
verò maior quā oportet labor fuerit, carnem superreſiccet,
euacuata autem humore caro, caleſcit, & dolet, & horret, & ad
febrem perducitur longiorem, si non quis rectē curet. Opor-
tet autem primū quidem ipsum balneo non valde multo,
neque nimis calido lauari. deinde exhibito à balneo molli
vino, in coena offerre plurima & omnigena edulia, & potu
aquoſo, vino verò molli ac multo vti. Postea longo tempore
his immoretur, donec venæ repletæ attollantur. Deinde ve-
rò vomat, & post modicam stationem, molliter dormiat. Po-
ſtea per dies sex ſenſim ad cibos & labores conſuetos adhi-
beatur, atque ita ad conſuetum cibum ac potum perducatur.
Vim autem habet hæc curatio talem. Reſiccatum excellen-
ter corpus, humectare poteſt citra exceſſum. Si quidem igi-
tur poſſibile eſſet, laboris exceſſum noſſe, quantus is eſſet,
commodum foret ipli per moderatum cibum mederi. Nunc
verò illud impoſſibile eſt, hoc verò facile. Corpus enim re-
ſiccatum, ab ingeſtis omnigenis edulijs id quod conduci-
bile ſibi ipſi eſt, ſumit, vnaquæque pars de ſingulis cibis, reple-
tum autem & humectatum, aluo per vomitum euacuata, rur-
sus exceſſum remittit. Alius autem vacua exiſtens reuellit.
Excedentem itaque humiditate caro eructat, moderatam
verò non remittit, niſi per vim, aut labores, aut medicamen-
ta, aut

Curatio.

Medela.

*Curatio-
nis
huius.*

A ta, aut aliam quādam reuulsionē. Qui autem additionē cibi *Qui apertius*
sensum crescente vitur, is corpori diætā placide constituit. *tracabit.*

HIPPOCRATIS

COI DE DIAETA SI-

VE VICTVS RATIONE, LI-

BER TERTIVS,

B



E diætā humana exactē quid conscribere, vt ad ciborum copiam, laborum commensuratio ac symmetria fiat, non est possibile, quemadmodum etiam antea à me relatum est. Multa enim sunt impedimenta. Primū quidem hominum naturæ, diuersæ existētes. Nam & sicca ipsæ ad seipsas,

*Quid ueretur
perfectam
uictus rati-
onem.*

& ad alia collatæ magis ac minus sicca sunt & humidæ. Similiter etiam aliæ omnes. Deinde ætates non iisdem indigentes, Insuper & regionum situs, & ventorum mutationes, & temporum alterationes, & anni constitutiones. Est & inter ipsos cibos multa differentia, Triticum enim à tritico differt, & vinum à vino, & reliqua omnia ex quibus victum facimus diuersa existentia, impediunt quo minus possibile sit exactē de diætā conscribere. At enim prænotiones inuentæ sanæ à me sunt eorum quæ in corpore dominantur, siue labores cibos, siue cibi labores superent, & quomodo singulis mederi oporteat, prædiscere quæ sanas naturas, & vt non accedant morbi, nisi quis valde multum delinquat ac sæpè. hæc autem medicamentis iam opus habent. Sunt autem quæ neque per medicamenta sanari possunt. Quantum quidem igitur inueniri possibile est quæ maximè ad rem faciunt, à me inuentum est. Verum exactē à nullo. Primū igitur multis ac vulgò hominibus cōscribam, ex quibus maximè utilitatem

*Qui modus
uitæ.*

tatem

HIPPOCRATIS LIBER III.

tatem capere possint, qui sanè cibis vulgaribus vtuntur, ac la-
boribus necessarijs, profectionibusque necessarijs, ac operis
marinis ad vitam degendam repertis, quique calefunt plus
quam expedit, perfrigeranturque præter commoditatem, &
reliqua dicta inconstanti vtuntur. His itaque ex presentibus
sic victum facere conducit.

*Anni qua-
tuor par-
tes.*

Annum equidem in quatuor
partes diuidunt, quas plerique omnes nouerunt, hyemē, ver-
a, statē, autūnum. Et hyemem quidem à pleiadum occasu, vs-
que ad æquinoctium vernum. Ver autem ab Aequinoctio vs-
que ad pleiadum exortum. Aestatem verò à pleiadum ortu
vsque ad Arcturi exortum. Autūnum ab arcturi ortu, vsque
ad pleiadum occasum. In hyeme quidem igitur tempori
frigido & compacto se opponendo, hoc victu vti conducit.

*Victus hy-
bernus.*

Primum quidem semel tantum in die cibum capere conue-
nit, nisi quis valde siccum ventrem habeat. Id verò si fieri nō
possit, modicum prandere. Victu autem vtendum est siccō &
austero, & calfactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane au-
tem magis vti expedit, & obsonijs assatis potius quam coctis
Et potionibus nigris meracioribus ac paucioribus. Oleribus
minimum, præterquam calefacientibus & siccis. Succis item
ac sorbitionibus minimè vtendum est. Laboribus autē multis
omnibus, cursibusque curuis sensim crescente accessione, &
iusta in oleo longa, à leuibus ordiendo ac sensim addendo.
Et deambulationibus ab exercitijs, acutis ac celeribus. à co-
na vero, tardis in tepore. Matutinis autem multis, leni initio
facto, ac sensim crescente accessione, ita vt placide rursus de-
sinas. Vtendum est & strato duriore, & nocturnis itineri-
bus, & funambulationibus, ac cursibus per funem vti cōfert.

*Vomitio-
nis
modus.*

Omnia enim hæc attenuant ac calfaciunt. Vtendum etiam
nauigatione. Vbi autem quis lauare velit, si quidem in pal-
stra se exercuerit, frigida lauetur. Si vero alio quopiam ex-
ercitio vsus fuerit, calida commodior existit. Vtendum & vo-
mitibus, si humidiores sint ter in mēse, sin sicciores, bis à ci-
bis omnis generis, à vomitibus sensim perueniendum est ad
consuetum cibum per dies tres, eoque tempore laboribus le-
uioribus ac paucioribus vtendum. à bubulis autem & porci-
nis carnibus, aut alijs, quicquid tandem modum excesserit,
repletus vomat: & à caseosis & dulcibus ac pinguibus, eum
qui non est adfectus repleti, vomere conducit: & ab ebrie-

tate,

- A** tate, ac ciborū mutatione, & regionum alteratione vomen-
dum est. Oportet autem frigori seipsum purum exhibere,
præterquàm à cibis ac exercitijs. Sed & in matutinis deam-
bulationibus vbi corpus calefieri cœperit, itemque in cursi-
bus etiam in alio tempore, excessum vitare oportet. Melius
est enim corpori hyemem ferre, quàm exerceri hoc tempo-
re. Nam neq; arbores quæ hyemē non pertulerunt hoc tempo-
re, fructum ferre possunt, neque ipsæ sanæ esse. Utendum
est & laboribus hoc tempore multis vsque ad excessum, nisi
lassitudines succedant. Signum autē docebo idiotas, osten-
damque quapropter hæc ita se habent. Tempore existente
frigido ac compacto, consimilia patiuntur etiam animalia
- B** ipsa. Necesse igitur est corpora tardè calefieri à labore, &
modicam quandam humiditatis præsentis partem excerne-
re. Deinde modicum tempus concessum est quo laborent,
multum autem quo quiescant. Dies enim brevis est, nox ve-
rò longa, propterea igitur neque tempus, neque labor exces-
sum habet. Ob hanc itaque causam hoc tempore sic dietam
institui oportet, à pleiadum occasu, vsq; ad solstitium hy-
bernū diebus quadraginta quatuor. Circa solstitium au-
tem maxime in custodia ac tutela esse, & à solstitio alios to-
tidem dies eadem dieta vti. Postquàm autem tempus ad-
duxerit fauonium, & mollius factum fuerit, oportet etiam
cū tempore dietam sequi, diebus quindecim, quum arctur-
us oritur & hirundo volat. Sequens verò tempus magis va-
rie transigere oportet vsque ad æquinoctium diebus trigin-
ta duobus. Oportet igitur etiam dieta vti hoc tempore va-
riegatiore, mollioreque ac leuiore, & cibo, & potu, & labore,
atque ita sensim ad ver perducere. Quum autem æquino-
ctium iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes
breuiiores, & tempus calidum ac siccum constiterit, etiā præ-
sens victus probe nutriendi ac meracius sit. Quemadmodum
igitur arbores rationem non habentes, hoc tempore præpa-
rant sibi ad æstatis commoditatem, tum incrementum, tum
vmbra: Sic oportet hominem, quum sanè mente ac ratio-
ne præditus sit, carnis incrementum salubre sibi præparare.
Oportet igitur ut ne derепente dieta transmutetur, tempus
in sex partes diuidere, per octo dies. In prima itaque parte,
& labore detrahenda oportet, & reliquis quoq; velocioribus

*Plus ocij
qudm labor
ris hyeme
datur.*

*Vergiliæ
occasus
Solstitij.*

*Fauonium.
Arcturi
ortus.*

Hirunda.

*Æquino-
ctium.*

*Homines
arbores imi-
tentur.*

*Diuisio sex
partes in
sex partes.*

vbi.

vti. Cibus autem mollioribus, & potibus aquosioribus ac al. D
brioribus, & lucta cum oleo in sole vtendū est. In singulis autem temporibus singulas dietas paulatim trāsinutare oportet, & deambulationes detrahēre à cœna plures, matutinas pauciores; & mazam pro pane offerre, & olera cocta exhibere, & obsonia cocta assatis adæquare, & balneis vti, & parum prandere, & re venerea pauca vti, & vomitibus primum quidem quarto quoq; die, deinde per longius tēpus, quo & corpus pura carne incarnatū constituas, & dietam in hoc tempore mollem, vsque ad pleiadum exortum. Et in hoc iam æstas adest, & ad hanc nunc dietam instituere oportet.

*Victus
æstatis.*

Quum itaq; pleias exorta fuerit, cibus mollioribus ac paucioribus vti oportet. Deinde maza magis quā pane, atque E
ea prius subacta, & vino dulci non emollica, potibus autem mollioribus albis aquosis, prandio modico, & somnis à prandio breuibus, & repletionibus ex cibis ac potibus quā minimis. Potu inter edendum vtendum est sufficere, per diem verò minimè bibendū, nisi necessaria aliqua siccitate corpus vtatur. Vtendum est & oleribus coctis, exceptis æstiuosis ac siccis. Vtendum etiam crudis, exceptis calfacientibus ac siccis. Vomitus nisi si qua repletio contingat, vtendum non est. Re autem venerea minimè. Balneis autem tepidis vti licet. At verò poma fortiora sunt quā pro humana natura. Melius est igitur à pomis abstinere. Si verò quis cum cibis

Poma.

Per æstatem exercitatio.

vtatur, minimè deliquerit. Laboribus quoque ac cursibus circularibus exerceri oportet, & cursibus rectis reuertentibus modicis multo tēpore, & deambulationibus in vmbra, lucta autē in puluere, quo quā minimè excalescat. Verūm volutationes in puluere meliores sunt quā cursus circulares. Frigefaciunt enim corpus humore euacuantes, à cœna deambulandum non est, sed saltē surgendum. Manē verò deambulationibus vtendum. Soles vitandi sunt, itemq; frigora, tum manē, tum vespere, quæ flumina, aut stagna, aut nives exhalant. Hanc autem dietam tolerare oportet vsq; ad solstitium æstiuū, quo in hoc tempore adimas omnia quæ sicca sunt & calida & nigra ac meraca, itemq; panes; præterquam si parū quid voluptatis gratia concedere velis. Sequenti verò tempore vtetur mollioribus & humidis & perfrigerantibus ac albis, vsq; ad arcturi exortum ac æquinoctiū per dies

nonag

A nonaginta tres. Carterum ab æquinoctio sic dietam instituere oportet, per autumnum ad hyemem adducendo, ita ut mutationes frigorum ac teporis vites vestitu crasso. Utendū autem hoc tempore motu in veste, frictioneque ac lucta in oleo, ita ut sensim accessio crescat. Deambulationes quoque in tepore faciendæ sunt, & calidis lauacris utendum, & somni diurni detrahēdi. Cibis autem utendum est calidioribus, ac minus humidis, & puris, & potibus nigrioribus, verum mollioribus & nō aquosis. Oleribus verò minus. Reliquā item dietam omnem sic cōsonam adhibere oportet, ut ab æstiuus detrahas, hybernis autem utari nō ad summum, quo hybernū victum quā proxime cōstituas, in diebus duodequingua-
B quaginta, vsque ad pleiadum occasum, ab æquinoctio. Hæc porro multitudinis commonendæ gratia ac vulgi hominū causa prodo, qui ex necessitate vitam temerè transigunt, neque licet ipsis aliorum negligentes esse, ac suam ipsorum sanitatem curare. Quibus verò iam hoc certum ac percognitū est, quoddam neque diuitiarum, neque corporis, neque vllius alterius rei vlla utilitas est, citra sanitatem, ad hos inuenta est à me dieta, quantum possibile est, ad veritatem ac certitudinem possibilium rerum adducta. Hanc itaque in sermonis progressu declarabo. Inuentum autem hoc honestū quidem mihi repertori, vtile verò discipulis, nullus adhuc priorum ne attentauit quidem cōponere, quod ad omnia alia magni æstimandum duco. Est autem præcognitio antequam ægrotent cognitio, quid corpora perpetiantur, vtrum cibis superat labores, aut labores cibos, aut moderatè inter se habeant. Vtrum enim tandem superetur, morbi fiunt, ab æqualitate autem inter ipsa mutua, sanitas adest. Ad hæc sanè commemoranda accingor, & demonstrabo qualia fiunt hominibus qui sani sibi esse videntur, & iucundè comedunt, laboresque possunt, & corporis ac caloris satis habent. Nares citra causam apertam à cœna implentur, & repletæ esse videntur, emungunt autem nihil. Vbi autè deambulare mane incipiunt ac exerceri, tūc emungunt ac spuunt, & progressu temporis etiam palpebras graues habent, & pruritus frontē occupat, & à cibis abstinent, & bibere minus possunt, & color fit decolor, & aut destillationes mouentur aut febres horridæ, luxta quodcunque tempus repletio fuerit mora. Quicquid

*Victus aut
tumi.*

*Sine sanita
te nihil iu
uat.*

*Quæ inueni
nerit Hip. præcognitio
diagnos.*

*Quid præ
cognitio
cognitio.*

*abundanti
ris nutritio
ti notat*

quid autem eo tempore fecerit, in idipsum culpam ac causam reijcit, quum id ipsum causa non sit. Huic enim cibi superant labores, & repletio paulatim collecta in morbum ipsum adduxit. Sed nō huc vsque differre oportet, verūm ubi prima signa cognouerit, scire quod cibi labores superant, & paulatim collecta repletio existit. Mucus enim & saliuā repletionis indices sunt ac signa. & quiescente quidem corpore, meatus spiritus obturant, multa repletionē existente, ubi verō calefactū est prae labore, attenuata excernuntur. Talem autem sic curare oportet. Exercitātū in consuetis exercitijs citra lassitudinem, calidāq; lotum, cibis omnigenis expleto, ac vomere facito, à vomitu verō os & fauces colluat vino austero, quo oscula venarum cōstringantur, & nihil attrahāt, velut à vomitu fieri solet. deinde surgens modicē deambulet in tepore. Postridie verō deambulationibus quidem vtendum est, exercitijs autē paucioribus & leuioribus quā prius, & si aestas fuerit, impransus degat, sin minus, parum comedat, & de cœna quam sumere solebat, dimidium detrahat. Tertia autem die labores quidem obeat omnes consuetos ac deambulationes, verūm cibos sensim ingerat, quo quinta die à vomitu consuetum cibum assumat. Et si quidem ab hoc satis bene habuerit, de cætero cibis quidem paucioribus, laboribus autem pluribus curetur. Si verō signa repletionis nō quieuerint, interpositis duobus diebus ab ea qua consuetos cibos assumpsit, rursus vomat, & eodem modo sensim ad consuetos cibos redeat. Quod si non successerit, etiam tertium eadem repetere, donec à repletionē liberetur. Sunt autem homines qui ubi labores superantur à cibis, talia patiuntur. Incipiente quidem repletionē somni longi & dulces ipsis contingunt, & interdū etiam dormiunt. Somnus autē cōtingit carni, & sanguis funditur, & spiritus diffusus tranquillus est. Quis verō nō suscipiat amplius corpus repletionem, secretionem iam remittit intro, prae circuitus violentia, quæ sanē secretio contraria alimento à cibis, animam perturbat. Quo tempore non amplius iucundi ipsis sunt somni, sed necesse est hominē perturbari, & videtur sibi cum aliquo pugnam committere. Qualiacunque enim paritur corpus, talia videt anima, visu iam concluso. Quum igitur ad hoc peruenerit homo, prope iam est ut aegrotet. Quod autem

Plenitudinis signa.

Medela,

Diurna
dormitio
bona nō est.
Mortuorum
alia causa.

- A** autem veniet morbus, valde manifestū est, Qualis enim secretio venerit, & quancūq; partem superauerit, eam insam morbo affligit. Verū non oportet ita desipientem esse & & hucusque differre, sed statim vbi prima signa cognouit, curam contingere, & hunc velut priorē curare longiori autem tempore, ac fame opus habet. Sunt præterea etiam talia repletionis signa. Dolet corpus aliquibus totū, aliquibus pars quædam, quæcūq; talem. Dolor autem est velut lassitudo, & delassati esse sibi videntur, segnicieq; ac repletionē curatur donec ad febrem perueniant, & adhuc nondum hoc cognoscunt, sed balneis ac cibis vtentes, ad pulmonis inflammationem, peripneumoniam Græcis dictam, morbum deducunt, & ad extremum periculum deueniunt. Verū oportet providere antequā ad morbos perueniant, & hoc modo curare, vt maximē mollibus fomentis hominē foueamus, aut si id fieri nequeat, multa calida lauamus, ac corpus dissoluamus, & à multis ingestis cibis, primū quidē acerbis ac plurimis, deinde salis, probē vomere faciamus, quo facto exurgat ac modico tēpore deambulet in tepore, deinde dormiat. Ma ne verō deambulationibus sensim crescētibus vtendū est, & exercitijs leuibus, & ciborū exhibitionibus sensim crescētibus, velut prius. Attenuatiōe aut plurima opus habet, itemq; deambulationibus. Si verō prouidētia non adhibita ad febrem peruenerit, nihil aliud offerre oportet præter aquā per dies tres. Siquidē igitur ex hac sedetur, bene est: sin minus, pituitiæ succo curandus est, & aut quarta aut septima die decedet febris, si exsudabit. Bonum autem est & vnguentis exsudatorijs vti, sub indicationes, exsudare enim cogunt. Quidam verō etiā talia à repletionē perpetiuntur. Caput ipsis dolet ac grauatur, & palpebræ ipsis à cœna cœcidunt, & in somnis turbantur, & calor inesse ipsis videtur, & alius aliquādo sistitur. Et talis vbi venere vtitur, leuior statim esse sibi videtur: postea verō magis grauatur. His caput repletionem reuellens, & alium sistit, & ipsum grauatur. Periculum autem subest, vt quod erumpat ipsa repletio id ipsum corrumpat. Verū providere hoc modo oportet. Si curam celerem facere velit, veratro purgandus est, deinde exhibendi cibi leues ac molles ad dies decem, atque hi alium mouentes, quo venter inferior superet, & de capite reuellere valeat.

*Repletio-
nis signa.*

Curatio.

*Morbus
vni plenis
chm*

Curatio.

Vtendum & cursib. tardis ac matutinis, & deambulationib. **D**
 multis. Item lucta in oleo, & prandio, & somno à pradio nō
 longor: cœna verò exurgere satis est, & partim balneis, par-
 tim vnctione vtendum, balneis verò repidis, à venere autem
 abstinendum. Hæc quidem velocior cura est. Si verò medi-
 camentum bibere nolit, multa calida lotus, à cibis dulcib. ac
 salis vomat, à vomitu verò satis est vt exurgat: mane autem
 deambulationib. adhibendus est, & exercitijs præscriptis ad
 dies sex, die septima repletionem corporis facta à similibus ci-
 bis vomitum faciat, & eodem modo cibi rursus sensim adij-
 ciendo exhibeantur, atq; his hoc modo ad quatuor hebdo-
 madas vtatur. In tanto enim tempore maximè sedatur. De-
 inde cibi exhibēdi quo corpus reficiatur, & diæta paulatim
 ad consuetum morem redigenda est. **E** Fiunt etiam talia à
 repletionem. Quibusdam venter quidem concoquit cibum,
 carnes autem non suscipiunt. Alimentum autem intus ma-
 nens flatum inducit. Vbi verò pransi fuerint, sedatur. Nam à
 fortiore id quod leuius est expellitur, & videntur sibi libera-
 ti esse. Verum malum multo maius postridie accedit. Quum
 autem quotidie augescens fortius inualuerit, id quod prius
 inest superingesta superat, & calfacit ac perturbat corpus, &
 profluuiū ventris facit. Sic enim nominatur quandiu ipsū
 solum alimentū putrefactū secedit. Vbi autē corpore calefa-
 cto purgatio atris fiat, tunc & intestinū raditur ac exulcera-
 tur, & sanguinolenta egeruntur. hoc autem dysenteria, à ma-
 la intestinorum affectione appellatur, morbus grauis & pe-
 riculosus. Sed providere oportet, & prandium detrahere, &
 cœnæ tertiam partē. Cursibus autē pluribus, & luctis ac de-
 ambulationibus vti, tum ab exercitijs, tum mane. Quū verò
 dies decem præterierint, dimidiū cibi detracti apponere, ac
 vomitu vti, atq; sic ad dies quatuor cibum exhibere: vbi autē
 alij decem dies præterierint, etiā reliquum cibum apponere,
 ac vomitum facere, atq; sic ad consuetū cibum reducēs, & ta-
 lem laborib. confidenter premens ac vigēs, in hoc tēpore sa-
 num facies. Fit etiam talis repletio. Postridie cibum eru-
 ctant erudum, citra ructum acidum. Alius autem egerit,
 pauciora quidem quā pro ratione ciborum: attamē multū.
 Dolor verò nullus intus est. His ventriculus frigidus exi-
 stens, cibos in nocte concoquere non potest. Quum igitur
 motus

Cum potio
res nō ad-
mittit.

Plenitatis
variā mala

Dysenteria

Curatio.

no præterierint
dysenteria sed
cum quā ob
repletionem facta
ut huiusmodi
ratio per post-
ea. Plenitatis
alia.

- A** motus fuerit , cibum crudum eructat. Oportet itaque huic præparare ventriculi caliditatem, tum ex victu, tum ex labo *Medela per nutritum.*
- Primùm quidem igitur utendum est pane ex tota farina collata, fermentato, diffracto in vinum nigrum, aut in iusculum suillæ carnis piscibus verò coctis in muria acri. Utendū etiam carnis, velut extremitatibus, creoctis, & suillis carnis coctis pluribus, & porcinis non multis, & catulorum, ac hœdorum. Ex oleribus verò porro & allio cocto ac crudo, blitoque cocto & cucurbita. Potionibus verò meracioribus, somnifq; longis citra prandiū prima die, itemq; somnis ab exercitijs, curibus autē curis sensim accessione augescēte, iustaq; molli in oleo, balneisq; modicis. Est & ficus cum cibus bona, & meracū vinum ab ipsa. Ex hac autem curatione alij citius, alij tardius repletio sedatur. Alij porrò quidam talia patiuntur. Faciem decolorem habent, & ubi comederrint, paulò post eructant acida, & acor in nares proserpit.

*Quibus si-
cus post ci-
bum proffit.
Plenius
alius mor-
bus.*

- His corpora pura non sunt, & plus est quòd de carne colligatur præ labore, quàm quòd depurgatur præ circuitu. Et hoc sanè intus manens alimento contrarium est, ipsumque violat ac acidum facit. Alimento quidem igitur eructatur, illud ipsum verò sub cutem expellitur, & hominem decolorem facit, & morbos similes aquæ inter cutem parit. Verùm providere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est poro veratro, exhibere cibos quemadmodum à me scriptum est. Verùm tutior à diætâ, hoc modo. Primùm quidem calida lotus vomitum faciat, deinde septem à vomitu diebus cibum consuetum capiat, decima autem à vomitu die rursus vomat, & similiter cibum assumat, & tertium similiter faciat. Et curibus quidem circularibus paucis ac velocibus vtatur, & motibus, ac frictione, & mora longa in gymnasio ac exercitio. Vtatur & volutatione in pulvere, & deambulationibus multis ab exercitijs, sed & à cœna. Plurimis autē marutinis in pulvere vtatur. Quum autē lauari vult, calida lauetur, & eo tempore impransus degat. Et si quidē vno mense restituitur, de cætero convenientibus curetur. Si verò quid reliquum fuerit, medela vtatur. Sunt autem quidam quibus post diē rursus acidi fiunt. His in noctē secretio præ repletionē fit. Quum igitur motus fuerit corpus ex somno deauiore spiritu vsum, calidum ac acidum vñ cum spiritu

*Medela
quis.*

HIPPOCRATIS LIB. III.

foras expellit, & ex hoc morbi fiunt, nisi quis prouidentia D
 utatur. Conducit autem etiam his facere velut priori. Verum
 laboribus pluribus hos uti oportet. Quibusdam etiam ta-
 lia fiunt. In corporibus densa carne præditis, quum cibi, con-
 calescunt ac diffunduntur, & à primò somno, & præ cibis
 carne calefcente, secretio per somnum fit à carne multa hu-
 miditatis. Deinde caro densa existens alimentum non su-
 scipit, Id verò quod à carne secretum est alimento contra-
 rium ac foras protrusum, hominem suffocat ac calfacit, do-
 nec euomuerit. Postquàm autem leuior factus est, dolor
 nullus in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Pro-
 gressu verò temporis, & dolores, & morbi fiunt. His con-
 similia patiuntur etiam qui inexercitati derepentè labora- E
 uorunt, & colliquationem carnis violentam ac multam fecerunt.
 Hos autem sic curare oportet. De cibo detrahenda
 est tertia pars. Utendum autem cibis acris, & siccis, & au-
 steris, ac odoratis, & vrinam cientibus. Cursibus verò pluri-
 mis curuis in vestitu, rectis autem reuertentibus & circula-
 ribus, exutis vestibus, frictione & lucta modica. Micatio per
 summas manus commodior est quàm follis. Utendum & de-
 ambulationibus ab exercitijs multis, itemquè matutinis. A
 cœna verò etiam vocis exercitatio valde comoda est, hu-
 miditatis enim euacuationē faciens rarefacit carnem. Con-
 ducit & impransum degere. His autem cibis utendum est per
 dies decem, deinde dimidium ablatis apponendum est ad dies
 sex, & vomitus faciendus, ab vnoquoque verò vomitu, ad dies F
 quatuor sensim adijciendo exhibendus est cibus. Quum au-
 tem dies decem à vomitu transierint, omnē detractū cibum
 assumat, laboribusque ac deambulationibus deditus sit, & sa-
 nus euadet. Talis autē natura copiosiore labore quàm cibo
 opus habet. Quidam etiam talia perpetiuntur. Secedit ipsis
 cibus per alium liquidus inconcoctus, velut ex intestinorum
 leuitate, & dolorem nullum exhibet, patiuntur autem hoc
 ventres maxime qui humidi ac frigidi sunt: & propter fri-
 giditatem quidem non concoquunt, propter humiditatem
 verò secessus fit. Corpus igitur contabescit, alimentum con-
 ueniens ac debitum non accipiens, Ventresque corrum-
 puntur, & in morbos incidunt, verum prouidere oportet.
 Confert huic de cibis tertiam partem auferre. Sint autem
 cibi,

*Carnosa
corpora
quæ patian-
tur.*

*Desiderio-
rum mor-
bus.*

*Curatio.
Quæ exer-
citationes.*

*Vocis exer-
citatio.*

*Morbus
alius.*

Curatio.

- A** cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, clibano cocti, aut subcinericij calidi, in vinū austerum tincti, & piscium partes ex dorso ac cauda. Verū capitales & sub ventre sinenda sunt velut humidiores. & coctos quidē pisces in muria edere oportet, assatos autem in aceto. Utendū etiam carnibus sale & aceto inueteratis, & caninis assatis, & de palumbæ ac reliquis eiusmodi volucribus, assatis ac coctis. Oleribus verò minimē. Vīno vtendum est nigro, & deambulationibus à cœna ac matutinis, à deambulatione autē dormiat. Cursibus verò curuis sensim accessione augescēte vtatur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in puluere, quo caro contalescens resicceat, & humiditatem ex ventre reuellat. Vngi autem magis conducit quā lauari, impransus verò degat. Quum autem dies septem transferint, dimidium cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibeatur, & vomat. Post alios verò septem dies, omnem cibum assumat, & vomitu rursus facto, cibis eodem modo exhibeatur. Qui *Morbus alius.* *Curatio.* *Qui cibis & exercitio.* *Morbus alius.*
- B**uldam verò alijs talia sunt. Secessus non putrefactus per aluum abit, & corpus contabescit cibis non fruens, hi verò progressu temporis in morbos incidunt. His ventres frigidi ac sicci sunt. Quum itaque neque conuenientibus cibis, neque exercitijs vtuntur, talia perpetiuntur. Conducit autē sic affecto, panibus puris furnaceis vti, & piscibus coctis cū intritis, & carnibus coctis suillis, & extremitatibus percoctis, & plurimis assatis, & ex acribus ac salis his quæ humescant, & *Curatio.*
- C**alsuginosis. Vinis autem nigris mollibus, & inter cibos vuis ac sicibus impleri confert. Oportet & modicum prandere, & exercitationibus pluribus vti, cursibusq; curuis sensim crescentibus, postremū autē cursibus circularibus, & post cursum lucta cū oleo deambulationibus verò nō multis ab exercitijs, à cœna verò satis est exurgere. Matutinis autē pluribus deambulationibus vtatur. Lauetur calida, & vtatur laboribus, ac vntionibus somnoq; longiori indulgeat, & molliter cubet. Oportet & venere aliquo modo vti. Verū de cibis quarta pars detrahenda est, & post dies decem rursus ad cōsuetos cibos reducendus est. Sunt etiam quibus secessus liquidus ac putrefactus per aluum abit, & qui aliās sani sunt ac exercentur, nullum dolorē res exhibet. Quibusdā verò excluduntur ea quæ cōueniebant, progressuq; temporis venter per ca.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Medela.

Cibus qui.

*Beta refri-
gerat.*

*Quæ exerci-
tatio.*

*Vomitus.
Semel come-
derit his con-
fite.*

*Morbus
alius qui
stercoris vo-
mitū facit.*

lilitatem carnes attrahit, & dolorem exhibet, & cibi exclu-
duntur, & venter exulceratur, & ipsum listere iam operosum
ac difficile est. Verum prius providere oportet, ac nosse ven-
trem calidum ac humidum magis quam debet esse, labo-
rumq; incōmodum excessum factum esse. Per diartam igitur
frigefacere ac ticcare oportet, & primum quidem exerci-
tia ex dimidia parte detrahare, & de cibis tertiam partem.
Utatur autem Maza antea subacta, ac vino dulci emollita, &
piscibus siccissimis coctis, & neque pinguibus neq; salis. Vta-
tur & carnibus assatis voluerium, coctis quidem, palumbis
ac columba, assatis autem perdicum & gallorum, citra con-
dimenta. Leporinis vero coctis in aqua, itemque ferinis
omnibus. Ex oleribus autē quæ frigefactoria sunt, velut beta
cocta acida. Vino verò nigro austero. Gymnastis autem, cur-
sibus circularibus velocibus, verum frictio non multa ad-
hibeatur, sed modica, neque lucta. Micatio per summas
manus, & manuum ad rythmū morus, & follis, & Volutatio
in pulvere, commoda sunt, sed non multa. Deambulationi-
bus ab exercitijs utatur sufficiens iuxta laborem, & à cœ-
na pluribus, iuxta cibum, & mane moderatē, iuxta habitum.
Laues autem tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac diarta trans-
egit dies decem, apponatur cibi dimidium, & laborum ter-
tia pars, & vomitum faciat à cibis siccis & acerbis, & in cibo
ne moretur, sed quā celerrimē vomat: à vomitu ad dies
quatuor & cibus, & labor partitus exhibeatur. Vbi autē dies
decem præterierint, reliquum cibi apponatur, & vinum po-
tabile, verum labores pauciores, & ubi vomitum fecit, cibus
velut scriptum est exhibeatur. Hec verò tempore semel
tantum in die cibum capere cōducit, donec malum sedetur.

Alijs porro quibusdam siccus & perustus sece. Tus fit, & os
siccum, & progressu temporis etiam amarum fit, & alvus si-
stitur, itemque vrina. Quum enim non habeat intestinū hu-
miditatem circa excrementum, intumescens transitus obtu-
rat, & dolorem exhibet, & calor occupat, & quicquid biberit
aut ederit homo, id ipsum reuomit. Postremum verò etiam
stercus vomit, atque hic nō superuinet, quum ad hoc perue-
nerit. Verum providere oportet ac nosse, quod caliditas &
siccitas in homine prædominantur. Victum igitur ipsi con-
stituere oportet ex maza prius subacta respersa, & pane

ex

A ex tritico trimestri, succo fursurum fermentato. Oleribusq; vtendum, exceptis acribus & siccis, atque illis coctis, & piscibus leuissimis coctis, & partibus capitalibus tum piscium, tum locustarum, & mitilis, & herinaceis, & cancris, & conchyliorum succis, ipsisq; liquidissimis. Carnibus autē suillis & ex- *Qui nutritio*
 tremitatibus anterioribus coctis, & hœdorum & agnorum ac *caus.*
 catulorum coctis. Piscium verò fluuiatilium ac in stagnis degentium coctis. Vino molli aquoso. Laboribus autem vtendū est non multis, neq; velocibus, sed omnibus quietis, Deambulationib; verò mane vtatur, iuxta habitū sufficiētibus, & ab exercitij laboribus, moderatis. à cœna verò ne deambulet.

B Balneis vtatur & somnis mollibus, & prandio, & somno à prandio non longo. Pomis etiam humectantibus vnā cum cibus vtatur, & cicere viridi, ac sicco in aqua macerato. De laboribus verò prioribus dimidium detrahat etiam hic à principio, & vomitū faciat à dulcib; & pinguib; ac salis, hisq; plurimis: moretur autem plurimū tempus in cibis vsque ad vomitum. Deinde cibū exhibeat ad triduum, & nō maneat impransus. Quum verò dies decem præterierint labores sensim adiiciendo augeat. & si quidē repletio inierit à cibo, aut ventris vitio, vomat: nō minus, sic reliquo tempore curetur. *Morbus ac*

Fiūt insuper etiā talia. Horrores à deambulationibus matutinis accedunt, & caput grauiatur. Huic plures fiunt deambulationes quā modus requirit. Corpus enim & caput humore euacuātū horret ac grauiatur. *lius.*

C ris ad febrē perueniunt horrores. Sed non hucusque differre oportet, verū prius curare hoc modo. Quamprimū ali qua signa apparuerint, vnctus ac frictus modicē prandium amplius solito faciat, & vinum multū bibat molle, deinde somno vtatur à prandio sufficienter. ad vesperam verò vbi exercitijs lenibus vsus est, calidaq; lotus, consueto more cœnet. deambulationib; autem à cœna ne vtatur. verū ad tempus differat. Postridie in aqua lauetur, & somnis mollibus tēpus transigat. Et per dies quinque paulatim ad consuetos cibos ac labores procedat. Sunt autē quidam qui horrēt ex gymnasijs, & quum se exiunt donec decerent, vbi verò perfrigerati sunt, rursus horrent, & stridor dentium tremulus corpus occupat, somnoque talis grauiatur. Vbi autem expergiscitur, sæpe oscitat, & à cœna palpebræ ipsi graues sunt. *Medela*
qua.

Morbus ac
lius.

HIPPOCRATIS LIBER

Curatio.

*Cur hæc fi-
ant.*

ro temporis etiam febres malignæ accedunt. Verùm cauere D
oportet, & non hucusq; differre, sed prius curare hoc modo.
Primum quidem ab omnibus exercitijs dimidiū auferatur.
Cibis verò omnibus humidioribus ac frigidioribus vtatur,
& potibus mollioribus ac dilutioribus. Vbi verò præterie-
rint dies quinq; tertia pars laborum ablatorum apponatur.
Cibis verò iisdem vtatur. Post alios autem quinque dies, di-
midium reliquorum laborū apponatur. Et rursus post alios
quinq; omnes labores & leuiore & pauciores reddito, vt ne
rursus excessus fiat. Nam his qui hæc signa perpetiuntur, la-
bores maiores sunt quàm cibi. Adæquare igitur hæc oportet.
Quidam verò non hæc patiuntur, sed aliqua ex his, ali-
qua verò non. In omnibus autem his signis, labores superat E
cibos, & curatio eadē est. Et confert his calida lauare, ac mol-
liter cubare, & semel atque iterum inebriari, verùm non vs-
que ad excessum, & venere vti, vbi excessus contigerit, & se-
gnem esse ad labores. Deambulationes autem in totum nō
sunt faciendæ.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE INSO-

MNIIS, IANO CORNARIO
MEDICO PHYSICO
TARPRETE.

*Quæ per so-
mnium sunt.*



Visquis de his quæ in somnis obue-
niunt recte cōiectat, is magnam ha-
bere vim ad omnia, ipsa reperiet.
Anima enim vigilat, & quum, qui-
dem corpori interuit, in multas par-
tes distributa, non sui iuris est, sed
partem aliquam singulis corporis
partibus siue sensibus distribuit, au-
ditui, visui, tactui, gressui, actioni,
ac omni corporis facultati. Ipsa autem animæ cogitatio sui
iuris non est. Quum autem corpus quiescit, anima in mo-
tu est, & corporis partes perreptans, doprans, domum suam
guber

*Gal lib de
insomnijs*

*Videitur namque in somnijs anima perferenda
corporis ingressa, exterioris relictis sensibus, ea quæ
corporis sunt dispossitio sensui, et omni quæ respicit
sanguinem iam præsentem per istam imaginationem
frui*

- A** gubernat & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa verò vigilans cognoscit, ac visibilia videt, & audibilia audit, vadit, tangit, trahit, animaduertit. In summa, quæcunque corporis aut animæ munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicunque igitur hæc rectè iudicare nouit, magnam sapientię partem nouit. *Quænam sit somnia nostra uisse.*
- B** Quæcunque quidem igitur somnia diuina sunt, & quædam euentura significant, aut urbibus, aut populo priuato, siue bona, siue mala, nõ ipsorum delictum, de huiusmodi sunt qui iudicant certam artem habentes. Quæcunque autem corporis affectiones sunt, & anima per ipsas repletionis aut euacuationis rerum à natura insitarum excessum, aut consuetorū mutationem permonstrat, de his quidem itidem iudicant, & partim assequuntur, partim aberrant, & de neutris rectè sentiunt, cur nam fiat: neque sciunt quando assequuntur, neque quando aberrant, cauere admonentes ne quid mali accidat. Atque hi non docent quomodo cauere oporteat, verum dijs supplicare iubent. Et supplicare quidem decorum ac valde bonum est. Oportet autè etiam ipsum opitulari, & deos inuocare. De his igitur res hoc modo se habet. *Somnia per se spicio.*
- C** Quæcunque in somnia mens hominis in noctem per somnū offert de diurnis actionibus, & reddit quo modo facta sunt, ea quæ seria ac iusta in re per diem facta sunt, aut de quibus cõsiliū initum est: hæc homini bona sunt, sanitatem enim significant propterea quod anima in diurnis consilijs perseuerat, neque repletionem, neque euacuationem, neque aliqua alia forinsecus allapsa re, victa. *Quæ bona & conuert.*
- Quum autem insomnia diurnis actionibus aduersantur, & de ipsis pugna oboritur, quum sanè hoc contigerit, turbationem in corpore significat. Et si quidem fortis fuerit, forte est malum: si verò leuis, debilius. De actione quidem igitur, an auertenda sit, siue non, nihil decerno. Verum corpus hominis curari consulo. Repletionem enim aliqua intus facta, secretio quædam contigit quæ animam perturbauit. Si igitur fortis fuerit contrarietas, vomitum facere cõducit, & cibos leues exhibere sensum adiiciendo aliquid ad dies quinque, & deambulationibus multis ac velocibus sensum augescensibus vri, & exercitijs exerceri moderatis, pro ciborum assumptorum ratione. Si verò debiliior fuerit cõtrarietas, detracto vomitu, tertiam sibi partem adime, atq; hanc

*Gal. quæ in somniis aut uisita s
aut se facere arbitrantur egrotantes, quam se possunt
nobis et ad defectus et ad excessus et qualitates
denique humorum reguendas inducunt.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Sol, Luna,
stelle quid
portendant
in somno ui
sa.*

sensim rursus ad dies quinque adijce, & deambulationibus D
preme. Sed & vocis exercitijs vtatur, & dijs supplicet, & tur-
batio ipsi sedabitur. At verò solem & lunam, & cœlū ac stel-
las, pura atque agilia solito more videre, singula bona sunt.
Sanitatem enim corpori significant ab omnib. præsenti-
bus. Verum talem habitum præsenti diæta cōseruare oportet. Si
verò quid cōtrariū his fiat, morbū quendā corpori significat:
à fortibus quidem, fortio-rem; à debilibus verò, leuiorem.
Et astrorum quidē exterior est in corpore circuitus, solis ve-
ro medius, lunæ autem ad cavitates, Quodcunque igitur ho-
rum astrorum extingui, aut lædi, aut disparere, aut iusti à cir-
cuitu suo videtur, iuxta illam ipsam partem morbum redun-
dere significat: & si quidē ab aëre, aut nebula, aliquod ex ip-
tis astris pati quid horum vider, debiliorem: si verò ab aqua, E
aut grandine fortio-rem. Significat autem secretionem in
corpore humidam ac pituitosam factam esse, & in externam
circunferentiam illapsam esse. Conducit itaq; huic & cursi-
bus in omni vestitu vti multis, sensim augescētibus, vt quā-
maximē exudet. Itē deambulationibus ab exercitio multis
citra prandium vti, & detracta ciborum tertia parte, ad dies
quinq; sensim adijciendo rursus exhibere. Si verò fortius vi-
deatur malum esse, etiam fomentis vti, nam per corporis cu-
ticulam purgationem facere expedit, propterea quod in ex-
terna circunferentia offensa ac latio existit. Cibis verò vten-
dum est siccis, acribus, austeris, meracis, & laboribus maxi-
mē siccantibus. Si verò quid horum luna patiatur, reuulsionē F
intro facere conducit, vtiq; vomitu ab acribus, & sanguino-
sis, ac mollibus cibis, cursibus autem circularibus celeribus,
& deambulationibus velocibus. Vtēdū & vocis exercitijs, &
prandiū auferendū, cibiq; detractio-
ne, ac rursus appositione, eodem modo vtendum est. Ob id autem intro reuellendum
est, quia ad cavitates corporis offensa apparet. Si autē sol tale
quid pati videatur, fortius iam malū est, & difficilius exigi
potest. Oportet autem in vtranque partem reuulsiones face-
re, & rectis cursibus, & curuis, & circularibus vti, & deambu-
lationibus, & alijs laboribus omnibus. Ciborū autem detra-
ctione, ac rursus appositione, eodem modo. deinde vomere,
& rursus sensim cibos augere, ad dies quinque. Si verò se-
renitate existente premantur hæc, & debilia esse videantur,
& p̄x

*Quæ nutri-
catio.*

*Luna per
somnia pa-
ti vsa quid
portendat.*

Quid sol.

A & præ siccitate à circuitu suo impediri, periculum significat delabendi in morbum. Verum oportet labores detrahere, & diata humectatione ac molli uti, & balneis ac ocio ampliori, & somno longo ac multo, donec malū sedetur. Si autē igneū ac calidum esse videatur quod se illis opponat, bilis secretionem significat. Si verò superata hæc dispareant ac evanescant, periculum est ad mortem perueniēdi ex morbo. Si verò versa ac mutata hæc esse videantur, presentem statum in fugam verti significant. Fugere autem ipsa celeriter, esseque qui ea persequantur, periculum denunciant futuræ infantæ hominis, si non curatus fuerit. Omnibus autem his conducit, ut veratro purgati, optimā victus rationem instituāt. Sin minus, ut victu ad aquam tendente utantur. vinum verò nō bibant, aut omnino album, tenue, molle & aquosum. Abstineāt autē ab acribus, resiccantibus, calfacientibus, ac falsuginosis. Laboribus secundum naturā plurimis utantur, & curibus in vestitu plurimis. Frictio verò ne fiat, neque lucta, neque volutatio in puluere. Somnis utatur mollibus, & in ocio degat, exceptis laboribus naturalibus, à cœna deambulet. Bonū est & fomentis uti, à fomentis verò vomere, per triginta verò dies nō repleatur. Quum autē repletus fuerit, bis in mēse vomat à dulcibus & aquosis ac leuibus. Quæcūque autem ex his aliās aliò præ nulla necessitate errant, animæurbationē quandā præcūra significant. Confert autem huic ocium, & animum conuerti ad spectacula, maximè risum mouentia: quod si fieri nō possit, ad id ex quo ad biduum aut triduum maximè voluptatem capiat, & sedabitur. Sin minus, periculum est delabendi in morbum. Quæcūque astra ex circūferentia excidere videntur, suntque pura & splendida, & vltra ac prorsum ferri videntur, sanitatem signifi-
C cāt. Quicquid enim in corpore parū ex circuitu excernitur secundum naturā, à vespere in aurorā: id ipsum recte habet. Nā & quæ in vētre secernūtur, & quæ in carnē eructātur, omnia ex circuitu ac circūferentia excidunt. Quæcūque verò nigra & obscura sunt, & ad vespērā ac occasum ferri vidētur, aut in mare, aut in terrā, aut sursum, ea magis morbos significant. Et quæ quidē sursum feruntur, fluxum capitis significant. Quæ verò in mare, ventris morbos. Quæ in terram, tubercula maxime significant ex carne enascentia. His cōducit tertiā cibi partē detrahere, & à vomitu, ad dies quinque

*Diversitas
est somniorū
obseruato.*

*Pura videntur
astra
quid porten-
dat.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Quid puri
tos aëris.*

*Cum deus
qui dat.*

*Quid plu-
via serena.*

*Quibus dijs
supplicādū.
Diuersa ui-
sa.*

quinque eandem rursus sensim adiiciendo exhibere, in alijs **D**
autem quinque diebus cibos omnes assumere, & vomitu fa-
cto, rursus eodē modo cibis sensim auctus exhibeatur. Que-
cunq; verò ex his pura & candida in cœlo exherere videbun-
tur, sanum esse significant, quia quod in hominem descendit
ex æthere est. Tale autem videt anima, quale sanè descende-
rit. Quæ autem nigra fuerint, & non pura, neque conspicua,
morbum significant, non propter repletionem, neq; euacua-
tionem: sed forinsecus inductum. Huic cōfert cursibus cir-
cularibus velocibus vti, quo quàm minima corporis colliqua-
tio fiat, & spiritu quàm densissimo vtens, id quod inductum
est excernat, à cursibus autem deambulationibus celeribus
vtendum est. Victus autem mollis & levis ad dies quatuor **E**
offeratur. Quicquid porrò à deo accipere quis sibi videtur
purum, bonum est ad sanitatem. Significat enim ea quæ in
corpus ingesta sunt pura esse. Quicquid verò huic contrariū
videre quis putat, non est bonum. Morbum enim in corpus
venisse significat. Oportet igitur velut priorem etiam hunc
curari. Si quis se complui putet clementi cœlo, aqua mol-
li, & non valde madefieri, neque vehementem tempestatem
ingruere, bonum est. significat enim moderatum ac purum
spiritum ex aëre ingressum esse. Si verò vice versa, valde
complui quis sibi videatur, & tēpestatem ac turbinem esse,
idq; aqua non pura, morbum designat à spiritu qui in ipso
est. Verū oportet etiam hunc simili diætā vti, & omnes **F**
hos paucō cibo ali. De significationibus quidem igitur
astrorum sic iudicare oportet, prouidereq; ac diætā statue-
re, & dijs supplicare, in secundis quidem rebus Soli, Ioui cœ-
lesti, Ioui possessori, Mineruæ opulenti, Mercurio, Apollini.
In contrarijs verò, dijs malorum auersoribus, & terræ, & he-
roibus, quo mala ac graua omnia auertat. Cæterū & hæc
sanitatem præsignant. Nimirum ea quæ in terra fiunt, acutè
videre, & audire, & securè iter facere, & securè ac citra timo-
rem currere, & videre terram leuem ac probè cultam, & ar-
bores florentes, fructuosasq; ac satiuas, & flumina solito
more fluentia, & aqua pura, neque copiosiore, neque paucio-
re quàm cōueniens est. Item fontes & puteos eodem modo.
Hæc omnia sic visa, sanitatem homini designāt, & corpus
rectè habere, omnesq; circuitus, & exhibitiones ciborum,
ac secre

A ac secretiones, integras esse. Si verò quid his contrarium videatur, detrimentum aliquod in corpore significat. Et visus quidem ac auditus læsus, morbum circa caput significat.

Itaque matutinis deambulationibus, itemque à cœna pluribus utendum est, ad superiorem diætam. Cruribus verò læsis, vomitibus reuellendum est, & lucta ampliore utendum, ultra superiorem diætam. Terra autem aspera, carnem non puram significat, quare deambulationibus ab exercitijs pluribus utendum est. Arborum verò sterilitas, seminis humani corruptionem indicat. Si igitur folia arboribus decidunt, ab humidis ac frigidis corpus læditur. Si verò floridæ sint arbores, verum infructuosæ, à calidis & siccis, hæc igitur per diætam frigefacere ac humectare oportet, illa verò siccare ac calfacere.

B Flumina autem non solito more fluentia, sanguinis circuitum significant, & auctiora quidem fluentia, excessum: imminuta verò, defectum. Oportet itaque per diætam hunc quidem augere, illum verò imminuere. Non pura autem fluenta, turbationem significant, quæ à cursibus circularibus & deambulationibus, corpore per densum spiritum moto, purgatur.

Cursus fluminis per somnum usus quid utilit.

Fontes verò & putei commoti conspecti, status circa vesicam significant, quos medicamentis urinæ cientibus expurgare oportet. Mare perturbatum, ventris morbum significat, sed oportet aluum mouentibus, leuibusque ac molliibus expurgare. Terram aut domum moueri videre, sano quidem viro debilitatem significat, ægrotanti verò sanitatē.

Fontes, putei. Mare.

C & ex præsentī statu transmotionem. Sano itaque transmutare diætā conducit, Itaque primū vomat, & rursus, ubi paulatim cibum assumpsit, à præsentī enim diætā totum corpus mouetur, debili verò eadem diætā uti conducit. Nam corpus ex præsentī statu transit. Terram ab aqua aliqua aut mari inundatam videre, morbum significat, humiditate multa in corpore existente. Verū oportet vomitibus, & prandij detractione, & laboribus & sicco victu uti, deinde sensum adiiciendo, ac modico cibo renutrire. Sed neque nigram, neque combustam terrā videre bonū est, sed periculum est de labendi in fortem ac lethalem morbum. Siccitatis enim excessum in carne esse significat. Verū oportet & labores detrahē, & cibos qui sicci & calidi, & acres ac urinam cientēs sunt: nutrireque; ptisanæ succo decocto, & omnibus molliibus ac leui-

Motus terræ uel domus.

Terræ inundatio.

Terræ nigra perustaque somnum bonū non est.

bus

HIPPOCRATIS LIBER

Natio bus modicis: & potu vti aquoso, albo, copiosiore: & balneis D
quid por- multis calidis, sed ieiunus ne lauet, molliter cubet ac dor-
tendat. miat, & in ocio degat, frigus & solem vitet. Supplicet autem
Vestis cal- terræ, & Mercurio, & Heroibus. Si verò in stagno, aut in
ciamentiq; mari, aut in fluminibus natate quis sibi videatur, nō est bo-
somnia. num, humiditatis enim excessum significat. Confert autem
 huic & diæta sicca, & laboribus vti, febricitanti verò id bo-
 nū est, extinguitur enim caliditas ab humoribus. Quicquid
 porrò quis circa seipsum videt solito more fieri, ad naturam
 suam ipsius, neq; maius, neq; minus, bonum est ad sanitatem. Et
 vestitum album indutū esse, & calciamentū pulcherrimum,
 bonum est. Quicquid verò membris maius fuerit, bonū non
 est, sed neque quodcunque tandem fuerit minus: & oportet E
Nigra. hoc quidem per diætā augere, illud verò minuere. Nigra
 autem morbosiora sunt, & periculosa. Mollire itaq; oportet
Noua. & humectare. Noua quoque transmutationem significant.
Mortui. Mortuos videre puros in vestibus albis, bonum est, & accipe-
 re aliquid ab ipsis purum, bonum est. Sanitatem enim signi-
 ficat corporū, & salubritatem ingestorū, à mortuis enim nu-
 trimenta, & incrementa, ac semina fiunt. Hæc autem pura in
 corpus irrepere, sanitatem significat. Si verò contra quis vi-
 deat ipsos nudos, aut nigris vestibus indutos, aut non puros,
 aut aliquid accipientes, aut ex domo portantes, non est com-
 modum. Morbum enim significat, quæ enim in corpus inge-
 runtur, nociua sunt. Verū oportet cursibus circularibus &
 deambulationibus depurgari, & alimēto molli ac leui à vo- E
Corpora mitu sensum nutriri. Quæcunq; verò formæ peregrinæ cor-
forma pere- pora in somnis apparent, & hominē perterrent, ciborum in-
grina. consuëtorum repletionem, & secretionē, & bilis superne ac
 inferne eruptionē, & morbum periculosum significant. Ve-
 rū oportet vomitum facere, & ad dies quinq; cibos quam-
 leuissimos non multos, neque acres, neque siccos, neque ca-
 lidos sensim adiiciendo accipere, & laboribus naturalibus
 maximè vti, exceptis deambulationibus à corna. Utendum
 etiā balneis ac calidis lauacris, & ocio. Solem verò & frigus
Comestio vitet. Si verò quis per somnum edere aut bibere consue-
p. ratioq; tos cibos ac potus sibi videatur, inopiam alimenti significat,
Carnis co- & animæ tristitiam. Et si carnes robustissimas quis edere se
mentio. putet, maximum alimēti excessum designat. Si verò debilis-
 simas,

*omnino quidem alterius vultus factus sibi
 laqueum, eo vultu factus est paralyticus*

A limas, minorem. Quemadmodū enim id quod editur bonū est, Sic etiam id quod videtur. Cibos igitur detrahare conducit. Nam alimenti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo ac melle facti per somnum comesti, similiter significant. Aquam autem puram bibere bonum est, reliqua omnia nociva sunt. Quæcunque homo ex consuetis ac familiaribus se videre putat, ea animæ concupiscentiam significant. Quæcunque verò fugit perterrefactus, sanguinem sisti ac præ siccitate coerceri significant. Confert itaq; frigesacere ac humectare. Quum verò quis pugnat, aut pungitur, aut ab alio ligatur, secretionem circuitui contrariā corpori contrigisse significat. Conducit igitur vomere, & attenuare ac deambulare, & cibis leuibus uti, & à vomitu ad dies quinq; sensim renutrire. Quin & oberrationes & ascēsus in somnis visi, grauiā significant. Fluminum transitiones, & hostes armati, monstra formæ peregrinæ, morbum aut insaniam significant. Confert itaq; his qui talibus in somnis vexantur, cibis modicis uti leuibusq; ac mollibus, itemq; vomitibus, atq; sic sensim rursus ad dies quinque cibum exhibere. Vtendum & laboribus naturalibus multis, præterquā à cœna, Calida lauacra, & ocium, frigusq; ac solem vitent. Qui igitur his quemadmodum conscripta sunt vtetur, vitam sanus deget, & inuenta est sanè à me hæc ipsa dixta, quantum possibile est humano ingenio excogitare, dijs auxiliantibus.

*Aqua
potio.*

*Diversa
somnia ac
spicua.*

*Inuentum
Hypocras
tis. 7. de dietis
pag. 120. 6.*

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE ALIMEN-

**TO, IANO CORNARIO ME-
DICO PHYSICO IN-
TERPRETI.**

Hunc librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicuius plebei ac vulgaris hominis esse dicit, & fortassis ipsius Thessali. Quidam Hierophilum autorem putant.

Alimentum

*inostitit
hyp: cognat
metre 2. qd
in infirmitate*

HIPPOCRATIS LIBER



Limentum & alimenti species, vnum & D
multæ, vnum quidem, quatenus vnum
genus est. Species verò humiditate ac
siccitate finitur, & in his formæ, ac quan-
titas est, & ad quædam, & ad tot. Au-
get autem, & corroborat, & incarnat, &
assimilat, & dissimilia facit quæ in sin-

gulis sunt, iuxta vniuscuiusque naturam ac facultatem quæ
ab initio adest. Assimilat autem pro viribus, quum id
quod superingeritur superatur, id verò quod prius inest su-
perat. Exile autem fit aliquando quidem prius, in tem-
pore dissolutum aut insuper appositum, aliquando verò
posterius, in tempore dissolutum aut appositum. Destruit
autem vtrunque in tempore & post tempus, id quod ex-
trinscus assiduo superingestum est, & per multum tem-
pus omnibus membris solidè implicatum est, & pro-
priam quidem formam producit, priorem verò aliquan-
do autem & priores, destruit. Facultas porro alimenti
peruenit & ad ossa, & ad omnes partes, & in neruum, & in
venam, & in arteriam, & in musculum, & in pelliculam, &
carnem, & pinguedinem, & sanguinem, & pituitam, & me-
dullam, & cerebrum, & medullam spinalem, & intera-
nea, omnesq; ipsorum partes, & sanè etiam in caliditatem,
& spiritum, & humiditatem. Alimenti verò & id quod
hoc nutrit, alimentum est, & quod velut nutrimentum est,
& quod nutrimentum futurum est: Principium autem P
omnium vnum est, & finis omnium vnus, & idem finis est
atque principium: & quæ particulatim in alimento pro-
bè, & malè distribuuntur. Probè quidem, quæ prædicta
sunt. Malè verò, quæ contrarium his ordinem habent.

Ciborum vit.
Alimentum
notaplex
Succorum
vit.

Succi varij, & coloribus, & viribus, & in detrimentum,
& in utilitatem, & neque lædentes, neque commodantes,
& multitudine, & excessu, & defectu, & implicatione, ali-
quorum quidem, aliquorum verò non. Et omnium cali-
ditatem lædunt ac iuuant, & frigiditatem lædunt ac iu-
uant, & facultatem lædunt ac iuuant. Facultatis autem
variarum naturæ sunt. Succo corruptentes & totum, & par-
tem, & forinsecus ac intrinsecus, spontanei & non sponta-
nei, Nobis quidem spontanei, causæ verò non spontanei.

Rursus

- A** Rursus autē causæ, aliæ manifestæ, aliæ obscuræ, & aliæ possibiles, aliæ impossibiles. Natura omnibus subuenit. *Causæ uariæ.*
 Ad hanc verò forinsecus quidē cataplasma, Illitio, Vnguentū, Nuditas & totius & partis. Caliditas & frigiditas, iuxta eandem rationem & Adstrictio, & vlceratio, & morsus, & corrosio. Intrinsecus verò & quædam ex prædictis, & suprà hæc causa obscura, & parti & toti, & alicui & non alicui, excretionēs ventris secundum naturam, item vrinam, sudoris, saliuæ, muci, vteri, iuxta hæmorrhoidas, verrucam, lepram, tuberculum, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex ventre, ex sede, ex cole, secundum naturam, & præter naturam, discrimina horum alijs iuxta aliam rationem, aliquando etiā aliter. Vna natura sunt hæc omnia, & non vna. Multæ naturæ sunt hæc omnia, & non vna. *Causa non semper patet.*
- B** Medicina sursum & deorsum, & neque sursum, neque deorsum. In alimento medicina, optimum. In alimento medicina malum. Malum & optimū ad aliquid. Vlcus, crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, vlcera capitis manantia, impetigo, vitiligo, lentigo, aliquādo lædit, aliquando prodest, aliquando neque lædit, neque prodest. Alimentum, non alimentum. Si nutrire nō potest, nomen est alimentum, non opus. Opus & res est alimentum, nō nomē. In pilos alimentum, & in vngues, & in extremā superficiem intrinsecus peruenit. Forinsecus alimentum ex extrema superficie, ad intima peruenit. *Medicina uaria.*
 Confluxio vna, conspiratio vna, Consentientia omnia. Iuxta totius quidē corporis naturam omnia, iuxta partem verò, partes in vnaquaq; parte ad opus. Principium magnum ad extremam partē peruenit. Ex extrema parte ad magnum principium peruenit. Vna natura, esse, & non esse. *Alimētū.*
- C** Morborum differentiæ, in alimēto, in spiritu, in calore, in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne, in pinguedine, in vena, in arteria, in neruo, musculo, pellicula, osse cerebro, medulla spinali, ore, lingua, stomacho, siue gula, ventre, intestinis, septo transuerso, peritonæo membrana aluum ac intestina amplectente, hepate, splene, renibus, vesica, vtero, cute. Hæc omnia & singulatim & particulatim. Magnitudo ipsorum magna, & non magna. Signa, titillatio, dolor, ruptura, mens, sudor, vrinarum subsidētia, quies, iactatio, vilus, imaginationes, morbus arquatus, singultus, morbus comitialis, sanguis integer, somnus. & ex his *Mira & brevis discussio membrorum.*
Signa languentis.

HIPPOCRATIS LIBER

Signa ob-
seruanda.

agua que
deleis.

Varietas
consideran-
da.
que
magis
mi
e
tort

Pulmo
Alimenti
principium
Venarum
des & arte
riarum.

Lac.
Vinum.

Sanguisua-
riat.

in
is

& ex alijs naturalibus, & quæcunque alia huiusmodi ad de-
trimentum & vtilitatem procedunt. Labores totius & par-
tis. Et magnitudinis signa, alterius ad maius, alterius ad mi-
nus, & ab vtrisque ad maius, & ab vtrisque ad minus. Dulce
non dulce, dulce ad potentiam, velut aqua. Dulce ad gustum,
velut mel. Signa vtrorunque, vlcera, oculi, & gustus, & in his
magis & minus. Dulce ad visum, & in coloribus, & in alijs
mixturis. Dulce magis & minus. Raritas corporis ad perspi-
rationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas
corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbi-
diores. Qui probè perspirant, debiliores & saniores sunt, &
à morbis facillè reconualescunt. Qui malè perspirant priusquàm
ægotent, fortiores sunt. Vbi autem ægotarunt, difficilius à
morbis reconualescunt. Hæc autem & toti parti. Pulmo
contrarium corpori alimentum trahit, reliqua verò omnia
idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur, pulmo,
& reliqua respiratio. Principium alimenti & humidi &
sicci, os, gula, venter. Verùm antiquius & primordiale ali-
mentum, per abdomen vmbilicus. Radicatio venarum he-
par. Radicatio arteriarum cor, ex his aberrant in omnia san-
guis & spiritus, & color per hæc meat. Vis vna & non vna,
qua omnia hæc & alia gubernantur, alia quidem ad vitam
totius & partis, alia ad sensum totius & partis. Lac nutriti-
um, quibus videlicet secundum naturam alimentum est, a-
lijs verò non. Alijs autem vinum alimentum est, & quibundā
non alimentum. Et carnes, & aliæ multæ alimenti species, &
iuxta regionē & iuxta consuetudinem alunt, partim ad aug-
mentum, & ad esse, partim ad esse solum, velut in senibus.
Quædam verò supra hæc, etiam ad robur. Dispositio A-
thletica non est à natura. Habitus sanus melior in omnibus.
Magna est res quantitas ad vires solerti ratiocinatione ado-
ptata. Lac & sanguis alimenti sunt redundantia. Circuitus
ad multa consoni sunt, ad foetum eiusq; alimentum. Rursus
autem sursum repit in lac, & in alimentum, & ad infantem.
Viuiificantur non animalia, viuiificantur animalia. Viui-
cantur partes animalium. Naturæ omnium nullo doctore
vsæ sunt. Sanguis alienus utilis. Sanguis proprius utilis. Sā-
guis alienus nociuus. Sanguis proprius nociuus. Humores
proprij nociui. Humores alieni nociui. Humores alieni cō-
ducibiles.

Aducibiles. Humores proprii conducibiles. Consonans dissonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum. Lac proprium nocivum. Lac alienum nocivum. Lac proprium commodum. *Lac ueriat. Digestio per aetates. Parvus conformatio.* Cibus iuuenibus facile ac leuiter putrefactus. Senibus uero ad summum transmutatus. His qui in vigore aetatis consistunt impermutabilis. Adfigurationem, soles triginta quinque. Ad Motum, septuaginta. Ad perfectionem, ducenti & decem. Alij tradunt. Ad formam, quadraginta quinque, ad motum, septuaginta sex, ad exitum, ducenti & decem. Alij sic. Ad formam, quinquaginta, ad primum saltum, centum, ad perfectionem, trecenti. Alij sic. Ad discriminationem, quadraginta, ad transitum, octoginta, ad elapsum, ducenti quadraginta. Non est, & est. Gignuntur autem in his & plures & pauciores, secundum totum, & secundum partes. Non multo autem plures aut pauciores, pauciores uero tot, & quaecunque alia his similia.

Ossium alimentum ex confractione. Naso bis quinque. *Quota ossium coalescentia.* Maxilla & clauicula, & costis duplicia, cubito triplicia. Tibia & brachio quadruplicia, femori quintuplicia. Et si quod in his plus aut minus potest. Sanguis humidus & sanguis solidus. Sanguis humidus bonus. Sanguis solidus malus. *Sanguinis alia uariatio.*

Ad aliquid omnia mala & bona sunt. Via sursum deorsum una. Potentia alimenti melior quam moles. Moles alimenti melior quam potentia. Et in humidis & in siccis detrahit & apponit idem, & alteri quidem aufert, alteri uero *Cibariorum uariatio.*

Capponit idem. Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, iuxta etatem, & consonantia & dissonantia sunt, & morbi & sanitatis signa, & sanitatis magis quam morbi, & morbi magis quam sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est. *Pulsus spiratio, signa sanitatis & morbi.*

Humidum alimentum magis facile transmutatur quam siccum. Siccum alimentum facilius transmutatur quam humidum. Alimentum quod aegre alteratur, aegre consumitur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicunque veloci appositione opus habent, his humidum ad reficiendas vires medicamen optimum. Quicunque uero adhuc velociori indigent, per os tactum. Qui autem tardiore appositione opus habent, solido alimento utantur. Musculi solidiores aegre magis quam alia colliquefunt, excepto osse & neruo. Quae denudata sunt, aegre transmutantur, & secundum ge-

*ide ga
in 2
opv. pta
in lib. de
sensu et
sensitio
se d. au.*

HIPPOCRATIS LIBER

nus ipsa seipsis fortiora sunt quàm pro re ipsa: propterea D
ipsa seipsis ægrius colliquescent. Pus ex carne, purulentū ex
sanguine, & ex alia humiditate. Pus vlceris alimentū. Pus
alimentū venæ, arteriæ. Medulla alimentum ossis, propterea
callo obducitur. Facultas & potentia omnia auget & nutrit,
& germinare facit. Humiditas alimenti vehiculum est.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE HVMI- DORVM SIVE LIQVIDO-

RVM VSV, IANO COR-

E

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Aqua.



*Oculorum
medela.*

Qua potabilis, saluuginosa, mare, potabi-
lis quidem in officina medica optima.
Nam & ferramentis & æraimentis opti-
ma, & medicamentis plurimis inuetera-
tis communissima. Verum ad corpus nosse
oportet, quod hæc aut madefacit, aut fri-
gefacit, aut calfacit. Aliter verò nulli commodat, aut de- F
trimento est potata. Vbi modica potabili in spongia vte-
ris, optimum oculis est. Cutis ipsa supernè exulceratur
calidæ asperzione. Fomentum corporis totius aut partis.
Cutis duræ mollitio, distente laxatio, neruorum, carniū,
humorum sub cutem effusio, sudoris secretio. Humecta-
re pro lutione, velut nares, vesicam, flatus. Incarnare, at-
tenuare, liquefacere, minuere, colorem reuocare, colorem
dispergere. Somniferum & in caput, & in alia, conuulsio-
num, tensionum, mitigatiuum dolores stupefacit auris,
oculorum, & quæcunque talia, frigida castrare, velut pix
vlceribus, præterquàm à quibus sanguis erumpit, aut eru-
pturus est, fractis, luxatis, reliquis quibus linteola sunt me-
dicus, Capitis grauitati. Moderatio in vno quoque, ne vltra
torq

torqueamus, velut calida corpori, ex excessu in vtranq; partem, vt ab vtraque non aberrer, coniectatione ex detrimento, aut inutili facta, velut in tepida. Oportet enim detrimētis aut vtilitatibus etiam si sint vti, vsquequo iuuent, aut donec lædant. Madefactio itaque & humectatio, debile quid est. Frigefactio verò & calfactio, forte: velut ex sole.

Madefactio.

Frigefactio.
Calfactio.

Verum frigida calida existens, velut potabilis aqua, debile quid est. Calida autem ne vltius pergat, vt vratur. Indicat autem de his ipse ægrotus, exceptis mutis, aut leuiter syderatis, aut stupefactis, aut velut in vulneribus perfrigeratis, aut nimio dolore vexatis. his enim hæc sensu non percipiuntur.

Nam non sentiunt hi perusti. Itemque profunda ac magnæ luxationes. Iam verò etiam pedes deciderunt perfrigerati, ex calidæ perfusione. Sed his corpus perfusi iudex est, similiter etiam frigidæ. Harum aut vtrarumque paucitas, debile quid est. Multitudo verò, forte. veruntamen finire oportet, donec fiat id cuius gratia fiunt. antea verò quam pestremum fiat, cessandum est. Harum porro vtraque lædit, & calida quidem

Calida con-
piosius ut-
es quid pa-
tiuntur.

amplius ea videntibus has læsiones inducit, carniū effeminationem, neruorum debilitatem, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia hæc ad mortem. Frigida verò conuulsiones, tensiones, nigrores, rigores febriles. Mediocritas quidem extra noxam est. Reliqua verò lædunt ac profunt, velut relatum est. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus ac molestiis, prout singula ex ipsis conueniunt, ita

facili apparent. Corpus regi ac velari aduersum, quicquid insuetum est, quicquid longissime à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimum, id ipsum auersatur: & propterea sanè calida gaudet, & ferre potest. Cerebrum & quæ ab hoc oriuntur, frigida quidem tristantur, calida verò gaudent, si sanè frigidius & solidius à natura fuerit. Propter

Ossibus den-
tibus neruis
frigida ini-
mica.

eà ossibus, dentibus, neruis frigida inimica, calida verò amica, quia ab illa conuulsiones, tensiones, rigores febriles, quæ sanè frigida facit, calida verò sedat. Ob id etiam à calida voluptates, & illecebræ, à frigida verò dolores & auersationes. Ideoque spina, pectus, dorsum, præcordia, magis frigida aggrauantur calida verò gaudent, & ferre ipsam possunt. propterea sanè spina, pectus, dorsum, præcordia, contraria perpeffa sunt, quia sunt contraria. Propterea sanè in hoc loco an-

HIPPOCRATIS. LIBER

xietatem ex calida obortam, frigida sedat. propterea sanè **D**
 frigida potu gaudet. propterea sanè cibis calidis delectatur.
propterea sanè & in animi deliquijs frigida extremis parti-
bus affundere prodest. Quod autem posteriores partes cali-
 dam magis sufferunt quàm anteriores, quæ relata sunt in cau-
 sa sunt. Quod verò etiam frigida, rectè habet. Nam & extre-
 mæ partes anteriores sunt, & regi non adsueta: velut etiam
 interna pars se habet ad externam. Cogitandum autem quòd
 vtraque in vnoquoque corpore potior est externa cute, quæ
 & sibi ipsi, & neruo sanguineo cõtìnuata ac coherens, eo quod
 extrà proprium calorem, in externo frigore est, ab vtrisque
 frequenter superatur, & vtrisque frequenter opus habet, fre-
 quentius autem calida ad voluptatem. Perpetiuntur autem **E**
 & extremæ partes tale quid, quare citò multa percipiunt, tar-
 dè autem primùm attolluntur. Et venæ quoque aliæ prius,
 aliæ posterius. Atque sic omnia apparent, & vbi frigesunt
 extremæ partes, & vbi calefiunt, in vasorum euacuationibus,
 in animi deliquijs. Et iuxta rationem meritò etiã venas se-
 quuntur, ea quæ ab his eueniunt. Et calefacit primùm calida
 velut in manibus, internas partes. At vlcera calida gaudent
 ex confesso, quia regi adsueta sunt. Meritò itaque altera gra-
 uatur. Meritò igitur & ipsæ venæ, quia sunt in calido. Meritò
 etiam ipse thorax, & ventriculus ipse à frigida superatus, mo-
 leste fert, & mortem minatur, quia maximè desuetus est. Ve-
 rum plurimum abest ab eo vt patiat: propinquissima autè **F**
 inter se sunt, egere, & pati. Meritò igitur frigida potu dele-
 ctatur. Et sic consentiunt inter se omnia hæc. Quod verò o-
 mnia desquamata & ambusta in superficie, nō valde regi ad-
 sueta, maximè frigida molestè ferūt, par est. Citissimè enim
 superantur. Et profundissima si superentur, maximè vtrique
 grauentur. deinde etiam natura nervosa participant. Quo-
 niam imus venter calida delectari videtur, considerandus lo-
 cus est, & postea extremæ partes, & vesica, & genitales par-
 tes, & virilis membri glans natura frigidior est, quā quis pu-
 tat. Sursum enim non deorsum exilit caliditas: & propterea
 calida delectatur. Considerandum etiam, quòd post calidam
 frigescit corpus magis perfrigeratum: post frigida verò re-
 calefcit magis cõtìrarium: velut etiã aquæ frige faciendæ & ca-
 lescentiendæ sunt, propter tenuitatē. Et quod post calidā durefcit
 corpus

Corpus fri-
 gescere ma-
 gis post.

- A** corpus magis reficcatum, velut oculi post frigidam. Altera enim similis est aëri ambiēti, altera non. Mare pruriginosis, & qui ab acribus humoribus vellicantur prodest, vt & lauet, & foueat ex calido. Qui verò nō aduēti sunt, aliquantū laeduntur. Verū ad vlcera, & ambusta, ac desquamata, & quæcūque talia, contrarium est. Aptum est autem puris. Bonum est & ad attenuandū, & ad piscatorum vlcera. Hæc enim neque suppurantur, si non vellices: & ad vlcera cuniculosa, & depascentia proserpendo sedat ac sistit, velut sal, salugo, nitrum. Omnia autem hæc si quis parum vtatur, irritant: si excellenter, bona sunt. Melius autem est calidum ad plurima. Acetum ad corpus & articulos, simile est mari, & potentius, ad
- B** perfundendum & ad fomentum: & ad vlcera recens vulneratis, & ad sanguinis grumos, vbi nigredines sunt in pudendis, collutio est ad aures, & ad dentes. Callido autem hæc fiunt, & alia, sed & ex tempore coniecturam facere oportet. Eliquat velut sal, & vt alia quæ impetigini, lepris ac vitiligibus conducunt, affusum ad calidū solem. maximè verò conducit vnguibus leprosis. Superat enim post tempus, verrucas formicarias attenuat, & sordes in auribus sanat. Mollic autem & corpus, & multos alios locos, si nō odor offenderet, & maximè mulieres. Valuerit & ad podagram, si nō corpus vulneraretur. Eadem etiam fex aceti facit. Vinum dulce ad diuturna vulnera cōmodum est assiduè vnti. Sed & ad medicamentorum potionem. Austerum autem & album, & nigrum vinum, frigidum ad vlcera commodum est, frigidum propter caliditatem. Lanæ quæ frigiditatis gratia, aut perfunduntur, aut induuntur, aut intinguntur, aquam frigidissimam postulant. Quæ verò adstrictionis gratia, vinum nigrum etiam lanas aspergere potest, velut etiam betarum folia, aut linteola intinguntur, in plurima quibus adstrictio inest, velut sunt hederæ albæ folia, & quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, velut hederæ & rubus, rhus coriarius, saluia: & in ea quæ mollire oportet, velut farina cocta. Aqua frigida prodest papulis rubicundis, quales alia atque alia parte sublatae erumpunt, quales per splenia attractoria emergunt: in carnosis verò & tenera carne præditis subrubicundæ sunt: in nigris autem rotundæ, dothienes hoc est furunculi appellatae, & quales in ipsis calidis lauacris oboriuntur, &

*Acetū quā
uim habeat.*

Vinū dulce.

*Aqua frī
gida.*

HIPPOCRATIS LIBER

mulieribus ex mensium sub cutem recurſu fiunt, & ab irri. D
tamentis cutis aut inſolita veſtimentorum aſperorum ge-
ſtatione, & ex ſudoris exitu, aut vbi quis ex frigore, derepen-
te ad ignem, aut calida lauacra acceſſit. Nam ſi hæc poſte-
rius fecerit, nequaquam amplius erumpunt. Alioqui quæ
ex frigore fiunt, aut quæ exaſperantur inſtar milij, deinde
exulcerantur, eas frigida lædit. Calida verò prodeſt. Tu-
mores in articulis, & dolores ſine vlcere, ac podagricos, &
conuulſa, plurima ex his frigida multa affuſa leuat ac exte-
nuat, & dolorem torpefacit. Torpor autem moderatus, dolo-
rem ſoluit. Sed & calida aqua attenuat ac mollit. Podagri-
cis, reſolutis, ante ac retro diſtensis, conuulſis, talia acce-
dunt, diſtentiones, tremores, leues ſiderationes: Tali- E
bus laxatis, claudicationes, torpores, vocis interceptiones,
ad talia, excretiones per infernas partes ſuppreſſæ. Cauend-
um autem eſt in frigida vſu, ne modum excedamus. Ar-
ticulos induratos, aut ab inflammatione aliquando oborta,
aut à diſtortione, operæprecium eſt ſanare, aqua calida in v-
triculum inſuſa. Manum deligare, & oculos lachrymas le-
nit, ita vt ad acres, ſtillamētum lene inſundat quis, vt ne ſal-
ſuginosa contactu lædat. Et foſſulis vlceribus oculorum elo-
tio prodeſt, & repletio ad naturam reducens. Calida oculis
cōuenit, doloribus, ſuppurationibus, lachrymis mordacibus,
ſiccis omnibus. Frigida doloris exortibus, valde rubicūdis,
& qui collectiones tuberculorū iuxta venas habere ſolēt, qua- F
lia ſunt vlcuſcula capitis manantia, circa thoracē, & alia du-
ra. Verūm podici & vtero non valde commoda eſt, neq; ſan-
guinem in frigore mingētibus. Vlceribus quidē frigida mor-
dax, cutem obdurat, doloroſa non ſuppurari facit, liuefacit,
nigrefacit, rigores febriles facit, cōuulſiones, ante ac retro di-
ſtentiones. Quandoq; verò in hac diſtentione, ſine vlcere iuue-
ni carnoſo, media æſtate, multæ frigida aquæ effuſio, caloris
reuocationem facit. Calor autem hæc ſoluit. Callida ſup-
puratoria eſt, non in omni vlcere, maximum ſignum ad ſe-
curitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores,
conuulſiones, ante ac retro diſtentiones lenit, capitis graui-
tatem ſoluit, plurimū autem conducit oſſium fracturis,
magis autem denudatis, & ex his maximè his qui in capi-
te vlcera habent, & quæcunque præ frigore, aut moriuntur,

Tumores
articulorū.

loci inglyde
podagricis
affecti locis sub
ne c. 198. 295
334. 345. 397
354. 419. 416
514
144

Calida.

Frigida.

A tur, aut vlcerantur : itemque in vlcerationibus voluntarijs ac inuoluntarijs, qualia sunt desquamata : herpetibus serpendo adedentibus, denigratis aut in gingiuis, aut in aure, aut in sede, aut vtero. His omnibus calida amica est ac iudicatoria. Frigida verò inimica & occidens, præterquam in quibus sanguinem fluxurum esse timor est. Atque hoc modo vtendum est liquidorum perfusionibus, inunctiliis illitionibus, foliorum impositionibus, aut linteolorum cataplasmatibus, quæcūq; aut frigiditate, aut caliditate profunt, aut nocēt.

B HIPPOCRATIS

COI LIBER DE HVMORIB.

IANO CORNARIO ME-
DICO PHYSICO IN
TERPRETE.

*

*Genuinum Hippocratis librum hunc esse Galenus dicit.
Verum quædam insunt ad extremam dictionis breuitatem contracta: quædam rursus ultra modum extēta.*

C



Impetus & ferocitas humorum, vbi non reciprocatio humorum est, velut florū, ducendus est quā repit per conuenientes ac commodas regiones, exceptis his quorum maturitas tempore contingit. Maturationes extra aut intro repunt, aut aliò quò oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficultas, pilorum nuditas, viscerum vacuitas, infernis repletio, supernis alimentum, mutatio sursum, mutatio deorsum. Spontanea sursum & deorsum, quæ profunt & lædunt. Cognata species, regio, mos, ætas, tempus, constitutio morbi, excessus, defectus. Quibus quantum

*Difficilis
humorū dis-
seratio.*

*Considerā
da medico.*

+

HIPPOCRATIS LIBER

deficit, aut nō, medela, declinatio, deriuatio, in caput, in obli- D
qua, quā maximē repit, aut reuulsio in supernis deorsum, in
infernīs sursum. aut siccare, aut aliquibus inferna, aut aliqui-
bus superna, aut eluitur, aut quibusdam mitigabitur. hu-
mores effusi ne intro reuellantur, sed secretiones siccantur.
Turbatio, infusio per sedem, pelluium, quibus abscedit ad
sedem, vnde exoluitur aut medicamentum, aut vlcus, aut
humor aliquis compactus, aut eruptio pustulosa, aut flatus,
aut cibus, aut animalculum, aut æstus, aut alia quædam af-
fectio. Consideranda hæc, spontanea desinentia, aut ve-
lut ab exustione excitatæ bullæ, in quibus qualia lædunt
aut profunt. Figuræ, motus, eleuatio, & rursus subsidētia,
somnia, vigilia. Quæ faciēda, aut impediēda, cito asse- E
qui. Castigatio per vomitum, infernè per exitum, aut sputū,
mucum, tulsim, ructum, singultum, flatum, vrinam, stertuta-
tionem, lachrymas, pruritūs, euulsiones, contactus, sitim, fa-
mem, repletionem, somnos, labores, ocium, corpus, mentem,
disciplinam, memoriam, vocem, silentium, vteri purgatio-
nem. Quæ supernè erumpunt ac torquent, pingua, intem-
perata ac meraca, spumosa, calida, mordacia, æruginosa, va-
ria, ramentosa, fæculenta, cruenta, flatus expertia, cruda, co-
cta, sicca. Quæcunque circumfluunt, ferendi facilitatem con-
templari oportet, itemq; difficultatem, priusquam periculū
veniat. Item quæ sedare non oportet. maturatio, descensus
eorum quæ infra sunt, redundantia & fluctuatio eorum quæ
supra. & quæ ex vteris, & in auribus sordes, cōcitatio ac per- F
mixtio, apertio, euacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinse-
secus, forinsecus. horum quidem, horum verò non. Quum in
fra vmbilicum fuerit id quod torquet, tardum & molle est
tormen. Vice versa, contra. Quæ per alium egeruntur quæ
repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, foetida, sicca,
humida. Quæ olfactum malè afficiunt. Sitis quæ prius non
adfuit. neque æstus, neque alia causa. Vrina, nasi humecta-
tio, lactationem. Siccitatem. & non esse contractum ac are-
factum, & spiritum turbulentum, præcordia, extremitates,
oculos malè affectos. coloris transmutatio. Pulsus, frigiditas,
palpitationes, cutis duricies, neruorum, articularum, vocis,
mentis, figura voluntaria, pili, vngues. facile ferre, aut non,
qualia oportet. Signa hæc. Odores corporis, oris, secessus,
auris,

*Tormentū
umbilici.*

*Quanta sit
hæc obser-
uatio vide-
to.*

- A** auris, flatus, vrina, vlceris, sudoris, sputi, nasi. Corpus falsuginosum, aut sputū, aut nasus, aut lachryma, aut alij humores. Penitus similia, iuuantia, lædientia. Insomnia qualia videat, & in somnis qualia faciat, an acutè audiat, & obedire paratus sit animo, an magis fortia sint ac plura quę commoda sunt ac seruant, quàm alia, an sentiant omnia omnibus sensibus, & ferant, veluti odores, sermones, vestitus, figuras, & huiusmodi patienter, quę sanè & sua sponte comparentia profunt, & quando etiam talia iudicationem inducunt. Item tot, & talia, veluti sunt flatus, vrina, qualis, & quanta, & quando. Quę verò contraria sunt, auertere, ipsisque aduersari. Quę propinqua & communia sunt affectionibus, prima & maximè affliguntur. Constitutionem autem ex primis incipientibus, quicquid tādē excernatur ex vrinis, qualēsnam fuerint, & qualis sit corporis collapsio, coloris immutatio, spiritus imminutio, & reliquę cum his victus rationes. Scire etiam oportet an similia sint quę decedunt, transitus, vrinae, per vteros, sputa, per nares, oculi, sudor, ex tuberculis, ex vulneribus, ex pustulis, quę sua sponte, quę arte. Quòd similia sunt inter se omnia quę iudicant, & quę profunt, & quę nocent, & quę perimunt, quo hæc quidem fugiens auertat, illa verò accersat, & ducat, ac suscipiat. Sed & alia eodem modo, cutis, extremarum partium, præcordiorum, articulorum, oculorum, oris, figurarum, somniorum, qualia iudicant, & quando, talia machinari. Insuperque qui tales abscessus fiunt. Qualia profunt cibis, potibus, odoribus, visu, auditu, cogitatu, secretionibus, humoribus, calefactione, frigefactione, siccitatibus, humectando, siccando, vnguentis, illitionibus, cataplasmatibus, emplastris, insersionibus, denique & epithematis quę imponuntur. Figurę, defrictio, curatio, labor, ocium, somnus, vigilię: spiritibus supernè, infernè, communibus, proprijs, arte paratis. In exacerbationibus neque præsentibus, neque futuris, neque pedum frigiditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationibus per circuitus fientibus, ciborum oblationes dandę non sunt, neque cogere oportet, sed auferre de appositionibus ante iudicationes. Quę iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque alijs irritamentis, sed sinere. Concocta medicamentis aggredi

*Quę per
exordia di-
gnoscentia.*

*Hæc eadē
in Apbo-
ri/mis dixit.*

HIPPOCRATIS LIBER

aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principijs, D
 si non turgeant. Multa verò non turgent. Quæ ducere oportet: quò maximè repunt per conuenientes locos, eò ducere oportet. Quæ prodeunt non multitudine æstimare oportet, sed quãdiu prodeant qualia oportet, & facilè æger ferat. Vbi verò opus est, debilitare etiam, aut animi deliquiũ inducere oportet, donec hoc feceris, cuius gratia hoc fit, interim aliò vertere, aut siccare, aut humectare, aut reuellere, si sufficiat æger, id quod ex his coniectabis. Sicca quidem calida erunt, humida verò frigida. Quæ verò aluum mouent, plerunque contraria. Hæc imparibus diebus, sursum, si & circuitus, & constitutio talis sit ex exacerbationibus. Fiunt autem plurima paribus diebus, deorsum: sic enim & sua sponte profunt: E
 si non circuitus faciant exacerbationes in paribus. In talibus autem, in paribus sursum: in imparibus deorsum. Tales autem pauci sunt. Et tales constitutiones etiam difficilius iudicantur. Quin & vltèrius tempore progressa sic fieri necesse est, velut ad decimam tertiam, ac decimam quartam diem. Decimatertia quidem deorsum, decimaquarta verò sursum. Ita enim ad iudicationem conducit. Et quæ ad vigesimam. Cæterum quæ infrà prodeunt, multũ purgare oportet, & hæc non propè iudicationẽ, sed longiũs ab ea. Raro autem in acutis, multa ducere oportet, in delassatis, totum.

In febribus ad articulos, & circa maxillas maximè abscessus fiunt, propè sanè dolores vnicuiusque, ad supernam partem magis & in totum. Si verò lentus fuerit morbus & deorsum tẽdens, infernè etiam abscessus fiunt. Maximè autem pedes calidi, infernè significant: frigidi supernè. Qui verò ex morbis se erigentibus statim in manibus aut pedibus dolores fiunt, in his abscessus contingunt. Sed & si quid doluerit quis antea quàm ægrotet, ad eas partes firmatur. Quemadmodum etiam tussientibus & anginosi in Perintho. Faciunt enim rufles abscessus, velut etiam febres. Iuxta eãdem rationem cõtìngit ab humorum aut corporis colliquatione & frigiditate. Proinde nosse expedit, in quibus temporibus humores florèt, & quales in singulis morbos faciunt, & quales in vnoquoque morbo affectiones: & reliquum corpus ad quem morbũ maximè natura repit: & quale quid splen intumescens facit. Horũ sanè & natura, & fermè colores deteriores F

*Concus-
siones & de-
cretoria qui
fiant.*

Perinthus.

*Humorum
obseruatio.*

Lienosiquid

- A** res sunt, & corpora tument. Et si quid aliud est, in his exercere se prodest, velut est animi intemperantia circa cibos ac potus, somnum, vigilias, aut ob amores quosdam, velut tesserarum, aut propter artes, aut propter necessitates: tolerantia laborum, & quorum ordinata est, aut inordinata: Mutationes ex qualibus ad qualia: ex moribus animæ industria, aut quærens, aut meditans, aut videns, aut dicens, aut aliud quid, velut tristitiæ, iracundiæ, cupiditates, quæ ex casu contingunt. Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum. Velut etiam corporum, Molis quidem ad seipsas attritis, dentes stupefunt: Ambulanti verò circa cauum locū, crura tremunt: quum autem quis manibus ea quibus opus habet leuat, hæc tremunt: Serpens de repente conspectus pallorem cum virore inducit. Timores, pudor, moeror, voluptas, ira, aliaque huiusmodi quomodo obediunt. Vnicuique autem pars corporis ad actionem pertinens in his obedit. Sudores, cordis palpitatio, & eiusmodi potentiæ. Quæ extrinsecus profunt aut nocent, vinctio perfusio, illisio cataplasmatum vsus, deligatio lanarum & talium rerum: & internæ partes talibus obediunt, nō solum externæ his quæ intro assumuntur: Sed & quæ in lanis ab ouili succidis adhibentur, & quod à rege nomen habet cuminum, videntibus & olfacientibus. Quæ de capite ducunt, turbant, sermones, vox, & huiusmodi, mammae, genitura, vterus, & quæ signa in ætatibus, & in suffocationibus, & tussi, & quæ ad testiculos. Quemadmodum arboribus terra, ita animalibus ventriculus: & nutrit, & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dum euacuatur, calefacit, dum impletur. Quemadmodum terra stercoreata hyeme calida est, ita etiam ventriculus. Arbores corticem tenuem siccum habent, intrinsecus autem carne sicca, sanæ, non putridæ, diuturnæ. Ita & ex animalibus testudines, & quicquid eiusmodi est. Aetatibus, temporibus, annis, similia animalia, non deteruntur si moderatè melioribus vtantur. Quemadmodum hydria quod recens est transmittit, quod inueteratum retinet. Sic & ventriculus transmittit alimētum, & fecem retinet, velut vasculum. Modi morborum hi sunt, partim quidem cognati sunt, de quibus interrogando discere oportet: partim à regione, familiares enim sunt per multas, & multi ipsos noscunt: partim ex corpore, & victus ratione,

patiantur.

Molæ dentes collisi molestant.

Quæ crurū tremorem,

et pallorem faciunt.

Quæ foris uel intus efficiant.

Terra saluta, ventriculus animalia nutrit.

Ventriculus qualitas.

Quid animalia tuentur.

Morborum natura.

3^o q^u 4

*Morborum
quorundam
causæ.*

*Bilis per
æstatem
quid faciat.*

*Ventorum
qualitas.*

*Magna uē
torum cæ
etatumq^{ue}
rerum ob*

tionem, ac temperiei constitutionem, aut à temporibus. At re- D
giones ad tēpora malè dispositæ, tales morbos pariunt, qua-
li tempori similes fuerint. Verbi gratia. Inæqualis calor aut
frigus eadem die quum talia fuerint, morbos autumnales fa-
ciunt. Et in alijs temporibus secundum rationem, alij ab
odoribus cœnosis aut palustribus: alij ab aquis, calculosi, sple-
nici: alij à ventis bonis & malis incipiunt. Qualia verò sunt
tempora tales erunt etiam morbi, & constitutiones ex ipsis.
Si tempora tempestiue, & ordinate se habuerint, morbos iu-
dicatu faciles faciunt. Vernaculi autem temporum morbi iu-
dicant mutationes, & prout euariauerit tempus, similes aut
dissimiles erunt morbi, qui in hoc tempore oriuntur. Si ve-
rò similiter procedat, eiusmodi quoque fuerint morbi, & ad E
talem modum tracti, veluti est morbus regius autumnalis.
Frigora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et si æstas bi-
liosa fiat, & bilis aucta intus relinquatur, etiā aliquantū sple-
nici fient. Quum igitur & Ver sic processerit, etiam vere fit
morbus regius. Proximus est enim hic motus tempori, iuxta
hanc speciem. Quum verò æstas fiat verisimilis, sudores in
febris, & febres faciles, & non peracutæ, neque linguis
obaridæ fient. Si verò hybernū fiat ver, & postremū hyemis
tempus, hybernī etiam morbi, & tussēs, & perinēumonix,
& angina. Et autumnus si non in tempore ac derepente hy-
bernari, non assidue, tales morbos facit, eo quod nō in tem-
pore incepit, sed inæqualiter fit. Quapropter etiam tempo-
ra à iudicatione aliena ac inconstantia fiunt: quemadmo- F
dum etiam morbi, si prærumpan, aut præexcernantur, aut
intus relinquuntur. Recidivas enim etiam tempora faciunt,
quemadmodum & morbos ita inducunt. Itaque insuper con-
siderandum est, quomodo habentia se corpora tempora sus-
cipiant. Austri auditum grauant, caliginem inducunt cap-
ut grauant, tropidi sunt, dissolunt. Quum hic præualue-
rit, talia in morbis patiuntur, vlcera glabra, maxime os, pu-
dendum, & aliæ partes. Si verò aquilo, tussēs, faucium affe-
ctiones, ventres duriore, urinæ difficultates, horrores, do-
lores laterum ac pectoris. Quum hic dominatur, tales mor-
bos magis expectare oportet. Si magis redūdauerit, ad squa-
lores sequuntur febres itemque ad pluuias, ex quibus tan-
dem redundantæ transmutatæ fuerint, & quomodocunque
habentia

- A** habentia se corpora ex alio tempore susceperint, & quocunque tandem humore in corpore dominante. Cæterum siccitates & austrinæ sunt, & Aquilonares. Differunt enim & alia hoc modo. Magnū enim, & hoc est. Nā alius in alio tempore ac regione magnus est. Veluti Aestas bilem parit, Ver sanguinem, reliqua prout singula. Mutationes maximè pariunt morbos, & præsertim maximæ: & in tēporibus magnæ mutationes, & in alijs. Quædam sensim fiēte progressu fiunt. Tempora huiusmodi sunt securissima, velut etiam diætæ, & frigus, & calor maximè sensim facto progressu. Et ætates sic transmutantur. Naturæ quantum ad tempora attinet, aliæ ad ætatem, aliæ ad hyemem, bene aut malè dispositæ sunt. *Billis per æstate, sanguis per uer uiget. Temporū mutationes quantum possint.*
- B** Quantum verò ad regiones, & ætates, & victus rationem, & alias morborum cōstitutiones, aliæ ad alias bene aut malè se habent. Et ætates ad tempora, & regiones, & victus rationem, & morborum constitutiones. Et in temporibus, victus, & cibi, & potus, qualitatem suam requirunt. Nam hyems ab operibus ocium habet, & quæ in corpus ingeruntur matura ac simplicia postulat. Magnū enim & hoc est. Autumnus autem laboribus deditus. Sub insolationibus potus frequentes sunt cibi inconstantes, vina, arborum fructus. Quemadmodum autem ex temporibus morbos coniectare datur, ita quandoque etiam ex morbis aquas, & ventos, & siccitates prænosce licet, & aquilonares, & austrinas. Licet autem ei qui probè ac rectè didicit, vnde sint hæc consideranda, velut & lepræ quædam, & circa articulos dolores. *Posse et ex morbis & ex anni tēporibus & tempestatibus omnia præiuderi.*
- C** Aquæ ubi futuræ sunt, pruriginosi sunt, & alia huiusmodi. Et quæ pluuiæ alternis, aut singulis diebus, aut per alios circuitus, aut assiduæ fiēt. Et venti aliqui per multos dies flant, & cōtrario inter se modo flant, alij per pauciores. Et iidem per circuitum. Hæc habet cum temporum cōstitutionibus similitudines. Verū breuius talia. Si verò annus diutius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, tales etiā morbi diutius erunt. Et si magis fortes fuerint, maximi quoq; morbi fiēt, & cōmunissimi, & ad plurimū tēpus. Ex primis aquis, ubi post multā siccitatē, aqua futura est, de aqua inter cutem prædicere licet: & ubi talia parua signa apparuerint in ventorū quiete, in transmutatione. Colligēdi igitur sunt quæ in qualibet aquis aut vêtis morbi significāt, & audiendus est si quis nouit,
- Hydropū coniectasse*

HIPPOCRATIS LIBER

nouit, quod tali hyeme prægressa, tale ver aut æstas erit. D

Colores non sunt similes in temporibus, neque in aquilonaribus, neque in austrinis, neque in ætatibus, neque in vnoquoque ad seipsum, neque in alio ad alium. Considerandum autem est ex his quæ præsentia ac quietæcilia nouimus de coloribus, & quod ætates temporibus similes sunt, & colore, & mutatione. Qui hæmorrhoidas habent neq; pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neq; tuberculis terebinthi figurâ habentibus corripuntur. Fortassis autem neque lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen tempestiuè curati, non tardè correpti sunt, & sic perniciosæ fuerunt. Et quicunq; alij abscessus, velut fistulæ, aliorum medela sunt. Quæ ubi insuper comparent sedare solent, ea prius fientia impedimenta ab his liberant. Alterius loci morbos loca excipientia, aut dolore, aut grauitate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod alijs sunt E
communicationes. Propter inclinationem nō amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem talia spūunt, conuenit quibusdam sanguinē detrahare tempestiuè in talibus, in alijs autem velut in his, non hoc conuenit. Impedimentum in spūentibus cruenta, tempus anni pleuritis, bilis. Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua fit, & pro ratione recidiuarum, recidiua fiente, rursus intumescūt, & permanent, quemadmodum febrium recidiuarum, in simili circuitu: in his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si verò ultra hoc, etiam sanguis è naribus largè eruperit etiam valde. Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est, quietior erat. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat. F

Vrina crassa alba quid faciat.

Archigenes.

HIPPO

A HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MORBO SA-

CRO, IANO CORNARIO ME-

DICO NPHYSICO

interprete.

*

Non Genuinū Hippocratis, sed memorabilis tamē uiri, hunc librum Galenus esse dicit, tum quod ad dictionem, tum quod ad sententiam atinet. Hippocratis autem neque dicendi modum, neque sententiarum acumen in ipso esse.

B



E morbo sacro appellato sic se res habet. Nulla re videtur mihi alijs diuinior esse morbis. neque sacratior. Verum naturam habet quam etiam reliqui morbi, vnde fit. Homines verò naturam & causam eius diuinā esse putauerunt, præ inexperientia & admiratione, propterea quòd reliquis

morbis nulla re similis est, & per inopiam quidem quòd nō cognoscunt, diuinjtas ipsi conseruatur. Per abundantiam verò & parabilem modum sanationis medentur. Exoluuntur enim aut expiationibus aut incantamētis. Si verò propter admirationem diuinitus censetur, multi morbi sacri erunt, & non vnus, quemadmodum ego demonstrabo etiam alios nihil minus admirabiles, neq; minus monstrosos, quos nemo sacros esse censet. Primū etenim febres quotidianæ, & tertianæ, & quartanæ, nihil minus mihi sacri esse videntur, nec minus à deo fieri quàm hic morbus, etiam si nihil admirabile habeāt. Deinde video insanos homines & delirantes à nulla manifesta causā, & multa & simul importuna facere, vndiq; multos in somno plorare ac vociferari, alios verò suffocari, alios exilire & foras fugere, atq; ita delirare donec experscūtur. postea autē etiam sanos esse ac sapientes velut prius, esseq; ipsos pallidos ac debiles, atq; hæc non semel, sed sæpe, alijq; multi sunt ac omnigeni morbi, in quibus singulis recensendis in longū sermo, extenderetur. Cæterū qui primi

Comitiales morbus.

Cur hoc malum non magis diuinum quàm alia putandum sit.

Quid cetera faciant.

HIPPOCRATIS LIBER

Magi.

*Quæ uela
vnt.*

*que carnes
alium partem
ant*

*Libes cur
non sanantur
tur ab hoc
morbo.*

hunc morbum sacrum esse pronunciauerunt, tales homines D
mihi fuisse videntur, quales etiam nunc sunt magi & expia-
tores & circulatores, & quidam arrogantes, qui se vehementer
pios esse simulant, & amplius quid scire. Hi itaque consilij ac
mentis inopia obuelantes ac prætexentes diuinitatē, quum
nihil haberent quod exhibitū prodesset, ut ne manifesta fie-
ret ipsorum ignorantia, sacram hanc affectionē esse pronun-
ciarunt, & rationibus idoneis collectis, curationem cōstitue-
runt sibi ipsis securam, expiamenta offerentes & incātamen-
ta, & à balneis abstinere iubētes, & à cibis multis ac ineptis
ad hominum agrotorū esum, velut ex marinis quidē à mul-
lo, & melanuro, mugiliq; ac anguilla, hi enim pisces oppor-
tunē haberi possunt. Ex carnibus uero à caprina, ceruina, suil E
la, ac canina. Hæc enim carnes maximē aluum turbant. Ex vo-
lucris autem, à gallo & turtura ac otide, insuperq; ab his
quæ robustissimæ esse censentur. Ex oleribus à mētha, allio,
ac cepa. Nihil enim acre infirmo conducit. Pallium præterea
nigrum habendū nō esse præcepere. Niger enim color mor-
talis est. Neq; in caprina pelle decubēdum esse, neque ean-
dem gestare oportere, neq; pedem supra pedem habendum
esse, neque manum supra manum. Hæc enim omnia curatio-
nis impedimenta esse, Omnia autē hæc diuinitatis gratia ap-
ponunt, velut amplius quid scientes, & alios prætextus pro-
ferentes, quo si sanus æger euadat, ipsis gloria & dexterarū
adscribatur, sin moriatur, in tuto positæ sint ipsorum excusatio-
nes, habeantq; prætextū quod non ipsi sint in causa sed dei. F
Neque enim medicamentum aliquod edendum aut biben-
dum exhibuerunt, neq; balineis incoxerunt, ut ipsi in causa
esse videri possint. Mihi autē videtur nullū ex his qui medi-
terranea Africa inhabitāt sanum esse posse, propterea quod
caprinis pellibus accarnibus vtuntur, quum neque stratum,
neque pallium, neq; calceamentum habeant, quod non sit ca-
prinū. Non enim alia vlla ipsis sunt pecora præter capras &
boues. Si autem hæc admota & comesta morbum augent, &
non comesta sanant, nō est sanē deus alicuius autor aut caus-
sa, neque profunt expiamenta, sed edulia sunt quæ & sanant
& lædunt. Numinis uero vis dissipatur. Sic igitur mihi vidē-
tur hi qui hoc modo hos morbos curare aggrediuntur, neq;
sacros ipsos putare, neq; diuinos. Vbi enim præ talibus expia-
mentis

A mentis ac tali curatione transmutantur, quid verat etiā prae alijs artibus similibus illis, & discedere ab hominibus & accedere? Quare nō deus autor est, sed aliquid humanū. Quisquis enim lustrationibus & magicis incantamentis talē affectionem abducere potēs est, is etiā alijs artibus abduxerit, & ex hac ratione diuinitatis opinio penitus pessumit. Talia itaq; dicētes ac excogitātes, ampliūs quid se scire simulāt, & homines decipiūt, proponētes his lustrationes ac purificationes, quum verba ipsorum magna ex parte se ad deum ac dæmonium extendant. Atqui mihi sanē nō de pietate verba facere vidētur, velut ipsi putāt, sed potius de impietate, & quod dei non sunt, pietasq; ac diuinitas ipsorū impia est ac scelerata, velut ego docebo. Si enim & lunā abolere, & solem obscurare, tempestatemq; ac serenitatem facere, pluias item ac siccitates, & mare sterile itemq; terram, & aliā huiusce modi omnia, se scire profitentur, siue ex sacrorum mysterijs, siue ex alia quadam professione aut meditatione, hāc potentiam iactent, qui talia studio habēt, impij sanē mihi esse videntur, & deos nō esse putare, neq; si sint, aliquid posse, neq; vllum aliquod etiā extremū malum prohibere. Quod quum faciāt, quomodo nō ipsis infesti sint? Si enim homo incantamentis ac sacrificijs vtens, & lunam abolebit, & solem obscurabit, & tempestatem ac serenitatem faciet, non vtique ego horum aliquid diuinum esse putauerim, sed humanum, si sanē diuinitatis potentia ab humana voluntate superatur, & in seruitutē redacta est: fortassis autē hec non hoc se modo habēt, sed homines victus indigni multa & omnigena moliuntur & euariant, tum in alia omnia, tum in hūc morbū, in singulis affectionis speciebus causam deo adscribentes. Non enim semel, sed sæpius eorundem mentionē faciunt. Siquidem enim capras imitentur, & si balatum edant, & frendant, & si dextris partibus cōuellantur, Matrem deorum causam esse aiunt. Si verō acutiorem & concitatiorem sonum emittant, equo assimulant, & Neptunum autorem esse dicunt. Si verō etiam aliquid stercoreis emittant, quod sæpe quibusdam contingit prae morbo coactis, Hecates enodix appellatio additur. Si autem tenuiorem & densiorem vocem edant, velut auiculæ, Apollo Nomius, id est pastor, si verō spumam ex ore remittant, ac pedibus calcitrent, Mars causam habet. Qui-

*Quare non
diuinū ma-
lum hoc sit.*

*Quales ue-
nefici.*

*Quare hæc
fingantur.*

*Quibus dijs
hæc tribuāt.
Apollo
Nomius.*

HIPPOCRATIS LIBER

cunque porrò pauores noctu ingruūt, timoresque ac deliria, D
& exsultationes e lecto, terroresque ac fugæ foras, Hecates in-
sidias esse dicunt, & heroum insultus, expiamentisque vtun-
tur ac incantamentis, & scelestissimum ac impijssimum, meo
sanè iudicio, faciunt numen. Expiant enim morbo correptos
sanguine, itemque alijs sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut
ab hominibus intoxicatos, aut qui scelestum aliquod facinus
perpetrarunt, quos contraria his facere oportebat, sacrificare
nimirum ac precari, & ad templa progressos dijs supplicare.
Nunc verò horum quidem nihil faciūt, verū expiant, & alia
expiamenta terra occultant, alia in mare proiciunt, alia ad
montes deferunt, vbi nemo attingat, neque conculcet. Opor-
tebat autem ea ad templa deferre ac deo contribuere, si qui- E
dem deus est author, Non tamē ego puto hominis corpus à
deo inquinari, sordidissimum scilicet à purissimo. Verū
etiā si cōtingat ab alio inquinari, aut quid perpeti, cupierit
vtique à deo purgari ac purificari magis quàm inquinari.
Deus itaque est qui maximā ac sceleratissima peccata purgat
ac purificat, & liberatio nostra existit, ipsique terminos tēplo-
rum ac delubrorū dijs designamus, vt nullus qui nō purus sit
eos transcendat, & ingressi respergimur, nō velut qui inqui-
nemur, sed si quod etiam prius scelus habemus purificemur.
Et de expiationibus quidem sic se res habere mihi videtur.
Hic verò morbus nulla re diuinior reliquis mihi esse vide-
tur. Sed naturā habet, quā etiam alij morbi, & causā vnde
singuli gignuntur. Naturā autē & causā, ab eodē deū fieri, F
à quo etiam alia omnia. Et sanabilis esse mihi videtur nihilo
minus quàm alij, nisi iam præ tēporis longitudine inualue-
rit, vt fortior sit medicamentis quæ adhibentur. Incipit autē
velut etiam alij morbi secundum genus. Si enim ex pituitoso
pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex tabido tabidus,
& ex splenico siue lienoso lienosus: quid prohibet vt cuius
pater & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorum
ac nepotū aliquis eo corripiatur? Semen enim genitale ab o-
mnibus corporis partibus procedit, à sanis sanū, à morbidis
morbofum. Aliud porrò signū magnum est, quod nihilo di-
uinior reliquis sit morbis: pituitotus enim natura oboritur,
biliosus verò nō accidit. Atqui si diuinior est reliquis, simili-
ter omnibus morbū hunc fieri oportebat, & nō discriminē fa-
cere

*Malum hoc
medicabile.*

*Pituitosus
tantū comi-
tialis mor-
bus uexat.*

A cere inter biliosos ac pituitosos. Sed enim ipsis cerebrum aut tor est & causa huius affectionis, velut etiam aliorum maximum morborum. Quo vero modo, & ex qua causa fiat, ego manifeste docebo. Cerebrum hominis duplex est, quemadmodum etiam alijs omnibus animalibus. Medium autem ipsius diuidit membrana tenuis. Quapropter non semper eandem capitis partem dolet, sed particulatim utramvis, aliquando verò totum. Sed & venæ in ipsum tendunt ex vniuerso corpore. multa & tenues, duæ verò crassæ, altera ab hepate, altera de liene. Et quæ quidem ab hepate venit, hoc modo se habet.

*Cerebrū hō
minis du-
plex.*

Venæ duæ.

Alterā quidem venæ pars deorsum tendit, per partes ad dextram, iuxta ipsum rhenum ac lumbum, ad internam semoris partem, & descendit in pedem, & vocatur vena cava. Altera verò sursum tendit per venas dexteræ ac pulmonis, finditur autem & in cor, & in brachium dextrum. Reliquum verò sursum fertur per claviculam ad dextram cervicis partem, ad ipsam cutem, ut conspicua fiat. Iuxta autem verò occultatur. Atque hic finditur, & crassissima quidem ac maxima & caussima ipsius pars, in cerebrum definit: alia verò pars in aurem dextram, quæ sanè venula tenuis est, alia autem in oculum dextrum, alia in ipsum nasum. Atque sic quidem venæ ab hepate habent. Tendit autem & à liene vena in sinistra sursum ac deorsum, velut ab hepate, verum tenuior & imbecillior. Cæterum in has venas etiam spiritus copiam inducimus. Hæ enim corporis nostri respirationes sunt, aerem in seipsas trahentes, & in reliquum corpus ac venulas deriuantes, refrigerantque ac rursus dimittunt. Non enim possibile est spiritum stare, sed procedit sursum ac deorsum. Si enim alicubi constiterit ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars ubi constiterit. Cuius rei signum hoc est. Quum enim desidens aut decumbens venulæ compressæ fuerint, ut spiritus à vena non discurrat, statim torpor occupat. Et de venis quidem reliquis sic habet. At verò morbus ipse fit in pituitosis, in biliosis verò non. Incipit autem fieri in fœtu adhuc in utero existente. Purgatur enim & florescit cerebrum, velut etiam aliæ partes prius quam gignatur. In hac autem purgatione, si quidem probe ac moderatè purgatum fuerit, & neque plus neque minus quam oportet defluerit, hic fœtus sanissimum caput habebit. Si autem amplior colliquatio à toto cerebro

Vena iecoris.

Vena lienis.

*Cerebrū in
utero purga-
tur.*

Tinnitus aurium unde. facta fuerit, morbosum caput augescens fœtus habebit, & sonitu plenum, & neque solem, neque frigus tolerabit. Si verò ab vna aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo, aut ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic afficitur qualiter sanè colliquatio contigerit. Si verò purgatio non contingat, sed in cerebro spissetur ac cogatur, sic necesse est fœtus pituitosos esse. Et quibuscunque quidem *Vlcera & pustula pro sunt pueris.* pueris existentibus erumpunt vlcera in caput, & in aures, ac in reliquum corpus, & qui saliuosi sunt ac mucosi, hi ipsi progressu ætatis facilius degunt: hic enim abit ac purgatur pituita, quam in vtero purgari oportebat, & qui sic purgati fuerint, comitiali siue sacro morbo ferè non apprehenduntur. Qui verò mundi sunt, & neque vlcus vllum, neque

qui xeroci sunt veri sunt & viculosi tremuli & abberosi sunt hoc de malo & xerici sunt

mucus, neque saliuua vlla prodit, neque in vteris purgationem fecerunt, talibus periculum imminet, vt ab hoc morbo corripiantur. Si porò ad cor progressum fecerit defluxus, tremor apprehendit & anhelationes, & pectora corrumuntur, aliqui verò etiam incurui fiunt. Quum enim descendit pituita frigida ad pulmonem aut ad cor, perfrigeratur sanguis. Venæ autem violenter perfrigerata, ad pulmonem & cor asiliunt, & cor tremore concutitur, vt præ hac necessitate anhelationes incidant, & spiratio ceruice erecta. Non enim spiritum suscipere potest, donec id quod influxit à sanguine fuerit superatum, & calefactum in venas fuerit diffusum. Deinde & tremor & anhelatio sedatur. sedatur autem prout copia eius fuerit, Si enim amplius influxerit tardius: sin minus, citius. Et siquidem densiores ac crebriores fuerint defluxus, crebrius comitiali morbo corripitur: sin minus, rarius. Hec itaque perpetitur homo si ad pulmonem ac cor fluxus processerit. Si verò in ventrem, profluentia alui apprehendunt. Si verò ab his vijs exclusus fuerit, & in venas quas dixi defluxum fecerit, mutus fit & suffocatur, & spuma ex ore effluit, & dentes constringuntur, & manus conuuluntur, & oculi distorquentur, & nihil sapiunt, aliquibus etiam sterces inferne secedit. Atque hæc sunt aliquando in sinistra, aliquando in dextra, aliquando vtrinque. Quomodo verò singula hæc perpetiatur ego narrabo. Mutus quidem est, quum pituita derepente in venas delapsa, ærem excluderit, & non admiserit neque in cerebrum, neque in venas cauas neque

Diversi sunt morbi affectus.

Cur mutescant.

A uas neq; in ventriculos, sed occupat respirationem. Quum enim accipit homo per os & nares spiritum, primum quidē ad cerebrum venit, deinde verò in ventriculum magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad venas. Ex his verò ad reliquas partes in venas dispergitur, & quantum quidem eius ad ventriculum venit, perfrigerat, & nihil aliud confert. Idem præstat & quod ad pulmonem venit. Qui verò ad venas peruenit aer, confert ad ventriculos ingressus & ad cerebrum. Atq; sic sapientiam & motū membris exhibet. Quare ubi fuerit exclusus à venis aer præ pituita, eumq; non susceperint, mutum ac desipientem hominem reddunt. At verò manus impotentes sunt ac conuelluntur, sanguine quiescente & dum non diffunditur velut solebat. Oculi quoque distorquentur aere à venis excluso, & conuoluntur. Spuma vero ex ore prodeit ex pulmone. Quum enim spiritus nō ingreditur in ipsum, spumescit & ebullit velut moriens. Stercus verò subit dum violenter suffocatur. Suffocatur autem, hepate & vētre sursum ad septum transversum irruentibus. & stomacho ventris concluso. Irruunt autem, quum tantum spiritus in os non ingreditur quantum solebat. Calcitratur autem pedibus, quum aer in membris conclusus fuerit, & foras penetrare non poterit præ pituita, verum exiliens per sanguinem sursum ac deorsum, conuulsionem ac dolorem inducit, & propterea sanè calcitratur. Porro omnia hæc perpetitur, quum pituita frigida defluerit in sanguinem calidum existentem. Perfrigerat enim & sistit sanguinem. Et si quidem fluxus multus fuerit ac crassus, statim occidit. Dominatur enim sanguini per frigus, ipsumq; congelat. Si verò paucior fuerit, in præsens quidem dominatur obturans respirationē. Deinde temporis progressu quum dispersus fuerit per venas & amixtus sanguini, multo existenti ac calido, si sic superatus fuerit, venæ aërem suscipiunt, atque ita agri resipiunt. Et quicumque quidem pueri parui hoc morbo corripiuntur, vtpurimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isque humidus existat. Venæ enim tenues existentes pituitam præ crassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed perfrigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur. Si verò modica existens pituita in vtrasque venas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superuiuiunt, nota ex morbo im-

*Cur oculi
distorquens
tur.*

*Cur os spu
mescat.*

Cur sterces.

*Cur præso
cetur.*

*Cur calcit
renat.*

*Cur infan
tes hic mor
bus necat.*

HIPPOCRATIS LIBER

pressa relicta. aut enim os conuellitur, aut oculus, aut cernix, **D**
aut manus, vbicunq; sanè vena pituita repleta superata fue-
rit & gracilis reddita. Hanc itaq; venam necesse est debilio-
rem esse, & hanc corporis partem lesam defectuosiore. Ve-
rùm ad longius tempus pleiùq; prodest. Non enim amplius
morbo apprehèditur, si semel notam impressam susceperit.
Quapropter necessariò etiam reliquæ venæ affliguntur, ac
partim simul gracilescunt, vt aërem quidem suscipiant, pitui-
tæ autem defluxus non amplius similiter illabatur. Debilio-
ra tamen similiter membra esse verisimile est venis afflictiis.
Quibuscunq; autem imperfectis & valde modica pituita de-
fluxerit, & ea in dextras partes, hi citra notæ impressionem
superuiuant, verùm periculum est ne morbus connutriatur, **E**
ac simul augescat, si non his quæ commoda sunt curentur.
Pueris quidem igitur sic fit hic morbus, aut quàm prope
huic modo. Seniores verò non occidit si accedat, neque dis-
torquet. Nam & venæ sunt caux, & sanguinæ calido refer-
ta, quapropter neque superare potest pituita, neq; perfrige-
rare sanguinem vt congelet ipsum, sed ipsa superatur, an san-
guini cito ammiscetur. atque sic venæ aërem suscipiunt, &
sapientia contingit, signaq; prædicta minus inuadunt pro-
pter fortitudinem. At verò antiquissimis si hic morbus
accedat, propterea ipsos occidit, aut leuiter sideratos facit,
quia venæ ipsis sunt euacuata, & sanguis modicus est ac te-
nuis & aquosus. Si igitur multum defluxerit, & hyemis tē-
pus fuerit, occidit. Suffocat enim respiraciones, & sangui- **F**
nem congelat, si in vtranque partem defluxus fiat. Si ve-
rò in alteram tantum, leuiter sideratum facit. Non enim
potest sanguis pituitam superare, quum tenuis sit frigidusq;
ac modicus, sed ipse superatus congelatur, vt impotentes
fiant illæ partes iuxta quas sanguis fuerit corruptus. Ad dex-
tras autem magis defluit quàm ad sinistras, quia venæ sunt
cauiore & plures quàm in sinistris. Ab hepate enim tēdunt
& liene. Defluit autem & eliquatur pueris maximè, qui-
bus sanè caput fuerit percalefactum, siue à sole, siue ab igne,
siue etiam de repente inhorruerit cerebrum, etiam tunc pi-
uita secernetur. Eliquatur etenim per calorem ac cerebri
diffusionem, segregatur autem à frigore ac concretionem, &
sic defluit. Et quibusdam quidem defluxionis causa hæc est.

Alijs

*Cur adul-
tos non tol-
lit.*

*Cur senes
perimit uel
siderat.*

*Cur dex-
trā partem
potius ue-
ret hic mor-
bus.*

A Alijs verò etiam vbi derepente post aquilonares ventos au-
ster flare coeperit, compactum ac debile cerebrum derepen-
te soluit ac laxat, vt pituita redundet, & sic defluxum facit.
Defluit insuper & ex ignoto timore, si quidem timuerint
aut aliquo vociferante, aut inter plorandum spiritum cito
reuocare non potuerint, id quod pueris frequenter contin-
gere solet. Quicquid sane horum ipsorum acciderit, statim
horret corpus, & ager mutus factus spiritum non trahit, sed
spiritus quiescit, & cerebrum compingitur, & sanguis consi-
stit, & sic secernitur ac defluit pituita. Et pueris quidem hæ
ipsæ causæ sunt, vt ab initio à sacro morbo corripiantur.
At verò senibus hyems infectissima est. Quæ enim ad mul-
B tum ignem senex caput & cerebrum percalfecerit, deinde
in frigore versatus fuerit ac inhorruerit, & ex frigore ad te-
porem accesserit, & ad ignem defecerit, idem hoc patitur, ac
sic à morbo sacro apprehenditur iuxta prædictum modum.
Periculum verò multum est vt & Vere patientur idem hoc,
si caput fuerit insolatum. Minimè autem æstate, non enim
sunt repentinæ mutationes. Postquam verò viginti an-
ni præterierint, non amplius hic morbus corripit: præ-
terquam paucos aut nullum, nisi ex puero connutritus fue-
rit. Venæ enim plenæ sunt, & cerebrum compactum est, &
acerbum ac rigidum, quare non defluit in venas: si verò de-
fluxerit, sanguinem non superat multum ac calidum existen-
tem. In quo vero à puero augmentum cepit ac connutritus
C est, in eo per consuetudinem facit vt in mutationibus vento-
rum patiatur, & vtpurimum morbo sacro corripiatur, præ-
cipue australi ac humida aëris constitutione. Et liberatio dif-
ficulter contingit. Cerebrum enim humidius quàm ex na-
tura sit, & præ pituita inundat, vt defluxiones quidem fre-
quentiores fiant, non autem amplius possibile sit pituitam
excerni, neque cerebrum resiccare, sed perrigatur & humidum
existit. Cognouerit autem hoc ipsum quis maximè ex o-
uibus hoc morbo correptis, & præsertim capris, Hæ enim
frequentissime corripiuntur. Si enim caput ipsarum disse-
cueris, reperiēs cerebrum humidum esse, & sudore refertū,
ac male olens. Et in hoc nimirum cognosces quòd non Deus
corpus affligit, sed morbus. Sic verò se res habet etiam in ho-
mine. Quum enim ætatem adeptus fuerit morbus, non am-

*Cur nec pe-
riculosum
sit.*

*Oues & ca-
præ comi-
uales.*

Comitialis

HIPPOCRATIS LIBER

*inucteratus
nō sanatur.* plius curabilis est, cerebrum enim eroditur à pituita ac col- D
liquatur. Id verò quod colliquatur, aqua fit, & foris cerebrū

*Quid casu
nagam.* ambit ac circunalluit, & propterea frequentius ac facilius à
morbo hoc corripiuntur. Propterea verò diuturnus est mor-
bus, quia id quod influit venis tenue est præ multitudine, &
statim superatur à sanguine ac calescit. Quicumque verò
iam assueti sunt morbo, præcognoscunt se corripiendos, &
ex hominum frequentia fugiunt, si domus ipsorum in pro-
pinquo fuerit, ad domum: sin minus, in locum desolatisimū,
vbi quàm paucissimi ipsos lapsos sint visuri, statimq; se ob-
uelant, idq; faciunt præ pudore affectionis, non præ timo-
re, uelut multi putant, dæmonij. At verò pueri primū qui
dem cadunt vbiunque tandem contigerit præ inassuetudi- E
ne, Quum autem sæpius à morbo corripiantur, postquā præ-
senserint cōfugiunt ad matres, aut ad alium maxime notum,
præ timore ac formidine affectionis. verecundari enim pue-
ri nondum sciunt. Cæterum in mutationibus ventorū pro-

*Quid vento-
rum muta-
tio possit.* preterea morbo sacro corripere censeo, maxime quidem austrini-
nis, postea verò etiam aquilonaribus, deinde etiam reliquis
ventis, hi autem sunt qui fortissimi ex ipsis existunt, & inter
se tum statione, tum viribus contrarijssimi. Etenim aquilo
compingit aërem, & turbatū ac nubilosum excernit, & illu-
striorem ac pellucidum facit. Eodem modo etiā alij omnes
venti ex mari ac alijs aquis proficiscētes. Ex omnibus enim
rebus, atque adeo ex ipsis hominibus humiditatem ac tene-
brositatem excernunt. Quapropter saluberrimus omnium ven- F
torum aquilo existit. Auster autem contraria huic operatur.

*Aquilo
qualis, &
auster.*

primū enim incipit aërem compactum liquare ac diffun-
dere, quapropter etiam non statim magnus spirat, sed primū
lentus ac lenis est, quoniam aërem statim superare non po-
test, qui prius densus est & compactus, sed temporis progres-
su ipsum dissoluit. Idem porro hoc etiam in terrā operatur
& in mare, fluuiosq; ac fontes & puteos, & quæ ex terra na-
scuntur, & in quibus humor inest. Est autem in omni, in alio
plus, in alio minus. Omnia autem hæc ventum hunc sentiūt,
& ex splendidis tenebrosa sūt, & ex frigidis calida, & ex sic-
cis humida. Et quæcunq; in domibus vasa iuxta terram sunt
cum vino aut alio quopiam liquore, ea omnia austrū sentiūt,
& formam in aliam speciem transmutant. Solem verò & lunā
ac syd

A ac sydera multò hebetiora quàm ex natura sunt reddit. *Mutatio*

Quum igitur etiam his quæ adeò magna sunt ac fortia in-
 tantum dominetur, & corpus sentire faciat, vt ex horum ven-
 torum alterationibus trāsmutetur, necesse est ab austris qui-
 dem solui ac humectari cerebrū, & venas laxiores reddi, ab
 aquilonis verò flatibus, quòd sanissimū est in cerebro com-
 pingi, quod verò morbosissimum ac humidissimū est excer-
 ni, & forinsecus circunalluere, atque sic defluxus in horum
 ventorum mutationibus succedere. Hoc modo hic morbus

fit & floret, tum ab accedentibus, tum à decedentibus, & nul-
 latenus difficilior aut cognitu aut curatu est quàm alij, neq;
 etiam diuiniore alij. Porro expedit homines nosse, quòd ex
 nulla alia nobis parte voluptates contingunt, & lætitiæ, &

B risus & lusus, quàm ex cerebro. Itemque mœrores & anxie-
 tates tristitiæque ac eiulatus & querelæ. Et hoc sapimus ma-
 ximè ac intelligimus, & videmus & audimus, & cognosci-
 mus turpia & honesta, mala & bona, iucunda & iniucunda,
 partim consuetudine discernētes, partim vtilitate percipien-
 tes. Eodem voluptates & iniucunditates pro opportunitate
 dinoscimus, & non eadem nobis placent. Eodem & insani-
 mus & deliramus, & terrores & timores nobis accedunt, par-
 tim noctu, partim interdiu, & insomnia, & errores intempe-
 stiui, & curæ inanes, & vt non noscamus adstantes, & desue-
 tudo, & inesperienza. Atque hæc omnia perpetimur à ce-
 rebro, quum sanum non fuerit, sed aut calidius quàm ex na-
 tura fiat, aut frigidius, aut humidius, aut siccus, aut aliud

C quid perpetiatur præter naturam, & consuetudinem. Et insa-
 nimus quidem præ humiditate. Quum enim humidius fue-
 rit quàm pro natura, necesse est moueri. vbi verò mouetur af-
 fectio, necesse est neque visum quiescere, neque auditum, sed
 alias aliud videre & audire, & linguam talia dicere qualia
 semper ac singulis vicibus viderit ac audierit. Quanto verò
 tempore cerebrum quieuerit, tantò etiam homo sapit. Fit au-
 tem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusq; cognitio sic
 contingit. Qui enim à pituita insaniunt, quieti sunt, & non
 vociferantur neque tumultuantur. Qui verò à bile, vocifera-
 tores sunt & malefici, & non quieti, semper aliquid intempe-
 stium faciētes. Si quidem igitur assidue insaniunt, hæc ipsis
 sunt causæ. Si verò terrores ac timores accedant, à cerebri

transmu

*Cerebrum
causâ om-
nium.*

*Cerebrum
quando sua-
riat.*

*Pituitosi bi-
liosiq; furo-
res quales.
Pauoris
causâ.*

HIPPOCRATIS LIBER

transmutatione id contingit, transmutatur autem dum cale-
scit, calefcit autem præ bile, vbi ad cerebrum impetum fece-
rit ex corpore per venas hæmatitidas hoc est sanguinarias
appellatas, & timor adest donec rursus redierit in venas ac
corpus, deinde quiescit. Angitur autem homo & inquietudi-
ne multa iactatur intempestiuè, dum cerebrum perfrige-
ratur, & præter consuetudinem compingitur. Hoc verò à pi-
tuita perpetitur, ab hac autem affectione etiam obliuiosus
eoadit. Noctu verò clamat & vociferatur, quum derepente
cerebrum percalefiat. hoc autem perpetiuntur biliosi: pitui-
tosi enim non percalefiunt: quum sanguis multus ad cerebrū
peruenerit & effluerit, venit autem per venas prædictas:
Quum contigerit vt homo videat in somnium horrendum,
& in timore fuerit, velut etiam si vigilet, tunc magis facies
ignescit, & oculi rubescunt, quū timuerit, & mens meditatur
aliquid mali operari, sic etiā in somno patitur. Vbi verò ex-
pergefactus fuerit, & resipuerit, atque sanguis rursus in ve-
nas prædictas dispersus fuerit, quiescit. Et propterea iudico
cerebrum vim plurimam in homine habere. Hoc enim est
nobis eorum quæ ab aëre fiunt interpret, si sanum fuerit. Sa-
pientiam autem ipsi exhibet aër. Oculi verò & aures & lin-
gua, & manus & pedes, qualia cerebrum statuit ac cognoscit
taliam subministrant. Sapientia enim toti corpori contingit,
prout aëre participat. Ad intelligēciam verò internuncius
est cerebrum. Quum enim homo spiritum in seipsum attra-
xerit, primum quidem ad cerebrū peruenit, & sic ad reliquū
corpus aër dispergitur, relinquens in cerebro suum ipsius vi-
gorem, & quicquid prudens ac sapientia præditum fuerit. Si
enim in corpus primum perueniret, & posterius in cerebrū,
relicta in carnibus ac venis dinotione ac iudicio, ad cere-
brum calidus iam existens perueniret, & non sincerus ac pu-
rus, sed ammixto humore à carnibus & sanguine, vt non am-
plius exactè sincerus esset. Quapropter dico cerebrum intel-
ligentiæ ac prudentiæ internuncium ac interpretem esse.

*Obliuio un-
de & uoci-
feratio no-
cturna.*

*Spūs aëris
sapientiæ au-
ebor.*

*Cerebrum
prudēciam
præbet præ-
cordia nō.*

Cæterum præcordia aliàs fortuitum nomen apud Græcos
per consuetudinem habent, quum phrenes à sapientia dicta
videantur, reuera autem non, neque ex natura. Neq; ego sa-
nè noui quā vim habeant præcordia, vt sapiant & intelli-
gant, præterquā si homo ex improviso nimio gaudio per-
fundatur,

A fundatur, aut tristitia afficiatur, tunc sanè exiliunt & anxietatem exhibent præ tenuitate & quòd distenta sunt maxime in corpore, & ventriculum non habent ad quem suscipiant aut bonum, aut malum allabens, sed ab vtrisque his turbantur, propter naturæ debilitatem. Nam nullo sanè prius sentiunt ex his quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen & causam habent, Quemadmodum quæ ad cor sitæ sunt aures appellantur, quum nihil conferant ad auditum. Porro dicunt quidam quòd corde sapimus, & quòd hoc est quòd angitur, & quòd curam gerit, Verùm hoc nō ita se habet, sed conuellitur quidè velut præcordia, & magis etiā propter easdem causas. Ex omni enim corpore venæ ad ipsum tēdunt,

*Cor cur nō
sedes sapien
tiæ.*

B & cōclusiones habet vt sentiat, si quis dolor, aut collectio homini contingat. Necessè est enim & dum angitur, in horrere corpus ac distēdi, & si quis nimio gaudio perfundatur, idem pari. Quapropter cor quidem & præcordia maxime sentiūt, sapientia tamen minimè participant, sed omniū horum cerebrum causa est, quemadmodum igitur etiam prudentiam ac aërem omniū primū ex his quæ in corpore insunt percipit cerebrum, Sic etiam si qua mutatio fortior in aëre contingat, præ temporibus anni, etiam ipsum à seipso diuersum redditur in aëre. Etenim cerebrum propterea primū sentit, quia etiam morbi in ipsum irruūt acutissimi, & maximi, ac præcipuè lethales, & qui difficilem iudicationem habent apud inexpertos. Hic verò morbus sacer appellatus, ex ijs-

*Cordis præ
cordiorūq;
proprietates.*

C dem causis oritur, à quibus etiam reliqui, ab accedentibus nimirum ac decedentibus, velut frigore, sole, ventis, quæ & transmutātur, & nunquā quiescunt. Hæc autem sunt diuina. Quare nequaquam hunc morbum ab alijs discriminare oportet, neque reliquis morbis diuiniore putare, sed omnes diuinos omnesq; humanos. Naturam autem vnusquisq; habet & vim in seipso, & nullus nec auxilij nec remedij expertus est, & plerique his ipsis curantur, à quibus etiam nascuntur. Alterum enim alterius nutrimentum est, alterius verò pernicies ac afflictio. Hoc itaque Medicū nosse oportet, & temporis occasionem in singulis pernoscere, quòd alterum quidem per alimentum absoluet & augebit, alterū verò detrahet & minuet. Oportet autem tum in hoc morbo, tum in reliquis omnibus, nō augere morbos, sed festinare vt ipsos ex-

*Morbus sa
cer unde.*

022. 7. 1. 1. 1.

7

*Medicum
quæ scire
oporteat.*

teramus,

HIPPOCRATIS LIBER

teramus, id quod aduersissimum est morbo exhibendo, non D
quod amicum & familiare. A familiari enim & consueto flo-
ret ac augetur, ab aduerso uero & hostili perit & dissipatur.
Quisquis autem talem mutationem in hominibus nouit, &
humidum ac siccum facere potest hominem, calidum item
ac frigidum per dietam, hic utique & hunc morbum sana-
uerit, si occasionem eorum quæ conferunt pernoſcet, citra
expiamenta ac incantationes, citraque omnem aliam huius-
cemodi machinamentorum absurditatem.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS LI. E

BER PRIMVS, IANO COR-
NARIO MEDICO PHY-
SICO INTER-
PRETE.

*Quæ medi-
cus præſta-
re debeat.*



Vi de sanatione rectè inquirere velit, per-
cunctantiq; respondere, & contradicere re-
ctè, eum hæc animaduertere oportet. Pri-
mum quidem à quibus omnes morbi ho-
minibus fiunt. Deinde uerò qui morbi ne-
cessario ubi facti fuerint, aut longi sunt
aut breues, aut lethales aut non lethales,
aut aliquam corporis partem mutilent, aut non mutilent,
& qui postquam orti sunt dubij sint, an mala ab ipsis euen-
tura sunt, aut bona. Et à quibus morbis ad quales transitus
fiat: Et quæ per fortuitum successum medici ægrotos curan-
tes faciunt. Et quæ bona aut mala ægrotantes in morbis
perpetiuntur. Et quæ importunè aut dicuntur, aut fiunt à
medico ad ægrotum, aut ab ægrotato ad medicum. Et
quæ exactè fiunt ac dicuntur in arte. Et quæ recta in ipsa,
& quæ non recta. Et quòd ipsius principium, aut finis, aut
medium, aut aliud quid eiuscemodi demonstratum, quòd re-
ctè habet ut in ipsa sit, aut non sit. Et quæ parua & magna,
& multa

A & multa & pauca. Et quod omne in ipsa vnum est, & omnia quod vnum. Et quæ fieri possunt intelligereque ac dicere, & est. si opus sit, neque intelligere, neque dicere, neque facere. Et quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas, & quod opportunitas, & quod intempestiuitas, & quibus alijs artibus similis sit, & quibus nihil similis sit. Et de corpore, quod calidum sit aut frigidum, aut siccum aut humidum. Et quod forte aut debile, aut densum aut rarum. Et quæ multa, pauca sunt, aut in peius, aut in melius. Et quod honeste aut turpiter, aut tarde aut citò, aut recte aut non recte. Et quod malum supra malum fieri necesse est. Hac animo versantem obseruare oportet in sermonibus, quantum quis ab his delinquat, aut in dicendo aut percunctando, aut respondendo. Et an quæ multa sunt, pauca dicat, & an quæ impossibilia sunt, possibilia esse asserat. Et quicquid sanè etià aliud dixerit ac aberrarit, hac ratione obseruare oportet, & in contradictione aggredi & impetere. Morbi quidem igitur vniuersi sũt ex his quidem quæ in corpore insunt, tum à bile, tum à pituita. Ab externis verò, à laboribus & vulneribus. Sed & à calido & supercalefaciente, & à frigido ac superfrigefaciente, & sicco ac superresiccante, & ab humido ac superhumefacente. Et bilis quidè ac pituita vnà cum nascentibus gignuntur, & sunt in corpore aut plus, aut minus. Morbos autè exhibent, partim à cibis & potibus, partim à calido supercalefaciente, & à frigido superfrigefaciente. Necessitatem autem talia habet, ut fiant hæc quum ipsa sũt, velut verbi causa. In vulneribus eos qui crassos nervos fauciatis habent, necesse est claudos fieri. Itemque si musculorum capita faucia sint, præsertim eorum qui sunt in femoribus. Moritur autem si quis cerebro fauciatus fuerit, aut spinali medulla, aut hepate, aut præcordijs siue septo transuerso, aut vesica, aut vena sanguinea, aut corde. Non moritur autem vulneratus in his partibus, in quibus hæc membra non insunt, sed ab his longissime absunt. Ex morbis verò tales necessitatem habent, ut ab ipsis permantur quum fiant, Tabes, Aqua inter cutem ac subter carnem nascent, & si mulierem fixum in vtero habentem peripneumonia, id est pulmonis inflammatio corripit, aut febris ardens, aut pleuritis siue lateris inflammatio, aut phrenitis, id est, membranarum cerebri inflammatio, aut Erysipelas

Omne vñ

Quæ mor
bor creatur.Bilis & Pi
uita conge
nit.quæ partes
vniuersæ mor
bos inducunt
id est in hisMorbi qui
mortiferi.

HIPPOCRATIS LIBER

*Que non
semper peri
munt.* pelas ignis sacer appellatus, in vtero fiat. Dubij autē mor- D
bi, vt & perdant, & non, tales sunt, peripneumonia, febris ar-
dens, phrenitis, pleuritis, angina, vua, hepatitis, splenitis, ne-
phritis, dysenteria, in muliere fluxus sanguinolentus. Tales
verō non lethales sunt, nisi quid ipsis accedat, affectiones
fluidæ circa articulos, atra bilis, podagra, coxædici, morbus,
tinesmus qui est voluntas egerēdi ineuitabilis, quartana, ter-
tiana, strangulatus vrinx, lippitudo, lepra, impetigo, morbus
articularis. Multi autem frequenter ab his mutili fiunt, siede-
ranturque manibus ac pedibus, & linguæ impotentes red-
duntur. Et ab atra bile quidam leuiter siderantur. Claudi ve-
rō à coxendicum morbo fiunt. Oculi autem & auditus mu-
tilantur a pituita obstruata. Longos autem necesse est es-
se, tabem, dysenteriam, podagram, affectiones fluidas circa
articulos, pituitam albam, coxendicum morbum, vrinx strā-
gulatū, in senioribus verō Nephriticū. Mulieribus verō flu-
xum sanguinolentum, hæmorrhoidas ani, fistulas. At verō
febris ardens, phrenitis, peripneumonia, angina, vua, pleu-
ritis, cito decernunt. Transitu autem sit in his, ex pleuri-
tide in febrem ardentem, ex phrenitide in peripneumoniā.
Verūm ex peripneumonia febris ardens non fit, ad dysente-
riam tinesmus accedit, & à dysenteria, lienteria siue leuitas
intestinatorum sequitur: ex lienteria in aquam inter cutem
transitus sit, & ex puituita alba in aquam inter cutem, & ex
peripneumonia ac pleuritide, in pectoris suppurationem.

*Que mu-
lunt.*

*Que mu-
lunt.*

*ide Longi mor
in p. 154.*

*Qui celeri-
ter decernit.*

*Qui in alia
transcunt.*

*Que neces-
sario sequun-
tur.*

*cerebri & au-
diu qd per
e. 154.*

*Omentum
quando pu-
trejcit.*

*Tempora,
occasione
u.*

Mala porrō supra mala fieri necesse est, velut si rigor cor- F
riperit, ardor igneus superuenit. Et si neruus dissectus fue-
rit, conuulsionem facit, & vt dissectus neque coalescat, & for-
titer inflammetur. Et si cerebrum concussum fuerit ac do-
luerit eius qui percussus sit, necesse est euestigio mutum fie-
ri, & neque videre, neque audire. Si verō sauciatum fuerit,
febrem necesse est superuenire, & bilis vomitum, & aliquā
corporis partem sideratam fieri ac perire. Si verō omēntom
exciderit, necesse est putrefieri. Et si sanguis ex vulnere aut
vena effluerit, in supernum ventriculum, necesse est ipsum
in pus conuerti. Temporum autem occasiones, vt in sum-
ma dicam, multæ sunt & variæ in arte, quemadmodum etiā
morbi & affectiones, & horum curationes. Maxime verō re-
pentinx sunt, in his quibus animo defectis opitulari opor-
tet, &

- A** ter, & qui neque vrinam neq; stercois egerere possunt, & qui suffocantur, & si mulierem parientē aut sauciatam liberare oportet, & quęcunque eiusmodi. Et hæc quidem occasiones repentinę sunt, & paulò posterius non sufficiunt. Plerique enim paulò posterius pereunt. Occasio verò est, si horum aliquid perpetiatur homo, & qui antequam animam efflet opituletur, hoc totum ex occasione opitulatur. Est quidem igitur ferme hæc occasio etiam in omnibus alijs morbis. Semper enim in quocunque sanè quis opituletur tempore, ex occasione opitulatur. Quicunq; verò morbi, aut vulnera non ad mortem tendunt, sed temporarii sunt ac periculosi, doloresque in ipsis fiunt, verum possibile est ut cessent, si quis rectè medeatur. His sanè non profunt auxilia à medico adhibita, quum adhibeantur. Nam & non præsentē medico utiq; cessassent. Alij verò morbi sunt, quibus occasio est ut curentur matutina diei hora, nihil autem refert an valde mane, aut paulò posterius. Alij morbi sunt quibus occasio est, ut semel in die curentur, nec refert quo tempore id fiat. Alij per tertium aut quartum diem curantur, & alij semel per mensem, & alij per tertium mensem, nec refert an id ipsum tertij augmento vel sine fiat. Tales itaque occasiones sunt, in quibus non aliam quàm hanc certitudinem habent. Intempestivitas autē hæc est, si quæ mane curari oportebat in meridie curentur. Propterea verò intempestivè curantur, quia inclinationem ad peius habent, propter curationem non in tempore factam. Quęcunque etiam citius siue in meridie, siue vespere, siue noctu curentur, intempestivè curantur. & si vere curari oporteat, curentur autem hyeme, aut si hyeme oporteat, curentur autem æstate: aut si quod iam curari oportet, id ipsum differatur, aut quod differre oportet, id ipsum iam curetur. Talia omnia intempestivè curantur. Rectè porò & non rectè in ipsa hæc fiunt. Non rectè quidem fit, si morbum alium existentem, alium esse pronuncies: & magnum existentē, parvum dicas. & vicissim parvum, magnū. & si supervicturum, non supervicturum pronuncies, & perituum non perituum. Et si suppuratum existentem non cognoscas, nec morbum magnum in corpore nutriti cognoscas. & si medicamento aut potione quis opus habeat, quo ipsi opus sit, non cognoscas. & si quæ sanari possunt, non sa-

*Curatio
opportuna.*

*Curatio in
intempestiva*

*Quæ rite
fiunt*

*Curatio in
intempestiva*

HIPPOCRATIS LIBER

nes, & quæ sanatu impossibilia sunt, te sanaturum recipias. **D**
 Atque hæc quidem circa sententiam non rectè fiunt. Circa
 chirurgiam verò hæc. Pus in vlcere aut tuberculo existens
 non cognoscere: & fracturas ac luxationes non cognoscere,
 & specillo admoto ad caput non cognoscere an os fractum
 sit: & fistulam in vesicam immisissam demittere non posse, &
 lapidem in vesica existentem nō cognoscere: & suppuratum
 existentem ex concussione non dinoscere, & secādo aut vrē-
 do, aut à profunditate, aut à lōgitudine aberrare, aut vrere &
 secare quæ non oportet. Et hæc quidem non rectè. Rectè au-
 tem fiunt hæc. Morbos cognoscere qui sint, & à quibus, &
 qui ipsorum longi, & breues, & lethales & non lethales, &
 qui transmutantur, & qui augeſcunt, & qui minuuntur, & **E**
 qui magni, quique parui. & dum curas posibles quidem cu-
 rare, impossibiles verò scire cur curatu sunt impossibiles. &
 dum curas eos qui tales habent, per curationem quantum
 possibile est opitulari. Quæ verò offeruntur ægrotis, ea sic
 observare oportet, rectè ne anſecus fiant, veluti si quis quæ
 ficcare oportet, humectet, aut si crassefacere oporteat, non
 exhibeat à quibus crassitudo inducitur. aut si quæ attenuare
 oportet, non attenuet, quæ frigefacere, non frigefaciat, quæ
 calfacere, non calfaciat, quæ putrefacere, non putrefaciat,
 et reliqua iuxta eandem rationem. Talia autem sua
 sponte ac casu hominibus in morbis fiunt, tum bona, tum
 mala. Febrienti ac bilioso, in tempore foras dispersa bi-
 lis, bonum: diffusa verò ac dispersa sub cute, toleratu levior **F**
 est habēti, et curatu facilior sananti. diffusa autem ac disper-
 sa et ad vnam aliquam corporis partem allapsa, malum.

Aluus turbata in pleuritico aut peripneumonico, aut sup-
 purato, malum. Febrienti aut vulnerato aluus resiccata,
 malum. Subaqueo ac lenioso ab alba pituita detento, al-
 uus fortiter turbata, bonum. Erysipelas si extra diffusum
 intrò vertatur, malum. Si verò intra diffusum foras verta-
 tur, bonum. A profluuiio alui forti correpto, vomitus su-
 perueniens, bonum. Mulieri sanguinem vomenti menses
 erumpere, bonum. A fluxione verò infestata, ad nares aut
 os fluxionem transire, bonum. Mulieri à conuulsione pres-
 sa ex partu, febrem superuenire, bonum. Et tetano ac cō-
 uulsione occupante, igneum ardorem superuenire, bonum.

Talia

*Quæ non
rūt.*

*Quid rūt
fiat*

*Perperam
medicandū
non est.*

*Quæ sup se
pore nesciūt
bona sunt.*

Erysipelas

aph. 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

A Talia enim per nullam medicorū ighorantiam, aut scientiam, sunt, & non fiunt, sed sua sponte ac fortuito casu fiunt, & profunt, & nocent, iuxta eandem rationem. Ceterum Medici talia per fortuitum successum bona, in curatione faciunt. Nimirum si medicamento sursum purgante dato, & sursum & deorsum probe purgāt. Et si mulieri medicamento dato, quod bilem aut pituitam deorsum purgat, mentes aliās nō fluentes erumpant. Et si lienem suppuratum habenti medicamentum dederint, quod bilem ac pituitam deorsum purget, & sic pus deorsum à liene expurgēt, & à morbo liberent. Et si medicamento exhibito calculoso, calculum in vrinarium meatum præ pharmaci violentia protrudant, ut per urinam eijciatur. Et si medicamentum dederint quod pituitam sursum purgat, ei qui pus in superiore ventriculo in tuberculo habet, non scientes quod habet, isque pus vomat ac sanus fiat. Et si eum qui ex medicamento sursum purgante superpurgatur, sua sponte aluo subter erumpente, à vomitu sanum faciant. At verò Mala operantur Medici præ infortunio hæc. Si pharmaco bilis aut pituitæ sursum ducti-
C no dato, venam in pectore præ vomitu rumpant, ei qui prius nullum manifestum dolorem in pectore habuit, atque sic fiat morbus. Et si mulieri in vtero habenti medicamentum supernè purgans exhibeant, alius autem infernè erumpens foetum expellat. Et qui suppuratum curat, si alius proflua fiat, ipsum perdit, & qui oculos curat ac sublinat, si dolores incidant acutiores, & si ita cōtingat, rumpantur oculi & destruantur, accusant medicū quod oculos subleuit. Et si puerperæ in ventris dolore medicus aliquid det, & malè habeat aut pereat, medicus in culpa est. Firmè autem quacunque necessitatem habent ut fiant in morbis ac vulneribus mala supra mala, ea ubi sunt, in medicum culpam reiiciunt, & necessitatem talia fieri cogentem non agnoscunt. Et si ad febricitantem aut vulnus habentem ingressus, ad mortis quàm primū remedijs non opituletur, sed postera die æger peius habeat, medicum accusant, Si verò opituletur, non æqualiter laudant. Oportere enim ipsum perpeti putant, vlceraque inflādari, & in morbis quibusdā dolores fieri oportere, neque tales esse ut ne fiant. Nervus præcisus ac dissectus non coalescit, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis,

*Quæ bona
malæ me-
dicus facit*

*pharmacis
vicio, & præ cal-
culis & verrucis
et præ ceteris
et præ ceteris
Quæ non bene
medico
succeedant.*

*Calculus non
vult melli
cus arguat
ur.*

*Quæ non
corant præ
cisa.*

*neque
inflā-
dari
neque
coalescere*

HIPPOCRATIS LIBER

*Principiū
artis cur
nullum est.*

Et mori

et de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

*Purulenti
pulmonis
signa.*

*causa morbi
pulmonis*

neque vena sanguiflua, neque tenuis genæ pars, neque pu-
dendi pellicula. Porro principium sanationis demonstra-
tum quidem non est, quòd sanè rectè principium sit vniuer-
sæ artis, neque secundum aliquod, neque medium, neque fi-
nis. Sed incipimus ab ea aliquando dicentes, aliquando ope-
rantes, & definimus eodem modo. Et neque dicentes ex
ijsdem sermonibus incipimus, neque si de ijsdem dicamus,
neque in ijsdem definimus & operantes iuxta eandem ra-
tionem, neque ex ijsdem operibus incipimus, neque in ijs-
dem definimus. At verò facilitas ac promptitudo in his est.
Quum quis secans aut vrens, neque neruum secet, neque ve-
nam. Et si suppuratum erat, pus consequatur. Et si secet,
eodem modo. Et fracturas rectè componere. Et si qua pars
corporis ex natura excidat, vt ipsam rectè ad naturam re-
trudat. Item apprehendere fortiter ea quæ oportet, & ap-
prehendendo premere. Et apprehendere leniter ea quæ
oportet, & apprehendendo non premere. Et in obligando
tortuosa non facere ex rectis, neque premere quæ non oporteret.
Et in contactu vbicunq; tandem contigerit, dolorem ex
superfluo nō exhibere. Hæc quidē igitur facilitatis ac prom-
ptitudinis existunt. At verò digitis decenter attingere, aut
probè, aut non probè, aut longis, aut breuibus, aut probè de-
ligare omnes deligaturas, non ad artem pertinere iudicatur
de facilitate ac promptitudine, sed seorsim. Quicumque sup-
purati fiunt pulmone, aut superiore vel inferiore ventre, aut
tubercula habent, siue in superiore ventre siue inferiore, aut
in pulmone, aut vlcera intrinsecus, aut sanguinem vomunt
aut spuunt, aut dolorem aliquem habent, vel in pectore vel
in dorso: Hæc omnia habent ex his quidem quæ in corpo-
re insunt, à bile & pituita: ab externis verò ab aëre insito
calori ammixto. Sed & à laboribus ac vulneribus. Et qui-
cunque quidem pulmone suppurati fiunt, ab his fiunt. Si
peripneumonia correptus in iudicatorijs diebus non purge-
tur, sed relinquatur in pulmone sputum ac pituita, suppura-
tus sit. Et si quidem statim curatus fuerit, vt plurimum effu-
git, si verò neglecta fuerint illa in pulmone corrumpitur, il-
lis & inhærentibus & putrescentibus, vlcaturque pulmo &
suppuratus sit, & nō ampliùs intro ad seipsum nutrimentum
memorable trahit, neque quicquam depurgatur ab eo sur-
sum,

A sum, sed suffocatur, & semper amplius difficulter spirat, & respirando sterit, & respirat illinc sursum ex pectore, tandem verò obturatur à sputo, & moritur. Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, & primum quidem vtplurimum latenter defluit, tustimque tenuem exhibet, & sputum paulo amarius solito, & aliquando tenuis adest calor. Temporis autem progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhaerente ac putrescente: & gravitatem exhibet pectori & dolorem acutum ante & retro, caloresque acutiores in corpore incidunt, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore: & maxime ex capite. Caput verò calefactum ex corpore, & hanc putrescentem suberassam spuit. Quanto verò magis tempus progreditur, tantò magis pus sincerum spuit, & febres acutiores fiunt, & tussis frequens ac fortis, & inedia vexat, & tandem aliud inferne turbatur. Turbatur autem à pituita, pituita verò de capite descendit. Hic quum ad hoc peruenerit, perit quemadmodum dictum est in superioribus, purulento ac putrido pulmone facto, aut ventre infra erumpente.

Fit præterea & ab his pulmò suppuratus. Quum venula videlicet aliqua in ipso fuerit rupta, rumpitur autem à laboribus: & ubi rupta fuerit, sanguinem fundit, si quidem crassior fuerit, amplius, si tenuior, minus, & sanguinem quidem ipsum partim confestim spuit, partim verò nisi vena adstringatur, in pulmonem funditur, & in ipso putrescit, & ubi putrefactus fuerit pus facit progressu verò temporis aliquando pus sincerum, aliquando pus subcruentum, aliquando sanguinem, & si magis repleta fuerit vena, ipsam sanguinis copia acervatim à seipsa reuomit, spuitque pus crassum ab accessoria & intus putrescente pituita. Hic anticipetur incipiente morbo, priusquam vena sanguinem fundat ac fortiter laxetur, & priusquam attenuetur, & in lecto decumbat, & caput corrumpi incipiat, & reliquum corpus colliquari, superstes ab hoc morbo euadit. Si verò neglectus fuerit, & hæc occuparint, ut ea perpetiatur aut omnia, aut plurius, perit. perit autem hic aut ex iisdem quæ superius dixi, aut à vomitu, sanguine multò multoties per vomitum reiecto. Si verò vena omnino quidem rupta non fuerit, verum acutus tractus in ipsa fiat, sit autem maxime velut varix

suppuratum
gust fiat

Vena fuit
ita signa

signum
cuius qd

Varix in
terior.

HIPPOCRATIS LIBER

qui etiam statim ubi factus fuerit, dolorem quēdam tenuem inducit, ac tussim aridam. Si verò diu durauerit & neglectus fuerit, primum quidem sanguinem modicum ac subnigrum dimittit ac reijcit, deinde verò adhuc copiosorem & lincerrissimum, deinde pus, patiturque quacūque in superioribus dicta sunt. Conducit autem talibus, si ab initio curandos suscipiat, ut & venæ de manibus sanguinem emittāt, & dicta à qua quàm siccissimus & exanguissimus fiat. Eodem porro modo etiam venæ in latere afficiuntur, quæ intus in superficie sitæ sunt. Quum igitur affectæ fuerint, varico-

Medela.

Purulentus unde.

saque factæ, & intus eleuatæ, & neglectæ fuerint hæc perpetuantur. Erumpunt & spunt à se sanguinem, & aliquando etiam vomunt, & suppurati fiunt, & ut plurimum pereunt. Si verò curentur incipiente morbo, rursus in loco venæ confidunt ad latus, humilesque fiunt. Et pulmo ab his suppuratus redditur, & ab ipso etiam talia perpetiuntur, & sic moriuntur.

Cæterum superiore ventre suppurati multipliciter fiunt. Nam quum pituita de capite copiosa & acuatim in superiorem venterem fluxerit, putrescit & in pus vertitur. Putrescit autem maxime in diebus viginti vna. Hoc igitur pus cōcutitur & intus fluctuat ad latera allabens. Hic si vratur aut sece-

ad hunc modum

Purulentus uentriculus

superior quot modis fiat.

tur priusquā diurnū fiat pus, sanus plerumque euadit. Fiunt autem & superiore ventre suppurati ex pleuritide, quum fortis fuerit, & in indicatorijs diebus neque putruit, neque sputo reiecta est, sed latus exulceratum fuerit à pituita affixa, & bile, & quum vlcus factum fuerit, reddit de se pus, & ex vicinis locis præ caliditate in seipsum pituitam adducit, & hæc ubi computruit, pus spuitur. Aliquando verò etiam ex venis sanguis se in vlcus ingerit, & putrefactus pus fit. Hic si euestigio assumatur, sanus plerumque; sic si verò negligatur, perit. Fiunt præterea suppurati etiam, si pituita de capite delapsa, ad latus adglutinata fuerit & putruerit. Tunc enim latus ut plurimum inflammatur, & patitur eadem quæ ex pleuritide suppuratus. Fiunt & quum præ labore, aut exercitijs, aut alio quopiam modo, vena ante aut retro fuerit rupta, & sic rupta ut nō statim spuat sanguis, sed in carne acutus tractus siue varix fiat: & carō tracta ac cōuulsa humiditatē modicā traxerit, & subliuida facta fuerit: & statim quidē sic affectus non percipit præ robore ac bona habitudine, aut si etiā sentit, nihil

molesti

A molesti esse putat. Hic ubi deprehenderit, quum iam præ febribus, aut potius, aut venere, aut aliqua alia re correptus, fuerit attenuatus, caro læciata subresiccat & subcalescit, & humiditatem in seipsam à vicinis tum venis, tum carnibus trahit. Vbi autem attraxerit, intumescit & inflātur, & dolorem exhibet tenuem, & tussim raram & siccam primū. Deinde adhuc magis trahit in seipsam, & dolorem inducit vehementiorem, & tussim frequentiorē. Et primū quidem subpurulentum spuit. Aliquando verò liuidum & suberuentum. Et quanto magis tēpus progreditur, amplius in seipsam trahit ac putrefacit, & de ipsa carne quantum ab initio liuidum erat, hoc pus fit: & dolorem acutum exhibet, & febrē, & tussim multam ac frequentem, & per sputum sincerum pus expuit.

B Si verò pus in ventre moram traxerit, totum corpus ab ipso calefcit. Maximē verò vicinissimæ partes. Calefcēte autem corpore, humiditas maximē eliquatur. Et quæ quidem à supernis partibus eliquatur, in supernum ventriculū maximē confluit, & pus fit, ad hoc quod iam in ipso est. Pars verò eius etiam in infernum ventriculū fluit: & quandoque aliū ab ipsa turbatur, & hominem perimit. Nam cibi ingesti secedunt inconcocti, et alimentum ab ipsis corpori nō accedit. Et sputi sursum purgatio non æqualis contingit, alio nimirum calefacta, et omnia deorsum trahente in seipsam. Et à spūto quidem suffocatur et stertit, dum non purgatur: à ventre verò fluente debilitatur, et plerūq; perimitur. In hu-

C iusmodi autem morbis hūc fluxum maximē exhibet caput, utpote quod cauum est, et supernē situm. Quum enim ab alio fuerit calefactum, tenuissimā pituitam de corpore in seipsū trahit. Vbi verò hæc in ipso fuerit collecta, reddit rursum acervatam et crassam, velut dictum est: et pars quidem ipsius in supernū ventriculū defluit, pars verò in infernum. Quum igitur caput fluere inceperit, et reliquum corpus colligari, non amplius æqualiter, ne vsti quidē, superstites eadunt. Superant enim supra pus influentiæ mala, ea quæ defluunt: et carnes liquefcunt magis à malis, quā nutriuntur ab ingestis. Qui verò huiusmodi morbos habent, partim ab his breui pereunt, partim diutius tempus extrahunt. Differunt enim corpus à corpore, et ætas ab ætate, et affectio ab affectione, et tempus à tempore, in quo egrotarint: et aliqui ma-

*Capitis
rheuma.*

HIPPOCRATIS LIBER

*certum mor-
bus est certu-
m tempus, &
certum tempus
certum mor-
bus est certu-
m tempus, &
certum tempus*

*Qui acervi-
culus infe-
rior purule-
tus fiat.*

*Pulmonis
erysipelas.*

*signum erysipe-
latis in pul-
mone gene-
rari*

lorem tolerantiam in morbis habent, alij omnino ad tole- D
randum impotentes sunt. Proinde certitudo exacta tempo-
ris in quo pereunt non est, an longum, aut breue futurum sit.
Neq; enim hoc tempus certum est quod quidam definiunt;
& plerunq; neq; hoc ipsum suppurat. Differt enim & annus
ab anno, & tempus à tempore. At si quis de ipsis rectè cogno-
scere ac dicere velit, is cognoscat omni tempore, & perire, &
superstes euadere, & pati quaecunq; tandem pariantur.
Caterum inferno ventriculo suppurati fiunt, maximè quidē
quum pituita aut bilis acernata inter carnem & cutem colle-
cta fuerit. Fiunt autem & à contuisionibus, quum venula
conuulsa rupta fuerit, sanguis effusus putrescit & suppurat-
ur. Si verò caro conuulsa fuerit, aut contusa, sanguinē ex ven- E
nis sibiipso propinquis trahit, atq; hic putrescit ac suppuratur.
His siquidem foras de se significationem præbuerit & erupe-
rit pus, sani fiunt. Si verò sua sponte intrò proruperint, per-
eunt. At verò diffusum pus in ventriculo inferno, veluti in
superno dictum est, generari haud quaquam poterit, sed ve-
lut à me dictum est in tunicis & in tuberculis innascitur. Et
si quidem intro notas habuerit, cognitu difficile est. Neque
enim ex concussione cognoscere licet. Cognoscitur autem
maximè ex dolore vbi fuerit, & si terram figulinā, aut aliud
quid huiuscemodi imposueris, breui id resiccat. Erysipelas
autem in pulmone sit, vbi pulmo fuerit nimium resiccatus,
id quod contingit ab ardore, & à febribus, & à labore, ac in- F
temperie. Et quum super resiccatus fuerit, plurimum sangui-
nis in seipsum trahit, maximè quidē & plurimū ex magnis
venis. Hæ enim ipsi vicinissimæ sunt, ac ipsi incumbunt. Tra-
hit etiā ex alijs vicinis. Et tenuissimum ac debilissimū tra-
hit. Postquam autem traxit, febris ex ipso fit acuta, & tussis
sicca, & repletio in pectoribus, & dolor acutus in anteriori-
bus ac posterioribus partibus, maximè circa spinam, nimirū
magnis venis percalefactis: Et vomunt aliquando subcruentum
aliquādo liuidum. Vomunt item pituitam & bilem, &
frequenter animo linquuntur, propter sanguinis transmuta-
tionem derepente cōtingentem: atq; hoc maximum signum
est Erysipelatis in pulmone generati, & si assidua febris in-
uasio contigerit. Huic si quidem duobus aut tribus aut qua-
tuor ad summum diebus, id quod intus est diffusum fuerit ac
transi

A transferit foras, plerumque sanus euadit. Si verò non diffundatur ac foras transeat, intus putrescit, & suppuratus fit ac perit. Perit autem breui, utpote pulmone toto suppurato ac putrido. Si verò foras diffusum, intrò vertatur & pulmonē corripit, huic nulla vitæ spes reliqua est. Quum enim antea resiccatus pulmo, traxerit in seipsum, non amplius dimittit, sed statim ab ardore, & siccitate, nihil amplius suscipit, neque ququam sursum distribuit, sed corrumpit. Tuberculū in pulmone fit hoc modo, quum pituita aut bilis coacta putrescit. Et quandiu quidem adhuc crudius fuerit, dolorē exilem, ac tussim siccam inducit. Postquam autem maturum factū fuerit, dolor & ante & retro acutus fit, & calores corripunt, ac tussis vehemens. Et si quidem quàm citissimè maturuerit, & eruperit, & pus sursum vertatur, ac totum expuatur, & vētriculus in quo fuerat pus, contrahatur ac resiccetur, penitus sanus euadet. Si verò ruptum quidem fuerit quàm celerrimè, & maturatum, ac repurgatum, verum penitus resiccari non poterit, sed ipsum tuberculum à seipso pus produxerit, & à capite sanè tunc, itemque reliquo corpore pituita ad tuberculum defluens putrescit, & pus fit, ac expuitur, per quod homo perimitur. Perimitur autem à ventre fluente, ab his quæ antea relata sunt, & loquente ipso ac intelligente omnes res, æquè ut in priori tempore, resiccatur ac perfrigeratur, conuiuentque venæ in corpore omnes, utpote sanguine ex ipsis à febre exusto: quandoque verò etiam præ temporis longitudine ac morbi magnitudine, tum malorum iam præsentium, tum eorum quæ insuper accedunt. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte, neque à medicamentis, consumitur debilitatus à doloribus vehemētibus, & inedia, & tussi, & febribus, & ut plurimum perimitur. Si verò iam attenuato, & in lectum reclinato, pus eruperit, neque sic valde reualescunt, sed tali modo perimuntur. At si eruperit quidem quàm celerrimè, & maturuerit, maturatum autem multa sui parte ad septum transversum effundatur, statim quidem melius habere sibi videtur. Verum progressu temporis quidem totum per sputum reiecerit, & ventriculus in quo pus inerat, confidat ac resiccetur, sanus euadit. Si verò & tempus longius protrahatur, & ipse debilior fiat, & per sputum reijcere nequeat, sed vltius fuerit aut se-

*Pulmonis
uomica.*

*Pulmonis
uomica quæ
do sanescit.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Costatum
notitia.*

Ruptiones

ctus, & pus exeat, statim quidem & sic melius habere sibi videtur, verum tempore procedente perimitur ab iisdem quæ prius relata sunt. Porro in latere fiunt tubercula, & à pituita & bile eadem ratione qua in pulmone. Fiunt etiam à laboribus, quum vena aliqua tracta rupta fuerit, non tamè penitus rupta, sed ita vt acutus tractus in ipsa factus sit. Si quidem igitur rupta fuerit, statim sanguis è vena effusus putrescit & suppuratur. Si verò acutus tractus in vena fiat, principio quidem dolorè exhibet ac pulsar: progressu verò temporis distribuit vena sanguinem in carnem, atque hic in carne putrescens, pus fit. Eodem modo & caro. si quidem magis doluerit, & sanguinis plus in seipsam trahit ex vicinissimis venis, & statim suppuratur. Si verò minus doluerit, tardius & trahit, & suppuratur. Quibusdam autem quum debiles facti fuerint tractus in carnibus, aut venis non suppuratur, sed fiunt dolores diurni, & vocantur Ruptiones. Et quæ quidem in carne fiunt, hoc modo fiunt. Quum caro afflicta fuerit, aut conuulsa, aut percussa aut aliud quid perpessa, liuida velut antea dixi fit, non sincero sanguine, sed tenui & aquoso, eoq; modico. Quum autem plus solito fuerit resiccata, percalescit & dolorem exhibet, & à venis ac carnibus vicinis humiditatem in seipsam trahit: & vbi nimium fuerit humectata, atque ea ipsa humiditas vbi à carne fuerit supercalefacta, per totum corpus dispergitur, qualis est attracta, magis tamen in venas dispergitur quàm in carnes. Venæ enim magis trahunt quàm carnes. Quando verò ad multam in corpore humiditatem, modica de carne attracta fuerit, obscura iam fit, & doloris exors, & pro morbida cum tempore sana euadit. Si verò caro magis fuerit percalefacta, & amplio rem humiditatem traxerit, dolorem exhibet: & ad quamcunque corporis partem ab ipsa processerit ac firmata fuerit, dolorem inducit acutum, & aliqui putant ipsis ruptionem transmutatà esse, verum hoc fieri non potest. Propinquissima verò vlceri sunt quæcunq; talia & alia. At humiditas de carne exiliit per venas, quum autem percalefacta, & crassa, & copiosa facta fuerit, dolorem exhibet, donec similis fiat reliquæ humiditati, in tenuitate ac frigiditate. Quæcunque verò in venis fiunt, sic habent. Ipsa quidem vena, in quantum tracta est, in loco manet.

Quum

- A** Quum autem tracta fuerit (trahitur autem ac conuellitur à labore & violentia) sit veluti varix. Percalescit autem & trahit in seipsam, liquidam quandam humiditatem, quæ est à bile ac pituita. Et ubi mixta fuerint sanguis & humiditas de carne, crassescit sanguis, & multipliciter ipse seipso, ea parte qua vena conuulsa est, & morbosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit, plenitudo ipsa transmigrat, quocunque tandem contigerit, & dolorem inducit acutum, ut aliquibus videatur ruptio locum permutasse. Et si contigerit ut ad humerum transferatur, & gravitatem in manu inducit, & torporem ac segniciem. Et si quidem ad venam proruperit, aut ad humerum & dorsum tendat, dolor plerumque statim quiescit. Fiunt porro conuulsiones & à laboribus, & lapsibus, & à plaga, & si quis onus maius leuet, & à cursibus & lucta, & eiusmodi omnibus. Quicumque verò à vulneribus suppurati fiunt, aut ex hasta, aut pugione, aut iaculo, intrò sauciati fuerint, quandiu quidem habuerint vlcus respirationem foras, per antiquum vulnus, & hac parte frigidum in seipsum adducit, & calidum à seipso hac parte emit, & sanè facile tum pus, tum si quid est aliud, expurgatur. Et si quidem & interna & externa pars simul fuerint sanata, sanus penitus homo euadit. Si verò externa quidem sanata fuerit, interna verò non, suppuratus fit. Et si etiam sanata simul sint interna ac externa pars, cicatrix autem intus debilis fiat, & aspera ac liuida, reulceratur quandoque, atque sic suppuratus fit. Rursus exulceratur etiam si quid amplius laborarit, & si attenuatus fuerit, & si pituita aut bilis ad cicatricem affixa fuerit, & si alio morbo correptus attenuatus fuerit. Vbi verò vlcus factum fuerit, siue hoc modo, siue ubi externa pars priusquam interna coaluit, dolorem acutum inducit, & tussim, & febrem: & frigiditatem ipsum sibi ipsi vlcus inducit, eo quòd amplius calidum existat: & ipsum à seipso caliditatem efflat, & pus expurgatur, & per longius tempus curatur, & tardius sanescit: quandoque verò neque sanescit. Nam caro, & vlcus, ab ardore qui est in corpore coquitur, & nimium humectatur, ut non possit neque siccare, neque carnem Producere, neque sanari. Sed cum temporis progressu moritur, patiens talia quæ etiam prius dicta sunt. At si contingat ut crassarium venarum aliqua saucietur, & sanguis

Vena conuulsa.

παρρησια.

Purulentus vulnere.

Cur quandoque vulnus non coalescat

Purulentus alia de causa

HIPPOCRATIS LIBER

guis intro fluat ac putrescat, suppuratus sit. Et si quidem hoc D
pus totum per sputum reiectum fuerit, & vena sauciata co-
aluerit, & vlcus intus ac foris sanatum fuerit, penitus sanus
euadit. Si verò neque vlcus intus coalescere poterit, neque
vena constringatur, sed alias atque alias sanguinem remit-
tat. Et si statim vomatur & spuat, aut etiā putrescat, & pus
expuatur, plerunq; perimitur, aut statim sanguinē vomens,
aut posteriori tempore, dum perit ab iisdem quę antea dicta
sunt. Sæpe verò hi quibus venarum aliqua intus sauciatur
à vulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitijs, aut
alia quadam causa, quum coaluerit & sana esse videtur vena
alio tempore iterum rumpitur, idque ab iisdem contingit caus
sis, à quibus etiam prius patiebatur. Vbi verò iterum rupta E
est, sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum
ac sæpe vomentes (aut aliās atque aliās sanguinem recentem
vomunt) pus autem spuantes per omnem diem multum ac
crassum, tali aut cōsimili modo pereunt, velut etiam in alijs

*Diversitas
maria.*

*Morbos
affectus di
uersi.
Seniorū &
iuniorum
affectus.*

morbis dictum est. At verò in his ac similibus morbis mul-
tum refert, quātum ad facilem ac difficilem curationem, vir
sit an mulier qui morbum habet, iuuenis an senex, & mulier
iuuencula an anicula. Et præterea tempus à tempore differt
in quo ægrotant. Interest item an ex alio morbo ægrent,
aut non ex alio. Differt etiam affectus ab affectu, maior à
minore, & corpus à corpore, & curatio à curatione. His autē
sic inter se differentibus, necesse est etiam tempus diurni-
tatis differre: & alijs longius fieri, alijs brevius: & alios peri-
re, alios non: & morbos alijs durabiles esse & maiores, alijs
minores & breuis temporis: alijs permanere vsque ad sene-
ctutem & commori, aliās perire ab ipsis breui. Et qui quidē
iuniores patiuntur eas affectiones, quæ à laboribus fieri di-
ctæ sunt, hi & ampliores & vehementiores ipsas patiuntur,
& magis quàm alij dolent, & statim in ipsis manifeste fiunt,
vt sanguinem aut spuant, aut vomant. Sed & quadam sientia
fallunt ipsos, præ bona corporis habitudine. Seniores autem
rarò quidem patiuntur, & si patiantur, debiles ipsas perpe-
tiuntur, vtpote ipsi debiliores existentes, & remittunt magis
ipsis, & affectionum maiorem curam gerunt. Fiunt igitur ab
initio omnino minus seniori quàm iuniori. & vbi factæ fue-
ri quidem

*morbos in se
nibus debili-
ores et quas iunioribus
debet aperi-
re quæ in senibus
non reperitur galy.*

Ari quidem, utpote qui habet corporis vigorem & siccitatem, & carnem densam ac robustam & ad ipsa ossa assidentē, cute circum ipsam circumtenta: quum aliquid amplius laborarit, solito magis & derepente, conuulsionē vehemētes fiunt, & ruptiones multæ ac omnigenæ venarū ac carniū. Et horum aliqua statim manifesta sūt, aliqua posteriori tempore comparent. At senioribus vigor fortis non inest, & carnes circum ossa diffiunt, & cutis circum carnes: & ipsa caro rara est ac debilis, & neq; tale quid pati possit similiter tenior veluti iunior. Et si quid patiat, leuiter patitur, & statim manifestum redditur. Atque intantum quidem in affectionum principio, iuniores senioribus difficilius liberantur. Quum verò morbus conspicuus factus fuerit, & aut pus, aut sanguinem, aut vtrumque expuerint, qui quidem iuniores sunt, quū corpus ipsorum sit robustum ac densum, non æqualiter depurari possunt ab vlcētib; quorū pus in superno ventriculo existit. Nam & pulmo non valde trahit ad arterias, ut qui densior sit: & arteriæ quum tenuēs & artæ sint, pus non suscipiunt, nisi modicū & raro. Quare necesse est pus in thorace, & in vlcētib; coaceruari & crassum fieri. At seniori & pulmo rarior ac cauior est, & arteriæ ampliōres, ut pus non diutius in ventriculo & vlcētib; moretur, & quicquid eius insuper generatum fuerit, hoc totum necessariō sursum attrahitur à pulmone ad arterias, & statim expuitur. In iuniori igitur, utpote quum sint affectiones vehementiores, & purgatio pro sputi ratione nō fiat, & febres acutiores & frequentiores fiunt, & dolores acuti incidunt, tum in ipso affectionis loco, tum in reliquo corpore: nimirum quum venæ sint robustæ ac sanguine plenæ. Vbi verò hæ percalescunt, dolores ab ipsis transiliunt alias ad aliam corporis partem. Ac hi quidem plerumque breui perimuntur. Senioribus verò quum affectiones sint debiliores, & sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, ac paucæ fiunt, & dolores adsunt quidem, verum exiles. Et ab huiusmodi affectionibus ne senes quidem penitus liberantur, sed longō tempore afflicti per-eunt. Et aliquando pus spuunt, quandoque sanguinem, quandoque neutrum, tandemque cum his moriuntur. Moriuntur autem hoc modo, quum ipsos morbus aliquis huic quem antea habent consimilis apprehendit, ita ut & hunc habeat, & is quem

*conspicui
virescunt*

*Cur in
Pulmonis
varietas.*

*Cur iuniores
magis
quàm senes
afficiantur.*

HIPPOCRATIS LIBER

Morbi periculosi. is quem prius habent vehementior fiat, & vltimum per-
eunt. At verò morbi qui hos morbos efficiunt, maximè sunt

lebris aut. ic.
fiat o o l b
pleuritis & peripneumonia. Febris porro ab his fit. Quum
bilis aut pituita calefacta fuerit, totum reliquum corpus ab
his calefcit, & vocatur hoc febris. Calefcit autem bilis &
pituita, intrinsecus quidem à cibis & potibus, à quibus etiam
nutritur ac augetur. Extrinsecus autè à laboribus ac vulne-
ribus, & à calido nimium calefaciente, & à frigido nimium
frigefaciente. Calefcit item à visu & auditu, Verum mi-
nimum ab his. Rigor autem in morbis fit quidem & ab

Morborum frigus unde. externis, ventis, aqua, serenitate, & alijs huiusmodi. Fit au-
tem & ab ingestis cibis ac potibus, Maximè verò & vehe-
mentior fit, quàm bilis & pituita sanguini fuerint permixta, E

in morbo
Pituita frigida, calidus sanguis. Magis tamen si pituita sola
permixta fuerit. Est enim pituita frigidissima ex natura.
Calidissimus autem sanguis. Frigidior est etiam aliquanto
bilis sanguine. Quum igitur hi humores ambo, aut alter
solum, permixti fuerint ad sanguinem, ipsum congelant,
non tamen omnino. Neq; enim viuere posset homo, si san-

in morbo
Rigor. guis densior & frigidior seipso multis modis fieret. Frige-
scente igitur sanguine, necesse est & reliquum totum corpus
perfrigerari, & vbi huiusmodi quid factum fuerit, rigor ap-
pellatur. Et si quidem vehemens fiat rigor, vehementior est
etiam tremor. Nam dum cōtrahuntur venæ, sanguine & co-
acto & congelato, corpus & cōtrahunt, & tremere faciunt. Si

Horror. verò minùs aliquāto sanguinis coactio fiat, hoc rigor appel-
latur. Horror autè dicitur debilissimus rigor. Quòd autem
post rigore necessarìo corripit febris, aut maior, aut minor,
sic habet. Quum sanguis percaluerit, & vim depulerit, ac rur-
sus ad suam naturā redierit, cōcalefcit simul & pituita, & bi-
lis sanguini permixta. Et sanguis ipse seipso multipliciter
calidior euadit. His igitur percalefactis, necesse est febrem
succedere post rigore, præ sanguinis caliditate. Sudor verò
fit hac de causa. Quicumque morbi in iudicatorijs diebus iu-
dicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de pituita & bile
quòd tenuissimum est eliquatur & secernitur, & secedit par-
tim extra corpus, partim intus & isthic in corpore relinqui-
tùr, partim præ caliditate attenuatur, & vapor fit, & cùm spi-
ritu permixtū foras procedit. Atque hæc quidem huiusmodi
sunt,

A sunt, et ab his sudor generatur. Quare verò quandoque calidus, quandoq; frigidus est, ita contingit. Calidus quidem de percalescēto malo, & exusto, et attenuato, et debili, et non valde multò secernitur, et necesse est ipsum calidiorē ex corpore excerni. Frigidus autem de ampliore malo secernitur, & de eo quod reliquum est et adhuc validum, et nōdum putrefactum, neque attenuatum, neq; exustum, et frigidior ac crassior et graueolentior prodit. Manifestum autem hoc ex hac re sit. Qui frigidum sudorem exudant, ē longis morbis plerunq; ægrotant, inualeſcente malo eo quod in corpore relinquitur. Qui verò calidum sudorem excludunt, citius à morbis liberantur. Pleuritis & Peripneumonia sūt hoc modo. Pleuritis quidem, quum poriones acervatē et fortes valde corripunt. Percalescit enim totū corpus ac humectatur à vino. Maximē autem et bilis et pituita percalescit ac humectatur. Et sanē his commotis ac humectatis, continget ut rigor invadat ebrium siue sobrium. Et cum latus natura carne nudum sit, præ omnibus corporis partibus: et non sit quicquam in ipso quod renitatur, præter ventriculi cavitatem: maximē rigore percipit. Et cum riguerit ac perfrigeratum fuerit, tum caro quæ est in latere, tum venæ, cōtrahuntur ac cōuelluntur. Et quantū in ipsa carne inest bilis ac pituitæ, aut in venis quæ in ipsa carne sunt, id magna ex parte aut totū secernitur, introq; compellitur ad caliditatē, carne extrinsecus condensata: atq; id ad latus affigitur, et dolorem vehementem exhibet, et percalescit: et per caliditatē trahit ad seipsum, à vicinis venis ac carnibus, pituitam ac bilem. Atq; hoc sanē modo sit, vbi verò ad latus affixa putruerint, & per spiritum reiecta fuerint, sani sunt. Si verò & antiquum multum affixum fuerit ad latus, et aliud insuper accesserit, statim pereunt, præ saluæ copia expuere nequeūtes: aut suppurari sūt, et partim pereunt, partim euadunt. Indiciū autē hæc de se præbēt in septem diebus, aut nouem, aut vndecim, aut quatuordecim: dolorem quoque inducunt ad humerum, & ad claviculam, et ad alas, hæc de causa. Vena quæ ipsenitis appellatur, tendit à splene ad latus, à latere verò ad humerū & sinistram manum. Hepatitis autem ad dexterās partes eodem modo: & quum huius in latere pars à rigore contracta fuerit, et sanguis in ipsa horruerit, ad alas et claviculā ac humerum

Calidus fri
gidus cur

Sudor frigidus
Pleuritis
Peripneumonia

lateris nā.

Vena splenis

HIPPOCRATIS LIBER

merum concedit, & conuellit ac dolorē inducit. Eodem modo & loci circa dorsum: ab affixo ad latus humore pituita: ac bilis percalescunt: & quandoque dolorem locis infra latus exhibent. Sape verò si ad infernas partes conuertatur, dolorem per venas ad vesicam distribuit, multumq; ab biliosum æger mingit. Arbitrantur aut̃ huius morbi causam ac principium rigorem esse. Peripneumonia fit quum commota ac calefacta pituita ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in seipsum de vicinis locis, ad ea quæ iã sunt in ipso. Et percalescit quidem totum corpus ac dolorem exhibet, maxime autem dorso, & costis, & humeris, ac spinæ, nimirum ab his in seipsum attrahens plurimam humiditatem, & superresiccatur hæ partes, & nimium calescunt. Postquã autem attraxit in seipsum, & tum bilis, tum pituita, sedem in pulmone occupauit, putrescit ac suppuratur. Et si quidem in diebus iudicatorijs putrefacta per sputum reiecta fuerint, æger superstes euadit. Si verò & ea quæ ab initio aduenerunt susceperit, & alia insuper accesserint, & neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ copia eorum quæ insuper accedunt, ut plurimum moriuntur. Si verò ad dies perueniant duos & viginti, & febris remittat, & in his per sputum purgati non fuerint, suppurati fiunt. Fiunt autem maximè ex his, quibus & pleuritis & peripneumonia vehementissima existit. Fit autem & peripneumonia & pleuritis sine sputo, ambæ ex eadem causa præ siccitate. Siccant autè & calida, vbi nimium calfaciunt: & frigida, vbi nimium friges faciunt. Congelatur autem latus, & quæ sunt in ipso venæ, & conuellitur, & quantum in ipso inest pituita: aut bilis, id à caliditate resiccatur, & dolorem inducit, & à dolore febrem. Huic venam tecare, cõducit in manu splenitidem appellatam, aut hepaticidem iuxta vtram sanè fuerit morbus. Atque sic dolor mollior fit, & lateris, & aliarum partium. Nam vena & quantum in ipsa inest bilis ac pituita: & ipsius sanguinis a grotantis vnà cum his magnam partem foras dimittit. Pars verò ex carne per medicamenta & potiones diffunditur, & calefactorijs forinsecus adhibitis, ita ut morbus per totum corpus dispergatur. Vocatur autem hæc pleuritis sine sputo. Peripneumonia verò quum pulmo etiam ipse superresiccatus fuerit, & quantum in ipso inest bilis aut pituita, neque putrefacit æquali

Peripneu-

monia qui

stat

que non
splenitis
be patit; ut
de aq
impens, non
morbi & vel
pleuritide, in
sputo

A æqualiter, neque per sputum reddit : & quantum in ipso est humiditatis, aut à potu, aut à sorbitione, aut à vicinis locis, hoc totum exurit, præ nimia siccitate ac caliditate. Huic poriones bibere conducit, à quibus pulmo humectatur, ac sputum rejicit. Si enim sputum non reiecerit, & durior sit, & coarescit, & hominem perimit. Febris ardens corripit magis biliosos, corripit item pituitosos. Corripit autè hoc modo. Quum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit venæ & sanguis attrahant bilem, eumq; plurimam ex carni-
bus ac vètriculo, ad eum qui prius inest, utpote quum etiam natura calidissimus sanguis in corpore existat. Cum itaque percaluerit ex carnibus & ventriculo, supra eum qui ià inest, adhuc magis à bile, percalfacit etiam reliquum corpus. Et quædam sanè partes præ multa humiditate, penitus resiccati non possunt. Si verò resiccata fuerint, homo moritur. Extre-
B mæ verò corporis partes, utpote natura sicca, resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis exurit, & si ipsas contingere velis, frigidas comperies ac siccas. Quapropter hi qui à febre ardente corpiuntur, internis quidem partibus à febre exuritur, externis autem frigidi sunt. Et lingua ac fauces ab interno spiritu ac caliditate exasperantur & arescunt. Quantū autem in ventriculo & in vesica inest bilis, quod quidem in ventriculo est, aliquando deorsum exturbatur. plerunque vero in primis diebus vomitur, aut in quatuor aut quinque. Vo-
C mitur autem hac de causa. Quum supernus ventriculus supercalefactus fuerit, attrahit in seipsum, & fit vomitus. Et ob hoc ipsum etiam ex febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniam maximè morbi transmutantur. Vbi enim sit pernus ventriculus supercalefactus fuerit, trahit in seipsum, & suscipit pulmo, & fit peripneumonia: & plerunq; pereunt, nimirum debiles iam existètes, & morbo alio nouo insuper generato, dies transigere nequeunt, donec sputum in pulmone concoquatur. Verum ut plurimum pereunt præ debilitate. Aliqui tamen euadunt. At quibus in vesicam confluit quid bilis, his crassa vrina mingitur, crassa autem à pituita. Biliofa verò alui egestio prodit, eo quòd combusta sint ea quæ sunt in ventre. Phrenitis hoc modo se habet. Sanguis qui est in homine, maximam partem ad prudentiam confert. quidam dicunt totum. Quum igitur bilis commota ad

na. 500.

de 151. 27. 72

Causa vomitionis quæ

Crassum lo-
tium cur.
Phrenitis
quæ fiat.

HIPPOCRATIS LIBER I.

venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex consueta compage ac motione dimouet, & serolum facit, ac calefacit. Calefactus autem, etiam reliquum corpus totum percalefacit, & desipit homo, & non sibi constat, præ febris copia, & sanguinis ad ferocitatem transmutatione, & motione non solita cōtingente. Assimiles autem sunt maximè hi qui phrenitide tenentur, his qui ab atra bile delirant. Nam & hi ubi sanguis ex bile & pituita corruptus fuerit, morbum habent, & dementes fiunt. Aliqui verò etiam insaniunt. Et qui phrenitide correpti sunt eodem modo. Tanto autem minor infania ipsumque delirium fit, quāto paucior ac debilior est bilis quā pituita. Porò subcruentum & liuidum est sputum in pleuritide ac peripneumonia, idque ob hanc causam. Principiò quidem plerunque neutrum spūunt, neque liuidum, neque subcruentum. vnde nosse conuenit morbum vehementem esse. Quum autem sputum subcrassum spūere cœperint, tunc maximè purgantur. Spuitur autem id à distentione venarum, in pleuritide quidem earum quæ sunt in latere, in peripneumonia verò earum quæ sunt in pulmone: & caliditatē ad seipsam affectio trahit. Si verò ægro abscessus fuerit ruptus, & purulentus fuerit, prima mox die sanguinem, & pus subcruentum ac liuidum cum saluta spuit. Liuidum autē fit à sanguine, si modicus ad multam saluam ammixtus fuerit, & nō statim spūatur, sed semiputrefactum & effeminatum in corpore manet. Moriuntur autem ex pleuritide, ubi & multum pituitæ ac bilis ab initio lateri fuerit affixum, & multum insuper ex reliquo corpore effluerit, & neque spūens, neque putrefaciens superarit, præ materiæ affluentis copia. Implentur autem arteriæ ab his quæ insuat, pituita ac purè, Deinde stertit, & frequenter, & illinc statim respirat, tandem verò omnia obturantur, & moritur. Eodem modo ex peripneumonia pereunt. Quicunque verò ex febre ardente moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Et resicantur primū quidem extremæ ipsorum partes, manus ac pedes. Deinde partes sicciores. Vbi autem humiditas ex corpore penitus fuerit exusta ac resiccata, sanguis quidem congelatur penitus ac perfrigeratur. Reliquum verò corpus exsiccatur, ac sic homo moritur. At ex phrenitide ita pereunt. Desipiunt in hoc morbo semper, nimirum sanguine corrupto,

Sputū subcruentū & liuidum cur

Liuidū spuū sanguis fit.

Peripneumonia quādo necat.

Febris ardens quādo perimat.

morbus cœcusa

Si a Phrenitici quomodo pereunt.

A rupto, & ex consueta motione emoto, & quum desipiant, nihil eorum quæ ipsis exhibentur accipiunt, quod saltem memoratu dignum sit. Quum verò progressum fuerit tempus, marcescunt ac imminuti consumuntur, tum ex febre, tum quod nihil alantur. Et primùm quidem extremæ partes consumuntur ac perfrigerantur. Deinde ipsis proximæ. Sed & frigiditatis, & febris, & dolorum principium hoc habet. Quum sanguis qui est in venis perfrigeratus fuerit à pituita, transmutatur & cōuellitur aceruatim aliàs alia parte, & tremmit. Tandem verò omnia perfrigerantur, & moritur.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS LI.

BER SECVNDVS, NO COR

NAPU MEDICO PHY-

NTER-

P. L. E.



Multum vrinx emititur vbi caput nimis incaluerit. Liquefcit enim in ipso pituita, liquefcens autem secedit partim ad nares, partim ad os, partim per venas quæ ducūt ad pudendum. Quum autem ad pudendum peruenerit, mingit homo & patitur quemadmodum ab vrinx stil-

licidio. Cæcutiunt autem quum ad venas in oculis peruenerit pituita, Aquosior enim fit visus & turbulentior, & splendor in oculis non similiter splendidus est, neq; in ipso compareret si videre voluerit, similiter sicut antè quum splendidus & purus esset. Hic in quadraginta diebus maxime sanatur. Si verò longo tempore postea morbus reuertatur, cutis capitis crassescit, & reliquum corpus attollitur, & crassescit, ac bonum colorem habet. Hæc pituita ad carnes conuertitur, & ab hac crassus esse videtur. Nam carnes quum sint perrigæ & eleuatæ ac rariores, sanguinem ex venis trahunt, & propterea bene colorati esse videntur. Alius morbus. Ca-

Cum quis multum mingit.

Qui visio debetetur.

car. a boni coloris in hoc. - id est.

*Pustularū
capitis ori-
go.*

*Caput cur
doliēt.*

*Malum ex
bono nō fit.*

*Tinnitus
auris unde.*

put vlceribus impletur, & corpus intumescit, & color morbi
regij est, & aliās alia corporis parte vlcera erumpunt: & fe-
bris aliās atque aliās corripit, & ex dorso aqua fluit. Huic
quum in capite pituita subbiliosa connutrita fuerit, vlcera
fiunt vbi sinciput pituita & bile perriatū fuerit, & vbi pi-
tuita rara & aceruata fuerit, itemq; bilis. Hæc enim cōsistit,
putrescit, & exulceratur. Attenuata verò pituita ad aures pe-
netrat. At in reliquo corpore vlcera eadē ratione qua in ca-
pite fiunt, sanguine & bile putrefactis quacunque in parte
fuerint collecta. Hac enim parte caro putrescit & exulcera-
tur, & accedentem pituitā ac bilem insuper putrefacit, & fit
pus. Alius morbus. Dolor circum circa caput vexat, & vo-
mit bilem, & difficulter mingit, & desipit. Hic caput qui-
dem dolet, præ nimia eius calefactione. Desipit autē quum
sanguis in capite à bile aut pituita fuerit calefactus, & plus
solito commotus. Vomit autem bilem, vtpote cōmota ipsa
in corpore. Et caput præ caliditate trahit in seipsum, & cras-
sissimum quidem vomit, tenuissimū verò in seipsum trahit,
Mingit autem & in hoc morbo ab iisdem, velut etiam in su-
periore dictum est. Alius morbus. Si circa cerebrum ve-
nularū supereuomant, nomen quidem rectum morbo non est.
Neque enim fieri potest vt aliqua vena, siue parua, siue ma-
gna supereuomat. Nominant tamen & dicunt supereuomitū.
Si verò etiam quàm maximè supereuomant morbum ab hoc
ipso fieri non est verisimile. Nam à bono malū fieri non po-
test, neque à malo vtique bonum fiat. Neque rursus bonum
plus iusto fieri potest. Verum supereuomere videntur, quum
ad venas bilis aut pituita ingressa fuerit. Eleuātur enim ve-
næ & pulsant, & dolor per totum caput dispergitur, & aures
sonitum percipiunt ac nihil audiunt. Et sonitus quidē per-
cipiunt, vtpote venis pulsantibus & palpitātibus. Tunc enim
sonitus est in capite. Grauiter autem audiunt, partim præ
interno strepitu ac sonitu, partim quum cerebrum & venæ
circa ipsum eleuantur. Præ nimia enim caliditate, vacuum
circa aurem partem cerebrum de seipso implet: & quum
æqualis aëris copia non insit, velut priore tempore, neque
æqualem sonum exhibeat, ea quæ dicuntur nō æqualiter se
imprimunt, atque ex hoc grauem auditum habent. Hic si
quidem erumpat ipsi ad nares, aut ad os aqua & pituita, sa-
nus

A nus sit. Si verò nō erumpat, septima die maximè moritur. At si in capite venæ supereuomant, id quod ab iisdem sit quæ & prius relata sunt. Signum vero quòd tali modo supereuomat hoc est. Quum quis aut manū, aut caput, aut aliam quandam corporis partem, hoc patientem incidat, sanguis niger profluit, & turbatus ac morbosus: quanquam neque sanguis nominari nulle mereatur, nisi tūc quum rubicundus ac sincerus fuit. Quum itaq; supereuomant ab iisdem causis, dolor & vertigo, & grauitas caput occupant. Dolor quidē, præ nimia sanguinis caliditate. Vertigo verò, quum acruatus ad faciem processerit sanguis. Grauitas autem, quæ copiosior sanguis fit in capite, & turbulentior ac morbosior, quàm intrinsecus.

Signū uenarū cerebri id efficiētū

Vertigo, grauitas.

B Cerebri corruptio.

S I cerebrum corruptū fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor adest, & somni expertus est, & ex naribus sanguis fluit. Sape etiā sanguinē vomit. Corruptitur autē cerebrū tali modo, quum aut nimium calefactus aut perfrigeratus, biliosus aut pituitosus plus solito factus fuerit. Vbi verò horum aliquid perpessus fuerit, etiam spinalem medullā supercalefacit. Et quum etiam hic percalefcit, dolorē spinæ inducit. Animo verò linquitur homo, quum pituita aut bilis ad cor consistit. Consistere autē necesse est cōmotis ac humectatis. Sudor autē fit præ dolore. Sanguinē verò vomit, quum venæ quæ sunt in capite, à cerebro fuerint calefactæ: quæ verò circa spinam sunt, à spina, Spina autē à spinali medulla. Medulla verò à cerebro, vnde sanè originē trahit. Quum igitur calefactæ fuerint venæ, & sanguis in ipsis efferbuerit, quæ quidē in capite sunt, venæ, distribuūt ipsum ad nares, & ad os: quæ verò circa spinā sanguifluæ, in corpus. Hic tertia aut quinta die plerūq; perit.

Alius morbus. Derepente dolor occupat caput, & statim vox intercipitur ac sui impotens fit. Hic in septē diebus moritur, si nō febris inuaserit. Si autē hac inuaserit, sanus euadit. Patitur autē hæc, quum atra bilis ipsi in capite commota fluxerit, maximè in parte in qua plurimæ sunt venæ, in collū in quā, ac pectus. Deinde postridie sideratus fit ac impotens, sanguine nimium perfrigerato. Et si superior euaserit, ita ut sanguis caleseat, siue ab his quæ exhibentur, siue à seipso, at-

Dolor capitis qui uocē intercipit.

HIPPOCRATIS LIBER II.

tollitur & diffunditur ac mouetur, & spirationem inducit, & spumescit, & à bile separatur, et sanus euadit. Si verò superior non euaserit, adhuc magis perfrigeratur: et vbi penitus perfrigeratus fuerit, & calor ex ipso defecerit, congelatur, & moueri non potest, sed moritur. At si ex ebrietatibus hæc patiatur (nam et hoc contingit) itidem moritur.

*Temulētia
hoc & ip/a
facit.*

Caries ossis capitis.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex osse corripit. Temporis autem progressu cutis de capite alia atque alia parte discedit. Talia verò patitur is cui in secunda ossis lamina, pituita superueniens resiccata fuerit. Hac enim parte rarum fit, et omnis humiditas ex ipso deficit, et quia aridum est, cutis ab ipso discedit. Hic morbus lethalis non est.

*Capitis stu-
por.*

Alius morbus. Si sideratus fiat, anteriorem capitis partem dolet, et oculis non æqualiter videt, et soporatur, et venæ pulsant, et febris debilis tenet, et corporis impotentia.

Hic patitur hæc, quæ venæ in capite fuerint calefactæ, et calefactæ pituita in seipsas traxerint. Et principium quidem morbi ex hoc fit. Anteriorē verò capitis partem ideo dolet, quod venæ in hac sunt crassissimæ, et cerebrum ad anteriorē capitis partē magis situm est quàm ad posteriorē. Et oculis ideo non videt, procumbente eo cerebro ac inflammato. Impotentia verò ideo corpus occupant. Postquam venæ pituitam in seipsas traxerint, necesse est præ pituitæ frigiditate, sanguinem magis nunc sisti ac perfrigeratum esse quàm priori tempore. dum autem sanguis non mouetur, fieri non potest, ut non etiam corpus quiescat ac torpeat. Et si quidem sanguis ac reliquum corpus superarint, ita ut calecant, homo euadit. Si verò pituita præualuerit, sanguis magis perfrigeratur ac congelatur. Et si frigiditas ac congelatio augeant, penitus congelascit ac perfrigeratur homo, et moritur.

Angina.

ANGINA siue cynanche fit, quum pituita in capite commota acruatim deorsum fluxerit, et in maxillis ac circa collum constiterit. Hic neque saluam deglutire potest, respirat autem violenter ac stertit, et aliquando etiā febris ipsum corripit. Et morbus sanè ex hac causâ fit, et aliquando sub ipsam linguam, aliquando paululum supra pectus.

Vua mor

A

Vua morbus.

V Va fit quum pituita de capite ad gurgulionem descen-
derit, & gurgulio præceps dependet, ac fit rubicundus.
Temporis autem progressu, nigrescit. Nigrescit autem hoc
modo. Venosus est gurgulio ac crassus, & postquam inflam-
matus est, calefcit: & præ caliditate sanguinem ex vena ad-
trahit, ac ab ipso nigrescit. Quapropter si non turgentem se-
ces, statim inflammantur. Nam vena calefacit, & præ cali-
ditate partes circa gurgulionem sanguine replet, & breui
suffocantur.

Tonsillæ ac vicine partes.

T Onfillæ, & partes sub lingua, & gingivæ, & lingua, &
quæcunque huiusmodi hoc loco consistunt: hæc omnes
partes ex pituita ægrotant. Pituita autem de capite descēdit.
Caput autem ex corpore trahit. Trahit autem vbi fuerit ca-
lesfactum, percalefcit autem à cibis, et sole, et frigore, et labo-
ribus ac febrili calore. Quum verò calesfactum fuerit, tenuif-
simum ex corpore ad seipsum trahit, Vbi verò traxerit, rur-
sus id ad corpus descendit.

Morbi à capite fientes.

Q Vum repletū fuerit caput, & ab aliquo ex relatis perta-
lesfactum, torpor caput tener, & frequenter mingit, &
alia patitur quæ ex vrinæ stillicidio contingere solent. Idem
per nouem dies hæc patitur. Et si quidē per nares aut aures,
aqua & mucus erumpat, à morbo liberatur, & vrinæ stillici-
dium sedatur, mingitq; citra dolorē, vrinam multam, & al-
bam, ad vigintidies. Et dolor capitis cessat, & intuenti splen-
dor ex oculis subtrahitur, & dimidiatas rerū facies se videre
putat. Hic quādragesima die penitus sanus euadit. Multis ve-
rò quandoq; morbus redit, septimo aut decimoquarto anno.
Et capitis cutis ipsū crassescit, & ad tactum cedit, & de paucis
cibis tener ac bene coloratus apparet, & non acutum auditū
habet. Quum ita habentem offenderis in principio morbi,
priusquā erumpat aqua per nares & aures, & tenuerit ipsum
dolor: derafo capite vtrem coriaceum circum frontem deli-
gate oportet, aqua plenum calidissima, quantū sustinere po-
test, atque hinc ipsum calefieri permittere, & vbi perfrigera-
tus fuerit, alium adhibere. Si verò hinc debilitetur, desistere:

Capitis tor-
por narcō-
us.

Straguria.

Medela
que.

HIPPOCRATIS LIBER II.

tempore interposito eadem repetere, donec remiserit dolor. **D**
 Et si alius non egerat, infusum per clysterem immittere, &
 vrinam cientibus in potu daris, aquam mulsam aquosam in-
 super bibendam exhibere. & calore quàm maximè foueatur.
 Sorbeat autem succum ptisanæ tenuem. Si verò venter non
 subeat, mercurialem in aqua coctam terito, ac succum excola-
 to, & de ipso, ac de ptisanæ succo, parem mensuram permisce-
 to, & modicum mellis adijcito. Hunc succum ter in die for-
 beat, & vinum mellei coloris, aquosum, album modicum, à
 sorbitione insuper bibat. Postquam autem eruperit ipsi per
 nares mucosa, & vrinam crassam eiecerit, & à dolore capitis
 liberatus fuerit, vtre amplius ne vtatur, sed multa calida lo-
 tus, vrinam cientia, & aquam mulsam aquosam bibat. **E** t pri-
 mis quidem diebus, miliū delingat, & cucurbitā edat, aut be-
 tas per tridui. Deinde cibus vtatur mollissimis ac quàm maxi-
 mè per aluum subeuntibus, ita vt semper modicum ad cibos
 priores addat. At vbi quadraginta dies præterierint (sedatur
 enim morbus maximè in tanto tēpore) capite ipsius purga-
 to, prius medicamento exhibito, ipsum deorsum purgato, si
 tempus anni hoc permittat. Deinde serum ad dies septem
 bibendum dato, aut pauciores, si debilis existat. Si verò mor-
 bus reuertatur, fomento per totum corpus adhibito, post tri-
 die veratrum bibendum dato. Deinde quanto tempore ti-
 bi visum fuerit intermittito, & tunc capite purgato, medi-
 camento deorsum purgante exhibito, crustas octo capiti in-
 urito. duas circa aures, duas in occipitio. hinc atque hinc ad **F**
 ceruicis neruum, duas in naso circa angulos oculorum. Ve-
 næ autem circa aures vrendæ sunt, donec pulsare desinant.
 Ferramentis verò cuneoli forma paratis obliquas venas per-
 urito. Atque hæc vbi feceris, sanitas continget. Alius mor-
 bus. Vlcerebus impletur caput, & crura intumescunt, ve-
 lut ab aquæ potu. & in tibiis tumor infarcitur, & si premas,
 color morbi regij apparer, & vlcera aliàs alia corporis parte
 erumpunt, maximè tamen circa tibiis, & malum aspectum
 præ se ferunt. Vbi verò inflammatione liberata sunt, cito
 sana sunt. & febris aliàs atque aliàs corripit. Caput autem
 semper calidum est, & ex auribus aqua fluit. Quum ita ha-
 bet, medicamentum ei dandum est, à quo pituita & bilis sur-
 sum purgatur, si quidem frigus fuerit, præfoto ac calida loto.
 Dein

*Caput ulce-
ratur.*

*Medela
qua.*

A Deinde tribus diebus interpositis caput purgato. Postea etiā deorsum purgans medicamentum bibendum dato. Si verò tempus anni ferat, etiam serum postea bibat. Sin minus, lac asininum. Post purgationes cibis quā paucissimis, & quā maxime per aluum subeuntibus vtatur, & non lauet. Si verò caput exulceratur, fecem vini ad smegma faciendum comburito, & glandis corticem tritum leuigatum ammisceto. & pari nitro ammixto, his defricus multa calida lauetur. Inungat autem caput baccis lauri tritis, & gallis, & myrrha, & thure, & argenti flore, adipeque suillo ac oleo laurino. His permixtis inungatur. Post hoc autem tempus vomitibus vtatur bis in mense, & exerceat se ac calida lauet.

B At si his adhibitis, ex reliquo quidem corpore morbus fuerit exclusus, verum in capite ipsi vlcera adhuc fiant, rursus capite purgato, medicamentum deorsum purgans postea bibendum dato. Deinde raso capite, fissuras raras incutito, & vbi sanguis effluxerit confricato. Postea lanas succidas vino imbutas superligato, & postquam exolueris, spongia detergito, & ne humefacto. Deinde oleo subito cupressum inspergito. Laneis autem deligamentis donec sanus fiat vtatur. Alius morbus. Dolor caput corripit, & si paululum moueatur, bilem vomit. Quandoque etiam vrinam difficulter emittit, ac desipit, & septima die quandoque moritur: & nona quoque ac vndecima, septimam transgressus, si non eruperit per nares aut aures. Si verò eruperit, euadit.

C Fluit autem aqua subbiliosa. Deinde temporis progressu putrefacta pus fit. Quum igitur ita habuerit, quandiu quidem dolor tenuerit in principio, priusquam ex naribus ac auribus erumpat, spongas aqua calida imbutas cito capiti admovento. Si verò his non laxetur, vtre vtari eodem modo velut in superiore morbo. Bibat autem aquam mulsam aquosam. Sin minus, aquam de farina crassa in ipsa macerata. Sorbeat prisanæ quoque succum, & vinum album aquosum insuper bibat. Postquam verò per aures eruperit, et febris ac dolor remiserit, cibis vtatur per aluum subeuntibus, à modicis initio facto, semper aliquid addendo. Et caput calida lauetur: et aures colluat aqua pura, et spongiā melle tinctam indat. Si verò neque sic rescicetur, sed diuturna fluxio fiat, collutione facta, argenti florem, sandaracham, ceru-

*Si morbus
repulset
quid agen-
dum.*

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER II.

ſam ſingula æquis portionib. trita leuigatâq; in aurē indito, D
eamq; expleto, & ſi qd præterlabatur, de medicamento am-
plius ſuperaddito. Vbi verò reſiccata fuerit auris, expurgato
ac medicamētum eluito. Poſtea (obſurdeſcit enim primū re-
ſiccata) lenibus fomentis aures foueto. Nam & ſic vix ac lo-
go tempore ſedabitur. Moriuntur autē etiam, ſi dolor in au-
re fuerit, & nihil in ſeptē diebus eruperit. Hunc multa cali-
da lauato, & ſpongijs aqua calida imbutas exprime, & repi-
das ad aurem appone. Si verò neque ſic erumpat, auri fomen-
tum adhibeto. Sorbitionibus autem ac potionibus iſſidem

*Cerebrina
dicitur ſigna*

vtatur quibus in ſuperioribus. Alius morbus. Si aqua in
cerebro fuerit, dolor acutus per ſinciput ac tempora emergit,
aliàs alio loco: & rigor ac febris aliàs atq; aliàs, & regiones E
oculorum dolet, & excutit, & pupilla ſinditur, & ex vno duo-
ſe videre putat, & ſi ſurrexerit, vertigo ipſum corripit, & ven-
tum non ſuſtinet, neque ſolem: & aures tinniunt, ac inter
audiendum ſtrepitu offenditur. & vomit ſalinam ac pituitā,
quandoq; etiam cibos: & capitis cutis attenuatur, & conta-
ctu gaudet. Quum ſic habuerit, primū dandum eſt ipſi me-
dicamentum quod ſuſum pituitam educit, & poſtea caput
purgato. Deinde interpoſito tempore medicamentum deorſum
purgans bibendum dato. Poſtea cibus quā maxime al-
uum ſubeuntibus ipſum reſcito, ſemper modica addendo.
Poſtquam verò comederit iam cibos ſufficientes, vomitibus
ieiunus vtatur, lenticulæ decocto mel & acetum miſcens, &
olera antea comedens: & in die illa qua vomuerit, primū P
eyceonem bibat tenuem, poſtea ad vesperam cibus medicis

*Medela
qua.*

vtatur, & non lauet. & à cibus deambulet, itemque mane, vi-
rans ventum ac ſolem, & ad ignem ne accedat. Et ſi quidem
taliam faciens, ſanus fiat, bene eſt. Sin minus, vere vbi ipſum
prius purgari primū veratro. poſtea etiā in nares medica-
mentum infundito, & pauco tempore interpoſito deorſum
purgato, Deinde cibus reſcito. Poſtea incifo capite iuxta ſin-
ciput, ad cerebrum vſq; perforato, & veluti ſectiōe ac perfo-
rationem curato. Alius morbus. Rigor, dolor, & febris
per caput, maxime ad aurem, & ad tempora, & ad ſinciput,
& oculorum regiones dolet, & ſupercilia ipſi incumbere vi-
dentur, & grauitas caput detinet, & ſi quis ipſum mouerit
minget, & multum ac facile mingit. & dentes torpent, & ſtu-
por

*Capitis
alius morbus*

A por ipsos tenet, & venæ attolluntur ac pulsant in capite, & nō potest quietus esse, sed anxius est ac desipit præ dolore. Huic si quidem per nares aut aures erupuerit, aqua profluit subpurulenta, & sanus euadit. Sin minus, plerumq; in septē diebus moritur. Hic morbus maxime fit ex febre lypyria, quum liberatus à febre, nondū purgatus, aut cibis se impleuerit, aut inebriatus fuerit, aut in sole laborarit. Quum sic habuerit, primum sanguinem de capite mittito, vnde cumq; tibi visum fuerit. Et post sanguinis missionem, raso capite perfrigatoria ipsi adhibeto. Et si alius non subeat, infusum per clysterem admittito. In potu verò prisanæ succum frigidum dato, & aquam insuper bibendam. Si verò ad perfrigatoria

Medela

B non remittat, transmutatione facta, vtre vitior ac calefacito, postquam autem quieuerit dolor, cibis vtatur aluum subeuntibus, & ne impleatur. Vbi verò vigesimum diem attigerit sedato dolore, fomento capiti ipsius adhibito, ad nares medicamentum apponito, & interposito triduo medicamentum deorsum purgans exhibeto. Alius morbus. Si venæ circa cerebrum sanguinem superuomuerint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, &incipit, ac posteriorem capitis partem, & aures tinnunt ac statim implentur, et nihil audit, & anxius est, et seipsum præ dolore iactat. Hic quinta aut sexta die moritur. Cum sic habuerit, caput ipsius calefacito. Si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortem effugit. Si vero sex dies euaserit, victum ipsi velut in superiore morbo constituto.

Cerebri morbus.

C Alius morbus. Si venæ superuomuerint in caput, dolor grauis totū caput tenet, et ad collum, et aliās ad alias capitis partes trāsit. Et vbi surrexerit, vertigo ipsum corripit, febris autem non inuadit. Cum igitur sic habuerit, de raso capite si non calefactorijs cesserit, frontē ea parte qua capillus desinit à capite findito: vbi verò secueris disparata ac diducta cute, cum sanguis defluerit, salē tenuissimū inspergito: & postq̃ efflueris sanguis fissuram componito, et duplici filo totam ipsam includito. Deinde spleniū cera ac pice illicitum, vlcere imponito, et lana sordida superimposita deligato, & ad dies septem ne soluito, si non dolor vexet: si verò dolor adfuerit, exsoluito. Donec autem sanus fiat, aquam de macerata in ipsa crassa farina bibendam dato, et prisanæ succum sorbendum,

*Medela**Capitis morbus.**Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

- Cerebri li-**
liosum, cum
est. dum, & aquam insuper bibendā. Alius morbus. Si cere- **D**
brum bile infestatur, febris emergit debilis, & rigor, & dolor
per totū caput, maxime ad tēpora, ad sinciput, & ad regiones
oculorum: & supercilia ipsis impendere videntur, & ad aures
dolor procedit, & quandoque per nares bilis defluit: & oculo-
los habetes habent, & plerisque dolor ad dimidiā capitis par-
tem extenditur, quandoq; etiam per totum caput. Quum sic
Curatio. habuerit, perfrigatoria ad caput apponito, & postquam do-
lor ac fluor cessarit, apij succum in nares instillato, & ne la-
uet quandiu dolor obtinuerit. Et sorbeat milium tenue mo-
dico melle affuso, & bibat aquam. Si verò aluum non subeat,
Quæ uentre
cant. brassicas edat & succum sorbeat. Sin minus, folia sambuci eo-
dem modo. Et postquam tempestiuum tibi esse visum fuerit **E**
cibos quā maxime aluum subeuntes ipsi exhibeto. Et si de
pulsio fluore ac dolore, grauitas ipsi supra supercilia incūbat,
& in naso mucus crassus ac putridus fuerit, fomēto ex aceto,
& aqua, ac origano ipsi adhibito, deinde calida aqua loto, flo-
rem aris & myrrham ad nares apponito. Atque his factis ple-
rumque sanum efficies. Morbus autem non est lethalis.
- Cerebri cor**
rumpio. Alius morbus. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex
cervicis neruo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, &
derepente nouus sudor adest, & per nares sanguis fluit, Vo-
munt quoque multi. Hic triduo moritur. Si verò septem dies
Medela. transgrediatur: plerique autem non transgrediuntur: & si san-
guinem vomat, aut ē naribus fundat, neque calidā ipsum la-
uato, neq; calefactoria adhibeto. Verū acetū album aquo- **F**
sum bibendum dato, & si debilis sit, ptisanam sorbendam. Si
verò plus iusto sanguinem vomere tibi videatur, aut ex nari-
bus ipsi fluat, à vomitu quidem bibat farinā trimestris triti-
ci in aquā inpersam. Si verò ex naribus fluat, venas & in bra-
chijs, & in temporibus, splenijs suppositis deligato. At si neu-
trum horū ipsi affuerit, dolet autem cervicis neruum, & col-
lum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum eruo pecto-
ra, dorsum, & cervicis neruum, & collum calefacito. Nam his
factis maximam utilitatem capere poterit. Verū pauci hu-
iusmodi morbum effugiunt. Alius morbus. Sanum de-
Capitis su-
bitus dolor. repente inuadit dolor circa caput, & statim vox intercipitur,
& stertit, & os hiat, & si quis ipsum vocet aut moueat, solum
suspirat, nihil autē intelligit, & multum mingit, & mingere
se non

A si non sentit. Hic si non febris ipsum corripiat, in septē diebus moritur. Si verō corripiat, plerunq; sanus fit. Huiusmodi verō morbus senioribus maximē fit, & magis quā iunioribus. Hunc ubi sic habuerit, lauare oportet multa calida, & quā maximē calefacere, & aquā mulsam tepidam in os instillare. At si resipiscat, & morbum effugiat, ubi ipsum cibus refeceris, ita ut viribus valere tibi visus fuerit, indito in nares ipsius medicamento, & paucis diebus interpositis, pharmacū deorsum purgans bibendum dato. Si enim ipsum nō purgaueris, timor est ne rursus morbus reuertatur. Effugit autem non ita valde ex primo. Alius morbus. Si quis ex ebrietate voce priuetur, & statim sanē ipsum etiam febris corripiat,

*Senium
morbue.
Medela.*

B sanus fit. Si verō non corripuerit, die tertia moritur. Si itaq; in ita affectum incideris, multa calida lauato, & spongas in aqua calida tinctas ad caput apponito, & cepas decorticatas in nares indito. Hic si quidem apertis oculis, & loquutus, ad se redierit, & nō nugeatur, hac die sopore pressus iacet, postridie verō sanus fit. Si verō exurgens bilem vomuerit, insanit, & moritur maximē in quinque diebus, si nō dormierit. Huic igitur hæc facere oportet. Multa calida lauato, donec ipse ad seipsum redeat. Deinde multo oleo illitū, ad stragula molli-ter reclinato, & vestimentis contegito: & neq; lucernā apud ipsum ardere, neq; loqui permittito. Ut plurimum enim ex balneo obdormit, & si dormierit, sanus euadit. Postquā verō ad se redierit, primis tribus aut quatuor diebus, milium tenue

*Temulen-
tia mor-
bus.*

Medela.

C sorbear, aut ptisanæ succum, & vinum mellis specie referens bibat. Deinde cibus vtatur mollissimis, ac paucis primum.

Cerebri corruptio.

Si corruptio cerebrum inuaserit, dolor tenet maximē anteriorem capitis partem, & paulatim etiam intumescit, & liuida fit: & febris, & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, secare oportet qua parte intumuit, & perpurgato osse ipsum radere donec ad secundam laminam perueniat, deinde velut fracturam curare.

Carallo.

Caries siue teredo.

Quam caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, & progressu tēporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura. Et si hanc reseueris, cōperies ipsum

HIPPOCRATIS LIB. II.

Curatio.

Medela.

ipsum os eleuatum, & asperum, ac fuluum. Quibusdam verò D
etiā ad cerebrum vsq; corrosum. Vbi in hoc modo affectum
incideris, si quidē vltra corrosum fuerit, sinere optimū est, &
vlus quā celerrimē curare. Si verò corrosum nō fuerit, sed
asperū, ad secundam vsq; laminā rasum, velut præcedens cu-
rare. Alius morbus. Si sideratus quis fiat, & anteriore ca-
pitis partē dolet, & oculis videre non potest, sed sopor ipsum
tenet, & venæ in temporibus pulsant, & febris debilis tenet,
& totius corporis impotētia, & emacescit. Quum sic habue-
rit, multa calida ipsum lauato, & calefactoria ad caput adhi-
beto. A fomētis verò myrrhā & æris florem in nares infun-
dito. Sorbeat autē ptisanæ succū, & aquā bibat. Et si quidem
vbi hæc feceris meliūs habuerit, bene est. Sin minus, quæ E
vna spes reliqua est, sinciput ipsius findito, & vbi sanguis de-
fluxerit, labijs cōpositis curato ac deligato. Si verò non se-
cueris, decimo octauo aut vigesimo die plerunque moritur.

Angina.

Curatio.

*Gargaris-
mus.*

Salua

Febri corripit & rigor, & dolor capitis: & maxillæ in-
tumescent, & sputū difficulter deglutit. Expuit autem &
saluias duras ac paucas: & infrā in faucibus stertit: & si appre-
hensā lingua inspexeris, gurgulio non magnus est, sed mol-
lis, fauces autē intrinsecus salua viscosa plenæ sunt, & non
potest excreare, & decubere nō sustinet, verū si decūbat suf-
focatur. Hūc si ita affectū deprehenderis hæc facito. Primū
quidē cucurbitas ad verticulū in collo primū affigito. Deinde in capite præraso, & iuxta aurē ab utraq; parte apponito.
Et vbi cucurbitā affixeris, ad multū tempus adhærere finito.
Posteā fomentū ipsi ex aceto, nitro, origano, & nasturtij se-
mine adhibeto. Hæc terito, & cū aceto pari aqua permixta di-
luito, ac parū olei instillato. Deinde in ollulā infusus, opercu-
lo addito arūdinē cauā immittito, & prunis imposta ferue-
facito: & vbi per arundinis fistulā vapor ascēderit, hianti ore
vapore intro trahat, cauens ne fauces adurat. Forinsecus autē
spōgias aqua calida imbutas, ad genas ac maxillas apponar.
Gargarismus porrō ipsi parādus est, ex origano, satureia, apio,
mētha, & modico nitro, cū aqua mulsa aquosiore, & modico
aceto instillato, prædictarū herbarum folia trita, & nitrū, in
aqua mulsa diluito, tepefacito, ac sic gargariset. At si salua
supprim

A Supprimatur, myrrhi ramulum cōplanatū sumito, & tenera *purgata.*
 ipsius summa parte incuruata, ac molli lana obuoluta, in fau-
 ces immissa, saliuā expurgato. Et si venternō egerat, glandē
 subdito, aut clysterē adhibeto. Sorbeat autē prisanā succum
 & aquam bibat. Si verō tumor ipsi oboriatur, & ad pectus
 intumescat, ac rubicundus sit, & ardeat, amplior spes salutis
 est. Facienda verō hæc sunt, postquā inflammatio foras con-
 uersa fuerit. Betas in frigidam aquam tinctas apponat. Tepi-
 das collutiones ore gargariset, & ne lauet. Hæc faciens ma-
 ximē euaserit. Est autem morbus lethalis, & paucissimi eua-
 dunt. Alia angina. Febris & dolor capitis corripit, & fau-
 ces inflammantur, itemq; maxillæ, & saliuam deglutire nō
 potest, spuit autem crassam ac multā, & difficulter loquitur. *Secunde*
 Quum ita habuerit, primū cucurbitam affigito, eodē mo- *Medela.*
 do veluti suprā diximus. Deinde spongiam aqua calida im-
 butā, ad collum ac maxillas adhibeto. Aquam autē mulsam
 aquosam colluendam dato. Et succū prisanæ sorbere cogito.
 Si verō ipsi talia facienti saliuā non exierit, eodem modo vel-
 lut in priore fomētum adhibeto. At si ad pectus conuertatur
 inflammatio, aut ad collum, betas aut cucurbitas concisas, in
 frigidam aquam tinctas superimponat, & frigidam aquam
 bibat, quo saliuā facilius exscreetur. Cū autem ad pectus
 extumuerit, pleriq; euadunt. Si verō faucibus ac tumoribus
 sedatis, morbus ad pulmonem conuersus fuerit, febris statim
 corripit, & lateris dolor, & ut plurimum moritur, vbi hoc fa-
 ctum fuerit. Si verō quinq; dies effugerit, suppuratus sit, si nō
 ipsum statim tussis inuaserit. Si verō inuaserit, facta exscrea-
 tione depurgatus, sanus sit. Huic quā diu dolor latus tenue-
 rit, latus calefaciendum est, & adhibenda quæ in peripneu-
 monia adhiberi solent. At si quinq; dies effugerit, & febris
 remiserit, tussis autem remaserit, primis quidē diebus sor-
 bitionibus vtatur. Postq̃ autē cibos sumere inceperit, quā
 pinguisimos ac maximē saluos edat. Quod si tussis nō affue-
 rit, nimirū suppuratū fieri scito, & vbi cœnauit cū dormire
 volet, alliuū edat crudum quā plurimū. & vinū insuper bi-
 bet. Sin minus, posttridie calida loto suffitum adhibeto, & si
 eruperit, velut suppuratū curato. Alia angina. Lingue po-
 sterior pars inflammatur, itemq; locus sub tonsillis ad gut-
 tur,

Tertia an-
gina.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

tur, & neque saliuam, neq; quicquā aliud deglutire potest. Si D
verò coactus fuerit, per nares ipsi effluit. Quum ita habuerit
mentam viridem tritā, apium, organū, & nitrum, & rhoem
rubrum melle diluito. & ad crassam formā redacta, intus lin
guæ qua parte tumor illinito. Postea ficus aqua coquito, & de
rhoe parum tritū, hoc ficum decocto diluito, ac gargarisan
dum dato si id potest, sin minus colluendum. Bibedam verò
aquam de farina crassa in ipsa macerata exhibeto. Foris autē
ceruicem & maxillas, farina calida in vino & oleo cocta in
tegito, & panes calidos apponito. Suppuratur enim plerunq;
in loco sub tonsillis, & si quidem sua spēte eruperit, sanus fit.
Si verò non rumpatur, vbi digito cōtigeris an molle sit, fer
ramēto acuto ad digitum alligato perforato. His adhibitis E
multi sani fiunt. Est autem hic morbus minimē lethalis.

Vua morbus.

Medela.

Si vua morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars
aqua impletur, & rotunda fit ac pellucida, & spirationem
intercipit. Et si maxillæ ab utraque parte inflammatae fue
rint, suffocatur. Si verò ipse morbus per se consistat, maxillis
non inflammatis, minus moritur. Quum sic habuerit, gur
gulionem digito apprehensum sursum ad palatum apprimi
mito, & summam ipsius partem præsécato. Postea foliorum
hortensium condimentariorum decoctum gargarisandum
dato, & farinam frigidam delingendam, aquamq; insuper bi
bendam: & ne lauet.

Tonsillæ morbus.

Medela.

Si tonsillæ fiant, intumescunt sub maxillis ab utraq; par
te, & ad contactum foris durum est tuberculum, & gur
gulio totus inflammatus est. Quum sic habuerit, immisso
digito tonsillas protrudito, ad gurgulionem autem florem
aridis sicum illinito, & foliorum condimentariorum horten
sium decoctum, velut à sole calidum gargarisandum dato.
Foris qua parte tumor est, ordeaceam farinam in vino & o
leo coctam calidam pro cataplasmate apponito. Postquam
verò tubercula mollia esse tibi visa fuerint intrinsecus ad
contactum, scapello ipsa pertundito. Quædam etiam sua
sponte sedantur.

Tuberculum sub lingua.

Situber

A Si tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatum, fiat, *Hypoglossis.* lingua intumescit, & pars sub ipsa ac externa ad tactū dura est, & saluā deglutire non potest. Cū sic habuerit, spongiam aqua calida imbutam apponito, & ordaceam farinam vino ac oleo coctam, foris vbi tumor est imposito, Gargariſet ficuum decoctum, & ne lauet. postquam autem purulentum factum fuerit, secato. Aliquando verò sua sponte erūpit, & sedatur non sectum. Si verò foras suppurauerit, perurito.

Inflammatio consistens ad palatum.

Si inflammatio constiterit ad palatum, intumescit & suppuratur. Quum sic habuerit, tuberculum inurito. Vbi verò exierit pus, reliquum eluito, primū nitro & aqua calida. **B** deinde vino. Postquam autem elueris, vuam passam albam exemplis vinaceis tritam, in vstura locum indito, & vbi exciderit, vino meraco tepido colluat, & vbi edere quid aut sorbere valet, spongiam indat, atq; hæc faciat donec sanus fiat.

Polypus.

Si polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum dependet, veluti gurgulio. & vbi expirationē facit, progreditur foras, & est mollis, vbi verò inspirationem facit, retrocedit: & loquitur obscure, & cū dormit, stertit. Quum sic habuerit, *Medela.* spongiam in rotundum concisam, & velut spiram factā, lino Aegyptio obuoluto, ac duram effcito. Sic autem eius magnitudinis, vt ad nasum quadret. Spongiam verò quadruplici lineo filo deligato, ita vt vnumquodq; lōgitudinē habeat cubitalem. Deinde facto vno ipsorū principio, virgā stanneā tenuem sumito, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissa per foramen filorum principio, virgam inacutam in os transmittito, & attrahito donec filorum principium apprehēdas. Postea specillo instar vngulæ bifurcato sub gurgulionem subposito, renitens trahito, donec polypum extra xeris. Postquam verò ipsum extraxeris, & sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo obuolutum indito, & de cætero xris flore in melle cocto, linamentum illine, atq; sic in nasum inde. Et vbi iam vlcus curatum fuerit, plumbū efformatum ita vt ad vlcus perueniat, melle illine, & donec sanus fiat, appone. Alius polypus. Impletur nasus carnibus, & ad contactum caro dura apparet, & per nasum

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

spirare non potest. Quum sic habuerit, fistula immissa, ferra D
mentis tribus aut quatuor vrito, & post vstionem veratrum
nigrum triticū inijcito, & postquā cōputruerit ac exciderit
caro, linamenta melle illita cum aris flore indito. & vbi cu-
ratū fuerit vlcus, plumbeas massas siue fistulas melle illitas
immittito, donec sanus fiat. Alius polypus. Intrinsecus ex

Medela.

cum ita habuerit, chordam nerueam accipito, & facta E
in ipsa parua ansula, eam tenui filo obligato, deinde alterum
principiū per ansulam transmittito, alia maiore ansa facta.
Postea principium illud per virgam staoneam transmittito.
Deinde ansam illam maiore in nasum indito, & specillo in-
secto ipsam circū polypum obducito ac adaptato, & vbi cir-
cumsita fuerit, virgam in os transmittito, & arreptam ipsam
trahito, eodem modo specillo instar vngulæ bifurcato sup-
posito sub gurgulionē ac renitente. Postquā autem extraxe-
ris, curato velut superiorem. Alius polypus. Intrinsecus
circa cartilaginem alicunde durum quid nascitur, & videtur
quidem caro esse, si verò ipsum attigeris, strepitum edit vel-
lut lapis. Cū sic habuerit, fistula per scalpellum naso expur-
gato, deinde inurito. Atq; hoc facto nasum rursus confuito,
& vlcus curato, linamētum melle illitum indens, & vbi cō-
putruerit, aris florem cum melle illinito. Fiat autem curatio
plumbeis massis itidem immisis. Alius polypus. Nascū-
tur ex obliquo cartilaginis in summo, velut cancelli. Omnes
autem hos vrere oportet, & post vstionem veratrum insper- F
gere. Postquam autem computruerint, aris flore cum melle
expurgare. Curatio autem etiam plumbo immisso fiat.

Medela.

Morbus regius niger.

Color sit niger circa faciem, & maximè circa partes ve-
lut in vmbra occultatas: & oculi cum virore pallidi,
itemque lingua infernè, & venæ sub lingua crassæ ac nigrae:
& est homo sine febre, ac mingit vrinam crassam, biliosam.

Medela.

Quum ita habuerit, primū venas sub lingua secato, dein-
de calida multa loto, asphodeli radices bibendas ieiuno da-
to, ita vt æquales quinque radices depurgatas in vino co-
quas, & apij foliorum quantum manu plena capit, addas. Af-
fundito autem vini dulcis tres heminas dimidiatas Aeginē-
ses,

A ses, vt à coctura semihemina supersit. Hoc permixtū bibendum dato. Postquā autem minxerit, cibis aluum subeuntibus vtatur, et à cibo cicer album edat, et vinum album, multum, aquosum bibat: et apium ac porrum in cibo edat, faciat autem hæc per dies septem, et si quidem in his color probè depurgatus esse tibi visus fuerit, bene est. Sin minùs, etiam alios tres hæc faciat. Postea interposita vna atque altera die, medicamentum ad nares apponito. Deinde pharmacum deorsum purgans bibendū dato, à quo bilis purgatur. Et si splenicus fuerit, alininū lac aut serum postea exhibeto. Hæc faciens, sanum efficies. Alius morbus regius. Febris corripit debilis, et grauitas caput tenet, et quibusdam sanè febres cessant. Ipse verò fit cum virore pallidus, et maximè oculi, et debilis est, et corporis impotentia adest, et vrinam crassam cum virore pallidam emittit. Hunc calida lauato, et vrinam cientia bibenda dato. Postquā autem purior esse tibi visus fuerit, et color melior apparuerit, medicamentum ad nares appone, et postea deorsum purgans bibendum præbe. Cibis autem vtatur quā mollissimis. Vinum bibat album, dulce, aquosum. Hæc faciens sanus euadet.

Febris à bile.

Si bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie, ac dimittit. Detinet autem in meridie, et os amarum est, et quum sine cibo manet, offendit hoc ipsum. Vbi verò ederit, strangulatur, et à modicis quibusdam cibis impletur, et abominatur, et vomitiones ipsum inuadunt, et ad lumbos ac crura grauitas incumbit, et nultum dormit. Hic si post febrem exudarit frigidum ac multum sudorem, et febre nō liberetur, morbum diurnum sentiet. Si verò non sudarit, citius iudicatur. Quum sic habuerit, et ad nonum diem deuenit, pharmacū dato. Nam si statim à febris initio dederis postquā purgatus est febris, repetit, et rursus medicamento opus habet. At si os non afficiatur, verū ad imum ventrem tormen irruat, pharmacū deorsum purgans bibendum dato, et postea lac alininum, aut serum, aut aliquem succum. Si verò debilis fuerit, per clysterem subtilis eluito.

Ante medicamentū verò potionē, si quis febrat, danda est ipsi aqua mulla aquosa. Altera autem die qua febris detinet, aquam frigidam quantum bibere volet, dabis. Vbi verò re-

Medela.

Medela.

spe in qd dicit
vide in tra
196. 388

*Continua
febris.*

Curatio.

Medela.

*Tertiana
febris.
Medela.*

Medela.

miserit febris, ptisanæ succum, aut milium tenue sorbeat, & D
vinū album, odoratū, aquosum insuper bibat. Si verò febris
neq; noctu, neq; interdiu remittat, & ad cōtactum supernas
partes habeat calidas, venter autem & pedes frigidi sunt, &
lingua aspera: huc medicamētū ne dederis, sed molli infuso
per clysterē subluo, & ptisanæ succū bis in die frigidū sor-
bendum dato, & vinū aquosum insuper bibendum. Reliquo
verò tempore aquā frigidissimā bibat. Hic si quidē septima
die exudarit, & febris ipsum dimiserit, bene est. Sin minū,
decimaquarta die plerunq; moritur. Alia febris. Foris ad
cōtactum febris debilis est, intrinsecus autē ardet, & lingua
ipsum aspera est, & per nares & per os spirat calidū. Quinta
die præcordia dura sunt, & dolor inest, & calor qualis in E
morbo regio apparet, & crassam ac biliosam vrinam eijcit.
Hic si septima die rigor & febris vehemēs apprehēderit, &
exudarit, bene est. Sin minū, moritur septima aut nona. Cor-
ripit autē maximē hic morbus, si nō annus squalidus fuerit.
Quum sic habuerit, quotidie calida lauato, aquamq; multā
aquosam multā bibendā dato, & ptisanæ succū frigidū bis in
die sorbendū. A sorbitione verò vinū bibat aquosum, albū,
modicū. Si verò alius nō egerat, clysterē adhibeto, aut glan-
dulam subito. Cibū autē ne exhibeas, donec febris remit-
tat. Vbi verò sedata fuerit, pharmacū deorsum purgans bi-
bat. Reuertitur enim quandoq; morbus, si impurgatus per-
manserit. Et ampliū morbus hic rursus corripit, si sanguis
nimiū biliosus factus fuerit. Alia febris. Si tertiana febris F
tenuerit, si quidem non omisis tribus inuasionibus, quarta
corripiat, pharmacū deorsum purgans bibedū dato. Si ve-
rò pharmaco nō opus habere tibi videatur, radicū quinque-
folij tritarum acetabuli mensurā, ex aqua bibendam dato. Si
verò neq; sic cesset, multa calida loto, trifoliū, & silphij suc-
cum, in vino pari aqua ammixta, bibenda præbeto, & reclina-
to vestimenta multa integito, donec exsudet. Postquā
verò exsudarit, si sitiat, polentam cum aqua bibat. Vesperi
autem milium coctum tenue sorbeat, & vinum insuper bi-
bat, donec febris cesset: & cibus quā mollissimis vtatur.

Febris quartana.

Q Vum febris quartana ex alio morbo non purgatū ap-
prehenderit, pharmacū deorsum purgans bibendum
dato.

A dato. Deinde caput purgato. Postea rursus infra purgato. Si verò his factis non cesset, interpositis duabus inuasionibus post purgationē infernam, multa calida ipsum lauato, & seminis hyoscyami milij magnitudinē, & mādragoræ tantūdem, & succi silphij trium fabarum magnitudinē, & trifolij tantundem, in vino meraco bibat. At si firmus & sanum se esse putans, ex lassitudine, aut profectione febre correptus, ad quartanam deueniat: fomentis ipsi adhibitis allium dato, in melle tinctum. Deinde lenticulæ decoctum bibat, melle & aceto ammixtis. Postquam autē repletus fuerit, vomat. Postea calida lotus, vbi frigidus factus fuerit, cyceonem ex aqua bibat. Vesperis cibis mollibus & non multis vtatur. Altera vero exacerbatione, vbi multa calida laueris, & stragula ipsi in texeris, donec exudet, statim veratri albi radices trium digitorum longitudine, & trifolij drachmam, & succi silphij duarū fabarū magnitudinē, & in vino meraco bibat. Et si vomitiones ipsum vrserint, vomat. Sin minus, post caput purgatū. Cibis autē vtatur quā mollissimis & acerrimis. Quī verò exacerbatio ipsum inuaserit, ieiunus medicamentū ne bibat.

Pleuritis.

Pleuritis vbi corripuerit, & febris & rigor tenet, & dolor per spinam ad pectus, & erectæ cervicis spiratio, & tussis, & saliuā alba ac subbiliosa, & non facili per tussim reijcit, & per inguina dolor est, & cruentā vrinam mingit. Quum ita habuerit, si quidem febris septima die remiserit, sanus euadit. Si verò non remittat, deuenit morbus ad vndecimum aut decimum quartū diem. Et sanè multi in his diebus moriuntur. At si decimū quartum transgrediatur, euadit. Quum ita habuerit dolor, calefactoria adhibeto. Bibat autem mel, æquali aceto affuso coctum, ita vt quanta fuerit mensura cocti mellis & aceti, vnde iugissimam partē aquæ affundas. Hoc paulatim & frequenter bibendum dato: et postea quoque aquam modico aceto affuso ammisceto. Sorbeat & milij succum, melle modico adfussato frigidum, quartæ heminae partis mensura, quoties vtrunque cibum sumit, & bibat vinum album vinosum, aquosum modicum. Sit autem vinum quā mollissimum, odorem nō habens. Vbi verò febris dimiserit, per biduum milium bis in die sorbeat, & betas iucundissime

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

paratas edat. Deinde catulū aut auiculam coquat, & ius sorbeat, & de carnibus parum edat. Reliquo verò tēpore, maxime quandiu à morbo tenetur: in prādio miliūumat, vespericibus paucissimis ac mollissimis vtatur. Alia pleuritis. Febris tenet, & tussis, ac rigor, & dolor ad latus, & quandoq; ad clauiculam: & saliuā spuit subbiliosam ac suberuentā. Quod si agro abscessus ruptus fuerit, qua parte dolor maxime vget, calefactoria adhibeto, & calida lauato, si non magna febris ipsum teneat. Sin minus, non. Bibendū autē dato fauū in aqua maceratū, ita vt aquā iam subdulcem facias, & postea quoq; aquā ammiscens. Sorbeat prisanæ succū bis in die, & vinū inde bibat album, aquosum. Et si quatuordecim dies effugerit, sanus euadit. Alia pleuritis. Febris detinet, & dentium stridor, & tussis sicca, & cum virore pallida reijcit, quandoq; etiam limida: & dolor latus corripit, & dorsum subrubidū fit. Caput & pectus calefcunt, aliquādo etiam venter, & pedes, & crura. Et quum erectus sedet, magis tussit: & alius turbatur, & alui egestio cum virore valde pallida est, ac graueolēs. Hic in viginti diebus moriū. Si verò has effugerit, sanus fit. Huic donec quatuordecim dies praterierint, aquā de farina crassa in ipsa macerata bibendā dato, & vinum album vinosum, aquosum postea bibendū. Sorbeat succum prisanæ frigidū, bis in die. Verū prae melle mali punici succū, ad prisanæ succū admisceto, postquā iam hic prisanæ succus coctus fuerit, & lauet nō multa. Vbi verò quatuordecim dies praterierint, in prandio miliūumat. Ad vespērā carnibus auicularum, cum iuscullo, & paucis cibus vtatur. At talem morbum pauci effugiunt.

Peripneumonia.

Febris detinet dies quatuordecim vt minimum, ad summum duas de viginti, & per hos dies fortiter tussit, & primum quidem excreat saliuam crassam ac puram, septima & octaua die. Si verò febris corripuerit, nona ac decima, subdulcem & purulentā, donec quatuordecim dies praterierint. Et si quidem decimaquinta die pulmo resiccatus fuerit, & tussiendo reiecerit, sanus fit. Sin minus, duas de viginti obseruato, & si quidem in his diebus tussis sedata fuerit, euadit. Si nō sedata, interrogato ipsum, an saliuā ipsi dulcior appareat, & si hoc confessus fuerit, morbus annū durabit. Nam pulmo superatus

Apuratus sit. Huic primis diebus vinum dare conuenit dulce; album, aquosum, paulatim frequenter bibendum. Sorbeat etiam prisanæ succum melle ammixto bis in die, donec dies decem & octo praterierint, & febris desuerit. Periclitatur autem maximè in septem, aut quatuordecim. Postquam autè decem & octo dies transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus spuit, & pectus dolet, & tussit. Quum sic habuerit, ieiunus cum salua vini illam potionem bibat, & leguminis fressi decoctum sorbeat, adipe multo ammixto, si non calor fuerit. Si verò fuerit, ne sorbeat, sed cibis vtatur salis ac pinguibus, & marinis potius quàm carnibus. Et si pro ratione purgari tibi visus fuerit, in os infundito, ac fomenta adhibeto: si quidem crassum fuerit pus, fomēta adhibeto: si verò tenue, infundito & ex cibis hæreat quàm maximè, & ab acerbis abstineat, & à carnibus bubulis, ouillis, ac porcinis.

Medela.

Suppuratus ex peripneumonia.

Quam ex peripneumonia suppuratus factus fuerit, febris detinet, & tussis sicca, & difficultas spirandi, & pedes intumescunt, & manum ac pedum vngues cōtrahunt. Hunc ita effectum ad decimam diem à suppurationis initio progressum, multa calida lanato, & ari radicē tali magnitudine tritā, & salis granum, & modicū mellis, & aquā, & olei parum, extracta lingua tepida infundito, & postea humerum concutito. Et si quidem ab his pus erumpat, bene habet. Sin minus, aliud facito. Cibos acres & cyclaminū exsuccato, sitq; succi vtrorunq; acetabulum paruum, deinde silphij succum fabæ magnitudine terito ac diluito, & lactis caprini aut asinini acetabulum ammisceto. Hoc tepidum infundito. Quod si ab hoc non erumpat, raphani corticem, & aris florem, triū fabarum magnitudine terito: Sit autem raphani duplum: & oleo diluito quarta heminae parte. Hoc tepidum infundito. Et si eruperit pus, cibis quàm salissimis ac pinguisimis vtatur. At si non prodierit pus, paulatim fomentum adhibeto in os, ex sij succo, vino Tornio, lacte bubulo, aut caprino, singulis pari mēsurā permixtis, ita vt sint heminae tres, in quas postea furni testas igni candefactas injcito, atque inde vaporem per fistulam trahat, cauendo vt ne aduratur. Postquam autem purius iam sputum prodierit, vrticæ semen,

Medela.

*Triuicloria
Alex. uromt*

HIPPOCRATIS LIBER II.

thus, organum in vino albo, melleque ab oleo modico, ipsi D
infundito, idque per tertium diem. postea vero butyrum, re-
sinam in melle eliquatam. Et cibis non amplius utatur sal-
sis, neque pinguibus. At diebus interpositis, infusioni oris usu
cessante, saluam, rutam, satureiam, organum, pari portione
ieiunus ex vino bibat acetabuli mensura, omnibus illis insper-
sis. Quod si ab infusionibus his oris non eruperit, nihil miri
est. Sape enim prorumpit ad aluum, & statim melius habe-
re sibi videtur, ubi ex angusto ad ampliorem regionem de-
uenerit. Alius morbus. Quum tempus longius protrahitur,
& febris vehemens ac tussis corripit, & latus dolet, & ad sanā
partem decumbere non potest, sed ad dolentem, & pedes, &
oculorum cavitates intumescunt. Hunc ubi decimus quintus E
ab eruptione dies adest, multa calida lotū in tella firma col-
locato, & alius quidem manus ipsius teneat, tu verò humerū
concutito, ut audias in vtrum latus affectio strepitum edat:
optandum autē esset in sinistrum. Hunc ipsum igitur locum
feces, minus enim lethalis est. Si verò præ crassitudine ac co-
pia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis, (nam
hoc aliquādo contingit) vtrum latus tumuerit ac magis do-
luerit, hoc infime secato retro tumore magis quam ante ip-
sum, quo puris exitus facilem fluxionē habeat. Secato autem
inter costas per nouacula primū cutem, deinde scapello
acuto, quod panniculo sit obligatū, ita ut summa ipsius pars,
ad unguis magni digiti mensuram expedita restet, quam in-
tro mittas. Postea emissio pure quantum visum fuerit, vulnus
linamento ex lino crudo, alligato foras propendente filo,
concludito: & quotidie semel pure educito. postquam autem
decimus affuerit dies, omni pure emissio linamentum ex lin-
teo indito. Deinde vinū & oleum tepē facta per fistulam in-
fundito, ne pulmo à pure humectari solitus derepente resic-
cet. Mittendum autem est id quod mane infusum est, ad
vesperam: quod vespera, mane. Vbi verò pus tenue velut aqua
fuerit, & ad digiti contactum viscosum ac modicum, penicil-
lum stanneum cauum indito. Postquam autem omnino ven-
ter resiccatus fuerit, paulatim linamentum præfectū minui-
to, donec vlcus coalescat, & ipsum penitus eximas. Signum
autem an euasurus sit habes: si pus album ac purum fuerit, &
fibræ sanguinis insint, plerumque sanus sit. Si verò prima die
probat

*Vomica in-
terior quæ si
gnatur.
Curatio
quæ.*

*Pus de vo-
mica quæ e-
ducatur.*

A profluat lutei oui speciem habens, aut secunda die defluat crassum, cum virore subpallidum, foetens, moriuntur vbi pus effluxit. Alius morbus. Quum quis ex pulmonis affectu tabescit, is salivam crassam, cum virore subpallidam, dulcem, tussiendo reijcit, & stridor ac dolor ad pectus & ad dorsum fit, & in faucibus tenuis sibilus auditur, & fauces siccae sunt, & oculorum cavitates rubicundae, & vox grauis, & pedes intumescunt, & vngues contrahuntur, & supernae partes attenuantur ac imminuuntur, & saliuā abominatur vbi excreaturus ipsam in ore habet, & tussit mane maximè & circa mediam noctem, imò etiam alijs temporibus. Et corripit magis hic morbus mulierculam iuenculam quàm vetulam.

Tabes.

B Huic si iam pili de capite defluant, & nudum sit caput, velut ex morbo: & si prunis inspuenti saliu graueolens sit, intra breue tempus ipsum moriturū esse pronuncia, id verò quod occidet, alui profluuium fore. Vbi enim iam pus circa cor putruerit, nidorosum odorem prunis iniectum de se praebet: & cerebrum cōcalescens salsuginosum humorem effundit, qui aluum mouet. Huius autem signum est, quod capilli ex capite defluunt, Hunc vbi ita habuerit ne curato. Si verò à principio morbus obrigerit, lenticulae decoctum bibendum dato. Deinde interposita vna die, veratrum dato temperatum, vt ne aluum infernam moueat. Et quum noctu ad os salsuginosus humor ipsi influit, medicamenta ipsi frequentiora ad nares appone. Si verò non fluit, appone quidem sed rarius, & mense semel, ita vt insuper veratrum bibendum des, quantum duobus digitis comprehendi potest, in vino dulci temperato. Statim verò lenticulae decoctum inde bibendum dato. At medicamenta quàm paucissima bibat, si non febres acutiores ipsum corripiant. Radicem dracontij albam, & veratri delingat, sed non ex melle. Sic enim minimè aluum mouebit. Si verò tormen in aluo inferna oboriat, primū per clysterem illud infusum immittito, in quod coccus cni-

*Signa mor-
tis.*

Medela.

C dius ammiscetur. Quod si neque sic sedetur, lacte asinino cocto purgato, pharmacum autem nullum deorsum purgans dato. Si verò ante medicamentum, praepotato veratro bilem vomat, ab ipso lenticulae decocto accepto vomat. Cibis autem vitatur, si febres acutae tenerint, carnibus ouillis coctis, & volucrum, & cucurbita, & beta. luscum autem ne

*Coccus cni-
dius.*

*Cibus qua-
lis.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

forbeat, neq; ad intinctus vtatur. Piscibus vtatur scorpijs, & D
cartilaginei generis coctis. Calidū verò nihil edat, neq; lauet
si febris multa teneat. Neq; oleribus acribus vtatur, præter-
quā satureia, aut origano. Vinum bibat albū. Si verò sine fe-
bre sit, calores autē aliās atq; aliās corripiāt, pisces edat opti-
mos ac pinguisimos. & pinguia, & dulcia, & quā maximē
falsa. Et deambulationibus vtatur, neq; in vēto, neq; in sole.
Et à cibis vomat, vbi tēpestiuū visum fuerit. Et calida lauet,
capite excepto. Ex cibis frumētaceis præstat panis, his qui nō
mazā edere soliti sunt, Mazā verò edere solitis, vtrāq; dato.

Alius morbus appellatus Tabes.

T Vsis vexat, & sputum multum ac liquidum, & quan- E
doq; facile tussiendo rejicitur etiam pus, veluti gran-
do. quod dum digitis conteritur, durum & male olens est. At
vox pura est & doloris exors, & febres non corripiūt, verū
calor quandoq; aliās atq; aliās, atq; hic debilis. huic veratrū
Medela. bibendum est, & lenticulæ decoctum, & largē cibis sumen-
dus, ita vt abstineat ab acribus, & carnibus bubulis ac porci-
nis & ouillis. Exerceatur modicē & deambulet, & à cibis vo-
mitu vtatur. A Venere abstineat. hic morbus per annos se-
ptem aut nouem durat. quod si ab initio æger curatus fue-
rit, sanus euadit. Alius morbus. Si ex feruido vlcere,
Pulmonis aphtha appellato, pulmonis fistula laborarit, febris debilis
fistula affr tenet, & dolor mediū pectus, pruritus corporis adest, & vox
ita quid san raucosa, & saliuam liquidam ac tenuem spuit: quandoq; etiā F
cia. crassam, velut ptisanæ succum. Et in ore odor oboritur ipsi
granis, velut à piscibus crudis, & aliās atque aliās in saliuā
apparent dura, velut fungus ab vlcere, & supernæ partes at-
tenuantur, atque aded homo totus: & circuli faciei rube-
scunt, & progressū temporis vngues contrahuntur, & aridi
ac cum virore pallidi fiunt. Moritur autem statim, si non cu-
ratus fuerit, sanguinem ac pus spuens. postea etiam febres
vehementes accedentes ipsū perimunt. Si verò curetur, ef-
fugit ex hac tabe. Curare porrò oportet, vt lenticulæ decocto
Medela ma potu vomat. Quod si tempestiuum esse visum fuerit, vera-
li bulus. trum bibat, siquidem potens fuerit homo, per se. Sin minus,
dimidium portionis ad lenticulæ decoctum ammisceto, ita vt
in quinta aut sexta potione definat. At ventrem infernū me-
dica

A dicamēto ne moueas, si nō febres fortes corripuerint. Si non autē corripuerint, lacte asinino subitus purgato. Quōd si debilis sit, vt bibere nō possit, per clysterē infundito. Minus autē caput moueas, & si quidē saliuā ad os prodierit multa ac saluginosa, ad nares apponito quid, quod bile nō ducat. Si verō fluxio ad os nō fiat, nihil capiti adhibeto. vbi autē saliuā graueolēs fuerit, interpositis inter lenticulæ decocti vsum diebus, medicamentū in pulmonē infundito, & interposita vna die suffito. Cibus vtatur carnibus ouillis & volucrum, & piscibus cartilaginei generis, & scorpijs coctis. Quarto verō quoque die salamentū edat optimum ac pinguisimū, & in pradio mazī sumat, in cœna verō etiam panem ad hanc addat, & nihil sorbeat, neque cyceonem bibat, si edere poterit. Porro obsonia condat ac edat sesamo pro tritico, & conandro ac anetho. Silphio autem ne vtatur, neque alio copiam olere acri, præterquā origano, aut timo, aut ruta. Deambulationibus autem vtatur ante & post cibum, vitans ventam & solem. Ab ebrietatibus & re venerea abstineat. Lauet tepida, excepto capite, quod quā rarissimē lauare debet.

Tabes dorsalis.

Dorsalis tabes à medulla fit. Corripit autem maximē recentes sponso, & veneri deditos. Sunt autem sine febre, & bene cibum capiunt, ac consumuntur. Et si interroges ita affectum, dicet sibi supernē de capite in spinam velut formicas descendere videri, & vbi mingit, aut ventrem exonerat, prodit ipsi genitale semen multum ac liquidum, & genitura in vtero non manet, & in somnis semen profundit, siue dormiat cū vxore siue non. Et quum iter fecerit aut cūcurrerit, tum aliās, tum ad accliuem locum, anhelatio ac debilitas ipsum corripit, & capitis grauitas, & aures sonant. Hunc temporis progressū vbi febres fortes ipsum corripuerint, perdunt febres lipyriz. Quum ita habuerit, si ab initio curandum suscepis, fomento per totum corpus adhibito, medicamentum sursum purgans bibendum ipsi dato, & postea caput purgato. Deinde deorsum purgans exhibeto. Operandum autem fuerit vt vere hanc curationē aggrediamur. Postea verō serum aut lac asininū bibendum dato. Ceterum bubulum lac per quadraginta dies bibendum præbeto.

*Semina
clandestina
na fluxio.*

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

beto. Ad vesperam verò quàm diu lac potat, alicam sorbendam dato. A cibis autem abstineat. Postquàm verò lac bibere cessarit, cibis mollibus ipsum reficito, ex modico initium sumens, & quàm maximè crassum ac pinguem facere studeo. Per annum ab ebrietatibus, & venere, & laboribus abstinere, exceptis deambulationibus, in quibus vitet frigus & solem. Tepida autem lauet.

Pulmonis morbus.

Medela.

S Aliua crassa ac fuliginosa tussi rejicitur, & color niger, ac suburgidus est, & dolores tenues sub pectus & sub scapulas fiunt: & vlcera ipsis ægrè sanescunt. Minus tamè periculosus est hic morbus superiore, & plures euadunt. Hunc veratrum bibere oportet, & per se, & lenticulæ decocto ammixtum. Infundere etiam in pulmonem oportet ac suffitum facere. Cibis quoque largè vtatur, abstinendo à carnibus bubulis, ouillis, & porcinis, & ab acribus oleribus, præterquàm origano, aut satureia. Vtatur deambulationibus. Mane verò ieiunus ad æcliuem locum iter faciat. Deinde folia condimentaria hortensia bibat in vinum temperatum inspersa. Deinde verò cibis relatis vtatur.

Arteria uulnerata.

Medela.

S I vulnerata fuerit arteria, tussis habet, & sanguinem tussiendo rejicit, et fauces sanguine latèter implètur, et grumos eijcit, et dolor fit acutus ex pectore ad dorsum, et salua viscosa ac multa, et fauces sicæ, et febris ac rigor corripit, et strident fauces velut à pinguedine, atque hæc ad quindecim dies patitur. Postea verò pus spuit, et velut vlceris ricinos, bronchia in pulmone cartilaginosa, et rursus tussit, et sanè sanguis erumpit, et postea pus crassius spuit, et febris fortior fit, et in pulmonem desinit, et vocatur ruptio pulmonis. At si post primum sanguinè pus nō spuat, à laboribus ac exercitijs quiescere oportet, et vehiculum inscendere, abstinerequà cibis salis, ac pinguibus, et ab oleribus acribus, et postquàm ipse seipsum optimè corpore affectum esse putat, pectus ac dorsum inurito, ex parte vtrunq; et postquàm vlcera sana fuerint, per annū abstinere ab ebrietate, et ne nimium impleatur, neq; manibus laboret, neq; vehiculum inscendar, sed studeat vt corpus quàm maximè crassum efficiat.

Articuli

A *Articuli pulmonis conuulsi.*

Quam articuli pulmonis fuerint conuulsi, sputum spuit album, quandoq; vetò cruenta, & desipit, & febris tenet, & dolor pectus, dorsum, ac latus: & si se vertat, tussit & sternutat. Huic qua parte dolor fuerit calefactoria apponito, & centauriū, & daucum, & saluix folia trita, melle & aceto affuso, præforbenda dato, & aquam insuper sorbendam. Et ptisanæ succum præsorbeat, & vinū aquosum insuper bibat. Postquàm verò dolor sedatus fuerit, saluiā tufam ac cribratā, & hypericum, & irionem trita, & polentam, singula paribus portionibus, in vinū temperatum coniecta, ieiuno bibenda præbeto. At si ieiunus non sit, leguminis fressi decoctū sine sale sorbendum dato. Si verò calor fuerit, cibus vtatur mollissimis, non salis, & minime nidorosis, vbi iam probè se habuerit corpus, & in pectore, & in dorso. At si ambo cōuulsa fuerint, tussis emergit, & salua crassa ac alba apparet, & dolor acutus adest ad pectus, & sub scapulas, ac latus: & ardor detinet, & rubicundis in tibijs circulis impletur, & pruritus habet, & non sustinet neque sedere, neq; iacere, neq; stare, sed ægrè afficitur, ac viribus deficit. Hic quarta die maxime moritur. Si verò hanc effugerit, spes neq; sic multa superest, Verùm periclitatur & in septima. Quòd si & hanc effugiat, sanus euadit. Hunc vbi sic habuerit, multa calida bis in die lauato. Et quum dolor habuerit, calefactoria

Curatio.

Cadhibeto, & mel, & acetum bibendum dato, & ptisanæ succum sorbendum, & vinū album vinosum insuper bibendum. Si verò ad balneum & calefactoria affligatur, ipsaq; non sustineat, crassi lintei panniculos ipsi adhibeto, quos aqua tinctos in pectus ac dorsum imponas. Et fauum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bibendam dato, & frigidum ptisanæ succum, & aquam insuper bibat, & ad frigus decumbat. Hæc facienda sunt. Verùm morbus lethalis est.

Erypelas in pulmone.

Si erypelas in pulmone fiat, tussis habet, & saluiā expuit multam ac liquidam, velut de gutture, non est autè cruenta: & dolor tenet dorsum, & vacuas partes ventris, ac laterum mollitudinem, & viscera sugunt, & vomit pituitā ac velut acetum, & dentes stupefcunt, & febris, ac rigor, & sitis corrip

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

corripit, & vbi quid ederit, in visceribus fugit, & acidū eru-
 dat, & venter stridet, & corpus torpescit, & vbi vomuerit,
 melius se habere putat. Quin autem non vomuerit, diges-
 sa die tormen & dolor in ventre oboritur, & excrementum
 alui liquidum procedit, hic morbus maximè fit ex ebrietati-
 bus, & carniū esu, & ex aquæ mutatione. Sed & ex alijs cau-
 sis emergit. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum
 dato, & lac asininum insuper bibendum, si non natura fuerit
 splenicus. Si verò splenicus fuerit, ne purges, neque succis,
 neque lacte, neq; sero, sed eo quod modicum ingestum mul-
 tum educet. Per clysteres quoque infusio in aluum fiat, &
 glandulæ subdantur in omnibus morbis, si aluus nō egerat.
 Adhibendum est & frigida lauacrum in hoc morbo, & ex-
 ercitiū, vbi febres remiserint, & corpus leuiter se habere
 visum fuerit. Et vere & autumnō vomitus inducatur. At ve-
 rò allij capita, & origani pugillum, quantū tribus digitis ap-
 prehendi potest, duabus heminis vini dulcis affusus, & aceti
 acerrimi hemina vna, & mellis quarta hemine parte, coqui-
 to donec tertia pars reliqua fiat. Deinde vbi hominem exer-
 cueris, & aqua tepida laueris, calidum hoc bibendum præ-
 beto, Dato etiā lenticulæ decoctū, melle & aceto ammixtis,
 donec impleatur. Deinde vomat, & ea die pota polenta &
 aqua, ita ieiunus permaneat. Ad vesp̄eram verò betam edat,
 & parum de maza, & vinum aquosum bibat. Reliquo verò
 tempore, à lenticulæ decocto, & à cibis vomat. Et si discesse-
 rit dolor sub scapulas, cucurbitam affigito, & venas in ma-
 nibus pertundito. Cibis porro vtatur non salis, neque pin-
 guibus. Acria autem & acida edat, & frigida omnia. Vtatur
 & deambulationibus. Hæc si fecerit, optima victus ratione
 vsus fuerit, & per plurimum tempus morbus prorogari po-
 terit. Est autem non lethalis, sed consenescentes relinquit. Si
 verò iuniorem aliquem citius à morbo liberare voles, vbi
 ipsum purgaris, pectus & dorsum inurito.

Morbus dorsalis.

Rigor & febris, & tussis, & spirandi difficultas corripit,
 & saliuam spuit cum virore pallidam, quandoq; etiam
 suberuentam: & dolet maximè dorsum & inguina: & tertia
 aut quarta die cruentam vrinam mingit, & moritur septima
 die. Si verò quatuordecim dies effugerit, sanus euadit: effu-
 git

Agit autem non ita valde. Huic aquam mulsam bibendam dà *Medela.*
 ro, in olla noua feruefactam ac perfrigeratam, & apij aut feniculi radicis cortice in ipsa macerato. Dato & ptisanæ succum bis in die, & vinum album aquosum insuper bibendum. Qua verò parte dolor constiterit, calefactoria adhibeto, & calida lauato, si non febris multa vexet. Postquam autè quatuordecim dies præterierint, in prandio quidem sumat milium, ad vesperam verò carnes catulinas, aut volucrum, coctas edat: & de iusculo sorbeat. Cibis autem quàm paucissimis primis diebus vtatur.

Tuberculum in pulmone.

Qum tuberculū in pulmone natum fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio, & dolor ad pectus acutus, & adlaterā, & vsq; ad quatuordecim dies ita afficitur. Nā plerisq; per tot dies tuberculi affectio inflammanatur. Sed & caput dolet & palpebras, & videre nō potest: & corpus subfultum fit, ac venis impletur. Hūc multa calida lauato, & aquā mulsam aquosam bibendam dāto, & ptisanæ succum sorbendum, & vinum aquosum insuper bibendum. Si verò dolor vigeat, calefactoria adhibeto. Vbi autem sedatus fuerit, cibis mollissimis vtatur. Quòd si liberatum à morbo, spiradi difficultas corripiat, dum ad accliuem locū recta pergit, aut aliās festinat, pharmacum dato, à quo inferna alius nō moveatur. Et si vnā cum vomitu pus sequatur, si quidē pus fuerit albū, & fibræ in ipso subruentē fuerint, effugit. Si verò liuidum, & cum virore pallidum, ac graueolens, moritur. *Medela.*
Cum autem in quadraginta diebus ab ea qua erupit. Multis etiam annus sit morbus. Hunc velut suppuratum curare oportet. Quòd si non erumpat (multis enim progressu temporis abscedit ad latus, & extumescit) hūc si hoc fiat secato ant vrito.

Pulmo repletus.

Si pulmo repletus fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio, ac anhelatio, & linguam exerit, rubicundiscirculis in tibijs repletur, & pruritus vexat, & dolor acutus emergit ad pectus & scapulas, & non potest sedere, neque iacere, neq; stare, sed ægris viribus est. Hic quarta die maximè moritur. Si verò hanc euaserit, spes plerunque est, periclitatur tamen etiam in septima. Si verò hanc effugerit, sanus euadit. *Curatio.*
 hunc

A tor, vbi verò id quod infusum est emiseris, aliud infundito. atque hæc per dies quinque facito. postquam autem pus tenue effluxerit, velut priscanæ succus ac modicum, ad manus contactum, stanneum penicillum indito, & vbi penitus resiccatum fuerit, linamento semper modicè præfecto, vlcus ad linamentum coalescere sinito.

Hydrops pulmonis.

Si hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tenet, & acuatim respirat, & pedes tument, & vngues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus sit, sed debilius ac diuturnius. Et si quid infundas, aut fomentū aut suffutium adhibeas, pus nō sequitur, atq; ex hoc sanè cognoueris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaueris, ebullit intrinsicè velut acetum: & hæc quidem aliquandiu patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse sibi videtur, ac à morbo liberatus. Verū progressū temporis aluus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, scroto, ac facie. Et quidam ab inferna aluo id esse putant, quum videant ventrem magnum, & pedes tumentes. Intumescunt enim hæc, si sectionis tempus transgreddiaris. Hunc si quidem extra intumuerit, inter costas sectum curare oportet. Si verò non intumuerit, multa calida lotum velut suppuratos colloca-
B ris, ea secato quàm potes infimo loco, quo effluxio facilis cōtingat. Postquam secueris, linamentum ex lino crudo indito, ita vt crassum & acutum linamentum facias, & sanguinè paucissimum parcè emittas. Et si quidem in linamento pus adhauserit quinta die, plerunque euadit. Sin minus, vbi aqua exhauserit, sitis corripit & tussis, & moritur.

*Curatio
qua.*

Pectus aut dorsum ruptum.

Si pectus aut dorsum fuerit ruptum, dolores tenent pectus ac dorsum perpetuò, & calor aliā atque aliās corripit, & saluam subcruentam tussiendo reijcit, & velut pilus cruentus per saluā transcurrit. Atq; hæc maxime patitur, si manibus quid laborarit, aut in currū aut equum inscenderit. Hunc ante & retrò vrito ex partibus utroq; loco, et sic sanus euadit. Cæterum per annū à labore se contineat, et ab vltura

Curatio.

pinguefaciendo corpori studeat.

D

*Febris ardens.**Peripneu-
monicus.**Medela.*

Febbris tenet, & sitis vehemens, & lingua aspera, & nigra, & cum virore pallida, & sicca, & vehementer rubicunda: & oculi cum virore pallidi sunt, & excrementum egerit rubicundum & cum virore pallidum, talem quoque urinam mingit, & multum sputat. Sæpe etiam transmutatur velut ad peripneumoniā, & delirat. Ex qua re cognoueris quod peripneumonia sit. Hic si quidem peripneumonicus fiat, & quatuordecim dies transgrediatur, sanus fit. Si vero in decem & octo diebus peripneumonicus fiat, si non impurgatus permanens suppuratus fiat, aquam de crassa farina in ipsa macerata bibat, & acetum album quam odoratissimum postea bibat, & prius sanæ succum sorbeat bis in die, si vero debilis fuerit, ter. & vinum vinosum, album, aquosum insuper bibat, & quam minimum lauet. At si suppuratus fiat, velut suppuratum curato.

E

*Febris singultiens.**Pisana in-
tegra.**Potio qua.*

Febbris detinet vehemens, & rigor, & tussis, & singultus, & una cum salua grumos sanguinis tussiendo reijcit, & septima die moritur. Si vero decem dies effugerit, melius habet. Verum vigesima suppurat, & primis diebus pus modicum tussiendo reijcit, deinde amplius. Purgatur autem in quadraginta diebus. Huic primis diebus acetum & mel cocta bibenda dato, & postea acetum & aquam ammisceto, quo aquosior portio fiat. Et prius sanæ succum modico melle ammixto sorbeat, & vinum album vinosum insuper bibat. Postquam autem decem dies præterierint, si febris sedetur, & sputum purum sit, prius sanam integram sorbeat, aut milium. At si vigesima die pus sputat, saluam, & rutam, & satureiam, & organum, ac hypericum, singula æquis portionibus coctæ ac cribrata permisceat, ita ut omnium ciathry parui siue cœchæ marinæ sit mensura, & polentæ tantumdem. Hæc ieiunus in vino dulci temperato bibat. Et si hyems sit, aut autumnus, aut ver, sorbitionibus utatur. Si vero æstas, minimum. Verum amygdalas, & cucumeris semine torrefactum, & sesamum, singula æquis partibus, ut in totum sit cœchæ marinæ mensura terat, & aquæ heminam Aegineam affundat, & farinam ac sauum inspergat. Hæc post potum sorbeat. Cibis utatur pinguibus & salis, & marinis magis quam carnibus.

Calida

A Calida lauet, minimè verò caput. Hæc faciens à morbo liberatur.

Morbus lethargus dictus.

TVisus oboritur, & saliuam spuit multâ ac liquidam, & nugas garrit, & vbi nugari desierit, dormit: & recrementum malè olens egerit: huic aquam de macerata in ipsa farina crassa bibendam dato, & vinû album vinosum postea bibendum, & prisanæ succum sorbendum Verû huic mali punici succum ammisceto: & vinum vinosum album insuper bibat, & ne lauet. Hic in septem diebus moritur, Si verò has effugerit, sanus euadit.

Curatio.

Morbus siccatorius appellatus.

NEquè sine cibo esse, neq; cibum acceptum tolerare potest. Verû vbi quidem sine cibo manet, viscera fugûr, & os ventriculi dolet, & aliàs alia vomit, & bilem, & saliuâ, & pituitam, & acria: & postquàm vomuit, aliquantisper melius habere sibi videtur. At vbi cibum accepit, ructus adfunè, & cùm rubore exardescit, & semper multû se cacaturû esse putat. Vbi verò ea gratia defecerit, flatus prodiit: dolor caput habet, & totû corpus velut aciculis pungi videtur, aliàs alia parte, & crura grauiâ sunt ac debilia, & consumitur, ac debilis fit. Huic medicamentum bibendum dato, primû deorsum purgans, postea supernè: & caput purgato, & à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & ab ebrietatibus. Vomac autè à succis, et à cibis, et pro anni tẽpore, lac aut ferum asininû bibendû præbès, pharmacû insuper bibendum dato, vtro tandem magis opus esse tibi visum fuerit. Aestate et vere frigida lauet. Autumno autè et hyeme vnguẽto vtatur, et deambulet, et modicè se exerceat. Si verò debiliior sit quàm vt exerceri possit iter, faciat. Et cibis frigidis ac aluum subeuntibus vtatur. Et si vèter nò egerat, molle infusum per clysterem intjcito. Morbus hic diurnus est, et cõfenescentes, si ita futurum est, relinquit. Sin minùs, commoritur.

Medela.

Febris interficiens appellata.

Febris tenet, et rigor, et supercilia impendere videtur, et caput dolet, et vomit saliuam calidam, et bilem multâ. quandoque etiam infra egerit, et loci oculos non capiunt, et dolor ad cervicem et ad inguina emergit, et affectis viri-

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

bus est, & nugas garrit. Hic septima die aut etiam prius moritur. Si verò hanc effugerit, plerunque sanus fit. Morbus est lethalis. Huic perfrigeratoria adhibere oportet ad viscera, & ad caput, & ordeum torrefactum vnà cum paleis fractū aqua macerare, & de excolata aqua, mulsam facere, atq; hanc aquosam bibendam dare. Cibum autē non offerre, neq; sorbitionem, vsq; ad septimū diem, si non debilis esse visus fuerit. Si verò sit, ptisanæ succum frigidum ac tenuem modicū bis in die exhibere, & aquā insuper bibendam. Postquā verò septem dies praterierint, & febris dimiserit, miliū lingat, Ad vespērā cucurbitam, aut betas paucas sumat, & vinū album aquosum inde bibat, donec ad nonū perueniat diem. Postēa cibo quā paucissimo vtatur, miliū in prandio sumens. Balneo donec dolor & febris assuerint, ne vtatur. Vbi verò cessauerint, multa lauet. Quòd si venter non egerat, molle infusum per clysterem immittito, aut glandulas subdito. Quum verò validus factus fuerit, molli pharmaco ad nares apposito, aluum infrā purgato, postēa lac asininū bibendum dato.

Morbus liuidus.

Medela.

Febris detinet sicca, & horror aliās atque aliās, & caput dolet, & dolor viscera tenet, & bilem vomit, & quum dolor tenet, suspicere nō potest, sed grauatur, & venter durus fit, & color liuidus, & labia, ac albæ oculorū partes liuescunt, & aspectū præ se fert velut qui strangulatur. Quandoq; etiā colorem trāsmutat, & ex liuido, cum virore subpallidus fit. Huic medicamentum & deorsum, & sursum purgans bibendum dato, & clysterem adhibeto, & à capite purgato. Et calida quā minimè lauet, sed & vbi lauerit, ad solem apricetur. Serum etiam & lac asininum pro anni tempore bibat, & cibis quā mollissimis vtatur & frigidis, abstinēs ab acribus & salis: verū dulcioribus ac pinguioribus vtatur. Cæterū hic morbus vt plurimum cum agro commoritur.

Morbus ructuosus.

Dolor corripit acutus, & dolitat vehementer, & ipse se ipsum iactat, & vociferatur, & frequenter eructat, & vbi eructauit, melius habere sibi videtur. Sape etiam bilem reuomit modicam, poculi parui mensura: & dolor corripit à visceribus ad imum ventrem, & laterum mollitudinem, & vbi

A ubi hoc factum fuerit, melius habere sibi videtur: & venter inflatur, ac durus fit, & strepit, & flatus non egreditur, neque stercus. Hunc si dolor habuerit, multa calida lauato, & ca-
Medela.
 lefactoria ipsi adhibeto. Vbi verò in ventre dolor ac flatus fuerit, clysterem adhibeto: & mercurialis coctæ succum, ad prisanæ succum ammisceto, ac sorbendum dato, & vinum dulce, aquosum, insuper sorbendum. Cibus autem ne exhibeas, donec dolor remiserit, & vuarum expressarum retrimenta dulcia, per noctem in aqua maceret, & hanc aquam per sex dies bibat. Si verò vuarum expressarum retrimenta non habeat, mel & acetum cocta bibat. Postquam autem dolorem emouerit, medicamento deorsum aluum purgato. Cibus vtatur inde mollioribus & aluum subeuntibus, & marinis magis quam carnibus, carnibus autem volucrum & ouillis coctis: edat etiam betas & cucurbitam: ab alijs verò abstineat. Morbus hic si iuuenem corripit, tempore decedit: si senioremm commoritur..

Morbus pituitosus.

Corripit quidem morbus pituitosus etiam virum, sed magis mulierem, & est hæc quidem crassa & bene colorata, verum iter faciens debilitatur, & maxime si ad accliuem locum iter faciat. Corripit ipsam etiam febris tenuis, quandoque etiam suffocatio: & euomit ubi ieiuna est, bilem & saliuas multas, sæpe etiã ubi cibum accepit, de cibo tamen nihil:
C & quum laborarit, dolet pectus & dorsum, aliàs alia parte, & rubicundis cutis eminentijs impletur, velut ab urtica inustis.
Medela.

Huic medicamentum bibendum dato, & serum ac asinum bibat. Si verò serum potet, medicamentum deorsum purgans de plurimos dies præbibendum dato. Et si serum bibere desierit, lac asinum postea bibat, & dum hoc potarit, à cibus quidem abstineat, vinum verò quam iucundissimum bibat, donec purgari desinat. At ubi à potione cessauerit, milium in prandio sumat. Vespero cibo mollissimo vtatur ac paucissimo. Abstineat à pinguibus & dulcibus ac oleosis. Et aliàs atque aliàs, maxime tamen hyeme, à lenticulæ decocto vomat, oleribus præsumptis. Et calida quàm minimum lauet, sed & ad solem apricetur. Morbus autem commoritur.

Pituita alba.

D

Curatio.

Intumescit totum corpus albo tumore, & venter ad cōtra-
ctum crassus est, & pedes ac femora tumēt, Tibiæ item ac
scrotum, & acervatim respirant, & facies rubicunda est, &
os siccum, & sitis tener, & ubi cibum accepit, spiritus fre-
quens incumbit. Hic eadem die quandoque melius habet,
quandoque peius. Huic si quidem venter sua sponte turbat-
us fuerit in principio morbi, proximus sanitati est. Si verò
non turberetur, medicamentum deorsum purgans dato, à quo
aqua purgetur. Et calida non lauet, & sub dio exponatur, &
scrotum ubi impletum fuerit secato. Cibis vtatur pane puro
frigido, & bēta, & piscibus scorpijs coctis, iusculo autē quā
paucissimo. Et frigida omnia edat, & non dulcia, neque pin-
guia: sed trita & acida, & acria, excepto alio, cepa, & porro.
Origanū verò & satureiā multā edat, & vinū inde vinosum
bibat, & ante cibum iter faciat. At si à medicamēto tumeat,
clysterē adhibeto, & cibo, deambulationibus, & illuue præ-
mito. Medicamenta verò quā paucissima exhibeto. Verū sur-
sum purgans nō prius dederis, quā tumores ad infernas par-
tes descēderint. Quòd si extenuato iam ipso suffocatio in pe-
ctore oboriat, veratrū bibēdū dato, & caput purgato, & post-
ea deorsum purgās bibat. Morbus hic maxie à nullo discedit.

Cura morbus difficilis.

In visceribus veluti spina esse videtur, & pūgere, & anxie-
tas ipsum corripit, & lucē ac homines fugit, & tenebras
amat, & timor inuadit, & septum trāsuersum foris tumet,
& ad contractum dolet, & expauescit, & terri culamenta ac
somnia horrenda videt, & quandoq; etiā mortuos. Et mor-
bus hic ferē plurimos vere corripit. Huic veratrū bibendū
dato, & caput purgato, & post capitis purgationē pharmacū
deorsum purgans bibat, postea verò lac alinum bibat. Ci-
bis vtatur quā paucissimis, si nō debilis fuerit, & frigidis, et
aliū subeuntibus, & nō acribus, neq; salis, neq; pinguibus
neque dulcibus. Et calida non lauet, neque vinum bibat, sed
aquam maximē, aut saltem vinū aquosum. Neque exercitijs
vtatur, neque deambulet. Hęc si fecerit, à morbo liberabitur
temporis progressu. Si verò neglexerit, commoriatur.

Morbus niger.

Nigrum

Nigrum vomit veluti fecem, quandoque cruentū, quandoque velut vinum secundarium, quandoque velut polyphi atramentum, quandoque acre velut acerum, quandoque saliuant & pituitam, quandoque bilem cum virore pallidā. Et vbi quidem nigrum cruentum vomuerit, gadaneris fetorem refert: & fauces & os à vomitu aduruntur, & dentes stupescunt, & id quod vomitu reiectum est, terrā eleuat. Et post quā vomuit, paululum melius se habere putat. Et neq; sine cibo esse, neq; ampliorem cibum ferre potest. Verū vbi sine cibo manet, viscera sugunt, & salia acidā sunt. Quū verò cibū accepit, grauitas in visceribus est, & pectus ac dorsum velut stilis pungi videtur, & dolor tenet laterā, & febris

B debilis est, et caput dolet, et ocalis nō videt, et crura grauantur, et color niger est, et consumitur. Huic pharmacū bibendum dato frequenter, et pro anni tempore et serum, et lac. Et à cibis abstineat dulcibus, et oleosis ac pinguibus, et frigidis simis ac maxime per aluum subeuntibus vtatur. Et caput purgato, et post medicamentorum potiones sursum purgantes, de manibus sanguinem detrahito, si non fuerit debilis. At si aluus non egerat, molle infusum per clysterē immittito. Et abstineat ab ebrietatibus et venere. Si verò coierit, ieiunus fomentis vtatur. Et à sole abstineat, neque multum se exerceat, neque deambulet, neque calida lauet, neque acris edat, neq; salsa. Hæc faciēda sunt. Et vnā cum ætate aufugit etiam morbus, et cū corpore senescit. Si verò denigratus, fuerit cō-

Medela.

C moritur. Alius morbus niger. Subfuluus et gracilis, et oculis cum virore pallidis fit, et tenuem cutem habet, ac debilis est. Quanto autem tempus amplius progreditur, tanto morbus amplius affligit. Et vomit omni tempore velut stilamentum modicū, ad duorum poculorum paruorum mensuram, et frequenter etiam cibum, ac vnā cum cibo bilem et pituitam: et post vomitum dolet totum corpus, aliquando etiam antea quā vomat. Et horrores tenues ac febris tenet, et ad dulcia ac oleosa maxime vomit. Hunc medicamentis sursum ac deorsum purgare oportet, et lac asininum postea bibendum præbere. Cibus autem vtatur mollissimis ac frigidis, piscibus litoralibus, et cartilaginei generis, et betis, et cucurbitis, et carnibus tritis. Vinum bibat album, vinosum, aquosius. Labore et deambulationibus vtatur, et calida ne la-

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER III.

uet, & à sole absteineat. Atque hæc sanè facienda sunt. Verùm D
morbus lethalis quidem est, non autem consenescit.

Morbus corruptorius.

Alia quidem omnia eodem modo patitur. Verùm gru-
mos bilis cœcretos vomit, & deorsum similiter egerit,
postquam cibos excreuit. Cæterũ eadem facere oportet, quæ
in priore morbo relata sunt, & clysterem adhibere.

HIPPOCRATIS


COI DE MORBIS LI-

BER TERTIVS, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.



E febris vniuersis à me dictum est,
de reliquis iam dicam.

Cerebri tumor.

Quoniam cerebrum ab inflàmatio-
ne tumuerit, dolor totum caput
occupat, maximè qua parte cõstitit
inflàmatio: Consistit autem in tem-
poribus: & aures sonitu implentur, &

auditus hebescit, & venæ extenæ sunt, ac pulsant. & febris
ac rigor aliquando corripiunt, & dolor nunquam deficit, sed
quandoque remittit, quandoque magis premit, & vocifera-
tur ac exilit præ dolore. Et ubi surrexit, rursus ad lectum
decumbere festinat, & iactat seipsum. Hic lethaliter qui-
dem affectus est, in quot verò diebus morietur, non habet
iudicationem. Nam alij aliter pereunt. Plerunque tamen
in septem diebus moriuntur. Si verò vigesimum primum
effugerint, sani sunt. Quum itaque dolor vexarit, frigefa-
cere caput oportet maximè quidem per rasuram, aut frigefa-
ctorio aliquo, velut est solani succus, & terra figularis, in ve-
sicam aut folliculum immisso, ita vt vicissim modo apponas,
modo auferas, priusquam tepescat. Sed & sanguinem detra-
here

Medela.

A here oportet, & caput purgare, ad apij succos odoratis ammixtis. A vino autem in totum abstinere. Ptisanæ succum sorbere, & infernam aluum soluere.

Cerebri repletio dolorosa.

Q Vum doluerit caput præ cerebri repletionem, vitiosorum humorum purgationem non factam esse significat, & dolores totum caput tenent, & delirat, & moritur septima die, & euadere non poterit, si non eruperit humor septima die per aures. Sic enim & dolor sedatur, & resipiscit. effluit autem multus & inodorus. Huius aures priusquam pus erupisse videris, potius ne curato. Si verò supernam ac infernam aluum purgare voles, seorsum utramque soluito. Postea capiti maxime quidem vniuerso, sed, & per aures, & per nares, fomentum adhibeto. Sorbeat autem ptisanæ succum, et à vino abstineat in totum. Postquam verò eruperit pus, contineto te donec multa fluxio sedetur, postea aures colluito vino dulci, aut lacte muliebri, aut oleo veteri, atque hæc tepida infunduntur. Caput verò frequenter mollibus ac odoratis fomentis foueto, quo citius cerebrum purgetur. hic primum quidem non audit, progressu verò temporis et fluxio minor fit, et auditus vnà cum fluxione penitus quiescente contingit, et maxime sibi ipsi similis redit. Cauere autem oportet solem, ventos, ignem, fumum, acriū odores, et alia huiusmodi: et quiescere, ac molli victus ratione uti. Sit autem aluus inferna præ vasorum vacuatione solutu facilis.

Syderati.

Q Vi isti ac syderati esse dicuntur, quum cerebrum multa immundicia vitiosorum humorum repletum fuerit. anterior capitis pars primum dolorem ipsis exhibet et suspicere non possunt, aliqui ambobus oculis, aliqui altero, et sopor ipsos tenet, et desipiunt, et tempora saluunt, et febris tenuis habet, et corporis impotentia. Hic tertia aut quinta die moritur, et ad septem non deuenit. Si verò deuenit, à morbo liber euadit. Hunc si curare voles, capiti fomenta adhibeto, et sectione facta transpirationem effcito. Si verò dolor tenuerit, etiam sternutationes inducere oportet, et caput purgare leuibus ac odoratis, infernam item aluum purgare. A vino autem penitus abstinere, et ptisanæ succo vtatur.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Cerebri corruptio.

D

SI cerebrum corruptū fuerit, dolor caput tenet, & per col-
lum procedit ad spinā, & æger non audit, & frigus ad ca-
put deuenit, & totus intumescit, & repente priuatur voce,
& ex narib⁹ sanguis fluit, & liuidus fit. Quod si morbus leui-
ter corripiat, ubi sanguis discessit, melius habet. Si verò vehē-
menter correptus fuerit, cito perit. Huic sternutationes per o-
dorata inducito, & aluū vtrāq; aut alterā saltē purgato, & o-
dorata quæ leues odores habet, narib. ad mouero. & sorbitio-
nē tenuē ac tepidā exhibeto. Abstineat autē penitus à vino.

Medela.

Lethargus.

MOrbi lethargi appellati status idē est, qui & peripneu-
monia. Verū difficilior, & nō omnino liber ac remot⁹.
est ab humida peripneumonia. Sed multo tardior est mor-
bus. Patitur autē æger hac. Tussis & sopor ipsum tenet, & sa-
liuā liquā ac multā educit, & vehemēter importēs est : & quū
morigatus est, multū atq; id liquidū infra egerit. Huic valde
exigua vitæ spes est. Attantiū hoc curādū est vt plurimū spuat,
& calefiat, & à vino abstineat. Si verò effugerit, suppurat⁹ fit.

Medela.

Morbus siue febris ardens.

IN morbo febris ardente appellato, sitis tenet musta, & lin-
gua horret. At color eius primo quidem tempore est velu-
ti solet, verū sicca est. Progressu verò tēporis induratur, exa-
sperratur, crassescit ac nigrescit. Si verò in principio hæc patiā-
tur, citiores iudicationes sūt. Si posterius tardiores. Cæterū
remissionis eadē omnia signa lingua exhibet, quæ in peripneu-
monia: & vrinæ biliosæ aut cruētæ, dolorem ampliorē flauæ
verò minorē significāt. & sputū præ caliditate ac siccitate, cō-
bustū ac crassum est. Sæpe verò etiā in peripneumoniā tran-
sit, quod si cōtingerit, breui moritur. Hūc autē hoc modo cura-
re oportet, Calida bis aut ter singulis diebus lauato, capite
excepto. At in iudicationibus lauare non oportet. Et primis
quidē diebus deorsum purgato, & aquā bibendā dato. Nam
plerunq; vomitum aqua ciere solet. Posterioribus verò post
purgationē humectato, & sorbitionib⁹ vtat, ac vinis dulcib⁹.
Quod si non ab initio agrū curādū suscepis, sed signis iam
in lingua existētib⁹, linere oportet donec iudicationes præ-
terierint, & linguæ signa mitiora facta fuerint: & neque me-
dica

Medela.

morbus
epagla

A dicamentum dederis, neq; ad purgationem faciendam clysterem adhibueris priusquam iudicationes prætereant.

Pulmo tumens præ calore.

Q Vum pulmo tumuerit præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis & dura, & erectæ cervicis spiratio, & acuatim respirat, & frequenter anhelat, & intumescit, & nares expâdit, velut equus ex cursu, & linguâ frequenter exierit, & pectus ipsi canere videtur, & gravitas in ipso inesse. Quapropter hæc capere pectus non potest, sed dirupitur & impotens sit, & dolor acutus emergit, & dorsum, & pectus, & latera velut acubus pugnatur: & ardēt hæc partes velut eius qui sedeat ad ignem & rubores exoriuntur ad pectus & dorsum, velut à flamma, & morfus fortis incidit, & angustia, ut neque stare, neque sedere, neque decubere possit. Verum ita velut desperatis rebus anxius iactat seipsum, & iam mori videtur. Moritur autem maxime quarta aut septima die, quas si effugerit, non valde perit. Huc si cures infernā aluū quā citissime clysteri adhibito, probe purgare oportet, & de cubitis, & naso, & lingua, ac de omni corporis parte sanguinem mittere. Potiones ite frigefaciētes exhibere & sorbitiones idē præstātes. Dāda sunt & urināciētia sæpe, sed quæ non calefaciant. Et ad ipsos quidē dolores quoniam irruunt, calefactoria levia ac humida adhibēdo, locū calefacere ac humectare oportet, ubicūq; dolor fuerit: ad reliquas verò partes. frigefactoria adhibere, vicissim ea apponendo ac tollēdo, & ubicūq; arserit frigus facere. A vino autem penitus abstinere.

Medela.

C *Capitis dolor.*

Q Vum à capite initio sumpto, dolor acutus statim vocē interceperit, tum aliās, tum si ex ebrietate hoc contingat, ita affectus septima die moritur. Minus tamen moriuntur qui ex ebrietate tale quid perpessi sunt, & voce privati permanserunt. Nam si eadem die, aut postera, aut tertia vocem edant, sani evadunt. faciunt autem hoc aliqui ex ebrietate, & neutri moriuntur. Hi sternutationes fortes inducere oportet, et infusum per clysterem injicere, quod bilem vehementer ducat. Quod si sensum xger receperit, Thapliæ succū in multa calida aqua dato, quo quā citissime revemat. Postea attenuato, et à vino prohibeto per septē dies. Detrahendus est et à lingua sanguis, si venā cōprehendere possis.

Medela.

Phreni

Phrenitides.

D

Medela.

Phrenitides fiunt etiam ex alijs morbis. Patiuntur autem ægri hæc septum transuersum dolent, vt ne contingere quidē permittant, & febris accedit, & mente mouetur, & intentis oculis videt, & alia similia faciūt his qui peripneumonia affecti sunt, vbi sanē in peripneumonia mēte mouentur. Hoc modo affectū calefacere oportet calefactorijs humidis & potionibus, excepto vino. Et si quidē fieri poterit, sursum purgare, & p tussim ac spuitionē educere oportet, quēadmodum in peripneumonia. Sin minus, inferna aluus preparāda est, vt egerat. Humeſtato autē potiōibus, hoc em̄ cōducit. Morbus autē lethalis est. Moriunt̄ em̄ tertia, aut quīta, aut septima die. Si verō leniter corripiat, iudicat velut peripneumonia. E

Angina.

AB Angina appellāta suffocatur homo, & in faucibus magis ipsi inhaerere videtur, & neque saliuam, neque quicquam aliud detrahit, & oculi affecti sunt ac prominent, velut strangulatis, & intentē per ipsos videt, & ipsos conuertere non potest, & anxius est, & exilit frequenter, & facies & fauces ardent, imo etiam collum. At vidētibz nihil mali habere videtur, & videt ac audit obtusius, & præ suffocatione non intelligit, neque quid dicat, neque quid audiat, aut faciat. Verū hians decumbit saliuam fundens, ac talia faciēs. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur.

Leuis angina paracynanche appellata.

F

Medela.

AT vbi horum signorū quid abfuerit, laxiorem morbū significat, quem paracynanchen vocant. Huic venā secare oportet, maximē sub mamma. Concomitatur enim hæc parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoq; deorsum purgare medicamento, aut per clysterem. Fistulas item detrudere cōuenit in fauces iuxta maxillas, quo spiritus ad pulmonem trahatur. Et faciendum vti quā citissimē spuat, & pulmo gracilis fiat. Et sufficiens fiat per hyssopum Cilicium, sulphur, et bitumen: et attrahat et per fistulas, et per nares, vt exeat pituita. Fauces et lingua conscentur his quæ pituitam ducunt. Et venæ sub lingua secantur. Sed et à cubitis sanguis dimittatur, si vires validæ fuerint. A vino abstineat, et ptiſanæ succum tenuē sorbeat. Postquā verō remisierit morbus, et

A bus, & iam cibos gustarit, elaterio recenti purgato, vt ne in aliud malum incidat.

Morbus regius.

MOrbus regius huiusmodi acutus est, & cito occidit. Color totus mali corium valde refert, & cum virore pallidus est, quales sunt lacerti cum virore pallicantes. Con- simile est etiā corpus: & in vrina subfidet velut eruum ful- num, & febris ac horror debilis habet. Quandoq; etiā vesti- menta ferre nō potest, sed morderetur ac raditur. Et mane quū cibum nō accepit, viscera plerunq; lancinātur. Et quum quis ipsum excitat, aut alloquitur, non patitur. Hic plerunque in quatuordecim diebus moritur. Has si effugerit, sanus euadit.

B Oportet autem ipsum calida lauare, & aquā mulsam biben- dam dare, ita vt de nucibus Thassii decorticatis, & absinthij coma, & quis portionibus acceptis, & de aniso cribrato dimi- dia parte ammixta, obolos tres ieiunus ex illa bibat, & rur- sus dum cubitū it, hanc aquā mulsam sumat. Bibat etiā vinū vetus tenue, & sorbitionibus vtatur. Nec à cibis absteineat.

Medela.

Tetanus.

QUum distentiones Tetani appellati, corripuerint, ma- xillæ rigent velut ligna, & os aperire non possunt, & oculi lachrymantur ac distorquentur, & dorsum ri- get, & crura contrahere nō possunt, similiter neque manus, & facies rubicunda est, & valde dolet, & vbi moriturus est,

C & potum, & sorbitionem, & pituitā per nares reuomit. Hic tertia die, aut quinta, aut septima, aut decimaquarta perit. Vbi verò has effugerit, sanus euadit. Huic catapotia ex pipe- re & veratro nigro deuoranda dato: & iusculum volucrum pingue calidum. Inducendæ sunt etiam fortēs ac multæ ster- nutationes, & fomenta adhibenda. Quum autem fomentis non vtitur, calefactoria humida ac pingua vndeque in vesicis ac vtriculis apponātur, maximè tamen ad partes do- lentes, & calido oleo multo ac sæpe illinatur.

Medela.

Opisthotonos.

QUum autem distentio in posteriores partes, opistho- tonos appellata tenuerit, reliqua quidem plerunque eadem sunt. Verum in posteriores partes conuelli- tur, & vociferatur aliquādo, & dolores emergunt vehemen- tes,

HIPPOCRATIS LIBER III.

Medela.

tes, & crura interdum contrahere nō permittit, neq; manus **D**
 extendere. Sunt enim cubiti incuruati, & digiti in pugnum
 contracti, & pollicē plerunq; alijs digitis cōtinet, & clamar,
 & nugas garrit quandoq; & non potest seipsum cōtinere, sed
 aliquando exilit, vbi dolor premit, quum verò dolor remit-
 tit, quietem habet. Aliquando etiā vox intercipitur simul vt
 morbo corripiuntur, aut insani & atra bile perciti fiunt. Si
 tertia die moriuntur voce soluta, & reuomunt per nares. Si
 verò effugerint decimumquartū diem, sani fiunt. Curandus
 hic est velut superior. Quòd si voles, etiā sic facies. Aquā frigi-
 dam plurimā superfundito, & postea vestimēta tenuia, pura,
 ac calida superintegito. Ignem autē tunc nō adhibeto. Hoc
 auxilium & ad tetanos, & ad opisthotonos adhibere oportet. **E**

Voluuli.

Medela.

Voluuli fiunt quum supernus ventriculus calescit, infer-
 nus verò frigescit. Resiccatur enim simul intestinum,
 & prae inflammationis caliditate obturatur, vt neque flatus,
 neque cibi pertranscant, sed venter durus sit, & quandoque
 vomat, primum pituitosa, deinde biliosa, postremū stercus.
 Et ager sitim habet ac dolorem, maxime circa prae cordia.
 Verum & totum ventrem dolet, & inflatus est, & anxius est,
 & febres corripiūt, & fiunt maxime septima die. Hos sic cu-
 rare oportet. Supernum ventriculum quā citissime purga-
 to, & sanguinē de capite ac cubitis detrahit, vt superna al-
 uus calescere desinat, & partes supra septum transuersum fri-
 gefacito, excepto corde. Infernas autem calefacito, homine
 in folio aquae calidae collocato, ac semper oleo illito. Calefa-
 ctoria quoque humida apponito. Et glandulam de melle so-
 lum decem digitorum longitudinis facito, & ex summa an-
 teriori parte fel taurinum oblinito, atque sic bis ac ter sub-
 dito, quo omnia combusta stercora circa rectum ac princeps
 intestinum cōtenta educas. Et si quidem sic obdierit, post-
 eā clysterem adhibeto. Sin minus, follem fabrilē indito,
 & in ventrem flatum immittito, à quo & ventrem, & inte-
 stini cōtractionem distendas. Deinde extracto folle, clyste-
 rem adhibeto. Sit autem infusum per clysterē iniiciendum
 paratum non ex valde calefactorijs, sed ex his quae stercora
 dissoluunt ac colligant. Postea obturata per spongiam sede,
 in aqua

A in aqua calida desideat continens clysteris infusum. Et si hoc infusum susceperit, & rursus dimiserit, sanus euadit. Cæterū *Desperatio huius morbi quæ* priore tpe mel optimū delingat, & vinū splēdidū vernaculū bibat. Quod si voluulo amoto, febris ipm corripiat, desperatus est. Fortassis enim & inferna aluus soluta ipm occiderit. *do.*

Peripneumonia.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, & spiritum frequentem ac calidum respirat, & anxietas adest, et impotentia, et iactatio, et dolor sub scapulas, et ad claviculam, et ad mammam, et grauitas in pectore, quādoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint. Verū hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. *Saliuam tenentem, ac spumofam primū spuit.* Lingua flaua est. Verū progressu temporis nigrescit. Si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Sin posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas inhaeret. At liberationē à morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc autem patitur homo, minimum diebus quatuordecim, ad summū vna et viginti, et per hoc tempus tussit vehemēter, et vnā cum tussi purgatur, primū saliuā multa et spumosa. Septima verò et octaua die vbi febris in vigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior prodierit: sin minus, non. Nona verò & decima, cum virore pallida ac subcruenta. Duodecima autem vsque decimam quartam, multa & purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum naturæ & corporis affectiones humida sunt, et morbus fortis est. Quorum verò et natura, et morbi cōstitutio sicca est, in his minus. Si quidem igitur decima quarta die rescicatus fuerit, & non amplius purulentum-tussiendo reiecerit, sanus est. Sin minus, ad duodeuigesimam, et vigesimam primam animum aduerte, et si quidem tunc sputum illud quicuerit, euadit. Sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit saliuā, et si affirmauerit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, et morbus annum durabit, si non in quadraginta diebus pus eduxerit. Si verò insuauem saliuam esse dixerit, status morbi lethalis est. Verū in primis diebus hi maximē manifesti sūt. Si enim putrefactum ac purulentū expuerit in diebus duobus ac viginti, & non exulceratus fuerit, euadit. Si minus, non.

*Purulenti
pneumonia
signa.*

HIPPOCRATIS LIBER III.

non. Hæc peripneumonia nihil abest ab affectionibus quæ D
in pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfue-
rit, cognoscere oportet & quæ ægrotus mala habeat, & quæ
medicus aggredi debeat. Si verò pauca horum signorum ha-
buerit, ne decipiatur. Nam pernicioſa non est peripneumo-
nia, sed mollis. Cæterum peripneumoniam hoc modo cu-
rare oportet. Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem
& phrenitidem ita curare aggrediatur. Primum caput le-
uius facere incipe, quo nihil influxat ad pectus. Primis autem
diebus sorbitiones sunt dulciores. Sic enim id quod confedit
ac compactum est, potissimum elueris ac commoueris. Quar-
ta die & quinta ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nam
ad sputum sursum excreandum conducunt. Si verò pro ra- E
tione spuere non possit, ex pharmacis sursum educeribus da-
to. Aluum autem in primis quatuor aut quinque diebus sub-
ducere oportet, & hoc paulo amplius, quo & febres obtusio-
res sint, & dolores leuiore. Quum autem euacuatus fuerit,
& corpore debilis, infernæ aluum tertio quoque die deorsum
commoueto, quo & corpus potens sit, & supernæ regiones hu-
moris exortes. Nam si multus humor infra secedat, à quinta
die, mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernæ
partes resiccantur, & sputi purgatio sursum non prodit. Opor-
tet igitur & infernam aluum, neque valde suppressam esse,
ut ne febres sint acutæ: neque valde egerere, quo salua sur-
sum educi possit, & æger viribus valeat. At medicamenta sur-
sum educetia, sexta & septima ac nona die, & morbo adhuc F
ulterius progresso, magis exhibeto. Sit autem medicamentum
veratrum album, thapsia, elaterium recens, singula æquis por-
tionibus. Quod si salua non probe purgetur, & spiritus fue-
rit frequens, & purgatio non præualeat, prædicendum est nul-
lam spem vitæ reliquā esse, si purgatione nihil efficere pos-
sit. Sed & alia faciendæ sunt quæ in peripneumonia fieri so-
lent, si inferna alui ministerium suum probe obtinet. Quin
& aliter facere curationem oportet. A prima die initio sum-
pto, ari magni conchulam maiorem dato, dauci & vriticæ
utriusque; itidem vnam, sinapis & rutæ quantum tribus digitis
comprehendere potes, & succum silphij magnitudinæ fabæ.
Hæc in aceto dulci & aqua permixta & diluta ac excolata,
ieiuno tepida bibenda dato. Postquam verò purum exspuere
coeperit

Curatio.

*Venter ni-
mis solutus
quinto die
necat.*

*Curatio al-
tera.*

A coeperit, ari cōchulam maiorē, & sēsāmū, & amygdalas purgas, in aceto dulci aqua diluto bibēda prābeto. Si verō magis ducere voles, radicis Capparidis corticem his ammisceto.

Pleuritis.

Quam pleuritis apprehenderit: hæc patitur. Dolor latus, & febris & horror tenet, & frequentē spiritum habet, & erectę ceruicis spiratio vrget, & tussiendo reijcit subbiliosa, velut à mali punici corio, si nō ruptiones habuerit. Si verō habuerit, etiam sanguinem à ruptionibus. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcructa reijcit, Et est quidem biliosa mitior, si non ruptiones æger habeat: sin minus, doloſior quidem est, sed non lethaliſior. At sanguinea *sanguinea pleuritis* fortis & dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum salua sanguinis grumos nigros tussiendo reiecerit, septima die moritur. Si verō dies decē transgressus fuerit, à pleuritide quidem sanus fit, verū vigesima suppuratur, & pus tussiendo reijcit, demum verō reuomit, & non adeo facilis curatu est.

Pleuritides sicca.

Sunt & sicca pleuritides sine sputo, Verū hæc difficiles sunt. Iudicationes autem similes alijs sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent quàm aliæ. Biliosa verō & sanguinea, nona & vndecima die iudicāt, atque hi magis sani fiunt. At si à principio quidem molles quidam tenuerint dolores, à quinta verō ac sexta die acuti, hi vsque ad duodecimum perueniunt, & non valde effugiunt, Periculum autem maximè est, vsque ad septimum. Imò etiam vsque ad duodecimum. Post has verō sanantur. Quæ verō ab initio molles sunt, à septima autem & octaua acutæ, ad decimumquartum iudicant, & sani fiunt.

Pleuritis ex dorſo.

Pleuritis ad dorsum intantum ab alijs differt, dorsum dolere velut ex plaga, & suspirat, & acuatim respirat. statim autem sputa pauca, & corpus delinatur. Tertia aut quarta die saniem mingit subcruentam. Moritur autem maximè quinta die: sin minus, septima. Has si effugerit, vixerit, Et morbus lenis est ac minus lethalis. Custodire tamē oportet vsque ad decimumquartum. Postea verō sanus euadit. Caterum

HIPPOCRATIS LIBER III.

quibusdam pleuriticis salua quidem pura est, mistio autem D
 cruenta, velut serosa à carnibus assatis sanies. dolores verò
 acuti per spinam ad pectus, & ad inguem tendunt. Hic si se-
 ptimū diem effugerit, sanus fit. At si alicui in his pleuritidi-
bis cōtingat dorsum rubesceri, & humeros calefacere, & in-
ter desidendum grauari, & vèter exturbetur egestione cum
 virore pallida ac valde graueolenti, hic propter vètris ege-
 stionem, vigesima prima die moritur. Has si effugerit, sanus
 fit. Quibus autem statim sputa varia sunt, & dolores valde
 acuti, hi tertia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sane-
 scunt. Qui verò sanus non fit septima, aut nona, aut decima,
 hic suppurari incipit. Melius est autem suppuratū fieri, etiā
 dolorosum sit. Minus enim lethale est. Porro supra omnia E
 relata signa, in vnaquaque pleuritide considerare oportet lin-
 guam. Si enim bulla subluida fiat in lingua, velut ferro in
 oleum tincto, si quidē in principio fiat aspera, difficilior est
 morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo reijcere,
 in diebus quibus id fieri oportet. Si verò facto morbi pro-
 gressu fiat, iudicationes quidem contingent ad decimum-
 quartum diem, Verū necesse est sanguinem spuere. Habet
 autem se res de liberatione ab hoc morbo, hoc modo. Si qui-
 dem tertia die inceperit maturari ac expui, citius liberabi-
 tur. Si verò posterius maturescat, posterius iudicationes fiūt,
 quemadmodum in capitis signis. Dolores porro in omni
pleuritide, plerunque magis interdū quā noctu leuiiores
fiunt. Curare verò pleuritidas hoc modo oportet, vt plurimū F
 velut phrenitidem & peripneumoniam, praterquam quòd
 hic balneis calidis & vino dulci vti dūm est. Si igitur prima
 aut secunda die postquam inuasiū agrum, accesseris, si ster-
 cus prodijt purum, aut leuiter biliosum & modicū, infusum
 ex Thapsia per clysterem injicito. Si verò aliud commota, no-
 ctu quidem egerat, postridie verò dolor & tormen vexet,
 rursus clysterem adhibeto. At si ager biliosus sit natura, &
non purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saluam
biliosam expuat, etiam medicamento bilem probe purgato.
Si verò iam expuat biliosa, medicamentum ne dederis. Si e-
 nim dederis, sputum sursum prodire non poterit, sed septima
 aut nona die suffocabitur, maxime si præcordia doleant.
 Quod si ad dolores in lateribus etiam præcordia doleant,
 clyster

*Longam consi-
deranda*

Medela.

- A** clysterem adhibere oportet, & in potu ieiuno bibendam dare, Aristolochiam, hyssopum, cuminum, silphium, pepulum, mecona appellatum album, florem æris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua verò sic se habent. Multa calida pro viribus ægri lauato, capite excepto, & quam iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepesfacito, & oleo illinito. Quum verò impetu fertur morbus, & ægrum & medicum à curationibus quiescere conuenit, ne quid mali inducatur. Dandus autem est pituitæ & succus coctus, aliquanto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiã vinum dulce & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angustis oris
- B** pocillo, & ubi tussis inuaserint, amplius bibendum & quam maxime excreandum, & potu humectandum, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius sputum reddat, & tussis minus affligat. Sed & mali punici dulcis vinosi succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim saepe dato, & noctu & interdum, & somnum quam maxime prohibeto, quo purgatio & citius & copiosior fiat. At verò sanguinea pleuritis sic curare oportet. Post iudicationes cibis leuibus reficito, & quietem agat, & nimium caueat solem, ventos, repletiones, acida, salia, pinguia, fumum, flatum in aluo, laborem, venerem. Si enim morbus reciduarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, ieiuno æris florem dato, magnitudine oliuæ, & succi silphij dimidiū eius, & trifolij seminis modicum. Hec ex melle delingat. Aut piperis grana quinque, & succi silphij magnitudinem fabæ, mel, acetum, & aquam, ieiuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores sedat. Quod si pro ratione spuere non possit, sed moretur sputum hærens in ipso, & stertat in pectore, ari magni radices conchulam maiorem, & oleum ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum insuper præbet. Aliud forte. Florem æris magnitudine fabæ, & nitrum assatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, melli misceto, & aquam ac oleum modicum adstillato, & tepesfacta in conchula maiore infundito, ut ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si verò neque stertat, neque velut oportet, spuat, capparidis fructus quantum tribus digitis

Pleuritis hæmato = des.

comprehendi potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, D
 & acetum, & aquam misceto, arque hæc tepida sorbenda
 præbeto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua feruefa-
 cta sorbeat. Hoc etiam stercentibus dato, & his qui purgari
 non possunt. At si fortius facere voles, hyssopi & sinapis, &
 nasturtij concham maiorem, melle & aqua terito, & ferue-
 facta ac excolata, tepida sorbenda dato. Atque hoc modo hi
 morbi curati sanantur, si non quid sputi in pulmone reli-
 ctum pus fiat, a quo arida tussis sequitur, & febris ac horror
 emergunt, & erecta ceruice spiratio tenet, & frequentem &
 acervatam respirationem æger habet, & vox paulò grauior
 fit, & color cum calore faciem occupat. Progressu verò tem-
 poris morbus magis manifestus redditur. Hunc si intra de- E
 cem dies susceperis, vbi victu & balneo calido calefeceris,
 medicamentum quod pus ducat, in pulmonem infundito,
 alijsque pus ducentibus vrito, atque sic velut suppurato vi-
 ctus rationem præscribas. Caput quoque resiccato, vt ne quid
 influat. Si verò ex eo quod in pulmonem infusum est, pus
 non educatur, rumpitur hoc ipsum ex pulmone in thorace,
 & post ruptionem sanus esse videtur, quoniam ex angustia
 ad amplam capacitatem pus peruenit, & spiritus quem respi-
 rando attrahimus in pulmone locū ac sedem habet. Verum
 progrediente tempore pectus pure impletur, & tusses, & fe-
 bres, & alij dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus
 inclarescit. Hunc post eruptionem per quindecim dies sine-
 re oportet, quo pus rursus maturescat, Nam ex eo quod pus F
 ad ampliorem locum deuenit, perfrigeratum est, & id quod
 in thorace humidi erat ad seipsum attraxit, ita vt ipsum sit
 semiputrefactum. Si quidem igitur sua sponte expui inci-
 piat in hoc tempore, bene est. Sin minus, medicamentis aut
 potionibus opem ferre oportet, in vltimis ex quindecim il-
 lis diebus, festinando ad corporis excitationem antea quàm
 magis affligatur, ita vt caput purum custodias, influxionum
 gratia. Si verò non spuatur, sed sui significationem ad latera
 præbeat, secato aut vrito. At si neque spuatur, neque ad la-
 tera de se significationem præbeat, vbi multa calida ieiunum
 lauasti, & neque potu vsu infirma sella locasti, alter ex hu-
 meris ipsum apprehendat, tu verò concute ipsum, aure ad la-
 tera admota, quo percipias ex vtra parte significationem sui
 præb

- A** præbeat. Optandum autem esset ex sinistra. Nam dextras vrere aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dextre partes, tanto etiam fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si præ crassitudine, humor non fluctuet, neque strepitus sit in pectore, verum spiritum frequentem trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant, hæc, sed thoracem pure plenum esse probe noris. Proinde in terra eretriade liquida, & valde trita ac tepida, linteum tenue tingito, eoque thoracem circumcirca integito, & qua parte primum resiccatum fuerit, ea secato aut vitro, quam proximè ad septum trasuersum, cauendo tamen ne hoc ipsum ladas. Si verò volēs, ipsam terram eretriadem illinito, & similiter velut in lino teo considerato. Multi simul illinunt, ne quæ primum illinuntur resiccantur. Post sectionem aut vstionem, linamento ex lino crudo vtere, & paulatim pus emitte. Caterum vbi secare vel vrere volēs, corpori in eadem figura, in qua inter secandum aut vrendum futurum est, notam imprimito, vt ne cutis te decipiat, si in figuræ transmutatione sursum aut deorsum magis cedat. Sed & tusses vitare oportet ex victu, vt ne rursus pus reuellant ad pulmonē. Malum enim hoc est: quare permittendum est vt ad sectionē quam citissimè resiccetur. Postquam verò duodecima affuerit dies; reliquum pus totum emittito, & ex lino linamentum indito, & bis in die pus emittito, & ventrē supernū ex victu quā maximè resiccato. Atque hoc modo oportet etiam suppurationes ex vulneribus, & ex peripneumonia: & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapsō, considerare ac curare.

Frigeſactoriæ potiones in febre ardenti.

Frigeſactorias potiones in febribus ardentibus quando volēs bibendas dato. Sunt autem multarum operationū. aliæ enim mictionem inducunt, aliæ alui egestionem, aliæ vtrunque præstant, aliæ neutrum, aliæ solum frigeſaciūt, velut si quis in vas aquæ feruentis frigidam aquam infundat, aut ipsum vas ad frigidum ventum exponat. Dabit itaque alias alijs. Neque enim dulces omnibus conducunt, neque acerbæ: neque eadem omnes bibere possunt. 1. Fauorum siccorum heminarum duarum mensuram aqua macerato, & conterens gustato donec sub dulcis aqua fiat, deinde exco-

HIPPOCRATIS LIBER. III.

Jato, & iniectis apijs bibendam dato. . i i . Seminis lini a-
cerabulum, aquæ heminis decem affusus, in noua olla prunis
imposita coquito ac feruere finito vt transpirent, donec suc-
cus ad tactum pinguis fiat. . i i i . Aquam mulsam aquo-
sam ad dimidias coquito, deinde apio iniecto frigidam pau-
latim exhibeto. . i i i i . Ordeum Achilleum magnum ac
plenum hemina mensura siccato, & acutis spicis ablatis, vbi
probè laueris, aquæ congio affuso coquito ad dimidias, fri-
gefacito ac bibendum dato, . v . Cumini Aethiopici hemi-
næ decimæ parti, tres aquæ semicongios affunde, & olla lu-
to piloso oblita, donec tertia pars restet feruere sine, & frigi-
dam hanc ad omnem ardentem aliamque febrem exhibe.

. v i . Aquam ecclestem ipsam per seipsam præbe.

. v i i . Ptilinæ hemina congio aquæ affuso, ad dimidias
coquito, deinde excolato, & apijs iniectis frigidam dato.

. v i i i . Profunt & vina alba aquosa ex viis pasis.

. i x . Profunt & vuarū passarū expressarū retrimēta aquosa.

. x . Vuarum passerarum albarum, exēptis vinaceis hemina,
radicum quinquefolij manipulum, tundito, & affusus aquæ
heminis viginti, ad dimidias coquito, & frigidam hanc pau-
latim bibendā dato. . x i . Ad farinæ ordeï pleni crassæ cho-
nicem dimidiam, atque congiū affundas, & quum iam in-
rumescent crassæ farinæ partes, manibus teras, donec aqua
alba fiat, & adianti pugillo iniecto, sub dio per noctē expo-
nito, ac exhibeto. . x i i . Quorum trium aut quatuor can-
didum, in aquæ congio concussū bibat. Hoc valde frigefa-

cit, & ægrum ad aluum exonerandam conturbat.

. x i i i . Ordeï torrefacti probè loti chēnicē dimidiā, in a-
quæ cōgiō bis aut ter feruere finito, & frigidā hanc exhibeto.

. x i i i i . Prisanæ succum coctum tenuem, & vinum dulce
dato. Hoc vrinā inducit. . x v . Cucumeris peponis corio nu-
dati pollinem ex aqua præbeto. Hæc potio vrinam ciet, fri-
gefacit, & sitim sedat. . x v i . Eruum in aqua præcoquito,
deinde ollam nouam, in maiore ollam aqua plenā ponito, &
alia aqua cruo affusa, ad modicū tempus coquito. Postea vbi
coctū fuerit eruum, tertiā aquæ partem reliquam excolatam
bibendam dato, ita vt ad singulos cyathos, & cucumeris, &
erui pollinem inspergas. Hoc constanter sitim edat.

. x v i i . Vinū Thasiū vetus parte vna, cū vigintiquinq; aquæ
partibus

- A** partibus dato. **xviii.** Trifolium, cucumeris pollinem, & crassam ordei farinam in aqua macerato, & hanc bibendam dato. **xi.** Apij manipulos tres, pulegij pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias coquito. Hoc melle & aqua dilutum, aquosum bibat, adianti pugillo iniecto. Hoc urinā ducit, & aluum soluit. **xx.** Mala odorata dulcia contudito, & aqua macerato, & aquam bibendam dato. **xxi.** Mala cydonea eodem modo, si aluus soluta fuerit in febre ardente. **xxii.** Quod si morbus regius insuper corripiat, vix passæ albæ exemptis vinaceis, & cicerum alborū, vtrorumq; dimidiam heminam, & ordei Achillei magni ac pleni tantundem, cinici tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & mentam, & coriandrum, de singulis parū, terito donec placcide aqua dulcescat, & adianti pugillo postea iniecto, ubi sub dio per noctē exposueris, exhibeto. Potes etiā alia his similia imitari. Omnia verò per noctem sub dio exposita dabis febrienti, exceptis his quibus alui plus quàm conuenit sunt. **xxiii.** Pulegij pugillos tres, apij duplum, in vino diluto coquito ac exhibeto: hoc urinā ciet, & bilem per aluum trahit.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS LI-

BER QVARTVS.



Ad hominis generationem de omnibus & viri & mulieris partibus semen progressum, & in vterum muliebrem illaplum condensatur, temporeq; veniente natura hominis formam referens ex ipso producit. Habet autem & mulier, & vir, quatuor species humoris in corpore, a quibus morbi fiunt, qui non à violentia aliqua fiunt. Sunt

Membra omnia generationi confertunt.

HIPPOCRATIS LIBER IIIL.

autem species hæc, Pituita, Sanguis, Bilis, & Hydrops siue a- D
 qua: & de his non minima, neque debilissima, in semen pro-
 cedit portio. Et quia animal secundum parentes nascitur, tot
 humorum species, & sanorum & morbosorum in seipso ha-
 ber. Ostendam autem quæ in vnaquaque harum specie-
 rum & plura & pauciora in corpore sunt, & à quo ægrotant.
 Et quod morbi imparibus diebus iudicantur. Et quæ sint
 morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore
 efficiant, vt morbum inducant, & à quo rigor febrilis fiat, &
 cur post ipsum febris irruit. Primum autem demonstrare vo-
 lo, quomodo bilis, & sanguis, & hydrops, & pituita, copio-
 siora & pauciora fiant à cibis & potibus, hoc modo. Ventri-
 culus dum plenus est, omnium horum corpori fons est. E
 Verum vbi vacuus est, corpore fruitur colliquefcente. Sunt
 autem & alij fontes quatuor, à quibus vnusquisque horum
 humorum in corpus procedit, postquam sanè ipsi à ventricu-
 lo acceperunt: & hi quoque fontes vbi euacuuntur, de cor-
 pore fruuntur. Sed & ipsum corpus attrahit, vbi ventriculus
 in seipso quid habuerit. Et sanè sanguini fons est cor, pitui-
 tæ caput. Aquæ splen, Bili locus folliculi in hepate. hi sunt
 quatuor humoribus his fontes, ventriculo excepto. Et his au-
 tem maxime caui sunt, Caput & Splen, Nam in hoc ipso ma-
 xima amplitudo est. Verum de hoc paulo postea clarius di-
 cam. Quin & hæc sic se habent. In omnibus cibis ac poti-
 bus & biliosi quid est, & aquosi, & sanguinei, & pituitosi: in
 alio plus, in alio minus. Quapropter & quæ eduntur ac bi- F
 buntur, alia alijs præstant ad sanitatem. Atque hæc mihi de
 hoc dicta sunt. Postquam verò comedit aut bibit homo, cor-
 pus in seipsum humorem relatū ex ventriculo, & fontes tra-
 hunt per venas de ventriculo, similis humor similem, & cor-
 pori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis
 humor similem trahit de terra. Habet enim eodē modo ter-
 ra omnigenas in seipsa ac innumeras facultates. Quæcunque
 enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorem similem
 vnicuique, qualem & hoc ipsum quod nascitur sibi similem,
 iuxta cognationem habet. & trahit vnumquodque de terra
 alimentum, quale etiam ipsum existit. Nam & rosa de terra
 trahit talem humorem, qualis ipsa in potentia est: & allium
 de terra humorem eiusmodi trahit, quale ipsum in potentia
 est.

*Pituita, san-
guis, bilis.*

*Quatuor
corporis
fontes.*

*Cor sangui-
nis fons, ca-
put pituitæ
lien aquæ,
fel bilis.*

*Quo pacto
hæc corpus
hauriat.
Terra vi-
res.*

*παραδ' ἑ-
μα δ' ῥοσά
ὁ ἄλλιο.*

A est. Et alia omnia terræ nascentia, ex terra trahunt, singula iuxta seipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes seminibus. Cui porro plantæ in terra cognatus humor multo vberior est quàm conuenit, ea planta agrotat. Cui verò paucior quàm opportunum est, ea reliccatur. At si ab initio non insit terræ humor, quæ planta iuxta cognationem trahat, ne germinare quidē poterit. Intelligentiam autem huius rei, quod si non habeat planta humorem secundum naturam, ne ab initio quidem germinet, inde nobis suppeditatur. Ionia enim regio & Peloponesus pro temporibus anni à sole non minimè calet ac illustratur.

B ut sol nascentibus è terra sufficere possit, attamē fieri nō potest, multis frustra iam id tentantibus, ut in Ionia aut Peloponeso Silphium nascatur. At in Libya sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponeso, eiusmodi humor qui ipsum alere possit. Quum autem sint & aliæ multæ medicinae, quas sole sufficiente, regiones alere nō possunt, aliæ verò sua sponte producunt, hoc ipsum eius quod nunc dicturus sum considerandi occasionem exhibet, quantum videlicet locus alteri loco etiam valde vicinus præstet ad iucundi vini productionem, sole æqualiter sufficiente. Hic etenim in terra humor est, qui vinū suaue exhibere potest, illic non est. Sunt etiam syluestria non pauca in loco nascentia, quæ ad orgyæ seu cubitorum quatuor spatium translata, nasci minimè comperias. Non enim habet terra

C talem humorem translato, qualem illa syluestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quædam venenosiores, aliæ humidiores, aliæ dulciores, aliæ sicciore, aliæ asperiores, & innumeræ aliæ aliter se habent. Innumeræ enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sanè videntur hæc omnes plantæ syluestres fuisse, Verum homines ipsas masuefecerunt, fructum ferre efficientes vnamquamque iuxta suum semen. Trahit enim similis humor similem ex terra, & ex hoc augefcit ac nutritur. & nullū ex terræ nascentibus alteri simile est, quod non æqualem, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia quæ nascuntur in cibi ac potus vsum venientia, multas facultates de terra ad se trahunt, & in omnibus est aliquid pituitosi

Silphium.

*Diuersi ter-
re humores*

*Prius syl-
uatica om-
nia fuerūt.*

*Cibus po-
tusq; quid
secū habeat.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

ac sanguinei. Et ex hoc adeò ad hanc demonstrationis neces-
 sitatem deueni, quòd à cibis ac potibus in ventriculum pro-
 cedentibus trahit corpus, secundum fontes quos nominavi,
 similis humor similem per venas. Referam quoque aliud
 argumentum, quòd singula prout relatum est trahant, & si-
 mul dicam, vnde pituita in corpore gignatur. Vbi quis caseū
 comedit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit aut bibit, quod
 pituitosum est, statim ipsi ad os, ac nares accurrit, atque hoc
 ita fieri partim omnes videmus, partim ita esse credere opor-
 tet, ex his quæ ego referam. Assero itaque, quod quantum
 in cibo aut potu pituitæ inest, illud vbi ad ventriculum per-
 uenit, partim corpus ad seipsum trahit, partim caput, vt quod
 cauum sit, & velut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, E
 vt pote viscosa existente pituita, ita vt hæc alia per aliam
 sequatur ad caput: & quæ quidem recens ex cibo genera-
 tur pituita, in capite manet. Vetus autem, prout copiosior
 est recens, ab ipsa violente extruditur. Quapropter vbi quis
 edit aut bibit aliquid pituitosi, excreat pituitam. Habet au-
 tem & hæc res se hoc modo. Si vbi edit aut bibit quid pi-
 tuitosi homo, non rursus exeat quod redundat, neque per os,
 neque per nares, necesse est ipsum manere in capite, aut ad
 corpus descendere de capite, & ad ventriculum peruenire.
 Ac optimum quidem fuerit, si ad ventriculum pertineat.
 Exire enim poterit vnà cum stercore, & si quidem multum
 fuerit ac humidum, stercois humectare poterit. Si verò modi-
 cum, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolo-
 rem capiti exhibuent, quum in venis est. Si verò modicum, F
 non hoc fecerit. Significationem autem de se præbet copio-
 sum ne sit an modicum. Quod si ad corpus deueniat, atque
 illic alio humori amixtum fuerit, si quidē multa fuerit pi-
 tuita, statim corpus læserit: si verò pauca, nō adeo lædere po-
 terit, quum magnum sit corpus, si nō & aliud quoddam prin-
 cipium ipsi reliquū sit. Verum temporis progressu, si alia pi-
 tuita superaccedat, lædi utiq; possit. At si corpus velicæ ac vē-
 triculo deleget, atque hæc foras perferant, nihil mali ex ipsa
 habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomo-
 do caput pituitā ex vētriculo trahat, & simile ad simile per-
 ueniat, & simul à me dictū est, quomodo & quare copiosior
 pituita homini à cibis ac potibus fiat. Nunc verò dicam de
 bile

Caput eu-
 curbiula
 inflat.

Pituita
 quid agat.

A bile, quomodo & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo *Bile.*

locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quoddam aliàs biliosum ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor vocant, atque hoc ita fieri videmus, & clarum nobis est quod à cibo aut potu factū est. Trahit etenim corpus in seipsum de cibis omnem prædictum humorem. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthic biliosi inest. Et si derepente multa bilis fiat, homo hepar dolet, & de ventre copiosior fit. Hoc enim contingente, procedit de veteri bile propter multitudinem ad ventriculū, & ex hoc tormen ventriculo oboritur, & pars ipsius per vesicam, pars per aluum egreditur, atq; sic minima pars in homine manet, & dolores cessant. Si verò neutrum horum contingat, procedit primum de veteri bile ad corpus, distribuitur enim ad ipsum: & si multa fuerit, statim significationem sui præbet alij humori ammixta. Si verò modica, non adeo læserit, quum magnum sit corpus, si non & aliud quoddam principium suboritur, Verū temporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominē utiq; læserit. Si verò non superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcunq; biliosa sunt, prodeant. Nam quæ in cibo ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sanè etiam alia quæcunq; lædencia sunt medicamenta, ubi aliud ab alio in ventriculum incidit, sua ipsius potestate causam habens, id quod

B superatum est expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his quæ in ventriculum incidunt, morbus huic oboritur. Atque in hoc sermone iam ego declaravi, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore, à cibis & potibus: & quod trahit in seipsum folliculus in hepar, iuxta similitudinem id quod biliosum est à cibis ac potibus.

C Nunc verò dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahat in seipsum. Affero autem ubi homo bibit amplius, & corpus, & splenem, aquam in seipsa trahere ex ventriculo. Et si plus traxerint quàm oportet, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt quicumque homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si vetus aqua quæ in splene inerat, ad vesicam aut ventriculū excoletur, & per hæc expellatur.

Nam

*Splen aqua
trahit*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

Nam per supernas regiones non purgatur aqua de plene, nisi quantum eius in vasis inest, quæ de liene procedunt: verum ad ventriculū & vesicam depurgatio fieri potest. Si verò hæc ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras excoleretur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthic alij humori miscetur. Et si quidem pauca fuerint, non sanè læserit sed de corpore ad vesicam, & ad ventriculū, per venas excolari poterit. Sunt enim multæ ex hoc tendentes deorsum, quæ ex infernis partibus à seipsas trahunt, ubi siciores fuerint quàm prius erant. At si alia aqua generetur, & ventriculus ac vesica foras non expellant, splen eleuatur, & infernæ corporis partes dolore afficiuntur. Atque hæc à me dicta sunt, quomodo & cur aqua copiosior generetur in corpore à E potu: & quomodo splen trahit. Nunc autem de sanguine dicam, quomodo & cur amplior in corpore generetur. Postquam bibit aut comedit homo aliquid quod sanguineū est, trahit quidem & totum corpus in seipsum, trahit autè & cor sanguineū ad seipsum. Et ubi plus attraxit, non oboritur cordi dolor. Est enim cor res solida ac densa, & propterea dolore non affligitur. Et ex ipso procedunt venæ crassæ iugulares appellatæ, ad quas statim si copiosius accedat, sanguineum illud distribuitur, & illæ impletæ breui ad caput & corpus delegant. Et quum ederet aut biberit homo quid sanguinei, statim venæ iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente verò ad cor & corpus sanguine quàm satis est vberiore, à cibis ac potibus, & ad alium humorem ammixto, si non ab ipso egressus fuerit, per aliuū aut vesicam, reliquo humori ammixtus, dolorem corpori inducit. Si verò modicus accedat, non sanè læserit corpus. Verum temporis progressu distribuitur ab ipso ad ventriculum, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nulla læsio contingit. Si verò paulatim copiosior fiat, morbosus efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, à me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis, Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc à me demonstrata sunt, & quomodo, & cur copiosiora fiant, à cibis ac potibus. Quod autem ex his fiant ac generentur, hoc argumento constat. Si homo parum edit, & parum bibit, nullum morbum hoc ipsi inducit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attigi etiā obiter ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Verum de

Splen tur-
gens quid
agat.

942. m
Cor cur nō
laboret.
Vena iugu-
laris.

hæc omnes quatuor
sunt fontes huius
virescentia
180 e.

Arum de hoc paulò post meliùs tractabo. Cæterum fontes hi *Fontes cor-*
 quatuor quos nominavi, quum pleni fuerint, semper corpori *pori submi-*
 distribuunt: quum verò vacui, vice versa trahunt ab ipso, Sic *nistrant,*
 etiã ventriculus facit. Et habet se res hoc modo, veluti si quis *non soli.*
 tria aut plura ænea vasa in planissimo loco cõponat, & co-
 aptata quàm optimè disponat, fistulas ad foramina insertis,
 atq; ita placidè in vnum vas aquam infundat, donec omnia
 ab aqua fuerint expleta. Ab vno enim diffluet in reliqua va-
 sa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquàm autem plena
 facta fuerint vasa, si quis de vno aquam effundat, retribuet se
 retro fluens aqua ad vnũ vas, & vacua fient reliqua vasa rur-
 sus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpo-
 re res se habet. Postquàm enim cibi ac potus in ventriculum
 inciderint, fruitur corpus de ventre, & vnà cùm fontibus im-
 pletur. Vbi verò aluus vacuatur, rursus retro humor ab ipso
 redditur, quemadmodum susceperat, veluti ex alijs ad vnum
 vasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes, *aliæ*
 tenuiores, aliæ crassiores, multæ ac frequẽtes. Hæ autem do-
 nec viuít homo, apertæ sunt, & suscipiunt & dimittunt nouũ
 humorem. Vbi verò mortuus fuerit, clauduntur & extenuan-
 tur. Quandiu igitur viuít homo, fruitur corpus de vètriculo;
 vbi quid in seipso habuerit: fruuntur etiã fontes, & impleri
 corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de vètrici-
 culi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuerẽt, non
 sanè haberet corpus sufficiens alimentum, sed paucius. Non
Cenim ampliùs haberent alimentũ fontes, quod corpori sub-
 ministrarent. At verò si fontes isti non essent, dum edimus
 ac bibimus, verè non cognosceremus, neq; quid iucundum,
 neq; quid iniucundum essemus, propter hanc quam referam ne-
 cessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquũ cor-
 pus, semper etiã anteqũ a trahat vnusquisque iuxta suam
 facultatẽ, reliquo corpori denunciat de cibis ac potibus, qui
 biliosus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquo-
 sus. Quicquid enim horum humorũ plus quàm opportunum
 est, in cibis ac potibus nobis obuenerit, neq; cibos illos iu-
 cundos facit. Quæ verò maximè appetimus, pro eorũ ratio-
 ne etiã illi iucundi sunt. Si verò cibis ac potibus opus habe-
 rit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsis
 fontibus, donec humor paucior quàm oportet fiat, & tũc sa-
 nè appetit

*me in semper
est qd e*

*Quo pacto
sua quisque
trahat*

*Cur cum
multum
sumpsimus
plus appe-
timus.*

*Locus bi-
lis fel.*

Caput pi-

cor sangu-

nis lien a-

que.

Venæ iugu-

lares.

Cur cor nō

afficitur, ca-

put & lien

multum.

Quo pacto

humores in

corpore mi-

nuantur.

nē appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod por-
tionem illam expleat, ac reliquis adæquet. Et propterea vbi
multum cibi sumpsimus aut bibimus, quādoq; adhuc cibum
aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quā
quod appetimus. Postquā autem comedimus, & adequatus
fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc
cessat appetentia. Atq; hæc de hoc à me dicta sunt. Quin &
hoc se ita habet, quod ad folliculum in hepate, sola bilis à ci-
bis ac potibus secernitur. Venulæ enim quum debiles & re-
tues sunt, alium humorē trahere non possunt, qui grauior &
crassior existit: & simul non est ea loci capacitas, vt alius hu-
mor in hoc folliculo cōsistat: & est hic locus maximē fami-
liaris bilis secundum naturā, & ob id in ipso nullus alius fit
morbus, quā is quem homines Cardiogmū; hoc est cordis
morsum vocant. At caput, & Cor, & Splen, de omnibus hu-
moribus participāt. Vnumquodq; tamen si nō ægroter, plu-
rimū de relictis participat, iuxta suā ipsius naturā, caput pi-
uita, cor sanguine, splen aqua. Trahūt autē & de alio humo-
re venæ in seipsas, amplæ & crassæ, & instar pāpini retortæ
existentes, ita vt vbi trahant, alius humor aliū sequatur. Et
cordi quidem propinquāt venæ iugulares crassæ, ad quas ci-
tō distribuitur, vbi illi amplior quā commodus est humor
accedat. Hæc verò ad reliquū corpus delegant: & simul ipsum
cor solidum est ac densum, vt ab humore nō ægroter, & pro-
pterea nullus morbus in corde oboritur. Caput autē & splen
maximē sunt morbis obnoxia. Aegrotāt enim & ab his quæ
à natura insunt, quum plura quā oportunitatem est, accesse-
runt. Aegrotāt item ab alijs humoribus. Venæ enim in ipsis
crassæ ac multæ sunt, & ipsæ quoque venosæ sunt ac caua, vt
& alijs humoribus recipiendis capacitas in ipsis sit, paulatim
nimirū accedentibus, & ad eum humorē qui à natura in-
est, se ammiscētibus. Quemadmodū in vase magno amplior
capacitas est quā in paruo. Sic sanē & in capite, aut in sple-
ne, res se habet. Magna enim capacitas maximē in ipsis est.
Si verò repletæ fuerint isthic humore venæ, ab ipso sanē in
illis morbus oboritur. Volo autem melius declarare, quomodo vnusquisque horum
humorum in corpore paucior fiat. Quatuor equidem humo-
res esse demonstravi hominē ludentes. Quatuor item ipsorū
fontes.

- A** fontes. Quatuor quoque esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur. Sunt autē hi, os, nares, podex, vrinae meatus. Et vbi humor aliquis affligens copiosior factus fuerit, si his locis homo depurgetur, nullus ipsum morbus ab illo premit. Et si ventriculus plenus fuerit, liquefcente corpore ab humore, defluit ad ipsum, & extra prodit per aliquem horū locorū, & propterea humor paucior fit in corpore. Corpus enim velut & antea dixi, vētriculo retribuit, vbi vacuum fuerit, & fruitur de ipso, vbi plenus existit. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur pauciores fiant humores hominem affligētes. Quomodo verò & cur homo sanus degat, referā.
- B** Postquam comedit ac bibit, & humor ad corpus peruenit, eo quo dictum est modo, ammixtus alijs, tum ei qui in corpore, tum ei qui in fonte est, ea quidem die qua accesserit, in corpore manet. postridie verò alius humor ad ipsum accedit. Atq; hi quidem duo sunt dies, duo verò in corpore humores. Et alteri quidem humori duo dies sunt, alteri vnus. Et qui quidē postridie accessit, manet in corpore, vt qui sit crassius. Alter autē coctus à caliditate diffunditur, & tenuis fiens, postera die ad vētriculum accedit, & per omne tēpus à recenti expellitur. Vbi verò ad vētriculum peruenit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinē in corpore facit. Si verò permāserit, tēpore graeolens fit. Tertia verò die vnā cum stercore, & vrina exit, copia ipse sibi ipsi æqualis, & cōsimilis, & equilibris, etiam si sui ipsius pars quādam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relatā rationē. Inluit autē & tertia die humor de corpore ad vētriculum amplior & graeolentior, qui videlicet reliquus fuit à secundo, & defert cibos concoctos, & quicquid est in corpore morbosum, & rursus simul exit. Indicio est autem vrina quæ salsuginosa est, quod cibi defuerunt de corpore etiam id quod morbosum est. Et cibi quidē semper postridie per alium secedunt, humor autem ad tertiam diem. Hoc modo sanitas contingere solet. Atq; hæc dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degunt. At verò humor hic si particulatim foras prodiret postridie, cibi nō similiter ex ventriculo graeolentes facti foras prodirent, sed veluti cocti: & vrina potui similis, & corpus semper euacuaret, & per omne tempus homo, vbi ventri exonerasset ac minxisset, opus haberet statim potu ac cibo, pro egestionis factæ copia,

Quatuor locis corpus purgatur.

Sanitas quæ contingat.

Tertio quoque die quæ sumuntur procedunt.

Quid esset si statim oletaretur.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

copia, si modo validus esse deberet, quum humor sufficiens in corpore non relinquatur, sed vñ cum stercore foras prodeat postridie, aut eadem die. Et si quidem comedisset, bene esset. Sin minus, & euacuatus, debilis esset, neque humor crassius fieri posset, vt postridie foras prodiret. Nō enim sufficiens in corpore relinquitur. Nunc verò alium exonerantes probè valemus, & si per biduū nihil cibi acceperimus, & viuere, & facere quid possumus, & non penitus debilitamur ex euacuatione in hoc tempore. Humor enim in corpore manens, robur exhibet. Atque hæc à me dicta sunt, quomodo & cur fieri non possit, vt humor qui corpori accessit, foras egrediatur eadem die, imò neque postridie. Id porro assero, si humor pluribus quàm tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus implens accedat, venis calescentibus ac stantibus, maius malum, aut minus, homini significationem desuperbere: hyeme quidem minus, & posterius: æstate verò maius, ac prius. Atque hæc à me dicta sunt, de eo quod fieri solet, si humor in corpore maneat. At verò si corpus cibos eadem die egeret, non sufficienter humore uti posset, sed essent homines tenues ac debiles. Nunc verò quum maneant cibi ac potus, quandiu permanent, corpus fruitur sensim de

Duos dies sine cibo quis daret.

Triduo exeat cibaria oportet.

Si cibaria statim exirent quid eveniret.

Quid cibaria retenta diutius faciant.

febris

ventriculo trahēs, & impletur. Hæc dixi & quomodo, & cur cibi nō possint eadem die exire. Si verò cibi maneant in ventriculo, ampliore tempore quàm opportunum est, & alij ad ipsos incidant, corpus vtiq; repleatur, & dum premuntur à plenitudine venarū, calor ac dolor corpori accesserint, æstate quidē citius, hyeme verò posterius. Aestate enim calidus est aer ambiens, & calidiorem corpus in seipsum trahit. Et si calido adhuc existente ventriculo, calidior quàm opportunus est spiritus homini accedat, nihil miri est hominem ex tali febre hyeme verò cum frigidum spiritū trahat in seipsum, multò magis poterit corpus repletionem ferre, homine modo vètrēme exonerante. Et hæc à me dicta sunt de eo quod fieri solet, si cibi ampliore tempore in vètriculo maneant, & attigi quoque obiter vt declararim omnem humoris ac cibi, & longioris & brevioris temporis differēciam, cur homines ægrotent. Verum de hoc melius tractabo temporis progressu. Revertor rursus retrò de sanitate dicturus, quòd sanè corpus hominis humore de cibis ac potibus fruitur, & prodeit foras

A foras in sano, tum cibi, tum humor, iuxta relatam rationem.

Et si quidē foras prodeat plus humoris, quā de cibis ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autē foris plus quā

Macies unde.

accessit ob hanc causam. Si in quiete degat homo, & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verū pre alia sanitate quæ multa est, nō lædit valde. Malum verò illud huiusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus, aduenerit copiosius, non ita multò corpus calefcit sensim, vt non valde lætatur: & liquefcit in ventriculo, & cibum homini iniucundum facit. Si verò humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verū de hoc exactius paulò post tradam. Quandoq; etiam vbi cibus iucundus est, homo attenuatur. Causa verò eadem est. His autem

febris

sentibus, plus humoris extra prodit, quā succēturatur. Et propterea in quiete degēti cōtingit vt attenuetur. At verò laborantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc à labore calefcēte, tum humor in ipso diffunditur, tum attenuationis morbus oboritur. Quū autem inutilis fiat humor,

Quid exercitatio possit.

& ad ventriculum, & ad vesicā defluit, hæ autem foras expellunt. Pars verò ipsius extra exhalat, per internam corporis raritatem. Pars autem quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo & exercitationes iuuenum idem efficiunt quod labor. Si verò etiam non paucior fuerit humor eo qui prius exiuit, accedatque insuper alius à cibis ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem

C accedit, si nō aliud quid edere poterit, & si neq; laboret propriis laboris aut exercitationis ratione, alij alijs pauciores fiunt. Caterū bonus corporis habitus accedit ex esu, hæ de causā. Postquam resicatus est tempore humor, & in priore labore prius egressus est alius alio copiosior, & vnus alius alios valde superauit, homo repletus fit. Et si quidem à multis valde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si verò à paucis parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre ac reualescere potest, humiditate enim vberiore in ipso existente, calorem exoluit. Calefcit enim corpus à febre, & si quidē modicum fuerit id quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autem cōtinuē tenet: Si verò copiosius, quinta die: per quatuor verò tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies iudicātur. At si dimiserit febri in imparibus

febris

Morborum decreta.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Cur diebus
nō paribus
hac fiat.*

diebus, & sanus homo fit, & moritur. Qua de causa, paulò post dicam. Nunc autem referam cui febris dimittat. Sic autē sentio, Quæcunque febris de corpore hominem corripuerit, necesse est tertia die humorem affligentem exire de corpore, aut in alio copiam impari die, iuxta rationem antea relatum. Non enim exit prius quàm alius bonus de ventriculo ipsi accedat. Nam intermedia & postera die corpus trahit de ventriculo, quicquid ipsi in seipso dimiserit priore die, nisi ventriculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sanè malum homini esset. Si verò dimiserit febris tertia die, eodem modo dimittit quo etiam eadem die, velut dictū est. Atque ita quidem contingit, ut febris de corpore fiens, tertia die remittat. Dico autē, etiam si quinta die, aut septima, aut nona dimittat, eodem modo dimittere, quemadmodum & tertia exiit. Etenim alimentum febrī contingit, secundum locos quos paulò antea dixi. Vbi enim humor copiosior præualuerit, homo liberatur à febre. Dimittit autē febris in diebus imparibus ea de causa. Quòd videlicet in paribus diebus trahit corpus de ventriculo: in imparibus verò dimittit, Ventriculus autem extra propellit in homine sano, iuxta huiusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudicatur. Atque hac quidem ratione homo febricitans sanus euadit. Assero autem & quòd doleant maxime homines agroti in imparibus diebus, propter hoc & secundum rationē fieri. Conturbatur equidem homo quum febricitat. Cuius rei signum est, quòd horror aliàs atque aliàs per corpus transcurrit. Hoc verò non sanè ita cōtingeret, si nō cōturbaretur humor, & de ipso aut plus, aut minus fecerneretur, & alius aliū superaret. Conturbatur autem maxime in imparibus diebus quum agrotat. Sed & horror maxime tunc fit. Habet enim se res hoc modo, De humore affligēte expellitur aliquid ex corpore, à recentissimo humore superatum, & procedit ad alium infernam, & alius ipsa vna cum affligente calescit, su scipiēs in seipsam magis quàm priore tempore. Hoc autem maxime fit in morbi iudicatione. Et si paulatim corpus ad alium dimiserit, & non multum fuerit id quod hominē affligit, & alius, & corpus, calorem susterre in iudicatione potest, & homo san⁹ euadit, vbi humor affligēs egressus fuerit. & is qui febrī alimentū præbuit consumptus, & sanus præualuerit

*Salutis mor-
tis causa.*

Aluerit. Atque hac ratione propter relatas à me causas, homo agrotus sanus euasit. Nunc verò referam cur moriantur homines in imparibus diebus. Sic autem sentio. Si multū fuerit id quod affligit in corpore, magis quàm opportunum est, & acuatim robustum, turbatur ad ventriculū. & quum non possit calorem sustinere corpus, eo fruatur, & grauiolentiam circa spiritum fieri necesse est. & quum nequeat corpus præ debilitate, nimirum omni humore morbofo existente, spiritum trahere, quocirca quæ in ventriculo sunt refrigerentur, quicquid est humoris vitalis id foras exhalat, atq; ita homo moritur. Non enim sperat alius humor, sed totus à morbofo qui multus est eleuatus, ac cōsumptus à febre exhalauit ac

Berspirauit. Atque hoc modo in imparibus diebus maximè dolor affligit. Neq; est quisquam cui hoc non sit notū. At verò quòd humor turbetur in iisdē diebus, hoc signū est. Quicunque iam à febre continua correpti, pharmaco vsi sunt in diebus paribus, hi nimium purgati nunquàm sunt. Qui verò in diebus imparibus medicamento forti vsi sunt, nimium purgati sunt. Multi verò etiam perierunt nimium purgati. Proinde priores Medici in hoc maximè peccarūt. Medicamenta enim exhibuerunt in diebus imparibus, & homines peremerunt, non scientes quòd hæc res se ita habet. Humor enim in corpore agroti magis turbatur in imparibus diebus, nimirum corpore humore ad ventriculum transmittente. Et si quis iam turbatū, adhuc magis perturbet medicamento immisso, nihil miri est ex talibus hominē perire. Quin & vlcera si curentur, maximè in his diebus inflāmur. Venit enim humor ad omnes venas quum turbatur, easq; replet. Et vbi ad vlcus peruenit, si quidem non curetur, & pus exitum habeat, expellitur ab humore qui in turbatione accessit, & vlcus foras expurgatur. Si verò curetur, pus exitū non habens, & isthic vnā cum eo qui accessit permanens, dolorē inducit, & carnē circa vlcus attollit: & ex illo si quidem in cruribus habuerit vlcus, attolluntur venæ quæ in iuncturis crurum existunt. Si verò in manibus, quæ in manū iuncturi sunt, & ex hoc glandularū tumores fiunt. Quibuscunque verò hominibus febris incidit, si nihil aliud malè habeat homo, à pinguiore quàm oportet existente humore incidit, & venæ impletæ dolorem ac calorem vlceri inducunt. Hoc autem cale-

*Dispart.
bus diebus
omnia lan-
guentium
discernunt.*

*Hinc est
in pharmaco
forte, ex his
indico, par
et, sed quæ
hinc est in
38. de 201.*

*Cur febris
nulla de
causis fiat.*

HIPPOCRATIS LIB. IIII.

factum, etiam reliquum corpus calefacit. Atq; hoc modo caliditas ad vlcera peruenit. Calefcit enim corpus, & vlcera, ab humoris cōmotione. Et labor talia efficit. Liberātur autem vlcera ab inflammatione quinta die, & iuxta horum dierum rationem, prout etiā vlcera fuerint magna, & tertia, & quinta, & septima, & nona, & vndecima. Deinde absoluto primo circuitu, rursus fecundi principiū tertia sequens hinc est, quæ à prima, decima quarta est. Maxima verò vlcera decima quarta die ab inflammatione liberantur. Atque hæc ratio docet morbos in impribus diebus iudicari, & humorē in sano homine tertia die exire, stercus autem secunda. Et hæc tertia die cōtingentia mutuum inter se testimoniū præbent, quòd res se ita habeat. Atq; ita mihi hic sermo vniuersus ad summum perductus est. Nunc verò exactius referre volo, cur homines agrotent, simulq; cum hoc sermone dicam quæ sint principia morborum, & qualia vnumquodque ipsorum efficiat. Sic autē assero. Si cibi plures quàm opportunū est, qui iam concocti sunt, intus maneant, & homo non purgetur, & alij cibi superingerantur, corpus ab humore priore ac recenti repletum calefcit, & febris ex hoc homini oboritur. Verū febris hoc modo fiens, nō periculosa, neque fortis est, in qua humor aqualis est, copia paululū vberiore nos affligēs. Si enim hoc ita se habuerit, & quis admodum validus sit, & quæ commoda sunt, adhibuerit, sanus euadit. Vnus autē morbus solus est ex omni humore, & septem signa habet. Nā & tussis ipsum habet, quæ & debilis & sicca est: & venter durus fit, utpote & stercore intus contento: caput grauat: & vomit: & febrit: & vrina non probè prodit. Hæc septem signa huius morbi sunt ex omni humore fientis. Si verò alui egestione non prodeunte, vnus ex alijs humoribus superet, melius deget homo. Et si quis febre fiente ab omni humore, nō adhibeat idonea, inualefcet morbus quantum ipse humores superauerit, hoc modo. Calefcēte sanguine exhalat maximè per hunc humor aquosus, qui feбри est infestissimus. Relinquitur autem pinguis ac leuis, qui est biliosus, & feбри maximè nutritum est. Exhalat autem hoc modo, Velut si quis aquam & oleum in vas æneum infundat, & ligna multa subiecta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex vase enim exhalabit: oleum paululum immi-

Labor quid faciat.

Diffbaria omnia de crotoria.

Morborū causæ.

Signa septem mali amia.

Simile.

E

F

- A** nueretur. Nam aqua præ raritate ab igne attenuari potest, & leuis reddita exhalare. Oleum verò ut pote quod est coniunctum ac densum, attenuari non potest, neque similiter ut aqua exhalare. Sic sane & in homine se res habet. Aqua enim calefacte corpore foras exhalat: Biliosus autem humor, ut qui coniunctus est ac densus, non similiter attenuatus exhalare potest. Verum attenuatus hic biliosus humor, corpus magis calelere facit. Copiosius enim & melius alimentum febris supeditat, & prorumpens aut firmata in corpore, morbum supra priora corroborat. Atque hæc quidem dicta sunt de eo quod afficitur homo, si non purgetur & curetur. Si verò non ipsa copia prævaluerit, siue semel multa siens, siue paulatim colligatur, reliquum corpus dum hoc fit, præ robore sufferre potest, donec principium aliquod superaccedat. Atque hoc sane modo morbus fit, si homo à copiosiore fiente humore non expurgetur. Principia ex quibus sunt morbi, tria sunt. Et unum quidem iam à me relatū est, qualia & quod afficiat in corpore, demonstraui enim quomodo & cur ægrotet homo, si non purgetur. Alterum est, si contingat ut ea quæ ex cælo obueniunt, inepta & præter victus rationem sint. Tertium est, si violentum quid accidat. Violentum autem esse dico, & casum, & vulnus, & plagam, & laborem, & si quid aliud est huiusmodi. Horum verò principiorum maximum est Violentia si magna fuerit: si verò parua, non ita maximum. Secundum est si non purgetur homo. Tertium, si quæ ex cælo obtineant inepta fuerint ad sanitatem. Proinde diligenter ab his se custodire oportet. Singula verò talia in corpore faciunt, qualia ego dicturus sum. Equidem si vulnus fiat, manifestum est quod caro dissecta est, & vlcus factum est. hoc autem morbum esse dico. Si verò contusio fiat, homine percusso, aut lapso, aut aliud quid tale pressio, et tumor oboritur, sanguis statim præ violentia calefactus, et venis hiatis illapsus, non habet exitum præ copia, quò abire possit, conglobatur: et propterea tumor fit, et tamdiu adest, donec depurgatus fuerit, eo modo quo de locis depurgari dictum est, aut etiam per ipsum tumorem, et siue per chirurgiam, siue sine ea, sanguini transitus fiat, aut per tempus suppurato, aut non. Sed et labor tale quid efficit. Quum enim homines laborarint, quibus sane maxime sanguinis affectio contingerit, illic firmatur ac calefit, et ex hoc dolor

Tria morborum principia.

Tumoris causa.

Labor quæ faciat.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

oboritur. Si verò hæc quidem superarit homo, verum mul-
 ta copia labor accedat, & alius ac vesica non breui copiam
 expulerint, febris sunt ex hoc irruerit. Et si quidem prior
 humor æqualis fuerit, nequaquam. Si verò in labore ipsorum
 plurimus in corpore permaneat, superat ille. Atque hæc à me
 dicta sunt de violentia, qualia in corpore efficit. Et hæc qui-
 dem duosunt principia, Violentia, & plenitudo, quæ si non
 purgentur homines, corpora calefaciunt. At verò quod ex
 cælo obuenit principium, si ineptum fiat in homine, superat ali-
 quid humoris, & velut ad morbum calefacit & fruges facit prius
 si fieri contingat. Dicam autem prius de eo, quod calefa-
 cit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fuerit aliquid
 morbosum, quale in priori dixi, & ea quæ ex cælo obueniunt,
 incommoda fuerint, & caleseat homo, turbatur humor om-
 nis in corpore calefcens. Hoc autem violentia facit. Et
 si quidem depurgetur homo, humore illo turbato, secer-
 nitur quantum eius plus quam commodum est, redunda-
 rit. Et habet hæc res similitudinem ad id quod Scy-
 thæ faciunt ex equino lacte. Lac enim in caua vasa lignea
 infusum concutitur. Illud autem dum turbatur, spume-
 scit ac secerenitur, & pingue quidem, quod Butyrum vo-
 cant, quum deus sit, in superficie consistit: graue verò
 & crassum, deorsum sedit, quod etiam secretum siccant.
 Vbi verò concretum ac siccatum fuerit, Hippacen ipsum
 vocant. At serum lactis medium locum tenet. Sic etiam in
 homine, dum turbatur humor, quicquid eius est in cor-
 pore, à principiis quæ dixi, disparatur. Et in superficie
 quidem bilis consistit. Leuissima enim existit. Secundo
 loco sanguis. Tercio pituita. Grauiissimus autem horum
 humorum est aqua. His verò ita se habentibus, quisquis ex
 his in morbo plurimus fuerit, in principio fiente turba-
 tione, deuenit ad locum, ubi plurimus esse possit. Ve-
 rum in turbatione; spaciola capacitate fiente, secretus di-
 strahitur, & calefacit corpus. Aut aliqua corporis par-
 te firmatus, vna cum alio humore, cum quo est in alio
 loco, dolorem ac calorem exhibet. Qui verò calefactus
 est locus, insuper etiam reliquum corpus concalefacit, & ex
 hoc febris oboritur. Et oboritur magis à bile, & pituita, &
 sanguine, calidissimi enim hi humores existunt. Et si quis ho-
 rum in

*Calestis
 uis quid fa-
 ciat.*

*Scytharum
 butyrum.*

Hippace.

*Qui humo-
 res febrem
 creant.*

*op. side
 154*

Arum in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimum morbus illinc nominatur, & cognomen habet. Ceterum ab aqua non valde fortis febris oboritur, neque diuturna. Nam igni non bonum alimentum aqua præbet. Atque hæc quidem de hoc dicta sunt. At verò ante turbationem, non habet multus humor quò procedat, sed sursum ac deorsum voluitur & distrahitur alij humori permixtus. Omnia enim plena existunt. In turbatione verò euacuantur. Verum aliud alio magis euacuatur. Et multus humor suum locum occupat, & alienus alij non ammittet, si firmatus fuerit priusquam ille viribus adæquetur. Potest autem ipsi adæquare is qui ab ipso postea ad morbum superaccessit, donec purgatus fuerit locus qualicunque purgatione. Si verò multus fuerit affligens humor, fruitur, & consumitur ad morbum etiam alius qui prius salubris erat. Et tali modo homo moritur. fruitur autem, si morbus non amplius sufficiens alimentum habuerit, & consumitur ab humore qui in loco dolente existit. primum enim propinquum assumit, deinde longius depascitur, donec consumptum fuerit, & non amplius inest in corpore alimentum. Alimentum autem est homini humor levis. Quemadmodum igitur ut certum est, putrefactio primum paulatim fit, si maxime calescat: Postea ubi isthic alimentum putrefactioni non amplius sufficit, depascitur de sano, initio sumpto à proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnosum est, putrefecerit, postquam verò in totum depasta est, alimentum putredini consumitur: Sic sanè etiam in morbo. Sumpto enim à loco illo initio, ubi isthic alimentum sufficiens non amplius inest, depascitur ulterius, à proximo initio facto. Postquam enim per totum grassatus fuerit, alimentum morbo consumitur, & alius salubris humor non superat. Et si hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic salubris humor amplio-rem locum occupavit, & non firmatus fuerit, sed voluitur ac distrahitur, non amplius alij miscetur, sed ad morbum consumitur, si non depurgetur. Deinde venæ superim-pleantur. Valde autem impleat, nihil ex seipsis remittunt, priusquam spaciola capacitas ipsis contingat. Quemadmodum ubi quis vehementer percussus est, sanguis sub plagam subtercurrit, nimirum venis à plaga euacuatis. Postquam autè carnes veluti spongia fuerint repleat, non amplius remittunt.

*Hydrops
febrem leuē
& non longam facit.*

*Qui æquatur
superius
necesse.*

*Morbū
causā.*

Simile.

sed continent in seipſis, donec in loco aliquid ab ipſis eva-
 cuatum fuerit. Quum enim collectus fuerit ſanguis, præ co-
 pia viam intercipit. Quemadmodum ſi quis vas olearium co-
 riaceum anguſti oris oleo impletum, in oſculum vertat e di-
 recto, & ſi hoc fecerit, oleum ex ipſo prodire non poterit:
 viam enim ipſum oleum intercipit, utpote multum & acer-
 uatim incumbens. Si verò quis ipſam vas inclinet, libera e-
 rit via oſculi intercepta, qua effluet oleum ex ipſo. Idem fe-
 cerit etiam aqua in menſa. Ita ſanè etiam vbi multus humor
 in corpore præ turbatione locum occuparit, & venas imple-
 uerit, non amplius ab ipſis diſcedit, priuſquam vbi locus va-
 cuus eſt, alimento à morbo conſumpto. Atque hæc à me di-
 cta ſunt de hoc, ſi in corpore quid fuerit vnde morbi gignan-
 tur, redundantibus etiam alijs: & quomodo principia effi-
 ciant colorem & turbationem humorū deducant ad mor-
 bum. Nunc verò dicam quæ efficiant ea quæ ex cælo no-
 bis obueniunt, ſi ad ea quæ in corpore generata ſunt, inepta
 ſiant, & quum humorem in corpore ſuperarint. Aſſero au-
 tem partem humoris in homine, vbi liquatus fuerit, conglo-
 bari ac ipſari, donec morbum pepererit: partem verò di-
 latari, ac ſecerni. Habet autem & hæc affectio ſimilitudinem
 ad lac. Si quis enim ſuccū in lac immittat, frigiditas in ipſo
 oborta, lac inſpiſſat & conglobat. Ac circum inſpiſſatum, ſe-
 rum eſt. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo
 oborta, conglobatur & inſpiſſatur. Circum ipſum verò aquo-
 ſum humorem, adhuc etiam alius humor, quanto copioſior
 fuerit in alio corpore, ammixtus eſt. At ſi quidem ad aluum
 deuenerit, ſtercus conturbat, & tormen in aluo inducit, & fo-
 ras pertranſit, nullo magno damno illato. Si verò non ad
 aluum deuenerit, firmabit ſe aliqua corporis parte, vbi ipſi
 plurimæ capacitatis erit. Volutatur itaque exquirens ſibi ipſi
 loci capacitatem. Et quod quidem aquoſi humoris de con-
 globatione ſecretum eſt, utpote frigidiffimū ac grauiffimū
 in corpore exiſtens, ad infernas partes descendit, & circum
 oſſa ac neruos volutatum, adhuc magis corpus ad inflamma-
 tionem perducit, & clarum eſt quod circa neruos, & præſer-
 tim circa oſſa, aquoſus humor, qui humorem facit, exiſtit.
 Circa oſſeas enim corporis partes, hemo maxime riget, &
 capilli erecti ſtant, contorta cuticula, ac ticcior ſiente quàm
 priori

Hydrops.

*Humoris
cauſſa.*

A priori tempore: Nimirum aquoso humore isthic deficiente, & circa ossa obuoluto. Atque hinc sanè solus ille locus ubi primo tempore erat, humorem facere nō potest, vnde etiam rigor oboritur. At verò reliquus humor q̄ æqualissimè crassus est, partim quidem in toto corpore est, partim verò quantum abundauerit, si quidem aluus plena non fuerit, & quod affligit modicum sit: quandoque ad aluum deuenit, & nulum magnum damnum inducit. & aliquando quidem febrē non inducit, aliquando verò debilem & innoxiam. & quod affligit vna cum stercore exit. Si verò aluus plena multum quod affligit habeat, periculum est ex ipso morbum aliquē fieri, si alicubi se firmet id quod affligit, aut ad latus, aut ad viscus, aut alicubi aliam partem concalefaciat, quo primum illum humorem simul turbet. Qui verò non valde ex calore ab aquoso humore victi sunt, utpote qui circa ossa, & prope medullam cōsistit: hos progressu temporis magis lædet, primum quidem in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquū, & semper vterius depascitur, & aluus ipsum assumit, ut quæ calida sit, & postea tum aluus, tum lædens humor, adhuc magis calefacit. At humor crassus calefcens primum diffunditur, is qui propinquus affligenti existit. diffusus autem aquoso humori affligenti miscetur: deinde in concussione corporis inanior redditur. & tam diu rigor tenet, quandiu aquosus humor alij humori ammixtus est. Quin & febris hoc modo generata oboritur. Affligentia ad locum firmata, calefcens corpus febrem in se suscipere cogunt: & ab affligente, & ab aluo calefactum, reliquum aquosum humore superat. Atque sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copiosior humor formatus fuerit. Si verò voluatur ac distrahatur, tali modo febris oboritur. Post frigus febris volutatur, maxime affligens circa aluum & supernam, & infernam. Isthic enim plurima loci capacitas existit. Dum autem volutatur, primum propinqua calefcunt, & viscera, & quæ in aluo sunt. Postea etiam alius humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atque febris post rigorem hic fit, ubi affligens volutatur, Imò etiam ubi firmatum fuerit reliqua corporis parte. Et hæc à me dicta sunt quomodo, & quando, rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint principia morborum, & qua-

*Venter plenus
vel uan-
cus quid
faciat.*

febris

*Qui post
frigus fe-
bris fit.*

capitulum

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

lem vnumquodque ipsorum morbum in corpore inducat, D
 & quomodo & cur in diebus imparibus morbi iudicantur.
 Et vnde homines sani sint, & vnde aegrotent, & quomodo bi
 lis, & pituita, copiosior & paucior fiat, Itemq; alia multa quæ
 in ipsa natura humana sunt, demonstravi, quæ sanè hic ser
 mo exigebat. Atque hæc ita relata finem habent. Nunc
 autem de lumbricis latius dicam. Affero enim ipsos in puero
 dum adhuc in utero est nasci. Postquam enim semel ex ute
 ro egressus est, non tanto tempore sterco in alio manet, ut
 ex eius diuturnitate ac putrefactione, tantæ magnitudinis
 animal generari possit. Excrnit enim semper hesternum
 sterco per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale verò
 animal nasci non possit, etiamsi multis diebus homo ster
 cus non egeret. Multa enim nascuntur dum puer in utero
 est, hoc modo. Vbi ex lacte & sanguine computrescente ac
 redundante, utpote quod dulce est, pus factum fuerit ferui
 dum, animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotundi
 lumbrici isthic eodem modo. Signum verò quòd hæc res ita
 se habet, hoc est. Postquam in lucem edici sunt pueri mu
 lieres ipsi in cibo offerunt medicamenta, quo sterco ex in
 testino exeat, & non comburatur, & simul ut intestinum di
 latetur. Vbi verò cibum obulerunt, multi sanè pueri & ro
 tundos & latos lumbricos vnà cum primo stercore excer
 nunt. Si verò non excreuerint, fiunt etiam insuperque na
 scuntur in ventribus. Et rotundi quidem parui, lati verò
 non amplius, etiamsi quidam ipsos parere dicant. Nam
 homo qui latum lumbricum habet, velut cucumeris semen
 excernit aliàs atque aliàs, vnà cum stercore ipso, & sunt ho
 mines qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mihi verò non
 recte dicere videntur qui talia dicunt. Neque enim ab vno
 animali tot pulli generari possunt: neque ea est loci in in
 testino capacitas, ut partus educare queat. Augescente au
 tem puero, augetur etiam lumbricus in intestino, ab his
 quæ in ventriculo ingesta sunt, & equalis sit intestino, qui
 buldam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam par
 uo prius. Et postquam intestino adequatus est, similiter auge
 scit, & quanto maior factus fuerit, vnà cum stercore excerni
 tur de intestino recto, & excidit velut cucumeris semen, sæ
 pe verò etiam maior. Quibusdam verò iter facientibus, aut la
 boran

*Lumbrici qui
 excreantur.*

*Lumbrici
 gignunt.*

A borantibus, & ventriculo calefcente, deorsum descendit, ipsisque prominet ex podice inflatur, hocque facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa verò quòd non pariat, sed ita habeat velut ego dico, hæc sunt. Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit aut potionem, siquidem fuerit homo bene præparatus, totus rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus erudit. Si verò ad medicinam hereat, recta pars de lumbrico abruptitur, longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiam longè amplior, & ubi abruptus fuerit per multum tempus signa cum stercore non prodeunt. Postea verò augefcunt. Atque hæc argumenta sunt, quòd lumbricus latus non parit, sed abruptitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Signa habet hæc. Cacat aliàs atque aliàs velut cucumeris semen, & ubi ieiunus est homo, exilit ad hepar aliàs atque aliàs, & dolorem inducit: & quandoque sputa ori influunt ubi ad hepar assilit, quandoque non. Quibusdam etiam vocem intercipit, si fortiter ad hepar irruat, & valde multa sputa ex ore fluunt, paulo autem post sedantur, & tormen multum in ventriculo aliàs atque aliàs oboritur. Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquàdo firmatus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingit & hoc. Qui hoc animalculum habet, in toto quidem tempore valde debilis fieri non poterit. Vbi verò debilis factus fuerit, vix renalefcit. Latus enim lumbricus partis alicuius partiiceps fit, ex his quæ in ventriculum ingesta sunt. Si quidè igitur curatus fuerit iusto modo, sanus fieri poterit. Si verò non curetur, sua sponte non exit. Mortem tamen nō inducit, sed cōsenescit. Atque hæc à me dicta sunt de lumbrico lato, unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. Cæterum calculi morbo principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutrice impurum fit, si pituitosis cibis ac potibus, & alimentis impuris nutrix utatur. Conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si nutrix non sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa: Lac etiam malum puero generatur. Consentiunt enim corpus & ventriculus. Plurimum verò ipsi ad lac cedit, de eo quod ipsa plurimum in seipsa habuerit. Et puer si de nutrice

*Longus
lumbricus.*

*Lumbrici
signa.*

*Calculus
puerorum
unde fiat.*

lac non

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

lac non purum suxerit, sed biliosum velut dixi, morbosus fit **B**
ac debilis: & in praesens maxime affligitur, quandiu lac pra-
uum ac morbosum suxerit. At ubi suxerit lac non purum, sed
terreum & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo
ad vesicam tendentes amplas ac attrahentes: procedit autem

*Lapis in
vesica qui
fiat.*

& quod bibit nutrix, & lac in ventriculum pueri, tale quale
trahit à ventriculo de lacte, in totum similiter prout venae ad
ventriculum detrudere possunt: si quid sane in lacte non pu-
rum fuerit, id quod vesica fruitur lapis fit tali modo, velut in
aqua non pura, in calice aut vase aeneo turbata, & rursus se-
data, fex acervata fit in medio. Sic sane & in vesica de vrina
non pura existente. Et non per urinam eiicitur, ut quae in ca-
uo sit loco, & maxime acervata fiens, praeter dolore per mictionem
non pertransit, & à pituita cruda concrescit. Glutinum
enim fit pituita ad fecem ammixta. Et primum parua lanugo
superstat, deinde quod accedit arenosum fit, glutino fiente
pituita, quae est in vesica de lacte, & augetur, & quicquid hu-
moris in glutinatione accesserit, emingitur. Rursus autem fex

*Similiter
ferrum fit.*

solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodum ferrum
ex lapidibus ac terra dum comburuntur fit. Et in prima qui-
dem in ignem immisione, coagulati sunt lapides cum terra
ad ferri recrementum. At ubi iterum atque iterum in ignem immissa
fuerint, recrementum quidem foras decedit liquefcens ex ferro,
id quod ita fieri oculis videmus. Ferrum autem in igne
relinquitur, & recremento decedente subsidet, fitque solidum
ac densum. Sic profecto etiam fex in vesica, dum pituita glu-
tinum fit, emingitur id quod ab vrina liquefcit. Fex autem
subndet, & densatur, ac solida fit velut ferrum. Vbi vero sub

*Calculi di-
uersa causa
fiat.*

sedit ac solida facta est, sursum ac deorsum in vesica voluta-
tur, & feriens vesicam dolorem inducit, & si vehementer fe-
riat ac viceret, aliquid de ipsa auferit. Verum id quod insuper
affertur, adhuc magis quam id quod arenosum decessit, con-
cretionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in vesica:
& si puero anxietas aliqua ab hoc oboriat, alias atque
alias, ubi meiére vult, vrinae meatum apprehendit. At si pue-
ro iam adulto lapis signatur ex terrae usu, dolor non adest ipse
prius quam ipse subipsum cibum deligat. Et haec à me de hoc
relata sunt. Ceterum morbus signa quinque habet. Nam

*Quinq. cal-
culi signa.*

ubi meiére vult, dolore affligitur, & vrina paulatim fluit ve-
lut ia

A lut in vrinæ stillicidio, & est subcruenta, nimirū vesica à lapide exulcerata, & vesica inflammata est. Verū hoc signum inconspicuū est, iudicat tamen summa pars præputij. Quandoque mingit arenosa, verū à talibus, qualia ego dicam. Eijcit autem aliquando lapides duos, aut etiam plures paruos, generatos eodem modo, velut de vno dixi. Fiunt etiam tali modo. Quum lapis fuerit concretus, & profundē subse-
Qui duo,
et plures, vnde
caliditas

derit in vesicam in arena separata, ita vt ipsam aduenientem lapis non assumat in seipsum, sed grauior ac copiosior fiat, vt tamen ipsa ad seipsam non concreseat, etiam sic duo lapides fiunt. Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisus inter se in agitatione aliquid disparatur, & arenosum per vrinam
B eijcitur. Quod etiam aliquando contingit, vbi arena ad vesicam descendit, & non coaluit. Quidam dicunt quod potus in pulmonem deuenit, ex hoc verò in reliquum corpus. Hi autem qui hæc dicunt, redarguuntur ex hoc quod dicturus sum, quod videlicet pulmo cauus est, & in ipso fistula est. Quod si pulmo cauus non esset, & fistula non ipsi adhereret, animalia vocem non ederent. Vocem enim edimus de pulmone, quia cauus est, & fistula ipsi adest. Vocem autem articulant labia & lingua, Verū de hoc exactius in peripneumonix tractatione egi. Cæterum hominibus quibus potus in pulmonem ferri videtur, aduersabor, habetque res se hoc modo. Procedit potus in ventrem, à ventre autē in reliquum corpus expenditur. Oportet autē his quæ dicturus sum mentem adhibere. Sermonis argumenta, quod potus non procedit in pulmonem, sed in ventrem, hæc sunt. Si enim potus procederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret, neque loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret. Et hoc quidem vnum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procederet, cibi in nobis sicci existentes nō similiter concoquerentur. Atque hæc duo argumenta existunt. Sed & medicamenta alium subducentia, si in potu sumantur, extra ventrem procederent. Habet autē hæc res hoc modo. Quæcun-
Potus pulmonem non percut.

C que medicamenta purgatoria sunt aut supernæ, aut infernæ, aut etiam vtrunque præstant, ea hæc faciunt. Omnia valde vrunt, & fortia quidem ex ipsis, si partem aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora verò turbulenta
Medicamentum quid a.
gan.

lentum

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*pulmo gualis id
em. gualis id
libum ut
ad. gualis.
no. uisceribus*

*Cur lotium
oleat o/cu-
lenta.*

laesio unde

*Lactis etiā
exēplo hos
refellit.*

*Quid pul-
monis fistula
lam e gat
cūm quid
edimus.*

lentum corporis motum faciunt, quacunq; tandem partem D
occuparint. Si verò aliquod ex his medicamentis in pulmo-
nem perueniret, videtur mihi magnū aliquod malum indu-
cturum esse, Pituita enim de capite descendens, eum in val-
de breui tempore exulcerat. Tēnera enim & rara res est pul-
mo. & si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob
multas sanē causas. At verò venter à medicamento non ex-
ulceratur. Nam res est valida ac robusta, nimirum velut pel-
lis & corium. Et pleriq; sanē ex Libya incolis pecorū pelli-
bus pro vestibus vtuntur, ventribus autem pro vtriculis. Ro-
busta enim res venter existit. Deinde vbi à vino nigro homi-
nes repleti fuerint, nigra recerementa excernunt. Atq; hac om-
nia argumēta existit. Et vbi allia comederimus, aut aliud E
quoddam edulium olidum, vrinā reddimus comesta odore
referentem. Et hac quidem omnia argumenta sunt. Sed &
hoc considerandum venit quòd dicturus sum. Si quis cyceo-
nem biberit, aut farinam coctā sorbuerit, aut aliud quid
eiusmodi, & hoc ipsum in pulmonem peruenierit, certe ar-
bitramur ipsum ne minimum quidem tempus viuere posse.
Vbi enim modicum quiddā pituita in pulmonem perue-
nerit, aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac
conuulsio. Si verò vtrique & vixerit homo qui cyceonē bibe-
rit, aut farinam coctā sorbuerit, vbi sanē concocta fuerit
forbitio, videtur mihi multa & fortis caliditas corpori obo-
ritura esse, multusq; dolor, vt omnino moriatur homo hoc
modo, si illa in pulmonem perueniant. Atque hac iam argu-
menta septem sunt. Praterēā quomodo lac infantes pueros F
nutrire posset, si ad pulmonem descenderet. Atque hoc mihi
aliud adhuc argumentū est. Et hac ne produxissem quidem
ad sermonis mei confirmationem, nisi multi aded homines
essent, quibus potus in pulmonem procedere videtur, & ne-
cesse est ad opiniones fortiter inhaerentes multa argumenta
adducere, si quis velit auditorem à priore sententia abduce-
re ac conuertere vt suis verbis fidem habeat. Et propter hoc
etiam potus in pulmonem non procedit, sed in ventrē: quia
contigua & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in
hanc procedit. Et simul pulmonis fistula velut hederæ foliū
incumbit, quare neq; descendere permitteret in trāsglutien-
do, si in ipsum procederet. Atq; hac mihi de hoc relata sunt.
Procedit

A Proccedit nanque potus in ventriculum, & vbi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas, & ad omentum; & in decliue deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. Et postquam morbus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de ventriculo, & semper ad splenem venit de potu, vbi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, vt neq; febricitet aliàs ex ventre, quàm vbi homo sitiit, vesica autem & ventriculus non iusto modo excolent, neq; conueniente diætâ homo vtatur. At splen subzgotans à ventre de potu trahit.

Morbus autem oboritur, & scrotum pellucidum fit, & clauiculae, & collum, & pectora attenuantur. Colliquatur enim ab hoc morbo, & humor ad ventriculum defluit, & infernae partes aqua plenae sunt, & venter cibum auersatur, & quandoq; valde adstringitur, quandoque defluit. Nec vesica iusto modo excolat, & plerumque horror aliàs atque aliàs per corpus discurret, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibiae rumpuntur, vbi morbus diurnus factus fuerit, & aqua illinc effluit.

B Incidunt & vigiliae & impotentia corporis, ac maximè lumborum. Et postquàm edit aut bibit, etiam paulò amplius splen affligitur, & spiritum frequentem semper emittit. Atq; hæc signa hydropsis sunt. Est autem & circa ventriculum solum, siue febris corripuerit, siue non. Et venter magnus fit. Et crura implentur aqua. Verùm supernae corporis partes attenuantur his qui ita affecti putantur. At signa omnia debiliora sunt & simul in cruribus aqua non discedit, & dolor tanto minor existit. Cæterum circa ventriculum solum hydrops & aqua hac de causa fit. Etenim vbi aceruatim aqua accessit, & via in principijs non pateat ad infernas partes, sed aceruatim in venis concludatur, nimirum vt quæ respirationem non habeat, neq; forsum, neque deorsum innoti potest, haud aliter quàm si quis magnum vas angustî osculi occludat, ac subito inuertat, deinde sensim operculum de osculo detrahatur. Et si enim hoc feceris, aqua non effluet foras, neq; enim respiratio nem habet, sed à spiritu qui intus est, conclusa est. Nā spiritus qui intus est replet vas, & externo spiritui renititur, & excursus aquae non datur præ spiritu vas implere, & simul aëre inclumbente. Si verò quis sensum vas inclinarit, aut fundum perforarit, spiritus de vase exibat. Egresso autem spiritu, procedit

*Quæ graci
lescant tabe
scantq; in
hoc morbo.*

*Subtercuta
nei morbi si
gna.*

*Curr solus
venter curu
geat.*

Simile.

HIPPOCRATIS LIBER

*Mulieres
etiam hoc
patiuntur.*

Hydropsis

cedit etiam aqua foras. Sic sane in hydrope, si quidem perspi-
ratio sursum aut deorsum cōtingat, in principio morbi, trā-
sit ad crura hydrops, & ad pedes. Sin minus, isthic solū vo-
lutatur circa ventriculū, Atque ita quidem de his à me di-
ctum est. Fit autem & mulieribus hydrops in vtero ipso,
& signa sanē in ventriculo, & in cruribus, & reliqua signa ea-
dem habet. Et de hoc ipso à me dictum est in morbis mulie-
ribus. Atque h̄c tres sunt species morborum ab hydrope.
Fiunt autem hi morbi omnes citò difficiles, & omnes citò
augentur. Adhuc autem difficiliōres fiunt, si ex alio morbo
corpus liquefactum, ad hunc deuenerit. Si quidem igitur su-
bito occupauerit morbus hominē, moritur, nempe alio mor-
bo diutissimē iam affligente. At vbi etiam alius valde flui-
da fuerit, citissimē moritur, & tentiens, & loquens. Atq; h̄c
à me relata sunt de hydrope, & vnde oriatur, & quod h̄c
sunt ipsius signa.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE AFFECTIONI-

BVS, IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

interprete.

Hunc Galenus Polybi esse dicit.



Itum prudentem ratione apud se intra,
quod maximi pretij res est hominibus
sanitas, nosse cōuenit quomodo ex sua
ipsius intelligentia, in morbis utilita-
tem capiat. Nosse autem conuenit ea
quæ à medicis & dicuntur, & adhiben-
tur corpori suo, eaquæ diiudicare posse.
Atque h̄c singula hactenus nosse satis
est, quatenus idiotæ contingere potest. H̄c verò nouerit
quis

A quis maximè, si harum rerum cognitione ac studio teneatur. Morbi omnes hominibus à bile ac pituita fiunt.

Morborum origo.

Bilis autem & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium aut resiccantur, aut humectantur, aut incalescunt, aut frigesunt. patiuntur autem hæc pituita & bilis, & à cibis, & à potibus, & à laboribus, & à vulneribus, & olfactu, & auditu, & visu, & coitu, & calido, & frigido. patiuntur autem quum singula ex relatis, aut non in debito tempore corpori exhibentur, aut non consueta, aut plura & fortiora, aut pauciora & debiliora. Vniuersi igitur morbi hominibus ex his fiunt. Oportet autem ad hæc idiotam nosse, quæ par est nosse idiotam. Quæ verò artifices nosse par est, ea etiam adhibere ac tractare. De his autem quæ dicuntur & fiunt, fieri potest vt idiotæ ex intelligentia quadam coniecturam faciat. Iam verò vnde singula hæc nosse oportet, ego referam. Sin in caput dolores inciderint, huius caput calefacere conducit: ita vt multa calida lauemus, & sternutatione facta pituitam ac mucos subducamus. Et si quidem ex his à dolore liberetur, sufficiunt hæc. Si verò non liberetur, purgandum est caput à pituita. Victus autem sit forbittio, & potus aqua. Vinum autem non exhibeatur, donec dolor sedetur. Quum enim calidum existens caput, vinū attraxerit, dolor fortior euadit. Dolores incidunt à pituita, cum in capite mota cumulata fuerit. Si verò aliàs atque aliàs dolor & vertigo in caput inciderit, prosunt quidem & hæc adhibita, prodest autem etiam, si sanguis à naribus fuerit detractus, aut à vena in fronte. Si verò diuturnus & fortis in capite fiat morbus, & purgato capite non decedat, huius caput aut scarificare oportet, aut venas in circuitu inurere. Ex his enim solum sanum fore spes est. Aegrotos considerare oportet statim in constitutionis morborum principio, quare opus habeant: & quales sint vt pharmaco purgentur, aut vt aliud quid, quodcunque tandem volueris, exhibeas. Si verò omisso principio, ad finem iam vergente morbo exhibueris, in desperato iam corpore, forte quiddam præbere veritus, periculū est ne magis delinquas, quàm successum consequaris. Si in aures inciderit dolor, conducit multa calida lauare, & auribus fomentum adhibere. Et si quidē ad hæc accesserit pituita de capite attenuata, & dolor cessauit

Capitis dolor.

Aurium dolor.

HIPPOCRATIS LIBER

rit, sufficit hęc. Sin minus, optimum omnium phar-
ma-^{cu}m fuerit, quod in poru exhibitum, sursum pituitam purgat. Aut
purgandum est caput medicamento, quo capitis pituita pur-
gatur. Fit autem & hic dolor, quum intrinsecus ad aures pi-
tuita ex capite allapsa fuerit. Si verò fauces inflammatae fue-
rint gargarismis uti oportet. Fit autem & hoc à pituita. Si
verò gingivæ, aut aliquid sub lingua inflammatū fuerit, his
quæ commanduntur utendum est. A pituita autem & hęc
fiūt. Si verò vna dependerit & suffocarit (Quidam hoc gur-
gurgulionem vocant) statim gargarismis utendum est, præ-
paratis velut scriptum est in medicamentis. Si verò ex his
gracilis non fiat, retrò naso capiti cucurbitæ duæ adhibean-
tur, & sanguinis plurimum detrahatur, & pituita fluxus re-
trò reuellatur. Si verò neq; ex his detumescat, scapello inci-
dito, & aquam educito. Sectio autem facienda est, vbi sum-
mum subrubicundum factum fuerit, Nam si tale factum se-
ctum non fuerit, inflammatur, & aliquando derepente stran-
gulat. Fit autem & hoc à pituita, vbi ex calefacto capite acer-
uatim defluerit. Cæterum quod ad dentium dolores at-
tinet, si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur. Si verò
non corrosus est, neque mouetur, dolorem autem exhibet,
per vñionem resiccatur. Profunt etiam quæ commenducan-
tur. Dolores autem fiunt, quum pituita sub radices dentium
subierit. Exeduntur autem & corrunduntur, partim à pitui-
ta, partim à cibis, si natura debiles fuerint, & cavitatem ha-
buerint, & malè in gingivis fixi fuerint. Si in nare Poly-
pus nascatur: quæ res ex naso in obliquum per respirationē
diffluatur, ac intumescit: eximitur laqueo ex naso ad os di-
stractus. Aliqui etiam phar-^{ma}cis erodunt. Nascitur autem à
pituita. Atque hi quidem sunt morbi qui à capite oriuntur,
exceptis oculorum morbis, de quibus priuatim agemus. At
verò de morbis circa ventrem, hęc considerare oportet.

*Fauciū in-
flammatiō.*

Vna tumor

*Dentium
dolor.*

Polypus.

Pleuritis.

*Peripneu-
monia.*

na vōes.

Phrenitis.

Pleuritis, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, hi mor-
bi acuti vocantur, & fiunt maximè quidem ac fortissimè
hyeme: sunt etiam estate, verum minus, & molliores. Quod
si fortè in tales incideris, hęc sanè faciens ac consulens, ma-
ximè successum senseris. Pleuritis. In pleuritide febris
detinet, & lateris dolor, & erecta ceruice spiratio, & tussis, &
sputum ab initio quidem subbiliosum spuit. Postquam autē
quinta

A quinta aut sexta dies aduenerit, etiam subputulentum. Huic ad lateris quidem dolorem dandum est, quod pituitam & bilē à latere deducat. Sic enim dolor lenissimus fuerit. Alius autem curanda est per clysterem subducentē ac frigefacientem. Hoc enim uniuerso morbo cōmodissimum erit. Exhibendus est etiā potus, & sorbitio. Et potiones dandæ sunt acidiore, quo sputum de latere repurgetur. Quum autem pus purgari inceperit, latus calefacere cōducit, & forinsecus maturare ea quæ circa latus sunt, prius autem hoc facere nō expedit. Resiccatur enim. Fit autē hic morbus maximē ex potu, quū quis humecto corpore, aut ebrius, aut sobrius, friguerit. Fit etiā aliter. Iudicatur autē morbus breuissimus septima die, longissimus decimaquarta. Et siquidem in hac, per sputum reiectū ac purgatū fuerit pus à latere, sanus fit. Si verò per sputum nō fuerit pus reiectum, pectore suppuratus efficitur, & morbus longus erit. Porro iudicari in morbis est, quum morbi auferunt, aut marcescunt, aut in aliū morbum transeunt, aut desinunt. Peripneumonia. In peripneumonia febris detinet, & tussis, & excreat primum quidē pituitā crassiā ac purā, Sexta verò & septima, subbiliosā & subliuidā. Octaua autem & nona suppurulentam. Huic si quidem dolor adest, aut dorsi, aut laterū, dandū est medicamentum, quod in pleuritide ad lateris dolorē, in medicamentario libro scriptū est. Per potus autem, & sorbitiones, & ventris subductionem ac frigefactionem, eadem curatio adhibetur quæ in pleuritide. Quo verò sputū & pus ex pulmone repurgetur, dandā sunt pharmaca in potu, quibus pulmo humectatur, & pus sursum purgatur. Fit autē hic morbus, quum pituita acernatim ex capite ad pulmonem fluxerit. Aliquando etiam ex pleuritide in peripneumoniā & febrem ardentem transitus fit. Iudicatur autē breuissimus quidem in diebus quatuordecim, longissimus verò in duobus de viginti. Pauci verò hunc morbū effugiunt. Fiunt etiā pectore suppurati ex hoc morbo, si non in indicatorij diebus pulmo fuerit purgatus. Phrenitis ubi apprehenderit, febris primum dibilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autem dextera, ad hepatis. Quum autem quarta aut quinta aduenerit, & febris fortior sit, & dolores auferunt, & color subbiliosus efficitur, & mens percellitur. Huic ad dolorem quidem dan-

*Morbi lateris cura-
tio.*

Causa morbi huius.

Iudicatio.

*Morborum decretorum quid.
Peripneumonia.*

Medela.

Morbushic unde fit.

Peripneumoniae decursum.

Phrenitis.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

da sunt quæ in pleuritide, & tepor faciendus ubi dolor hæret. D
Sed & alius curanda, ac reliqua similiter facienda sunt, excepto potu. Potu verò utendum est quocunque alio volueris, præter vinum. Aut acetum & mel ac aquam dato. Vinum autem non conuenit mente motis, neque in hoc morbo, neque in quibuscunque alijs. Conducit autem in hoc morbo etiam caput multa calida lauare. Mollito enim corpore, sudor quoque magis sequitur, & aluus & vrina secedit. Et æger ipse seipso temperatior euadit. Fit hic morbus à bile, quum mota visceribus ac septo transuerso infederit. Iudicatur autem morbus, breuissimus septima die: longissimus vndecima. Effugiunt & hunc pauci, transiitque etiam ipse in peripneumoniam, & si transierit, pauci effugiunt. Febris ardens siue causos, quum habuerit, febris detinet, & sitis fortis, & lingua aspera ac nigra sit, à spiritus sanè caliditate. Et color subbiliosus sit, & spuma biliosa. Et æger extrinsecus quidè frigidus sit, intrinsecus verò valde calidus. Huic conducit frigefaciètia adhibere, & ad aluum, & forinsecus ad corpus, cauendo ne inhorrescat, potiones quoque ac sorbitiones dandæ sunt frequentes, & paulatim quàm frigidissimæ. Venter autem curetur, & si quidem non subeant quæ insunt, infusa frigidissima per clysterem immittatur, aut quotidie, aut alternis. Hic autem morbus sit à bile, quum mota intra corpus firmata fuerit. Solet etiam in peripneumoniam transire. Iudicatur autem breuissimus quidem nona aut decima die. Longissimus autem decimaquarta. Et si quidem transierit in peripneumoniam, pauci effugiunt. Si verò nõ transierit, multi effugiunt. Atque hi quidem morbi acuti vocantur, & oportet hos sic curare. Quæcunque verò aliæ febres hyeme fiunt, siue ex vino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua alia re, eas obseruare oportet. Transiunt enim aliquando in morbos acutos. Transitio verò ipsarum talis est. Quum commotis duobus humoribus, pituita & bile, non conducentia corpori exhibentur, ipsi inter seipsos coacti, pituita videlicet ac bilis, corpori ubicunque tandem contigerit allabuntur. Et sit pleuritis, aut phrenitis, aut peripneumonia. Obseruare igitur ac vitare oportet febres in hyeme. Sit autem obseruatio, & tutela ab ipsis, quies, & gracilitas, & ventris euacuatio. In sorbitionibus autem & potionibus legendum est, donec febris imminuta fuerit.

Causos.

Dieta.

*Hyberna
febres cur
obseruandæ.*

*Quæ obser
uauo.*

Ex

- A** Ex morbis ferme maximè acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima curatione. Et à curante nullum malum accedere oportet, sufficiunt enim quæ ab ipsis morbis adsunt. Verùm vt boni quid præstet, pro viribus conetur. Et si quidem rectè curante medico, à magnitudine morbi superetur æger, non hæc culpa medici est. Si verò non rectè curante, neque cognoscente, à morbo superetur, medici culpa est. Aestate porò hæc fiunt febris detinet fortis, & sitis. & vomunt aliqui bilem, aliquibus verò etiam infernè secedit. His in potu dandum est, & ad sorbendum, quodeunque tandem tibi idoneum esse visum fuerit. Si verò bilis aut pituita ad cor confederit, aqua frigida, aut aqua mulsà pota, vomant. Si verò venter non secesserit, clysteri vtendum est, aut subditiua glande. Morbus autem fit à bile. Liberantur autem maximè septima die, aut nona. Si verò febre detinente non purgentur, neque deorsum, neque sursum, dolor autem affuerit per totum corpus, tertia aut quarta die, pharmaco leui aut porione, deorsum purgato. facito autem sorbitionem ex milio, aut farina: & iisdem porionibus curato. Patiuntur autem & hæc à bile. Si verò externæ partes non valde feruidæ fuerint, verùm internæ, & lingua aspera ac nigra sit, huic pharmacum ne dederis, curato autem frigefacientia adhibendo, & ad aluum, & ad reliquum corpus. Vocatur autem hæc febris æstuosa. Iudicatur maximè vñdecima die, & decima-quarta. Si verò febrilis calor apprehenderit ac dimiserit, grauitas autem corporis ipsum detinuerit: hunc donec qui-
r tenuerit, sorbitionibus ac porionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato. purgato autem quam celerrimè pharmaco, siue sursum siue deorsum opus habere tibi visum fuerit. Si verò febris quidem nō tenuerit, os verò amarum habuerit, & corpus grauetur, & cibum auer setur, pharmacum dandum est. Paritur autè hæc à bile, quum in venas ac articulos incubuerit & firmata fuerit. Quicunque verò alij dolores in æstate circa ventrem fiunt, si quidem ad præcordia & cor tenderint, aquam mulsam aquosam facito, & aceti tribus heminis affusis, tepidam bibendam dato. & vbi modico tempore ipsam retinuerit, & igne ac vestibus concalesfactus fuerit, vomat. Si verò à vomitu rursus ac-

Morborum
acutorum
natura.

Per æstatē
quæ uexet.
Medela.

pharmacum
quod est huic
febris in æstatē
interiorum. i. n. s. u.
279. 99

Causæ
febris.
Curatio.

Dolores
æstatis.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

cesserint ac suffocauerint, rursus vomitum faciat. Aut ipsum
 multa calida lotum, per clysterem subluet, & tepescitiora ad-
 hibe, si affuerit dolor. Patiuntur autē hæc maxime à pituita,
 quum cōmota ad cor collapsa fuerit. Danda sunt etiā his qui
 talibus doloribus vexantur, pharmaca quæ descripta sunt ad
 eiusmodi morbum, in medicamētato libro. Si verò transie-
 rit dolor aliās ad alium vētris locum, & febre caruerit, mul-
 ta calida lauetur, & doloris gratia bibenda dentur, quæ in
 pleuritide sunt descripta, aut alia prout tibi visum fuerit. Si
 verò à dolore non liberetur, per pharmacum deorsum sub-
 purgetur. A cibis autem abstineat, quousque dolor affuerit.
 Tales autem dolores, qui sic errant, à bile fiunt. Quicunque
 verò dolores infrā vmbilicum fiunt, in his molli infuso per
 clysterem immisso subluito. Si verò non sedentur, pharmacū
 deorsum purgans dato. Quicunque verò dolores de repente
 in corpore fiunt citra febre, in his lauare multa calida con-
 ducit, & tepescere. Nam pituita & bilis compacta quidem,
 fortia sunt, & prævalent in quacunque corporis parte consti-
 terint, & laborem ac dolorem fortem exhibent. Diffusa ve-
 rò debiliora sunt, quacunque corporis parte manifesta fue-
 rint. At verò morbi qui in æstate fiunt, sic fieri solent. Quum
 corpūs à sole fuerit calefactum, humectatur, humectatum au-
 tem agrotat, aut totum, aut ea parte in quam pituita & bilis
 incubuerint. Si quidem igitur quis ipsos incipientes curet,
 neque longi fiunt, neque periculosi. Si verò non curet, aut ma-
 le curet, & longiores fiunt, & sæpe quoque occidunt. Sed &
 tertiana & quartana febres, ex talibus fieri solent. Hæc mor-
 borum constitutio maxime quidem æstate fit, aliquibus ve-
 rò etiam hyeme. Tertiā febris quū apprehenderit, si qui-
 dem videbitur tibi non purgatus esse, quarta die pharmaca-
 cum dato. Si verò pharmaco non videbitur opus habere, me-
 dicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transmute-
 tur, aut deficiat. Exhibeto autem velut scriptum est in medi-
 camentis. Et in apprehensione quidem, sorbitione & potu
 nutrito. Interposito verò tempore, cibis per alium seceden-
 tibus. Apprehendit autem plerumque non ita sæpe. Si verò
 non curetur, in quartanam transire solet, & diuturna fieri.
 Si verò quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fue-
 rit, primum caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor
 diebus,

Cussia bo-
 rum malorum
 astitis.

Tertiana.

Quartana

A diebus, pharmacum sursum versus purgās dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursus aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione. Si verò ex his nō sederit, rursus interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca quę scripta sunt dato. potibus autem & sorditionibus, & reliqua dicta vtendū est velut in tertiana. Apprehendit autē hęc febres plurimos multo tēpore, alios verò paucos. Et sic tum tertiana, tum quartana, a bile & pituita. Cur autem tertiana & quartana, alibi à me scriptum est. Vim porò habent medicamenta in his febribus, vt potis his corpus in loco sit, in consuetā caliditate ac frigiditate. & neq; præter naturā calefiat neq; frigefiat. Dāda sunt autē velut scriptū est in medicāmē-

B tario libro. Pituita alba quum tenuerit, corpus totū intumescit albo tumore. & in eadem die alia parte melius sibi videtur habere, alia deterius. Et tumor aliās in alia corporis parte maior & minor sit. Hunc pharmaca danda sunt deorsum purgantia, à quibus aqua, aut pituita purgatur. Victus autem ratio constituenda est, in cibis & potibus, ac laboribus, à quibus siccissimus ac gracilissimus euadat. Morbus autē hic fit à pituita, quum quis ex febribus diuturnis pituitosus existens, impurgatus manserit, & pituita ad carnes ipsius cōuersa fuerit. Et nihil quidē albidior est hęc pituita quā malia. Verūm corporis color albidior apparet. Sanguis enim à pituita copiosior fit, & non inest similiter in ipso bonus color. Quapropter albidiores apparent. & vocatur hic morbus pituita alba. Si quidem igitur curatus fuerit incoante morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropem transit morbus, & hominem corrumpit. Quicumque splenem habent magnum, qui quidem fuerint biliosi, hi mali coloris fiunt, & malis vlcertibus sciant, & ex ore graue olent, & tenues euadunt. Et splen durus est, & semper consimili magnitudine, & cibi non tēcedunt. Qui verò pituitosi sunt, hęc & minus patiuntur, & splen aliās maior, aliās minor efficitur. His cōducit si quidem impurgati fuerint, & caput & reliquum corpus purgato. Si verò purgatione non egeant, victus ratio cōstituenda est, ita vt pituitosis corpus resicemus ac attenuemus, cibis & potibus, & vomitibus, & exercitijs plurimis, & deambulationibus. Et in vere sursum per veratrum purgentur. Biliosis autem cōducit, vt per victum humectantem, aluum & vesicā subducat.

Pituita alba.

Medela

Morbi huius causa.

Phlegma album.

Lienosis quales sunt.

Medela.

mus, & vt de vena splenitide frequenter sanguinem mittant **D**
 & medicamentis vrinā cientibus vtantur, quæ splenem mol
 lire scripta sunt, & vt pro anni tempore bilem purgent. Qui
 dam verò splenici à pharmacorum potu nihil vtilitatis sen
 tiunt, neq; à reliqua curatione quicquam gracilior splen ip
 forum euadit, sed quæ adhibentur à magnitudine morbi su
 perantur. progressu verò tēporis, aliquibus in hydropē mor
 bus degenerat, & corrumpuntur. Aliquibus autē splen suppu
 ratur, & vlti sani fiunt. Cum quibusdam verò consenescit du
 rus & magnus existens. Morbus autem fit, quum ex feбри
 bus & mala curatione, bilis aut pituita, aut ambo in splenē
 incubuerint. Et diuturna quidem est affectio, non autem le
 thalis. Ex pharmacis quæ splenis gratia exhibentur, alia per
 vesicam purgant, & ipsum molliorem faciunt. Alia verò pur
 gant quidem, verum neq; per vesicam quicquam, quod ma
 nifestius fiat, neque vsquam alia parte. Splenem tamen mol
 liunt. **E**
 Voluulus quum apprehenderit, venter durus fit, &
 nihil secernit, & dolor infernē omnem aluum tenet, & fe
 bris, & sitis. Aliquando verò præ dolore æger etiam bilē vo
 mit. Hunc humectare oportet, & intrinsecus, & extrinsecus.
 Et multa calida lauare. Et bibenda dare quæ aluū mouent,
 & vrinam subducunt. Et clysterē adhibere, si admittat. Si ve
 rò nō admiserit clysterem, fistulam ad vtriculi extremitatē
 alligato, & insufflando multum flatum immittito. Et vbi in
 testinum & vter eleuata fuerint à flatu, exempta fistula, sta
 tim infusum per clysterē immittito. Et si susceperit, secessum **F**
 emittet, & sanus euadet. Si verò non sic susceperit infusum,
 moritur maximē septima die. Talis autem morbus fit quū
 stercore aceruatim combusto in intestino, pituita circa hoc
 colligitur. Et intestinū intumescit, vtpote his aceruatim in
 duratis, & neq; pharmaca quæ supernē bibuntur suscipit, sed
 reuomit. Neque infusa infernē adhibita admittit. Est autem
 morbus acutus & periculosus. Aqua inter cutem fit plerun
 que quum quis ex lōgo morbo impurgatus multo tempore
 manet. Corruptuntur enim carnes, & liquantur, & fit aqua.
 Fit etiam hydrops à splene, quum ægrotauerit: & ab hepate,
 & à pituita alba, & à dysenteria ac henteria. Et si quidem ex
 purgatione non facta fiat hydrops, venter aqua impletur. pe
 des autē & suræ attolluntur. humeri verò & clauiculæ, & pe
 ctora

Hydrops.

Voluulus.

Medela.

*Morbi bu
ius caussa.*

*Aqua in
ter cutem.*

- A** Stora & femora liquefiūt. Hūc si à principio acceperis, priusquam aqua supere crescat, pharmaca bibenda dato à quibus aqua aut pituita purgatur. Bilem verò ne moueto. Cibus autem & potus & labores ac deambulationes constituito, à quibus gracilis ac siccus euadat, & carnes quā robustissimæ fiāt. Morbus autem est lethalis, cum aliās, tum si venter aqua repletus fuerit. Quum verò à splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dysenteria in hydropem transitus sit, conducit quidem per eadem curare, effugiunt autem non valde. Nam in morbis quum alter alteri succedit, plerunque occidit. Quum enim corpori à præsentī morbo debilitato, alius morbus accesserit, præ imbecillitate perit, priusquā alter morbus quod posterior accessit, desinat. Aqua porro sic fit. Quū carnes à pituita, & tēpore, & morbo, & nō purgata immunditia, & mala curatione, ac febribus corruptæ fuerint, liquefcunt & fiūt aqua. Et venter quidem non distribuit aquā in seipsum, verum in circuitu circa ipsum consistit. Siquidem igitur à pharmacis, & alia victus ratione, æger vtilitatē percipiat, & venter ipsius euacuatur, bene est: Sin minus, sectione facta, aquā emittito. Secatur autem vel iuxta vmbilicum, vel retro iuxta lumbos. Effugiūt autem & hinc pauci. *Dysenteria* Morbus quod fiat. *Medela en cep.*
- B** Dysenteria quum habuerit, dolor adest per totum ventrem, & tormē, & egerit bilem ac pituitam, & sanguinem combustum. Huius vbi purgaueris caput, pharmaco in potu exhibito, quod sursum pituita purgat, & aluum lacte cocto elueris, reliquum corpus curato, & si quidē febre caruerit, pinguibus & dulcibus ac liquidis semper quæ insunt, ex aluo subducito. Et multa calida partes sub vmbilico lauato, si dolor affuerit. Potus autē & sorbitiones ac cibos exhibeto, velut scriptum est in medicamentario libro. Morbus hic fit, vbi bilis & pituita in venas ac aluū incubuerint, ægrotat quidē sanguis, & corruptus secedit: ægrotat autem & intestinum, & raditur ac exulceratur. Fit autem hic morbus, & longus, & laboriosus ac lethalis. Et si quidem robusto adhuc corpore curetur, spes est fugæ. Si verò colliqua to iam, & vtrē omnino exulcerato, nulla vitæ spes superest.
- C** Lienteria. In lienteria, hoc est intestinorum leuitate, cibi secedunt non putrefacti, liquidi, dolor autē non adest, & corpus attenuatur. Hunc per eadē curato, velut à dysenteria de-
tentos. Morbus autem fit, quum ex capite & superiore vtrē,

HIPPOCRATIS LIBER

pituitæ defluxus fit in vētrem inferiorē. Quod vbi cōtingit, D
cibi ab ipso frigescunt ac humectantur. Et secessus ipsorū non
putrefactorū velox contingit. Et corpus liquefcit, dum simul
eibi per multū tempus in ventre non concoquuntur, & simul
à ventre calido, præter naturam calefcit. *Profluuium ven-*
tris. tris longum quum detinuerit, secedunt primū quidem liqui
da, quæ sunt ingesta: postea pītuita. Et probè quidem edit, ve
rū à multo secessu debilis ac tenuis fit. Hunc sursum versus
resiccato, veratro in potu dato, & capite à pituita purgato.
Ventrem quoque lacte cocto eluito. Deinde reliqua cibis ac
potibus curato, à quibus venter & totum corpus rescicetur.
Morbus autem ab iisdem fit, à quibus etiam intestinorum
leuitas. Hi morbi, dysenteria inquā, & hienteria, ac diarrhœa E
siue profluuium ventris, confimiles sunt. Et oportet ipsos sic
sanare, ita vt defluxū à capite & superiore vētre intercipias,
aut auertas. Morbi enim natura hinc est. Et nemo sentētiā
tuā reprehendet. Firmè autem & reliquos morbos sic con
siderare oportet, vnde vnicuique natura sit. Et si sic confide
raueris ac deprehenderis principiū morborum, minimè ab
erraueris, Tenesmos vbi apprehenderit, secedit sanguis ac
Tenesmos. mucus, & dolor fit in ventre inferiore, maxime vbi ad seces
sum deuenerit. Huic conducit ventrem humectare, & pin
guetfacere, ac tepefacere. Et quæ insunt subducere, & calida
lauare, excepto capite. Solet autem hic morbus plures cibos
expetere, Formina enim euacuato ventre à sanguine ac mu
co pertranseuntibus, & ad intestinū allabentibus, fiunt. Quā F
autem insunt cibi minorem mordacitatē intestino inferunt.
Et fit quidem ex iisdem à quibus & dysenteria, verū debi
lior, & breuis, & non lethalis. Quum ex vino aut à cōuiuio
bilis supernè ac infernè fluxus, aut diarrhœa corripuerit, di
arrhœæ quidē conducit ieiunare. Et si sitim habeat, vinū dul
ce dare, aut vuarum passarum dulcium retrimenta. Ad vespe
ram verò danda sunt, quæ etiam his qui à pharmaco purgati
sunt dant. Si verò nō cesset, velis autē sedare, vomitū à cibo,
aut lenticulæ decocto facito, & cōfestim sursum reuellit in
fernus secessus, & si succo lentium aut cicerum infuso elue
ris, etiam sic sanè sedabitur. At verò bilis fluxui conducit,
Medic. si dolor adlit, dare quæ in pharmacis scripta sunt sedantia do
lorem. Venter autem curetur, tum superior, tum inferior, per
potio

A potiones humectantes, & per balnea calida corpus mollientia, capite excepto, & sic tum vomitus procliuor fit: & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea quæ aduersantur sursum reuoluuntur: tum infernus secessus magis prodit. Si verò euacuaueris, violenter vomuntur, & violentius secedunt. Ad vesperam verò dato & huic ea quæ dari solent ei qui phatmacum bibit. fiunt autem & hi dolores qui ex potationibus aut ex consuiuo oriuntur, quum cibi & potus plus solito in ventrem ingressi fuerint, & quæ extrinsecus corpus supercalentescere solent, bilem, ac pituitam mouerint. Vrinæ stillicidij modi quidem multi & omnigeni sunt. Conducit autem forinsecus quidem corpus balneis calidis mollire. Intrinsecus verò humectare aluum quidē per cibos, à quibus fluida fiat. Vesicam verò per potus, à quibus vrina quàm plurimum diffunditur. Danda sunt & vrinam cientia medicamenta, quæ scripta sunt in medicamentario libro sedantia dolorem.

*Dolores
crapulae.*

Medela.

B Morbus autem fit à pituita. Et quum quidem vesica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut euacuata, dolorem exhibet: Quum verò humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus fit autem senioribus diuturnior hic morbus. Iunioribus autem breuior. Neutris verò lethalis. Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxę iuncturam, & summas nates, ac coxendicem. Tandem verò etiam per totum crus dolor vagatur. Huic confert quum dolor tenuerit, mollire in quacumque tandem cruris parte dolor hęserit, per balnea, & tepesfactoria ac fomenta. Et aluū subducere. Vbi verò quicuerit dolor, phatmacum dandum est infra purgans. Et postea bibat lac asinum coctum. Doloris autem gratia dentur quæ scripta sunt in medicamentis. Morbus hic fit, quum bilis, & pituita in sanguisquam venam incubuerint, aut ex alio morbo, aut aliter quantumcumque sanguinis à pituita & bile compactum ægrotarit. Hic enim per crus vagatur per sanguisquam venam: & vbicumque constiterit, ibi etiam dolor manifestus fit maxime, molestus quidem, sed non lethalis. Si verò in vnum aliquē locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, vito quocumque loco fuerit dolor. Vito autem lino crudo. Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor & dolor corporis articulos. Corripit autem acutus, & in aliū atque alium articulū dolores incumbit,

Ischia.

Curatio.

*Morbus hic
unde.*

*Articularis
morbus.*

*est etiam hic
morbus
a cutis*

HIPPOCRATIS LIBER

Medela. tum acutiores, tum molliores. Huic conducit adhibere quæ parte dolor hæret, frigefactoria. Et quæ insunt ex aluo subducere, per clysteres, aut glandem subditam. Ad sorbendum verò & bibendum dato quodcunque tibi conducibile visum fuerit. Quum verò dolor intus fuerit, pharmacum infrà purgans bibendum dato, & post hoc serum coctum, & asininum lac. Hic morbus à bile fit & pituita, quum commota in articulos incubuerint. Et brevis quidem fit & acutus, non autem lethalis. Solet autē iunioribus magis quàm senioribus contingere. Podagra violentior est omnibus eiusmodi circa articulos morbis, & diuturnissimus ac ægrè cedens morbus. Et est quidem hic morbus sanguinis in venulis à bile ac pituita corrupti. Quantò autem in tenuioribus fuerit venulis, & in plurima corporis necessitate constitutis, & in nervis, & ossibus multis ac densis: tantò sanè durabilior est morbus, & qui ægerrimè depelli possit. Conducunt autē & huic eadem quæ morbo articulari. Et longus quidē est & hic morbus ac molestus, sed non lethalis. Si verò in digitis dolor relinquantur, venas paululum suprà articuli in digito nodū inurito. Vrito autem cum lino crudo. Morbum autem regium sic curare oportet. Extrinsecus quidem corpus molliendum est balneis calidis. Alius verò & vesica humectanda, & urinā cientia danda, quæ sunt præscripta. Si verò fortis fuerit, purgato capite, pharmacum quoddam potandum dato quòd bilem deorsum purgat. Postea verò urinam cientibus utendum est. Morbus autem fit, quum bilis commota sub cutem vertitur. Quòd si hæc nouerit vir idiota, non similiter incurabiles morbos inciderit. Solēt enim morbis ex paruis occasionibus magni ac diuturni fieri. Et quicunque cibi, aut potus, aut sorbitiones congruè ac consequenter se habent, & quæcunque pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo sepe exhibētur, si iuxta præscriptum exhibueris. Quæcunque verò pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his pericula fiunt, & culpæ medentibus imputantur. Quàm maximè igitur ea vitare oportet. Atque hi quidem sunt morbi qui circa ventrem fiunt. Exceptis pectore suppuratis, & fistulidis, & muliebribus morbis. Hi enim seorsim describentur.

Tubercula. Tubercula quæ enascuntur omnia, à pituita aut sanguine nascuntur, quum sanè à vulnere, aut casu fuerint collecta. Conducit

A ducit autē horum aliqua cataplasmatīs integere, & per phar-
 maca in potu data diffundere. Aliqua verò impositis cata-
 plasmatīs maturare, & diffundunt quidē cataplasmata, quæ
 quum calida sint, humectant, & non in seipsa trahunt. Matu-
 rant autem, quæ calefacientia contrahunt. Quum verò ali-
 quod sectum fuerit, aut sua sponte ruptum, pharmaco hu-
 morem repurgare conuenit, vbi autem pus effluere deliue-
 sit, velus vlcus sanare. *Lepra, pru- ritus, sca- bies impe- tigo, vitili- go, alope- cia.*
 rigines, & vitiligo, & alopecia, à pituita fiunt. Sunt autem
 talia turpitudine magis quàm morbi. Fauus, & strumæ, & *Fauus, stru- mæ, pani,*
 pani, & furunculi, & carbunculus, à pituita fiunt. Quo verò *furunculi, carbuncu- lus.*
 hæc depurges, pharmacis sic vtendum est. Quicumque biliosi
B sunt, his dato ea à quibus bilis purgatur. Pituitosis verò, ea
 à quibus pituita. Atrabiliarij autem, ea à quibus atra bilis. *Pituita, atra bilis.*
 Hydropicis ea per quæ aqua. Quæcunque verò pharmaca *pituita, aqua.*
 in potu dantur, & non purgant neque bilem, neq; pituitam, *pituita, aqua.*
 ea quum in corpus ingressa fuerint, vim exhibere oportet, *pituita, aqua.*
 aut frigefaciencia, aut calefacientia, aut siccantia, aut hume-
 ciantia, aut contrahentia, aut diffundentia. Quæ verò somnū
 faciunt, ea quietem sanguini exhibere oportet. Quum ad
 ægrotum deueneris, interrogare oportet quæ patitur, & ex
 qua causa, & quot iam diebus: & an veter secedat, & quo vi-
 ctu vititur. Et primū considerare, an morbus à bile aut pi-
 tuita factus sit, aut vtriusq;. Et hoc probè nosse cōuenit, quod
 necesse est, vt ab altero horum, aut vtriusque fiat. Deinde utrū
C siccitate aut humiditate opus habeat. Aut aliqua quidē par-
 tes corporis siccitate, alique verò humiditate. Postea an mor-
 bum sursum purgare oportet, aut deorsum, siue per velicam.
 Et an augefcit morbus aut marcescit, & an soluitur, aut in al-
 num trahit. Vulneratos fame affligito, & ex aluo quæ in-
 sunt subducito, aut per clysterem, aut pharmaco infra pur-
 gante exhibito, & in potu dato aquam, aut acetum. Aut for-
 bitiones præbeto. Inflammata cataplasmatīs frigefacito. *Quæ nul- lus refrige- rent.*
 Talia verò cataplasmata sint, aut betæ coctæ in aqua, aut
 apium, aut oleæ folia, aut fici folia, aut rubi, aut querūs, aut
 mali punica. Atque his coctis vtendū est. Crudis verò rham-
 ni folijs, aut viticis, aut saluæ, aut Tithymali. Aut pullegium
 viride, aut porrum, aut apium, aut coriandrū, aut ifatidis fo-
 lia impone. Si verò nihil horum habueris, neq; vllum aliud
 catap

HIPPOCRATIS LIBER

cataplasma. polentam aqua aut vino subactā imponito. **Tan-**
to autem tempore hæc cataplasmata profunt, quanto frigi-
diora fuerint quā vlcus. Quum verò fuerint calidiora, aut
similiter calida, nocent. Pinguia ad inflammata non con-
ducunt, neque ad ea quæ non sunt purgata, neque ad putre-
scentia. Sed ad inflammata conferunt frigida. Et ad impur-
gata ac putrescentia, acria faciunt, & quæ mordacitatem ali-
quam inducentia purgant. Vbi verò carnem producere vo-
les, pingua & calida magis cōducunt. Ab his enim caro pu-
lulat. Quibuscunque cibis aut potibus homines sani in vi-
tu vtūtur, ex his oportet præsentibus vti ad ægrotos, ita vt
præpares calidos & frigidos, & humidos, & siccos. Ex frigi-
dis quidem calidos, & calidos ex nō calidis, & siccos ex non
siccis, & reliquos iuxta eundem modum. Neque verò de præ-
sentibus desperare oportet, tanquam nihil possint, & absen-
tes quærere, qui nullam vtilitatē ægro afferant. Comperies
autem, si rectē consideraueris, extra hos, paucos quibus ad
ægrum vtaris. Sorbitiones autem in morbis omnibus da-
to, aut ptisanam, aut milium, aut farinā, aut alicam. Et quæ-
cunq; ex his dederis ad secessum, tenuia dato, & magis per-
cocta, & dulciora potius quā salisiora aut calidiora. Quæ
verò ad robur aut refocillationē, crassiora, pinguiora, & mo-
deratē cocta. Potibus autem vtendum est, si quidem aluum
& vesicam subducere velis, vino dulci aut aqua mulsa. Si ve-
rò adstringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, ni-
gro. Qui vinum bibunt citra affectionē erga ipsum, his dan-
di sunt potus qui præparantur, & in medicamentario libro scri-
pti habentur. His qui medicamentum biberunt, post pur-
gationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut mi-
lium tenue, aut ptisanæ succus. Danda est autem ptisana &
milium, velut quæ leuia sint. Alica verò velut omniū robu-
stissima. Et farina velut his robustior. Lenticula autē odo-
rata præparetur. & modica secundo loco detur, vt quæ leuis
sit sorbitio, & stomacho grata sursum versus. Ammiscea-
tur autem aut sal, aut mel, & corainum, & oleum. Ad lenticu-
lam verò ammisceatur pulegij herba, & parū aceri. Non fe-
brientibus autem, panis puri medullam in iusculum interi-
to, aut mazam & frustum piscis dato, aut ouiculæ tenerinnæ
carnem, aut volucris aut catuli coctam. Febrientibus autem
etiam

*Quæ uulne-
ri complen-
do profunt
Tempera-
mentum o-
mnium.*

*Quæ for-
beantur.*

*Quæ uentre
urinæque
ciunt.*

*Quæ strin-
gunt.*

*Post purga-
tionem quæ
dantur.*

F

A etiam betam dato, aut cucurbitam, aut blitum. Et post cibū bibant vinum vinosum, vetus, album quā aquosissimum.

Quibus lauari non conducit, vngantur vino & oleo calido, & alternis exergeantur. Quum aluum debilis, à cibis humectare volueris, mazam dato & obsonia. Et marinorum quidem piscium frustra cocta cum intrito. carnes autem ouiculæ tenerimæ, aut hædi, aut catuli, aut volucris coctas. Et betam, aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit. Ex oleribus verò apium, & anethum ac ocimum. & vinum mellei coloris, vetus, album item ac aquosum. Quum verò siccare volueris corpus, panem dato, & obsonia assa, & sicca, & hæc omnia calidiora. & carnum partes carnosas: pisces, petrosos: olera, rutham, aut thymū, aut origanum. Vinū verò nigrum austerum. Præparentur autem obsonia cum sale & cumino. Alijs verò cōdimentis parcissimè vtendum est.

Quæ siccet

Quum autem ex morbo refocillare volueris, alia quidem eadem dato, quæ exhibes quum ventrem humectas. Verum pro lactentibus carnes fortiores, & pro catulis, voluerium, ac leporinas, & ex his aliquas assatas, tum de carnibus, tum de piscibus, & quā optimè præparatas. Quibuscunq; morbis siccitas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit, & cibos ac potus pauciores dare, quā vt repleantur, & hos laboribus ac deambulatione perficere, & quā minimū dormire. Quibuscunq; verò humiditas conducit, his expedit inediam non ferre, & cibi ac potus non indigos esse, neque laborare, & dormire quantum voluerint. Quoscūq;

inuoctia.

C cibos, aut obsonia, aut potus ægroti concupiscunt, exhibeto, si non corpori damnum inde accessurum est. Quum aut cibibus aut potus augere inceperis aut detrahere, paulatim & additiones, & detractiones facere oportet. Quicunq; cibos sufficientes perficere possint, his sorbitiones ne dederis. Excludunt enim cibum. Qui verò non possunt, his dato. Si verò quid dare volueris refectiois gratia, alicam dato, & prisanam triticeam. Hæ enim sorbitiones sunt fortiores. Dentur autem post cenam. Pharmaca quæ potantur, & quæ ad vulaera adhibentur, discere oportet: omnibus enim hoc expositum ac procliue est. Non enim ex intelligentia homines hæc reperiunt, sed potius ex fortuna. Neque artifices magis quā idiotæ. Quæcunq; verò in arte medica, intelligentia

*Quicquid lē
quens pē
rit dato.*

*Sorbitiones
ualide.*

*Medicamē
ta casu reo
perit.*

discun

HIPPOCRATIS LIBER

discuntur & reperiuntur, aut de cibis aut de medicamentis: De ea ab his qui dinoscere possunt quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere velis. Post sorbitiones cibum debilibus dato, & vinum vinosum insuper bibendum, Ante cibos verò & potus aut sorbitiones, & postea, & cibum & potum quicumq; tãdem tibi videbitur debilibus exhibeto, ita vt & corpus & animam inspicias. Sic enim maximè profueris.

*Qui uis co-
rũ quæ por-
riguntur co-
gnosciunt.*

Quam facultatem singuli cibi habeant, coniectare oportet, ex his qui vim manifestam faciunt. Quicumque flatum, aut morsum, aut repletionem, aut ructũ faciunt, aut tormen, aut secedunt, aut non secedunt: hi manifesti sunt quòd hæc operantur. & ex his etiam alios considerare oportet. Habent enim singula edulia, & quo prosunt, & quo lædunt. Verum alia manifestissimè operatur quæ operatur, alia verò obscurius. Cibi & obsonia præparentur ac exhibeantur debilibus, à quibus neq; flatus sit, neq; ructus acidus, neq; tormen. & quæ neq; valde per aluum secedunt, neque valde resiccantur. Hæc autem sic fiunt. Quæcunq; quidem venter superat & corpus ipsa suscipit, ea neque flatum exhibent. neque tormen. Si verò venter non superarit, ab his & flatus, & tormen, & alia huiusmodi fiunt. Leuissima sunt cibaria, & potus ac obsonia, quæ moderata in corpus ingesta, aut paulò amplius supra modum, neque repletionem exhibent, neque tormen, neque flatum, neque aliud quiddam eiusmodi, & celerrimè concoquuntur, & concocta secedunt, & per omnem diem in vètre[m] ingesta, minimè molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Grauiam autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum, repletionem & dolorem exhibent. & quæ neque dari, neque edi, neque bibi possunt, vt non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat aut edat, etiã sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt.

Leuia quæ.

Grauiam.

*Sanitati
conducit.
Robur fa-
ciunt.*

Ad sanitatem optima sunt, quæ modicè ingesta, sufficiunt, vt & famis & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autè optima sunt, quæ carnem plurimam ac densissimam producunt, & sanguinem crasse faciunt, & pro ingestorum ratione secedunt, & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pinguiam, & caseosam, & mellitam, & ex sesamo paratam, ructũ acidum maximè faciunt, & bilis fluxum supernè ac infernè, & tormen, & flatum,

A flatum, & repletionem. Hoc ipsum etiam cōtingit, cum quis plura ederit aut biberit, quā venter concoquere potest.

Debilibus si quidem pro morbi ac corporis ratione dederis, quācūq; tandem dederis, consumit hæc corpus, & neq; indigum est, neque repletum. Si verò aberraris à temporis occasione, detrimentum in vtraque sequitur. Quācūque cibaria aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neque tormen sit, neque flatus, neque ructus acidus. Quum enim in ventrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit quod ipsi commodum est. Et necesse est iam quod restat debilius esse, quā ut tormen, aut flatum, aut aliud quid huiusmodi in ventre faciat. Vina dulcia, & austerā, & mellei coloris

Cibaris, potulaq; comferentia, & conerd.

Vina.

B vetusta, ventrem subducunt, maximeque vrinam cient ac nutriunt, & neque flatum exhibent, neque tormen, neque repletionem. Carnes percoctæ & exsiccatae, vtræque debiles sunt ad robur augendum. Ad secessum verò percoctæ commodæ sunt, Assatæ verò magis sistunt. Quæ verò moderatā habent & cocturam & assaturā, hæc & ad robur, & ad secessum moderatè se habent. At verò crudiores ad robur quidem commodæ sunt, sed non ad secessum. Ex cibis ac potibus qui commodissimi sunt corpori ac maxime sufficientes, & ad alimentum, & ad sanitatem, & ex his ipsis etiam, ubi quis ipsis non in tēpore vtatur, aut pluribus quā tempestiuum est, & morbi, & ex morbis mortes fiunt. Reliqui verò cibi ac potus, qui talem vim nō habent, parum vtilitatis afferunt, etiam si

Carnes.

C quis semper ipsis in tempore vtatur: parum autem etiam laedunt. In vtranque enim partem debiles sunt, vt & boni aliquid faciant, & mali. Sunt autem cibi & potus qui hanc vim habent hi, panis, maza, carnes, pisces, vinum. & ex his alij magis, alij minus. Quicūque ex sicco victu viuūt, his non cum cibo potus datur, sed post cibum, multo tēpore interposito. Et sic quidem siccus humor à siccis cibis ortus, corpus siccatur. Si verò quis simul cum cibo bibat, cibum humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidæ, ipsæ per se comestæ, siccant. Si verò cum liquore dederis, aut statim à cibo potum præbueris, nō siccant. Panis purus ex farinis. ad robur ac refecutionem commodior est, quā qui non est ex tenuibus farinis paratus, & recens vtilior est quā vetus, & ex farinis recentibus melior quā veteribus. Polenta ex

Siccus nutriticus.

Panis distantia.

Polenta.

HIPPOCRATIS LIBER

D
 ordeo non madefacto, sed circuncirca consperso ac decortico, fortior est quàm ex madefacto: & recens quàm vetusta.
Vinum quod debilietur. Et maza prius subacta fortior est, quàm nō subacta. Vinum diffusum, ac perfrigeratum, & excolatum, tenuius fit ac debilius. Carnes coctæ, si quidem percoctas feceris, debiliores sunt ac leuiore. Assatæ verò si ex assatæ fuerint, & inueteratæ ex aceto aut sale, debiliores sunt & leuiore recentibus. Debiles ac leues cibi, ventrem quidem nō lædunt, neq; corpus, eo quòd calefacti non intumescunt, neq; replent, sed citò mollescent, & concocti secedunt. Humiditas autē ab ipsis debilis corpori accedit, & neq; augment, neq; robur memorabile exhibent. At fortes cibi et intumescunt vbi in ventrem ingesti fuerint, et replēt, et difficilius quidem ac tardius concoquuntur, et nō secedunt. Verū humor ab ipsis fortior ac incorruptus accedens, multum robur ac augmentum corpori addit. Ex carnibus leuissimæ sunt in corpus, caninæ, & volucrum, & leporinæ coctæ. Graues autem sunt bubulæ. Et porcinae moderatiores, flatum autem faciunt, & coctæ & assatæ. Et sanis autē & debilibus conueniunt ouillæ. Suillæ verò his qui laborāt & exercitantur, & ad bonum habitum, & ad robur commodæ sunt. Debilibus autem & priuatam vitā degētibus fortiores. Sed & farinæ māsuetis leuiore. sunt, eo quod fructum non similem edunt. Differunt autem & pecorum carnes, & eorum quæ fructum edunt, & quæ non edunt. Et fructus non idem in omnibus facit, sed partim densam ac fortem victimæ carnem efficit, partim rarā & humidam, ac debilem. Vt in summa dicam, pisces leue sunt edulium, & cocti, et assati. & ipsi per se, & cum alijs cibis. Ipsi verò inter seipsos sic differūt. Stagnorū pisces, & pingues, & fluuiatiles, grauiore sunt. Littorales autem marini, leuiore. Et percocti assatis sunt leuiore. Ex his itaq; fortes dato, vbi reficere aliquem voles. Leues verò, vbi gracilem & tenuem facere oportuerit. Balneum calidum moderatum quidem, mollit, & auget corpus. Quòd verò opportunū modū excedit, siccās quidē corporis partes humectat, humidās verò resiccat. Et siccæ quidem humectatæ debilitatem & animi deliquium exhibent. Humidæ verò siccate, siccitate ac sitim. Ex oleribus allia, & cocta & assata, urinā cient, & per aluum secedunt, & ad menses muliebres conducunt. Cepæ
E
F

A ad urinas cōmodæ sũnt. Succus enim acrimoniã quãdam exhibet, vt secedat. Atq; his quidem sic vtendum est, sed debilibus non exhibenda. Apium & coctum & crudum urinam ciet, & palustre magis quã satiuũ, quod etiã maiorem vim habet. Coriandrum stomacho gratũ est, & per aluum secedit, tum coctum, tum crudum. Ocimum & humidum est & frigidum, ac stomacho gratum. Porrum coctũ quidem urinam ciet, & secedit. Crudum verò æstuosum est & pituito sum. Malum puniçũ reficit & pituitosum est, & cùm nucleo quidem, aluum sistit. Citra nucleũ verò, secedit. Calidi cibi, sicci quidem sistunt, humorẽ enim in ventre resiccant. Si verò humidi sunt, humectantes per caliditatẽ, aluũ subducunt.

Apium.

Coriandum.

Ocimum.

Porrum.

Malum puniçum.

Cibaria.

B Acerba siccant, & cōtrahunt corpus. Habent & vim sistendi. Acida attenuant, morsum inducentia. Salsa secedunt, & urinam ciet. Pingua & dulcia, humiditatẽ & pituitam exhibent. Reficiunt cucurbita, & beta, & blitum, & rumex, & per humiditatẽ secedunt. Brassica verò acrimoniam quandam habet ad secessum, & simul boni succi est. Caseus, & sesamum, & vicia passa, reficiunt & pituitosa sunt. Vinum dulce, & mellis speciẽ referens, ambo & reficiunt, & urinã ciet, & pituitosa sunt. Austera verò, ad robur & siccitatẽ commoda sunt. Urinam autem ciet etiam austera vetusta, quæ alba & tenuia existunt. Oleum & quæcunq; oleosa, reficiunt & pituitosa sunt. Ex oleribus coctis secedunt, quæ ex natura humidissima aut acerrima sunt, aut caliditatẽ habent. Danda autẽ sunt hæc tepidiora ac flaccidiora, Sic enim ad secessum cōmodant. Cucumis pepo, & urinã cit, & aluo secedit, ac levis est. Alter autẽ pepo, frigiditatẽ quandam exhibet, & sitim sedat. Alimentum verò, à neutro horum contingit, nisi tenue quoddam. Sed neq; malum, neque memorabile. Mel

Brassica.

Vinum.

Oleum.

C cum alijs quidem comestum, & nutrit, & bonũ colorem exhibet. Ipsum autem per seipsum attenuat magis quã reficit. Nam & per urinam, & per secessum plus iusto expurgatur. Urinam cientia in ventre & cito calefiunt, & calefacta marcescunt ac liquefcunt, & ob id citum secessum faciunt. Stabiles autem ac aluum sistentes cibi, & calefcũt, & calefacti cito resiccantur ac compinguntur, & propter ea obduri facti, non secedunt. Quæ per aluum secedunt, succosa sunt, & natura calida. Quæ verò urinam ciet, sicca & frigida.

Mel.

Cibarium uarietas.

HIPPOCRATIS LIBER

*Frumentum
vinum.*

Frumentum & vinū, differunt quidem & ipsa inter seipsa D
ex natura, tum robore & debilitate, tum lenitate ac gravitate. Differt etiam locus à loco, ex quo illa fuerint. Est enim alius aquosus, alius aquarū inops, & apricus, & vmbrosus, & bonus, & malus. Quare omnia hæc ad hoc conferunt, vt singuli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicunque sanè panem comedere soliti fuerunt, his dandus est & in morbis.

*Quum plus
iusto come-
ditur quid
agendum.*

Quum quis cibos aut potus plures solito acceperit, si non solito more perfecerit, optimum est vt statim reuomat. Po-
ma & fructus arborei, tum mollis, tum duri corticis, pro-
pterea post cibū molestiora sunt, & sano, & debili, quia cor-
pus eius qui cibū sumpsit, solū ab ipsis humores trahit. Si
verò ieiunus quis edat, plures. Quicunque cibi aut flatum, E

*Cibaria
cum uexāt,
quid agas.*

aut æstum, aut morsum, aut repletionē, aut tormen faciunt, à
talibus liberat vinum meracum insuper potatum. Corpus
enim à vino calefactum, per calorē amouet ea quæ insunt à

*Ventris di-
uersitas.*

cibis & potibus ac similibus. Venter aliquando perturba-
tur, aliquando sistitur, aliquando etiam pro ratione secedit.
Cur autem hæc sic se habent? primū quidem venter quum
humidior fuerit, & quum siccior, susceptum cibum corrup-
pit. Deinde quum mutatio facta fuerit, siue ex frigore ad ca-
liditatem, siue ex caliditate ad frigiditatē, itidem corrūpit.
Quare necesse est ventrē, ab ipsdem cibis ac potibus propter
hæc ipsa, & molliorem fieri, & duriorē. Cibaria & potus
& obsonia, excepto pane, & maza, & carnibus, & piscibus, &
vino, & aqua, reliqua omnia tenues ac debiles vtilitates ex- F

*Languen-
tium nutri-
catio.*

item ac debilia mala ab ipsis fiunt. Quosunque agrotos,
febres non continenter detinent, sed intermittentes corri-
piunt, his cibi dandi sunt post apprehensionem, ita vt conie-
cturam facias, ne febris à recēs accepto cibo irruat, sed cibis
iam concoctis. Vinum & mel optima iudicata sunt in ho-
minibus, si iuxta naturam & sanis, & debilibus cum tempo-
ris opportunitate ac mediocritate exhibeātur. Et bona qui-
dem sunt ipsa per seipsa, Bona verò etiam permixta, & tum
alia, tum quæcunque memorabilem vtilitatē habent. Quæ-
cunque sanis commoda sunt, ea etiam agrotis exhibita for-
tiora sunt. Et oportet detracto ipsorum vigore ea dare, alio-
qui non feret ipsa corpus, sed magis lædunt, quàm prosunt.

Hippoc

A HIPPOCRATIS

COI LIBER DE IN-

TERNIS AFFECTIONI-

BVS, IANO CORNARIO ME

DICO P. TICO IN-

TERPRETE.



I pulmonis arteria fuerit exulcerata, aut *Pulmonis arteria san-*
 aliqua tenuis venula ex his quæ in pulmo- *ciata uenæ*
 nem dependent, rupta fuerit, aut aliqua fi- *ue fracta.*
 stula ex his quæ per pulmonē distēta sunt:
 & alia in aliam distracta fuerit, & sangui-

ne fuerint impletæ: distrahuuntur sane ac
 rumpuntur ob has maximè causas, propter laborem, propter
 cursum, ob casus, ob plagas, ob vomitus violenter fientes, ob
 febres. Hæc igitur patitur. Primum quidem tussis sicca ob-
 tinet. Deinde paulò post expuit saliuam subcruentam, ali-
 quando autem puram. Et si quidem hic breui à morbo libe-
 retur, satis est: Si verò non, temporis progressu sanguis am-
 plior prodit, aliquando purus, & aliquando etiam subputri-
 dus. Sæpe verò etiam fauces non animaduertentibus sangui-

ne implentur. Postea sanguinis grumos paulatim & frequen-
 ter emergentes reijciunt. Aliquando verò etiam graucolen-
 tia ab ipsis contingit, & fauces aliquando spuma quadam re-
 plentur. Et rigor ac febris apprehendit, circa initia quidem
 morbi, vehemèter. In progressu autē debilius, & alias atque
 alias corripit, & dolor quandoq; in pectoribus insitus est, &
 in dorso, & in lateribus. Et ubi sanguinē spuere desierit, sali-
 nam multā liquidā expuit, quandoq; verò etiā viscosam. Atq;
 hæc quidē sic patitur donec quatuordecim dies præterierint.
 Post hos verò si nō desuerit morbus, squamas ab arteria tuf-
 siendo auellit, quales à pustulis decedunt. & dolor incidit in
 pectus. & in dorsum, & in latus, & præcordia cōtingens velut
 vlcus dolet. Huic cōducit ut quā maxime quietē intus ha-
 beat, si morbus sic se habuerit. Si enim quid laborarit, & do-

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

lor acutior, & tussis magis quā prius premit, & rigor ac fe- **D**
bris magis occupat. Et si sternutauerit, dolor acutus irruit.
Dolet autē & in lecto, quū se circūuertit. Huic cibos quidē eos
dem, quos & pectore suppurato exhibere oportet, verūm hos
nō multos. Ex obsonijs autē his vtatur. De piscibus quidem,
squatina, aut pagro, aut galæo magno albo, aut alijs simili-
bus, omnibus cū rhoe & origano cōditis. Carnē autē edat gal-
li assatā, sine sale. aut capræ coctam. & vino austero vetustissi-
mo ac iucundissimo nigrovatur. Deambulationib. autē mode-
ratis. Verūtamē hęc fiant febre nō tenente. Si verò febris te-
nuerit, sorbitione farinæ aut milij vtatur. Si verò cibos assu-
mat, paucos assumat, & obsonia per aluū secēdētia. Et si phar-
maco tibi vtendū esse videbitur, cnidio cocco, aut tithyma- **E**
lide ipsū subpurgato. Et post purgationē, farinæ coctæ pin-
guis heminā absorbendā dato. Deinde quā maximē reficito,
vt quā minimum tenuis sit. Ad huiusmodi enim morbū non
cōducit tenuē esse. Deambulationes etiā primū paucas faciat,
vt ne lassitudo succedat. Fomentū verò aliās atq; aliās adhi-
beatur. Et qua die fomētū adhibetur, sine cibo sit excepta fa-
rina cocta, cuius heminā absorbeat. Aquā autē bibat. Postera
die minus quā solitus fuit edat, & bibat vinū nigrū, iucudū,
austerū modicū. De cæterò verò bis aut ter in die cibi dētur.
Sic autē huic paulatim dato, donec ventrē confirmaueris. Nā
ex febribus & inedia, si os quidē appetuerit, venter autē lu-
scipere noluerit, vbi acruatim suscepit, inflammatur. Quare **F**
paulatim dare oportet. Si verò acruatim dederis, & parū la-
borarit, deambulationibus vter nō perfrigeratur, nimirū ci-
bis quiete cōpactis. Quare etiā febris succedere solet, & hye-
me quidē minus, æstate verò periculū est ne delinquat. Hunc
quā maximē reficere oportet, quo quā crassissimus fiat. & de-
ambulationib. moderatis vtatur, & minus solito luctetur, &
parū labore primū, deinde ampliū, nūquā aut multū. hęc si
fecerit, celerrimē sanus erit. Si verò tenuis fiat, ppter laborē,
remittat ac quietē agat. Hic vbi sanus fuerit, neq; ad vetū ce-
leriter currat, neq; equū, neq; currū cōscēdat. Vitet etiā voci-
ferationē, & iracundiā. Periculū est enim ne morbus reuertat.
Quare hęc oīa vitare oportet. Si verò cibū auerfetur, eruum
torreto, & corticē depurgato, deinde per triduū in aqua ma-
cerato, singulis aut diebus aquā diffundito, & alia affundito.
Postea

*Medela
qua.*

*Qua cauē-
da.*

- A** Postea quarta die excolato ac refecato, deinde tenuissimè molitum cribrato. Et lini semen tostum tundito ac terito. Et sesamum tostum tundito ac terito. Et polentam non salfam, puram, tenuem accipito. Et erui quidem ac polentæ, amborū æqualis sit mēsurā, sesami verò tertia pars, lini verò dimidia vnius partis. Hæc in lacte caprino cocta quā liquidissimè absorbeat. Postea verò in prandium ipsi dentur cibi puri, & obsonia fortiora. Vinum autem idem bibat. Dato autem ipsi & centaureæ radices, ad has rupturas facientes, in vinū ipsas deradens. dato item dracontij radices in vinum derafas. Sed & tussis gratia, dracontium derafum in melle delingendum dato: Et si decoctum in lacte assueuerit se sorbere non posse, lac bubulū quā plurimum bibat, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Atque sic celerrimè sanus erit. Morbus autē curationē multa opus habet. Est enim difficilis. Si enim curatus & sanus factus non seipsum custodierit, plerisque reuertens morbus interitus causā sit. hic si quidē ab hac curatione sanatus fuerit, latis est: Sin minus, ipsum lacte crameractum, & in pectore, & in dorso vrito. Si enim successerit vstitio, fugæ morbi spes est. Si verò arteria conuulsa fuerit, aut aliqua vena ex his quæ ad pulmonem tendunt, hæc patitur. Ab initio quidem morbi, tussis acuta obtinet, & rigor, & febris, & saliuam expuit multam, albā & spumofam, aliquando verò sub cruentā, et dolor caput ac collū detinet. hic morbus fortior est priore, et vsq; ad decem primos dies talia patitur. Postea pleriq; vndecima die pus crassum violenter expuunt. Decimaquarta verò die puriora expuit, si euasurus est, et dolore minus vexatur, et breui sanus fit. Si verò morbus diuturnus futurus est, tunc et pus multo amplius expuit, et reliquis dolor multo amplior in corpore inest. Calores autē debiliores habeat quā prius. Hunc si à principio acceperis, infra subpurgato scammonia succo, si non febricitarit. Post purgationē autem accipiat ea quæ prius, et alia eadem assumat, quieto quā maximè corpore et molliter cubet. et hæc quidem ab initio faciat vsque ad decem dies. Si verò pectore suppuratus fiat, eadem quæ etiam prius faciat. Si verò sanus fiat, ab his cibis ac potibus abstinere oportet, ab acidis, et acerbis, et salis, et pinguibus. A labore itē ac iisdem à quibus prior, abstineat. Hæc si fecerit, celerrimè à morbo liberabit.

*Sorbis
quæ.*

Curatio.

*Arteria
lancinatio.*

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

Si verò quid horum non fecerit, rursus reuerso morbo peri- **D**
clitabitur, & morbus peior erit. Nam multi rupto pulmone
vitam degunt, donec moriantur. Hunc si non statim quis cu-
ret, recidiuante morbo postea non habueris quo prodesse pos-
sis, nisi hæc feceris. Lacte bubulo crassefactum, in pectore &
dorso vrito. Si enim vstio successerit, proderis. Morbus autē

*Pulmonis
morbus uno
de fiat.*

hic ex iisdem delictis fit, ex quibus etiam prior. Pneumo-
nis siue pulmonia, ab his maxime fit. Quum pulmo sangui-
nem in seipsum traxerit, aut pituitā salſam, & non rursus di-
miserit, sed in ipso coacta ac cōpacta fuerint: ab his tubercu-
la fieri solent in pulmone & suppurari. Hic autem hæc pa-
titur. Ab initio & per totum morbum tussis acuta sicca obtri-
net. Et rigor, & febris, & dolor in pectoribus & in dorso in- **E**
cumbit. Aliquando etiam in latere, & erecta ceruice spiratio
vehemens incidit. hic vsq; ad quatuordecim dies talia pati-
tuitur. Sæpe verò etiam plures. Deinde erumpit pus, & multū
expuit. Sæpe verò etiam velut araneorum tunicas expuit,
Sæpe etiam tubcruentum. Et si quidem depurgatus fuerit &
breui gracilis factus pulmo, interitum effugit. Si verò non
adhæret, & per annum morbus tenet, & transmutatur, vt a-

Medela.

liās alia æger patiat, huic in principio antequam pus erū-
pat, hæc adhibere oportet. Quum febris remiserit, multa ca-
lida lauetur, & sorbitionibus multis vtatur. Ptiſanæ succum
coctum, melle ad coctum affuso, sorbeat. Et vinum bibat dul-
ce album, aut aquam mulsam coctam. Quum verò pus expue-
re inceperit, eadem bibat, quæ prior suppuratus, & cibis ac **F**
potibus, & obsonijs iisdem vtatur, abstinens ab acidis, & acri-
bus, & salſis, ac pinguibus. Et à venere ac ebrietatibus, nisi
morbo cōmodum fuerit. Ex coloris autem inspectione æsti-
mandum est, qualibus opus habere videatur. Reliqua verò
eadem faciat. Bibat etiam lac bubulū, ac caprinum pro tem-
pore. prius autem subpurgetur lacte asinino cocto. Bibat etiā
equinum lac excolatum quotidie manē, poculi tres heminas
continentis mensura, si facere poterit. Si quidē igitur sic cu-
ratus melius habebit, satis est. & si nō eruperit pus in pectus,
ipse seipsum curet, quietem quā maxime corpori exhibēs,
& quæ cōmoda sunt sibi ipsi exhibens. Si verò erūpat pus in
pectus, qua parte tibi significationem de se præbere videbi-
tur, illic maxime sectione aut vstione facta, pus emittito mo-
dicum

*Pus secatio
ne uſtione
ne educitur.*

A dicum primum. Reliqua verò eadem facito, quæ & In priore suppurato factò descripta sunt. Si in pulmone varix fiat, tussis sicca corripit, & rigor, & febris in principio quidē morbi valde vehementer, habet etiā erecta ceruice spiratio, & dolor in capite cōsistit. Et supercilia impendere videntur, & tumor in faciem descendit, & in pectus, & in pedes. Sæpe verò etiā in capite innititur, & præ dolore vbi is vexat, respicere non potest, & corpus subpallidum est, & venæ per ipsum tendunt flammæ, aut nigræ. Huic quum sic habuerit, & dolor maximè premit, primum sanguis detrahatur. Deinde multa calida lauato. Et vbi sitis habuerit, Cyceonem in vino nigro austero quàm iucundissimo, æquali mensura aquæ mixtum, bibendum dato. Frigidum autē maximè bibere oportet. Sorbitionibus autem vtatur prisanæ succo cocto, melle bono affuso. Hac exhibere oportet in primis quatuordecim diebus.

*varix in
morbo*

Si verò diutius morbus teneat, & dolor amplior fuerit in corpore, et impotentia aderit, huic sic habēti eadem exhibeto, quæ ei qui pulmonem suppuratum habet, vbi quatuordecim dies præterierint. Hic morbus fit à labore, et atra bile.

Quum venæ cauæ per pulmonem tendentes, sanguine aut atra bile impletæ fuerint, venulæ aliæ in alias rumpuntur, vt quæ in angustijs sunt conclusæ, et exitum non habeant: et dolorem exhibent ac flatum in pulmone. Hic morbus difficilis est, et multa curatione opus habet. Alioqui ægrum non relinquit, et plerunque in multis simul commoritur. Si in

*Morbicau
sa*

C inflammatio in pulmone fiat, fit autem maximè à vinolentia, et gulositate, piscium capitonum, et anguillarum. Hi enim pinguedinem habent naturæ hominis infestissimam. Iam verò etiam factus est morbus à pituita, vbi sanguini mixta in pulmonē influxerit. Accidit etiā ex carnis esu, et ex aquæ mutatione. Hęc igitur æger patitur. Tussit fortiter, et saliuā expuit liquidam ac multam. Sæpe etiam crassam et albam, velut à raucedine, Et dolor premit acutus in pectora, et dorsum, et laterum mollitudinem ac latera. Et acidum eructat. Et ex pectoribus ac pulmonibus, velut venter murmurat. Et vomit pituitam acidam. et si id quod vomuit in terram effundas, radit terram velut aceto infuso, et dentes stupefiscunt, et rigor ac febris, et sitis fortis detinet, et si quid pingue voluerit edere, exugitur ad viscera, et vomitum indu-

*Pulmonis
inflammatio.*

HIPPOCRATIS LIBER

cit. Et totum corpus torpor occupat. Quum verò reuomue- D
 rit, paulò leuior sibi esse videtur. postea vbi vespera diei ac-
 cessit, venter sonitum edit, & tormine versatur, ac murmu-
 rat. Huic quum sic habuerit, & tempestiuum esse visum fue-
 rit, curationem sic adhibeto. Mel & lac, & acetum, & a-
 quam, mixta in ollam infusa tepefacito, & origani capita-
 ti ramulis agitato, vbi verò tepida facta fuerint, bibenda
 dato, aut apprehensa lingua, sensim per fistulam infundito.
 Deinde conuolutum quietem habere iubeto. Postea si vomit-
 us succedat, promptè vomat. Si verò non succedat, irritatio-
 ne per pennam facta vomat, & si quid pituitæ vomuerit, per
 dies quinque idem faciat. hinc enim leuior euadet. Bibat au-
 tem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa calida lotus: Sin E
 minus, saltem lotus. Postquam verò quinque dies præterie-
 rint, manè ieiunus bibat in aqua mulsa, aut vino mulso sit-
 phij succum, erui magnitudine, & allium comedat ac rapha-
 nidas ieiunus: & meracum vinum insuper absorbeat nigrū,
 aut album austerum. Bibat etiam inter cibum, & post cibū.
 Cibis verò siccis, & carnibus caninis vtatur coctis, si rigor &
 febris non apprehenderit. hic si à tali infusione per fistulam
 in os, purgetur, satis est. Sin minus, sursum per veratrum ip-
 sum purgato. Post purgationem verò farinæ coctæ duas he-
 minas absorbendas dato, melle affuso. Vinum verò idem bi-
 bat aquosum. At si non in principio affueris morbo, lacte
 ipsum crassefactum in pectore ac dorso vrito, ita enim ma-
 ximè à morbo liberari poterit. Si verò non fuerit vstus per-
 manet, & non valde deficit, sed ad senectam vsque adhæret. F
 Sæpe etiam commoritur, si non in primis quadraginta die-
 bus mortuus fuerit. Quare multa quàm maximè opus est cū-
 ra. Et serum ac lac pro tempore bibat, bubulum & capri-
 num, & asininum ac equinum. Sic enim facilimè deget. Est
 autem morbus difficilis. Si pulmo ab erysipelate intui-
 muerit, Hic autem tumor maximè à sanguine fit, quum
 pulmo in seipsum sanguinem attraxerit, & susceptum tenue-
 rit. Morbus autem hic æstatis tempore maximè fit: Hæc
 igitur ab ipso æger patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, &
 febris, & erecta ceruice spiratio, & dolor fortis in pectori-
 bus, & nares aperit, velut equus à cursu. Et linguam exe-
 rit, velut canis æstate ab ardoris flatu vstus. Et tumor de-
 tinet

Medela.

Vstio.

*Pulmonis
erysipelas.*

- A** tinet pectora. & parum loquitur. & rubor est in facie. & pruritus fert in corpore. & præ dolore decumbere non potest. Sed ipse seipsum anxius iactat. Hic in septem diebus moritur. Veruntamen in principio quum sic habuerit, per hæc curatur. Corpus quidem perfrigeretur, betis in aqua frigida tinctis, ac corpori impositis, in recenti maxime dolore. Aut lintea frigida aqua tincta ac expressa apponito. Et si quidem sic melius habuerit, satis est: Sin minus, terram figularem frigidam pro cataplasmate imponito. & sub dio decumbat. Sic enim tractatus sæpe septem dies effugerit. Quum autem septem dies præterierint, & dolor adhæserit, dolentem partem intus, cum oleo illinito, & tepefactoria eadēque in pleuritide adhibeto: & potionem ad subpurgationem ipsi dato, ex peplio, & meconide, siue peplo, & grano cnidio. Et post purgationem, lenticulæ heminam absorbendam dato. Bibat autem aquā. Postera die multa calida aqua ipsum lauato, capite excepto. Postea origanum in aqua multa macerato, & bibendam dato. Potibusque quā calidissimis utatur. Cibus autem accipiat eosdem quos & qui à pleuritide correptus est, si non febris adhæserit. Hic morbus grauis est, & pauci effugiunt. Si pectus & dorsum dirupta fuerint: (Dirupuntur autem maxime à labore) æger hæc patitur. Tussis obtinet acuta, & saliuam expuit aliquando suberuentam, & rigor & febris plerumque corripit. & in pectore, & in dorso, dolor inest acutus. & in latere velut lapis incumbere videtur, & à dolore perpetuo pungi, velut si quis acu stimulet.
- C** Huic quum sic habuerit, statim lactē in potu dato, pectus & dorsum inurito. Et sic celerrime sanus erit. De cætero verò quietam maxime corpori vitam degat. Si quid enim laborarit, & aut currum, aut equum ascenderit, aut humeros oneri subdiderit, periclitabitur ne rursus morbus recidiuā faciat. Et si hoc contingat, periculum est ut corrumpatur. Morbus enim reuersus magis premit quā ab initio. Si verò non fuerit usus, ipsidem ipsum curato quibus & suppuratum, prohibitionibus, & potibus, & cibis. In summa verò, quietem agat, & commodis cibis alatur, Si enim sic tractatus fuerit, celerrime sanus erit. Morbus autem grauis est. Si in latere tuberculum nascatur, & suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor tenet & febris, & tussis sicca per multos dies. Et dolet latus. & ad mam

*Medela.**Curatio.**Pectoris
scapulariū
scissura.**Tuberculi
lateris.*

HIPPOCRATIS LIBER

Curatio.

ad mammam, & ad clauiculam, & ad scapulas, dolor impetū D
facit. Hic quum sic habuerit, in primis decem diebus sorbi-
tionibus vtatur, ptisanæ succo cocto melle affuso, quum sor-
bitio cocta fuerit. Vino autē vtatur albo, dulci, aut austero, &
aquofo. Et vt vinū sæpè sorbeat, ac expuat iubeto. Et à som-
no impedito, donec vndecim dies præterierint. Post hos dies
cibis paucissimis vtatur, carnibus catulinis aut galli calidis.
Oportet autem ipsas probè cum iusculo preparare, & iusculū
absorbeat. Et sorbitionibus prius quàm cibo vtatur. & ne si-
tiant, donec latus suppuratum fiat. Suppuratur autem maximè
in quadraginta diebus, aut paulò prius. Hoc autē cognosces,

Puris emissio.

ubi suppuratum fiat latus. Pus enim non expuit, neque reuo- E
mit. Hunc quum sic habuerit, ubicunque tumor significatio-
nem de se præbuerit, secato aut vrito. Et postea pus paulatim
emittito. Et postquàm exhausteris, linamētum crudi lini im-
mittito & hoc posttridie rursus exempto, paulatim pus exhau-
rito. Deinde rursus linamētum indito, & rursus tertia die, &
alijs deinceps, bis per diem exhausto, donec resiccatum fue-
rit. Dato autem & cibos & obsonia, si admiserit. Et bibat mo-
dicum non multum, siue vinū, siue aquam. Edat etiam ori-
ganum tenellam plurimam melle tinctam. Si verò tenellam
non habeat, siccam tritam & melli ammixtam plurimā ex-
hibeto. Et neq; frigeat, & balneis lauet, & molliter cubet. Et
sic hunc morbum curans, celerrimè sanum feceris. Quum au-
tē sanus euaserit, vitet frigus, calorem, solem. Et deambu-
lationibus modicis vtatur post cibum, vt ne lassitudo corpus F
corripiat. Hæc faciens sanus erit. Ex his morbis quoscunq;
vsseris, statim post vstionem, porrum multum tritum super
vsturas imponito, & per diem vnā finito. Tres sunt tabis

Tabis tres species.

species. Prima quidem fit à pituita. Quum enim caput pitui-
ta impletum agrotarit, & calor accesserit, pituita in capite
computrescit, vt quæ moueri non potest vt decedat. Postea
quum crassæfactæ fuerint & putrefactæ ac superexpletæ ve-
nulæ, fluxio in pulmonē fit. Et pulmo ubi susceperit, statim
agrotat, vt qui à pituita mordetur quæ salsa est ac putrida.

Hæc igitur æger patitur. febris debilis inuadere incipit, &
rigor, & dolet pectora ac dorsum. Aliquādo etiam tussis præ-
mit acuta, & expuit saliuam, multam & liquidam ac salسام.
Et hæc quidē in principio morbi patitur. In progressu verò

corpus

- A** corpus attenuatur, cruribus exceptis, hæc enim intumescunt, & pedes & ungues contrahuntur, ex humeris autem tenuis & debilis est, & fauces velut lanugine implentur, & velut per arundinē sibilat: & fortiter sicut per totum morbum: & multa impotentia corpus habet. Hic quum sic habuerit, in anno corruptus malè perit. Verum studiū quàm maximè adhibere oportet, ac rescire. Et primū quidem veratrū bibendum dare, infra autem subpurgare epithymo, aut peplio, aut grano cnidio, aut tithimalide. Hæc quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis. Dandū est & lac asininū coctum ad subpurgationē, aut bubulum, aut caprinum. Bibat etiam crudum lac bubulum, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, per quinque & quadraginta dies. ammixto etiā origano. Caput autē ipsius prius purgetur, pharmaco ad nares appposito. Cibaria autem & obsonia dentur, neque pingua, neque nidorosa, neque valde acria. Hæc autem morbum observando facere oportet, & deambulationibus ad cibos uti, observando ne frigeat. Hyeme verò iuxta ignem habitationem faciat. Vinum autē bibat austerum, nigrū, quàm vetustissimum ac iucundissimum, verum modicū. Et si tibi visum fuerit, ante pharmacū fomentum adhibeto, & sic pharmacū daro. Si verò dare nolueris, factō fomento, vomitum ex cibis facere cogito, velut prius scriptum est. Huic si commodæ fuerint, deambulationibus utatur. Si verò non conducant, corpore quàm maximè quiescat. Hic hoc modo tractatus, facillimè in morbo deget.
- C** Est autem morbus lethalis, & pauci hunc effugiunt. Secunda tabes fit à labore. Eadem autem æger patitur quæ & prior. Morbus autem hic magis priore quiescit, & æstate remittit, Salivam verò expuit crassiorē priore, & rursus premit maximè senes, & dolor fortior est in pectoribus, & velut lapis incumbere ipsis videtur. Dolet etiam dorsum. Et color ipsius limpidus existit, & si quid laborarit, flatus & anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maximè moritur. Curare autem oportet iisdem, quibus etiā priorem.
- Hic morbus multis adhæret vsque ad tres annos, sed moriuntur. Estq; morbus grauis. Tertia tabes. Ab hac hæc patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autem similiter & à cavi venis. Hæc verò pituita hydropiformi, & bile replentur. Patitur autem eadem, ab utris tandem tabescat.

*Medela
qua.*

Tabes secunda.

Tabes tertia.

HIPPOCRATIS LIBER

Curatio.

tabescat. Et homo statim niger sit ac subrumidus. Et partes **D**
sub oculis pallidæ sūt. Et venæ in corpore pallidæ distentæ
sunt, quædā verò valdæ rubicundæ. Maxime autē manifestæ
sunt, quæ sunt sub alis. Et sputum pallidum, quæ ubi ipsum inua-
ferint, suffocāt: & tussire volens aliquando nō potest. Quan-
doque autem præ suffocatione & tussendi cupiditate, bilem
aceruatim vomit, aliquando verò pituitā. Sæpe verò etiā ci-
bos quum comederit. Et ubi reuomit, leuior sibi esse vide-
tur. Deinde modico tempore interposito, in iisdem dolori-
bus iacet. Hic etiā acutius loquitur quàm quū sanus esset. Et
rigor ac febris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hunc
ubi sic habuerit, cibis & sorbitionibus, & potibus ac pharma-
cis, & reliquis omnibus curato, velut priores. Morbus autem **E**
durat maxime annos nouē. Postea durat dum corrumpitur,
pauci verò ex ipso effugiunt. Grauis enim est morbus. Si ve-
rò voles, sic ipsum curato. Primum fomentū adhibeto, & ubi
fomentū adhibueris, postridie aquæ mulsæ dimidiū congruū
ipsi bibendum dato modico aceto affuso, & hæc citra respira-
tionem bibere iubeto. Deinde stragulis ipsum ad multum ac
quàm longissimum tempus cōtegito. Si verò nō sustineat, &
euomere velit, vomat. Si verò vomitus nō sequatur, tempore
iam aliquo interposito, aquæ tepidæ poculo magno super-
ingesto vomat, irritatione per pennā facta. Quum verò euo-
muerit, vt bene habeat, quietē agat per hūc diem. Vbi autem
cena tempus fuerit, cenet mazam modicā, & obsoniū ha-
beat, balsamentū & porrum. Hæc autem quàm plurima edat. **F**
Vinum verò bibat dulce. Reliquo tempore per totam diem,
exordio manē factō, multa calida lauetur, & post balneū ca-
uere oportet, vt ne frigescat, sed decumbens plurimo tempo-
re dormiat. Quum autem à somno surrexerit, viginti stadia
minimum circumeat illa die. In alijs autē diebus alia quin-
que stadia prioribus addens vadat, singulis diebus additione
facta, donec ad centū stadia perueniat. Ventrem verò quoti-
die subpurgare oportet, succis betæ, & à brasiæ, ita vt vtrā-
que seorsim coquas, & de vtraque congruum excoles. Deinde
adipis à rhēnibus detracti minæ quadrantē ammiscas ac si-
mul coquas, in vtrisque succis diuisim facta coctura. Quum
autē bibere voluerit, ad brasiæ quidem succū, salem adijci-
to. Ad betæ verò succum, mel affundito. Licet autem seorsim
vtranque

A vtrang; bibere: Aut melle in alterum poculum affuso bibar, in alterum verò immisso sale. Ebibere autem oportet totum succum, & hæc facere per triginta dies. Secundo verò mense edat panē, & carnes pingues suillas coctas, aliud verò nihil. Vinum autem bibat album, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante cœnam. Post cœnam verò decē. & ne frigeat, sed contegatur. Hæc si fecerit, leuius morbu feret. Tertio autem mense cyceonem floridum bibat, apij radices, & anethum, & rutam, & mentā, & coriandrum, & papauer tenerum, & ocimum, & lentē, & mali punici dulcis & vini succum. Oportet autem dulcis duplam mensurā esse, ita ut vtriq; succi simul sit hemina dimidium, & vini nigri iucundi austeri hemina dimidium, & aque hemina dimidiū.

B Postea flores triti in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea farina erui acetabulum adijciatur, & polentæ tantundem, & casei veteris caprini rasi tantundem, & hæc permixta eibat. Deinde modico tempore interposito prandeat panem, & obsonium habeat, frustum torpedinis aut squatinæ, aut galei, aut raiæ. Et carnes suillas edat coctas & crasse faciat seipsum, quietem quā maximè agens. Et decimo quoq; die fomentum sibi ipsi leuiter adhibeat. Quarto autem mense, quinto quoque die leuiter fomento vtatur. Et edat obsonium plurimum. Sint autem obsonia, caseus, & carnes ouillæ coctæ paucæ. Et iter faciat per stadia, velut antea dictum est. Et prima quarti mensis die, initio à decem stadiis facto eat, & quotidie addat, donec octuaginta stadia fiant. & deambulet in die stadia octuaginta. Ante cœnā, triginta. Post cœnā, viginti. Mane triginta. Reliquo verò tēpore victu vtatur, mazā & panē vtrāq; edens. Et obsoniū habeat, chartilaginea. Sed & carnes oēs edat, exceptis bubulis ac porcinis. A piscibus autē is abstineat, à mugile, anguilla, & melanuro. Edat autē torpedinē, squatinā, raiā, galeū, pastinacā, & ranas. Ex alijs nihil. Si verò videat innoxius esse, etiā cyceonē bibat. Postq̃ autē dormire voluerit, bibat de vino nigro, iucundo, veteri, poculū duarū heminarū. Et per diē eodē vino vtatur inter cibū. Et in die iter faciat per stadia centū quinquaginta. Ante cœnā nonaginta. Post cœnā, viginti. Mane, quadraginta. Hic nō mō curatus, in anno sanus euadit. Resiccatur medulla spinalis maximè, quā venulæ ad medullā tēden

*Secundi mē
sis curatio.*

Tertij.

Quarti.

*Medulla
spinalis cur
arescat.*

HIPPOCRATIS LIBER

tes fuerint obturata, itemq; ex cerebro accessus. Propter cor D
poris autem afflictionem hæc patitur, & ægrotat. Rescicatur
etiam à venere. Hæc igitur patitur. Dolor acutus incidit ipsi
in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborū musculos,
& in articulos crurum, vt aliquando flectere non possit. Et
stercus non secedit, sed sistitur. Et vrine difficultate vexatur.
Hic in principio quidem morbi quietius degit. Quāto autē
magis tempus morbo prolongatur, tātō magis omnia dolet.
Et crura velut ab aqua inter cutē tument. Et vlcera à lumbis
emergunt, & alia quidem sanescunt, alia verò nascuntur. Huic
quum sic habuerit, caput purgato, hippophais succo, aut cni-
dio grano, corpore prius valde bene foro. Vesperī verò post
purgationem, ptisanæ duas heminas sorbeat, melle affuso. E
Vinum autem bibat albū molle. Postera die asinini lactis co-
cti, melle affuso, octo heminas ebibēdas ipsi dato. Si verò asi-
ninum nō habeas, bubuli, aut caprini cocti tres semicōgios,
melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, lac bibat,
sero & lacte vtens, per quing; & quadraginta dies. Cibis au-
tem & obsonijs vtatur quam maxime per aluū secedētib;.
Vinum bibat album molle, Meadesium. Quum autem cras-
sissimus fuerit, in lumbos ipsius ab vtraq; verticulum parte
crustas quatuor inurito, & in dorsum vtrinque quindecim.
& in ceruicem duas, inter tendines. Si enim vstio successerit,
sanum facies. Est autem morbus hic grāuis. Quatuor morbi
à rhenibus fiunt, A primo hæc patitur. Dolor acutus incidit
in rhenē, & in lumbos, & in testem secūdm rhenem situm. F
Et frequenter mingit, & adstringit paulatim ac supprimitur
vrina, & cum vrina procedit arena. Et vbi per vrine meatum
exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Quum autem
ipsam per vrinam eiecerit, dolor remittit. Postea verò rursus
in ipsdē doloribus iacet. Quum autē mingit, etiam colem
præ dolore fricat. Vulgus autem medicorū quod non intel-
ligit morbum, vbi videt arenam, putat vesicam ē calculo la-
borare. At nō vesica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus sit
a pituita, quum rhen susceptam in seipsum pituitam, nō rur-
sus dimiserit, sed in ipso in totum concaluerit, & sunt ex ea
tenues lapilli, velut arena. Huic quum sic habuerit, cum sca-
monis succo aut ipsa radice, fomento prius adhibito, totum
corpus purgato, postera verò die duobus congijs succi cicoris
albi

Medela.

Vstio quæ.

Rhenem
morbi qua-
tuor.

Medicorū
error.
Calculi
caussa.

M. dela.

exercitia

etiam valde gferant, vnde infra. 334 c

- A** albi subpurgato, quē sale inieſto bibendum dabis. Poſt hæc potibus, & cibis, & balneis curato, & eadē quæ in vrinæ ſtillicidio exhibentur pharmaca dato. Quum autē dolor preſerit, multa calida lauato, & tepeſactoria qua parte maximē dolet, adhibeto. Cū, autē intumuerit & eleuatus fuerit, ſub id tempus iuxta rhenem ſecato, & extracto pure arenam per vrinam ciētia ſanato. Si enim ſectus fuerit, fugæ ſpes eſt. Sin minus, morbus homini cōmoritur. Secundus rhenem morbus. Dolores fortiter premunt, velut in priore. ſit autē morbus à labore, quum ruptæ fuerint venulæ ad rhenem tendentes, & poſtea rhen ſanguine repletus fuerit. Hic vbi hæc patitur, cū vrina ſanguinē mingit in principio morbi, deinde *Secundus rhenis morbus.*
- B** progreſſu temporis pus: hic ſi quietem corpore habuerit, ceſſerimè ſanus erit. Si enim quid laborarit, dolores multo magis obtinebunt. Quum itaq; ſuppuratus fuerit rhen, circa ſpinam intumeſcit. Hunc vbi ſic habuerit, circa tumentē partem ſecato, profunda maximē ſectioe iuxta rhenē. Et ſi quidem ſucceſſerit ſectio, euſtigio ſanum facies. Si verò aberraueris, periculum, eſt ne vlcus linamētis curandū fiat. Si autē concreuerit vlcus, venter intrinſecus à rhene ſuppuratur, & ſi quidem pus intus rumpatur, & ad inteſtinum rectum procedat, fugæ ſpes eſt. Si verò contigerit alterum rhenem, periculum eſt ne pereat. Curetur autē pharmacis, & iſſdem omnibus, quibus & prior, & diatā eandem habeat. Hic morbus grauis eſt, & multi ex ipſo ad tabem rhenalem deuenerunt. *Morbushic qualis.*
- C** Tertius rhenem morbus. Vrina prodiit, velut à carnibus bubulis aſſatis ſuccus. ſit autem morbus ab atra bile, cūm bilis in venas confluxerit quæ ad rhenem tendunt, & cūm conſtiterit, exulcerat venulas & rhenē. Ab vlceratione igitur tale quiddam cum vrina procedit, Dolores autē herent in lumbis, & in veſica, & inter anum & pudendum, & in ipſo rhene ad modicum tēpus. Deinde remittit dolor, & rurfus acutus breui corripit, & in tenuem ventris partem aliquando dolor incidit. Huic quum ſic habuerit, vtrēm ſubpurgato, epithymo, aut ſcammoniæ radice. Bibenda verò eadem dato, quæ & ex vrinæ ſtillicidio laborāti, & quum dolor habuerit, multa calida lauato, & tepeſactoria ad dolentē maximē locum adhibeto, & forbitione vtatur farina cocta, melle aſuſo, & reliquo victu vtatur quàm maxime per aluū ſecedente, & vinū *Curatio.*

Tertius rhenis morbus.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

bibat album Mendacū mellei coloris. Aut aliud albū iucundissimum probè temperatum. Hic morbus nō valde deficit. & pro temporis opportunitate serum & lac bibat. Serū quidem ad purgationem. Lactis autem potū faciat in tempore per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si ita feceris, morbum in melius dispones. Quartus rhenum morbus. Morbus hic fit à bile & pituita, maxime tempore ætatis. fit etiā à venere morbus. Hic æger hæc patitur. Dolores premunt ipsū in lateris mollitudinē. & in lumbos, & in lumborū musculos: & patitur qualia solet mulier ex partu laborans, & non sustinet in sanam partem decumbere, sed valde dolet. & ex lateris mollitudine quædam pēdere videntur, velut abrupta. Si verò pronus decubat, nō dolet. pedes & tibiæ ipsius semper frigent. Vrina verò vix prodit, præ pituitositate & crassitudine sua. & si fueris ipsam ad modicum tempus depositam donec defecerit, videbis subsidentiam crassam, velut farinam, & siquidē bilis præualuerit, subfuluā ipsam videbis. Si verò à pituita fuerit morbus, alba & crassa erit. & primū quidem in annum, aut paulō amplius aut breuius tempus, æger talia patiēs perseuerat. Si verò prolongetur morbus, & magis dolet, & suppuratur. & quum suppuratus factus intumuerit, quæ maxime parte intumuerit, in rhenem secato, & pus emittito & si quidem successerit sectio, statim sanum facies. Hūc cū sic habuerit, iisdem omnibus curato, quibus etiam priores. Et à principio morbi oportet & purgare, & ante subpurgationē fomentū adhibere, & balneis frequenter lauare. Vngatur item & magis calefiat, neq; frigeat, & à sole abstinenceat: & neq; venere vtatur. Hæc si fecerit, & nō celerrimè sanus euaserit, nihil noui est. Morbus enim est grauissimus. Si verò citra pharmaca curari velit, crassum ex diæta facere oportet, siue ex hoc morbo ægrotet, siue ex aliquo de prioribus, diuisis cibis quos edere solet in decē portiones, ita vt vna parte detracta, reliquas comedat. Obsonium autē habeat, carnem suis tritam. & ea die decē stadia deambulet. postera verò die & tertia vsq; ad decem dies, portionem minus edat, & deambulet decem stadia aut plura singulis diebus addens. Quum autem ad vltimam cibi portionem deuenierit, etiam ad centum stadia iter faciat. & edat quidem vnā tantū portionem, & ea die centum stadia deambulet. Post cœnam autem viginti

Quartus
rhenū mor-
bus.

Curatio.

Obsonium
obseruato.

A viginti, mane verò quadraginta. Vinum autē bibat Mendacū album, austerum, atque hæc per tres menses faciat. postea reliquo tēpore deambulationes imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta velut detrahebat. Deambulationem verò detrahat vsque ad decimū diem, & post ea quā maximē quietē habeat, & cibis puris alatur, & obsonia quā pinguisima habeat, & dulcia omnia ipsi cōmoda sunt. Ab oleribus autē, & acidis omnibus abstineat, itemque ab acribus, & quæ flatū faciūt. Multa etiā calida lauet, & ne frigeat. Hæc si fecerit, celerrimē sanus erit. A rhenū morbo corripit inorbus magnus venarum cauarum, quæ à capite iuxta iugulum per spinam tendunt, ad malleolū pedis externum, & ad intermedium magni digiti locū. Morbus hic fit à pituita & bile, quū in venas cōfluxerint. Venæ autē hæ sanguine plenæ sunt. Si igitur quid alieni in ipsis præter lapsum fuerit, agrotant. Si dextram partē morbus corripiat, dolorē ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto autem amplius tempus progressum & prolongatum fuerit, tanto acntior dolor infra descendit, & quum ad malleolum pedis externum, & ad magni digiti inter mediū locum deuenit, rursus ad caput venire incipit, & vbi in ipso vlcus cōstitit, fortiter premit, & homo caput sibi distringi putat, & oculi pituita replentur, itemque totum corpus. huic quum sic habuerit, elaterium bibendum dato, aut thapizæ radicē, aut veratri, aut succum scammoniz, post purgationē verò eadē

C exhibeto quæ superioribus. Si verò ab hac curatione non desinat, lacte ipsum crassefacito, & in scapulam dextrā quatuor costas inurito, & in acetabulū coxæ dextræ, tres: & sub natiuas: & in medio femore, duas: & supra genu, vnā: & supra malleolum, vnā. Hic vbi sic vltus fuerit, neq; sursum neque deorsum morbū procedere permittit. Si verò alicubi dolor ruptus visus fuerit, si quidem in crus incubuerit priusquā vratur, claudus erit. Si verò in caput, surdus aut cecus. Si verò in vesicam, prodit simul cum vrina sanguis maximē, per quadraginta dies. Verū si in vesicam eruperit, eadem pharmaca quæ & in vrinæ stillicidio dato, & si alicubi dolor congregatus fuerit, vrato. Vrere autem oportet carnosā quidem, ferior ossēā verò & neruosa, fungis. Cæterū ante hæc si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendū

Quam morbus hinc fiat.

Medela. anceps.

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

est vinum album Mendæum, aquosius, plurimum per diem, D
& inebrietur donec sanguis à naribus erumpat. Quum autè
fluere inceperit, minimum tres & decem dies fluit. Vbi verò
hi dies præterierint, non ampliùs inebrietur, neq; vbi semel
fluere inceperit. Bibat tamen paulò ampliùs vinum inter ci-
bum, quo sanguis fluere possit. Iam verò quibusdam sedato
sanguine, erupit in vesicâ, & prodijt sanguis ac pus. Si igitur
eruperit, eadè pharmaca quæ & ex vrinæ stillicidio laborât
dato. Et de eodem vino plus bibendum exhibeto. Hic si ita
curetur, & cibos per aluum secedentes assumat, & obsonia
eiusdè facultatis, citissimè sanus erit. Morbus autè grauius est.

Vena fini-
stralaesa. Alius morbus à sinistra vena. Hic ager alia quidem e-
dem patitur, quæ etiâ prior. Verùm in splenem dolor acutus E
incumbit statim, & in principio morbi. Et si nò intellexerit
priusquàm incubuerit, profilit in pulmonè. Huic per fungos
crustas octo inurito, capita lienis quàm celerrimè interci-
piens. Et vbicunq; alius dolor incubuerit, vrito. Sic enim sta-
tim sanus erit. Si verò nò fuerit vstus, sanus autè sponte fiat,
plerisq; post duodecim annos, morbus rursus reuertitur, & si
splenè occuparit, multis aquam inter cutem inducit. Verùm
oportet statim curare velut priorem, & si visum fuerit, vrere
velut priorè, si dolor in iisdem articulis cõstiterit. Si verò nò
sic curatus fuerit, de cætero colliquescens moritur. Morbus
enim grauis est. De pituita easdem sententiâ habeo, quas &
de bile, & species ipsius multas esse puto, & alia quidè popu-
laris est, quæ sanè recētissima est. Cuius etiâ curatio facilima F
est. Vomitus enim post cibū facere oportet per duos aut tres
dies, ita vt & prandeat insuper ac quiescat, si prioribus die-
bus semel in die cibū capere, & laborare solitus fuit. Sin mi-
nus, huiusmodi diætâ vtatur. Primum multa calida lauetur,
quò vomitū facere voluerit, & edat mazâ oleo & melle sub-
actam, & panem exassatū veterem. Hæc enim magis pituitâ
trahūt. Obsonijs autè vtatur & oleribus acribus. Sed & pin-
guia, & dulcia, & acida omnia idonea sunt, vt permixta assu-
mantur. Et oleribus omnibus viridibus vtatur. Et bibat inter
cibum frequenter modicum vinū dulce, & in fine placentam
insuper edat, & mel, & ficus. Et quò coenabit, pocula largè ex-
hauriat, & vbi iam repletus fuerit, parū dormiat. Deinde ex-
perrectus vomat, magno vini poculo epoto, cum tepida aqua
temperato.

Vena fini-
stralaesa.

Medela.

Pituita.

Curatio.

Victus.

Vomitus
qui.

A temperato. Trahit enim magis pituitam & humorem ex car-
nibus, & corpus magis resiccat. Euomat autē donec ficus euo-
muerit. Hæ enim postremū euomuntur. Atq; hæc quidē hæc
die faciat. postera verō contineat seipsum vsq; ad cœnam, &
in cœna sumat panem, cui nihil fursurū decessit. Obsonium
autem sit ex fortioribus. Vinum verō bibat nigrum, austerū.
Atque hæc quidem popularis pituitæ medela est. Si verō ede-
re & bibere potest, & cibis delectatur, deinde verō crura gra-
uentur, & color immutatus fuerit, huic ostendendum est, pi-
tuitam molestantem in ventre esse. Verū oportet quum sic
habuerit, mel & vinum dulce, & oleū, & nitrū tali ouilli ma-
gnitudine, permixta per clysterem infundere. hæc enim mi-
tissima sunt in clysterem ad hominis naturam. Mensurā au-
tem singulorum esse oportet, vini quidem heminam, olei ve-
rō hemina dimidium, & mellis tantundē. Si verō clysterem
non voluerit, humectum hominē facere oportet, fomēto hu-
mido admoto. Fortassis enim etiā sit stercus subeuacuari po-
terit. Nam à ciborum nimia resiccatione hæc patitur. Siqui-
dem igitur quis edat cibos valde succosos, fortassis hæc non
ita vehementer patiatur. Si verō etiā aliquando patiatur, mo-
dica curatione opus habuerit. Hunc ita curans, celerrimē sa-
num feceris. At si antiquior fuerit pituita, appellatur autē
hæc pituita alba, hæc patitur. Grauat hominem magis, & spe-
ciem à populari alienā habere videtur pallidiorem & totum
corpus laxo tumore intumescit, & facies rubet, & os siccū est,
& sitis tenet: quum comederit, spiritus densus ipsi incidit.
C Hic eadem die aliquando melius habet, aliquando derepen-
te dolet, & sibi mori videtur. Huic si quidem vëter sua spon-
te turbatus fuerit, sanitati proximus erit. Si verō nō sua spon-
te venter turbetur, purgare oportet cneoro dato, aut hippo-
phæ, aut cnidio grano, aut lapide Magnesiæ. Et post purga-
tionē, lenticulæ hemina vna aut duæ dentur ad absorbendū.
Coquatur autem allium in lēricula. Detur etiā betæ pinguis
hemina non conditæ, polenta circuminspersa. Bibat vinum
nigrum, austerū, & forte. Postera verō die mane stadia vigin-
ti deambulet. A qua deambulatione reuersus, panē edat par-
um exassatū, & obsoniū habeat allium coctū, & de eodē vi-
no paulo meracius bibat. deinde stadia vadat triginta, & vbi
tempus aderit cœnet, quantum etiam prandere cōsuevit: ob-

*Qua facillē
subluant.*

*Qua venter
moueant.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Quo caro
piscis
dandi.*

*Mortis hu-
ius causa.*

Medela.

*Aqua in-
ter cutem de
pituita qui
fiat.*

Vitula.

sonium autem habeat, maxime quidem pedes, & capita suil- D
la. Sin minus, galli carnibus & suis tritis vtatur. Ex piscibus
autē scorpio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut go-
bio, aut alijs piscibus qui aequalem facultatem habet. Ex ole-
ribus autē solo allio, & nullo alio vtatur. Hoc verò quā plu-
rimum edat, & crudum, & assatū, & coctum, semper plus sin-
gulis diebus, & laboret ex modico amplius, respectu ad cibos
facto. hic morbus maxime fit tempore aestatis ex aque potu.
Insper & à somno multo. Iudicatur autē in triginta diebus,
an lethalis sit, aut non. Atque hæc quidem faciat vbi tri-
ginta dies præterierint. In primis autē diebus, sorbitionibus
vtatur, lenticula cocta acidiorē ab aceto, & pristana acida. Bi-
bat aquam mulsam tepidam, polēta modica inspersa, quo cor E
pus præparatū sit ad pharmacorū potū. Et his diebus sub diu
dormiat, & si tibi visum fuerit sanguinē à lumbis detrudere
cucubitat affigito, & venas in seroto crassissimas secato. hic
ita curatus citissimē sanus fiet. A pituita maxime in aquam
inter cutem trāitus fit, hoc modo. pinguedo colliquescit, & à
calore qui in pituita est, fit aqua. Cognosces autē hoc an quis
sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pinguedi-
nem habet, fieri non potest vt ipsum sanes. Cognosces autem
ex his maxime, an pinguedo insit in pectine, aut non. Si qui-
dem febres succedat, & nō potest exurgere, & umbilicus in-
flatus extra prominet, indicium est non amplius inesse pin-
guedinem, & sanabilem esse. Huic conducit vētem siccare,
& panem dare cui nihil furfurum decessit, antiquū calidum. F
Obsonium autem carnē leporinam, & canis perfecti, & ou-
culz, & suis assatam, & galli assatā ac calidā, & polypos edat
coctos in vino nigro austero. Vinū autem bibat nigrum, au-
sterum quā crassissimū ac acerbissimū. Piscibus autem vta-
tur, gobio, dracone, callionymo, cuculo, scorpio, & alijs huius
modi, omnibus coctis, non recētibus, & frigidis. hi enim sic-
cissimi sunt, & in iusculū ne intingat, & insulti sint pisces. ex
oleribus autē vtatur raphanis, & apio. Torreat autē lenticulā
ab aceto acidiorē, & edat. Et deambulet quotidie, & post coe-
nā, & mane, & serotino tēpore dormiat, & mane exurgat. Et
si quidē ab his restituitur, satis est: Sin minus, cneorū, aut hip-
pophais succū, aut granū cnidiū, bibendū dato. Et post purga-
tionem, lenticulz heminas duas sorbeat, & panē parū com-
dat.

A dat. Vinum verò bibat nigrum, acerbum modicum. Bibat autem pharmacutn bis in die, donec vacuus fiat. Si verò tumor constiterit in seroto, & femoribus ac tibijs, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficies.

Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore siti vexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maxime fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorem vehementem exhibet, ut pinguedo quæ in arterijs inest colliquefeat. & si semel liquari pinguedo inceperit, multo amplius in brevi tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora ru-

B pra. Quod autem fiat etiã à tuberculis aqua inter cutem, testimonij habeo, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maxime sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habet. Si enim dissecueris, citissime cognoueris. Fluere enim aqua. Videntur autem talia multo magis in homine fieri, quàm in pecoribus, quanto etiã morbosiore diætã utimur. Facti sunt autem & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum cõsequuntur. Tussis sicca, & fauces exasperari videntur, & rigor ac febris succedit, & erecta ceruice spiratio. & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur. & donec quidem in superno ventre fuerit aqua intercus, adest dolor acutus. postquam autem ad infernum ventrem venerit, melius habere sibi videtur. Postea progressu temporis patitur qualia prius impleto ventre. Quandoque etiam ad latus intumescit, & indicat ubi secare oportet. Si verò non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in vitro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiam ab vltima vsque ad os secato. Deinde cum terebra caua vltra perforato. Et ubi perforata fuerit, aquæ parũ emittito, & ubi emiseris, linamentum ex crudo lino indito, & spongiã mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decima tertia totam aquam emittere, et reliquo tempore si subnascatur aqua emittere, et ventrem cibis resiccare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succus silphij drachmæ pon-

Tubercula pulmonis.

Exemplo probat.

Purulentis etiam hinc fiunt.

C dat. Vinum verò bibat nigrum, acerbum modicum. Bibat autem pharmacutn bis in die, donec vacuus fiat. Si verò tumor constiterit in seroto, & femoribus ac tibijs, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficies. Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore siti vexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maxime fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorem vehementem exhibet, ut pinguedo quæ in arterijs inest colliquefeat. & si semel liquari pinguedo inceperit, multo amplius in brevi tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora ru- pra. Quod autem fiat etiã à tuberculis aqua inter cutem, testimonij habeo, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maxime sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habet. Si enim dissecueris, citissime cognoueris. Fluere enim aqua. Videntur autem talia multo magis in homine fieri, quàm in pecoribus, quanto etiã morbosiore diætã utimur. Facti sunt autem & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum cõsequuntur. Tussis sicca, & fauces exasperari videntur, & rigor ac febris succedit, & erecta ceruice spiratio. & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur. & donec quidem in superno ventre fuerit aqua intercus, adest dolor acutus. postquam autem ad infernum ventrem venerit, melius habere sibi videtur. Postea progressu temporis patitur qualia prius impleto ventre. Quandoque etiam ad latus intumescit, & indicat ubi secare oportet. Si verò non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in vitro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiam ab vltima vsque ad os secato. Deinde cum terebra caua vltra perforato. Et ubi perforata fuerit, aquæ parũ emittito, & ubi emiseris, linamentum ex crudo lino indito, & spongiã mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decima tertia totam aquam emittere, et reliquo tempore si subnascatur aqua emittere, et ventrem cibis resiccare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succus silphij drachmæ pon-

Curatio.

dus parato, & aristolochiam tali ceruini magnitudine dera. D
 dito, & lentium ac erui torrefactorum polentam, dimidiaz
 choenicis mensura vtranq; purgato, atq; hac melle & aceto
 subigito. Deinde pastillos sexaginta efformato, & quotidie
 vnum tritū in vini nigri austeri ac iucundissimi hemina di-
 midia diluito, & mane in pota daro. Reliquum verò victum
 ac laborem eundem, velut priori tempore, habere iubero, Et
 si intumuerint pudenda ac femora, confidenter vulnusculis
 impactis pertundito. Hunc si ita curaueris, celerrimè sanum
 facies. Ab hepate fit aqua intercus, quum in hepar pituita
 accesserit, & hepar ipsam susceperit, & humectum fuerit. Sta-
 tim igitur calorem huic exhibet, & flatum inducit. Deinde
 temporis progressu aqua impletur. Postea morsus in corpus
 incidit. Et tumor in tibijs ac pedibus inest, & hepar durum
 est ac intumescit, & clauiculae attenuantur. Huic quū sic ha-
 buerit, in principio si hepar doluerit, origanum tritum, & sil-
 phij succum erui magnitudine, in vini albi dimidia hemina
 diluta, bibenda dato. & lactis caprini poculum quatuor he-
 minarum, tertia aquae mulsae parte ammixta. A cibis autem
 per primos decem dies abstineat. Hi enim iudicant morbum,
 an lethalis sit, aut non. Sorbeat autem ptisanæ succū coctum,
 melle affuso. Vinum autem bibat album Mendæū, aut aliud
 iucundissimum aquosum. Quum autem decem dies præter-
 ierint, cibos accipiat puros, & obsonium habeat, galli carnē
 assatam calidam. Habeat & catulinam coctam. Pisce verò v-
 tatur galeo, & torpedine assatis. Vinum verò idem bibat. & F
 si quidem ab his quiescat, satis est: Sin minus, postquam sanē
 crassissimus factus fuerit, & hepar maximum, fungis vrito.
 Sic enim celerrimè sanum seceris. Iuere autē oportet cru-
 stas octo. Si verò aqua intercus innascatur, & rumpatur in
 ventrem, iisdem medicamentis & potibus, & cibis, ac labori-
 bus, quibus priores curato. Vinum verò bibat austerum ni-
 grum. Si verò tibi videatur discessisse ab hepate, per ferrum
 vbicunque apparuerit vrito, & aquam paulatim emittito, &
 velut reliquos priores curato. Si verò ab his non sanus fiat,
 temporis progressu corrumpitur ac moritur. Morbus enim
 est grauis, & pauci hunc effugiunt. Aqua verò intercus à
 splene, hoc modo fit, & ab huiusmodi maximè causa, quum
 quis ficuum viridiū, & malorū fructus multos ederit. Multi
 verò

*Aqua in-
 tercus ab
 hepate.*

Curatio.

*Aqua in-
 tercus alia.*

*Alia dli-
 ene.*

A verò iam etiam à cibo botrorum multorum, & à multo multo, morbum inciderunt. Si quidem igitur in morbum collabatur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti in splene consistūt, transeunt autem & in humerum, & in claviculam, & in mammam, & ad lumbos, & febres fortes tenet. Et si parum quid ederit, venter impleretur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si durauerit, reliquo quidē tempore minus dolet. Quum verò fructuū malorū tempus fuerit, & hos ederit, magis quàm prius dolet. Hunc ubi sic habuerit, à principio curato, & sursum quidem veratrum exhibeto. Deorsum verò cneorum, aut hippophais succum aut cni-dium granum, Lactis item alinini heminas octo, melle affuso: & si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, quū maximus fuerit lien, & maximè intumuerit, fungis vrito, capita eius intercipiens: aut ferramentis, cum multa cautione ac observatione ne ultra peruras. hæc à morbi principio facito, & hac dicta nutriatur. Si quidem febris non affuerit, panem vitur triticeo assato, aut ex duro tritico bis cocto: obfoniū autem habeat salsamentum Gaditanum, aut sapedā. Et carnem ouillam tritā. Et acida ac falsa omnia edat. Et bibat vinum austerū Coum quàm nigerrimū. A dulcibus abstineat. Quum autem exsurgit, & potens est, luctetur summis humeris, & labore per circuitus multos in die, & comedat ea quæ dicta sunt. Si verò aqua intercus fiat, iisdem curato quibus & priores. Alia aqua intercus ab his fit. Aestatis hora si iter faciens per viam longam, in aquam pluuialem ac stabilem inciderit, & biberit de ipsa multū assatim. Si igitur carnes absorbuerint & continuerint in seipsis aquam, secessus autem nusquam fiat, hæc patitur. Si quidem fuerit in carne, calorem facit & in ventre, & in corpore, ut pinguedo ventrē ambiens colliguescat. hic quandiu quidem iter facit, nihil mali habere videtur. Postquam autem iter facere cessarit, & sol occiderit, statim dolorem multū habet. progressū verò morbi valde attenuatur. Si verò etiam cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur. Si verò cibos edere poterit, & ad laborē impotens fuerit, etiam amplius læditur, & plerisq; horum tumor in totum corpus deducitur. Et tenui quidem color corporis liuidus fit, & venter magnus, & sitis fortis tenet, & viscera ipsius à calore resiccantur. progrediente verò tempore,

*Medela.**Alia aqua
intercus.*

HIPPOCRATIS LIBER

ad edendum quidem promptus sit, & edit quodcumque quis dederit, & bibit, & dolet nihil. Si verò tumor obtumuerit, color huic sit pallidus. Et venæ nigræ frequentes per corpus distenduntur. Indignatur autem & tristatur ex quavis re, etiā si nihil noui accidat. Venter verò aqua perhumescit, & magnus sit, & laternæ speciem præ se fert. Et temporis progressu cibos non admittit, sed videntur ipsi cucumeris sylvestris odorē habere, præ abominatione. huic ubi sic habuerit, cneori aut hippophais succum dato, aut cnidium granum. hæc verò pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidem per sextam diem, Hippophais autem succum per octauam. Cnidium verò granum per decimam. & dare ipsa oportet donec expurgetur, & vacuus fiat. Interpositis autē diebus alatur ex iisdē quibus & prior. Maximē autem de eadem aqua bibendū datur, ex qua morbus corripuit, plurimum, quo ventrem ipsius turbet, & valde secessum faciat. Sic enim potissimum sanum facies. Si verò tibi videbitur, etiā frequenter clysterem adhibeto, ex cneori triti dimidia hemina, mellis tertia hemina, & parte ammixta, his cum quatuor succi betæ heminis dilutis, atq; sic infusis. postea die etiā alinini lactis cocti octo heminae dentur affuso melle, aut adiecto sale potandæ. Et post purgationem, iisdem vtatur quibus prior. & interiectis diebus, cibis ac potibus iisdem vtatur, & deambulationibus similiter, & sic curatus breui à morbo liberabitur tertio mense, aut sexto. Si verò negligentia aliqua contigerit, & nō statim curatus fuerit, breui moritur. Sed & in attenuato iisdem vtendum est ad sanationem. Præhumescere verò antea corpus ipsius oportet per fomenta, quo magis pharmacis obediatur. At verò statim curā adhibere oportet. Sin minus, cum multis consenescit morbus. Sed & vter tandem morbus sit, clysterem ex his adhibere cōuenit. Vini albi heminas duas accipito, & mellis heminam dimidiam, & olei heminam dimidiam, Nitri Aegyptij rubri torrefacti quadrantem, foliorum cucumeris sylvestris usorum ac expressorum succi heminam. hæc omnia mixta & in ollulam infusa seruefacito, & per clysterem infundito. Morbus hepaticus. Fit ab atra bile, quum influxerit ad hepar. Accidit autem maximē in autumno, in mutationibus anni. Hæc igitur ager patitur. Dolor acutus ipsi in hepar incidit, & sub vltimas costas,

Curatio.

Morbus hepaticus paucus.

A costas, & in humerum, & in clauiculam, & sub mammam. Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando liuidam bilem reuomit. & rigor, & febris primis diebus debilior habet, & dum attingitur, hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, & cibi quos prius comedebat, suffocant ipsum, & ingesti vrunt ac torquent ventrem. Atque hæc quidem in principio patitur. Morbo verò progrediente, & febres remittunt, & à paucis cibis repletur. In solo autem hepate dolor restat, & ipse aliquando fortis, aliquando quietus. Quandoque verò acutus corripit, & sæpe derepente ager animam efflauit. Huic conducit vbi dolor habuerit, tum alia, tum tepefactoria eadem apposita, quæ etiam pleuritidi. Quum verò remiserit dolor, multa calida ipsum lauato, & aquam mulsam bibendam dato, & vinum album dulce, aut austerum, vtrum tandem profuerit. Et sorbitiones easdem quas etiam à pleuritide correpto. Ceterum ad dolorem hæc bibenda dato. Qui galinacei cocti liquorem terito, & succi solani dimidiam heminam affundito, & aquæ mulsæ dimidiam semiheminæ partem amisceto, diluto, ac bibenda dato, & sedabunt dolorem. dato autè quotidie donec dolor quiescat. Bibat etiam silphij succum erui magnitudine, & cum eo organum tritum in vino albo diluat, & sic ieiunus bibat. Bibat insuper & pharmaca quæ in pleuritide dantur doloris gratia. Bibat & caprinum lac, tertia parte mellis ammixta. Sin autem lactis heminæ quatuor. Hoc mane bibat, quum alia non biberit.

Medela.

C A cibis autem abstineat, donec indicetur morbus. Iudicatur autem maxime in septem diebus, in his enim manifestum sit, an lethalis sit, an non. Si verò etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet quo vomat. Mel, aquam, acetum, saleem, permixta in ollam nouam infundito. Deinde tepefacito, & origani capitati ramulis vnâ cum semine agitato. Vbi verò tepefacta fuerint, tepida ebibenda dato. Deinde stragulis iniectis contactum finito, donec quàm maximè exudarit. Et vbi vomitus ipsum apprehenderit, promptè vomat irritatione per pennam facta. Si verò vomere non possit, aquæ mulsæ tepidæ poculum duarum heminarum insuper bibat, & sic vomat. Et si quid pituitæ aut bilis euomuerit, rursus idem facere oportet ad horas quatuor. proderit enim. Post morbi verò iudicationem curato modicis cibis, ijsque puris datis, & si quidem

*Suffocatio
nis medela.*

HIPPOCRATIS LIBER

quidem panem edere cupiuerit, panem calidum maximè pum edat. Si verò mazam, eam quæ vino dulci subacta non est, edat, vbi tamè prius aqua subegit. Obsonium autem habeat carnes catuli coctas, aut columbar, aut pulli gallinacci carnibus, omnibus coctis vtatur. Ex piscibus autem galeo, torpedine, pastinaca, & rais paruis, omnibus coctis. Laetetur autem quotidie, & frigus vitæ & parum deambulet antea in securitate. Hæc si seruauerit non est timor vt morbus reuertatur. Nā huiusmodi morbus grauis est ac diuturnus. Alius hepaticus morbus. Dolores quidem eodem modo premunt in hepar, & color differt à priore. Malicorij enim formā habet. In tempore verò ætatis maximè incidit. Fit autem à bulæ carnis esu, & vini potu nimio. Hec enim omnia isto anni tēpore hepatis sunt infestissima, & bilem maximè ad hepar adducunt. hec igitur æger patitur. Dolores acuti incidunt, & non deficiunt vlla hora, sed semper magis premunt. Aliquando etiam vomit bilem pallidam. & vbi vomuit, paulo melius sibi habere videtur. Si verò nō vomuerit, bilis ad oculos peruenit, & fiunt valde pallidi. Et pedes intumescunt. Atque hæc patitur quandoque valde, quandoque minus. Quum autem dies præterierint in quibus morbus iudicatur, dolor minus vrget, si nihil deliquerit, & eiusmodi diætam huic constituere oportet, qualem & priori. Si enim inebriatus fuerit intempestiuè, aut venere vsus fuerit, aut aliud quid fecerit quod commodum non est, hepar statim ipsi durum fit, & intumescit ac à dolore pulsatur. Et si quid facere festinauerit, derepente hepar & totum corpus dolet. huic vbi sic habuerit, & primi dies præterierint, fomentum adhibeto. deinde scammonio subpurgato. Si verò venter combustus fuerit, clysterem ex ijsdem quibus in prioribus vsus es, adhibeto, quæ probè ducant. & post clysterem, lactè asinino cocto subpurgato, octo heminis eius, melle affuso, in potu datis. Dato etiam caprinū lac mane poculi quatuor heminas competentis mensura, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Dato item cocti lactis caprini heminas duas, tertia aquæ mulsæ parte ammixta, aut ipso solo melle affuso, dandum est etiam equinum lac, eodem modo velut asininū, & si quidem ab his morbis curatus cedat, satis est: Si minus, dextri cubiti internam venam secato, & sanguinem detraxito. Si verò non

*Alius be
paucus
morbus.*

Medela.

visus

A visus fuerit tibi per alinum lac subpurgandus esse, bubuli lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ mulse parte ammixta, quotidie ad dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ mulse affusa, ad bibendum dato. De cætero verò ipsum lac duarum heminarum mensura, donec pinguescat exhibero. Si verò neque sic desinat, vrere oportet, quum maximū hepar factum fuerit, & maximè eminuerit. Vrito autem per buxeos fusos, in oleum feruens tinctos. Apponito autem donec tibi bene habere, & vstionem factā esse visum fuerit. Aut per fungos octo crustas inurito. Si enim vstio successerit, sanum facies, & reliquo tempore melius degget. Si verò non successerit, de cætero ab alijs sanus nō fiens, corrumpitur ac moritur. *Hepatis*

B Alius morbus hepaticus. Reliqua quidem eadem patitur hic æger velut priores. Color autem niger est. At hepatis fel, pituita & sanguine repletū, velut ratiocinamur, dirumpitur, & vbi diruptum fuerit, celerimè insanit, & indignatur, & loquitur stulta, & latrat velut canis. Et vngues punicei fiunt, & oculis videre non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Huic eadē adhibere oportet quæ etiam prioribus. Plerique verò moriuntur in vndecim diebus, pauciq; effugiunt. *acutus morbus.*

Splenis morbus primus. Fit huiusmodi morbus, propter caliditatem solis bile commota, quum in seipsum bilem traxerit. Hæc igitur æger patitur, febris acuta in principio accedit, progrediente verò morbo remittit, excepto ipso splene, in quo semper calor hæret, & dolor aliàs atque aliàs incidit acutus, & in lateris mollitudinem, & in ventrem. Et cibos in principio

C quidem admittit, non autem valde secedunt, progressu autem temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruit, & clauiculæ attenuantur, & cibos non similiter admittit, velut in principio, & à modico impletur. Lien verò aliàs magnus fit eadem die, & aliàs minor, huic quum sic habuerit veratrū purgans deorsum, bibendum dato, & cnidio cocco subpurgato. Ad vesperum autem post purgationem, lenticulæ acidioris heminam sorbendam dato: & betarum pinguium heminam polenta inpersa, postera verò & tertia die panē paruum dato, pro obsonio autem lenticula vtatur, & carne suilla in lenticula cocta trita. Vinum bibat austerum, nigrum, paulò meracius. Et quietem his diebus habeat, nisi quod in

Splenitis.
Medela.

HIPPOCRATIS LIBER

Saperda.

rus in vmbra paululum deambulet. Reliquo verò tempore D hæc exhibenda sunt. Cibus sit panis cui nihil furfuris decessit. Obsonium habeat carnem canis maioris, vel capræ, vel ouiculæ tritam. & salsamētum Gaditanum, aut saperdam. & acida ac salsa omnia assumat, & acerba. Bibat vinū Cōi sub- alstringens quàm nigerrimum. à dulcibus autē & pinguibus ac nidorosis abstineat. & silphium non accipiat, neq; allium, neque carnem porcinam. Neque mugilem, nec recentē, nec salsum, neque anguillam. Neq; olus vllum coctum sine ace- to. Ex troximis autem, hoc est his quæ cruda eduntur, rapha- nide vtatur & apio, in aceto tinctis. & polentam vino suba- ctam edat, & vinum meracum forbeat. Si verò velit, etiam panem in vinum interat, ac calidum edat. Dentur etiam pi- sces, scorpius, draco, cuculus, gobio, callionymus. Hos coctos

Quæ lienē excrement.

& frigidos dato. Dato etiam quæ splenem attenuare possunt singulis diebus, asphodeli semen, aut visci folia, aut fœnum Græcum, aut viticis semē, aut rutam, aut mentæ radicem. ex his quodcunque volueris tritum in vino austero dato iei- no. Si verò adeò validus fuerit, per triginta dies ad ligna se- canda cogito. & summis humeris luctetur. & interdiu deam- bulet. & vespere dormiat. Mane verò surgat, & quæ relata sunt edat. Si verò ab his non melius habeat, splenem fungit vrito, decem magnis crustis inustis, quum maximus fuerit splen, & maxime eleuatus. Si enim successerit vstio facta ve- lut oportet, sanum facies, verum non breui. Opus enim ha- bet morbus curatione. Grauis est enim & diuturnus, si non fuerit statim curatus. Alius splenis morbus sic quidem ab iisdem à quibus & prior, patitur igitur æger ab hoc morbo hæc. Venter inflatur, postea verò etiam splen intumescit, & durus est, & dolores acuti in splenem incidunt. Color autem mutatur, & conspicitur niger, pallibus, malicorij speciem re- ferens. & ex aure male olet, & gingiuarū malè olent, & à den- tibus discedunt. & ex tibijs vlcera erumpunt, velut pustulæ nocturnæ. Membra verò attenuantur. & stercus non secedit. Hūc quum sic habuerit, iisdem phar- maticis & edulij, & po- ribus, & laboribus, atque alijs omnibus curato. & vbi stercus secedere noluerit, clysterem adhibeto, ex mellis hemina di- midia, & nitri Aegyptij magnitudine tali ouilli. Hæc trita in quatuor heminis aquæ de betis coctis diluito, & per cly- sterem

Curatio.

A sterem infundito. Si verò morbus ab his non sedetur, splenē ipsius vrito velut prioris, & si vltio successerit, sanū efficies.

Alius splenis morbus fit, in anno, veris maxime tempore, verum à sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrem, & dolores acuti in splenem incidit, & in mammam, & in clauiculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plumbiformis, & parua vlcuscula velut lacinata in tibijs exurgunt, ex quibus vlcera magna fiunt, & quæ primū infrā secedunt, sanguinolenta sunt, & æruginosa. & venter durus subit, & splen velut lapis est, hic morbus magis lethalis est quàm priores, & ex ipsa pauci effugiunt. hunc quum sic habuerit, iisdem purgato quibus et priorem, veruntamen phar̃macum sursum purgans ne dederis. Deorsum verò granum cnidium exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle asfuso. Si verò hoc non adfit, bubuli aut caprini cocti duos cōgios præbeto, ita vt alternatim mel in poculū ammiscatur et vicissim bibantur. Ad vesperam autem post purgationem eadem quæ priori dato. Et si visum fuerit ab interna cubiti sinistri vena sanguinem detrahito. Reliquis autem diebus quotidie ieiuno lactis bubuli quatuor heminas dato, tertia muriz parte ammixa. Cibis verò et potibus, et alijs omnibus iisdem curato, quibus et priorem. Abstineat autem à venere, et ebrietate, hic velut prior. Et si videatur etiam vrito, quū crassissimus et maximus splen factus fuerit, et si opportunè vsseris ac successerit, sanum facies, Si verò ab hac curatione sanus nō fiat, tēpore corruptus moritur. Est enim morbus valde grauis. Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus vere maxime, quū splen pituitā assumpserit in seipsum, & statim magnus factus fuerit ac durus, & deinde rursus, sedatur. Et quum quidem eleuatus fuerit, dolores incidunt acuti. Quum verò mollis fuerit, doloris exors est. Et vbi diu turnus factus fuerit morbus, obscurior esse videtur. & insurgit, & citò sedatur. Hic quum sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & citò attenuatur: & corpus impotentiam multam habet. Morbus autem si non statim curatus fuerit, aut sua sponte quieuerit, interpositis quinque aut sex mensibus, rursus insurgit. Intermitte autem maxime per hyemem. hunc si in principio acceperis, decem cr-

Lienis tertius morbus

Medela.

Lienis quartus morbus

stat

HIPPOCRATIS LIBER

*Lienis quin-
tus morbus*

Medela.

*Regius mor-
bus primus*

Medela.

stas in splenem vrito, & statim sanū facies. Si verò non vffe- D
ris, ijsdem pharmacis curato, quibus & priores. Et alijs item
ijsdem, & potibus, ac laboribus. Sic enim celerrimè sanū fe-
ceris, huius autem color fit exalbidus, subpallidus, & squali-
dus. Alius splenis morbus. Fit autumno maxime ab ara-
bile. Fit autem ab olerum multorum quæ cruda eduntur esu,
& ab aquæ potu. Patitur itaq; æger hæc. Quū morbus corri-
puerit, splenem vehementer dolet, & rigor & febris apprehendit,
& inedia ipsum habet, ac cibos auersatur, & corpus cito concidit. Splen autem, magnus quidem non valde fit, ve-
rum durus, & ad viscera allabitur, & adhærens fugit. Hunc
quum sic habuerit, ijsdem pharmacis & eduljijs ac laboribus
quibus priores curato. Et si se tibi exhibuerit, vrito ipsum eo E
modo quo etiam alios. Hic morbus in plerisque si statim cu-
ratus fuerit, breui decedit. Quatuor morbi regij, primus
quidem æstate maxime corripit, bile commota. Cōsistit igitur
tua bilis sub cute, & in capite, quare statim corpus in alium
colorem mutat, & fit pallidum, velut malicorium. Et oculi
pallidi sūnt, & in capite sub pilis velut cortex subest. & rigor
ac febris corripit, & pallidam urinā mingit, & crassum sub-
pallidum in ipsa subsidet. & manè quàm diu ieiunus fuerit,
ad cor & viscera exugitur. & si quis ipsum alloquatur aut in-
terroget, agere fert, & anxius fit, & non sustinet audire. Ster-
cus autem excretum cum pallore albicat, & malè olet. Hic
quum ita habuerit, maxime moritur in quatuordecim die-
bus. Si verò has effugiat, sanatur. Curare autē oportet ipsum E
sic. Quum febris remiserit, multa calida lauato, & aquā mul-
sam bibendam dato. Et sorbitionibus vtatur, ptisanæ succo,
melle affuso. Mel autem non simul coquito, donec præte-
rierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant an lethalis sit
morbus, aut non. postea verò bis in die lauato, & nutrito pri-
mum modicis quæcunque maxime admiserit. postea tamen
plura dato. Vinum bibat album plurimum per diem. & si
progressu temporis videatur tibi pallidus esse & debilis, vo-
mitum a cibis facere iubeto, velut in superioribus morbis
habetur. Et si quidem ab his morbis quiescat, satis est. Sin-
minus, veratrum bibendum dato. Post talem autem purga-
tionem, ad vesperam edat mazam mollem, aut panis modul-
lam. Obsonium verò edat, pullum gallinaceum percoctum,
probe

A probè conditum cum cepa, coriandro, caseo, sale, sesamo, & vua passâ alba. Vinum autè bibat album, austerum, vetustissimum. Alium verò infra subpurgato, postèrâ diè succo cicerum alborû, melle affuso, vtatur, & duas heminas eiusmodi succi ebeat. Tertia verò diè initio factò, singulis diebus hâc aquam bibat, ex his rebus coctam fœniculi radices tenues ea copia quanta tribus digitis comprehendi potest, in duos aquæ congijs mittito, ac coquito vsque ad dimidias. Et cicerum alborum chœnicon, in duobus aquæ congijs ad dimidias item coquito, & quod superest excolatum sub dio per integrâ noctem exponito, & ambo hæc decocta misceto. Cum hac aqua & vinum temperatum bibat, & ipsam aquam

B solam si velit, quàm plurimam bibat: & aliâ aquam non bibat. Si verò hanc potionem non admiserit, aliam sic præparatam dato. Caricarum albarum chœnicon in duobus aquæ congijs coquito, excolato, & sub dio per integrâ noctem exponito, postea hâc aquam bibat, siue nudam ipsam voluerit, siue cum vino mixtam. Bibat autem nō acruatim multam, sed pro vna vice dimidiam heminam, vt ne alui profluuium ipsi succedat, & modico tempore interposito rursus bibat. Commoda autem sunt & hæc in potu data ieiuno singulis diebus, trita & in vini veteris albi hemina diluta, apij semē, cucumeris semen, fœniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, coriandrum herba, vuz passæ albæ. His & illis in potu acceptis vtilitatem percipies, et celerrimè sanus fiet.

C Alius morbus regius siue arcuatus. Hic corripit tempore *Secundus.* hyemis, et ex ebrietate et rigore. Incipit autem primum rigor inuadere, postea etiam febris detinet. Et humor qui est in corpore, congelatur in cute. Quòd autem sic habeat, ex his ostenditur. Liuidum est ipsius corpus et subdum. Et venæ per corpus distentæ sunt pallidæ. maiores autem et crassiores sunt quàm prius. Et altæ venæ subnigriores distentæ sunt. Et si quis aliquâ ipsarum secet, sanguis effluet pallidus, si pallidæ sunt venæ. Si verò nigra fuerint, niger sanguis effluet. Et vestem interiorem corpori adiacentē, præ pruritu nō sustinet. Hic promptus est ad iter faciendū et ambulandum, sed præ debilitate crura labascunt, ac ipsum non sufferunt, et sitit vehementer. Hic morbus non minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus

*Quales in
hoc morbo
venæ.*

- sanus fiat. Si verò morbus prolongetur, & ad octauum aut nonum diem duret, in morbum incidit, & morbus, & dolor magis premit, & exurgere non potest. Et plerique in hoc tempore statim pereunt. Huic ubi sic habuerit, si quidem principio morbi accesseris, quum iam septem dies præterierint, veratrum bibendum dato. Ventrem verò infra subpurgato per succum, vel ut priori. Et alia eadem pharmaca dato.
- Medela.*
quæ. Exhibeto & cantharidas, sine alis & capite, quatuor tritas, & in vini albi hemina dimidia dilutas, modico etiam melle affuso. Atque has bis aut ter in die bibat. Progrediente verò morbo, balneis & fomentis curato. Edat autem quæcunque admittit. Vinum bibat album, austerum, & alia eadem assumat quæ prior. Hic morbus diuturnus est & grauis, si non ab initio probè fuerit curatus. Alius morbus regius. Popularis appellatur hic, eo quod omni tempore corripit. Fit autem à repletione maximà ac ebrietate. & postquam riguerit, statim sanè corpus immutatur, & pallidum fit, & oculi pallidi valde sunt. Et sub pilos & sub ungues morbus procedit. Et rigor ac febris debilis tenet. Et debile est corpus, & in capite dolor adest. Et pallidū ac crassum mingit, hic morbus minus lethalis est prioribus, & curatus breui sanatur.
- Cūbarida* Huic quum sic habuerit, cubiti venam secato, & sanguinem detrahit. Deinde fomento adhibito, elaterium bibendum dato. Tertia verò die rursus infra subpurgato, cum lacte asinino. Reliquas verò sorbitiones, & potus, ac edulia, eadem dato quæ priori. Et caput ipsius frequenter purgato. & de succo bibendum dato. Et multa calida ipsum lauato, ac carnem defricato, & defricatas sordes in vino albo bibendas dato. & ad alia omnia ipsiſdem vtatur. & breui sanus euadet.
- Tertius.*
Morbi cau
sa. Alius morbus regius, fit quidem à pituita, hyeme autem maximè corripit. & color ipsius agri est albus, & pectora ipsius pituita plena sunt, & spuit saliuam: & quum exsereat, singulus ipsi oboritur. Et album lotium ac crassum mingit & in vrina subsidet, velut fatina. Hic morbus non est lethalis, & breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cnidium granum bibendum dato. Et post purgationem, succi ptisanæ quatuor heminas, melle affuso, exsorbendas dato. Superiorem verò ventrem vomitu inducto, velut in prioribus purgato. Sic enim faciliè pituitam à pulmone & arterijs abduxer
- Curatio.*
- Quartus.*
- Medela.*

A duxeris. Sed & gargarismum ipsi frequenter parparato. Hic aliquando etiam febricit debili febre, & horror tenuis succedit. De cætero verò ipsi quibus priores curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & edulijs, & potibus, & sorbitionibus. Sic enim maximè sanum facies. Morbus Typhos vocatus. Typhos quidem appellatur hic morbus, hoc

Typhos.

est stupor attonitus, corripit autem tempore æstatis, quum canis sydus oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & grauitate debilitas, & crurum ac manuum impotentia: maximè enim inutilia ipsi sunt hæc membra, & venter turbatur, & quæ secedunt grauè olent. Et tormen forte succedit. Sed & hæc

B patitur, si quis ipsum erigere velit, erigi nō potest, neque oculis videre potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum autem moriturus est, acutius videt, & loquitur confidenter, & bibere ac edere cupit, & si quis det quod edat, breui etiam animam emittit, si

non euomuerit. Huic morbus hic iudicatur in septem, aut quatuordecim diebus. Multi verò perueniunt etiam ad vigin-

ti quatuor. Si igitur hos trāsierit, sanus erit. Nam in his diebus iudicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc quum ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus à balneo

abstineat. Vngatur autem vino & oleo tepido, in lecto, & à cibis abstineat. Sorbitiones autem tenues frigidæ dato.

Vinum autem bibat nigrum, austerum, si ipsi conducat: Sin

C minus, album, aquosum, austerum. Si verò sitis fortis premat propter calorem, potu acuatim dato, euomere iubeto, bis aut ter hoc reperito. Et quum calor habuerit, lintea

aqua frigida tincta apponito, qua parte se maximè ardere dixerit. Si verò horrorem habuerit corpus, frigefactoria re-

mittito. Hic quum doluerit, ab huiusmodi maximè dolore periclitatur, ne repente animam relinquat. Verum exhibere

oportet ipsi doloris causa festinanter, eadem pharmaca quæ ei qui à pleuritide tenetur. Quum autem exsurrexerit, cibo

& potu, & balneis quàm celerrimè refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiunt. Alius typhos. Corripit

quidem hic morbus omni tempore, sit autem propter corporis humiditatem, quum cibos humidos, & potum multum, car-

nes combibunt, & fluidæ sunt, ab his maximè sit morbus.

Medela.

Qui æstus leniatur.

Typhos dicitur.

HIPPOCRATIS LIBER

Incipit igitur febris, tertiana aut quartana, in principio *fiēs*. D
Et dolor fortis in capite consistit, Aliquādo etiam in corpo-
re intermittens. Et vomit saliuam, & frequenter eructat, &
oculorum regiones doler, & facies albescit, & tumor in pe-
des descendit. Quandoq; verò etiam totum corpus intume-
scit. Et ad pectora, & ad dorsum aliquando dolor currit, &
venter turbatus est, & oculis fortiter tuetur, & saliuam mul-
tam & spumofam expuit, & in faucibus detineri videtur, &
exasperat ipsas. Sæpe verò etiā inflammantur fauces. Hic ubi
sic habuerit, & dolor ita presserit, & erectæ cervicis spira-
tio fortis inciderit, quandoque derepente præ dolore ani-
mam emittit, in septem diebus, aut quatuordecim. Multi ve-
rò vsque ad viginti quatuor dies durant. Sæpe verò etiam E
derepente morbus remittit, & æger sanus esse sibi videtur.
Verum obseruare oportet donec quatuor & viginti dies præ-
terierint. Si enim has effugerit, non ita valde moritur. Huic
Medela. quum ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oportet,
Potio quæ. farinam coctam, tenui melle affuso. Vinum verò dan-
dum est nigrum, paulatim, prout voluerit temperatum. Cibi
autem ne exhibeantur priusquàm hi dies præterierint. Po-
lypi verò in vino cocti edendi dentur, & iusculum sorben-
dum. Et raphanidas multas edat, & nasturtij semen torrefac-
tum, molitū ac cribratū, vino nigro acerbo affuso bibat. Et
polenta tenuis modica manē bibēda detur. A balneo autem
abstineat, donec hi dies præterierint. Vino verò & oleo te-
pescatis in lecto illinatur, & extergatur. Et fructus pæoniæ F
grana decem in vino nigro cocta bibenda dato, & rapi pro-
bè percocti succum sorbeat, caseo insulso conditum, & papa-
uere, & sale, & oleo, & silphio, & aceto. Si verò etiam phar-
macum bibendum dare volueris, cnidium granum dato. Et
post purgationem, farinæ coctæ & pinguis duas hemi-
nas exsorbendas dato. Vinum autem bibat idem. Et ex phar-
macis & sorbitionibus ac potibus quicquid dederis profue-
rit, siue singulatim, siue plura simul exhibueris. Atq; sic ce-
lerrimè sanum feceris. Morbus autē est gravis, & pauci effu-
giunt. Alius typhos, hic quidem propter hoc fit. Quum bi-
lis putrefacta ammixta fuerit sanguini, per venas & articu-
los, quum sanguis steterit, consistit quidē maximè in articu-
lis. Incumbit autem quandoq; etiā in reliquum totum cor-
pus,

*Typhos
tertius.*

- A** pus & dolores acutos exhibet. & multi ex huiusmodi morbo claudi fiunt, quum bilis in articulis conclusa in tofum callescit. Dolor autem intermittens, corripit per tres & quatuor dies. Hunc ubi sic habuerit, hoc modo curato. Dolo-
Medela. re in corpore prævalente, tepefactoria facere & adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem remiserit, veratrum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die serum caprinum coctum bibendū dato, duorum cōgiorum mensura, ita ut in alterum cōgium mel affundas, & in alterum sal adijcias, deinde poculis vicissim permutatis bibat, donec totū ebiberit. Ad vesperam verò post purgationem, lenticulæ heminam sorbeat. & betarum pinguium heminam, polēta inspersa ebibat. Et pulli gallinacei carnē, aut columbæ, aut turturis, aut ouiculæ, aut suis pinguem edat. Veratrum autem per sextum diem dato. & si alicubi in articulis tumor fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinem detrahito, punctura per acum triangularem facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex alijs articulis perpungere. Interpositis autem diebus cibum accipiat, panem maxime assatum. Mazam verò maxime oleo & melle subactam. Obsonia verò habeat, maxime quidem assatas carnes volucrum, non falsas: Sin minus, etiam coctas, conditas, verum sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, assatis eodem modo velut carnes: & coctis organo conspersis, ac oleo ipsis affuso. Vinum autem bibat album, si conducat: aut si hoc non commodet, nigrum. & in deambulationibus se exerceat per diem, & post coenam, & mane. Serū autem & lac pro tempore semper bibat. Si verò tibi visum fuerit, etiam aluinum lac decoctum dato. Et si sanus fiat, in custodia ipsum esse oportet, ut ne à frigore & aestu lædatur. & tibi non valde expleatur. Periculum est enim ne morbus reuertatur. hic itaque morbus si sic curetur, in sex mensibus sanatur. In tot enim mensium spatio iudicatur an mortalis sit, aut non, etiam si statim curetur. Nam morbus est gravis, & plerisque commoritur. Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tempore pomorum, quum quis se fructibus mollis corticis, & foris non lignosi, omnis generis repleuerit. Plerisque verò etiam ab his factus est talis morbus, ubi videlicet placentarum, & liborum sesaminorū, & aliorū dulciorum ex

*Typhos
quartius.*

*Morbi huius
causæ.*

Medela.

melle paratorum, esu se infatiabiliter expleuerūt. Mel enim D
 costum æstuosum est, et ventri adhæret: postea quū concoctū
 fuerit in ventre, efferuescit: & venter derepente attollitur, &
 ardet ac dirumpi videtur. Deinde repente ventris profluuiū
 succedit. et quum semel secedere inceperit, per multos dies
 purgatur. & multi post hanc purgationem sani fiunt. Quum
 igitur sua sponte purgari cessauerit, lenticum succi tres semi
 congios ipsum ebibere cogito, sale adiecto. post purgationē
 verò succi, ad vesperam, lenticulæ frigidæ non salæ heminā
 sorbeat: Multum autem sulphurij in ipsam deradat: & betę pin
 guis non conditæ heminam, polenta inspersa. Vinum autem
 bibat nigrum, austerum, paulatim. Reliquo verò tēpore ea-
 dem faciat. Et cibos accipiat panem exassatum, & Mazam E
 oleo & melle quāmaximē subactā. Primis autem diebus
 farinam edat coctam frigesactam, melle affuso. Vinū autem
 bibat nigrum, acerbum, & donec quieuerit morbus hæc as-
 sumat. At qui ex fructibus morbo arreptus est, statim sentit,
 & tormen, et dolorem: et cibi secedere non volunt, et venter
 ipsius magnus ac durus est, & rigor ac febris habet. huic si
 quidē sponte turbatus fuerit venter, in viginti diebus vt mi-
 nimū purgatur. Et quū purgari cessauerit, sanus statim erit.
 Si verò non fuerit purgatus, purgato ipsum hippophais suc-
 co, aut cnidio grano. Ad vesperam autem eadem exhibero,
 quæ ei quī sponte purgatur. Postera die si febris habuerit,
 quietem habeat. Et de eodem vino in aqua frigidissima ipsi
 bibendum dato. Si verò febris nō habuerit, victu vtatur non
 humido, sed fortiore. Et deambulet coniectura iuxta cibos
 facta. Ab hoc morbo multis iam aqua intercus facta est. Et si
 tibi clysterem adhibere visum fuerit, eadem quæ etiam hy-
 dropico per clysterem infundito. Si verò volueris, hæc infun-
 dere potes. In aquæ mullæ hemina, herbā thapliæ coquito, &
 sic infundito. hic hoc modo curatus celerrimē sanus erit.
 Typhos. Fit hic morbus quū humor qui est in corpo-
 re, putrefactus fuerit, et magis quā oportunitum est resicca-
 tus. Fit igitur æger hoc morbo correptus, speciem limpidus ac
 humectus, subpallidus, pellucidus, & vesicæ urinæ similis, ve-
 rum non intumescit, sed tepuis et aridus est, ac debilis. Atte-
 nuantur autem in corpore maximē clauiculæ, & facie forti-
 ter gracilescit, & oculi valde sunt excauari. & hæc quidem
 a morbo

*Typhos
quintus.*

- A** à morbo patitur. Color autem corporis niger est, causa vesō hęc est. Quum bilis atra in venas, & ad cutē subierit, & postea calor successerit, necesse est à calore venas comburi ac resicari, Quare sanguis ē venis excedit. hęc igitur patitur. Hic tenuis fit, & fortiter gracilis. & oculis raro nictat, & muscas à stragulis venatur. Et grauitas ciborū maior est quā quū sanus esset. & lucernæ extinctæ odore delectatur, & frequenter semen per somnum effundit. Sæpe verò etiam inter eundem genitura ipsi exit. huic quum sic habuerit, ventrem nigro veratro purgato, supernū videlicet: infernū verò scammoniz succo. Post purgationem verò eadem quæ & alijs dato. & serum ac lac bubulum, aut caprinum pro tempore exhibeto. & lac asininum decoctum, ad purgationem.
- B** ita curatus in duob⁹ maximè annis sanus fit. Cibus autē quos vult assumat, & quā maximè nutriatur, & deambulet cōiectura ad cibos facta. hic morbus corripit maiorē viginti annis. Vbi verò corripuit, si non à principio morbi q̄s curatus fuerit, nō desinit, nisi viginti anni præterierint, sed adhæret. postea ab aliquibus dum curantur decedit. Morbus autē grauis est. Voluuli porrò vocantur hi morbi. sunt autē maximè ab his. Si hyemis tempore quis calido & humido victu vitur, & non deambulationibus se exerceat, respectu ad cibos factō. Verū repletus semper dormit. & deinde lōgū iter perficere cogatur, frigore sœuiente. Deinde riguerit sub ossa. hęc igitur patitur. Flatus in toto corpore oboritur. et color ipsius fit plumbiformis, et riget semper, vt etiā calida ipsi affusa, calida esse nō videatur. Corpus autē ipsius dum lauatur, à calida desquamatur, maximè scrotū, et si digito corpus cōpresseris, impresionem facies, et notæ tibi apparebūt, velut in farina aqua subacta. Maximè autem in potibus impresionem perfert. Crura verò ipsius grauiā sunt. et si obambulet, tremat, et si ad accliuem locum iter faciat, vehementer anhelat, et vlnæ dependere videntur, et sitis vrget noctu, cibi verò crudi secedūt quoscūq; ingessit. Huic quum sic habuerit, fomento prius adhibito, cneorum bibendum dato, aut hippophais succum, aut cuidiū granum. post purgationē verò, eadem dato quæ prioribus. Postera die lactis asinini cocti congium dato bis ebibendū, sale adiecto. Ad vespertā cœnet panem. Obsonium autē habeat, ouiculæ carnes coctas, et poly-

*Medela.**Voluuli.**Curatio.*

HIPPOCRATIS LIBER

pos coctos in vino nigro, & iusculum sorbeat. & lenticulā ha
beat sic præparatam: heminā lentis coctam probe terito, de
inde farinā ammisceto, & silphium deraſum addito, et ſalem
adijcito, & acetum affundito, & alliū ad hæc ſimul coquito,
& affuſa aqua bis aut ter ſeruefacito, & cum tudicula vndi
qua; expaſſa brachia habēte, ſimul ipſa agitato: deinde ab
lata frigeſacito. Sit autē nō valde craſſa, & odoris gratia etiā
pulegiū vt ſimul coquatur, adijciatur. Intermedijs verō die
bus vomitus faciat per ſextū diē. Verūm aliās atq; aliās ante
vomitum, & pharmaci potum, fomentum adhibere oportet.
Et per tertiam diem lauetur, ſi cōducatur: Sin minus, vngatur.
Et deambulet ſi ita potens fuerit, coniectura ad cibos facta.
& ſambuci, ac conyzæ ſemper teneræ, folia cocta edenda da
to. Sic enim curatus, facilimē deger, & morbus annuum deſi
net. Multis verō iam ſanis factis, poſt duos annos morbus re
uerſus eſt. Sed ſi hoc contingat, eodem modo curetur. Si verō
tertium reuertatur, tumor quidem non ſuccedit. Tenuis autē
ſit & gracilis, incipitq; à facie attenuari, & colore exalbeſcit
magis q̄ prius. huic quādoq; aqua intercus ſit in vētre. Si igitur
facta fuerit, ſecare ipſum non oportet, moritur enim, ſed
iſdem curare quibus cum qui à ſplene aqua inrer cutē labo
ret. hunc maximē in principio curare velis, & ſic cito ſanū fa
cies, Opus autē habet morbus multa curatione. Eſt enim gra
uis. Alius voluulus arcuatus. Hic maximē æſtatis tempore
in paluſtribus regionibus corripit. Magis autē ab aquę potu.
Multi verō iā à tali morbo correpti ſunt, ex volutatione ad
ſolem capitis dolore affecti. Verūm ſimilia prioribus patiun
tur, excepto colore. Nam pallidus ſit æger, velut malicoriū.
Et oculi aliquādo morbo arcuato implentur. hunc vbi ſic ha
buerit, iſdem curare oportet quibus priorem. Danda etiā in
potu aqua à cicere albo cocta, & cum vino eadem permixta
danda eſt. Et caput eius tetragono medicamento purgerur.
hic minus q̄ prior lethalis eſt, & vocatur voluulus arcuatus.
Voluulus hamarites. Reliqua quidē eadē patitur cum priori
bus. Incipit autem morbus autumno fieri. Hæc verō in mor
bo accedunt. Ex ore male olet à dentibus, & gingiuarū diſce
dunt, & à naribus ſanguis fluit. Aliquādo etiam ex cruribus
vlcera pullulant, & alia ſaneſcunt, alia emergunt. Et color ni
ger ſit, & cutis tenuis. Eſt autem ad deambulandum ac labo
randum

*Malumboc
redit.*

*Voluulus ſe
cundus.*

Curatio.

*Voluulus
hamarites.*

- A** randum promptus. Hūc vbi sic habuerit, ijsdē curato quibus *Medela.*
 priores, & hac per clysterē infundito. Cucumeris syluestris
 folia quinq; terito, & mellis dimidium hemina ammisceto,
 itemq; olei hemina dimidiam, & salis quantū vna manu cō
 prehēdere potes. & succi betarum heminas quatuor. Ad sub
 purgationem verò lactis asinini cocti heminas octo exhibe
 to, melle affuso. Bibat etiā bubulū lac pro tempore. per qua
 draginta dies. Bibat item mane bubuli lactis duas heminas,
 tertia aquæ mulsæ parte ammixta, per intermedios dies. Hic
 morbus multa medela opus habet. Sin minus, nō exit, sed cū
 homine moritur. Vocatur autē voluulus hæmatites. Morbi
 crassi appellati. Ex crassis appellatis morbis, hi maximē sūt. *Morbicras*
- B** Quū pituita & bilis mixta fuerint in corpore, fluunt in ven
 trē, & quū cōgregata fuerint in vētre, attolluntur, & sursum *si.*
 ac deorsum discurrūt, velut vnda. Et rigor ac febris corripit. *Febris vnde*
 Et dolor in capite consistit, & quū dolor circa viscera cōstite
 rit, suffocationē inducit. Aliquando verò vomit pituitā aci
 dam, quādoq; etiā salfam & postquā euomuit, os amarū ipsi
 esse videtur. In lateribus autem rubores detinentur. Nā quū
 pituita in ventre sit, sanguis à caliditate cōgregatus in late
 re allapsus est, & rubores in lateribus excitat. Et calor maxi
 mē latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incuruū fit. Et
 quū maximē doleat, corporis contactū non sustinet. Nam ve
 lut ex vlcere dolet. Et carnes præ dolore vibrant, & testes cō
 trahuntur. & in sedem, & in vesicam calor quidā ac dolor ir
 ruit, Et mingit crassum velut in aqua inter cutem. Et ex capi
 te defluunt capilli, & pedes semper frigidi sunt. & dolor pre
 mit maximē latera, & dorsum, & collum, & ad cutē aliquid
 ipsi proserpere videtur. Morbus verò quandoq; virget, quan
 doq; remittit. In progressu autē magis assidue premit, & cu
 tis capitis crassa ac rubicunda est. Hic vsq; ad sex annos talia
 pati perseverat. Postea & sudor multus diffunditur, & male
 olet. Sæpe verò etiam per somnum semen effundit. Quod ve
 rò per coitum emittit, subcruentū ac subliuidum prodit. Hic
 morbus fit propter calorem solis, & aquæ potū. proinde hūc
 quum sic habuerit, cneoro aut hippophaë, aut enidico grano
 dato, subpurgato. dato etiā lactis asinini cocti heminas octo
 bibendas, melle affuso. postera die post purgationem, eadem
 quæ alijs exhibeto. Primis autem diebus ex ijsdē nutriatur.

HIPPOCRATIS LIBER

*Morbus
crassus sc-
cundus.*

ex quibus etiam is qui ab aqua inter cutem correptus est, & deambulationibus se exerceat, si ita potēs fuerit. Si verò præ febribus impotēs fuerit, & cibos edere nō poterit, lenticulæ sorbitione vtatur. potu verò vino nigro quāmaximè austero, Hic morbus maximè corripit autumno, & tempore fructuū pomorum. hic si quidem curatus fuerit in sex annis, satis est: Sin minus, adhæret vsq; ad decem annos. Cum multis verò simul mori, si non statim curatus fuerit. Alius crassus morbus. Tales crassi morbi à bile fiunt, quum bilis in hepar influxerit, & in capite cōstiterit. hæc igitur æger patitur. hepar intumescit, & præ tumore ad septū transuersum expanditur. & dolor statim in caput irruit, maximè verò in tēpora. & auribus non acutè audit. Sæpe verò etiam oculis non videt, & horror ac febris corripit. Atq; hæc quidem in principio morbi ipsi fiunt, intermittentiā quādoq; valde, quandoq; minus. Quanto autē magis morbus progressus fuerit, tātō amplior dolor in corpore existit, & pupillæ oculorū disperguntur ac hebetantur, & si digitū oculis admoueris, nō sentit, eo quod non videt. Quod autē nō videt ex hoc cognoueris, quod admoto digito non niſtat, & floccos de stragulis tollit, si quos viderit, pediculos ipsos esse putans: & quum hepar magis ad septū transuersum expansum fuerit, delirat. & ob oculos ipsi obuersari videntē reptilia, & omnis generis peregrinæ feræ, & milites armati pugnātes. & ipse sibi inter ipsos pugnare videtur, & talia loquit velut q̄ videat pugnas & bella geri, & inuadit, & minat, si qs ipsum exire vetet, & si surrexerit, crura eleuare non potest, sed cōcidit, & pedes ipsius frigidi sunt. Et quum dormit, exilit à somno, & timet quū insomnia viderit horrēda. Cognoscimus autē hoc, quod ab insomnijs exilit ac timet, postq̄ resipiscit. Nā insomnia denarrat, & ea quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atq; hæc quidē sic patitur. Quandoq; verò etiam per totā diem ac noctē voce priuatus iacet respirans spiritum multū aceruatum. Quum autē delirare cessauit, statim euestigio resipiscit, & si quis ipsum interroget, rectè responder, & cognoscit ac intelligit omnia quæ dicuntur. deinde rursus post modicū tēpus, in iisdē afflictionibus iacet. hic morbus accidit maximè in peregrinatione. Et si quis alicubi per desertam viam iter faciat, & timor ipsum ex spectro corripiat. Fit etiā aliter. huic quū sic habuerit,

Medela.

- A** rit, veratri nigri obolorū quinq; pōdus, in vino dulci bibendum dato. Aut hæc per clysterem infundito. Nitri Aegyptij magnitudinē tali ouilli terito, & mellis optimi cocti dimidiā heminam, & olei dimidiā heminā, in mortario ammisceto, & aquæ à betis coctis heminas quatuor per noctē sub dio expositas addito: aut si volueris, pro beta lac asininū coctum ammisceto. & hæc mixta per clysterē immittito, siue febris habeat, siue nō. Sorbitionibus autē vtatur, ptisana cocta, melle affuso. Bibat etiā mel & aquā & acetū, simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Iudicatur autem in quatuordecim diebus ad summū, siue lathalis est, siue non. Multis autē iam huiusmodi morbi sedatus, rursus redijt. Si igitur redierit, periculum est ne eger pereat. Iudicatur autē morbus in septem diebus, an lethalis sit, aut non. Si verò has effugerit, nō valde moritur, sed morbus in plerisq; curatus decedit. Quum autē desuerit morbus, diætā bona vtatur, quiete ingerēs quæ ventri suscipiat, & non cōburantur, neq; ventris profluuiū succedat. Ambo enim hæc periculosa esse vidētur. Lauetur autē quotidie, & deambulet post cibos modicē. Veste verò induatur leui ac molli. & pro tempore anni lac & serum bibat, per quinque ac quadraginta dies. Hæc si fecerit, celerrimē sanus erit. Morbus autē grauis est, & multa cura opus habet. Alius morbus crassus. Fit à pituita putrefacta. Quod autē putrida est vnde sit, ex hoc manifestū est. Eructat ab hac quod odorē habet, velut si quis raphanides edisset. Incipit autē fieri talis morbus à cruribus, deinde ab his ascendit ad ventrē. Et quū in ventre constiterit, rursus decurrit ad viscera. Et quū in his cōstiterit, sugit & vomitū facit, pituitam acidā subputridam educens, & vbi euomuit, non habet seipsum neq; sibi cōstat æger. Deinde angustia fit circa viscera. Quandoq; etiā in caput derepente dolor incūbit acutus. Et auribus acute audire non potest, neq; oculis videre, præ grauitate. & sudor multis diffundit male olēs, & maximē quū dolor habuerit, & morbū leuat. Color autē ipsius arcuatus apparet. hic morbus priore paulò minùs lethalis est. Huic quū ita habuerit, vtrē purgato, deorsum quidē, per hippophaes. sursum autē, per veratrū. & caput terragono purgato. & quū à veratro purgatus fuerit, postera die lacte asinino cocto subpurgato. Tertia deinde caprino cocto. & similiter quarta ac quinta. Reliquis verò

*Tertius
crassus mor-
bus unde.*

Medela.

viginti

HIPPOCRATIS LIBER

viginti diebus, lac bubulum crudum, aut etiam caprinū dato, D
 tertia aquæ mulſę parte ammixta. Bibat autem lactis con-
 gium. Poſt purgationem verò deorſum verſus, eadem phar-
 maca exhibeantur, quæ hydopricis. Reliquo tempore quum
 lac bibit, cœnet panem exaſſatum. Obſonium autē habeat,
 ex piſcibus ſcorpium, aut callionymum, aut cuculū, aut ſqua-
 tinæ fruſtum cum condimentis coctum. ex carnibus, ouillas,
 aut gallinacei pulli coctas. Vinum bibat album, ſi conducat:
 Sin minus, nigrum aſterum. deinde poſt cibum deambulet,
 vt ne frigeat. Si quidem igitur cōducant, cibos huic dato qui
 dicti ſunt. Si verò non conducunt, ſorbitiones dato ptisanæ
 aut milij. In hoc morbo ſi æger triginta dies trāſgreſſus fue-
 rit, ſanus fit. hi enim iudicant an lethalis ſit, aut nō. Eſt autē E
 morbus grauis. Alius morbus craſſus. Fit hic morbus à
 pituita alba. Cōgregatur autem in ventre, quum febres diu-
 turnæ corpus occuparint, Initium hic morbus à facie ſumit,
 & intumeſcit facies. deinde deſcendit in ventrem, & vbi in
 ipſo conſtiterit, ventrem magnum attollit, & corpus velut à
 labore laſſatur, & in ventre grauitas ineſt, & dolor fortis, &
 pedes tument, & ſi pluuiā in terram effundatur, pulueris odo-
 rem non ſuſtinet. Si verò in pluuiā ſteterit, & terram odoret,
 derepente cadit. Hic morbus interquieſcens, longiore tem-
 pore quàm prior occupat, & tardius decedit. Curare verò ip-
 ſum oportet iſdem quibus hypropicum, fomentis videlicet
 & pharmacis, & edulijſ ac laborib. Hic morbus per ſex an-
 nos maximè obtinet. Deinde decedit temporis progreſſu, ſi F
 probè curetur, etiamſi non in principio fuerit curatus. Eſt au-
 tem morbus difficilis, & multa cura opus habet. Coxendi-
 cum morbus ex his maximè cauſis fit pleriſque. Si quis diu-
 tius in ſole verſetur, & coxendices fuerint calefacti, & hu-
 mor qui eſt in articulis, à calore fuerit reſiccatus. Quòd autē
 id quod reſiccatur, condenſatur, ac conſtringitur, hoc mihi
 ſignum eſt. Aeger enim articulos vertere aut mouere nō po-
 teſt, præ dolore qui eſt in iſtis, & eo quòd verticula ſunt com-
 pacta. Dolet autem maximè lumbos, & verticula ex obliquo
 iuxta coxendices, & genua. cōſiſtit autem dolor multò tem-
 pore in inguinibus ſimulque coxendicibus, acutus & æſtuo-
 ſus, & ſi quis ipſum erigat, aut tranſmoueāt, præ dolore ei-
 ulat quàm maximè poteſt. Aliquando etiam conuulſio ſucce-
 dit,

Quintus
 craſſus mor-
 bus unde.

Curatio
 quæ.

Coxendicis
 dolor.

A dit, & rigor ac febris, fit autem & à bile, & pituita, fit item à sanguine, dolor cōsimilis velut ab omnibus morbis, & rigor ac febris aliquādo corripit debilis. Ceterū eum qui à sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius *Medda.* fomento humectetur, & cibi ac potus, & alia quæ exhibētur, tepida ac humida præbeantur. Atque hæc omnia cocta, cibo vtatur maza molli, vino dulci nō subacta. Vinū bibat album, aquosum, & corpore quietem habeat, & quamuis impotens fuerit vt exsurgat, tamen modicē singulis diebus deambulet, & ne frigeat, & non multa aqua lauetur, & quum tibi bene habere visus fuerit, & corpore humidus esse, leni fomento vehemēter foueto. Magis enim remittit, & condensatio-

B nem ex articulis humectat ac relaxat. Deinde postera die cnidium granum bibendum dato. Si verò non profuerit, hæc per clysterē infundito, cumini heminā dimidiā terito, & colocynthidem integrā paruam ac rotundam in mortario tundo ac cribrato, & nitri rubri Aegyptij minæ quadrantem torreto, ac terito. Atque hæc in ollam conijcito, & olei heminam, mellis heminā dimidiam, vini albi heminā, & succi betæ quantū videbitur affundito, & donec bonam crassitudinem habere visa fuerint coquito. Deinde per linteam excolato, & si mel non simul coquere velis, mellis Attici heminam ipsis ammisceto. Si verò Atticum nō habeas, optimi aliās cocti heminā in mortario ammisceto. Si verò crassius fuerit hoc infusum, de eodem vino affundito, iustæ crassitudinis respectu habito, & per clysterem infundito, deinde vsque ad dies tres purgari finire oportet. Si verò pluribus diebus purgetur, bubuli aut caprini lactis heminas tres ebendas dato, deinde betas pingues non salsas, condimentis conspersas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi facti sunt. Si verò à bile morbus fiat, veratrum deorsum purgās *Biliofus morbus.* ipsi bibendum dato, aut scammoniae succum, post huiusmodi verò purgationem, succi ptisanæ melle affuso, heminas duas exorbendas dato, postera verò aut tercia die adhibito fomento, lacte asinino cocto subpurgato. Ad vesperā autē pinguis betæ heminas duas edat, polenta inspersa. Vinum bibat album, aquosum, dulce, & nunc, & post pharmaci purgationem. Si verò à pituita ægrotet, cnidium granum, aut hippophaes, adhibito prius fomēto, bibendum ipsi dato, post purgationem

HIPPOCRATIS LIBER

gationem verò, easdem sorbitiones ac potus exhibeto. Item- **D**
 que lactis potionem. Intermedijs autem diebus, diætā quàm
 leuissima vtatur. Et si quidē ab his vtilitatē sentit, bene est:
 Sin minus, ipsum vrito multis ac profundis crustis inustis,
 in ossēis quidem partibus, per fungos. In carnosīs autem, per
 ferramenta. Si verò à sanguine ægrotarit, fomentū adhibe-
 to, & cucurbitā affigito, & venas in poplitibus secato. Si au-
 tem tibi visum fuerit, etiam cnidium granū ipsi bibendum
 dato. Diætā verò quàm siccissima vtatur. Vinum autem ne
 bibat. Si verò bibere velit, quàm minimū & aquosissimum
 dato, & modice deambulare iubeto, aut si potens fuerit, plu-
 rimum. Conducit autem & à pituita ægrotanti talia facere. **E**
 Si verò stare non possit, in lecto ipsum quàm frequentissime
 circumferre oportet, à quacunque causā ægrotarit, per om-
 nia similiter, vt ne intus chartilago concresecat. Si verò con-
 creuerit, & articuli conglutinati fuerint, omnino necesse est
 hominem claudum fieri. Et si clysterē adhibere volueris ei
 qui à sanguine ægrotat, quo sanguinē ac pituitam à coxen-
 dicibus abducas, hæc infundere oportet. Salis pugillo trito,
 olei heminam, & de ordeī decocto duas heminas ammisce-
 to, atque sic infundito. Si enim sic curationem feceris, celer-
 rimē sanum facies. Morbus autē grauis valde est ac diutur-
 nus. Tetani tres. Si ob vulnus tetanus siue distentio fiat,
 æger hæc patitur. Maxillæ conglutinantur, & rigent, & os
 aperire non potest, & oculi lachrymantur ac detrahuntur, &
 dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, neque **F**
 manus, neq; spinam. Quum autem lethalis fuerit, potum &
 cibos quos prius accepit, aliquando per nares reddit. Hunc
 quum sic habuerit, fouere oportet, & pinguius vnctum, ad
 ignem nō ita prope calefacere, & tepesfactoria illito corpori
 adhibere. Et absinthiū, aut lauri folia, aut hyoscyami semen,
 & thus terito, deinde vino albo diluta in ollam nouā infun-
 dito, & oleum pari cūm vino mensura affundito, & cūm his
 calefactis largē calidis corpus ac caput illinito. Postea super
 pelliceum indumentum reclinatum, ita vt pars ad quam fuit
 animalis caro sursum vergat, mollibus ac puris stragulis ac
 vestimētis cōtegito, quo vehemēter exsudare possit. Aquam
 verò mulsam tepidam, si quidem hanc bibere poterit, per os
 exhibeto. Si verò non poterit, per nares infundito. Vinum
 autem

*Sanguis
 meus.
 dicitur sanguis
 isq. ubi dicitur
 ex sanguine
 in alio non
 & beuere.
 sed solutio
 in de
 155.*

Tetani
 tres.

Curatio.

- A** autem album quàm iucundissimum ac plurimum bibendum dato. Hoc quotidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autem morbus grauis, & statim curatione opus habet. *Opisthotonos.* Opisthotonos. In distentione retrorsum fiente (opisthotonum vocant) alia quidem eadem æger patitur. Fit autem, quum tendines qui sunt retrò in cervice ægrotant. Aegrotat autè, aut ab angina, aut ab vna, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquando etiam à capite febribus succedentibus, conuulsio succedit. Iam verò etiam à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partem, & præ dolore circa dorsum ac pectora, eiulat. Hic conuellitur vehemèter, vt vix detinere possint ipsi præsentès, ne è lecto excidat. Hic sæpe in die dolore affligitur, sæpe etiam leuius degit. Huic sic habenti eadem exhibere oportet, quàm priori. Morbus autem adhæret ad summum diebus quadraginta. Si verò hos euaserit, sanus fit. Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est quàm priores. Fit autem ab iisdem. Multi verò etiam ex casu in partes posteriores, à morbo correpti sunt, patitur igitur æger hæc. Totum corpus conuellitur. Aliquando verò quacunq; corporis parte id contigerit conuellitur. & primùm quidem obambulat. Postea temporis progressu in lectum cadit. & rursus remittit & dolor, & conuulsio. & si surrexerit, & fortassis ad paucos dies obambularit, postea rursus in iisdem afflictionibus iacet. Atque hæc patitur ac transmutat, per multum tempus. & si quid comedit, non secedit infra, nisi difficulter, atque hoc combustum. At in pectoribus hæret cibus, & suffocationem inducit. Hunc si iisdem curaueris quibus priores, celerimè sanum facies. clysterem verò ex ptisana cocta tenui, ac melle adhibeto. *Curatio.* *Tetanus tertius.* *Medela.*

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE VIRGI-

NVM MORBIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

HIPPOCRATIS LIBER



Rincipium sit mihi compositionis eorū
quæ perpetua sunt in arte medica: Non
enim possibile est morborum naturam
cognoscere (si quidem artis est inuenire)
nisi quis nouerit naturam in indituisibi-
li, ex qua in principio discreti sunt: pri-
mum de morbo sacro appellato, & de at-
tonitis siue syderatis, & de timoribus.

ex quibus adeò fortiter pauent homines, vt delyrent. &
dæmones quosdam videre putent, iplis infestos, quandoq;
nocte, quandoque interdiu, aliquando verò vtroque tem-
pore. Postea ab huiusmodi spectris multi iam se strangula-
uerunt, plures autem mulieres quàm viri. Est enim mulie-
bris natura animi magis deiecti ac imminuti. Caterum vir-
gines nobiles & maturæ viro, hoc magis patiuntur, vnà
cum mensium descensu, antea non valde hinc afflictae. Post-
ea enim sanguis in vteros confluit, velut effluxurus.

Quum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis
autem amplius influxerit, propter cibos & corporis augmē-
tum, tunc sanguis non habens effluxum, præ multitudine
resilit ad cor, & ad septum transuersum. Quum igitur hæc
repleta fuerint, cor fatuum fit, deinde ex fatuitate torpedo,
postea ex torpedine delyrium apprehendit. Quemadmodū
quum aliquo longo tempore delidente, sanguis ex coxis ac
femoribus depressus, in tibiae ac pedes torporem inducit.

A torpore autem, pedes ad iter faciendum impotentes fiūt,
donec sanguis ad seipsum reuertatur. Reuertitur autem
celerrimè, quum steterit in aqua frigida, quæ vltra mal-
leolos madefaciat. Atque hic quidem torpor facilè cedit.
Citò enim propter venarum rectitudinem refluit. Et locus
corporis non est periculosus. At ex corde & septo traueser-
so tardè refluit. Venæ enim obliquæ sunt, & locus periculo-
sus, & ad delyrium ac insaniam paratus. Quum enim hæ
partes repletae fuerint, & horror cum febre ingruit, erro-
neas febres appellant. his autem sic habentibus præ acuta
quidem inflammatione, insanit: præ putredine verò, clamat:
præ caliginositate autem, timet ac formidat: præ compres-
sione verò circa cor, strangulationes parat: præ sanguinis
autem malitia, animus mœrens ac anxius malum attrahit.

Sed

*Virgines
qui percel-
lantur.*

*Quid pedū
torporem
discutiat.*

*Causa fu-
roris.
Planetis se-
bres.*

A Sed & alium horribiliter compellat, & in puteos proflire ac incidere iubet, & strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ vtilitatem excedentia. Aliquando verò sine spectris ac phantasmatis, voluptas quædam adest, ex qua mortem, velut bonum aliquod, amat. Postquam autem resipuit homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas muliebres vestes Dianæ consecrant, à vatibus id iubentibus deceptæ. Cæterum curatio vt hinc liberentur, est sanguinis detrahitio, si nihil fuerit quod impediatur. Ego verò iubeo virginem quum huiusmodi patiuntur, quàm citissimè viris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ fiunt. Si verò huiusmodi non affuerint ipsis, simul cum pubertate, aut paulò post corripientur, si non viro nupserint. At verò ex mulieribus viro iunctis, steriles magis hæc patiuntur.

*Quæ Dianæ darent.
Furoris me dela.*

HIPPOCRATIS

COI, LIBER DE NATVRA

MVLIEBRI, IANO COR-

NARIO MEDICO

PHYSICO

IN-

terprete.

*

C

DE muliebri natura ac morbis hæc dico. Maxime quidem num̃e in hominibus causam esse. postea verò naturas mulierum, & colores. Nam quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt & fluidiores. Nigræ verò duriores acerbioresq; ac adstrictiores. Quæ verò vini colorem referunt, medium quid inter utraq; habet. Sic autè et in ætatibus cõtingit. Iuueculæ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerumq; refertæ. Aniculæ verò sicciores, & modicum sanguinem habentes. Mediæ autè, medium quiddam inter utraq; habet. Oportet autè eum qui hæc rectè tractare velit, primum quidem ex dijs ordiri. Deinde mulierum naturas discernere, itemq; ætates, & tem-

Deus potissimus auctor & causa rerum humanarum.

Medici munus.

F

pore, & locos, in quibuscunque degunt. Frigidi enim loci, D
 fluidi sunt. Calidi verò, sic & stabiles. Initium autē faciam ab
 humido secundum naturam. Si aqua intercus in vteris obo-
 riatur, menses pauciores ac deteriores fiunt. Deinde repentē
 deficiunt. & venter intumescit, & mammae siccae fiunt, & re-
 liqua malè habet. Et in ventre sibi habere videtur. & ex his
 cognoscet, quòd aqua inter cutē laborat. Sed & in ore vtero-
 rum significationem de se prabet. Tangentibus enim gra-
 tile apparet: & calor & aqua ipsam corripit. Quum autē tem-
 pus amplius processerit, dolor in venterem, & lumbos, ac
 laterum mollitudinem occupat. Hic morbus maximè fit ex
 abortu. Accidit item ex alijs. Quum sic habuerit, calidè lau-
 re oportet, & tepesfactoria adhibere, donec dolor sedetur. E
 pharmacum autem deorsum purgans bibendum dare opor-
 tet. post pharmacum verò, vteros bubuli stercoreis fomento
 fouere, & postea medicamentum cum cantharide præpara-
 tum apponere. Et interpositis tribus diebus, id quod cū felle
 paratur. Vna verò die interposita, per triduum aceto infuso
 colluatur. & si quidem venter mollis & vacuus fiat, & febres
 sedatae fuerint, & menses prodeant, viro cōdormiat. Sin mi-
 nus, rursus eadem facito, donec menses prodeant. & aliquibus
 subdititijs vtatur. Intermedijs autem diebus crethmi corti-
 cem bibat, & pēoniarū grana nigra, & sambuci fructum, ieiuna
 in vino. & Mercurialem quam plurimam edat, & allium
 coctum & crudum, & cibis mollibus, & polypis, ac alijs mol-
 libus vtatur. Si verò pepererit sana erit. Si vteri ad hepar ac-
 cesserint, muta de repente fit, & dentes conserit, & color ni-
 ger fit. patitur autem hæc de repente dum sana est. Est autem
 huiusmodi affectio virginibus maximè antiquis, & viduis,
 quæ iuenculæ sunt & pepererunt, ac viduæ manent. Quum
 sic habuerit, depulsiōne per manum infra facta, sub hepate
 aut sub præcordijs, fascia deligato, & aperto ore vinū odora-
 tissimū infundito. Et graueolentia naribus adhibeto ac suf-
 fito. Sub vtero verò bene olentia. Postquam autē respuerit,
 pharmacū infra purgans bibendum dato, & lac asininū post-
 ea bibendum exhibeto. Deinde vteros odoratis foueto, &
 medicamenta cū buprestis præparata apponito. Postridie ve-
 ro Netopon vnguentum. Intermisis autem duobus diebus,
 vteros cum odoratis colluito. Et postridie pulegiū apponi-
 to.

*Humoris
 aquatici co-
 gnitio &
 medela.
 Primus lo-
 cellorū mor-
 bus.*

*Stercus bu-
 bulum.*

*Cum vteri
 hepar petūt*

A to, die verò una interposita, aromata suffito. Aquæ hæc quidem viduæ facito. Virginæ autem ut viro cohabitaret persuadeto, ad uteros verò nihil adhibeto, neque pharmacū bibendum dato, verum conyzam & castoreum in vino ieiunæ exhibeto, & caput odoratis ne vngat, neque odorata olfaciat.

Si uteri prociderint, & foras egressi fuerint, calor habet maximè pudenda, & sedem. Et vrina paulatim destillat, ac mordet, hæc patitur si ex partu progressa viro cōdormierit.

*Cum uteri
prociderint*

Quum autē sic habuerit, myrti baccas & loti ramēta, in aqua coquito, & aquā per noctē sub dio exponito, & pudenda cum eo decocto quā frigidissimo perfundito, & eadē trita pro cataplasmate adhibeto, postea bibens aquā lentium, & mel,

B & acerū, donec uteri fuerint eleuati, vomat. Et lectum à pedibus altiore facito, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata verò sub nares. Cibus verò vtatur mollissimis ac frigidis. Et vinum aquosum album bibat, Ne laetetur autē, neque cum viro dormiat. Si verò penitus ex pudendis exciderint, dependent velut scrotum. Et dolor corripit imum ventrem,

*Cum exci-
derint.*

& lumbos, & quum tempus processerit, ad locum redire non volunt. Morbus autē corripit, quum ex partu progressa uteros doluerit, aut cum viro in puerperij purgatione cōcubuerit. Quum verò sic habuerit, frigefactoria ad pudenda apponere oportet, & quod foris est depurgatū, & cum vino nigro, in quo malum punicum coctum est, ablutum, intro de-trudere. Deinde mel & resinā mixta infundere. Decumbat

Medela.

C autem supina pedes sursum extentos habens, postea spōgias imponito, & ex lumbis deligato. Quum autē sic habuerit, à cibis quidem abstineat, potu verò, quā paucissimo vtatur, donec septem dies præterierint, & si quidem sic ingredi voluerint, bene habet: Sin minus, summas uteri oras deradito, calefacito, abluito, ac cerato picato illinito, & alligata ad scalam muliere, scalam iuxta caput pulsato, & uteros cum manu intrudito, postea crura ipsius alternatim colligato, & sic per diem ac noctem finito, & modicum ptisanæ succū frigidum dato, aliud verò nihil. Postera die decubenti cucurbitā quā maximam ad coxendicem affigito, & multo tempore trahere finito, postquam verò detraxeris, ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil aliud quā succū exhibeto, donec septem dies præterierint. Si verò sitiat, aquam dato frigidam

quàm paucissimam. Vbi verò septem dies præterierint, cibis **D**
 mollissimis ac paucissimis vtatur. Si verò ventrem exonera-
 re velit, decumbens exoneret, donec quadraginta dies præ-
 tereant, postea surgat, & parcissimè obambulet, & ne laue-
 tur, sed intra pudendum graueolentium suffitum admittat,
 & modica edat. Si vteri adglutinati fuerint, incumbunt.
 & si contigeris, videbis locum durum sub lateris mollicie, &
 dolor corripit imum ventrem, & laterum mollitudinem, &
 lumbos, & in crura dolor irruit, eaquè extendere nō potest.
 Sape verò etiam suppurantur, & linamētis inditis curatæ ac
 fluentes moriuntur, si non vsseris, aut secueris. Quum autem
 sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare opor-
 tet, & multa calida lauare ac fouere, & quum recens lota aut **E**
 fota fuerit, iubere vt admota manu, cum digito os vterorum
 abstrahat, & myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bi-
 bat autem pæoniæ grana nigra quinque, castorio ammixto,
 in vino odorato, & in coxam sanam decumbat, & apponat
 Baccarim vnguentum, aut oleum album ad coxam sanam, &
 edat allium plurimum, & crudum, & coctum, & succum sor-
 beat, & cibis mollibus vtatur, postquàm autem dolor quie-
 uerit, abduces euntem super sanam coxam, postea verò fo-
 mentum ex vrina adhibeto, lauro inspersa, & à fomento cy-
 claminū apponito, postera die lotæ suffitus ex aromatis ad-
 hibeatur. Cæterum ex hoc morbo maximè steriles fiunt.

*Si os utero-
 rum compli-
 catū fuerit.
 Curatio.*

Si complicatum fuerit os vterorum, menses nō prodeunt. **F**
 Si verò prodeant, pauci ac prauī sunt. Et vbi cum viro coit,
 dolet, & dolor imum ventrem tenet ac lumbos. Et si contin-
 gat digitis & os requirat, non est manifestum. Quum sic ha-
 buerit, vrina humana foueatur, & post fomentum lenticulæ
 decocto lauetur, & postquàm lota fuerit, vteri vnguento Aeg-
 yptio foueatur. Et si odor ad nares ascēderit, spes est ipsam
 sanam fore. Et quum dormire voluerit, Aegyptium oleum
 in lana subdat. Postera verò die consideret an magis corre-
 cti sint vteri, postea odoratis foueto, & purgatoria quæ non
 mordeant subdito, & post subditicia medicamēta, pari men-
 sura aceti ad aquam ammixta eluito. Quum autem menses
 prodierint, ieiuna & illota, & suffita, cū viro coeat. Maximè
 verò ex hoc morbo steriles fiunt. Si vteri ad coxam decur-
 rerint, & menses non procedunt, & dolor ad imum ventrem
 accedit,

*Cum uteri
 coxendicem
 petunt.*

- A** accedit, & ad lateris molliciem. & si digito cōtigeris, deprehendes os in coxa. Quum ita habuerit, calida lauato, & allia plurima edenda dato. Et lac ouillum purum bibat. & postquā lac purum exhaust, fomēto adhibito, postea pharmacum infra purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus vteros foueto, ex fœniculo & absinthio permixtis. Vbi verò recens fota fuerit, os cum digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die postea id quod præparatur cum narcissino adhibeto. Si verò tibi purgata esse visā fuerit, Netopon apponito. Et postridie rosaceum vnguentum. Cæterum prima mensium decurrentium die ab apponēdo cessato. postera verò incipito vbi defecerint. At in mēsis si quidem sanguis eruperit, satis est: Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & pæonię grana nigra quinque, & sepię oua. & apij semen, cum vino. Et si dolor habuerit, & vrinæ stillicidium vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam bibat aquosam. Si verò à primo nō fuerit purgata, rursus bibat donec fiat. postquam autem purgatio decurrit, ieiuna cum viro coeat. In purgatione verò mercurialem edat, & polypos coctos. & cibus mollibus vtatur. Liberabitur autem à morbo, si in vêtre habuerit. Si ex partu non fuerit purgata, tumet venter & crura. & rigor ac dolor imum ventrem, ac lumbos tenet. Quādoque etiam ad viscera ascendit, & animo linquitur. Atque hæc patitur incipiente morbo. progressu verò temporis, cauæ faciei partes rubescunt. Quum igitur sic habuerit, fomento vteris adhibito, cyclaminum apponito. Bibat autem medicamētum cum tæda præparatum, donec fluxus fuerit commotus. Ad os verò vterorum, adipem anserinum illinito, & myrrham, & resinam tepidam. & quāmaximè deambulet. & ante cibum Mercurialem coctam edat, & allium ac porrum. & brassicæ succum sorbeat. & cibus mollibus vtatur, & magis marinis. & calida lauetur. A pinguibus autem & dulcibus abstineat. donec sana fiat. Si vteri pituita impleri fuerint, flatus oboritur, & menses albi pituitosi superueniunt. Aliquādo etiam sanguis tenuis pelliculis plenus. & præ humiditate cū viro coire non vult, et pallida ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsam oportet, an quod fuit mordeat et exulceret. et si non mordeat, pronunciare cerebro fluxum esse. Si ve-

*Curatio.**Cum puera non purgatur.**Curatio.**Cum uteri pituita copulatur, quid accidat.*
Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER

rd mordeat, à ventre. Si quidem igitur à ventre fuerit, à D
lenticulæ decocto vomat. Deinde veratro purgato. postea
idem in nares immittito. Postquam autem superior venter
tibi purgatus esse videbitur, pharmacum infra purgans bi-
bendum dato. A cibis autem pinguibus ac dulcibus absti-
neat. Acres autem exhibeantur, velut commodi, nisi pu-
denda fuerint exulcerata, præstant autem frigidi. Et mo-
dice laetetur, non tamen calida, neque caput. Ieiuna verò
bibat hypericum, semen apij, saluiam, in vino aquoso.

Cum uteri
penitus in-
flammat,ur,
quid agen-
dum.

Quum autem cessauerit fluxus, cum succo grossorum elui-
to, & postea acerbis colluito, Est autem morbus grauis. Si
vteri inflammati fuerint menses omnino non prodeunt, aut
prauī & pauci. Et quum ieiuna est, vomitus ipsam corripit. E
Vbi verò quid ederit, vomit cibos. & dolor inum ventrem
ac lumbos habet, & animi deliquium inuadit. Venter autem
aliquando durus, aliquando mollis est, & inflatur ac magnus
fit. et putat se in ventre habere. Si verò contigerit, plenitudo
illa vacua fit. Huic vsque ad decimum mensem tumor paula-
tim augetur, velut in ventre habenti. Vbi verò decem men-
ses præterierint, venter aqua impletur, et vmbilicus eminet.
Et si digitum admoueris, os vteri gracile et collapsum com-
peries. Et vbi menses apparuerint, pauci sunt et prauī. Et cla-
uiculæ ac collum attenuantur. Et pedes intumescunt. Quum
igitur sic habuerit pharmacum infra purgans bibendum da-
to. et ad vteros quæ purgant et non mordent apponito. Et
post appositionem vteros eluito, pari mensura aceti acerri- F
mi ad aquam ammixta. et Mercurialem edat, et succum eius
farina inspersa, vbi cocta fuerit absorbeat. Morbus autem est
periculosus. Si ignis facer erysipelas dictus in vteris obo-
riatur, tumor fit à pedibus exorsus, et ad crura et ad lumbos
procedens. Quum autem tempus ampliùs processerit, intum-
escit etiam venter, et rigor ac febris corripit, itemque de-
bilitas. Præ dolore verò, quiescere nō potest, sed iactat seip-
sam. Dolor autem ex imo ventre ascendit ad lumbos. Postea
sursum vergit ad præcordia, et pectora, et caput. Et mori sibi
videtur. Quū autē remiserit, torpor occupat manus. Aliquan-
do etiam inguina et crura, et poplites. et liuida fit, et modico
quandoq; tēpore sibi meliùs habere videtur. Deinde rursus
eadē patitur. et corpus pustuli implet. et facies rubescit, et si-
tis fort

Vteri cry-
sipelas.

A tis fortis tenet, & fauces sicce sunt. Hic morbus si pregnantia fiat, moritur. Sin minus curata sanatur. Quum igitur sic habuerit, adhibere oportet, si dolor habeat, frige factoria, & ventrem turbare. Et si quidem in ventre habeat, cibis ac potibus vratur, à quibus fetus non corrumpitur. Si verò non secedant, clysterem adhibeto. Si autem in ventre non habuerit, pharmacum bibendum dato, & cibis paucissimis vtatur mollissimis ac frigidis, & Mercurialem edat, & sambucum, & neque falsa, neque pingua, neque acria, velut est origanum, aut thymus, aut ruta. Postquam autem calor & strangulatio remiserit, & tumor non fuerit sedatus, medicamentum fortius infra purgans postea bibendum dato. Morbum autem

B hunc paucè effugiunt. Si vteri præter naturam hient, & menses plus quam oportet prodeunt, viscosioresq; ac frequentiores, & genituram non manet intus. Et si digito contingeris, os hians comperies, & febris ac rigor. & dolor, imum ventrem & lumbos corripit. Hic morbus à fluxu sanguinolento corripit. sit autem quum menses suppressi derepente eruperint. Huic quum dolor maximè habuerit, tepe factoria apponito. Et cum remiserit, vteros foueto, & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quæ non mordent subito, & post subdititia medicamenta, cum acerbis collueto, & quam minimum lauato. Cibis autè siccissimis vtatur. Si verò his factis sana non fiat, pharmacum bibendum dato, à quo sumum ac deorsum purgetur. Et quum menses mori fuerint, & quum quiesuerint, eiusdem modi victum exhibeto. Morbus autè lethalis est. Si vteri ad medium lumborum protuberint, dolor imum ventrem habet, & crura contrahuntur, & quum aluum exonerat, dolores acutiores fiunt, & stercus cum vi prodit, & vrina destillat, & animo linquitur. Quis sic habuerit, fistula ad vesicam alligata vteros iussilato, & fomentum adhibeto. Aut multo calido lauato, & male olentia sub pondenda sufflato. Sub nares autem odorata. Quum autem dolor cessarit, leucicula decocto præpotato, pharmacum sursum purgans bibendum dato, à quo venter moueatur. postquam autem vteri ad locum suum redierint, medicamentum infra purgans bibendum exhibeto, & postea lac bibendum dato. Postea fomento ad vteros adhibito ex vino, medicamenta cum lauro præparata immittito, & apponito quæ non mordent, ammix-

Curatio.

Cum vteri præter naturam hiant.

Curatio.

Cum vteri lumbos percutit. Medola.

HIPPOCRATIS LIBER

*Profluuiū
album.*

to aceto. Postea aromata suffito. Cæterum steriles & claudæ **D**
fiunt ex hoc morbo. Quum fluxus albus obortus fuerit, ve-
lut vrina asinina apparet. Et dolor inum ventrem habet, &
lumbos, & lateris mollitudinem, & tumores sunt crurum ac
manuum, & caua eleuantur, & oculi humidi sunt, & color
arcuatus ac albus fit. Et quum iter facit, anhelat. Morbus au-
tem fit, si vbi natura pituitosa est, febricitarit, & bilis com-
mota purgata non fuerit. Si quidem igitur venter acuerit,
ventris profluuiia fiunt. Si verò ad vteros vertatur, fluxus fit.

Medela.

Postquam igitur ventris profluuium habuerit, papaueris al-
bi ac rubri corticem pari pondere, & spinæ fructum in vino
diluto terito, & polenta recenti inspersa bibat. Si verò velis,
malicorium calido cinere torrefactum ac tritum ex vino bi **E**
bat, pari polenta ac farina inspersa. Minimum verò lauetur.
Cibis autē vtatur quàm siccissimis ac frigidis. Vbi verò flu-
xus quieuerit, pharmacum bibendum dato, à quo superna
purgentur, & lac asininum bibat. Postquam autem infra pur-
gata fuerit, bubulum lac bibat, ad dies quadraginta, si pote-
rit meracū, sub dio per noctem expositum, quarta aquæ par-
te ammixta. Vesperi verò vbi ebibit, alicam sorbeat. Quum
autem decem dies fuerint transacti, lactis & aquæ decimam
partem detrahito. Quantum autem detraxeris, tantam tepi-
di recens multæ portionem additam bibat. postridie verò
duas portiones, vt in decem portionibus pro modico diluto
fit meracum, & ad quatuor dies bibat. Dum autem decimā
partem detrahit, etiam de sorbitione amplius addat. Post **F**
quam autem quatuordecim dies transfegerit decimam lactis
partem bibens, postea tertiam aquæ partem affundens, ad
dies decem bibat, & cibis vtatur, & sic fiant omnes dies qua-
draginta. Quum conceperit & vterum ac partus gesta-
rit, ea quæ natura sterilis est, primū quidem menses defi-
ciunt, & pauciores fiunt, & tempus in quo prius fiebant, trā-
mittunt. Postea derepente multi fiunt, & puri ac fortes, & si
quidem semel facti fuerint, de cætero secundum rationem
in ventre habet. Sin minus, & primū fiunt & iterum atque
iterum in mēse, postea ex seipso desinet fluxus, pallidāq; ac
tenuis fit. Pharmacum igitur & sursum & deorsum purgans
bibendum dare oportet. Et lac asininū postea bibendum aut
serum. Postea adhibito fomento, vteros medicamento quod
non

*Profluuiū
aliud.*

Medela.

A non mordeat purgato. Deinde cum aceto colluito. Postea aromata suffito. Hæc autem facito ut prima mensium die facta sint. Et ne sit illota & impasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis suffiatur, betopo affuso & vnguento roseo. Postea cum viro coeat. Si acerbula pituita plena fuerint, menses quidem bene succedunt, & in ventre habet. Corruptum autem foetum ubi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrumpitur. Cognoueris autem hoc modo. Humida sit, & mucosum ac viscosum defluit, & non mordet, & in mensibus ubi à fluxu purgari cessauerit, per duos ac tres dies muci ab utero prodeunt. Hanc grossorum succo eluito, & collusione per acerba postea bis aut ter facta. de cætero ap-
Bponito id à quo pituita purgatur, & mollia fomenta adhibeto. Et post subditicia apposita, pari mensura aceti ad aquam ammixta eluito, & in mensibus aromata suffito. Postea impasta & illota cum viro dormiat. Quum menses occultati fuerint dolor imum ventrem tenet, & onus incumbere ipsi videtur, & lumbos dolet, ac laterum molli tudinem. Quum verò ad præcordia uteri allapsi fuerint, suffocant: & ubi frequenter acida euomit, ad modicum tempus melius habet. Dolor autem & ad caput & ad collum procedit. Postquam igitur allapsum parat, aut allapsi sunt, reprofactoria adhibeto, & graueolentia suffito, infra autem odorata, & castorium bibendum dato, et conyzam. Vbi verò deorsum prociderint, infra graueolentia suffito. sub nares autem odorata. Sedatis autem doloribus, pharmacum bibendum dato. Et lac asininum postea bibendum. Deinde succum à quo vomat dato, et ad nares apponito. Postquam autem purgaueris, fomento uteris adhibito ex his quæ cum lauro præparantur, id quod ex narcisso præparatur apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhibito, id quod ex cantharide præparatur apponito, et postea die adipem aserinum. postea intermissis tribus diebus, collusione cum aceto parata eluito. In purgationibus autem mercurialem ante cibos edat, et cibis mollissimis utatur, et acria edat. Et bis in die calida lauetur. Si verò menses non fiant, ubi hæc opportuno tempore feceris, cantharides bibendas dato, et postquam prodierint, ieiuna et illota, ac suffita, cum vino dormiat. Quum in ventre habens, foetum menstruum aut bimestrem corruerit, et ad perfectionem gesta-

Cum acerbula pituita implentur.

Medela.

Menses cum non decurrunt.

Medela.

Cum prægnans parit menstruum perdit.

HIPPOCRATIS LIBER

Medela. re non poterit, et tenuis præter naturam fiat. Huius vteros **D**

*Crassa cur
non concipi-
ant.*

*Cum os uul-
ue durescit.*

Medela. Quum sic habuerint, nihil acre adhibeto. Si enim os exulce-
raueris, ubi inflamatum fuerit, periculum est ne penitus ste-
rilis fiat. Verum apponito quæ non mordent, à quibus pur- **E**
getur. Si mulierem parere non potentem purgare velis,

*Cum menses
non decurrunt*

ab his

*Cum humi-
dus fuerit
os uulue.*

et fuerit biliosa aut pituitosa. Cognosces autem utrum ho-
rum sit, si arena substrata quum menses fiunt, in sole sangui-
nem superfundas, ac siccare sinas. Si enim biliosa fuerit, su-
pra arenam sanguis pallidus erit. Si verò pituitosa, velut mu-
cus erit. Et sanè utrum horum fuerit, infra purgato, et ad v-
teros subdititia apponito. Si menses omnino non fiant, si
quidem præ dolore id contingat, primùm ventrè infra purga-
to, deinde medicamentum à quo sanguis ex vteris purgatur
apponito. postea intermissa die vna aut altera, rursus id à quo
sanguis purgatur apponito. Reliquo verò tempore corticem
citræ in vino tritum bibat. Si humidius fuerit os vte-
rorū quàm oportet, acria apponito, quo morsum perreptet, **F**
et inflammatū valde durum fiat. Si verò induratum fuerit, a-
cria adhibeto. Mordentia enim saniem diffundunt. Deinde
mollia apponito. Sed et ad alios morbos non minus apponi-
ro. Si puerperæ vteri in coxam incubuerint, aut ad lateris
mollitudinem, ad sanam coxam oleum Aegyptium album,
aut baccarum vnguētum apponere oportet, et in sanā coxam
decubat, et prona grana nigra quinque bibat, et fructus sam-
buci conchæ testam maiorem, et castorij magnitudinem fa-
be in vino. postea lota suffiatur, et potibus ac cibis molibus
vtatur, et mercuriali, et acribus omnibus, excepto raphano
ac cepis. Quum suffocari vteri, graueolentia omnia suf-
fire oportet, bitumen videlicet, sulphur, cornu, lucernarium
funiculum, phocæ adipem, castorium. Odorata verò subter
puden

*Strangu-
tio uulue.*

- A** pudenda. Si verò puerperæ inflammanti fuerint, vteri, ardet, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, muscum marinum tenue tritum super linteolo extentum pro cataplasmate adhibeto. postea crudam ordeaceam farinam, & cinerem sarmentitium, ac lini semen, oleo & aceto affuso coquito, donec velut farinæ subactæ massa fiat. Deinde quam calidissima ferre potest imò ventri imposito. Si verò fixi fuerint vteri, lentem & mentam multam in aceto coquito, ut vaporem inde in os trahat, & nares adhibeat, & graueolentia suffito, & mercurialem edat, & in succo eius farinam coctam sorbeat. Quam celerrimè autem & priusquàm dolor occupet, exhibere oportet pharmaca, quæ vteros à dolore leuant, & cibos per aluum secedentes assumat. Si verò vter calefiat, clysterem adhibeto. Si ex partu inflammati fuerint vteri, solani succum in pudenda infundito, & vbi hic calidus factus est, alium infundito, Si verò hic non fuerit, lentisici aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum infunde. & quod in medio huius est tenerimum, dera sum longa forma inde. postea cerusam aqua trita & lana exceptâ appone. Si verò horruerit, tolle. Si mulier ab vtero debilis sit, et bilis ipsam suffocet, & opus sit ipsam leuiter purgare, & dolorem sedare, peucedani succû trium cyathorû mensura bibendû dato. Si in lumbis aut lateris mollitudine fuerint vteri, & transmutare velis, sulphur & bitumè terito, & melle cocto affuso, glandulâ crassam facito, & in sedè indito. & vteri si sicci fiant, hæc quàm celerrimè apponito. Mulieri si vteri sicci fiant, & ad pudèda promineant, & inguina dura fiant, & calor in pudèdis insit, cancerari incipit. Quû sic habuerit, cum cumeris syluestris internâ partem aridam terere oportet, & aquæ hemina affusa, in sedè immittere, & purgari finire donec purgetur. Quum autè mulieri pharmacum dederis, ammisce ad pharmacû ea quæ vteros purgant, & quæ expellunt.

Potiones, & subdititia medicamenta quæ

secundas educere, & menses
detrabere possunt.

C Antharides quinque; auulsis alis & pedibus ac capite, deinde tribolos ad mare nascentes vnâ cû radice mensurâ quanta est cõchæ testa terito, & anthemi pallidâ siue luteam internam

Cum vteri
inflammantur.

Medda.

Cum vteri
compacti
fuerint.

Apertæ
inflammatio
vulvæ.

Debilis
à partu.

Cum lumbi
& ilia
venerantur.

Cum vulua
durefcit.

HIPPOCRATIS LIBER

Internam partem siccam tritam, conchæ testam addito, et se-
 minis apij tantūdem, et sepia oua quindecim et in vino dul-
 ci diluto bibenda dato. et quum dolor habuerit, in aqua cali-
 da desideat, et aquam mulsam aquosam bibat. Aliud. Ra-
 nunculi foliorum et floris triti Aegini stateris pōdus, in vi-
 no dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album
 et uvas passas in aqua coquito, et perfrigeratam bibendā da-
 to. et vbi vrinæ stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat.
 Aliud. Adianti staterē Aeginæum, in vino albo pari aqua
 ammixta, bibendū dato. Aliud. Viola albe semen quan-
 tum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo eodē mo-
 do temperato, bibendum dato. Aliud. Leucoij nigri ra-
 dicem, in vino eodem modo sumat. Aliud. Crinanthemū
 quod in domibus nascitur, eodem modo misceto ac bibendū
 dato. Aliud. Anchusæ foliorum pugillos, duos, in vino al-
 bo aquali aqua ammixta, bibendos dato. Aliud. Chamæ-
 leonis radicem, velut veratri potionē, deraſam in vino albo,
 aqua pari mensura ammixta, bibendā dato. Aliud. Bras-
 sicæ et porri succū, ad vtrūq; succi silphij obolis tribus am-
 mixtis, et vino albo cum pari aqua bibendum dato. Aliud.

Oliuas albas priusquam oleum insit compunctas siccato,
 postea tufas et cribratas ac in vinum iniectas bibendas dato.
 Hoc et menses detrahit, et secundam expellit. Aliud. Di-
 ctammi Cretici obolū in aqua bibendū dato. Et si hoc in po-
 tu dato, secundam eijcere non potes, sambuci succo cocto im-
 misso foueto, et cantharidē apponito. Hoc etiam foetum ex-
 pellit. Quum autem morsum intulerit, auferat, et rosaceo vn-
 guento tinctum apponat donec elapsa fuerit. Aliud. Po-
 puli nigrae creticae grana nouem trita, in vino bibenda dato.
 Cum hoc etiam ablatur: si difficulter pariat. Aliud. Go-
 nyza testam conchæ maiore cum porri succo diluito, et ne-
 topi testam conchæ maiorem ammisceto. et hæc in vino bi-
 benda dato. Aliud quod menses detrahit. Peucedanum
 et panaces, et pæoniae radicē, in vino bibenda dato. Aliud
 quod foetum mortuum et secundas eijcit. Viola et portu-
 lace semen contundito ac misceto, et in vino albo veteri ex-
 hibeto. Aliud quod menses detrahit. Seminis violæ albæ
 quantum tribus digitis apprehendi potest, et stercoris capri-
 ni pillulas quinque aut sex, in vino odoratissimo pmiscero,
 et biben

A & bibenda dato, vbi prius fomentum ex aqua & oleo immiseris. Adhibeto autē fomentū in sella, & vbi hæc bibit, quā celerrimē lotam reclinato. Brassicam verò edendam exhibeto, & succum eius sorbendum. Aliud. Seminis violæ albæ quātum tribus digitis apprehendi potest, in vino bibendum dato, & in aqua calida desideat. Si verò id non habeat, fœniculi radices contusas, in aqua mulsâ tepida macerato, & exhibeto. Aliud. Fraxini grana decem, in vino bibenda dato. Hoc in omni vterorum morbo cōmodum est, & valde ciet vrinam. Aliud. Succum sulphij magnitudinē erui, & nasturtij semē terito ac ammisceto, & in vino aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam fœtum expellit. Aliud fœtum eiiciens. Ranunculum herbam, & parum elaterij, in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem.

Brassicæ caulem tenerū, extremitate ex nepoto illita, affricato. Aliud si menses non fiant. Terebinthi fructum tritum, in vino & aqua dilutum ac excolatum, ieiunā bibendum dato, & calidā lauetur. Aliud menses ciens. Rubra prœniæ grana, in vino ieiunā bibēda dato. Aliud ad puerperij purgamenta purganda. Fœniculi semen, & crethmi corticem, & thus, in vino bibenda dato. Aliud. Tadam quā pinguisimam in vino coquito, & prœniæ grana quinque in vino terito, & hemina quadrantem bibendam dato.

Aliud. Mercurialis semen & folia, in vino bibenda præbeto. Aliud. Prœniæ grana nigra quinque, & sœpiæ oua **C** in vino bibenda dato. Ad omnē puerperam. Ad irionem & polentam, oleum affunde, & coctū sorbeat, & cibus quā mollissimis vtatur. Aliud. Scammoniam in lacte muliebri tritam, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in linteo subde. Aliud. Herbam artemisiā tritam, & vnguētō rosaceo imbutam appone. Aliud. Albam radicē tritam ac rosaceo vnguento subactā appone. Aliud.

Prœniæ radicē melle, vnguento rosaceo & Aegypcio subactam, in lana subde. Aliud. Farinam non lotam eodem appone. Aliud. Lolij & tritici farinam, simul melle subactas, in lana subde. Aliud quod menses & puerperij purgamenta purgat & aquā ducit. Radicis struthij tusi tritici quātum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nasctur autem in Andro in littoribus. Aliud ad vteros depurg

Noto per

HIPPOCRATIS LIBER

depurgandos. Mercurialis contusa, & cucumeris syluestris **D**
modicū, in vino tere, & melle subacta appone. Aliud. Pilos
leporis cōbustos, ac tritos in vino, & melle cocto & aqua sub-
actos, bibēdos dato, & aqua calida lauetur. Aliud partus pur-
gatoriū. Potentā crassius fresam dimidij hemichætnicis mē-
sura, in aquæ heminis quatuor coquito, & vbi efferbuerit, bis
aut ter sorbendā dato. Aliud purgans puerperij purgamēta.
Sambuci folia coqto, & oleo affuso bibēda dato. Edat & bras-
sicas coctas, & porrū. Aliud purgans vteros. Rhōis folia &
irionē terito, & in vino, polēta inspersa, bibēda dato. Aliud.
Misyos obolos duos tritos & vino subactos apponito. Aliud.

Linū semen tritū, vino subactū apponito. Aliud. Trifolij
semē in vino bibendū dato. Si verò ad lūbos vteri incubue- **E**
rint, polypos coctos edat, itemq; affatos, & vinū bibat nigrū,
odoratū, meracū quā plurimū. Alię portiones, medicamēta
subdititia ac purgatoria. Rhōē rubrū, & vinacea, in aqua co-
quito, & farina tritici recētis in aquā inspersa, bibendā dato.

Aliud. Farinā in aquā iniectā bibēdā dato. Aliud. Mora
sub siccato ac terito, & polēta recēti ammixta, amborū ace-
tabuli mensuram, in vino odorato & aquoso, bibat. Aliud.
Terrā nigrā samīā in aqua tritā, tali magnitudine bibēdam
præbeto. Aliud. Hypocistidē in vino bibendā dato. Aliud.
Mala punica vinosa exsuccato, & polentā cū succo, subactā
succato. Postea tritā in vino bibendam dato. Aliud. Baccas
myrti nigras tritas in aqua diluito, & polēta inspersa, biben-
das exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis affati drachmā, in **F**
vino tritā bibēdam dato. Aliud. Triticū & ordeū torrefa-
ctā, trita, & ad farinam redacta, in vino nigro bibenda dato.

Aliud. Mali punici dulcis internā partē, pari aqua ammixta
bibendā dato. Aliud. Cicutæ quantū tribus digitis appre-
hendi potest, cū aqua bibendū dato. Aliud. Farinæ tritici
recētis, & gypsi, æquales partes mixtas in aqua bibēdas dato.

Aliud. Mali punici dulcis corticē ac coriū, in vino bibēdū
dato. Aliud, si sanguis ex vteris fluat. Viticis folia in vino
nigro bibenda dato. Aliud, ad fluxū ac dolorē. Rosmarini
radicē in vino bibendā dato. Alias item portiones ad vteros
habes. Cedri fructus, seseli, cuminū Aethiopicū, casie fructū,
iuniperi baccas, miliū, lentisci fructū, nigellā, dauci radicē ac
semē. Aromata verò, thymū, thymbrā, ericē, hypericū, papa-
uer

Auer album crethmi radices ac semen, maluarum radices mercurialis semen, & folia, vrticę semē, saluiam, populum nigram, dictamnū, pseudodictamnū, amomum, cardamomū, heleniū, aristologiam, castorium, adiantum, dracōtium, peucedanū, rutę folia ac semē, apij semē, fœniculi semē, hipposelini semen & radices, hippomarathri semen & radices, struthij semen & radices, hyssoppum cilicium, irionem, pæoniam, panaces. Quodcunq; horum volueris, & cū altero permixtū, & per se in vino aut aqua prout volueris coctū, exhibeto bibendum. Commoda sunt et purgatoria, et quę dolores sedant.

Maluarum radicem in aqua dato. Aliud. Pæonię semen modico cedrino oleo ammixto, in vino bibendū dato. Et vterorum dolores sedabis. Aliud, quum vteri suffocarint. Castorium et conyzā in vino albo bibenda dato. Si verò ad nares accesserint, cnidij internā partem albā, melle ammixto, naribus illinito. Aliud sedans dolores. Maluarum radicem, et fœniculi ac crethmi corticem, ex aqua bibenda dato.

Aliud. Stellas marinas nigras, et brassicam misceto, et in vino odorato bibenda præbeto. Aliud. Myrrhę obolos tres, coriandri parum, resinā, pæonię radicem, cuminum Aethiopicum, hæc trita in vino albo diluta, leuiter tepescata bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Ricini radicem bibendam dato. Aliud, si ad cor allapsi vteri strāgularint. Vtici et pæonię semen, in vino bibendum dato. Appositicia acria sanguinem ducentia. Cantharidas quin-

Cque thuri ac myrrhę ammisceto, et glandulam longam magnitudine gallę formato, et lana obuolutā linteo albo circū dato, et vngueto Aegypto albo aut rosaceo madefactā apponito. Aliud. Buprestim si parua fuerit, totā, si magna, dimidiā, ad prædicta ammisceto, et eodē modo apponito. Si verò mollioribus vti velint, buprestidas in vinum mitte, et cuminū Aethiopicū, et seseli, ac anisum addito ac feruefacito. ad decē verò buprestidas, acetabulū olei ammisceto, reliquis oībus æquali portiōe acceptis. Ammisceto etiā myrrhę ac thuris parū. Ex hoc pugillū accipito. et velut priorē glandulā subdito. Aliud. Nigellā terito cū melle, et vino subactā in glādulā redigito, ac vtere velut superiore. Aliud. Philistiū eodē modo preparatū apponito. Aliud. Telephiū eodē modo preparatū subdito. Aliud. Anemonę folia trita linteo excipito

HIPPOCRATIS LIBER

excipito, & myrrheparum ammisceto, & eodē modo vtitor. **D**

Aliud, quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiam terito, & sulinum vnguentum quod est in terra Aegyptia addito, & aqua diluta, ac lana inuoluta apponito. Aliud bilē purgās. Cucumeris sylvestris medullam tritam, ac melle subactam, & ad glandis formam redactam apponito. Aliud.

Colocynthis sylvestris internam partem terito, & melle subactam eodem modo subdito. Aliud. Elaterij potiones

quatuor, adipe anserino & caprino, & misy ammixto, in glādulam formato, & in linteo apponito. Aliud. Thlaspitritum, & melle imbutū apponito. Aliud. Foliorū fici sanie

deradito, & elaterij potiones duas ammisceto, & nitri tantūdem, melleque subacta apponito. Aliud, si vteri inflamma

ti fuerint. Nitrum rubrum, ficus pinguedinem internam, vtriusque pares portiones tritas, & ad gallæ magnitudinem

efformatas subdito. Aliud. Cucumini folia cū vino trita, in linteo subdito. Aliud. Radicē albā terito, & melle affuso

feruefacito, & glandulā inde factā subdito. Aliud. Succū silphij, & ficū, mixta in glādē formata apponito. Aliud. Cucumeris sylvestris semen tritū eodē modo. Aliud. Fel tauri,

nitrum rubrum, netopō, cyclaminū terito, & de singulis gallæ magnitudinē, de cyclaminoverò plurimū, melli ammisceto & apponito. Aliud. Cyclamini caput purgatū, in aqua

tritum ac linteo illigatum apponito. Aliud. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, hæc melle subacta ac linteo excepta

subdito. Aliud. Grana cnidia triginta deligito, & tria

Indici pharmaci oculorum, quod piper vocatur, & alia tria de rotundis. Hæc tria in vino veteri trita, & oleo dulci diluta ac subacta, lanaque excepta subdat, & vrina eluatur. Aliud.

Tithymali succum melle subactum, ac linteo exceptū apponito. Aliud. Scillæ radicem longitudine digitorum

sex sumito, & duobus digitis lana obuolutis subdito. Alia mollientia, à quibus aqua purgatur, & sanguis ac menses du

cuntur, si non diuturni fuerint, & os vteri mollitur. Narcissinum, cuminum Aethiopicum, thus, absinthium, cyperum:

aliorum quidem singulorū æquales portiones sumito. narcissini verò partes quatuor. Hæc trita & in glādulā efformata, linteoque crudi lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudinetali, & florem aris magnitudine fabæ

terito,

A terito, melle subigito, & efformatam hinc glandulā subdito.

Aliud. Pulegium, myrrhā, thus, fel suillum, melle subigito, & in glandulā efformata subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum apponito. Aliud. Cnicum eodem modo preparatum subdito. Aliud. Loti ramenta eodem modo apponito. Aliud. Rhoem melle ammixto subdito. Alia mollientia. Sulphur, adipem, vitellum oui, farinā, melle subige, & tepesacta in lana subda. Aliud. Pinguedinem anseris, adipem ouillum, ceram albam, resinam vnguentum rosaceum, tenui linteo excepta appone. Aliud.

Medullam cerui & adipē liquefacito, & in lana apponito.

Aliud. Adipem ouillum aut caprinum, & oui candidum rosaceo vnguento subactum, ac lana exceptum apponito.

B Quæ ad eluendos vteros infunduntur. Grossos hybernos in aquam missos ad lentum ignem coquito, & oleo ad decoctum affuso eluito. Deinde verò malicorium, & gallam, & loti ramenta, in vino acerbo coquito, & hoc excolatum infundito. Aliud. Fecem vini combustam in aquam mitte, & postea cum aqua collue. deinde malicorio, myrrhi baccis, folijs rhois in vino coctis, vinum excolatū infunde. Aliud.

Lērisi, saluix, hyperici folia, in vino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in vteris fuerit exulceratum. Butyrum, thus, myrrhā, resinæ parum, infunde. Aliud. Porrū in aqua coquito, & excolatā aquam ad vinum ammixtā infundito. Aliud. Sambuci fructum, anisam, thus, myrrhā, vinum, sumito & horum succum infundito. Aliud. Brasicam in aqua coquito, & in brasicæ succo, mercuriale coquito, modico lini semine adiecto, & postea excolatum infundito. Aliud. Myrrhæ acetabulum, thus, seseli, anisum, semē lini, netopum, resinā, mel, pinguedinē anseris, acetum albū Aegyptium, horum singulorum æquales portiones terito, & in vini albi heminis duab⁹ diluito, & postea tepida infundito. Aliud. Mercurialem in aqua coquito ac excolato, & myrrhæ acetabulum, thuris, netopi, singulorū æquas portiones ammiscero, ac tepida infundito. Aliud. Saluiam & hypericum in aquam coquito, ac infundito. Aliud. Sambuci fructum, & lauri baccas, æquis portionibus in vino coquito, deinde vinum infundito. Aliud. Pulegium in aqua coquito, & oleo ad aquam affuso immittito. Aliud. Pingue-

HIPPOCRATIS LIBER

dinem anseris, & resinam, colliquefacta infundito. Aliud. D

Butyrum, oleum cedrinum modicum, cum melle liquefacto, & tepida infundito. Aliud. Cyperum, iuncum rotundum odoratum, calamum aromaticum, pari portione myrrhæ ammisceto, & cum his Sisymbrium in vino coquito, ac infundito. Aliud. Semen apij, anisi, fœselis, nigellam, in vino coquito ac infundito. Aliud. Cedrum creticam in vino coctam infunde. Aliud. Bryoniam albam & myrrham, in aqua diluta infunde. Aliud. Argenti florem cum vino & aqua infunde. Aliud. Elaterij portiones duas aqua dilutas infunde. Aliud. Cucurbitas siue colocynthidas sylvestres duas, in vini aut lactis cocti heminis quatuor madefacito, excolato, ac infundito. Aliud. Cucumeris sylvestris medul
lam palmi parvi magnitudine, in aquæ heminis quatuor coquito, & melle ac oleo affuso infundito. Aliud. Radicis thapsiæ duas portiones, & mel ac oleum, in duabus aquæ heminis diluito ac infundito. Aliud. Veratri duas portiones in duabus aquæ heminis tepidæ infundito. Aliud. Thlaspios acetabulum melle admixto, in duabus aquæ heminis diluito, ac tepidè infundito. Aliud. Cucumeris sylvestris magnitudinem palmi parvi, in aquæ heminis quinque coquito, & melle affuso infundito. Aliud. Grana cnidia sexaginta, oleo & melle diluta infundito. Aliud. Si natura pituitosa fuerit. Cneori portionem tritam in aquæ mulsæ hemina Aeginea diluito, ac infundito. Aliud. Si biliosa fuerit, Daphnes portionem odoratæ illius drachmæ pondus, scammonia
portionem, terito & in aquæ mulsæ, aut aquæ vuc passæ hemina Attica diluito. Aliud. Daphnoidis portionem eodè modo. & si biliosa fuerit, hæc infunde: Si vero pituitosa, grana cnidia electa, & succi tithymali portionem infundito. Similiter etiam cneoro, & peplo, vtrisque his vti oportet. Immittito autem cum infuso non ampliore quàm duarum heminarum. Suffitus porro sunt hæc contusa. Gallam suffito. Aliud. Rameta loti ad oleæ folia sicca contusa misceto, & oleo subacta suffito. Aliud. Prunas subijcito, & ordeï paleis humidis inspersis suffitum facito. Aliud. Super amphoræ oleariæ operculo stœben incendito. Aliud. Cupressi ramenta suffito. Aliud. Scammoniam, myrrham, thus, ynguento affuso suffito. Aliud. Bitumen, & ordeï paleas
misce

A misceto, ac addita pinguedine phocæ suffito. Aliud. Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Calamum, cyperum, bryoniam, muscum, arboreum, apij semen, anisum, simul mixta & vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Resinam siccam cineri feruido inspersam suffito. Aliud. Cinamomum, myrrham, casiam, paribus singula portionibus suffito. Aliud.

Crocum ammixta myrrha, & musco, æquali cum croco portione suffito. Aliud. Calamum, cneorum, crocum, folia rosarum rubra suaueolentia trita & siccata ad crocū ammisceto, & styracem dimidia croci portione addito. Hæc trita mixta & siccata, melle cocto modico subigito. Horum verò omnium suffitus sit oboli Attici pondus. Suffiantur autem super stercore bubulo. Formetur autem stercus velut acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, & sit siccum. Ignis autem sit sarmentitius, in quo stercus iaceat, & ex illo mulier insidens contexta suffiatur. Aliud. Galbanum, resinam, mannam, vnguento rosaceo subacta suffito.

Aliud. Panacis et cupressi ramenta, vnguento Aegyptio albo subacta suffito. Aliud. Cinamomum, nardum et myrrham vnguento rosaceo imbuta suffito. Aliud. Violæ albæ semen, cedri ramenta, et galbanum, melle subacta suffito. Aliud. Stercoris caprini pilulas, et leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffito. Aliud. Coaguli phocæ pelliculam contusam ac tritam, et spongiam, et muscum

C arboreum, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffito. Aliud. Stercus caprinum, et pulmonem phocæ, ac cedri ramenta suffito. Aliud. Stercus bubulum, cedri ramenta, et bitumen suffito. Aliud. Spinæ Aegyptiæ fructum, et cedri ramenta, et myrti sicca folia. Hæc trita et vnguento molli subacta suffito. Multa verò aromata in vnguentum injicito. Aliud. Vinacea tusa trita, et cedri bacca, et resinā pinus, simul mixta et passo cocto subacta suffito. Fomenta. Stercus bubulum contusum ac cribratum, aceti dimidia mensura, et decocti erui dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquam autem fomentum adhibueris, lenticulæ decoctum bibendum dato ac reuomendum. Et farinam sorbendam, ac vinum insuper bibendum. Postridie verò granum cuidium deuorandum exhibeto. Se-

quenti die quod urinam ciet, hoc scilicet. Ciceris albi partes **D**
 duas tritas, vix passæ tertiã partem, affusa aqua ad dimidias
 coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio expo-
 nito, & postridie bibendam dato. Et de cætero saluiam ac li-
 ni semen, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem in vi-
 ni diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas di-
 midias tres, foliorum sambuci manus plenæ mensurâ. Hæc
 cocta in craterem calidum fundito, & per testas calidas im-
 missas fomentum facito, muliere in sella collocata, ac vesti-
 mentis cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manus plenæ
 mensuram, & myrti tantundem in aquam missa coquito, &
 ad excolatam aquam, ordeï paleas inijcito, coquito, & lin-
 teo excipito, ac cum hoc fomentũ facito, prout maximè ca- **E**
 lorem ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, mel,
 hæc mixta valde feruefacito, deinde accepta vesica capiente
 congiũ, aut vtriculo ex tenui corio factõ, infundito, & pan-
 niculo laneo obuoluto, foueto. Quum autem tepidus factus
 fuerit panniculus, alium obuoluto. Aliud. Pini corticem,
 & rhois folia in aquam coniecta fortiter coquito: & in exco-
 lata aqua ordeï paleas coquito, oleo affuso, vbi verò simul
 coxeris linteo excipito, ac foueto. Aliud. Loti ramenta
 & cupressi, aqua & oleo affuso coquito. Deinde simul cocta
 linteo excipito, ac foueto. Aliud. Aromata in aquæ chœ-
 nicem coniecta coquito, & in excolata aqua furfures triti-
 ceos coquito, & foueto. Aliud. Eodem modo gallam con-
 tusam, & rhamni corticem in aqua coquito, & cum aqua fur- **F**
 fures triticeos subigito, ac oleum ammisceto. Postea semiaf-
 satum panem duos chœnices habentem facito, linteoque ex-
 cipito, ac foueto. Aliud. Brassicam & porrum decoqui-
 to, & cum succo eodem modo fomentum facito. Aliud.

Ordeï paleas coquito, oleo affuso, & linteo excipito, ac fo-
 ueto. Aliud. Solanum & oleæ folia coquito, & eodem mo-
 do fomentum facito. Atque hæc sanè, si quidem humidis
 vti volueris, pro fomento velut scripta sunt adhibe. Si verò
 siccis, panes parato & exassatos, & semiaffatos, & cum his fo-
 ueto. Sed & testis calidis linteo inuolutis foueto, itemque
 cum ipsis linteis calefactis, & cum lenticulis vasis testaceis,
 feruente aqua infusa, Apponito autem ad pedes. Aliud.

Iridis radicem tundito ac coquito, & eodem modo fove-
 to.

A to. Si aqua in vteris gignatur, menses pauciores fiunt, & *Menses*
deteriores, & per longius tempus, & pragnas est semper per *quando*
duos menses, aut paulo amplius. Quum autem hoc tempus *pauciores.*
aduenerit, & corrumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. huic *Melcla.*
autem lac bibendum dare oportet, & peplum, mecona dictum,
donec foetus moueri inceperit. Plerumque vero ante hoc cor-
rumpitur, & per abortum extruditur, & vteri sanguine man-
nant. Hac autem paritur nihilo magis ex labore, quam ali-
ter. Hoc autem cognoscere poteris quod hydrops inest, ex
digiti contactu. Comperies enim osculum ipsorum gracile, &
obscuratum ac plenum humiditate. Si vero non circa initia,
sed dum iam mouetur, foetus ipsi corrumpatur ac suffocetur,
B tunc & venter imus intumescit, & ad contactum dolet, velut
vlcere praesente. & febris ipsam ac dentium fremitus corri-
pit. Et dolorem habet acutum & vehementem, circa pruden-
da, imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem ac co-
xendices. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare oportet. Et
qua parte dolor haerit tepesfactoria adhibere, experimento
facto de eo quod maxime admittat. & pharmacum deorsum
purgans bibendum dato. Interposito vero tempore quantum
tibi sufficiens esse videbitur, & collutione facta, & fomento ad-
hibito, cyclaminum apponito, ita ut melle subactam, & lin-
teoexceptam deliges, & ad os vterorum apponas. Cupressi
etiam ramenta in aqua madefacta, eodem modo apponito.
C Verum hac breuiore tempore, & per longius temporis in-
teruallum, quanto magis mordent & exulcerant. Et specil-
lum stanneum paratum immittito, & digitur eodem mo-
do. Portiones quoque bibendas dato, experimentum faciens
quas libeter admittat, & cum viro dormiat, maxime opportu-
no tempore praesente. Si enim genituram conceperit, & pre-
gnans facta fuerit, ac pepererit, subexpungantur & quae prius
in ipsa fuerant, cum ipso puerperij purgamento. Atque sic ma-
ximè sana fieri poterit. Si indurati fuerint vteri, & os ip-
sorum asperum sit, & menses occultantur. Quum verò ap-
paruerint, velut arena sunt. & genitura hoc tempore non
sit. Si verò etiam digito contigeris, asperum comperies os
vterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere oportet. *Curatio.*
& salem ac sicum crudam ammiscere, & cum melle efforma-
ta apponere. & fomento adhibito, purgatoria infundere.

*Vteri duria
sics.*

HIPPOCRATIS LIBER

Edat autem mercurialem, & brassicas coctas, & succum sor- **D**
beat, & calida lauetur. Si indurati fuerint vteri, & menses
occultantur, & os ipsorum conuiuet, et nō concipit. Quum sic
habuerit, si digito contigeris, comperies os asperum, et digi-
tum nō intronmittit. et febris ipsam corripit, ac dentium fre-
mitus. Et dolor habet inum ventriem, et laterum mollitudi-
nem, et lumbos. Patitur autem hæc, si foetus in ipsa corru-
ptus fuerit putrefactus. Quibusdam verò etiam ex partu con-
tingit. Sæpe etiā aliter. Quum sic habuerit, multa calida ip-
sam lauare oportet, et fomentum adhibere. Quum autem re-
cens lota aut fota fuerit, immisso specillo os aperito ac dila-
tato, et per digitum eodem modo, & velut in priore scriptū
est apponito. Et potiones similiter bibendas dato. & eodem **E**
modo curato velut priorem. Si vteri ad latus allapsi fue-
rint, tussis detinet, & dolor sublatus, et vterus durus velut pi-
la infidet. et ad contactum dolet velut ab vlcere. Et contabe-
scit, et videtur peripneumonia esse, et conuellitur, et gibbo-
sa fit. Et menses omnino non apparent. Quibusdā verò prius
conspetti, euanescent. Tunc autem sientes, debiles sunt ac
pauci, aut deteriores quā antea. et genitura nō fit hoc tem-
pore. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bi-
bendum dato, et eo epoto. multa calida ipsum lauato. et ex-
tepefactorijs quod maximè admittit adhibeto. et à quibus
sanguis purgatur ea apponito. et lini semen tostum, tustum
accibratum, et peplum album, et saluiam cum polenta te-
nui, et caseum caprinum, sordibus et salis muria derasis: hæc **F**
misceto, vt casei sint partes duæ, reliquorum verò vna: po-
lenta autem sit antiqua non falsa, et ieiunæ in vino bibenda
dato. Vespero verò cyceonem crassum melle affuso exhibe-
to, et ex potibus quemcunque libenter admiserit bibendum
dato. Et frequenter fomentum adhibeto. Calidam verò as-
pergito, et per ceratum leniter mollito, ac à latere detrudi-
to. et latus fascia lata deligato, et lac bubulum quā plurimū
ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis autem vtatur
quā mollissimis. Morbus hic vehemens est et lethalis. et
pauca etiam si curentur ipsam effugiunt. Si os vterorum
concludatur, forte fit velut grossus ficus. Et si digito conti-
geris, comperies durum ac contractum. et digitum non in-
tronmittit. et menses occultantur. et geniturā nō suscipit hoc
tempore.

*Vteri ad la-
tus allapsi.*

Medicla.

*Cum os ute-
rorum con-
cluditur.*

- A** tempore, & dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterū mollitudinem. Quandoque etiam sursum procedit, & suffocat. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum præbeto, & multa calida lauato, & quæ os molliunt apponito, & specillum immittito ac aperito, & digitum similiter, & calidam aspergito. Quum autem molle factum fuerit, ea quæ sanguinem purgant apponito, & ex potionibus dato, experimento facto quam libenter admittat, & brassicam edat, & succum eius sorbeat. Si vteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fit, & menses ipsi nunc occultantur, nunc prius apparentes euanescent, & non similes fiunt, sed *deteriores & pauciores quam antea, & genitura non fit hoc* *Vterorum obliquitas.*
- B** tempore, & dolor habet imum ventrem, & lumbos, & coxā, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & calida lauare, ac fouere. Vbi verò recens fora aut lota fuerit, digito immisso os vterorum corrigat ac dirigat, & odoratorum suffitum admittat, & ex potionibus dato, iuxta experimentum quam libenter suscipit. Cibis autem vtatur mollibus, & allia edat cocta ac cruda. & cum viro dormiat, & in sanam coxā decumbat. Alteri verò fomentum adhibeat. Morbus autem difficultet cedit. Si *Vterorum inflatio.*
- C** inflari fuerint vteri, et venter attollitur ac inflatur, et pedes intumescunt, et caue faciei partes. Color verò iniucundus fit. et menses non fiunt. et genitura hoc tempore non fit, et adhelat, et anxia mœret, et quum surrexerit, aut progressa fuerit, erectæ cervicis spiratio ipsam tenet, et quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, et gemit, et magis agrā tristatur quam priusquam ederet. Sæpe verò etiam suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, et calida lauato, ac fomentum adhibeto. Interposito verò tempore quodam, apponito ea à quibus purgetur, ac non mordeatur. Frequentissimè verò totum corpus foueto. Tunc autem et sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graueolentia, et poriones dato quæ vteros purgant, et ad locum compellunt. Et Mercurialem edat, et lac bibat, velut de latere dictum est. Morbus autem non est diuturnus. Si sanguinis grumi in vtero coierint, os ipsorum velut eruo plenum fit, et si attigeris, ita habere deprehendes, et menses nō fiunt. Neque genitura retinetur, quam diu sic habuerit. Quum *Grumi sanguinis in utero.*

HIPPOCRATIS LIBER

Medela. igitur ita habuerit, cyclamini corticem detrahito, & allium D
& salem, & siccum, & mellis parum terito ac permisceto, &
glandulam hinc formatam ad vterorum os apponito, & alia
vteris convenientia medicamenta subdito, quæ videlicet a-
cria sunt ac corroduunt, & à quibus sanguis purgatur, & de po-
tionibus dato eas quæ vteros purgant, & omnia circumsadi-
to, & vesicæ pellicula siue cuticula digitis obuoluta, os vtero-
rum deradito. Si obtorti fuerint vteri, & menses non fiunt,

*Vteri obtor-
ti.*

Curatio.

& genitura non manet intus, & dolor habet inum vterem,
& lumbos, & laterum mollitudines, & si digito contigeris,
os vterorum attingere non poteris, nam fortiter secessit. E
Quum sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, à
quo sursum ac deorsum purgetur, magis tamen deorsum. &
os ipsum ac vteros quàm maxime fouere, ac calida lauare bis
in die, & de potionibus dato quam libenter susceperit pro

*Cum uteri
nō cōsistūt.*

experimento, & viro condormiat frequentissimè, & brassi-
cam edat. Si vteri commoti in loco non manserint, quo
prolapsi fuerint dolores exhibent, & incōspicui fiunt. Quan-
doque verò eminent, velut sedes prolapsa. Et quum quidem
supina decubuerit, in loco manent. Quum autem surrexerit,

Medela.

aut se inclinauerit, aut aliàs se commouerit, exeunt. Sæpe ve-
rò etiam quietem habent. Hanc quàm maxime quiescere o-
portet, & non moueri, & lectum ad pedes altiorem statui, &
ijsdem vti, velut in superioribus, & cum acerbis infusis con-
spargere, & graueolentia suffire. Sub nares autem odorata.
& malum punicum in medio per vmbilicum perforato, & in F
ipso picem quæ maxime congruat cum vino tepefacito, &
non valde premens quàm penitissimè apponito. Quum au-
tem quid apposueris, lata fascia exceptum ex lumbis deliga-
to, vt ne dilabatur, sed maneat & faciat quod expetitur, & pe-
plum cum caseo, & polenta, bibendum dato, velut in allapsu
ad latus dictum est, et ex potionibus quam maxime admise-
rit bibendam præbeto. Cibis autem molissimis vtatur. et

*Cum uteri
hiant.*

cum viro quàm maxime dormiat. Si hiauerit os vterorum
magis quàm solet, menses plures fiunt, et deteriores, et hu-
midiores, et per longius tempus. et genitura ipsam non con-
tingit, neq; intus manet, sed rursus foras effundit, et si digi-
to contigeris, os vterorum hians comperies. et impotentia
ipsam corripit præ mensibus, et febris ac rigor, et dolor te-
net.

Anet inum ventrem, et lumbos, ac lateris mollitudinem. patitur autem hac maximè, si quid in ipsa fufum fuerit, et corruptum computruerit. patiuntur etiam ex partu, et alia aliter. Quum sic habuerit, pharmacū bibendū dare oportet, à quo sursum purgatur, et quum dolor habuerit, tepesfactoria apponere, et calida lauare, et interposito tempore, per infusa colluere, velut scriptum est in priore, et de potionibus dare quā libentissimè susceperit, et suffire quæ siccant. Edat autem polypos et mercurialem. Si leuigati fuerint vteri, et menses plures fiunt, et deteriores, et humidiores, ac frequentiores, et genitura intus non manet, sed rursus exit, et si digito contigeris, comperies os leue. Et impotentia ipsam corripit præ mensibus, et febris ac rigor, et dolor inum ventrem, et lumbos, ac lateris mollitudinē, maximè si quid in ipsa corruptū computruerit, et ex partu, et aliās. Quum sic habuerit, curare oportet vbi dolor habuerit, velut scriptum est in priore. Si vteri ad ventrem nutauerint. dolor acutus et vehemens coxendices, et lumbos, ac laterum mollitudinē habet. Et crus claudicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, postridie verò suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, et oleæ folia probè contusa, et gallam cōtusam ac cribratam, et hyoscyami tertiam chœnices partem. Hac mixta, et olei hermina dimidia affusa, efforinata, in olla per dies quatuor, ter in die suffito. Noctu verò lac bubulum, et mel, et aquam bibat, et calida lauetur. Si ad caput conuersi fuerint vteri, signum hoc est. Venas in naso et sub oculis dolere videtur. Hanc calida multa lauare oportet, etiam in capite, lauro et myrto in aqua incoctis, et caput vnguento rosaceo illinatur, et odorata subter suffiantur, et brassicam edat, et succum absorbeat. Si ad crura et pedes conuersi fuerint, ex hoc cognosces. Magnis pedum digitis cōuellitur sub vngues. Et dolor crura ac femora tenet. Quum sic habuerit, multa calida ipsam lauare oportet, et fomentum adhibere quod maximè libenter admiserit, et subter suffire graueolentia. Et vnguento rosaceo vngere. Si mulier cibum auersans vteros doleat, et febris ipsam ac rigor corripiat, pepli albi quintam dimidiæ chœnices partem, et seminis viticæ tantundem, et casei caprini rati dimidiā chœnicem, simul cum vino vetere mollito, deinde cocta sorbenda dato. Si ex

*Medela.**Cum uteri leuigati fuerint.**Medela.**Cum uteri in uentre uagentur.**Medela.**Cum uteri caput uexant.**Medela.**Cum uteri crura & pedes molestant.**Cum cibi studium ob uulua dolorem obrepiat.*

partu fluxus corripit, & cibi in ventre non maneat, vnam **D**
Cum fluor passam nigram, & mali punici dulcis grana trita, & coagu-
post partū lum hœdi, vino nigro diluito ac vitor, ita vt caseum capri-
um ad se num deraſum, & polentam tritici torrefactam adijcias, & be-
uerat. ne temperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem vo-
Medela. mat, hepatis fistula sauciata est, & dolor ad viscera procedit,
de hœc & cor conuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, &
475. f. uomitus. tepefactoria quæ maximè admiserit adhibere, & asininum
Medela. lac bibendum ad dies quinq; dare. Postea verò vaccæ nigræ
 lac bibendum præbere, ita vt sine cibo degat, ad dies quadra-
 ginta. Ad vesperam verò sesamum tritū bibat. Morbus hic
 est periculosus. Si mulier diu non concepit, mensibus ap-
 parentibus tertia aut quarta die, alumen tritum vnguento **E**
 dilutū, lana exceptum apponito, & per tres dies appositum
 habeat. Tertia verò die fel bouis radito, & rameutum oleo
 dilutum ac subactum, linteo exceptum apponito. Et tres dies
 appositum habeat. Sequenti verò cum viro coeat. Ad vte-
 rorum morbum sedandum, lini scissi vnâ cum stipula pugil-
 lum tenuiter tussum, in vino albo quàm iucundissimo per no-
 ctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepefacito, &
 in eo lanam molissimam tinctam apponito, & vicissim prio-
 re detracta aliam subdito. Si vteros purgare voles, primū
 quidem ordeum oleo imbutum in prunis suffire oportet.
 Postridie verò carnem ouillam coquere, cum ordeï decocto
 sub dio per noctem exposito. Sit autem decoctum ordeï con-
 gij mensura, & valde ipsas eoquito. Vbi verò coctæ fuerint, **F**
 leuiter tepidas edat, & iusculum sorbeat. Postridie autem
 thus & pulegium tritum, melle subactum & lana exceptum
 ad triduum subdito. Si vteri ad sedem conuersi fuerint, &
 sedē priunt. secessus secedere prohibuerint, dolores habent & lumbos, &
 imum ventrem, & ilia. Quum sic habuerit, calida ipsam laua-
 re oportet, & lumbos fouere, & graueolentia suffire. & ap-
 ponere quæ purgant & impellunt ipsos vteros. & bibenda
 dare ea quæ maximè admittit. Si vteratum fuerit os vte-
 rorum aut inflammatum, myrrham & adipem anserinum, &
 ceram albam, & thus, in leporis pilis qui sub ventre sunt mi-
 sceto ac terito, & in lana mollissima apponito. Si secundæ
 decedere non possint, statim quidem à cibo abstinere opor-
 tet. Viticis autem folia trita in vino & melle, oleo affuso te-
 pefacito,

- A** pefacito, & hemina mensuram bibendam dato. Si in flammam fuerint uteri, sambuci folia teneerrima in tritici recens crassiore farina coquito, & leuiter tepida sorbenda dato. Si uteri transitori fuerint, hederam siccissimam tritam, & linteolo tenui illigatam subdito. & pingue aliud nihil adhibeto. Bibendum verò dato triticum recens, & pepulum tostum, & saluiam, & cyperum, & anisum. Hæc trita vino diluta cum fursuribus ordeï bis in die dato, pro vice dimidiam heminam. Si menses constituto tempore non fiant, brassicæ folia & rutam terito, postea paleas ordeï chœnicis mensura madefacito donec flaccescant, & per noctem sub dio exponito. Mane verò in hemina inde excolata brassicam ac rutam diluito, & affuso oleo conquassato, & bibenda dato. postea polypum vino albo suffocatum edendum dato, & vinum ebibendum. Si verò volueris, pisces odoratissimos coctos edendos dato, & iusculum sorbendum.
- Si ex feruido & superficiario ulcere pudenda fuerint exulcerata, myrti baccis in vino coctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrham ac resinam simul mixta vino diluito, & intinctum in his linteum subdito. Si urinæ stillicidium corripit, cucumeris siue cucurbitæ os & fundum refecato, & subiecta pruna cucumim circumponito, & inspersa in ignem myrrha, mulierem super cucumim locato, ita ut summam cucumeris partem quam penitissimè in pudendum indat, quo vapor plurimus in pudenda transmittatur. Et ex potionibus urinam cientibus ieiunæ aliquas exhibeto. Si ad cor progressi uteri suffocent, & non decedant, porri semen tritum, & pulegiū, in aquæ cyathis tribus, & aceti albi cyatho vno, & mellis tertia cyathi parte diluito, tepefacito, & ieiunæ sorbenda dato. Si ex partu, aut abortu, rigor corripuit, iuniperi fructum & saluiam simul trita, in aceti albi cyatho diluito, & vini albi diluti poculam affundito, versato ac stare finito. Mane verò excolato, & tepefactum bibendum dato. Si uteri inflati fuerint, & si ventus in utero fiat & dolor, saluiam & cyperum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & purū cremorē in ollam fundito, tritici farina crassiore adiecta, & aceti albi cyatho affuso, & succi silphij magnitudine fabæ addita, & cocta crudius sorbenda dato.
- Si in pu

*Cum uteri
flammescunt.*

*Cum uteri
mouentur.*

*Cum menses
constituti
tempore non
fiunt.*

*Pudenda
ulcerata.*

Stranguria.

*Cum uteri
cor premitur.*

*Rigor
partu.*

*Viciorum
inflation.*

HIPPOCRATIS LIBER

Graueolentia in pudēdis. Si in pudendis graueolentia fuerit, & columella nascatur, & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunz in vino datum. Graueolentiam verò, anisum eodem modo datum. Columellam verò refecare oportet. Si vlcera fiant in pudendis, & pruritus corripiat, olez & hederz & rubi & mali punicz dulcis folia trita in vino veteri dilue, & postea carnem recentem folijs intege & appone. Et habeat subditam per noctem. Mane verò eximat, & myrtū in vino decoquat, & cum vino pudenda colluat. Si genituram non suscipiat, mensibus secundū naturam fientibus, membrana ante vteri os excreuit. Contingit etiam ex alijs causis. Cognoscas autem hoc, si digitum admoueris, membranz prætextū continges. Ad hæc medicamentum subdititium facere oportet. Resinam itaque & æris florem melle diluito, & linteum ex his tinctum penitissimè indito, filo ad extremam partem dependente illigato. Quum itaque hoc exiluerit, myrtum in vino coquito, & cum vino tepido eluatur. Si anhelationes corripuerint mulierem, sulphuris magnitudinem fabaz, & nasturtij tantundem, & rutam, & cuminum Aethiopicum, hæc trita et vino diluta, ieiunz bibenda præbeto. Oportet autem et à cibis abstinere, et non frequenter edere. Si pariens inflata fuerit, hepar ouillum aut caprinum calido cinere obrutum, edendum dato meracius ad dies quatuor. et vinum bibat vetus. Si lumbos doleat, anisum et cuminum Aethiopicum bibat, et calida lauetur, et subcalidam bibat. Si menses non fiant, testam crassam exurito ac terito, et origanum in pinguedine anseris coctam terito, et ad testam in linteū ammisceto, ac tepida apponito. Si vteri conclusi fuerint, et menses nō apparuerint, colocynthidem syluestrem, et sulphij semen, cuminum Aethiopicum, nitrum, salem thebaicū adipem rhenalem, farinam, myrrhā et resinam, Omnia hæc feruefacito: simulque mixta ac trita in glandulam efformato, et apponito. Si vteri ad viscera conuersi strangularint, vinum cedrinum, et cuminum Aethiopicum bibat. et calida lauetur, et subcalidam bibat. Si menses non fiant, adipem anseris, et netopum, et resinam, mulier lana excepta subdat. Si vero magis quàm conuenit prodeant susinum, et raze linguam, in lana apponat. Si transmoti vteri aliquò allapui fuerint, ordeum decorticatum tritum vnà cum paleis sume, et cum

A & cum cornu ceruino vino subige, & hinc vteros suffito.

Si secundæ decedere non possint, fræniculum vino & oleo ac melle feruefactum bibendum dato. Si menses non appareant, & velis ipsos detrahere, crassio rem tritici farinā & ordeum coquito, & oleo affuso edenda dato. Si inflammati fuerint vteri, cotyledonis folia, & porrum, in crassiore tritici farina coquito, & affuso oleo edenda dato. Si moti vteri aliquò allapsi fuerint, & dolorem exhibuerint, oleæ scabiam, & lauri ac cupressi ramenta, in aqua coquito, & linteo excepta apponito. Si vterus doleat, & ad vesicam fuerit dolor, porri semen in aqua tritum ieiunæ bibendum præbe. & repositoria adhibe. Si vteri prominuerint, lotos ipsos

Cum secundæ non decedunt.

Vteri inflammati.

Vteri moti.

Vterus dolens.

Vteri prominentes.

B cum aqua tepida, & vino ac oleo illitos, rursus intrudito, & ex lumbis deligato, & graueolentia suffito, & si vrinā emittere non poterit, calida lauato ac foueto, & cupressi ramenta suffito. Et portiones vrinam cientes bibendas dato. Si fluxus fiat, acerba suffito, & sterus asini dera sum, lanæ illigatum subdito. Sit autem sterus siccum. Si in pudendis vlcera fiât, adipem bubulum illinito, & apponito, & cum vino in quo myrtus cocta est colluito. Si ex partu os vterorum fuerit exulceratum, florem rosarum tritum & vino imbutum in pilis leporinis apponito, & acerbis colluito. Si vteros doleat, alij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum terito, & melle subacta subdito, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si ex feruido ac superficiali vlcere pudenda

Fluxus.

Pudenda ulcerosa.

Os vteri ulceratum.

Vteri dolor.

C fuerint vlcerata, adipem bubulum, & butyrū, & anseris adipem, ac sulinum vnguentum misceto, & ex his pudenda illinito, & aqua tepida colluito. Si vteri ascendentes suffocarent, funiculum lucernarium accensum extinguito, & narius admovento, quo fumum attrahat, postea myrrham vnguento dilutam, & lana exceptā apponito. Et resinam oleo dilutam bibendam dato. Si secunda non secedat, conyzam tritam lana exceptam apponito, & ignē in vino tritam bibendam dato. Si caput doleat, & inum ventrem, et lumbos, bilis in vteris est. Huic itaque pharmacum dare oportet, quod sursum ac deorsum purgare potest, et calida lauare, et apponere quæ bilem purgant. Et anisum ac nigellā vino diluito, et bibenda dato. Si fluxus oboriatur, caneros fluuiales in vino suffocato, et vinū bibendum dato, et quæ succant

Vteri ascendentes.

Secunda non secedens.

Capitis dolor.

Medicamentum ad fluxum.

suffito,

HIPPOCRATIS LIBER

suffito, & apponito. Si fluxus oboriatur, porri pugillum in D
vino tritum bibendum dato, & siccis & acerbis vtatur. Si
fluxus oboriatur, muli sterus combustum, tustumque ac cri-
bratum, vino dilutum bibat. Reliquis autem eodem modo
vtatur. Si fluxus oboriatur, & iam diuturnus fuerit, spon-
giam combustam ac tritam, vino odorato dilutā, bibendam
dato, & per suffitus resicca, & quæ restringunt appone. Si
vteros purgare velis, nitrum, cuminū, allium, & ficus terito,
& melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidā bi-
bat. Si vteros doleat, cyclamini radicem in vino ieiunæ bi-
bendam dato, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Si lac
extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, fœni-
culi verò semen bibendum dato, & radices fœniculi decorti-
catas, ac butyrū simul coquito. Quum autem cocta fuerint, E
frigefacito ac bibenda dato. Commodum est etiam hippo-
marathrum & hipposelinū simul coctum. Si lac extinctum
fuerit, porrum tritum aqua dilutum bibendum præbe, & ca-
lida lauetur, & porrum ac brassicā edat, simul coctis Cyrtifi
folijs, & succum sorbeat. Si lac extinctum fuerit, saluiam,
cedri aut iuniperi baccis adiectis coquat, & ad diffusum, vi-
num affundat, ac bibat, & ad cætera farina inspersa addito-
que bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acida, &
salsa, ac cruda olera omnia vitet. Nasturtiū verò in vino po-
tum cōmodum est. Nam lac purgat, & calida lauetur, & sub-
calidam bibat. Si velis mulierem prægnantem fieri, ipsam
& vteros purgato, postea farinam ieiunæ edendam dato, & F
vinum meracum insuper bibendum, & nitrum rubrū, cumi-
num, ac resinam, melle subacta in linteo subdito, & vbi aqua
defluerit, nigros pestos mollitorios apponat, & cū viro dor-
miat. Si prægnantem facere voles mulierem, ipsam & vte-
ros purgato. Deinde linteum tenuissimum resiccatum, ac
melle imbutum in glandes efformato, & in fici succo tin-
ctos apponito, donec fuerint aperti. Postea verò magis
intrudito. Vbi autem defluerit aqua, vino & oleo colluta
cum viro dormiat. Bibat autem & pulegium in vino cedri-
no, quum viro condormire volet. Medicamentum fœtum
ex vteris pellens. Cucumeris sylvestris succum potionis
mensura, in mazam conspersum apponito, vbi ad duos dies
antea ieiunauit. Aliud. Staphidis sylvestris pugillos
duos

*Vteri pur-
gatio.*

Vteri dolor.

*Lactis ex-
tincti reme-
dia.*

*Ut mulier
prægnans
fiat.*

*Ut fœtus
ex utero ex-
pellatur.*

A duos, in aqua mulsa dilutos, bibendos dato. Experimentum fecunditatis. Caput allij integrum derafum vteris apponito. Postridie vero digitum immittat, ac contingens consideret. & si quidem oluerit inde os, bene habet: Sin minus, rursus apponat. Aliud experimentum. Netopum modicum in lana inuolutum apponat. & consideret an per os oleat. Alia subdititia medicamenta. Scorpij marini fel, in lana inuolutum, & in umbra siccatum apponito. Pulegium siccum tritum, melle imbutum in lana apponito. Cucumeris sylvestris semen, & testam combustam, vino subactam, cum pilis leporinis, in lana subdito. Alumen Aegyptium, lana inuolutum apponitum. Cantharidas vino subactas, in lana subdito. Herbā artemisiā vino subactam apponito. Nigellam in vino tritam, in lana subdito. Aliud ad recens enixam. Vnguentum rosaceum & ceram, in lana apponito.

Bulbion ex tritico, tritum & vino subactum in lana subdito. Vini albi veteris fecem combustam, & vino albo extinctam ac tritam, in lana apponito. Galbanum, netopum, & misy, cum vnguento rosaceo, in linteo apponito. Elaterij portiones duas, & fauum cum vino, in linteo apponito. Butyrū & alumen melle subactum, in linteo subdito. Scammoniaz succum, & adipē, cum maza misceto, & vino imbuta, in linteo apponito. Si concipere nolit, misyos fabæ magnitudinem aqua dilutam bibendam dato, & per annum non concipiet. Si periculum facere velis in muliere, an prægnans sit aut nō, rubro lapide siue terra erythrea oculos sublinito. Et si quidem ingrediatur pharmacum, prægnans est, sin minus, non. Si prægnāti pudenda feruido et superficiario ulcere fuerint exulcerata, amygdala trita, et medullā bubulā in aqua coquito, et modica farina adiecta, pudenda illinito. et baccarum myrti decocto colluito. Si virgo ex lapide laborarit, semen radicis Aethiopicæ, in vino veteri ad dies decem dato. Deinde in aqua ad dies viginti, et bis in die multa calida lauato. Cataplasmata. Allium, portulacam, apium, loti et cedri ramenta, trita simul mixta aqua mulsa diluito, et cataplasma hinc factū imponito. Rubi folia, myrti folia, simul trita aqua mulsa diluito, et polenta ammixta subacta imponito. Sābuci folia, myrti folia, terebinthi folia tenerrima, eodē modo apponito. Loti ramenta, mori folia, simul

Ne concipiat mulier

An conceperit expectamentum.

Pudenda si

ulcerosa

sint.

HIPPOCRATIS LIBER

simul trita mixta, aqua diluta cum vua passa imponito. Suffitus. Ovicula aut caprae cornu tusum, & ordeum tostum ac frefum, oleo subigito ac suffito. Cerui cornu, & oliuas nondum habetes oleum, simul trita mixta suffito. Rhoem rubrum, & polentam tostam, oleo subigito ac suffito. Polentam, & stercus bubulum, & paleas, oleo subigito ac suffito. Loti ramenta, & rhois folia, & cupressi siccae ramenta, vino nigro austero subacta suffito. Galbanum, mannam, & resinam vnguento subacta suffito. Caprae cornu, & galla, & adipem suillum, ac cedriam suffito. Terram & asinorum pedibus deradito, & stercus asinum, cum vino nigro subigito ac suffito. Collutiones. Folia myrti, & lauri, ac hederæ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito. Rhois, & mali punicae, ac rubi folia, in aqua mulla coquito, & cum ea excolata colluito. Sambuci & lentisci folia in aqua coquito, & excolatam leuiter tepidam infundito. Fœniculi, & brassicae radices tulas in aqua coquito, oleo affuso, & postea cum excolata coluito. Oenanthen, & cyperum, & vuas passas, in aqua mulla coquito, ac colluito. Malagmata.

Maluam & fœnogræcum in aqua feruefacito, & cum excolata aqua leuiter tepida colluito. Cupressi ramenta & amaracū, in passo aqua temperato coquito, ac colluito. Serpillum & violæ albæ radicem, in aqua mulla coquito, ac colluito. Hypericū, & lentiscum, & baccas cedri in aqua coquito, & cum leuiter tepida colluito. Fauum, & butyrū, & resinam, & adipem anserinum, in aqua coquito, & colluito.

Fomenta. Lolium tostum ac molitum, in posca meraciorē coquito. Postquam autem coxeris, linteo illigato, & foueto. Lentem tostam, decorticatam, & in farinam crassiorē alicæ similem redactam, in aqua coquito, & linteo illigato, ac foueto. Eruum eodem modo parato, ac foueto. Comoda est & saluia eodem modo parata. Saluiam & hypericum in aqua coquito, & ordeï paleis in decocto coctis, & linteo exceptis foueto. Loti & cupressi ramenta in vuc passæ cremore coquito, linteoque ipsa illigato ac foueto. Oleæ, & myrti, & hederæ, ac lauri folia, in aqua coquito, & in decocto, ordeï paleas coquito, deinde linteo illigato, ac foueto.

Cupressi ramenta & cedri, & ordeï surfures, simul misceto, & in vuc passæ cremore subigito, ac panem formato, & cum

A cum hoc affato, calido in linteum alligato, foueto. Violæ alba semen, aut radices, in aqua coquito, & cum aqua fursures tritici subigito, ac panē formato, cum quo calido in linteum inuoluto, foueto. Serpillam in aqua coquito, & fursure triticeo in aquā coniecto, eodem modo foueto. Spōgias calefacito & adhibeto. & cum mollibus lanis, & panniculis laneis, & vasis testaceis aqua infusa, & vtriculis eodem modo, & decoctionibus in vtres infusis foueto. Purgatorium.

Si mulierem parere non potentem, facere velis vt pręgnās fiat, considerare oportet in mensibus, an biliosa aut pituitosa sit. Cognosces autem hoc, arena tenui sicca ad solem conspersa, & quum mēses prodierint, sanguine super arenam in sole effuso, ita vt ipsum siccarī sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super arenam siccatus, pallidus sit. Si verō pituitosa, velut mucus existit. horum igitur vtrum tandem fuerit, ventrem purgato, siue sursum siue deorsum purgatione opus habere visa tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, vteros purgato. Vterorum fomenta. Si duri fuerint vteri, & non concipiat, Vinum quā iucundissimū cum pari aqua temperatum, trium semicongiōrū Atticorum mensura, & fœniculi radices, & seminis fœniculi quartam partem, & vnguenti rosacei semiheminā. Hæc in vas nouū fundito, & vinū affundito. Vasis autem operculū perforato, & imposita arundine foueto. Arundinē verō cū operculo tollito. Si enim sine operculo abstuleris, exuretur. Postquā autem fota fuerit, scillam apponito, velut infrā scriptum est. Apponito autem donec dixerit molle & amplum esse vterorum osculum, & si quidē exulcerata fuerit, & pustulæ in purgatione fuerint, si summa labia vlcerata fuerint, anisum, & adipem anserinum, in rosaceo oleo terito, & in lana inuoluto & accepta carnē bubula, magno pedis digito crassiore, sed digitorum longitudine, ipsam pharmaco illinito. & lana exceptam inuoluto. & ad extremam carnis partem quæ foras spectat filum alligato, & reliquam in vteros indito, vbi est vlcus. Mensium purgatoria. Si non procedat menstrua purgatio, cucumeris syluestris internam partem pondere trium obolorum, & artemisiā herbam, & thuris obolum, terito & ammixto melle in lana inuoluto, & ad os vteri apponito, quinquies in die hoc faciens. Aliud. Vitem viridem terito, & melle am-

*Vteri cum
duri fuerint*

mixto lana excipito, & eodem modo apponito. Aliud. B

Cupressi fructum, & cucumeris sylvestris internam partem, & thus, terito & melle ammixto lana excipito, & eodem modo subdito. Aliud. Cupressi fructum & thus terito, & melle ammixto lana excipito, ac subdito. Aliud.

*Cū mulier
nō concipit*

Abrotani obolos tres, cum melle lana excipe, ac subde. Aliud. Elatherij obolum, & myrrhæ obolū terito, & cum melle lanæ inuoluito, ac subdito. Purgatorium si mulier non concipiat. Tauri urinam collige trium heminarum mensura.

Deinde artemisiam herbam, aut parthenium, aut adiantum & laurum viridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde in effosa scrobe carbones accende, & imposita olla urinā tauri infunde, & confusa in mortario adijce. postea sellā circōpone, & artemisiam herbam, aut hyssopum, aut origanū impone, & muliere super hæc collocata, donec sudet foue. E

Vbiverò sudarit, laua cum calida, & in lauacrum artemisiam & laurum immitte. Deinde subdititium medicamentum adhibe. Aut artemisiam, aut bulbium in vino albo tritum lanæ inuolutum subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cum viro dormiat. Subdititium pharmacū ad conceptum faciens.

Ex nitro & thure, cum melle glandem formato, & apponito. Aliud purgatoriū molliens. Caricam coquito donec granula abijciat, & hanc expressam leuissimè tritam in lana cum rosaceo vnguento apponat. Aliud acrius. Brassicæ, rutæ, pares portiones tere ac vtere eodem modo. Aliud

molle & purgatorium. Medullam anseris, aut bouis, aut cerui, magnitudine fabæ, affuso vnguento rosaceo & lacte muliebri terito, velut molle pharmacum teri solet. Deinde ex hoc os vteri illinito. Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lentissimæ aut terebinthinæ magnitudine nucis. Hæc in vnguento rosaceo ad lentum ignem liquefacito, & velut ceratum facito, & deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem madefacito. F

Aliud detrahens purgationem & sistens. Præoniæ granā nigra aut rubra, tria aut quatuor in vino trita bibenda dato. Si verò magis detrahare voles, grana nigra eodem modo trita bibenda prabeto. Aliud purgans ac detrahens.

Lauri baccas ad summum viginti, & seselis dimidium acetabulum, cum vino trita bibat. Aliud. Tauri fel, trium dimid

A dimidiorum obolorum Atticorum pondere, in vino ieiunā bibendum dato. Et efformata quoque ex ipso catapotia deuoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhæ obolos tres, croci tantundem, castorij obolum, Hæccum vnguento rosaceo trita apponat. Aliud purgatorium. Semen vriticæ, & malux succum, cum adipe anserino tritum subdat.

Aliud. Si non purgata fuerit ex partu, floris farinæ quantum tribus digitis comprehendi potest coquito, & melle affuso, ventri velut cataplasma imposito, & bibendum dato.

Aliud quod vteros aperit & purgat. Cantharidas quinque aceto albo affuso terito, & non valde liquidum pharmacum facito, sed vt digitis effingi possit, & de ficu alba pingui, sine granulis & pelle, duplā cantharidum partē ammisceto, & efformatā glandulam tenui lana inuolutam subdito. Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit, & fœtus expellit. Aliud purgans vteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidem syluestrem in melle tritam delingat, aut subdat. Aliud sanguinem purgans.

Sanguinem ex vteris expelles, si violæ albæ semen tritum, vino dilutum bibendum dederis. Aliud quod similiter sanguinem ex vteris expellit. Rhœis seminis quum rubrum fuerit, grana viridia triginta terito, & rosas caninas rubras, rubicundo ex ipsis delecto, in vino bibenda dato, quum sanguis eruperit. Aliud purgatorium. Si menses non apparuerint, styracem & origanum terito, commisceto, & adipe anserino affuso apponito. Aliud quod subditum vteros purgat ac euacuat. Absinthij radicem tritam cum melle, cum oleo apponito. Subdititia vteros purgantia, aperientia, & aquam ducentia. Scillæ frustum longitudine sex digitorum, & digiti parui crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circunderadito ac leuigato, & reliquum lana sordida inuoluito, eam verò partem quæ circumrasa est ad os vterorum subditā, per diem ac noctem appositā finito. Postquā

autem lauit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud purgatorium molle, quod aquā & pituitam ducit, & pallidos ac subcruentos menses detrahit, si non diuturni fuerint, & os emollit. Vnguentum narcissinum, cuminū quod edimus, myrrham, thus, absinthiū, cupressum, salem, rosaceā oleum

*Postremū
horū medi-
camentum.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

sumito. Et de alijs quidem singulis congiunt accipito, nar. D
cissini verò partem quartā, & omnia in glandem efformata,
ac crudi lini linteos excepta subdito. Aut linteū tenue pennæ
circundato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctū ap-
posito, & tota die appositum finito. Deinde ubi lauit & ab-
stulit, aqua odorata colluatur,

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS MV-

LIEBRIBVS LIBER PRI-

MVS, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSI-

CO INTER-

PRETE.

*

*Cur mulie-
res crebrius
laborant.*

*Quæ puer-
peria facile
decurrant,*



E muliebribus morbis sic sentio. Mu-
lierem quæ non peperit grauius & ci-
rius è mensibus agrotare, quàm eam
quæ peperit. Quum enim peperit ve-
nular fluidiores sunt ad menses. Flui-
das autè ipsas facit purgatio illa quæ
fit à partu. Et ubi hæc erumpit, vicinæ
maximè ventri ac mammis corporis F
partes discinduntur. Discinditur item

reliquum corpus, à quo verò hoc fiat, dictum est à me in na-
tura pueri in partu. Discisso autem corpore necesse est venas
magis aperiri, & ampliores ac fluidiores ad menses fieri: item
quæ vteros magis aperiri, nimirum puero per ipsos egresso,
qui & vim & dolorem induxit, & quum hæc sic se habeant,
mulier purgationem à partu experta, minus laboriosè men-
sibus decurrentibus purgatur. Si verò etiam affectio aliqua
mulieri quæ iam peperit accidar, vt menses venientes probè
purgari non possint, facilius dolorem feret, quàm si non pe-
perisset. Asueti enim sunt vteri, & corpus idoneū vt implea-
tur, utpote in ventre habenti, & simul multa amplitudo in
corpore est. Maior autem sit etiā amplitudo ubi peperit, ni-
mirum

*Cur steriles
magis affi-
ciantur.*

A mirum corpore discisso. & corpus in amplitudine existens minus dolore affligitur, si non venæ superimplentur; & nimium doleant. At verò ei quæ non peperit, quum corpus non assuetum sit, si impleta fuerit, & fortius ac solidius & densius sit, si purgationem à partu experiatur: & quum uteri ægrius aperiantur, menses laboriosè prodeunt, & affectiones plures accidunt: ut propterea menses obturentur, si prius non peperit. Habet autem res se hoc modo, velut etiam prius à me dictum est. Dico mulierem rariore carne præditam & teneriorem esse quam virum. & hæc res sic se habet. à ventre trahit humiditatem, & citius, & magis, corpus mulieris quam viri. Etenim si quis super aqua, & per regionem aquosam, duobus diebus ac duabus noctibus, molles lanas ponat, & vestem puram & contextam æquali ad lanas pondere, sublatis utrisque apponderatione facta, multo grauiores lanas comperiet quam vestem. Fit autem hoc ex eo quod semper ab aqua sursum decedit in vasa ampliora oscula habentia. & lanæ quidem tanquam raræ & molles, ex decedente amplius suscipiunt. Vestis autem ut quæ plena est & ex contextu obturata, explebitur, non multum ex decedente aqua suscipiens. Sic sanè etiam mulier, velut quæ rarior est, ampliorem à ventre humiditatem corpori attrahit, & citius quam vir. & tanquam teneriori carne prædita mulieri, ubi corpus sanguine repletum fuerit, si non ab ipso secesserit, carnibus impletis ac talefactis, dolor oboritur. Habet enim mulier sanguinem calidorem, & propterea

C calidior est quam vir. Si verò amplior accedens sanguis secesserit, dolor non fit à sanguine, neque calor. Vir autem ut qui solidiore carne præditus est quam mulier, neque in superna ventris parte adeò sanguine superimpletur, ut nisi aliquid sanguinis singulis mensibus secedat, dolorem fieri necesse sit: & sanguinis quantum satis est ad nutrimentum trahitur: & quum corpus ipsi non sit tenerum, non dolore affligitur, neque superincalescit à plénitudine, velut mulieri. Multum autem cõfert ad hoc viro, quòd magis laborat quam mulier. Nam labor aliquid humoris abducit. Postquam igitur mulieri quæ non peperit, occultati fuerint menses, & viam foras reperire non poterint, morbus fit. Hoc autem contingit, si uterorum os cõclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars cõtracta. Si enim horum quid fuerit, menses exitum inue-

*Exemplo
comprobat.*

*Cur mulier
calidior sit
quàm vir.*

*Quid femi
nas affli
ciat.*

*Uteri inue
stio*

niré non poterint, priusquàm vteri ad sanam naturam redierint. Fit autē hic morbus his maximè, quæ angustos vteros habent, aut ceruicem vltra pudendum sitam. Si enim horum alterum fuerit, & mulier viro non misceatur, & venter magis quàm oportet euacuetur, ab hac affectione vteri obtorquentur. Neque enim humidi in seipsis sunt, utpote muliere non coeunte: & amplitudo ipsis spatiosa est, utpote quum venter magis vacuus existat. Quare obtorquetur, dum sicciior & leuior est venter quàm conuenit, & aliquando dum ipsi obtorquentur, etiam os ipsorum distorqueri contingit, nimirum ceruice vltra pudendum sita. Si enim humidi fuerint vteri, à coitu, & venter non euacuetur, non facile distorquentur. Hæc igitur causa est ut ipsi sint conclusi, nimirum à venere abstinent
E
te muliere. In tertijs porrò mensibus optimè afficietur, si quæ prius insunt progressa fuerint educta. Sin minùs, mulier hæc patietur. Suffocatio aliàs atque aliàs in ipsa irruet, & febris aliàs atque aliàs corripiet, ac horror, & lumborum dolor, hæc patietur in tertijs mensibus, si ipsi non prodierint. In quartis verò si non egressi prioribus exitum fecerint, etià tunc tertijs mensis afflictionibus omnibus magis affligetur, & maximè tempore mensium. Deinde minùs. Sæpè verò etiam à dolore libera sibi esse videbitur. Erunt autem in quartis etià hæc signa. Urinam multam ac crassam eiiciet, aliàs atque aliàs. Et venter ipsius durus erit, & maior quàm prius, & dentibus fretinet, & cibum auersabitur, & vigilabit. Hæc patietur in quartis mensibus. Si verò curetur, etiam in his sana euadit. Et in quintis si non multi menses descenderint, dolor adhuc fortior accidit. In sextis verò iam incurabilis est. & iuxta priora quidem signa magis dolebit. Deinde ad ea etià hæc aderunt. Anxia erit, & aliàs atque aliàs seipsam iactabit, & animo deficiet, & pituita vomet, & sitis fortis ipsam corripiet. Nimirum dum exurit venter ab vteris sanguine plenis. & ad contactum dolebit, maximè pectinem. Et aliàs atque aliàs acutè febriet. & vteri aliàs atque aliàs murmurabunt, dum videlicet sanguis in ipsis commouetur ac discurrit. & venter consuetum modo non secedet. Neque vesica urinam excolabit, maximè quum vteri ad stomachum qui neruosus est, mulieri allapsi fuerint, & ad venterem irruerint, dolet spinam, & totum dorsum. & lingua ipsius refrenatur. & hanc non claram habet. et
animi

*Menses diutius remora
ti quid agant.*

*Menses sex mensibus
retenti non
habent me-
delam.*

A animi deliquium adest. Aliquibus etiā vocis priuatio, & stomachus mordetur. & flaua bilis exit. et spiritus offendens. et anxia est, et iactat seipsam, et ardet. Postquam autē transmutati fuerint, et vesica tenuem sanguinem ab uteris trahet, tunc vrina mingitur rubra, Et dolet quidem reliquum corpus, maximē verò collum, et spinam, et lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progressi, et venter attollitur, et crura supra modum intumescunt, et tibiæ ac pedes. et mors succedit. Et circa hanc quidem sic finiunt menstruæ purgationes ad sex menses occultatæ. fiunt item hæc. Quibusdam mulieribus menses bimestres in uteris existentes multi ad pulmonem procedunt. et ubi recepti fuerint, omnia patiuntur quæ in tabe dicta sunt. et non est possibile ipsam superesse. fiunt et hæc. Quibusdam suppurati fiunt menses, ubi per duos aut tres menses moram traxerint. Hoc autem maximē fit, si à febre fuerint cōbusti. Signa verò sunt si suppurati fuerint. dolores enim incidunt in pectinem. et pulsationes fortes, et contactum non sustinet. et si melius habitura est, menses ipsi erumpuntur in pudendum, et procedit pus ac sanguis, et procedit graueolens, ad septem, aut octo, aut nouem dies. In priore verò tempore dolet velut dictum est antea. Postquam autem depurgata fuerit, optimum quidem est si non fiant vlcera. Si verò relinquantur vlcera, ampliore curatione opus habebit, quo vlcera non putrescant, et graueolentia fiant. Sterilis autem euadet, etiam si melius habebit, ubi magna vlcera fuerint quæ in uteris facta sunt. Si verò non continget, vt menses ipsi in pudendum procedant suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris mollitudinem erumpent, circa tuberculum, vt pote purè rupto, et illa parte purulenta graueolentia procedent. et si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si verò etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de cætero via fit mensibus vt foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. fit et hoc. Quibusdam ubi bimestres aut trimestres aut diuturniores fuerint menses, et ad lateris mollitudinem allapsi fuerint, quum non suppurati sint menses, velut tuberculum sit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum. et vulgus medicorum ignarum quid hoc esset, iam sæpe secuerūt, et sic in periculum induxerunt. Cæterum id quod velut tu-

*Mensium
rius affec-
tua.*

*Menses cum
non in pudē-
dum procedunt.*

*Cum ueter
exuberet.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

berculum fit, tali modo fit. Fruitur sanguine caro ipsa, ut po-
 te osculo vterorum lateris mollitudini adiacente, & imple-
 tur caro ab ipso, & insurgit ac eminet, velut sanguine repleta.
 Et aliquando si transmotum fuerit os vterorū, & ad puden-
 dum conuersum, & menses processerint per pudendum, id
 quod circa lateris mollitudinem eminuit sedatur. In vteros
 enim distribuitur, hi verò foras laxantur. Si verò nō conuer-
 sum fuerit os vterorum ad pudendum, circa lateris mollitu-
 dinem suppuratur, & hac parte transitus fit mensibus, & ea-
 dem pericula sunt, quæ prius sunt relata. Sed & ad vomitum
 conuertitur, & quibusdam in sedem, velut in virginum mor-
 bis à me dictum est, & signa & dolores eisdem ostēdit, quos
 isthic retulimus. Ad hanc viam minus faciunt menses mulie-
 ribus quàm virginibus. Quum menses fuerint occultati,
 dolor habebit imum ventrem, & onus quoddam incumbere
 videtur, & lumbos & laterum mollitudinē mirum in mo-
 dum dolet. Si verò omnino non procedunt, præ morbo aut
 crassi & viscosi, aut glutinosi fiunt. Primum igitur ventrem
 purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde vteros subditi-
 tio medicamento, à quo sanguis purgatur. Atque ita quiesce-
 re, & potandum dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Bi-
 bat etiam Crethmon in vino rēdaceo. Si verò fluxus ipsi non
 fiat, contingeret ut prægnās esse videatur, & dum cū viro coit
 doleat, ut putet quid incubere, & grauitas sit in ventre, & vē-
 ter prominere, & desiderijs similibus afficitur, velut in ventre
 habeat, & stomachi dolore afficitur, maximè vbi quinqu-
 aginta dies præterierint, Et dolor aliàs atque aliàs habet ven-
 trem, & partem circa vmbilicum, & collum, & inguina, &
 lumbos. Et postquam menses quo aut tres præterierint, quā-
 doque menses aceruatim ipsi in pudendum erumpunt, & quæ
 prodeunt velut carnem esse putat, quemadmodum ex fœ-
 tus corruptione & nigra. Quibusdam etiam vlcera fiunt
 in vteris, & opus habent diligenti animaduersione. Multis
 verò contingit ut putent se sex mensibus in vtero habere, aut
 etiam paulo breuiore tempore, & venter prominere, & alia
 sibi fieri putat, velut in ventre habenti. Postea sunt & qui-
 bus suppurati eruperunt supra inguen, simul cum quinto aut
 sexto mense, & viam ea parte patefecerunt. Quibusdam au-
 tem vlcera fiunt in vteris etiam infra sub inguine, & pericli-
 catur

*Signa men-
 sum nō de-
 fluentium.*

Medela.

*Vterorū ul-
 cera.*

*Vterorū va-
 rij morbi.*

Atatur mulier de vita. Si verò etiam superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendum erumpunt, & prodeunt ipsi putrefacti ac purulenti. Et ab his vlcera fiunt in vteris, & periclitatur. Et oportet vt ne antiqua fiant vlcera, cum attentione mederi. Sterilis autem & hæc fit, etiam si fuerit curata. Si verò non eruperint menses sex mensibus intus conclusi, omnia patietur velut ea quæ non peperit, in qua menses viâ inuenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sana erit. Sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis verò contingit, vt menses pituitosi ad multum tempus prodeunt, etiam pauciores sanis sint, sana autem talis fit, si conuenienti cura fuerit sanata. Si verò menses mulieri prodeant quidem, verum pauciores quàm conuenit, vt pote osculo vterorum paululum à pudendo emoto, aut nuper concluso ad hoc, vt prodeant quidem, verum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant vbi ad vteros descendunt: moderati sanè paulatim prodeunt, sanguine semper perfectè osculo incumbente. Et postquã dies præterierint quibus purgari solet, & cõclusus fuerit sanguis in vteris relictus, & alij menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, & primis mensibus duobus aut tribus non valde prodeunt. Postquam autem plures menses præterierint, adhuc magis dolebit, & non habet in ventre, quàm diu sanè sic habuerit, & febris corripit ipsam debilis, maxime in diebus quibus purgari solet. Verisimile

Cest autem & in intermedio tempore ipsam febrile, & horre-re, & stomachi dolore vexari, & ad multitudinem addere singulis diebus. Et dolet aliàs atq; aliàs corpus, & maxime lumbos, et spinam, et inguina, et articulos manuum ac pedum. Verum his locis nō simul dolet, sed aliàs atque aliàs, qua parte sanguis discretus, et in vteris esse non potens impetu suo grauaret, et qua sanè corporis parte incubuerit, tumor est fitque etiam cõuulsio fortis articularū corporis. Et aliàs aliud ex relatis antea signis ipsi apparet. Hæc siquidem iuxta debitum modum curata fuerit, sana euadet. Sin minus, morbus septimestris aut diuturnior factus, lethalis fuerit, aut claudam faciet, aut artes aliquas impotentes efficiet, si præ rigore et cibi fastidio, sanguis circa neruos compactus fuerit, quẽ cunque tandem locū occupauerit. Hic autem morbus magis

*Cur san-
guis circa
neruos com-
pingatur.*

fit his quæ virum non habent. Si verò hi morbi iam relati, **D**
aut quicunque postea referentur, incidunt in eam quæ par-
tum non sit experta diuturniores erunt, & minus dolorosi.
Verùm signa eadem, & ijdem fines, tum ei quæ non peperit,
tum ei quæ puerperia experta est, contingunt, si non curen-
tur. Oportet autem statim curationem facere. Sin minus sta-
tim comparent morbi. Si verò menses plures quàm opor-
teat prodeant, & crassiores: Nimirum corpore natura fluído
existente, & osculo vterorum prope pudendum sito, & ad hæc
multò cum viro coitu vtatur, & conuiuetur, semel aliquan-
do multi descendentes, & cumulatè prodeunt, os vtero-
rum impetu suo magis dilatant. & si ad hæc non incidat va-
sorum euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os am- **E**
plum faciunt, & corpus: vt pote dum conuiuente & volu-
ptatem ac cōsuetudinem viri consecrante muliere, facili flu-
xu ad vteros etiam calor defertur, & decolor erit quàm diu
sic habuerit. & si postea morbus aliquis aut affectio incide-
rit, vt corpus affligatur, & vteri similiter iuxta solitum mo-
rem ampli sunt, & corpus facili fluxu in ipsos præditum est.
Et post hæc febris habet, & cibum auersatur, & anxia est,
& tenuis ac debilis. & lumbos ex mensibus dolebit. & pro-
gressu temporis si non curata fuerit, omnia ipsam magis af-
fligent in intermedio tempore. & periculum ipsi imminet,
ne sterilis fiat, aut à tempore & morbo vexata, si alius mor-
bus coincidat, ex hoc moriatur. prodeunt autem menses
crassiores & plurimi, in intermedijs diebus. Incipientes au- **F**
tem & desinentes, pauciores & tenuiores. Moderati verò
sunt menses prodeunt in omni muliere si sana sit, vt dua-
rum heminarum Atticarū mensura secedant, aut paulo plu-
res, vel pauciores. atque hoc ad duos aut tres dies. Longius
autem tempus aut breuius, morbosum & sterile est. Conie-
ctare porro oportet mulieris corpus inspiciendo, & interro-
gare collatione ad priora facta, an semper morbosa viuat, aut
non. Si enim pauciores aut plures dies quàm solent prodeant,
aut ipsi pauciores aut plures fuerint, morbofi sunt: Nisi na-
tura ipsa morbosa & sterilis fuerit. Si verò hoc fuerit, & ad sa-
lubriorem statum transmutatur, melius est. procedit autem
sanguis velut à victima, & cito congelatur si sana fuerit mu-
lier. Quibus verò in natura est, vt plures quàm quatuor dies
purgen

*Cur multa
purgatiōes
mēstruæ et
crassæ de-
fluant.*

*Mensium
modus &
qualitas.*

A purgentur, & menses valde multi prodeunt, hæc tenues fiunt, & fæctus ipsarum tenues, & emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci menses secedunt, hæc crassæ sunt, & bene coloratæ, virilesque ac partus immemores, & neque concipiunt. Si suffocatio derepente accesserit: fit autem maximè his quæ cum viris non coeunt, & senioribus magis quàm iunioribus. Leuiore enim vteri ipsarum sunt: fit autem potissimùm tunc, vbi mulieri vasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit: resiccati à labore vteri conuertuntur, vt qui vacui sint ac leues. Est enim ipsis locus spaciosus vt conuertantur, vtpote vêtre vacuo existente. Dum autem conuertuntur, impetunt hepar, & iuxta consistunt, & ad præcordia irruunt.

*Suffocatio
nis mulier
caussa qua.*

B Currunt enim & progrediuntur sursum ad humiditatē, tanquàm à labore magis quàm opportunum est resiccati. Hepar autem humidum est. Postquàm autem impetiuerint hepar, suffocationē faciunt, derepente perspirationē circa ventrē intercipientes, et aliquādo simul incipiunt hepar impetere, & à capite pituita defluit ad præcordia, velut ab eo quod suffocatur, & aliquando simul cum pituitæ defluxu, descendunt ab hepate ad locum suum, et cessat suffocatio. Descendunt autem detrahentes humiditatē, & grauati. Stridor autem ab ipsis fit, dum ad suam ipsorum sedem procedunt, postquàm autem eo deuenerint, aliquando veter post illa humidior fit quàm superiori tempore. Laxat enim iam caput pituitam in ventrem. Vbi verò apud hepar & præcordia fuerint vteri, & strangularint, mulier albas oculorum partes subuertit, & frigida fit. Sunt autem & quæ liuidæ fiunt.

C Quædam etiam dentibus frædunt, et saliuæ ad os fluunt, & similes sunt his qui ab Herculeo morbo detinentur. Si verò diutius moram traxerint vteri apud hepar & præcordia, mulier strangulatur. Quādoque verò vbi mulier vasa euacuata habuerit, & insuper laborarit, vteri conuersi ad vesicæ stomachum allabuntur, & vrinæ stillicidium inducunt. Aliud autem nihil mali habet, & curata citò sanescit, quandoque etiam sponte. Quibusdam verò ex labore aut inedia, ad lumbos aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. Si mulier corpore male habuerit, & menses biliosi prodierint, ex hoc probè cognosci possunt. Nigri sunt valde, quandoque verò nigri aut splendidi, & paucissimi prodeunt, & citissimè congelantur, & semen amborum, & maris & feminae euanescit, & non habet

*Menses bi-
liosi.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Febres erra-
tica.*
 habet in ventre, & incipiente quidem morbo, purgatur die- **D**
 bus quibus solita fuit, non pluribus, progredientibus autem
 mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores sin-
 gulis diebus apparent. Et febres succedunt erroneæ acutæ,
 cum horrore & cibi fastidio aliâs atque aliâs, & stomachi do-
 lor, & dolebit maximè ubi menses ipsi appropinquarent. Post-
 quàm autè purgata fuerit, & ad modicum tēpus, superiorum
 respectu melius habuerit, postea rursus ad idem perveniet.
 Dum autè curatur, citò sana fit. Si verò non curetur, & tēpus
 procedat, omnia prius relata valde ipsam affligent, & dolor
 corripiet, nunc vētris partem infrà umbilicū, nunc inguina,
 nunc lumbos et coxendicū ad sedem iuncturā, nunc collum,
 aliquando verò strangulatio fortis accidet, et caligo ante ocu- **E**
 los obuersabitur, & vertigo, utpote purgatione sursum ver-
 gente ac ascendente. Si enim corpus male habuerit mulierī
 menses pauciores fiunt, et quibus corpus plenum fuerit, his
 menses plures prodeunt. At verò biliosæ si menses prodeant,
 pusillanimitas incidit, et cibi fastidium aliâs atque aliâs, et
 anxietas, ac vigilia, et eructat frequenter, et non vult deam-
 bulare, et tristis est, et non videre sibi videtur, et timet. Et si
 curetur, ex his sana erit. Si verò tēpus processerit, adhuc ma-
 gis dolebit. Optimè autè cū hac agatur, si vomitus biliosus
 succedat, aut venter turbetur, nō fortiter, et subeant biliosa,
 et si fluxus succedat ipsi non fortis. Si enim quid ex his fortè
 inciderit in corpus afflictum, periclitabitur. Si verò leniter
 depurgetur aliquid biliosi aut totū id quod molestū est, sana **F**
 fiet. Si verò neq; curetur, neq; quicquā horū fiat, moritur mu-
 lier. plerūq; tamen cōtingit ut fluxus incidat biliosus ex hoc
 morbo, et si fluxus fiat, primū quidem pauca sunt quæ cōpa-
 rent: per omnes autè dies omnino plura cōtingunt. Tēporis
 autem progressu plerunq; etiam morbus acutus fit: et vteri à
 purgatione biliosa prodeunte mordentur, ac exulcerantur.
 Sed et in hoc adhuc sana fit, si curetur, et fluxus compescatur.
*Viciorum
ulcera.*
 Si verò vteri ab vlceribus fuerint inflammati, adhuc acutior
 morbus erit, et multa graueolentia ac purulenta prodibunt,
 ab ipsis vteris iam egressa, et semper velut aqua de carnibus,
 et prius relata omnia ipsam magis affligent, et vlcera ad-
 huc magis efferatiora erunt, donec ipsam vincant. Si ve-
 rò etiam sanata fuerit, sterilis erit à cicatricibus. Si mulier
corpore

- A** corpore malè habuerit, & pituitosi mēses prodierint, cognosci autem possunt si pituitosi prodeant. Pelliculosi enim apparent, & velut araneorum casses distenduntur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non subpurgetur, neq; per nares, neque per sedem, neque per vrinæ meatum. Sed in mensibus, & in turbatione sanguinis, vna cū purgatione foras exit. Et si hæc sic habuerint, ad duos quidem aut tres menses nihil egrotat. postquàm autem amplius tempus progressum fuerit, & non curetur, magis dolebit, & febris erronea corripiet, & cibum aliàs arque aliàs fastidiet, & stomachum dolebit, & maxime dolebit vbi menses appropinquant. Quū verò purgata fuerit, ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit, postea ad idem relabitur, & si non curetur, sed tēpus procedat, fient ipsi omnia quæ ei cui biliosi menses prodibant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam vt hæc fluxum pituitosum habeat, aut alia quæ ego dicam paulò postea. Et si quidē fluxus succedat, semper procedūt per omnes dies, nūc aceruata, nunc pauca, & quandoque velut à carnibus aqua prodit, quandoque velut sanies, & in hoc ipso multi sanguinis grumi insunt, & radit terram velut acetū, & mordet vbi-cunque mulierem contigerit, & vteros exulcerat. Et vbi ad hoc peruenit, reliqua quidem similiter patitur, velut prior. Minus verò quàm illa caput dolebit, & vlcera neque deformia, neque magna, neque purulenta, neque graueolentia, similiter velut illi fiunt, sed minùs huic. Si verò curetur, sana euadit, etiam vbi morbus progressum fecit, & nō valde moritur. Verūm prægnaus esse nō potest quæ sic habet. Quæ-cunque viro cohabitantes in ventre habere non possunt, interrogandæ sunt, an ipsis menses prodeant, aut non: & an purulenti sint, aut frigidi. Si quidem igitur responderit, interrogetur an statim exeat genitura, an postera die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire vbi coiuit, vteri osculum rectum non est, sed distortum, & genituram nō capit. Si verò dixerit, postera die, aut tertia, vterus perhumectus est, & semen eluitur. Si verò sexta aut septima, semen putrescit, putrefactum verò exit. Si igitur ab initio nō suscipiat semen, os vteri primū curandum est, vt rectum sit. Si verò eluatur postera, aut tertia die, vterus & caput. Si

Pituitosi menses.

Qualis ut ratio in his.

Fluxus pituitosus.

Quid in his agendum, quæ nō concipiunt.

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Mensium
cognitio.*

put. Si verò computrescat & exeat, & vterus, & totum corpus D
curetur. Atque hac singula sit cognoscere oportet. Quali ve-
rò purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum
menses prodeunt, linteam complicatum palmi magnitudi-
ne super tenuem cinerem expandito, deinde ut quæ exeunt
super hoc defluant curato. Præstat autem duo esse lintea,
vtrunque seorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum, &
diurnum quidem, postera die lauare oportet. Nocturnū ve-
rò, ubi per diem ac noctem super cinere situm fuit. In lo-
tura verò considerare oportet, qualiānam fiant lintea lota,
ubi in sole fuerint siccata. Optimum tamen est in tenebri-
coso loco ea resiccare. Si quidē igitur pituita fuerit quæ con-
ceptionem impedit, mucosa horea erunt. Si verò propter sal- E
uginem & bilē impeditur, fulua & subliuida. His igitur cō-
sideratis, & diligenti animaduersione expensis, totum etiam
corpus inspicito, an multa purgatione opus habeat, aut se-
cus, ita ut & ad colorem, & ætatē, & robur, & anni tempus, &
qua diæta vtantur respicias. Curatio verò & totius corporis
est, & vteros ac osculum ipsorū sanare, & si hoc conclusum
fuerit, aperire: Si verò illi distorti fuerint, dirigere oportet.
Si autem humidi fuerint, resiccare, & alia quoq; facere con-
traria. Fērmē autem omnibus multa curatio eadem est, ex-
cepta mensiū detractiōe. Nam quibus nihil prodit, his de-
trahere oportet. Imò quicquid in mensibus mali inest, hæc
auferre oportet: quum videlicet pituitosi sunt, & pelliculosi,
& saniosi, & tenues, aut albi, & grumosi: & quum nigri sunt, F
& carbūculosi, aut caliginosi, aut acres, falsi, turbati, purulen-
ti. Hæ omnes causæ tollendæ. Prohibēt enim in ventre con-
ceptum. Quibuscunque igitur menses pituitosi ac pelliculosi
sunt, hæ carnosæ sunt, & his os humectum est, & salua multa
ac viscosa. Et si acidum aut acre quid gustarint, sputū in ore
liquidius erit, & insulsum, & ad omnia quæ ederint aut bibe-
rint, turbatio sequitur, & supprimitur ipsis ac attollitur ven-
ter, & nausea adest, & anxietas ac iactatio multa. Et à capite
fluxus defluit, & omnia obducit, & multā humiditatem in-
ducit, & partes sub oculis liuidæ sunt ac inflatæ. Has totas
fouere oportet & frequenter vomere, & à cibis, & ieiunas.
Infernum autem vētrem mollire, sed pharmacis omnino le-
uibus, quæ minimē bilem ducunt, & semel in die cibum ca-
pere.

Medela.

Medela.

A pere, & frequenter exerceri. Et cibo siccissimo uti, & potu paucissimo meratiore. Melius autem est vt venter facile solubilis conseruetur. Verum vteros si ad hanc dietam non paruerint, pharmacis subdititijs nõ mordacibus purgare oportet. Fomentum tamen semper purgationibus præmittendum est, prius id quod ex fœniculo paratur. Deinde quod ex suffimentis. Fomenta verò & subditiõnes medicamentorum facito, coniectura facta vt omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quo tempore menses prodeunt. Si quidem igitur puri & sinceri ac cruenti fiant, ita ad virum accedat incipientibus mētib⁹. Optimum autem, desinentibus, & adhuc euntibus magis quàm vbi disparuerunt. Quum autem ad virum itura est, suffimentum quoddam ex adstringentibus suffiat. Atque hoc per canistrum, & arundinem, pharmaco calido cineri insperso. Quum verò insperseris, & canistrum, siue operculum circumponito, & per arundinem insidenti fomentum adhibeto. Vbi verò opus fuerit ipsam suffiri, plumbea fistula utere, vt aperto osculo suffiatur. Deinde cum surrexit, rursus in lecto plumbeam fistulam apponat, Deinde ea subtracta cum viro coeat. Et si ea quæ à viro prodeunt, non fuerint ei manifesta, extentis & alternatim positis cruribus quiescat. Ieiunium autem utile est in hac die, præterquam si cyceonem velit non salsum in aqua. Hunc autē tunc bibat quum vult suffiri. Si verò vbi cum viro coiuit, postridie detineat geniturā, & neq; altera die exeat: à cibis quidem & balneis prohibeatur. Bibat autem polentam in aqua non salsum, bis ac ter in die. Atque hæc dieta sit per sex dies, aut quod melius est, septem, si non exierint ea quæ à viro suscepit dum cum ipsa coiuit. Illota verò maneat per omne tempus, & det operam vt motus vitet. Si verò deambulare velit, deambulet in loco plano & leui, nequaquam accliui, neq; decliui. Desideat etiā super mollia, si conceperit. Reliquam verò dietam eandē faciat vsque ad dies triginta. Illota autem sit, aut si lauari opus habeat, pauca & non valde calida lauetur. Caput verò ne malefaciat. Cibis autem utatur & panibus, & maza si velit. Ex carnibus autē, palumbe, & similibus. ex marinis, his quæ aluū sistunt. prohibeatur ab olerib⁹ acribus. Vino verò nigro utatur. Carnibus autem assatis potius quàm coctis, tum mansuetis, tum ferinis. Et hæc quidem si conceperit, hoc modo facere

*Vicorum
purgatio.*

*Post uiri
congressum
quid agat.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

Quæ semen cere oportet. Si verò non conceperit, sed secunda aut tertia die exeunt ea quæ à viro immiſſa ſunt, fluentia cum multa humiditate: manifeſtum eſt quòd vteri ſunt humidiores. Curare itaque oportet iuxta relatum modum, donec ſicci fiant.

Quum uirum adeat hæc mulier. Quum autem ſicci eſſe videbuntur, ſic curato. Optimum eſt pharmacum mollitorium, & retro, & anteriori parte ipſi adhibitur, donec vteri ad naturam ſuam redeant. & rurfus ad virum accedat, quum menſes nō amplius multi, ſed pauci & bene colorati fuerint, & ad libidinem concitatur. Sed & in alijs diebus cum viro conſuetudinem habere oportet, ſi optime habuerint vteri.

Cum nō concipiat ſana. Quum autem in relatis diebus conſuetudinem habuerit cum viro, ſi probè parati fuerint vteri, & ſi geniturā ad decem aut duodecim dies detinuerit, ne adeat virum. Si verò non concipiat, vteri autem ſani ſint: contingit enim & hoc plerique, quum debiles exiſtentes vteri, ab affectione macilenti fiunt: aut præ medicamenti & fomēto multo, genituram ferre non poſſunt, priuſquam aſſueti fiant & conualeſcant. Hoc autem ſic cognosci poteſt. Quum ab ipſa exierint, ſecūda aut tertia die exeūt, aut adhuc prius, craſſa & compacta velut mucus: niſi mali quid ſit, & propter alium vterorum morbum genitura diſcedat.

Curatio. Quum igitur talia apparuerint, curatione quidem vterorum non eſt opus, verū reliqui corporis cura habenda eſt, quo huiuſmodi bonus habitus ſit ipſi, ut contractū ſimul ſit corpus, & iuſta mole præditum, ex paucorum balnearum, plurium verò & leuiū laborum uſu. Ab acribus autem & ſaliſis prohibeatur. Vomitiſus vtatur ante dies quibus menſes fieri ſolent, & rurfus fame maceretur, & alia perficiat quæ dicta ſunt. Atq; hæc quidem harum curatio eſt. Quibus autē ſtatim ubi coiuerint diſfluunt ea quæ à viro ſunt immiſſa, hiſ os vterorum cauſa eſt.

Quum ſtatim poſt coitum geniura exit. Curare verò ſic oportet. Si quidem valde concluſum fuerit, tædis & plūbeis fiſtulis immiſſis aperito, & molli fomēto ex fœniculo foueto. & ſubdititijs, quæ vteros attenuant, & in directum redigūt, purgato. Poſt purgationes autem & fomenta, ea infundito quæ cauſa ſunt contraria. Quibus

Medela. verò os diſtortum eſt, & ad coxam allapſum: fiunt enim etiā talia prohibentia ne vterus ſemen ſuſcipiat. Quum igitur tale quid acciderit, odoratis fomentis fouere oportet. poſt fomētum autem per digitum auulſum à coxa detrahito. Quum autem

A autem disceſſerit, tædis & plumbeis fiſtulis immiſſis iuxta priorem rationem in rectitu- linem dirigit. vbi verò rectifi- cati ac aperti fuerint vteri, medicamentis ſubdititijs purga- to, & alia facito iuxta relatam rationem. Quum autē ma- gis quàm oportet aperti fuerint vteri, purgatione opus ha- bent. poſt purgationes autem, collutionibus & ſuffimentis. Si verò propiores ſint quàm oportet, vomitibus vteri opus habent, & fomento fœtido, donec ad ſuum locum redeant. Diata verò vtendum eſt relata. Si verò os pingue fuerit & craſſum, & propterea non concipiat, ſinapi coctum ieiuna edat, & meracum inſuper bibat. Apponat autem nitrū ru- brum, & cuminum, ac reſinam. Optimum autem fuerit ni- trum vino ammiſcere & reſinā, vñā cum cumino & vnguen- to albo. Aut cornu cerui vrito, & duplum crudæ ordeacæ farinæ cum vino ammiſceto. Si verò non melius habeat, por- rum coquito, & ipſam inſidere facito. Aut phagum id eſt glā- dem tritam apponat. Et allio recenti veſcatur, & aqua muſſa inſuper pota vomat. Quibus porrò intus manet viri ſemē et computreſcit, et turbationem facit, his atriplicis ſemen aut ſuccum, cum melle aut cum cumino delingendum da- to. Quum autem à viro immiſſa graueolentia fuerint, non concipit. Portulacā igitur et adipem anſerinum miſceto et apponito. Quibus verò ſexta aut ſeptima die, à viro im- miſſa prodeunt putreſacta his veriſimile eſt ab vtriſque fie- ri, et bilis, et ſalſuginis influxu. Curare autē ſic oportet, per veratrum, aut ſcammoniam, aut peplium. Hæc enim ſurſum ac deorſum pituitam et bilem purgāt, et flatuſ educunt. An- te purgationes autem fomentis vtendum eſt, ex ſuffimentis. Vbi verò fomentum adhibueris, per ſubditia purgato, eodē modo velut in prioribus. Et poſt ſubdititorum ac purga- tionum vſum, mollitorijs vtēre, et ſubdititio medicamento ex mercuriali et artemiſia herba, et anemona, et veratro al- bo et nigro. Atque hæc quidem medicationes hoc modo his conducunt. Diætā verò reſpectu, ad totum hominis cor- puſ factū conſtituere oportet, ſiue ſiccior, ſiue carnoſior mu- lier eſſe videatur. Et ſi quidem ſiccior fuerit, balneis pluri- bus, et obſonijs omnibus coctis, tum marinis, tum carnibus vtatur. Vino verò aquoſo, et oleribus coctis, et pinguibuſ o- mnibus ac dulcibus. Hæc enim plerunque faciunt vt humi-

*Cūm uteri
numis hīāt.*

*Quum os
uulvæ craſſū
ſum eſt.
Medela.*

*Quū ſemen
intus pu-
treſcit.*

Curatio.

*Vterorū hu-
meſcentium
curatio.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

ditas sit, tum in reliquo corpore, tum in vteris. Si verò humi-
dior fuerit, tales vteri nullo ex his opus habent, sed vice ver-
sa neque contrectare, neque lauare recenti motu facto oportet,
neque suffire. Nam ad periculum hæc procedere solent. Et si magis
quàm pro natura fuerint humectæ, siccare sanè, ac suffire oportet.
Si verò biliosa in ipsos confluant, medicamentum dare quod bilem purgat. Si verò falsuginosa,
lac asinum, & vinum, & alia auxiliaria. Morborum porro vires
considerare oportet, & causas ex quibus morbi fiunt exquirere,
atque sic ad alia procedere, & morbos circa locos curare. & quæ
quidem ob causam osculorum hiantium prohibentur, ut ne detineant
in ventre, horum oscula præparare, ut probè diducta sint. Quum
verò humiditas prohibuerit, hanc inspicere ut ne impediat, totis
mulierum negotijs expentis, siue ex toto corpore, quid moueri videatur,
siue ex ipsis vteris, siue ex vtrisque. Vteros autem sic curare oportet,
ut neque humidi sint, neque valde sicci. Imò sicciores quidem,
tanto magis bono succo, quanto sunt sicciores, eiusmodi humiditate
ut pingues magis fiant quàm graciles. Humectos verò & madidos
siccare, ita ut relinquantur quod humidi sint, & non valde resiccentur.
Excessus enim in his valde sunt vitandi. Concipit autem in ventre,
neque ea quæ humiditatem habet, neque quæ resiccata est, nisi quid
horum in vteri natura fuerit. Cæterum virum adire ipsam oportet,
post adhibitam curationem, desinentibus aut inchoantibus mensibus.
Optimum est etiã ubi quiescerint. Maxime verò in his diebus
experiendū est, an prægnans fieri possit. hi enim sunt opportunissimi.
Si verò nō statim concipiat, & reliqua bene habeant, nihil prohibet
etiam alijs diebus cū viro coire. Nā hæc exercitatio alacritatem
ipsi inducit, & venulæ hinc laxantur: & si ea quæ à viro prodeunt
concurrerint secundum rectitudinem cum eo quod à muliere, citius
concipiet. Hæc enim causa est his, quibus siue statim, siue posteriore
tempore exeunt. Atque hæc quidem de his dicta sunt. Si verò
humidius fuerit os vterorum, genituram attrahere nō possunt.
Utendum autem est medicamentis subdititijs acribus. Cōmorsus
enim & inflāmatuſ stomachus solidus ac firmus quādoque fit,
& aliquo modo accommodatur. Sed & si in callum indurati fuerint,
præstat acria apponere quæ mordeāt. Quæ enim

*Tēpus cō-
cubitus.*

*Quæ duri-
tiam vulua-
rum tollit.*

E

F

enim

A enim tenuia & feruida sunt, calli duriciam diffundunt. Si verò mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his quæ nō mordeant. Quòd si diu non concipiat, mensibus non apparentibus, quum tertia aut quarta dies aderit, alumen tritū, vnguento dilutum, & lana exceptū apponito, & habeat per triduum. Quarta verò die fel bubulum siccum in oleo seruefacito, & lanam teneram eo imbutam subdito, & habeat per triduum. Postridie autem eximat, & cum viro coeat. Si genituram non suscipiat mulier, mensibus secundum naturam prodeuntibus, membrana præposita est, fit etiam ex alijs causis, cognosces autem vbi digito obicem cōtigeris, facito autē medicamentum subdititium, resinam & aris florem cum melle

Medela non concipiens.

B subacta in linteo apponito quàm penitissimè, filo ad extremitatem alligato, vbi verò hoc extraxerit, myrtum in vino coquat, & vino tepido perluatur, præstat autē membranam auferre. Sunt autem mulieres quæ faciliè quidem in ventre concipiunt, gestare verò nō possunt, sed fœtus ipsis corrumpuntur, aut tertio, aut quarto mense, nulla causa accedente, neque cibo incommodo ingesto, & hæc est causa quæ relata est, & maximè quum vteri augmētum fœtus dimiserint, aut venter ipsis turbetur. Debilitas autem, & febris vehemēs, & cibi fastidiū incidit eo tempore quo fœtus corrumpunt. Est autem & hæc caussa, si vteri fuerint leues, aut natura, aut viceribus in ipsis innatis. Si enim leues fuerint, quandoq; continentes ipsum pelliculæ, minus quàm oportet coherent: vtpote quum vteri ipsi pleni existant, cognouerit autem quis hæc singula, si de his exactè interroget. De leuitate verò cognouerit, si alia mulier cōtigerit, dum vteri vacui sunt. Non enim hoc tempore manifestum fit. Si verò menses prodierint his acervatim prodeunt. Quibusdam tamen ipsarū contingit vt fœtus edant. Et si qua curetur, spes partus adest, & de his quidem sic habet. Si mulierē puerperam facere velis, aliàs concipere nequeuntem, menses considerare oportet, an pituitosi sunt aut biliosi. Cognosces autē sic. Arenā tenuem ac siccā subijcito, & quum menses prodeunt, in sole sanguinem superfundito, ac siccari sinito. Et si quidem biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus pallidus erit. Si verò pituitosa fuerit, velut mucus. Vtrum igitur horum fuerit, ventrē purgato, siue supra opus habuerit, siue infra, postea vteros pur-

Partus retinendi causa.

Leuitas uterorum uti dignoscatur.

HIPPOCRATIS LIBER I.

Quæ fæ- gatio. Si verò concipere voles, hederæ grana septem, aut fo. **D**
cunditatem lia, singulis mensibus in vino veteri, cessantibus mensibus
parent. bibenda dato. Et malicoriū in vino odorato meraco coqui-
to, & glandem ex hoc factā in meridie subdito. Aut alumen
Aegyptium tritum lanæ illigatum apponito. Quum autem
sol occiderit, eo detracto, vino odorato perluatur. Hæc autē
cessantibus mensibus facere oportet. Sed & hoc sic habet.

Conceptus Quum purgatæ fuerint mulieres, maximè in ventre con-
tempus. cipiunt cū viro consuetudinem habentes, & genitura ipsis
corroboratur, si quando oportet coiuerint. Et semen viri fa-
cilè ammiscetur, & si præualuerit, illi accommodatur ac ap-
propriatur. Tunc enim maximè os vterorum hiat, & disten-
tum est post purgationes. Et venæ genituram attrahunt. At **E**
in priore tempore, & os vterorum cōclusum est, & venæ ma-
gis sanguine plenæ existentes, nō similiter genituram attra-
hunt.

Quando nō Si verò genitura iugi cursu defluat, mulier viro mi-
concepit. sceri non cupit, & si misceatur, non concipit: & lumbi ac co-
xendices doloribus vexātur, & febris debilis corripit, & im-
potentia ac animi deliquium succedit, & aliquando vteri in
suo loco non sunt. Si quidem igitur præ plenitudine defluat,

Vitæ ra- sinere ipsam optimum est. Si verò vterus laxus fiat, diætā sit
tio. alica, caro suilla, aut palumbis, & vinū nigrum, portiones ve-
rò, quæ ad fluxū describentur. Nunc porrò dicam de mor-
bis earum quæ in ventre habēt. Pronuncio autem de mulie-

Prægnan- re in ventre habente duos aut tres menses & ultra, si menses
tium mala. statim prodeāt singulis mensibus, necesse est tenuem ipsam **F**
fieri ac debilem. Quandoque etiam febris ipsam corripit his
diebus, quā diu menses prodierint. Et dum prodeunt, &
postquā prodierint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His
vteri magis quā opportunum est, hiant, & augmētum fœ-
tus dimittunt. Descēdit enim quum mulier in ventre habet,
sanguis paulatim in vteros à toto corpore, & in orbem circa
id quod in vteris est circumstans, illud auget. Si verò hiarint
vteri magis quā oportet, sanguinē singulis mensibus, ve-
lut procedere solet, dimittunt. Et quod in vteris est, tenue ac
debile fit. Si verò curetur mulier, melior & fœtus, & mulier
euadit. Si verò non curetur, fœtus corrūpitur. Sed & ipsa pe-
riclitatur, ne diuturnum habeat morbum, si purgatio plus
quā oportet prodeat. Quia & post corruptionem pericu-
lum

- A** lum imminebit, nimirum vteris magis apertis, Si verò *Causse uariæ abortus* mulieri in utero habenti caput pituitosum fuerit, & pituita acris in ventrem descenderit, & à capite ventrem perumpit, & febris debilis ipsam corripit, & palpitationes quibusdam debiles subexolutæ, augescences acutæ. Si verò etiam cibi fastidium, & impotentia corripiat, periculum est ne breui fœtus corrumpatur. Sed & ipsa in periculum adducetur, si non curetur. ubi verò effugerit, ut pote ventre fluendo existente, statim concludere ac constringere oportet.
- Multa verò etiam alia sunt pericula, in quibus fœtus corrumuntur. Nam si mulier in ventre habens ægrotarit, aut debilis fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut salutarit, aut cibum fastidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut amplius aut minus nutrimentum accipiat, aut timeat, & consterneretur, aut vociferetur, aut intemperanter viuat fœtum corrumpet. Nam & cibus corruptionis causa est, & potus multus. Sed & ipsi uteri naturas habent, quibus abortum faciunt, quum sunt flatuosi, densi, magni, parui, & alia his similia. Si mulier in utero habens, ventrem aut lumbos doleat, formidare oportet ne fœtum per abortum edat, pelliculis qui ipsum continent ruptis. Sunt etiam quæ fœtus corrumunt, si acre quid, aut amarum ederint, aut biberint præter consuetudinem, dum adhuc paruus intus est puerulus. Si enim puero quid accidat præter consuetudinem, & si paruulus adhuc fuerit, moritur. Et si eiusmodi edat aut bibat, velut diximus, ut necesse sit ipsi turbare ventrem, dum adhuc paruus est puer. Percipiunt enim & concitantur ipsi uteri, fluxione ex ventre secedente. Et si laborauit mulier plus quam oportet, & venter ipsius concludatur, aut magnus fiat, etiam sic puer corripitur, velut à labore calefactus, & à ventre pressus. Plerumque enim dum parui sunt, debiles sunt. Quidam verò etiam magni corrumuntur, Quare mirari non oportet mulieres, quod inuitæ corrumunt. Nam custodia & scientia multa opus est, ut in uteris gestent puerum & enutrient, & ut euadant ab ipso in partu. Si verò mulier in ventre habens corpore male habeat, & fuerit biliosa & doloribus vexata, & aliàs atque aliàs febricitet, & os examarescat, & lingua cum virore pallida fiat, oculi velut morbo regio affecti, ungues bi-

Quam facile abortus fiat.

Prægnantium uarij affectus.

HIPPOCRATIS LIBER I.

biliosi, vrina acris: hæc tum aliâs, tum si febricitet, aliâs at- D
 que aliâs ipsi accident: postquàm verò etiam purgationem
 contigerit biliosam esse, planè timendum est etiam pueros
 debiles fore: hæc si biliosa per secessum egerat (id quod val-
 de contingit) melius deget. Et si biliosa aut valde nigra
 sunt partus purgamenta, etiam ut plurimum pinguedo suc-
 cedit, et prodeunt paulatim, et non cito congelantur. et
 primo quidem tempore leuius fert, postea verò grauius, et
 minùs purgatur quàm oportet. Si enim corpus malè habue-
 rit, etiam partus purgamenta pauciora ac deteriora ipsi pro-
 cedent. Patietur autem et hæc omnia, etiam si menses pro-
 deant biliosi. Verùm breuiori tempore ægrotabit. Et mor- E
 bus ad eadem pericula, et signa, et transmutationes deue-
 niet. Aut enim ipsis vomitus biliosus, aut purgatio per ven-
 trem, in hoc morbo fit, et vteri exulcerantur. Multa verò cu-
 stodia mulier opus habet. Quum igitur tale quid factum fue-
 rit, ut ne moriatur, sterilis erit. Si verò nihil horum fiat, et
 non curetur, sed partus purgamenta fuerint ipsi occultata, in
 triginta et vna diebus ut plurimum moritur. Huic pharma-
 cum in potu exhibendum est quod bilem ducat. Prodest et
 anisum, et quæ ad vrinam ciendam dantur. Vomant autem,
 et sudores eliciantur, et alius succo ptisanæ, et melle, et ovis,
 et maluæ aqua infusa eluatur. Quibus in ventre habenti-
 bus circa septimum aut octauum mensem, derepente mam-
 marum et ventris plenitudo collabitur, et vbera gracilescent,
 et lac non apparet, his dicendum est, puerum aut mortuum F
 esse, aut viuere et debilem esse. Si enim in ventre habuerint,
 et apparuerint menses: aut abortus fiunt, si plures fuerint et
 male olentes, aut foetus morbosus fiunt. Si mulier in ventre
 habens pituitosa fuerit, et caput dolet, et aliâs atque aliâs fe-
 brit, et in capite obuoluitur pituita. Et grauitatem exhibet
 ac frigus. et in corpus procedit, et in venas, quum caput fue-
 rit repletum. Fit etiam colore plumbo similis, et vomit pitui-
 tam, lingua alba est, et vrina communiter exalbescit, frigida
 est, turbatio adest, et æger motus. Vbi verò pepererit, proce-
 det ipsi purgatio pituitosa, et apparebit pelliculosa, et velut
 araneorū casses in hac distenti erunt. et patietur quidē eadē
 omnia etiā ea cui menses pituitosi prodeunt. verùm breuiore
 tēpore ægrotabit. et eadē pericula, et signa, et transmuta-
 tiones

Medela.

*Quid signi-
ficet partū
perisse.*

- A** tiones morbus habebit. Cōtinget enim ipsi vomitū pituitosum fieri, & affectiones similes velut illi accident. Dependēt enim eodē modo partus purgamenta, & menses pituitosi, verū purgamenta partus breuiore tempore quā menses, et nisi eruperit ipsa purgatio quæ diu morā traxit, moritur in quinq; et quadraginta diebus, etiamsi pituitosum partus purgamentum ipsi prodierit. Curata autem mulier, sana fiet, et inflabitur ab initio si sanata fuerit, grauis enim erit hic morbus. Huic dare oportet pharmacum quod pituitam ducit, et lac caprinum coctum cum melle miscere. Si verò saepe non obediāt, nasturtium, aut cnicum, aut cneorū, aut polypodiū, aut serum, aut medicamentum ex sale compositum exhibeto, et quæcunque pituitam laxant, ac educunt. Si verò mulier in vtero habens, lienosa sit à relatis affectionibus, in hoc morbo menses hydropi similes et pituitosos demittit, et partus purgamenta procedēt hydropi similia, et prodibunt modò multa, modò pauca, et fiunt quemadmodum aqua à carnibus, velut si quis carnes cruentas abluat. Aliquando verò paulò crassiora, et non congelantur. Et patietur eadem omnia etiam ea cui menses aquosi procedunt, et pericula eadem ac transmutationes morbus habebit. Cōtinget enim ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationem occultari, et ad ventrem conuerti, et ad crura, aut ad pectus, aut aliquam harum partium, et pericula erunt eadem quæ prius sunt relata. Si prægna intumescat, vrticæ semen plurimum, et mel, et vinum dilutum odoratum potandum dato, bis in die. Si prægna bilis vexet, ptisanæ succum dato, rhoë rubro insperso, aut eo qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, et sistetur. Si suffocatio derepente accidat prægna. Fit autem hoc maximè vbi mulier laborarit, et cibum fastidierit, vteris à labore calefactis, et pauciore humore foetui accedente. Et quum vterus ac venter inanior sit quā oportet, procedit foetus ad hepar et præcordia, vt quæ sunt humecta, et suffocationem fortem derepente inducit. Intercepit enim perspirationem circa ventrem, et mulier voce priuatur, et albas oculorum partes subuertit, et reliqua patitur omnia quæ relata sunt, si mulier non prægna ab vtero suffocetur. Quin et suffocatio fieri incipit mulieri in ventre habenti, quum à capite defluit pituita ad præcordia,

*Periculum
mortis in
prægnate.*

Medela.

*Prægna
lienosa quid
patietur.*

*Suffocatio
vulua cur.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

utpote corpore respirationem trahere non potente. Et si **D**
quidem vnâ cum pituitâ descensu, foetus redierit ad suum
locum, velut qui humorem attraxit, & à pituita delatus sit,
mulier sana sit. Stridor autem sit foetu locum suum occupan-
te. Et venter mulieris ut plurimum humidus sit. Si verò non
breui redeat foetus in suum locum, duo iam fiunt quæ fœ-
tum affligunt, pituita quæ à capite descendit, grauat enim
& insistens frige facit: & loci alienitas, & periclitabitur. Et si
non breui quis commodiorem diætâ adhibuerit, mulier
suffocabitur. Et de his quidem sic habet. Si verò mulieri
in ventre habenti, tempus partus iam affuerit, & dolor par-
tus tenuerit, & ad multum tempus mulier puerum edere
non poterit, omnino obliquus aut in pedes procedit. Utile **E**
est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, diffi-
cilis sit affectio. Sicut enim si quis in vas oleariû angustî o-
ris nucleum immittat, non proclive est extrahere ipsum ob-
liquatû. Sic sanè etiam mulieri grauis affectio est, vbi foetus
fuerit obliquatus. Difficile est enim ipsum exire. Graue au-
tem est etiam si in pedes processerit, & saepe aut matres pe-
reunt, aut pueri, aut ambo. Est autem & hæc magna causa ut
non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus
fuerit. Quum mulier in ventre habuerit, tota sit cum vi-
rore pallida, quoniam purus ipsius sanguis semper quotidie
ex corpore destillat, & in foetum descendit, & augmentum
ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, neces-
se est ipsam esse pallidam, & semper alienos cibos appetere, **F**
& sanguinea in ventrem intrare. Et debilior sit, quoniam
sanguis minuitur. Affero porrò mulierem vbi pariet, fre-
quentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, venter
plenus est, & calore pressus. Maxime verò frequenter respi-
rat, vbi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolet.
Nam & lumbi à foetu colliduntur. Dolet autem stomachum
sive ventriculi osculum in intermedio tempore aliàs atque
aliàs, utpote dum venter, maxime verò vterus, circum fœ-
tum obuoluitur. Et si puerperæ vterus infletur, ouiculæ aut
capræ hepar cinere obruito, deinde coquito, & hoc edat, ac
vinû meracius verus, si nihil prohibuerit, bibat ad dies qua-
tuor, si longius aberit à partu. Si verò lumbos doleat, ani-
sum & cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lauetur. Si ve-
ro anhe

*Partus dif-
ficilis.*

*Cur graui-
da palleſcat*

*Parturiti-
onis signa.*

Aro anhelatio corripiat, sulphuris magnitudinē fabæ, & cardamomi tantundem, & rutæ ac cumini Aethiopici tantundem. Hæc terito, & vino diluta ieiunæ bibenda præbeto. Et à cibis frequenter abstineat. Si in partu purgatio multa prodierit, vterus contrahitur, & vesica, & intestinum, & neque stercus continent, sed & vrinam emittunt. Oua igitur forbenda dato, & panem cinericiū edendum, & reliqua quæ scripta sunt. Si verò ea quæ in partu est, sicca fuerit, & difficulter humectetur, oleum bibat, & locos oleo calido. cum malux aqua irriget, & celato liquido illinat, & anserinum adipem cum oleo infundat. Si verò parere non poterit, resinam, aut cuminum, aut pinus corticem suffito.

Partus difficultas quæ tollatur.

B Quicumque verò tumores vteri in partu, aut ex partu fiunt, eos adstringere non oportet, velut medici faciunt: verum pharmaca optima exhibeto. Cuminum Aethiopicum quantum tribus digitis capi potest, & anisi, & sesellis, grana quinque aut sex, pæoniæ radicis aut etiam seminis testam conchæ maioris dimidiam. Hæc in vino albo odorato maxime, ieiunæ exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, seseli, pæoniæ radicem, eodem modo. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen, eodem modo. Aut crethmi radicem. Aut cuminum Aethiopicum quatuor obolorum Atticorum pondere. Aut piper, anisum, daucum, pæoniæ Atticæ radicem, hæc in vino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos aut tres, & cuminum Aethiopicum, & pæoniæ radicē.

C Aut etiam lini semen similiter, quo etiam pueros tussientes nutriunt, cum oui assati vitello, & cum sesamo tosto. Si prægnanti pudenda superficiario ac feruido vlcere affecta sint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito, & aqua à coctis myrti baccis perluito. Nunc verò dicam de puerperij purgamentis, & his quæ post partum exeunt. Quum mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, aut etiam vterus durus fuerit: dolor habet lumbos, & lateris mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amarè dolet, & venter attollitur, & horrores per corpus discurrunt. Ex talibus autem febres fiunt acutæ.

Puerperarum purgatio.

Hanc ita habentem, si quidem sine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Maluam au-

HIPPOCRATIS LIBER I.

tem coquito, & oleo cyprino in aquam eius infuso, mitigandi gratia insidere iubeto. In omnibus autem morbis in quibus fomentum auxiliatur, melius est postea oleo vngi. Si vero febris habeat, à balneis abstinere, fomentis autem & tepesfactorijs imum ventrem & lumbos curare. In potu autem exhibere pharmaca vterina, aut sæpiæ ovis, aut castorio ammixtis. post hoc verò farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succum sorbendum dare. Si verò mulieri cum puero in partu non prodierit humor velut oportet, sed si quidem in capite habuerit humorem à calore attractum, in partu & ante, caput dolebit. Si verò in ventrem acervatim descenderit, ubi concitatus fuerit, ipsum turbabit. Et non oportet longè progredi sinere, sed auxilium ferre, ut ne ex partu ventris profluuium succedens, corpore male habente, ipsam dolore affligat. Si verò à capite delatus fluxus, ad puerperij purgationem vertatur, & multum concitetur, melius habebit. Si verò plus moderato, curam adhibeto. Si verò in ventrem, facilius utique exitus puero contigerit. Si verò purgatio modica mulieri prodierit, dolor fortis corripit lumbos, & omnem circa pudenda locum, & intumescit, & femora ardent. Et ex ore ac naribus pituita fluit fortiter aquosa, & dolet caput, & febris habet, & horror, & tumet, & dentes stridunt. & venter, & vesica constringetur, & oculus subvertitur, & caliginosum visum habet. Quum mulieri puerperæ purgatio non facile procedit, velut vteris inflammatis, & osculo ipforum concluso. Obtorquetur enim stomachus vteri post pueri egressum. Si enim quid horum fuerit, purgatio non procedet. Si verò non processerit purgatio, continget ipsam febrile, & horrorem habere, & ventrem magnum esse. & si ipsam attigeris, totum corpus dolere, maximè si quis ventrem attingat, & aliàs atque aliàs stomachi dolore vexatur, & lumbos dolet, & tibi fastidium, & vigiliæ, & punctura adest. postea quinto aut septimo die quandoque venter turbatur, & secedunt nigra, & valde graueolentia aliàs atque aliàs, & vrina velut alimina. Et si secesserint, videtur sibi melius habere, & curata, breui sana fit: sin minus, periclitabitur profluuium ventris forti ipsi illapso. Et puerperij purgamenta ipsi occultabuntur. Si verò venter ipsi non turbetur, neque purgatio prodeat sua sponte, neque ea quæ commoda sunt breui exhi

Quid si nō
curatur eue
nias.

A ui exhibeantur, tempus autem progrediatur, multò magis ex prædictis affligetur. Et insuper periclitabitur, ne liuida fiat velut plumbum, & aquam intercutem incidat. & vmbilicus extabit ipsi, ab vteris eleuatus. Et circumcirca nigrior erit. & vbi hæc facta fuerint, fieri non potest vt mulier superstes maneat. Pereunt autem aliæ alio tempore, pro corporis & affectionis ratione. Verùm vnā & vicenariā diem nō excedunt, id quod plerunq; sic contingit. Si verò purgatio ipsi eruperit, siue à pharmacis, siue sua sponte: sit enim & hoc si vteri os laxarint, à sanguine acruatim derepente delato coacti: & si eruperit, graueolentia purulenta depurgantur, Quandoque etiā nigra: & melius habebit, & curata sanescit. Fiunt autē &

B vlcera in vteris, vtpote puerperij purgamentis putrefactis. Si verò fiant, maiore cura opus erit, vt ne ipsi vlcera magna & putredinosa fiant: periculum est autem ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa verò hæc fiunt, si vlcera intus fuerint. Quum purgatio ipsi prodierit, velut spina per vteros transire videtur, & calor ipsam corripit, ac maximè ventrem inuadit. Et si attingatur, partem infra vmbilicū dolet, velut si purum neruosum vlcus contingat. Post dolores fortes aliās atque aliās in vteros incidunt. Et febris aliquando ad contactum manus debilis & aliās atque aliās puerperij purgamenta procedunt, maligna, purulenta, graueolentia. Hæc sunt signa, si vlcera in vteris fuerint, & multa cura opus habent. Atque huius quidem morbi tot fines existunt. Si verò purgatio

Signa ulcerarum in vteris.

C puerperij primis tribus aut quatuor diebus processerit, verū postea derepente euanescit: easdem affectiones consimiles priori patitur, sed minus. & si transmutetur morbus, in idem transmutabitur. Diuturnus autem & debilior priore erit. Si verò curetur mulier, superstes erit, si cito curetur. & de hoc morbo sic habet. Si verò ex partu non fuerit purgata, venter intumescit, & splen, & crura. Et febris habet, & rigor corripit, & dolores proliunt ad lumbos. Aliquando etiam ad viscera. Et perfrigeratur, & febris habet. pulsus debiles sunt, & aliquando acuti, & aliās attolluntur, aliās deficiunt. Hæc patitur incipiēte morbo, & sic habet. Temporis autem progressu, caue faciei partes rubescunt. Quum sic habuerit, leues cibos exhibeto. Et si turget, pharmacū infra purgans bibendum dato, si biliosa fuerit, quòd bilem purgat: si pituitosa, quod

Cum puerperæ purgatio subsistit.

Cum post partum non purgatur.

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER I.

quod pituitam. Postea verò vteros odoratis foueto, & molli- D
torium in die apponito. Si verò osculum solidum fuerit, tota
die foueto, & mollitoria apponito. Deinde calida aqua laua-
to, & plumbeas fistulas indito. postea salis grana, & myrrhā
in linteum illigato, & picē coctam ammixtis aromatis lana
excipito, & singulorum pares portiones ad gallæ parue figu-
ram efformato, & per diem ac noctem apponito. Deinde ve-
rò intermissis tribus diebus, iisdem foueto. Et grana cnidia
decorticata duarum porionum mensura, & piperis grana tri-
ta, oleo Aegyptio albo, & melle optimo ammixto, in lanā in
farcito, & pēnæ obuoluta. tota die ac nocte apponito. Et si ti-
bi purgata esse videantur, melius est sinere. Si verò purgatio-
ne opus habere videatur, duobus diebus interpositis, rursus E
id quod ex cucumere sylvestri paratur, per diem ac noctem
subdito. Deinde Netopon, & oleū rosaceum odoratissimum,
& adipē cerui liquefacito, & die vna in lana subdito. & mul-
ta calida, quantum eius fieri potest, leniter lauato. Statim au-
tem vbi purgatorijs, & calida, fuerint purgata loca affecta,
adipe anserino, & myrrha, & resina tepida os vterorum illi-
nat, & foueat. vteros verò postridie vino et oleo narcissino
eluat, Aut si narcissinum non sit, vino solo. Atque hæc die
vno ante menses faciat. Postquam autem menses prodierint
primis diebus atramentum, hoc est spondium cyprium terat
et salis granum addat, et hæc lana excepta paululum in cor-
pore habeat. Et ieiuna vinum meracū odoratum absorbeat, F
Vbi verò quieuerint menses, per diem id quod ex pulegio pa-
ratur apponat, et virum accedat. Et si in ventre conceperit, sa-
na euadit. Cibis autem in purgatione vtatur. Ad hæc cōmo-
dat, mercurialem coquere, et porrū, allium, brassicam, et gra-
na mali punici ammiscere, et succum sorbere. Alijs autē ob-
sonijs marinis potius quàm carnibus vtatur. A dulcibus verò
et oleosis prohibeatur. Bibat autē semper ieiuna id quod ex
tæda paratur, donec purgetur. Et mensibus prodeuntibus idē
valde bibat. Si verò paulo pauciora quàm oportet prodie-
rint mulieri puerperij purgamenta, velut vteris angusto ore
præditis ac distortis, Aut aliqua pudēdi pars valde fuerit cō-
clusa ab inflammatione: Mulier acutē febrit, et stomachi do-
lore vexatur, et dolet totum corpus, et molestē fert. et ad ar-
ticulos manuum ac crurum et lumborum dolor procedit. et
locum

*Puerpera
mala pur-
gatio quid
apparet.*

- A** locum circa collum, & spinā & inguinā dolebit, & quādam corporis partes impotentes fient. Postea calor quietus erit, & horror valde manifestus. Vomūt autem & pituitosa, amara, acria, & de hac sic habet, & continget vt si curetur, sana fiat. Sin minus, clauda & quarundam corporis partium impotens erit. Non autem valde sterilis est hic morbus. Si quidem vlcerati fuerint vteri, & puerperij purgamenta nō prodierint, *Viciorum ulcera.* velut oportet, omnia dolebit, & si nō magna fuerint vlcera, curata breui sanescit. Oportet autem curationem vlcera in vteris exactē facere, vt quæ in tenera & subtili sensu prædita sint parte, & in nervosa cavitare. Multæ autē sunt partes cū quibus societatem habet, sinciput, stomachus. Mens percellitur, & improba fit, & nō facilē intelligit. Si verō vteri angustii oris ipsi fuerint, & puerperij purgationem nō emisierint. *Cū uterorum os angustū fuerit.* inflammantur: & si non curetur breui, omnia magis ipsam affligent. Et odor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint vteri, sua sponte exit malū grauē olens, & liuidum, aut nigrū grumosum, & mulieri puerperij purgamenta purgantur. Quandoque verō non exit, sed mulieri mortē portendit, nisi quis breui venā secet, aut ventrē emolliat, præstat autem etiam clysterem adhibere. Si verō ad vomitum facilis fuerit, etiā vomitum inducere. Melius autem est lotium ciere & exudare. Verū in his occasio optima est, quum opus his fuerit. Si verō ex partu purgata mulier fuerit, paulo plura quā oportet. Cōtingit enim hoc, si vteri amplioris osculi fuerint, & venæ quādā ruptæ sint, quæ sub vteros tendunt, præ violentia egressus ipsius fœtus: febris & rigor habebit ipsam tenuis, & calor per totū corpus. Aliquando etiā horror, & cibi fastidium, & omnino abominabitur. & tenuis erit ac debilis, & pallida, & tumida, & cibū auersatur. Si verō quid edat aut bibat, non concoquitur. Quibusdam verō etiā aluus & vesica erumpit, & horror magis obtinet. Et de hac sic habet. Si verō puerperæ aliqua pudendi pars obturata fuerit: Iam enim etiam hoc cognoui: si vlceratum fuerit os pudendi, vbi sanē vlceratum fuerit, in partu à pueri exitu violatū, simile quid sit vlceri superficiali ac feruenti, & valde inflammatur. Et labia præ inflammatione inter se coincidunt, & se mutuo contingunt, vtpote quæ sunt exulcerata. Sed & frigus fit, & ambo labia clausa sunt, cōstrin-
- gentia

HIPPOCRATIS LIBER I.

gentia purgationē relictam. Si verò prodiret purgatio, vlce-
 ra non cōclusa essent. Nunc autē influit, & aliena carne cras-
 sescunt. Proinde ea sanare oportet, velut in reliquo corpore,
 & ad cicatrices perducere. Locus autē levis & concolor red-
 datur. Mulier quādam pariebatur eadem quæ patiuntur
 vteri dum à puerperij purgamentis nō purgantur, & ad hæc
 dolebat pudendum. Et ex contactu cognouit, quòd obturata
 esset, & narrauit, & cūrata depurgata est, & sana euasit ac fræ-
 cunda. Si verò curata non fuisset, neque purgatio ipsi sponte
 erupisset, vlcus maius fecisset, & malo non remittente, peri-
 clitata fuisset ne vlcera cancerosa fierent. Si verò processe-
 rit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemque ac pul-
 monem: fit enim & hoc: moriuntur sæpe statim, si detineatur
 ac firmetur. Si verò probè exeat per os aut nares, sana euadit.
 Si verò morbus paulo diuturnior fiat, patietur sanè mulier
 ea quæ dicta sunt de virgine, cui menses primū cōparentes
 sursum impetum fecerunt. Verū mulier longiore tempore
 superstes erit quā virgo, & affectiones debiliores erūt, do-
 nec pulmo purulentus fiat. Si verò puerperij purgatio nō ex-
 eat per os, sed sursum tamen impetum fecerit, occultabitur.
 & non procedet iusto modo. Et tussis corripiet, & anhelatio-
 nes. Et impleto pulmone à sanguine, valde dolebit latus &
 dorsum. Et quum tussiet, sicce tussiet. Aliquādo verò spumo-
 sum expuet. Temporis autem progressū sputum apparet sub-
 nigrum & turbatū. Et calor pectora tenet, magis quā reli-
 quum corpus, nimirū sanguine ipsa calefaciente. Et febricit
 mulier, & venter ipsi coarctatur, & cibū fastidit, & vigilabit,
 & abominabitur, & nō superstes manet, sed moritur plerū-
 que vicesima prima die. Si verò purgatio sursum progressa,
 per os non exeat, neque in pulmonem vertatur: conuertetur
 ipsi ad faciē, & erit hæc valde rubicunda, & caput graue, quòd
 neque mouere potest absque doloribus, & oculi valde rubi-
 cundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis fluat. Et quibusdam ex
 naribus sanguis manat. Et si hic exierit, diuturnior morbus
 fit. Et aures nō acutè audiunt in hoc morbo, & stomachi do-
 lore vexatur, & eructat, & mente alienatur, & deliria fiunt
 furiosa. Quibusdam autem adest oculorū distortorū feroci-
 tas. Et reliqua omnia perpetietur, velut si purgatio ad pulmo-
 nem vertatur. Verū nō tussiet, neq; expuet eiusmodi, neq;
 dorsum

*Cum pur-
gatio caput
petit.*

*Cum pur-
gatio faciē
petit.*

A dorsum similiter dolebit. Curata verò sana fit. Non multaverò spes est de vita ipsius. Et si etiam superstes maneat, surditas aut cecitas omnino ipsi accedet. Atq; hic est huius morbi finis. Si ex partu fluxus corripit, & cibi in ventre nō maneant, uuā passā nigram, & mali punici dulcis grana terito, & vino nigro dilutis utitor, ita ut caseum caprinum derasum, & polentam tritici torrefactam inspergas, & bene temperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem vomat, hepatis fistula sauciata est: & dolor ad viscera procedit, & cor cōuellitur. Hāc multa calida lauare oportet: & tepesfactoria quæ maximè admiserit adhibere: & lac alininū in dies septē vel quinq; bibendum dare: postea verò vaccæ nigræ lac bibendum præbere, ita ut sine cibo degat, si fieri poterit, ad dies quadraginta. Ad vespertinam verò sesamum tritum bibat. Morbus hic est periculosus. Quomodo autem lac fiat, dictū à me est in pueri in partu natiuitate, & alia similiter. Si lac fuerit extinctum, porrum tritum & aqua dilutum bibendum dato. Et calida lauetur, & in cibo porrum ac brassicam edat. Sed & cytisi folia simul coquat, & succum sorbeat. Bibat etiā fœniculi succum, & de radicibus fœniculi. Et ordeum molitū ac butyrum simul coquito, frigefacito, ac bibenda præbeto. Bonum est & hippomarāthrū, & hipposelinum, & cytissus. Hæc omnia simul multum lac faciunt & augment. Capræ item Scyriæ, casei autē maximè commodi sunt. Sed & saluiā coquat: Aut à iuniperi baccis, aut cedri fructu, succum diffundat, & vino affuso bibat: & reliqua oleo affuso edat, & ab acribus, & falsis, & acidis, & crudis oleribus omnibus prohibeatur. Nasturtium verò in vino potum commodum est. Nam lac purgat: & calida lauetur, & subcalidam bibat. Viticis itē fructū in vino bibendum dato: & betæ succus poratus multū lac facit. Sesamum quoq; recens, & ordeum trimestre, in mortarium coniecta terito, & succum per lintēū exprimito, & mel aut amamelidas ammisceto: deinde in vino nigro bibēda dato. Quum mulier peperit, & à secunda non fuerit liberata, præstat dare ea à quibus maximè purgātur puerperij purgamentā: allia cocta aut assata in vino & oleo cum polytis ac sepiolis super prunis tostis, quicquid tandē ex his voluerit. Castorium verò aut nardum bibat. Bibat etiā rutam in vino nigro dulci ieiuna, aut sine vino. Si verò vinum non fuerit dul-

*Profluuium
post partū.*

*Quæ lac
reparent.*

*Quæ post
partum curen-
tur.*

ce,

HIPPOCRATIS LIBER I.

ce, melius est mel ammiscere. Edat etiam brassicam coctam **D**
 cum ruta & mercuriali. & semen aliquod vtero commodum
 bibat. Si verò puerperij purgamenta in grumos fuerint coa-
 cta, & dolor in imo ventre fiat, porrum coctum, & quæcunq;
 sylvestria ac hortensia olera dato, verum omnia pingua fa-
 cito: & per tertium quenq; diem sub clementi cælo lauetur.
 Frigus enim his inimicum est. & post balneū inungere me-
 lius est, & non multa calida vti. Quum secunda non statim
 exierit post partum, imi ventris dolores fiunt, in laterū mol-
 litudine, & rigores ac febres. Et si discesserit secūda, sanatur
 etiam mulier. Sape verò putrescit, & discedit sexta aut septi-
 ma die, aut etiam prius. Huic autem dare oportet pharmaca
 quæ ego describam, & spiritum continere iubere. Omnium **E**
 verò optimum noui artemisiā herbam, & dictamnū, & vio-
 læ albæ florem. Et silphij succus optimus est fabæ græcæ ma-
 gnitudine in aqua potus. Et si secūdas excludere nō poterit,
 a cibo abstineat. Et postea viticis folia trita in vino & melle
 oleo affuso tepefacito, & heminx mensuram bibēdam dato.
 & exhibunt. Si mulieri secunda in vteris relicta fuerit, hoc
 si contingit. Si per vim ruptus fuerit vmbilicus, aut ab obste-
 trice vmbilico seca per imperitiā resectus, quæ videlicet vmbi-
 licum pueri prius incidit, antequā secunda ex vteris exiisset.
 & vteri sursum retrahunt secundam, utpote lubricam &
 diffusam, & in seipsis detinet. Nam secunda ex vmbilico pue-
 ri hæret. & vmbilicus postremus ex vteris exit. Si enim prior
 exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentū, quoniam **F**
 ex ipso depender. Quum in ventre habens fœtum corru-
 perit, menstruum, aut bimestrem, & secundæ exire nō pote-
 rint, fuerit autem tenuis: huius corpus tunc purgare oportet
 ac pinguefacere. Non enim prius exeunt fœtus putrefacti,
 nisi fortes fuerint vteri, & probe compacti. Si mulieri secū-
 da relicta fuerit, si non ampli fuerint vteri, purgatio ipsi mi-
 nus quā oportet procedit, & venter durus fit ac magnus. Et
 frigus detinet, & febris acuta, & dolor per totum corpus, &
 ventris maxime partem eam quæ est infra vmbilicū: & gra-
 uitas fit in vteris, et tormen, velut fœtus insit. Et curata secū-
 dam breui eiicit putrefactam, et sana euadit. Si ex partu
 vterus ulceratus fuerit, rosarum floribus curato. Sed et acer-
 bis infulis colluatur. Si verò os eius ulceratū fuerit ac inflam-
 matum,

*Cum secūda
remanet.*

*Cum par-
tus minor
non exit.*

*Cum secun-
da non exit*

*Cum post
partum ute-
rus ulcerat-
ur.*

A matum, myrrham, & adipem anserinum, & ceram albam, & thus, pilis leporinis subvêtre enatis misceto, & simul trita in lana apponito. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest. Ex ventre verò nunquā deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & venter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur. Secessus autē est malus & olidus. & calor vehemēs corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & ventris stomachus non potest trahere cibos ac potus, & cōcoquere nequit. & nisi curentur statim, plurimæ moriūtur. Venter autē est in caussa. Sambuci igitur folia tenerrima, in crassiore tritici recentis farina cocta, leuiter tepida sorbeat. Dato & aquam mulsam, & vinum aquosum. Et

B pectinem cataplasmatiss frigefactorijs integito. Cibū autem quā minimum edat, & venter sistatur, & caput curetur. precordijs verò & vterorū loco, cataplasmata adhibeto. *Quum* doluerit sedem, aut aliud quid, iuniperi baccas, aut apij & vrticæ semen terito, ac bibendum dato. Si ex partu doleat, resinam terebinthinam, & mel, & vinum tepidum, sorbēda dato. Et si inflammati fuerint vteri, inde sedantur. Si verò nō doleat vterorum locum, amygdalas amaras tritas, & olea folia tenera, & anisum, & irionem, & origanū, & nitrum. Hæc misceto, terito & vterorum collyria efformato. Si verò inflāmati fuerint, & dolor habuerit, rosarum folia, cinamomū, & cassiam simul terito, & netopo affuso, placētulas ac pastillos drachmales formato, easq; in ollam nouā fictilem igne candētem mittito, circumlocataque muliere ac vestibus contecta, in vteros suffito. Hoc dolores sedat. Si verò ex partu vteri doluerint, calor debilis habet. verūm venter imus intus igne ardet, & ad coxendicem aliquando intumescit: & dolor habet imum ventrem, & laterum mollitudinem. Et secessus biliosi sunt, & graueolentes. & si non sistatur venter, derepētē moritur. *Quum* igitur sic habuerint, ventrē frigefacere oportet, cauendo ne horrescat. Bibat autem si non sistatur, aquam de crassiore tritici farina in ipsa macerata, & panis farinam edat. Sorbeat autem mali punici vinosi succum aqua dilutū, farina lentium inspersa. Et hoc coquito, misce lentē, & cuminum, & salem, & oleum, & acetum, atq; hanc sorbitionem frigidam exhibeto. Lēticulam item acidam dato, & vinum vinosum pramnium insuper sorbēdum. Ab alijs autē

*Medela
quæ.*

*Quæ sedes
post partū
dolisat.*

*Medela ute
rorum inflā
matorum.*

*Quum post
parium ute
ri dolent.*

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER. I.

cibis abstinere oportet donec febris solvatur. Si verò visum fuerit, etiam lauetur. Si verò debilis fuerit, potentiam bibendam dato. Et si imbecillior sit, ex aqua frigida. Cibum autē exhibeto leuem, qui nō euacuet, vbi calor remiserit. Morbus

Quum inflammatur. hic acutus est & lethalis. Si inflammati fuerint puerperæ vteri, venter ardet, & magnus fit: & ad præcordia suffocatio habet. Quum sic habuerit, muscum marinum quem super pisces iniiciunt, pro cataplasmate adhibeto. Verum in mortario misceto ac tundito, crudam ordeaceam farinam, & cinerem sarmentitium, & lini semen tostum, & hæc oleo, & aceto subigito, & velut cyceonē crassum facito, deinde coquito

Quæ puerperia leuētur. donec velut farinæ subactæ massa fiat, atq; ita quā calidissima imposito: & si opus fuerit, etiā insidere facito. Si puerperæ inflammati fuerint vteri, intumescunt. & vbi puerperij purgamenta intus manserint, occultè distenduntur: distenduntur autem vbi cōdensati fuerint à frigore. His si quidem perfrigerentur, calefacere conducit. Si verò inflammati fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subdititium facere quod inflammationi aduersatur. & simul lauare, ac fouere, & pharmaca adhibere, quæ ego describam, & vaporem in os ac nares attrahere. Si verò suffocet, lentes in aceto, & sale, & origano multo coquere, & attractionem facere. Et mercuriale edat, & in succo eius tenuem farinam sorbeat: & quā eelerimē ac prius quā dolor corripit, pharmaca dato quæ vterorum dolores sedant: & cibos per aluum secedētes assumat.

Quæ strangulatio tollatur. & si vter sit inflammatus, clistere adhibito quā citissime subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, flatus in vteris fiunt, & menses procedūt pauciores, albi, pituitosi. Quādoq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense comparet: & præ humiditate cum viro commisceri non vult, neque libidine ad hoc faciendum concitatur: & tenuis fit. Dolet autem imum ventrem, et lumbos et inguina: et si mordeat id quod effluit, et exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem diuturnam fore pronuntiatio. Et si nō multa fuerit fluxio, lenticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. Deinde in nares infundito: et pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si verò grauetur, et frigeat, et torpedo habeat, lac præbeto, et vinum odorat

Quæ uteri pituita impletur. & si vter sit inflammatus, clistere adhibito quā citissime subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, flatus in vteris fiunt, & menses procedūt pauciores, albi, pituitosi. Quādoq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense comparet: & præ humiditate cum viro commisceri non vult, neque libidine ad hoc faciendum concitatur: & tenuis fit. Dolet autem imum ventrem, et lumbos et inguina: et si mordeat id quod effluit, et exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem diuturnam fore pronuntiatio. Et si nō multa fuerit fluxio, lenticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. Deinde in nares infundito: et pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si verò grauetur, et frigeat, et torpedo habeat, lac præbeto, et vinum odorat

Profluij longi signa. & si vter sit inflammatus, clistere adhibito quā citissime subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, flatus in vteris fiunt, & menses procedūt pauciores, albi, pituitosi. Quādoq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense comparet: & præ humiditate cum viro commisceri non vult, neque libidine ad hoc faciendum concitatur: & tenuis fit. Dolet autem imum ventrem, et lumbos et inguina: et si mordeat id quod effluit, et exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem diuturnam fore pronuntiatio. Et si nō multa fuerit fluxio, lenticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. Deinde in nares infundito: et pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si verò grauetur, et frigeat, et torpedo habeat, lac præbeto, et vinum odorat

Medela uterum uterum. & si vter sit inflammatus, clistere adhibito quā citissime subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, flatus in vteris fiunt, & menses procedūt pauciores, albi, pituitosi. Quādoq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense comparet: & præ humiditate cum viro commisceri non vult, neque libidine ad hoc faciendum concitatur: & tenuis fit. Dolet autem imum ventrem, et lumbos et inguina: et si mordeat id quod effluit, et exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem diuturnam fore pronuntiatio. Et si nō multa fuerit fluxio, lenticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. Deinde in nares infundito: et pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si verò grauetur, et frigeat, et torpedo habeat, lac præbeto, et vinum odorat

A odoratum. Bibat autē ieiuna hypericū, apij semen, saluiam, in vino odorato aquoso, & vteros medicamento ex vini facce colluat, & si vlcerati fuerint, interpositis diebus duobus aut tribus, pharmaco ex grano cnidio eluat, & postea cum acerbis lauet, myrti ac lauri decocto, & medicamento ex flore argēti illinat. Morbus autem est grauis & paucæ effugiunt.

Si verò acetabula pituita plena fuerint, menses fiunt pauciores, & si in ventre habuerit, corrumpit vbi factus fortior factus fuerit, Non enim corroboratur, sed defluit. Cognoueris autem hinc. Humida fit, & quòd defluit mucosum & viscosum velut à ventre defertur, & non mordet, & in mensibus postquam sanguine purgari desierit, per duos aut tres

Cum acetabula uulue pituita plena sunt.

B dies, muci ex vteris prodeunt, & horror tener, & calor non acutus, verum non deficit. Hanc succo grossorum colluito, à quibus omnis aqua purgatur, & hoc iterū atq; iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cætero acerbis vtatur. Apponat autem mollia, à quibus pituita purgatur, & foueat vteros medicamento ex lauro, & colluat pharmaco ex aceto, & aromatis suffitum faciat, postquam menses cessarint, postea verò à cibis & balneis abstinere oportet. Coeat autem cum viro, & cibos ac vinum parcè sumat, & calidè degat, & regumenta cruribus circūdet, & oleo illinat. Si aqua intercus in vteris nascatur, menses pauciores & prauī fiunt, & ante tempus deficiunt, & imus venter intumescit, & mammarū solidæ, molles fiunt, & lac malum. Et putat se in ventre habere, &

Medela.

Aqua intercus uteri.

C ex his cognosces quòd aqua intercus est. Sed & in vterorum osculo significationem de se præbet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet, & rigor ac febris corripit. Quanto verò magis tempus processerit, tanto magis dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex alijs causis, & quum menses fuerint occultati. Hanc multa calida lauare oportet, & tepesfactoria adhibere si dolor habuerit, Postquā autem sedatus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & vteros medicamento ex bubulo stercore fouere. Deinde id quod ex cantharide paratur apponere, & biduum aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, ne-
topo colluere, & si venter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundum rationem prodeant cum viro dormiat, &

Medela huius quæ.

HIPPOCRATIS. LIBER I.

in medicamentis subdititijs perseueret, & interposita die D
crethmi corticem bibat, & prœoniæ grana nigra quinque, &
sambuci fructum in vino ieiuna. Et mercurialem quàm plu-
rimam edat, & allium crudum ac coctum, & mollibus ad som-
num vtatur, & multa portione, & alijs mollibus, & obsonijs
marinis potius quàm carnibus, & si peperit, sana euadit.

*Hydrops
uulvæ.*

Si hydrops in vteris fiat, menses pauciores fiunt ac dete-
riores, & per longius tempus, & pauciores quàm oportet,
aut paulò plures, & venter intumescit, & locus supra pecti-
nem, & tibiæ, & lumbi. Vbi verò multum temporis proces-
serit, & in ventre habuerit, corrumpit ac eijcit, & aqua cum
ipso foetu effunditur, & mulier plerunque moritur. Sanguis

Medela.

autem corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum E
dato, & peplum album potandum, donec foetus moueri po-
terit. Quin & antè hoc ut plurimum foetus corrumpitur, &
per abortum eijcitur, & vteri sanguine & aqua manant. Hæc
autem patitur nihilo magis ex labore, quàm aliter. Cogno-
scere verò poteris quòd hydrops est, ex digiti contactu. De-
prehendes enim osculum ipsorum gracile & plenum humi-
ditate. Si verò foetus in ipsa non circa initia, sed iam bime-
stris corrumpitur ac suffocatur, tunc & venter imus intume-
scit, & ad contactum dolet, velut vlcere præsentè, & febris
magna ipsam ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus
& vehemens pudenda, & imum ventrem, & lumbos, & la-
terum mollitudinem, & coxas. Quum sic habuerit, calida
ipsam lauato, & si dolor habuerit, tepesfactoria adhibeto, ex-
perimento facto de eo quòd maximè admittat, & pharma-
cum deorsum purgans bibendum dato. Intermissione verò
facta per tempus quantum tibi satis esse videbitur, & collui-
ro, & foueto, & cyclaminum melle subactum, ac linteo ex-
ceptum, ad os vterorum apponito. Et cupressi ramenta in
aqua madefacta, eodem modo apponito. Verùm hæc breuiore
tempore, & per longius temporis interuallum, quàm ma-
gis mordent & lancinant. Et specillum stanneum paratum
immittito, & digitum eodem modo. Portiones quoq; biben-
das dato, quasq; maximè libenter admiserit, & cum viro
dormiat, maximè opportuno tempore præsentè. Si enim ge-
nituram cõceperit, & prægnâs facta fuerit, ac pepererit, sub-
purgantur, & ea quæ prius in ipsa fuerunt, vnâ cū ipsis puer-
perij

- A** perij purgamentis subeuntia. Atque sic maximè sana fieri poterit. Si mulier aqua intercute laborarit, splene ipsius magno & aquoso existente Fit autem splen aquosus ab hac affectione, quum febris habuerit, & nō dimiserit hominē, & sitis ipsum corripuerit fortis, & biberit, ac nō reuomuerit. Nā quod in vesicam penetrat, per urinam eijcitur. Reliquum verò splen capit, abstrahens à ventre ad seipsum, vt qui rarus est & spongiformis, & secundum ventrem situs. Et si his sic habentibus non exudari, neque alius laxetur, ab hoc splen attollitur, & hoc magis si aqua fuerit potus. & si quis ipsum cōtingat, mollis est velut mollissima pluma siue lana: quandoque verò etiam renititur. Eleuatus autem & impletus, distribuit per venas corpori, & maximè in omentum, & locos circa ventrem, & crura. Altera enim pars ad alteram delegat in corpore, vbi singulis plus quàm oportet effluerit, & cōtinere non poterint. Succedit autem ex hoc semper hydrops, vbi splen ad seipsum trahere cōsueuerit, quum natura rarus sit ac mollis. Quibusdā verò hoc morbi principium fit sine febre, si calor quidē in ventre constiterit, velut pituita in ipsum colapsa. & si homo sitim non continuerit, neq; vesica, neq; venter, urinam & stercus iusto modo excolarint: neque commoda diæta homo vtatur. Si verò hydropica fuerit, prodeūt menses multi derepente quandoque verò pauci. Et fiunt aliquando velut aqua à carnibus, sicut si quis cruentas carnes abluisset: aliquando vero paulo spissiores, & nō congelantur. & anhelatio ipsam corripit priusquā menses prodeūt. & dolor in splene, & magis si quid dulce ederit. et venter attollitur ac magnus fit. Et vbi plura quàm solita est ederit, dolet vētrem, et lumbos aliàs atq; aliàs dolor vexat. et febris ipsam paulatim corripit. postquam autem depurgata fuerit, meliùs sibi habere videtur superiorū respectu. postea ad idem relabitur. et si curetur velut cōuenit, sana euadet. Sin minus, et fluxus comparet, et per omne tempus semper fluat paulatim velut serosa sanies, et ampliore curatione opus habet. Si verò fluxus non succedat, sed vteri à prioribus menses nō laxarint: tunc et venter ipsi magnus erit, et grauitas intus erit, velut in vētre habenti. et velut puer in ventre ipsius moueri videbitur, nimirum dum vteri aqua pleni sunt, et aqua mouetur. Aliàs enim atque aliàs fluctuat in ipsis aqua, velut in ventre pars

Causa hydropis in femina.

Licentis natura.

Hydropis des mulier que patitur.

Signa huius mali.

HIPPOCRATIS LIBER I.

infra umbilicum ad contactum dolet. & clauiculę, & thorax, D
& facies, & oculi attenuantur. & mammae attolluntur. Qui-
busdam verò & venter, & crura aqua implentur. Quibusdam
autem alterum horum. & si quidē ambo impleta fuerint, nul-
la spes est de hominis vita. Si verò etiam alterum horum,
modica spes est si curetur, & non valde fuerit attenuata. Diu-
turnus est autem hic morbus. Et fiunt omnia magis his quę
non pepererunt, fiunt autem sepe etiam his quę pepererunt.
Periculosa verò sunt velut dictum est, & plerunq; acuta & ma-
gna, & intellectu difficilia, eo q̃ mulieres participant mor-
bis, & aliquando neq; ipsę sciunt quòd ægrotant, priusquam
morbos experiantur à mentibus, & seniores factę fuerint. Tūc
autem & necessitas, & tempus, ipsas morborū causam docet. E
& quandoque non cognoscentibus ex quo morbo ægrotent,
morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur rectē medicus
ab ægrotante ex quo morbo ægrotet. Verentur enim nar-
rare, etiam si sciant: & præ imperitia ac ignorantia, turpe si-
bi id esse putant. Sed & medici simul peccant non exactē
causam morbi percunctantes, sed velut viriles morbos sa-
nantes. & multas noui iam ab huiusmodi affectionibus cor-
ruptas. Quare statim causam exactē interrogare oportet.
Multum enim differt muliebrium morborū ac virilium cu-
ratio. Si vteri fuerint vlcerati, sanguis & pus purgatur, &
fœtor grauis oboritur: & dolor acutus corripit lumbos, &
inguina, & in imum ventrem. & dolor sursum procedit ad
laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas. Ali-
quando etiam ad clauiculas peruenit. & mordetur, & ca-
put vehementer dolet, & delirat. Progressu verò temporis
tota intumescit. & debilitas ipsam corripit, & animi deli-
quium, & febris tenuis, & perfrigeratio. Intumescunt autem
maximè crura. Morbus autem corripit ex abortu, si qua cor-
rupto ac putrefacto intus puero, non fuerit expurgata. & ca-
lor totum corpus tenet. Corripit etiam ex fluxibus, & si in
ipsis acria fuerint, & biliosa mordeant. Si in hoc modo ha-
bentem incideris, vbi quidem dolores habuerint, multa
calida lauato. & tepesfactoria adhibeto qua parte fuerit do-
lor. & si quidem supernè fuerint dolores, et mulier fortis
est, totam fomentato. et pharmacum deorsum purgans biben-
dum dato. et vbi tempus anni fuerit, serum coctum insuper
bibend

*Languen-
tis & medi-
ci error.*

*Vterorum
ulceratorū
signa.*

*Morbi
caussa.*

Medela.

A bibendum præbeto, per dies quinque, si id facere poterit. Si verò non fuerit serum, lac asininum coquito, & per dies tres aut quatuor bibendum dato. Post lactis autem potum, cum aquis ipsam reficito, & cum cibis commodis, carnibus ouillis teneris recentibus, & volucrum: & beta, & cucurbita. Abstineat autè à salis & acris, & marinis omnibus. Et à carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis. Edat autè panes. Si verò animi deliquia teneant, & non valida sit, & perfrigeretur, sorbitionem accipiat. Sunt autem quidam qui his caput dolentibus lac bibendum præbent, quia caput dolent. Alij aquam, quia animo linquantur. Ego verò vice versa, si caput dolent, & mēte percellantur, aquam commodam puto.

B Quū autem mordentur, & acria sunt quæ pungunt, lac his lenitatem inducit. Vbi verò tibi valida esse videbitur, vteros colluito. primū medicamento ex vini fece postea interpositis diebus tribus aut quatuor, eo quod cum brassicæ decocto tepido paratur. Et rursus intermissis diebus tribus eo quod cum butyro paratur eluito. Et si vbi hæc feceris sanescāt vteri, eo quod cum malicorio paratur colluito. Super vlcera verò argenti florem, & gallam, & myrrham, & thus, & spinæ Aegyptiæ fructum, & cōnanthen sylvestrem, & chrysocollā, et squamā æris, & loti ramenta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illinito. Horū singulorum vna aqualis sit portio. Alumen verò & gallam, & crocum, vna omnium portione sumito. Hæc omnia trita ac permixta in vino albo dulci diluito, deinde coquito donec mellis crassitudo fiat, & dato vt cum hoc pharmaco bis in die vlcera inungat, vbi aqua tepida prius lauit. Coquantur autem in aqua, & hederā, & saluia. Et vbi tibi hæc facienti melius habere visa fuerit, lac caprinum coctum præbibendum vna die dato. Postea verò lac bubulum præbeto eodē modo velut in prioribus. post lactis autem potum, per cibos quā maximè crassifacito, & vt in ventre habeat facito. Sana enim fiet. Plerunque vero ex hoc morbo euadunt, & steriles fiunt. Sentioribus autem non valde quid horum accidit. postea verò bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactum, et sesamum, et vrticæ semen, et pæoniæ radix amara, hæc in vino nigro odorato trita bibat. Si vteri ulcerati fuerint, et sanguis, et pus, et serosa fanies fluit: putrescentibus enim vteris, morbus ab ipsis fit, et

Que reficiant.

Quid capitis dolorem sedet.

Signa uterorum ulceratorum.

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Morbi cau-
sa.
Medela.*

venter imus eleuatur, & attenuatur, & ad contactum dolet, D
 velut vlcere præsente, Et febris ac fremitus ipsam occupat,
 & dolor acutus ac vehemens inuadit pudenda, & pubem, &
 imum ventrem, & lateris mollitudinem, & lumbos. Mor-
 bus autem maximè corripit ex partu, si quid in ipsis diuul-
 sum computruerit. Itemque ex abortu, & aliàs sua sponte. In
 has si incideris, aqua multa calida lauato, & qua parte dolor
 habuerit, tepesfactoria adhibeto & spongiam ex aqua calida
 expressam, & colluito acribus & acerbis vitatis, mollioribus
 verò ammixtis, prout tibi tempestiuum esse videbitur, & li-
 ni semen ac sambuci fructū tundito, & ammixto melle phar-
 macum facito, atque hoc vtor. calida verò aqua lauato. Et
 acceptam spongiam, aut mollem lanam, in aqua calida tin- E
 gito, & pudenda ac vlcera expurgato. Deinde in vino mera-
 co, rursus spongiam aut lanam tingens, eodem modo vttere.
 Et postea pharmaco hoc inunge, quoties tibi tempestiuum
 esse visum fuerit. Postea resina & adipe suillo mixtis simul
 illinito sæpe interdium ac noctu. postea verò lini semen torre-
 to, tundito, ac cribrato: & peplum album in polenta tundito
 ac cribrato: & caseum caprinum affato, & sordes ac falsugi-
 nem deradito, & piuguitudinem eius, & polentæ pollinem
 ammisceto. Sit autem vna pharmaci mensura, & casei, &
 polentæ. Hæc bibenda dato mane ieiunæ, in vino austero
 diluto. Ad vesperam autem misceto, & crassum cyceonem
 præbeto, & quicquid muliercula maximè libenter admiserit
 bibendum dato. Et donec quidem sanguis multus fluxerit, F
 & dolores acuti habuerint, & modico tempore intermi-
 ferint, hæc facito. Postquam autem vlcus minus fue-
 rit, & dolores debiles apprehenderint, & per longius tem-
 pus, pharmaca bibenda dato à quibus purgetur deorsum ma-
 gis quàm sursum, & intermissio tempore quantum opportu-
 num esse visum fuerit, lenibus fomentis foueto, muliere in
 alto collocata, prout tempestiuum esse videbitur. Hæc si fe-
 cerit, sana euadet. Morbus autem est lenior & lethalis, & pau-
 cæ ipsum effugiunt. Si verò vehementer exulcerati fue-
 rint, sanguis & pus purgatur, & odor fit grauis. Et quum do-
 lor apprehēderit, velut à partus dolore fiunt ea quæ circa flu-
 xum contingere solēt. Et quum tempus affuerit, crura & pe-
 des intumescunt. Et curant medici hunc morbum velut hy-
 dropem

*Cum ualde
ulcerati fue-
rint uteri.*

A dropem, verum hic talis non est. Hanc si curandam acceperis, primum calida lauato, & calefacito. Et acribus ac molli-
bus & acerbis, & aqua et vino colluito. Et polycarpon, et pol-
yncnemon, ac mel simul coquito, deinde lanam in his tingi-
to, et pudenda illinito. Et resinam, ac mel, et pinguedinem
suillam illinito. Et bibendum dato semen lini ac sesamum
torrefactum, et butyrum, et caseum caprinum, et polentam
in omnibus. Bibat autem in vino ieiuna. Ad vesperam verò
plurimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purge-
tur, et dolores acuti habuerint, et modico tempore intermise-
rint, hoc facito. Quum autē ipsi minus prodierit, et dolores
debiliores per longius tempus tenuerint, pharmacum deor-
sum purgans bibendū dato, ac finito. Hæc si fecerit, sana eua-
det. Sobolis autem spes non adest. Quæcunque vlcera-
tiones in vteris fiunt, ex abortu, aut alia quadam causa, eas om-
nes respectu ad totum corpus factu curare oportet, quacunq;
curatione opus habere visæ fuerint, siue ex vniuerso corpore
hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis vteris.
Cognosces autem an ab ipsis vteris sint, hoc modo. Quæ e-
nim vlcera-
tiones ab ipsis vteris sunt, purgationem exhibent
purulentam et compactam: quæ verò non ab ipsis, tenuem et
saniosam. Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharma-
co eas curare oportet, et dare quod et sursum, et deorsum pur-
get. Primum autem sursum. Et si quidem post pharmaci po-
tionem, fluxiones pauciores fiunt ac faciliores, intermissio-
ne facta rursus eodem modo medicari oportet. Post pharma-
ci verò potionem, talem victum præscribito, ex quo homo
ipsa quam siccissima fiat. Id autē continget, si toti ipsius cor-
pori, per tertiam aut quartam diem, fomentum adhibueris,
et à fomentis statim vomitus feceris. post vomitus autem et
fomenta, diætam constituito ex illuue, et aquæ potu, et pa-
nis cibo, nullo vero obsonio, quam vino nigro meraco. Nul-
lo item olere. Quum verò vomitum præparas, multis et a-
cribus oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, multis
etiam cibus, et obsonio quodcunque voluerit. Et ut impleas
ipsam multo vino aquoso, et ut à fomentis ipsam laues mul-
ta calida. Atq; hæc quidam curatio est huiusmodi fluxionū.
Melius tamen est ut vtrasque pharmacis cures, et vomitum
procures, et sursum trahas. Diætæ verò siccatoria melior est.

Medicina
post dolores 180
388

Causa ulce-
rum.

Cognitio.

Nutricatio
post pouo-
nes.

Qui uomi-
uo promoue-
ur.

HIPPOCRATIS LIBER I.

Smegma.

& illuies. Caterum vteros hoc modo curare oportet. Pri- D
mum quidem fouere sambuci folijs in aqua coctis. Deinde
post fomētum, sinegmate ex vini fece colluere. Et si quidem
putredo in vlceribus fuerit, & quæ exeunt graueolentia,
sinegmate meraciore. Si verò nihil tale, aquosiore. post fe-
cem autem, cum aqua in qua cocta est myrtus & saluia. Post-
ea verò cum vino colluere, meraco, albo, tepido. Quum au-
tem mordetur iam à collutionibus, tunc iam pura sunt vlce-
ra. colluere igitur oportet fece aquosiore, & vino nigro. post
vinum verò, adipē suillum recentem liquato, & pinguedi-
nem anseris si affuerit, sin minus, aliam, maximè gallina-
ceam, aut ex volucrum gente. Si vero neq; hæc adsit, oleum
vetus ex oliuis ammisceto, atque hoc tepido colluito postvi- E
num, per alium clysterem in os vteri infuso. Et si fuerit vlce-
ratū, linamenta ex mollitorijs facta apponito. Et si hæc sub-
dita ardorem induxerint, his ademptis mulierem aqua tepi-
da lauari iubeto: tali quali colluebatur. Si verò ad hanc diæ-
tam fluxiones non discedant, pauciores tamen fiant, & ve-
hementer mordeant, & ea quæ effluunt bilis fuerint ac falfu
go: & non solum internas partes, sed etiam externas exulce-
rent, diætam transmutare oportet, & totam humectare, quo
fluxiones quàm aquosissimæ fiant, & minimè mordaces, bal-
neis multis calidis, maza, oleribus coctis omnibus pingui-
bus piscibus carthilagineis, cum cepis & coriandro, in muria
dulci coctis: coquantur autem pingui modo: carnibus coctis F
omnibus, excepta bubula & caprina: His enim percoctis cum
anetho & fœniculo: vino mellei coloris, fuluo, aquoso, vbe-
riore lactis potu cum vino dulci. Reliqua verò de collutio-
nibus iuxta relatum modum facito. Atque hæc quidem est
eiusmodi fluxionum curatio. Quum verò purulenta & com-
pacta exierint, harum quidem totum corpus non mouere o-
portet. Verum colluere, & per collutiones totam curationē
facere. Colluere autem oportet cum iisdē infusis, quæ prius
dicta sunt eodem modo. Conscribentur tamen etiam aliæ
collutiones. Vlcenum curatio. Ceruinum adipem recen-
tem ac viridem subdito. Omnia verò statim vino sirzo: siue
sapa colluere oportet. Optimum autem est cerussa, si vlcera
fuerint, & oleo narcissino. Cibis autem mollissimis vtatur,
non acribus. Si verò sordida fuerint, & proserpant, ac proxi-
mum

Medela.

Cibus.

A mum locum mordeant, purgato, & nouam carnem produci-
to, & carnem ad cicatricem perducito. facile enim resoluun-
tur, & maligna fiunt. & frequēter lauato. Si verò mulier
ex abortu vulnus accipiat, aut ex medicamentis subdititijs
vteros exulceretur: Qualia multa semper mulieres faciūt ac
medicando excitant, & fœtus corruptus fuerit, & mulier non
purgetur, sed vteri inflammati fuerint vehemēter ac cōclu-
si, & purgationem emittere nō poterint, nisi primū emittant
sanguinem qui est in fœtu. hæc si quidem curetur, breui sana
euadet, verū sterilis. Si verò puerperij purgamenta ipsi sua
sponte eruperint, & vlcera sanata fuerint, etiā sic sterilis erit.
Si verò purgatio quidem ipsi fiat, vlcera autem nō purgētur,
periculum est ea putredinosa esse. Si verò purgatio prodierit
ipsi iam afflicta ac extenuata, moritur. **Quin** & si in partu
vteri valde fuerint exulcerati, fœtu non secundum naturam
exeunte, eadem patientur quæ patitur ea quæ ex corruptione
fœtus vteros ulceratos habet. Et transmutationes ac fines eor-
dem morbus habet, siue ex fœtus corruptione: siue ex partu
vteri fuerint ulcerati. & si puerperij purgamenta omnia pro-
dierint, minus dolebit, nisi magna vlcera fuerint. Et si cure-
tur, breui sanescit. Oportet autem curam cito adhibere, si vl-
cera in vtero fuerint. Nam vt quæ in tenero loco sunt, cito
augescunt, & breui putrescunt. Curare verò oportet vlcera,
velut etiam ea quæ in reliquo corpore sunt, Nimirum vt in-
flammationem arceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricē
perducas. Danda est autem aqua in potum, vinum minimē.
Cibos item paucos, ac minimē multos exhibeto. Quicunq;
abortus facti discedere non possunt, dum aut toti, aut partes
fœtum sunt maiores, aut minores & obliqui ac impotētes,
tales siquidem secundum naturam siti fuerint, pharmaco ali-
quo dato ex his quæ ego referam expellito, vbi multa calida
prælaueris. Et si prodire volentes, non facile exeant, quum si-
ti sint secundum naturam, talibus sternutatorium ad moue-
ro. Apprehendito autem nasum, & os comprimito, ac sic ster-
nuter, quo sternutatio quàm maximē efficax sit. Vtatur item
concussionibus. Sic autem cōcussionem facito. Lectum altum
robustum ac instratum sumito, & mulierem supinam reclina-
to. pectus verò & axillas ac manus, fascia aut molli lato loro
ad lectum alligato ac cingito, & crura incuruato, & mal-
leolis

*Cum uteri
partu vel
abortu ulce-
rantur.*

Curatio.

HIPPOCRATIS LIBER I.

leolis apprehensam detineto. Quū autē sic disposueris, sar-
mentorū molliū fascem, aut aliquid huic simile parato, tātū
quantus sufficit, ut lectū nō negligat excipiendo ipsum, dum
in terrā proijcitur, quo nō pedibus iuxta caput, terrā contin-
gat. Postea verō ipsam manibus lectū apprehēdere iubeto, et
lectū ad caput sublimem habere, ut declius sit in pedes, ani-
maduersione habita ne p̄nua sit homo ipsa. vbi vero hæc fa-
cta fuerint, et lectus sublimis fuerit, retro sarmēta supponito
maximē autē dirigito, quo pedes terrā non contingant dum
lectus proijcitur, et ut sint intra sarmenta. Eleuent autē duo
viri ex utroq; pede hinc atq; illinc, quo in directū lectus ca-
dat, planē ac æqualiter, et cōuulsione fiat. Concutiendum est
autē maximē vna cū partus dolore. Et si quidē discedant, sta-
tim quiescendū. Sin minus, interstitio factō rursus cōcurito,
et in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atq; hæc quidē sic
facienda sunt, vbi rectē et secundū naturam discedant. Opor-
tet autem cerato liquīdo præillinare, quod in omnibus hu-
iusmodi circa vterū affectionibns optimū est: et maluæ aquā
affundere, et fœnigræci, aut potius ptisanæ triticeæ succum.
Oportet autem vsq; ad inguina, sedem et pudendum fouere,
et insidere, vbi partus dolores maximē infestarint, et nihil a-
liud mēte versare. eā verō quæ medicatur, oscula mollibus a-
perire oportet, et leniter hoc facere. Umbilicū verō vnā cum
fœtu attrahere. Quicunq; verō duplicati cōplicantur, et in
osculo vterorū incumbunt, eos siue viui fuerint, siue mortui,
rursus retro p̄trufos vertere oportet, quo secundū naturā in
caput exeant. Quum autē retrudere voles aut vertere, supine
ipsi reclinatæ molle quiddā sub coxas substernere, oportet, et
sub lecti pedes, quo altiores sint hi à pedibus, semper aliquid
supponere. Sed et coxæ altiores capite sint, et ut nullū cerui-
cal sub capite sit prouidero. Quum verō retrusus fuerit fœtus
et hinc atq; illinc obuoluitur, ut secundum naturā constitua-
tur, et quicquid sub lecti pedes supposuisti ac lapides, et quic-
quid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti verō puluinar
subijcito. Atque talia hoc modo curato. Quicunque verō
fœtus vini, manū aut crus foras præmittunt, aut etiā ambo:
eas oportet quā celerrimē vbi exitum significarint, prædicto
modo intro retrudere, et ī caput vertere, et ad viā reducere.
Et quicūq; fœtus cōplicatur, ad lateris mollitudinē, aut coxā
in par

Quum par-
tus non rite
prodeunt.
quid agen-
dum.

Cum par-
tus uiuus
manum uel
crus emit-
tit, et cum
mortuus,
quid agas.

A in partu collapsi, eos dirigere ac vertere oportet, & in aquam calidā desidere facere, donec mulier refocilletur. Quicumq; verò foetus mortui, aut crus, aut manū, foras protendunt, eos optimū quidē fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas has partes in caput vertere. Si verò hoc fieri non poterit, verū intumescit, secare hoc modo. Dissectū per scalpellū caput, cū cōtutorio instrumēto, vt ne in ramēta findatur cōtundito, & ossa per osiū volsellā, aut tractoriū instrumētū, iuxta caluiculā immissum, prout habuerint extrahito, non multis simul, sed paulatim exēptis, ac rursus ablatis. Quū verò hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris, ambas manus in articulis cū ipsis humeris secato. Et vbi hæc extraxeris, si quidem fieri poterit vt exeāt, etiā reliqua facilē extrahito. Si verò nō obediāt, totū pectus vsq; ad iugulū findito. Verū caueo ne in ventrem seces, & aliquid de intestino denudes. Exit enim vēter, & intestina, & stercus. Si verò horū quid excidar, maioris negotij iam res fit. Cōtundito autē costas, & scapulas contrahito. Et facilē postea reliquum foetus procedet, nisi iam vētrē tumidū habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est vētrē foetus leniter perforare. Flatus enim solū à ventre exit, & sic facilē prodibit. Si verò exciderit manus, aut crus, immortui foetus, si quidē fieri poterit, ambas partes retrudito, & foetū rite dirigitō. Hoc enim optimū fuerit. Si verò fieri nō poterit vt hoc facias, quicquid sanē foris fuerit quātum potes penitissime resecato, & reliquū profunditate intus explorata protrudito, & foetū in caput vertito. Quū autē vertere ac secare puerū voles, vngues de manibus tuis resecato. Scalpellū verò quo dissecas, incuruū potius sit quā rectū, & huius caput occultato per indicē digitū, eodemq; interna explorato ac deducito, ita vt caueas ne vterū cōtingas. Ceterū molæ cōceptus hæc caussa est. Quū multi mēses, modicū & morbosum semen cōceperint, neq; cōceptus rectus sit, & vēter plenus est velut prægñatis. Nihil autē in vētre mouetur, neq; lac in māmīs generatur. Mammæ autē turgidæ sunt. Hęc igitur ad duos annos, sæpe etiā tres, sic habet, & si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest vt superstes maneat. Si verò plures, erūpit ipsi per pudēdū sanguis carnosus plurimus, & si hoc moderate fiat, seruetur. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidē talis est. Iudicare verò oportet

ex

HIPPOCRATIS LIBER I.

Partus quo ex plenitudinis mole, & quòd in vètre nō mouetur. Nā mas **D**
tus in utero trimestris, fœmina quadrimestris motū habet. Postquā igitur
moueat. tur tēpore hoc prætergresso nō mouetur, nimirū hic morbus

Curatio
mola.

est, est autē hoc magnū signū, quòd lac in māmīs nō genera-
tur. Hāc igitur maximē quidē ne curato. Ant certē cū prædi-
ctione. Et primū quidē totū corpus foueto. Deinde per sedem
clysterē adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim
quod cōpactū est cōmoueris, id quod fœtus esse putatur, mu-
liere à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo san-
guinē educas. Sin minùs, subdititijs vtatur fortissimis è bu-
presti. Et dictānū creticū in vino bibat, sin minus, castoris te-
stem. Et retrò cucurbitā ipsi ad laterū mollitudinē affigito,
& plurimū sanguinē detrahitō. Atq; hoc maximē rerū ac vi- **E**

Puerperia
purgatio -
nis mensu -
ra, & color.

est de morbis à puerperij purgamētis fiētibus. Sunt autē pe-
ricula in ipsis nō parua. Acuti enim sunt, & cito trāsmutātur,
& magis affliguntur primiparæ, quā quæ sunt partuū ex-
pertæ. Prodeūt autē puerperij purgamēta sanæ mulieri suffi-
cienter, primū sesquiheminæ mēsurā, aut paulo plura, postea
adhuc pauciora iuxta hāc rationē, donec cessent. Prodeūt au-
tem velut sanguis à victima, si sana velut dixi, mulier fuerit,
& sana futura est, & cito cōgelātur ac purgātur, & post partū
plerunq; sanæ mulieri cōtingit vt post puellæ partū, in qua-
draginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat, extra
periculū autē est etiā si viginti quinque diebus purgetur, post
masculi verò partū, purgatio diuturnior fit in triginta die- **F**
bus, extra periculū est etiā quæ in viginti diebus cōtingit, &
in his quæ fœtus corruerūt secūdū horū dierū rationē pur-
gatio cōtingit, & in iunioribus quæ corruerūt paucioribus

Magis la-
dit abortus
quā par-
tus.

diebus. In senioribus autē, pluribus. Eadē verò sunt affectio-
nes ex puerperij purgamētis, & ei quæ corrumpit fœtum, & ei
quæ peperit, si menstruū corruerit fœtū, & quæ corruerunt
magis periclitātur. Corruptiones enim grauiores sunt quā
partus, Nō enim fieri potest vt citra violētiā fœtus corrupa-
tur, aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititijs medica-
mentis, aut aliqua alia re. Violētia verò malū est. In huiusmo-
di enim periculū est ne vteri exulcerentur, aut inflāmentur.

Lactis pro-
creatio.

Hoc autē est periculosum. At verò lac quomodo fiat, dictū est
à me in natura pueri in partu. Postquā autē prægnaus fuerit
mulier,

A mulier, mēses nō valde prodeūt, prāterq̃ quibusdam pauci. Dulcissimus enim humor ex cibis ac potib. ad māmās vertit̃ ac exsugit̃. Et necesse est etiā reliquū corpus magis euacuari & minus sanguine plenum fieri. Atq; hoc ita contingit. Sūt autē quę natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tempus. Hę verò natura solidę sunt, & densę carnis. & propterea sufficiens humor nō penetrat à ventre in māmās, quū via sit densa. Ad menses detrahendos. Elaterij potiones duas sumito, & adipē ouillū de rhenibus, pari elaterij portione ammisceto, & non cōterito, verū duas glādulas subdititias facito. Aut melāthium ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glādulas formato, atq; has ante dies quibus affuturi sunt apponito. Si enim nō prodeūt, rigores ac febres inducūt. Mollitoria, à quibus aqua & arena purgatur, ducūt etiā menses, si nō fuerint diuturni, & osculū emolliunt. Narcissum, myrrham, cuminū, thus, absinthium, cyperum, singula equalibus portionibus sumito, narcissi verò solū quatuor portiones: & puluillū stupę dum pectinatur crudū linū ammisceto, & hęc cū aqua origani cocti terito, ac glandē formato & subdito. Aut cyclaminū magnitudine tali, & aris florē magnitudine fabę terito, & cum melle glandē formato, ac apponito. Aut pulegium, myrrhā, thus, fel suis ac bouis, cū melle subigito, & glandē efformato. Si menses nō prodeant, adipem anseris, & netopū, ac resinā permixta ac lana excepta apponito. Medicamentū subdititium, purgatoriū, mollitorium,

C Caricam percoctā ac expressam leuissimē terito, et in lana subdito cū rosaceo vnguēto. Aut acris brassicę et rutę, vtriusq; dimidiū terito, ac vti tor eodē modo. Purgatoriū. Medullam anseris aut cerui magnitudine fabę affuso vnguēto rosaceo et lacte muliebri terito velut pharmacū teri solet, et cum hoc os vteri illinito. Aliud subdititiū molle. Medullam anseris magnitudine nucis, cerā magnitudine fabę, resinę lentiscinę aut terebinthinę magnitudinē fabę. Hęc cū rosaceo vnguento ad lentū ignem liquefacito, & velut ceratum effacito. deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatoriū. Farinā recentē, myrrhę obol. iij. croci tantundem, castorij obolum, hęc trita cū vnguento irino apponat. Aut vrticę semen, & maluę succum, ac anseris adipem simul permixta subdat. Aliud subdititiū purgato

*Cur quædā
lac non ba-
beāt aut ab
eo deseran-
tur.*

*Mensium
prouocatio.*

*Diuersa de
hac re medi-
camenta.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

purgatorium, si menses nō cōpareant. Styracē & origanū terito, & permixtis adipem anserinum affundito ac apponito. D

Aliud quod vteros expurgat, ac sanguinē euacuat. Absinthij radicem tritā, melle ac adipe anserino ammixtis apponito. Aliud purgatoriū. De buprestis caput & pedes & alas tollito, & reliquū ipsius terito, ac ficus internā partē ammisceto. Sit aut pinguitudinīs ficus portio dupla. Hoc vteros inflat. Hoc etiā desperatis optimū est. Aut mercurialis folia trita subdito. Hoc tenuē biliosam purgationē ducit. Sed & artemisia facit velut mercurialis, & melius purgat. Veratrū quoq; nigrū cum aqua tritū, velut aquā à carnibus ducit. Sed & alumen ac resina idē facit cyperū, absinthiū, aristolochiā, cuminū, salem, mel. Hæc oīa simul terito ac apponito. Et veratrum cū vino dulci, & farina lolij ac tritici, melle subacta in lana subdatur. E

Subdititia si catapotia nō purgariint. Mercurialem, myrrhā, violam albam, cepam acerrimā, & melanthium ac mentā, si sufferat, permixta apponito. Subdititia acria sanguinē ducentia. Cātharidas quinque; demptis pedibus ac capitib. & myrrhā ac thus simul misceto, & mel addito. Deinde in oleū rosaceum aut Aegyptium tinctū per diē subdat, & vbi mordet, tollat. & rursum in lac muliebre ac vnguētum Aegyptiū tingat, & hoc per noctē apponat. & aqua odorata perluat, & adipē subdat. Cōduxerit & buprestis, si quidem parua fuerit, sine alis & pedib. ac capite. Si verò magna fuerit, non cōmisceto eadē quæ cātharidibus, sed solā sumito ac similiter apponito. Si verò molliore opus habuerit F

ad buprestim vinum & cuminū Aethiopicū immisceto, vñ item passam & pollinem seselis ac anisi. & vinū feruefacito, eoq; affuso reliqua terito, & pastillos drachmales efformato eosq; apponito myrrha ac thure ammixtis: facito autē eodē modo velut cū cantharidibus. Aut melanthium ex tritico, tritum ac melle subactū apponito. Aut hoc ipsum melanthiū cum melle tritum velut glandem effacito, circum pennam autem obducito. Subdititiū efficax. Succum mandragoræ & cucurbitæ syluestris, cū lacte mulierbri apponito. Aut fecē siccā ex vino veteri albo vrito, & vino extinguito ac subdito.

Cucurbitā item syluestre, mercuriale, nitrum & irionem.

Citius detrahit & madragoræ radix, cātharis, serpyllū, lauri fructus, vnguentum irinum, laurinum. Tithymali succū permi

A permisceto ac agitato, & detracto visco, erui magnitudine exhibeto, Optimū est & glādē subdititiā ex eo facere. Si verò amplius p̄dierit, vino proluatur. Aut xs vsũ dissoluito, & tepidum lana excipito ac apponito. Medicamētum ad cōceptum. Cedriæ acetabulū, adipis bubuli drach. iij. simul terito, & talorū figuras efformato, quas ieiuna apponat, & dū appositas habet per diem ieiunet. Apponat autē bis, mane & vesp̄ri, post mēses post cœnā verò lauet: & cū viro dormiat. Aut melārthiū cōtūdito, & in linteū illigato, & adipe anserino addito, subdendū dato. Aliud ad cōceptum. Quo cures mulierem vt in ventrē cōcipiat, vrinā sumito veterem, & ferri recremētum tantū, vt in fragmenta resoluerē possis. postea mulierē in sella collocato, & corpore & capite velato, peluiq; ad pedes supposita, ignita recrementi ferri fragmenta tria pro vna vice iniicito. Sit autē vetus hęc vrina cōgij mensura: & cum his triginta fomētis ipsam foueto. Dum autē fomētū adhibes, caput lauato, ita vt donec fota fuerit rursus lapides illos recremēti ferri in vrina extinguas, & fomētum rursus calefacias. Postea verò caput lauato plurimū, polio & vticis folijs q̄ plurimis in aqua coctis. Hęc autem facito ad dies septē. Ter verò per singula hęc fomēta suffito, antequā laues. A balneo verò oleo laurino inungatur. post cœnā autē, vbi cepas melle tinctas comedit, & aquā mulsam tepidā quatuor heminarū mensura bibit, & paululum cōtinuit, vomat. & supina reclinata, rutā habeat auribus & narib. inditam. Et panem fermentatum sexta chēnicis parte, in iusculum volucris confringat, habeat autem hoc iusculum apij chemam, & sic assumat: & rursus tātundem in cœna dato. Et hoc per dies septem facito: postea verò ventri per dies septem clysterem adhibeto, Sit autem infusum clysteris, resinæ drachmæ quatuor, mellis acetabulū, olei plataënsium tantundem, furfurū recentium succus, spuma nitri, oua tenuia. Sit autē infusum hemina octo, & ex his tres succi ptisanæ. Obliquæ verò clysterem adhibeto, & parū lauato. Apponat etiā glandes septē in die, & detineat donec fuerint liquefactæ. Sint autē ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo verò eodem vtatur. Suffito autē alini albi pilos, & lupi stercus. De his plurimū prunis iniice, ipsamq; circumlocatā ac contextā suffito, cauendo ne cōburas. Si verò mulier parere nequeat quæ prius pepe-

Cōceptoria

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Qui conce-
pius pare-
tur.*

rit, vitrum & resinā, & myrrhā, & cuminum Aethiopicum, & D
vnguentum simul terat, & apponat. Aut pulegiū siccū in lin-
teo subdat. Bibat autē pulegium vbi dormire volet. Aliud
ad cōceptum. Viētus rationem mulieri cōstituere oportet,
quæ prægnaſ fieri cupit, & ad edendum ac bibendum exhi-
bere ipſi, quæ libēter admittit. Viro autem mulieris reliqua
dato, præter allium, & cepā, & legumina freſa cocta, & ſilphij
ſuccum, & quæ inſtant. Ab his ſanè abſtineat. Medicamētum
quod ſimiliter inſunditur ſi nō concipiat. Lac mulieris ma-
ſculum alentis, grana mali punici recentis terito ac ſuccum
exprimito, & teſtudinis marinæ partē inter anum & puden-
dum cōburito ac terito: & hæc in pudendū muliebre inſun-
dito. Aliud quod ſimiliter inſunditur nō cōcipienti. Lac & E
reſinam, & mali punici dulcis ſuccum, Hæc omnia melle am-
mixto inſundito. Aliud ad cōceptum. Bulbi albi ſemē aut
florem cum melle terito, & lanæ inuolutum per triduum ad
vterum apponat. Quarta verò die, malū ſylueſtrē lotifoliā
terat lacte muliebri ammixto, & lanæ inuolutā apponat. de-
inde cum viro dormiat: præforbeat autē pulegium in farina
coctum, & bibat pulegium tenue in vino. Si verò huic non
obediat, conyzā odoratā cōtundat, & expreſſum ſuccū vino
mixtum ieiuna bibat. Aliud. Aſparagi ſemen ſimiliter in
vino bibat. Aliud. Secundā mulieris, & vermium carniū
capita, & alumē Aegyptium, cum adipe anſerino diluito, &
in lana ad os vteri apponat. Aliud. Aeruginē, florem æris, F
vtrumq; oboli dimidij pondere, thuris maſculi, aluminis ſciſ-
ſi, fructus vitis ſylueſtris, gallæ, myrrhæ, malicorij, reſinæ, po-
lij, ſingulorū obolum, in melle tritum, per triduū bis in die
apponat. Si verò fortaiſſis acrius fuerit, anſeris adipem ac ni-
trum roſtum ammiſceto. Vinū autem exhibeto, fortitudinē
in ipſo vitans. Aliud ad conceptum. Vermem carniū qui
caudam habet accipito, & de ipſo tres aut quatuor partes ſu-
mito: & origanum tenuem ſimul cum roſaceo vnguento te-
rito: & hoc ad vteri os apponat. Aliud. Portulacā cum adi-
pe anſerino, & myrrhæ, & porri ſemine, & felle bubulo te-
rito, & lanæ inuoluta ad os vteri apponito. Si menſes quidē
ſiant multi, non cōcipit autem, floris æris obolos duos, & alu-
minis ſciſſi tantundem, cum melle terito, & lana excipito.
Illiget autem mulier lanā in linteū cum ſilo, & ſibi ipſi ſub-
dat,

*Conceptus
reparatio.*

A dat, ita vt filum extra promineat. Deinde quum probè purgata fuerit extrahat, & vino odorato myrti folijs iniectis feruefacto proluat, & virum accedat. Subdititium ad cōceptum.

Mel, myrrhā, myricæ fructum, resinam liquidam, adipem anserinum, omnia simul trita lanæ inuoluta apponat. Aliud, quod vterum valde aperire potest, quum cōclusus est, & cōcipere non potest, & ad aquam expurgandam. Accipe anchusam paruam, & lentiscum, & cuminum, & cyperum, & cucurbitam syluestrem, & nitrum rubrum, & sal Aegyptiū, & anchusam magnam. Hec omnia trita per linteum rarium excernito, & acceptū mel ad lentum ignē coquito. Postquā verò efferbuit, cerā ac resinā ammiscero. Deinde etiā alijs omni-

B bus ammixtis oleum affundito, ac ab igne tollito, & tepida lanæ cōuolutæ inuoluta vtero apponito, donec purgata fuerit. Aliud. Si mulierem cōcipere velis, ad purgatoria quibus vtitur, etiā virū accedere oportet. Et baccas lauri nigras decem, thuris pugillos tres, & cumini modicum, cum melle trita in lanam succidam inuoluat, & semel in die subdat, & semel auferat, ad quatuor dies, & ijsdem diebus à cibo abstineat. Conceptum impediens. Si verò cōcipere non oporteat, nisi yos magnitudinē fabæ aqua diluito, ac bibendā dato, & per annum vt ita dicam, non concipiet. Partum accelerans ægrè parienti. Lauri radicem derasam, aut lauri baccas dimidij acetabuli mensura in aqua calefacta bibēdas dato. Aliud partum accelerans. Dictamni obolos duos tritos in

*Cōceptum
impediētia.
Partum ac
celerantia.*

C aqua calida bibat. Aut abrotoni drachmā, & lauri baccas, & anisum, in vini dulcis veteris cyatho terito, & aquæ cyatho affuso bibendum dato. Hoc bonum est si antè partus dolores fuerit datum. Aut dictamni obolū, myrrhæ obolū, anisi obolos duos, nitri obolum. Hæc cum vini dulcis cyatho vno terito, & aquæ calidæ cyathis duobus affusis bibenda dato. Deinde calida lauato. Aliud partū accelerans. Resinā terebinthinam, mel, oleū duplum horum, vinum odoratū quā suauissimū. Hæc mixta tepesacta sepe ebibenda dato. Oportet autem, & vteros sedare, si fuerint inflammari. Aliud.

Cucumeris syluestris quicumq; albus fuerit semē ceræ infarcito, deinde lanæ rubræ inuolutum lumbis alligato. Si verò prægna multo tēpore cohibeatur, & parere nō possit, sed diebus pluribus ex partus doloribus laboret: Sit autem

HIPPOCRATIS LIBER I.

Quæ puer-
peria pur-
gent. iuuenis, in vigore, & multo sanguine referta, secare oportet **D**
 venas in malleolis, & sanguinē detrahē, viriū respectu ha-
 bito, & postea calida lauri corticibus incoctis lauato. Viricis
 autem semen, & dictamnū creticā, vtrunq; pari portione, in
 vino albo aut aqua bibendū dato. Subdititium autem me-
 dicamentū facito, galbano, & baccis lauri, & oleo rosaceo, in
 lana inuolutis ac subditis. Aliud. Filicis quercinæ radicem
 tritam in vino bibendam dato, & adiantū tritum in oleo di-
 lutum illinendum, & in vino meraco bibendū dato. Aliud,
 quod puerperæ puerperij purgamentā melius purgat. Testu-
 dinis marinæ hepar viride adhuc viuēris, in lacte muliebri
 terito, & cum vnguento irino ac vino subigito, & apponito.
 Aut mercurialem tritam in lana apponito. Aut artemisiā tri- **E**
 tam similiter in lana subdito. Aut mercurialis & cucumeris
 syluestris parum terito, & vino ac melle subactum apponito.
 Purgatoriū puerperij purgamentorum ex partu. Triticum
 trimestre fractū ac fresum, dimidię chœnicis mēsurā, in aquę
 heminis quatuor coquito. Quū autē efferbuerit ter aut qua-
 ter, sorbendū dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito,
 & aquā bibendam dato. Edat autē & brassicas coctas, & por-
 rum, & fœniculum, & anethū, & polypus, & locustas piscicu-
 los. Aut rhois folia & erysimū ex vino, aut polentæ pollinem
 bibendū dato. Aut misy duorū obolorū pondere tritū ac vi-
 no subactum apponito. Purgatorium mensium & puerperij
 purgamentorum. Ducit etiā aquam & alia. Radicis struthij
 cusi triti quantū tribus digitis apprehendi potest, melle sub- **F**
 actū apponito. Nascitur autē in Andro in littoribus. Aliud
 similiter purgans. Erysimū in aqua coquito, & vbi ebullijt
 oleū affundito, ac bibendum dato. Commodum est etiā suc-
 cum pro fomento adhibere per suffitū, & cibis mollibus vti.
 Aliud quod puerperij purgamenta purgat. Erysimū pla-
 cide terito, & corticē difftrato. Quum autem purum feceris,
 leuiter terito, & aquā adstillato, salemq; ac oleum ammisce-
 to, & vbi polentam insperseris coquito, ac sorbendum dato.
 Aliud. Si non descenderit purgatio, aut puerperij purga-
 menta nō prodierint. Cucumeris syluestris internā partem,
 trium obolorū pondere sume, & artemisiā herbam, & thus
 oboli pondere, & hæc trita, & melle ammixto, lanæ inuoluta,
 ad vteri os appone. Et hoc semper noctu ac interdiu per dies
 quinque

- A** quinq; facito: Aut vitis pampinos aut folia viridiā terito, & melle ammixto lana excipito, & eodē modo subdito. Aut cupressi fructū & thus simul trita, rosaceoq; ac melle diluta, & lana excepta apponat. Aut abrotoni drachmā, & cucumeris syluestris medullæ obolum, & thus cū melle terito, & in lana inuoluta apponito. Aut elaterij obolū, & myrrham, cum melle terito, & lana excepta apponat. Aut cupressi fructum, & cucumeris syluestris internam partem, & thus, melle ammixto, in lana subdat. *Puerperæ purgatio diuersa.* Purgatoriū si ex partu nō purgetur. Trifolium in vino bibendū dato. Idem etiā appositum menses erumpere facit, & fortum eijcit. Purgatoriū vterorum, quum puero mortuo sanguis in hoc māsērit. Cucurbitam syluestrem tritā cum melle delingat, aut apponat. *Secundam quæ educat.* Ad omnia puerperij purgamenta si nō probē prodeant. Erysimum coquito cū polenta, & oleo affuso vbi coctum fuerit sorbeat: & cibis mollissimis vtatur. Aut scāmōniam cū lacte muliebri tritam, ac lana exceptā apponito. Aut radicem dulcem melle, & rosaceo aut Aegyptio vnguento subactam, in lana subdat. Aut farinam lorā similiter apponat. Bibat autē crethmi: & seselis, & rutæ, & silphij semen, ita vt de singulis obolos duos simul tēas, & in vino meraco, si non febricitarit, præbeas. Subdititium quod secundam relictam eijcit. Ex sambuci foliorum decocto prius fomentum adhibeto, & id quod ex cātharide fit apponito. Hoc & ea quæ debilia sunt sanat. Si verō lācinet ac mordeat, statim tollito, & lanam rosaceo tinctam subdat. Poriones quæ secundam educere possunt, & menses detrahē, itemque fortum enectum.
- C**antharidas quinq; alis & cruribus ac capite auulsis, & tribulum ad mare natum cum radice ac folijs tritum conche mensura, & eūanthemi, ac seminis apij tantundem, & sepis quæ quindecim, in vino dulci temperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit in aqua calida desideat, & aquam multam aquosam bibat, & vinum dulce. Alia. Ranunculi foliotum ac floris triti, stateris Aeginæ pondus, in vino dulci bibat. Si verō dolor habuerit, cicer alburni & vvas passas, in aqua coquito, perfrigerato, ac bibendum dato. & vbi vrinæ stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat. Aliud quod eijcit secundas. Cucumeris syluestris succū in māsā cōpersum apponat, vbi prius ad biduū ieiunarit. Hoc nullū aliud

HIPPOCRATIS LIBER I.

Fœcunditas præstâtius inueneris. Fœcunditatis experimentû. Caput al. **D**
tis experien lii integrû deraſum appone, & vide an per os oleat. Aliud
ua. experimentû. Netopon modicû lana inuolutû apponito, ac
videto an per os oleat. Alia ſubdititia. Scorpij marini fel,
lana exceptû & in vmbra ſiccâtû appone. Aut pulegium ſic-
catum & tritû ac melle ſubactû, in lana apponito. Aut florẽ
æris cû melle linteolo illigatû ſubdito. Aut cucumeris ſylue-
ſtris ſemẽ, & teſtâ cõbuſtâ, cum vino ſubigito, & leporinis pi-
lis ac lana excepta ſubdito. Aliud ſubdititium. Alumẽ Aę-
gyptiû lana inuolutû apponito. Aut cãtharidas tritas vinoq;
ſubactas ſubdito. Aut artemiſiã herbã vino ſubactam appo-
nito. Aut melanthium cum vino tritum in lana ſubdito. Aut
bulbiõ ex tritico tritum & vino ſubactû apponito. Aut vini **E**
veteris albi fęcẽ cõburito, & vino albo extinguiro, teritoq;
ac in linteo apponito. Aut galbanû, & netopon, & miſy cum
roſaceo vnguẽto in linteo ſubdito. Aliud. Elaterij potiões
duas, & fauû cû vino in linteo apponito. Aut butyrû & alu-
men melle ſubacta ſimiliter. Aut ſcãmonix ſuccum & adipẽ
cum maza miſceto, & vino imbuta in linteo apponito. Po-
tiones quæ poſſunt ſecundã in vtero detentã educere. Colo-
cynthidis ſylueſtris internã partẽ cû lacte muliebri tritã, in
linteo apponat. Ad idẽ. Silphium magnitudine fabæ in vi-
no bibẽdum dato. Aliud qđ fœtû expellit. Mulierẽ ſub alis
apprehẽſam fortiter cõcurito. In potu verò dato, viticis folia
in vino. Aut dictãnum creticû oboli põdere in aqua terito ac
exhibeto. Aut conyze graueolẽtis man^p plenẽ mẽſurã cû por-
ri ſucco diluito, & netopû chemæ plenẽ mẽſurã addito, atq;
hec trita in vino bibẽda dato. Aut tedã pinguiſſimã cû vino
dulci coquito, triû cyathorû mẽſuravini aſuſa, & galbani o-
bolos tres, & myrrhã adijcito, & vbi cocta craſſa facta fuerit,
repida bibẽda dato. Aut porri ſuccû, & myrrhã, & vinû dul-
ce ſimul exhibeto. Aut portulacę ſemẽ terito, & in vino albo
vereri dato. Aut populi nigre creticę grana nouẽ i vino trita
bibat. Aut ranûculi herbę foliorû ac floris triti, drachmę Aę-
gineę põdus, i vino dulci bibat. Si verò adhuc ſcãda intus de-
tineat, Senecę anguiû obolû i vino terito, ac bibẽdû dato.
Aut apij, radicę, & myrti baccas coquat, & p dies quatuor bi-
bat. Aut cumipû Aethiopicû, & caſtorij obolû, & cãtharidis
parû hæc i vino bibẽda dato. Aut ſerniculi radicę, in vino &
oleo

*Quæ fœtû
expellant.*

- A** oleo ac melle feruefactā bibat. Si secūda nō p̄dierit, conyzā tritā in lana subdito. Melius autē est vt bibat. Aut conyzā quātū manus capit, & porri succū, & netopū chemæ mēsurā misceat, & hæc in vino bibat. Aliud qđ secundā eijcit. Holo conitidis dulcis radicē, est autē velut bulbus, & parua velut oliua: Hāc in vino terito, ac bibendā dato. Et si quidem parua fuerit duas dato. Si verò maior, vna sufficit. Ammisceto autem ex seminibus cuminū Aethiopicum, & feseli māsiliēse. Aut sulphij libyci semen siccū chœnicis dimidiā mensura, in vini heminis tribus coquat, & ad dimidias redigat, & de hoc bibat. Aliud. Viticis semē, & feselis, pari portione simul cū myrrha terito, et cum aqua bibēda dato. Alia secundas expellentia. Viticis albæ recentis acetabulū, in vino albo odorato tritum bibendum dato. Aliud. Castorij aut sagapeni obolum, bituminis drach. j. nitri drach. ij. Hęc omnia terito, et in vino dulci, ac olei hemina dimidia obolos duos ieiunā bibendos dato. Et calida probe lauato. Aliud similiter habens. Herinaceos marinos tres totos tenuiter tritos, in vino odorato bibendos dato. Aliud. Mentæ fasciculum parū, et rutæ et coriandri, et cedri aut cupressi semē, in vino odorato bibēdum dato. Et de herinaceis si habuerit, plurimum sorbeat. Postea verò similiter calida lauato. Aliud. Anisum, cedri baccas, semē apij, cuminū Aethiopicum, feseli, singulorum dimidiū acetabulū, tenuiter tritum, ex vino albo bibendum dato. Aliud. Diſtamni fasciculum, et dauci seminis drac. ij.
- C** et melanthij tantundē, tenuiter terito et in vino albo bibenda exhibeto, et multa calida lauato. Dato autē iuxta corporis robur. Aliud. Galbanū oliuæ magnitudine, in oleo cedrino tritum apponat. hoc corrumpere et eijcere morātes secundas potest. Aliud secundarum expulſorum quod vteris infunditur. Quum secunda à frigore mortificata cōputruerit, vbi vētus frigidus fuerit, crocum leuiter tritum drachmæ pōdere, cum adipe anserino infundito, et ad plurimum tēpus finito, Potus ad idē probe cōferēs. Conyzam suaue olentē, et mel, et resinā terito, inq; vino odorato, aut in syrma portione moderate purgant bibēda dato, et calida lauato. Alius similis potus ad puerū et mala intus existentia. Aeruginē tritā cum melle, et syrma portione, bibendā dato. Aliud subdititium, ad eijciendū fœtum immortuum. Aeris ramēta in molle lin

HIPPOCRATIS LIBER I.

teum indita, ad os vteri apponito, & profueris. Aliud. Te- **D**
 stam recentē, & adipē anserinū terat ac apponat. Aliud. Ni-
 trum cum resina coctū, & in glādē efformatū, gallinaceo adi-
 pe tinctum appone. Aliud. Charien appellatur herba, hu-
 ius radicē nō multo adeo tempore ad vmbilicū apponito.
 Aliud. Cucurbitā syluestrē, & muriū stercus, leuiter trita ap-
 ponito. Aliud quod alligatur. Resinā & adipē gallinacē,
 trita ac simul mixta, super vmbilicū ac vētrē deliget. Aliud
 subdititium. Hederae albae semen, & cedri ramenta terat, et
 glandes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis marinae ce-
 rebrum, & crocū Aegyptiū, & salē Aegyptiū terito, misceto,
 glandes formato, ac subdito. Suffimentū expulsiuū quod & **E**
 sanguinē vētris expellere potest. Salicis folia in ignē posita
 suffito, & mulierē circūlocatā finito donec fumus in vterum
 intrauerit. Abortus sanatio. Quum mulier abortū fecerit,
 & puer nō fuerit egressus, siue putrefactus fuerit, & intumue-
 rit, aut aliud quid eiusmodi passus fuerit. Porri & apij succū
 per linteū expressum, de vtriusq; colligito, & olei rosacei he-
 minam, & adipis anserini quadrantē adijcito, resināq; obo-
 los tres in oleo liquefacito, & ubi mulierē ad pedes altiorē
 feceris, in vteros infundito, ac decubēs ad plurimū tēpus con-
 tineat. deinde ad dies quatuor desidere iubeto, & egreditur
 puer putrefactus. Sin minus, salē Aegyptiū & cucurbitā syl-
 uestrē viridē accipito, & melle ammixto trita edēda dato. Et
 postquā ederit, hinc & hinc moueatur. Aliud. Salē Aegy-
 ptium, & muriū stercus, & cucurbitā syluestrē sumito, & mel **F**
 lis semicocti quadrantem affundito, & resinā drach. j. in mel
 injcito, & cucurbitā ac muriū stercus, omnia probē cōterito,
 & in glādē efformato, easq; ad vterū subdito, q̄ diu opportu-
 num esse visum fuerit, Aliud expulsiuū, quod puerū enectū
 eijcit. Helxinē in vino tritā bibendā dato. Aliud eiectionū,
 quod puerū liuidum expellit. Veratri nigri radices tennes
 tritas, quantū tribus digitis apprehēdere potes, & myrrham
 magnitudine fabae, in vino dulci bibēda praebe. Aliud ex-
 pulsiuū. Coriandrū cum radice, & nepotū apponat, ac de-
 ambulet. Aliud quod infunditur, si mortuus fuerit puer, vt
 ipsum eijciat. Crocum terito, & anserinū adipē affundito, &
 excolata in vteros infundito, & ad plurimū tēpus relinquito.
 Cum par- Ad foetum immobilē corripēdū ac expellēdū. Aluminis
 scissi

*Abortus
sanatio.*

*Partus im-
mortui cie-
tio.*

Cum par-

- A** scissi drach. vnam, myrrhæ tantundē, veratri nigri obolos tres, in vino nigro leuiter trita, in glādes afformato, & apponito donec paulatim fuerit exolutus. Collutiones vteros purgātes, si ex partu aut inflammatione fuerint exulcerati. Grossos hybernos aqua affusa feruefacito, & excolato. Deinde oleo tepido affuso misce, & duas heminas ad summū infunde. Omnes autē collutiones nō ampliōre q̄ hac mēsurā vteris infundantur. Malicoriū item & mānam thuris, in vino nigro austero coquito, & excolato vinū infundito. Alia collutio. Fecem vini vstā liquefacito, & cum aqua infundito. Deinde malicoriū, myrti baccas, iuncum odoratū, lentes in vino coquito, & diffusum vinū infundito. Alia. Butyrū, thus, resinam, mel, simul liquefacito, & affuso vino, tepida infundito. Aut sambuci fructū in aqua coquito, & excolata aqua, apium myrrhā, anisum, thus, simul in ipsa terito, & vinū odoratū pari aquæ mēsurā affundito, excolatoq; per lintheum, & tepefactum infundito. Alia. Brassicā, & mercurialē, & lini semē, et linum viride, in aqua coquito, excolato, ac infundito. Aut foliorū myrti acetabulū, mirrhā, anisum, mel, resinā, vnguentum Aegyptiū, omnia terito ac vnito, affusisq; vini albi odoratissimi heminis duab⁹, excolato tepefacito, infundito. Aut lauri fructum et pulegiū in aqua coquito, et vnguentū rosaceū affundito, et cum hoc tepido colluito. Aut anseris adipē resinæ ammisceto, affusoq; ad hoc vino, tepefactū infundito. Alia. Butyrum et oleum cedrinū, in modico melle tepefacto ac infundito. Aut mel, butyrū, iuncum odoratū, calāmum odoratum, muscū marinū sumito, et in vino coquito, excolato, ac infundito. Aut apij semen, seseli, myrrhā, anisum, melanthium, in vino coquito, et excolato vinum infundito. Aut cedrum in vino coquito, et cum vino colluito. Aut hederā in aqua coquito, et aquā infundito. Aut elaterij, aut cnestri portiones duas in aqua coquito, et duas heminas ex hac tepida infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris magnitudinem digiti in duabus aquæ heminis coquito, et melle ac oleo ad aquā affuso infundito. Aut radici thapsiæ portiones duas leuiter terito, affusoq; oleo ac melle, in duabus aquæ tepidæ heminis diluito, ac infundito. Aut veratri nigri portiones duas, vino dulci et aqua dilutas infunde. Aut grana enidia sexaginta terito, melleq; ac oleo et aqua affusa infundito.

Collutio corroborans, si vlcera pura fuerint. Grossos hy- D
 bernos rerito, & aquā affundito, & per totā diem macerato,
 & oleo affuso colluito. Aut malicoriū, & loti ramenta in vi-
 no nigro coquito, & infundito. Quum autē impura fuerint,
 & sordes deferuntur, scē vini vnā, cum vino & aqua infundi-
 to. Aut malicoriū, rhoem coriariū, myrtiq; ac rubi folia, in
 vino nigro coquito ac infundito. Collutiones quæ infun-
 duntur ad vetera vlcera. Succo brasicæ cocto collue. Et mer-
 curialem similiter ac nitrū rubrū modicū ammisce, & myr-
 rhæ acetabulū, thus, seseli, anisum, apij semen, netopū, resinā,
 mel, adipē anserinū, acetum album, vnguentum albū Aegy-
 ptiū. Hæc oīa simul trita, & vini albi heminis duabus diluta,
 tepida infunde. Aut mercuriale in aqua coque & excola, E
 & myrrhæ acetabulū, thus, seseli, netopū, singulorum pares por-
 tionēs adde, ac tepida infunde. Aut saluiā & hypericum in
 aqua coquito, & cum aqua colluito. Aut sambuci fructū, &
 lauri baccas, æquis portionibus in vino coquito, & cum vino
 colluito. Aut pulegij aqua colluito. Aut adipē anseris in
 resina liquefacito, & similiter oleum cedrinū modicū affun-
 dito, & cum melle liquefacito, ac tepida infundito. Aut ar-
 genti florē in vino & melle ac cera liquato, & cyperū, & iun-
 cum odoratū, ac calamū (quæ sanē etiā in vnguentum ammi-
 scentur) & iridem ac muscum in vino coquito & infundito.
 Aut apij semen, anisum, seseli, Myrrhā, melanthiū, in vino co-
 quito ac infundito. Aut cedrum creticā in vino coquito, aut
 in aqua, & infundito. Aut hederā creticā in aqua coqui- F
 to ac infundito. Atq; hæc faciendā sunt si vulnus habet, &
 myrrhā in aqua dilutā infunde. Aut elaterij portiones duas
 cum aqua infunde. Aut colocynthidas sylvestres duas in vi-
 no aut in lacte cocto, quatuor heminarū mēsurā macerato, et
 excolato, aut infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris,
 pulmi magnitudinē in aquæ heminis quatuor cocto, & mel-
 le ac oleo affuso colluito. Aut radices thapsiæ duas portiones,
 in vino dulci dilutas, cū aquæ heminis duabus, tepidē infun-
 dito. Aut veratri portiones duas in vini dulcis heminis dua-
 bus dilutas infunde. Aut thlaspios acetabulū, melle ammi-
 xto in aquæ heminis duabus diluc, & tepido vtere. Aut cu-
 cumeris sylvestris magnitudinē palmi, & cneori portione v-
 nā, in aquæ heminis qnq; cocto, & melle ac oleo affuso col-
 luito.

A luto. Aut grana enidia sexaginta, in melle aut in oleo diluta, cum aqua infundito. Si ex partu alui profluuium corripitur. Bibat vuam passam nigrā, et punici dulcis malicoriū, et internū nucleū, et coagulū hœdi. Hæc vino nigro diluta, et caseo caprino, ac polenta triticea inspersis, bibenda dato. Triticum autē modice torreto. Si verò ex partu sanguinē vomat, huic hepatis fistula sauciata est. Hæc lac asini bibat, dein de vaccæ nigræ, ad quadraginta dies. Et sesamū tritū donec probè habeat. Bibat autē lac ieiuna. Si ex partu sedem doleat, iuniperi fructū et apij radicē coquat, et ad dies quatuor bibat, et lactuca semē cum anserino adipe tritū edat. Si verò ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum infundito, aut betæ, aut rhamni. Si ex partu crus ab vteris claudū factum fuerit, et exurgere nō poterit, semen hyosciami chemē mensura, in vino nigro ad tridū bibat. Si verò mēte percellatur ipsa bibēs, lactis asinini pauculū bibendū dato. Deinde pharmacum à quo pituita purgatur, ex sandaracha aut et cerato, et pilis leporis, per tridū sufficus fiat. De inflāmatione ex partu. Si ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum intra pudēda infundito. Aut apij, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succū expressum. Aut sambuci medullā ac ternerrimam partē derasam, oblōgā indito. Aut absinthium in aqua terito, et lana exceptū subdito. Si verò horruerit tollito. Aut cotyledonis folia, et porrū, in crassiore tritici farina coquito, et oleo ipsis affuso præbeto. Bilē ex vtero purgantia. Cucumeris sylvestris internā partem tritā ac melle subactā, **C** in glandē efformato ac apponito. Pharmacū autē dare oportet, qđ sursum ac deorsum purget, et calida lauare. apponere verò anisum, aut melāthiū: aut colocyntidis sylvestris internam partē terito, & melle subactā apponito. Aut elaterij portiones quatuor, ammixto adipe anserino aut caprino, in oblongiorē glandē redactas apponito. Aut nitrū, & cuminum, & allium, & ficū, oīa leuiter trita & melle subacta apponito. Calidaverò lauet, & à balneo bibat. Aut thlaspi leuiter tritū & melle subactū apponito. Aut ficus veteris pinguitudinē derasam elaterij potiōibus duabus ammixtis, & nitro tm quānim est elateriū, cum melle subigito ac apponito. Aut peucedani tres cyathos bibēdos dato. Et anisum ac melanthiū vino diluta bibenda dato. Aut elaterij portiones quatuor, adipe ouil

*Sanguinis
vomitus
caussa.*

*Contra ute-
rorum in-
flammati-
onem.*

*Diuerse
medicæ.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

*Collutiones
uariae.*

*Pituitosa
& biliosa
lenatio.*

pe ouillo ammixto apponatur. Et hoc ablato aqua odorata lau-
uet, quæ leniter adstringat. Aut elaterij potiones tres cū ouil-
lo adipe, in glandē circū pennā efformato, & ubi amouerit,
sufficienti aqua probe eluatur. Aut thlaspis portionē cū melle
dato. Collutio si biliosa fuerit. Elaterij portiones duas
aqua dilue, & oleū narcissinum affunde, & cū tepido collue.
Aut colocynthides syluestres duas in lactis asinini cocti he-
minis quatuor macerato, & vnā excolato, ac oleū narcissinū
ammisceto, & infundito. Alia collutio biliosa & pituitosa.

Cucumeris syluestris internā partē palmi magnitudine, in
aquæ potabilis heminis quatuor coque, & inelle ac oleo an-
thino ammixto infundito. Alia pituita & bilē purgans. Gra-
na cuidia sexaginta, melle ac oleo anthino ammixto, cū aqua
infundito. Aut cnestrū in aquæ potabilis heminis quinq; co-
quito, & duabus excolatis, mel & oleū anthinū cū narcissi-
no ammisceto, ac colluito. Collutiones purgatoriae. Grossi
hyberni vsti in aqua macerantur, et ad aquā excolatā oleum
ammiscetur, ac infunditur. Postea verò collutio fiat ex mali-
corio, galla, loti ramēis. Hæc autē in vino nigro coquere o-
porter. Aut fece vini vsta vtēre cū aqua. Et postea hæc infun-
dito, myrti folia et rhoem coriariū. Coquantur autē in vino
nigro odorato. Et postea lentisci folia, et hypericū, et saluā,
cū vino nigro odorato cocta infundito. Aut cū brassicæ
aqua, in qua mercurialis cocta sit, modico nitro adiecto, col-
luito. Aut elaterij portionē, cū oleo narcissino aut anthino, te-
pidā infundito. Si verò biliosa fuerit, colocynthidas duas,
in lactis asinini cocti quatuor heminis macerato, et cū exco-
lato colluito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Aut cu-
cumeris syluestris internā partē palmi magnitudine, in aquæ
potabilis heminis quatuor coquito, et melle ac oleo anthino
addito, colluito. Hæc collutio pituitosæ ac biliosæ conducit.

Collutio pituitā trahens. Granū cniidū, et mandragorē li-
quorē terito cū aqua, Nam purgatio multa et oīs generis ex
hac collutione cōtingit. Aut alij caput integrū, nitri, sicut
internā pingue partē, æquis portionibus trita ad gallæ ma-
gnitudinē efformato, ac apponito. Aut cummū folia cū vino
trita, in lana subdito. Aut radicē albā terito, et melle affuso
feruefactā in glandē redigito, ac apponito. Aut filiphij liquo-
re cū ficis emollito, et glandē efformato. Bonū est et cucu-
meris

A mēris sylueſtris ſemen ſimiliter triſū. ac preparatum. Aut fel tauri, & nitrū rubrū, & neropū, ac cyclaminū, illorū quidem gallę magnitudinē, cyclamini verò ampliorē portionē, melle ammixto mulier quę curatur apponat. Aliud ſubdititiū.

Cyclamini caput purgatū aqua terito, & lana tenera exceptū apponito. Aut myrrhā, ſalem, cuminū, fel tauri, cū melle eodem modo. Aut grana cnidiā triginta, & Indici pharmaci oculorū, quod vocatur piper grana tria, decorticato: & rotundi itē tria. Hęc autē terito, & vino veteri tepido diluta, inſtar glādis circū volucris pennā efformato, & ſic adhibeto. Aut thymali ſuccū melle ſubactū. Aut ſcillę radicē longitudine digitorum ſex, duobus digitis lana obuolutis ſubdito. Aut

B iſtam ſcillā abſq; radice terito, & ſimiliter lana obuolutā apponito. Collutio ſi pituitoſa fuerit mulier. Veratri portiones duas in vini dulcis heminīs duabus diluito, & permixta inſundito. Si purgatione opus habuerit, porrū coquere oportet, aut ſambuci fructū, aniſum, thus, myrrhā, vinū. Hęc omnia terito, & cū ſucco horū colluito. Aut braſſicā in aqua coquito, & in huius ſucco mercurialē coquito, & nitrī parum, & excolatū inſundito. Aut cneſtri potionē in melle dilutā immittito. Verū mēſes cōſiderare oportet, an biliōſi ſint, aut pituitoſi. Ad hoc arenā ſiccā tenuē in ſolē ſubiſcito, & quū mēſes prodierint, ſanguinem ſuperfundito, ac ſiccari ſinito. Et ſi quidē biliōſi fuerint, ſanguis in arena ſiccatus viridis euadit. Si verò pituitoſi, velut mucus conſpicitur. Si igitur pituitoſi

*Menſium
cognitio.*

C fuerint, cneſtri potionē cum aquę muſcę hemina inſundito.

Purgatoriū molle, aquā ducit & pelliculas, ac ſaniem ſubcruentā. Detrahit & mēſes, niſi diuturni fuerint, & vterorū os mollit. Vnguētū narcifſinū, & cuminū quod editur, myrrham, thus, abſinthiū, cyperū, vnguentū roſaceū, Horū ſingulorū pares portiones, narcifſini verò quatuor partes ſumito, & crudi lini puluillo dum à ſtupa depectinatur ammixto, omnia terito, & glāndē circū pennā efformato, & linteo tenui circundato deligato, & in oleū albū Aegyptiū tingito, ac apponito, & per totā diem ſinito. Et vbi lauit & amouit, aqua odorata perluatur. Aliud purgatorium. Ducit aquā & pelliculas, & mucos, & ſaniē ſubcruentā. Myrrhā, ſalē, cuminū, fel tauri, melle ſubacta & linteo indita apponito, & totū diē inſita ſinito. Deinde vbi lauit & amouit, aqua odorata perluatur,

*Purgamē
tum ad mul
ta.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

tur. Aliud. Salem, cuminū, fel tauri, melle subigito ac sub-
dito. Et silphium ficui ammisceto ac apponito. Deinde vn-
guēto rosaceo illinito. Aut grana cnidia decorticato, portio-
nemq; ipsorum terito, ac in glandē efformato. Aut alliū &
nitrū rubrū, & ficū, paribus portionibus melle ammixto sub-
denda dato. Et vbi amouerit, cerui adipē apponat in vino li-
quefactum. Aut piperis grana quinque cū modico elaterio,
muliebri lacte instillato, in lana vnguento tincta apponat, ac
amoueat eodē modo. Aut pinguisimā ficus partē cum ela-
terij portione, & nitri rubri ac mellis æquali portione, eodē
modo. Aut fel tauri, nitrū rubrum, neropum, cyclaminū, pa-
ribus portionibus eodē modo cū melle in glandē efformato.

Aut fel tauri oleo Aegyptio tinctum apponat. Et eo amoto
rosaceū illinat. Aut cucumeris sylvestris longi internā par-
tem, exēpto semine, cū lacte mulieris masculū alētis, & myr-
rham purā, & modicum mel, & vnguentum Aegyptiū, terito
& apponito. Aut cucumeris sylvestris partē internā siccato, &
sine semine tundito, & adiecto melle seruefacito, & glādem
oblongā efformato, atq; oleo albo tinctum subdito. Aut syl-
uestrem cucurbitā eodē modo. Aut elaterij portiones tres cū
farinæ massa terito, & glādē formato. Aliud similiter faciēs.

Grana cnidia decorticata triū potidnū mensura coquito, &
melle affuso apponito. Deinde rosaceū illinito. Quæcunq;
verò glandē subdunt, eas prius lanā in glandē infigere, dein-
de linteū tenue circumdare oportet, atque sic oleo Aegyptio
tinctam apponere. Ducunt autē hæc maximè, & pelliculas

Purgatio - auferunt. Subdititia purgatoria fortia, quæ aquā ducere pos-
nes diuersæ. sunt, & mucos, ac pelliculas, magis quàm priora. Piperis gra-
na quatuor maxima, aut etiā parua, si opus fuerit, ad elaterij
portionē ammixta terito, & muliebri lacte instillato, cū mo-
dico melle subigito. Atq; hæc in lanā mollē circū pēnā obuol-
uito, & linteo circūdato apponito, vbi prius in oleū Aegy-
ptium tinxeris. Maneāt autē subdita per diē, & vbi amouerit,
adipē cerui apponat. Portiones, similiter purgatoriæ, quæ se-
cundas eiicere possunt, & menses detrahare, & fortū enectū
educere. Cantharides quinq; alis & cruribus ac capite auul-
sis: & tribulū ad mare natū cum radicibus ac folijs tritū con-
chæ mensura: & euanthemi viridē siue luteā internā partem,
& seminis apij rātundē, & sepix oua quindecim, in vino dul-
ci temp

A ci tēperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquā mulsam aquosam bibat, & vinū dulce.

Alia. Ranunculi foliorū as floris triti, æginei stateris pondus in vino dulci bibat. Cū autē dolor habuerit, cicer albū & vuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. Et vbi vrinæ stillicidiū vexarit, in aqua tepida desideat & vinum dulce bibat. Subditia purgatoria si potiones non purgarint. Mercurialem tritā, ac myrrhā apponito. Aliud ad omnem morbum, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicam & saluiam, & anisum terito ac vtor. Purgatoriū quod sterilem purgare potest. Si os vteri nō rectē habuerit, stercus bubulum siccū tusum ac cribratū quatuor chœnicum

B mēsurā, & aceti heminas decē, & vrinæ bubulæ tantundē, & salsuginis marinæ heminas viginti, pro fomētō adhibeto, & ad multum tēpus hoc leniter facito. Deinde lota vbi lēticulę decoctum, & mel ac acetum mixta bibit, vomat. Et farinam sorbendā dato: & vinū odoratū vetus sub dio per noctē expositum, insuper bibendū. Cibum autē ea die ne gustet. Sequenti verō granum cnidium deuorādum dato. Tertia verō pharmacū vrinā ciens exhibeto, ita vt vuas passas & cicer album, duarum chœnicum mēsurā sumas, & aquæ semicōgios tres affundas. Deinde facta coctura excoles, & sub dio per noctem exponas, & postera die bibēdum prębeas: & subdititijs pharmacis vtatur. Aliud purgatoriū mensium. Stercus bubulum velut cōchæ testā efformato, & cupressi ramenta am-

C misceto ac subigito, & in sole siccato: & in hoc suffimēta iniicito, ac suffito. Aliud quod infunditur ad similem affectiōnem, si mēses nō prodeant. Spinæ albæ folia trita, & excolata ac tepefacta infundito. Illitio purgatoria, quæ vteros purgat. Porri & nasturtij semen tritum, & vino ac lacte cocto dilutum, imo ventri illinito. Illitio mollitoria. Ducit aquam, & mucos, & pelliculas. Et purperij purgamēta detrahit, & nō exulcerat. Myrrhę optimę dimidiā partem, & salis granum, & picē aromatibus conditā, cōtundito ac trita misceto. Sit autē myrrhæ dimidia pars, ad salē ac picē cōtusam, Hæc in linteū ad gallæ magnę magnitudinē efformata immittito. Sint autem duo linteā, vt alterū in die, alterū nocte habeat, donec colliquescāt. Lauetur autem calida. Et deinde vbi amouit, aqua odorata perluatur. Si voles mulierem con-

*Vt cōcipiat
mulier.*

cipere

HIPPOCRATIS LIBER I.

cipere, ipsam & vteros purgato. Deinde ieiunæ farinā edendā dato, & vinum meracū insuper bibendum. & nitrū rubrū aut cuminū, & resinā, melle subigito, & in linteo subdito: & vbi aqua defluerit, nigros subdititios talos ad emolliendum apponito, & cum viro cōcumbat. Si verò os cōclusum fuerit, etiā fici succum apponat, donec fuerit apertum, & statim aqua eluat. Cæterū accipitris stercus in vino dulci terat, & ieiuna bibat, & tunc viro condormiat. Aut vbi menses desierint, anseris aut vulpis stercus, in rosaceo vnguento terat, & pudendum illinat, ac cōdormiat. Si vlcera fuerint acria & inflāmata, hac collutione vtete. Adipē anseris & resinam misce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrū melli ammixtum liquefacito ac infunde. Aut bryoniæ albæ cōche testam parū deradito, & myrrhā ac mel similiter. Hæc in vino nigro odorato diluito, ac tepidum infundito. Si vlcerata aut pustulis plena fuerint suūma labra, carnē bubulā sumito, & butyrum siue adipē anserinum, & anisum aut crocū, aut spodium cyprium. Hæc omnia terito, & carni oblita apponito. Si vlcera fiant ac mordeant, Bubulā carnē adipe illinito, & carnē subdito. Et si sordida fuerint, eluito, & fomentū ex fici radice adhibeto. Et postea etiā de pinguedine in vino dulci bibat. Si in pudendis fiant vlcera, bubulum adipem illinito. Et myrtum in vino coquito, & cum vino perluat. Aut oleæ folia, & rubi, & mali punicæ, eodē modo. Sit autē vinū prænium. Atq; hæc quidē sic facienda sunt. Et perseæ arboris videlicet folia terito, & ad pudenda apponito. Aut Anethi & apij semen tritum illinito. Si feruido ac superficiario vlcere pudenda laborēt, sic curare oportet. Carnē bubulam longitudine duorum palmorū paruorū, crassitudine verò ligni quod in foramen bipennis immittitur, pudēdi videlicet virilis forma, vsq; ad vesperam apponat. Noctu verò auferat. Postera die autem rursus apponat vsque ad meridiem, & bibat vinum dulce, melle ad vinum ammixto. Collutio si vlcerati fuerint vteri, & si vrinæ stillicidium vexarit. Porrum, sambuci fructum, seseli, anisum, thus, myrrham, & vinum æquali mēsurā ad horum succum. Hæc mixta & feruefacta frige facito, & moderatē colluito. Aut mel, butyrū, medullā, & ceram immittito, ac illinito. Ad vlcera quæ in pudēdo sunt ac enascuntur. Folia oleæ, & rubi, & hederæ, & mali punicæ

Medela omnium quæ in pudendis nascuntur.

223

dulcis

- A** dulcis terito, & vino veteri diluta, noctu in lana pudendis apponito, & pro cataplasmate adhibeto. Quū autem dies venerit, detrahito. & myrti baccas in vino coquito, ac colluito. Aut anseris adipem & resinā liquefacito ac infundito. Aut butyrū et oleum cedrinū, modico melle amixto infundito. Ad vlcera in vtero resiccanda. Argenti florem in vino terito ac infundito. Aut butyrum cum melle infundito. Aut bryoniam albam, & myrrhā, & mel, vino diluta infundito. Postridie verò vino nigro tepido eluito. Aut lentisci folia in aqua coquito, & cum hac postea colluito. Si vlcera fueris os vterorum, Butyrum, thus, myrrhā resinā, medullā ceruinam infundito. Aut lenticulā in aqua coquito, & cū excolata aqua colluito. **B** Quū verò aqua ex vteris fluxerit, & vlcera fuerint, & lancinarint, anseris adipem & ouum illinito. Aut ouillum aut suillum adipem: & lentem in vino coquito & hoc pari aqua temperatum infundito. Quæ verò in pudendo sunt vlcera, cum hoc perfundito, & mannā thuris, rubum, pini corticem inspergito. & cum aqua horum lauentur. Expulsorium si mortuus fuerit foetus. Galbanum oliuæ magnitudine linteo inuolutum, ac oleo cedrino tinctum, ad os vteri apponat. Aliud. Calamū odoratum, & cucumeris sylvestris medullam, cum adipe anserino terito. Deliget autē vmbilicum & pectinem, & de hoc modicum lanæ instillatum ad os vteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahetur. Aliud. Rubiam & cedri ramenta cōtundito, & aqua affusa sub dio per noctem exponito. Deinde mane ad dolores partus exhibeto. Aliud. Silphij drachm. vnam, & porri succi acetabulum, cedrini olei dimidio cyatho paruo amixto, bibenda dato. Aliud. Tauri fel obolivnius aut semioboli pondere, in vino terito ac exhibeto. Aut fermento oblitum, torrefactum deuorādum dato. Aliud. Cancros fluuiatiles quinq; & rumicis ac rutæ radicem, & fulginem de furno, omnia simul trita, & cum aqua malsa vnita, sub dio per noctem exponat, & ieiuna ter bibat. Aliud. Cucumeris sylvestris medullam tritā, in cedrina pice lanæ inuoluito, & cum filo ad pennam deligato, apponat autem intro, ita vt pennæ dura pars paululum foras promineat ex lana. Quum autē sanguis apparuerit, amoueatur. Aliud. Veratri nigri virgulam longitudine sex digitorū lana obuoluito, extremā verò ipsius par-

*Foetus im-
mortuo in-
iectio.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

tem nudam finito. Deinde quàm maximè intrò apponat, & vbi extrema pars cruentata fuerit, amoveat. Aliud. Veratrū nigrum, & cantharidas, & conyzam in aqua terito, & glādulam mollem sex digitorum lōgitudine efformato, ficcato, & vbi dura facta fuerit, lana inuolutā apponat. Summā autem partem cedria illinat, sitq; ipsa nuda. Cūm verò sanguis appa-
ruerit, amoveatur. Aliud expulforium. Si foetus mortuus aut syderatus intus fuerit, ranunculum & elaterij parum in aceto meraco misceto ac bibendum dato. Aut brassicæ tener coliculus, in summa parte netopo illinitus immitatur.

HIPPOCRATIS

COI, DE MORBIS MULIEBRI-

BVS LIBER II.

*Diuerſi flu-
xus.*



Luxus albus in iunioribus mulieribus magis fit quàm in iuniorib. Fluxus ful-
uus in vtrifq;. Fluxus ruber ex iunioribus. Et ruber quidē fluxus fit in febre. Magis autem ex abortu. fit & ex mensium interceptione, quum cōclusi dere-
pentē eruperint. Fit etiā ex partu & fe-
bribus, & sanguis profluit valde multus, & grumi excidunt. Et dolor fit clauicularum ac tēdinum, & corporis torpor, & crurum perfrigeratio. Aliquando verò etiam nasus effundit ad dētes, si amplior sanguis discesserit. & sudor multus diffunditur. Ad hæc & stomachi morsus fiunt, & perfrigerationes, & febris bilis meracæ ac pruriginosæ: & eadem die sæpe rigent, & rursus sudant, & aliquando à supernis locis conuulsiones ipsis fiunt, aliquando ab infernis. & ad inguina dolores acuti ac fortes irruunt, procedentes velut dolores partus. Quandoq; etiam vrinæ stillicidium adest, & os siccū est, & sitis premit: & lingua aspera est: & digiti pedum magni contrahuntur, & ad suras semper cum femore distenduntur. Et lumbi dolores vexantur: & manus impotentes fiunt. Quū
autem

A autem huiusmodi sunt, tunc etiam nervorum antrorsum ac retrorsum distentiones fieri solent, à claviculis iuxta iugulū, ad maxillas & linguā. A talibus verò paulo post retrorsum, à tendinibus iuxta spinā, ad lumbos, atq; sic per violentiā percutunt, prædicere igitur oportet fluxibus inchoantibus, & diætā cōstituere hoc modo. Mane quidem dandū est pharmacum ad fluxiones, ex his quæ ego describā, quocūq; maximè opus habere visæ fuerint. Dandum autem & ter & quater, si multus sanguis discesserit. Diæta igitur constituatur, si quidem sine febre fuerint, ex cibis. Si vero febricitant, ex sorbitionibus. Sunt autē ex sorbitionibus hæc cōmodissimæ, panicū, lenticula, farinā horni ac recētis tritici cocta, alica cocta sorbilis, zea cocta. Ex potionibus verò polentæ pollen in aqua, & ramenta à panibus derafa cōtusa. Et polentæ recentes tenues in aqua madefactæ, quas etiā insulas delingere prodest. Ex cibis verò panis exassatus in cinere. Obsoniū autē sit leporis caro, & colūbæ, ac palumbis, & cocta, & assata. Et hœdi caro assata, nullo ascititio cōdimento addito, sed vt in acetū saltem intingant. Hepar item capræ aut bouis in cinere assatum. Ovi tenue, aut ipsum luteū. Caseus insulsus. Ex oleribus autem nullum gustent, neq; coctū, neq; crudum. Et à balneis abstineant. Et manus ipsis deligato, ita vt lana sordida ipsas circundes, & laqueū immittas supra cubitos, & ad poplites, supra genua. Et cum cucurbitis sub māmās affixis, ipsas eleuato, modo ad dextram, modo ad sinistram partē translati.

C Si verò spirandi difficultas oriatur ad cucurbitæ admotiōnem, cucurbitam amoueto, sanguinem autem ne detrahito. Verū subdititijs vtere, quæ ego describam, & ad sistendum sanguinem in talibus sunt apta. Et si quidem ex fluxionibus mulier euaserit, vbi multus sanguis discessit: & color est exalbidus, & facies eleuata, & sub oculis tumores laxi, & crura turgida, & vterus humidus, ac semper præter rationem hians. Et quæ discedunt aquosa sunt, velut à crudis carnibus succus. Talibus si robustæ fuerint, vomitus ciere oportet ieiunis, & post vomitus prandium exhibere. His conducit modicus cibus. Vinum nigrum meracius. Illuuiēs, aut frigida lotio. Deambulationes. Semel in die cibū capere, omnis refectio. Si verò ad hæc non sedentur, neque cōfidant vteri, neq; à fluxionibus liberentur, respectu virium corporis ha-

*Medela.**Sorbitiones.**Potiones.**Cibus.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

bito, si quidem robusta fuerit, veratrum dare oportet. Si verò D
 nō obediat, caput purgare, facta autē purgatione, per diætā
Quæ in his reliqua curare eodem modo velut circa steriles. Considerare
consideren- porrò oportet etiā naturas mulierum, & colores, & ætates, &
tur. tempora, & locos, & ventos. Aliæ enim frigide, aliæ humidæ
 ac fluidæ, aliæ calidæ quidem, sicciores autē & stabiles sunt.
 Nam quæ supernalbidæ sunt, humidiores sunt ac fluidiores.
 Nigræ verò, sicciores & acerbiore ac adstrictiores. Quæ ve-
 rò vint colorem referunt, mediū quiddā inter vtrasq; habēt. Sic
phlegmatis diffinitione autem & in ætatibus cōtingit. Iuenculæ enim humidiores
in sanguine sunt, & multo sanguine plerunq; refertæ. Aniculæ verò sic-
 ciores, & modicum sanguinē habētes. Mediæ verò medium
 quiddam inter vtrasq; habēt, vt quæ nunc æquales existunt. E
 Oportet autē eum qui rectē hāc tractare volet, semper mu-
 lierum naturas discernere, & temporū occasiones, & ætates,
 & tēpora, & locos, & ventos. Si fluxus in vteris obortus fue-
 rit, sanguis multus fluit, & grumi cōpacti excidunt, & dolor
 occupat lumbos, & laterū mollitudinem, ac imum ventrē, &
 durus est venter, & ad contactū dolet, & rigor ac febris acu-
 ta corripit, & debilitas oboritur, & omnia præter humeros ac
 scapulas dolet, & calor inuadit, & rubescit, & venæ duræ fiūt
 ac renitentes. Morbus hic maximè fit ex abortu. Fit & quum
 menses multo tēpore retenti derepente eruperint. Huic vbi
 sic habuerit, grossum siccum cōtustum ac cribratū in linteum
 alligato, ac apponito, & imo vētri perfrigerantia imposito,
 cauens ne horreat. Postquā autē fluxus steterit, oleæ sylue- F
 stris folia in acerrimo aceto coquat, eoq; pudenda perluat.
 Bibat autē vinacea, & rhoem rubrū in aceti acerrimi hemina
 dimidia coquat, & eo pudenda perluat. Aut mora rubi rubra
 siccata ac trita, cum farina recenti, pari portione mixta, ieiuna
 bibenda dato. Si verò fortius facere voles, duabus farina
 partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lauetur. Cibis au-
 tem vtatur siccis, & vino nigro vinofo. Si verò intumuerit,
 fluxu iam sedato, pharmacū deorsum purgans bibendū da-
 to, post pharmacū autem vteros grossoru decocto colluito, &
 postea acerbā infundito. Si verò his factis, humecta fuerit,
 suffitum faciat donec resiccet. Ruber fluxus fluit talis, qua-
 lis sanguis victimæ recens maceratæ, & grumi pellucetes.
 Aliquando verò etiā fluxum rubrum emittit, & venter imus
 attollitur,

Morbi
 causa.
 Medela.

Qualis
 fluxus.

- A** attollitur, & attenuatur, & impotēs fit, & indurefcit, & ad cō-
tactum dolet, velut vlcere prēfente. & febris habet, & dentiū
fremitus. & dolor ad ipfa pudenda, & pubem, & lateris mol-
litudinē, & lumbos, & tēdinem, & vētrem, & pectus, & sca-
pulas irruit. Et aliās omnes partes dolet. & impotentia ac pu-
sillanimitas occupat. & color mutatur. In principio quidem
morbi hęc corripunt. Si verò hęc omnia morā trahant, ad-
huc magis debilitatur. & manifestus est morbus. & cauæ par-
tes attollūtur, & pedes intumescūt. Morbus hic ex partu ma-
ximē corripit, si quid in ipsa dilaniatum nō prodierit, sed in-
tus cōputruerit, & fœtus exasperatus fuerit. Hęc si in princi-
pio cōtigeris, spōgiā humectā ipsi adhibeto, quum fuerit do-
lor. Aut linteum tenue molle rasum, aqua frigida madefactū
B ventri imposito, & aqua perfundito. & lectū a pedibus al-
tiorē facito, atq; sic insternito. & ad mēses ciendos medi-
camentum quodcunq; magis admiserit, bibendum prēbeto.
Apij semen torreto, tundito, ac cribrato, & erysimum simili-
ter, & peplij semen cum polēta cribratum, & vrticæ semē si-
militer, & scabiem oleæ syluestris, & gallā, & rutā, & origa-
num, & pulegium cum polenta cribrato ac misceto: polentā
verò crassā torreto, & triticeā polentā cōmolito, & ca-
seum caprinum sordibus deralis, & de alijs quidem singulo-
rum æquales portiones misceto. Origani verò & rutæ, & sca-
biei, & gallæ dimidium. Hęc ieiunæ ante morū bibenda da-
to. Miscere verò etiā oportet ad vsum, si acriora prodierint,
C & cyceonem exhibere. Et de pharmaco quidem pars vna sit,
& casei vna, & vna polētæ. Ad vespērā autem melle ammix-
to bibenda dato. & donec quidem principium morbi fuerit,
& sanguis multus prodierit, & modico tempore intermise-
rit, & dolores acuti tenuerint, hęc facere oportet. Si verò san-
guis paucior fluxerit, & per breuius tempus, ea quę deorsum
aut sursum ducunt bibenda dato. & pudenda lenibus fomen-
tis foueto, prout semper opportunum visum fuerit, & zeam
vnā cum cortice fractā, & grossos siccatos, tusos ac cribra-
tos, & oleæ folia similiter, singulorum pares portiones in ca-
taplasmate adhibeto. & lac bubulum coctum, aut crudum bi-
bendum dato, respectu ad id quod rectē habet factū, & pro-
ut opportunum esse visum fuerit. & videtur morbus hic de-
bilis ac lethalis esse, & paucæ ex ipso effugiunt. Quum

Medela.

Profluuiū
ex abortu
uel labore.

HIPPOCRATIS LIBER II.

mulieri sanguis ab articulis fluxerit, à partu aut à labore cor
ruptæ, quidam putant ex medicis hoc fluxum esse. Est autem
aliud. Nam hoc quod ex articulis, & ex lumbis, ac coxendice
aliud est, glutinosum est simul cū sanguine. Illud verò quod
ab uteris & cauis venis fluit, sanguis purus est. Hæc suffire o-
portet hoc modo, Zeæ fractæ semiduum aceto modico subi-
gito, ut ne per totum uteros humectet: & sulphuris viui se-
miobolum ad zeas tritas ammisceto, & aceto subacta per no-
ctem finito. Mane verò multo igne accenso, obturamenta de
dolijs olearijs imponito, & sordes officinæ fullonum, & ser-
pentis semē ammisceto. Mox autem multum ignem tollito,
& non vrito, sed maximè suffumigare facito. Oportet autem
fellam perforatam adesse, & mulierem vestibus contactam
insidere, ut ne quid præterspiret. In ignem verò medicamen-
tum cum aceto præparatum inspergito, itemque de semine
serpentis. Sed & myrrha ammixa efficax est, ut suffita pudē-
dorum cruentationem sedet. Si verò satis habuerit, erysimi
semen torrefactum terito, & in vino exhibeto. Fluxus ful-
uus fluit velut ex ovo vitioso multus & graueolens, & ute-
ri inflammantur, & dolor ex lumbis & inguinibus emergit.
& prodeuntia multa sunt, & si non liberetur, celeriter fluen-
tia. At etiam si tempus accedat, quæ restant putrefacit, quàm
maximè id fieri potest. Riget enim, & velut à carnibus as-
satis humor defluit. & cum his simul febres fortes ac rigo-
res fiunt. Ex huiusmodi verò fluxibus multæ pereunt, pau-
cæ effugiunt. & si quidem in principio accesseris, sic cura-
re oportet. Si sine febre fuerint ac robustæ, veratrum ip-
sis dato, & intermissis tribus aut quatuor diebus, pharma-
cum deorsum purgans exhibeto. Post purgationem verò sic
diætam constituere debes, quo fluxiones aquosæ sint ac te-
nues. Mane quidem ieiunæ pharmacum aliquod ex his quæ
ego describam ad fluxum, ebibendum dato in vinum in-
spersum. Post pharmacum autem, alia diætâ curato. Uteros
verò sic curato. Si quidem inflammati fuerint ac conclusi,
fomenta adhibere oportet mollia, donec os uterorum mol-
le fiat. Post fomenta, infusis qualibus opus habere visæ fue-
rint colluito, siue magis purgantibus, siue mollioribus. Post
collutiones, mollitoria apponito. Si verò non facilè solubi-
le sit osculum, foueto & subdititijs mollito, quæ ego descri-
bam,

Medela.

Curatio.

Aham, donec apertum fuerit. Quod si ad hæc fluxiones non sedentur, caput purgato, et sic victus rationem constituito. Si quidem sine febre fuerit, asinum lac bibat. et oleribus coctis hortensibus ac sylvestribus vtatur, excepto allio, porro, brassica & raphano longo. Ex marinis autem, raia leui, scorpio, congro, torpedine, anguilla, passer, gobio: coquere verò oportet cum cepis & coriandro, in muria dulci ac pingui, ita vt probe percoquantur. Ex carnib. autem, maxime suilla, deinde agnina, aut ouilla, coctis potius quàm assatis, & ipsarum iusculis. Vino verò albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis autem non valde calidis, neque multis, excepto capere. Si verò ex hac diætâ, ab vlceratione & inflammatione liberentur, humidi verò sint vteri, pro balneis quidem, illuuiæ. pro fuluis autem vniis nigris. & pro aquosioribus, meracioribus. & pro polenta panibus, & pro piscibus carnibus, assatis, & omnibus cibis siccantibus, quibus sanè in alui profluuijs vtimur. à collationibus autem omnibus, abstineat, excepto vino & aqua. Suffitus autem fiat per adstringentia. Optimum autem esset si coccum pereret. Si verò iuuencula fuerit, frequenter ieiuna vomat, & postea parum prandeat. Atque hæc harum fluxionum diætâ est. Fluxus albus fluit velut alba asini vrina, & in facie sunt tumores albi, & partes ambæ sub oculis tumet. & hydropiformes ac non valde bona specie præditi sunt oculi, & splendor abest. & lacrymosi sunt oculi ac hebetes. & color corporis exalbidus ac pustulosus. & venter imus tumidus. & in maxillis pustulæ paulatim rubentes, parue, aquosæ ac malignæ. & in cruribus, tumores laxi, & si presseris digito, notæ imprimuntur velut in fermento, & os saliuâ implet. & stomachi morsus percipiunt quum ieiunæ fuerint, aut etiâ vomuerint velut acidam aquam, & si ad accliuæ locum procedunt, anhelatio citius corripit, & strangulatio, & crurum perfrigeratio, & genuum impotentia. & in ore vlcera feruida ac superficialia. & vterus præter rationem aperitur, & ad osculum procidit grauis, veluti plumbum. Et dolores per femora tendunt. & omnia inferna perfringerantur, ab imo venter inchoat usque ad pedes. et placentæ torpēt, ac ingredi non possunt. Tales difficile est à morbis liberare. Nam & arte prouecta sunt, & afflictiones cōsenescunt. Nisi casus aliquis spontaneus forte fortuna allapsus ipsas soluat. Hæc exhaustire oportet quum redundari, per pharmaca quæ bilem flauam

*Cibaria**Nutritio
lus mutatio**Profluuiū
albū quale**Curatio.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Profluuiū
aliud albi.*

Curatio.

*Profluuiū
aliud.*

Medela.

non purgant. Sed vrinā cientes his pota conferunt, & capitis D.
purgationes, & illuuiēs. & epithymi albi potus, & deambu-
lationes. & omnis resiccatio in victu, Hæc ubi fecerint, sanæ
quidē penitus nō fiunt, facilius autem degunt. Fluxus albi
alterius curatio. Purgatur album subluteū, & quum mingit,
morsum percipit, & lācinatur, & vterus vlceratur. & febris
corripit acuta, & calor multus, sitis, vigiliæ, & mente mouen-
tur. Et quū aliqd festināter egerit, anhelatio ipsam inuadit,
& mēbra exoluuntur. Hæc mecona, hoc est peplum album bi-
bere oportet, & vrticæ semē, & quod præstat, mali punicę dul-
cis radicem, & rhoēm, ac gallā. Hæc in vino acerbō bibenda
dato, & mali punici succū, aut caseum caprinum ammisceto.
Subter autē suffito zeam, & grossos hybernos, & oleæ folia, E
& scabiē eiusdem, & cucumeris syluestris cortices ex tertia
parte, reliqua paribus portionibus. Sorbeat etiā olera cocta,
& sorbitiones ex amygdalis & sesamo. & gestet ac curru ve-
hatur, & non quiescat. Alius fluxus. Desiuit multum velut
vrina ouilla. color est albus, & tota intumescit, & in tibijs e-
minētia laxa & rubicūda emergūt. & si digito attingas, no-
ta foueas præ se ferētes tibijs ac pedibus imprimuntur. & si
quid edat, impletur ac inflāmatur. & ubi iter fecerit, & opus
aliquod obierit, anhelatio & dolor ipsam corripit, & color
albus, qñq; subluteus, huic si robusta & iuēcula fuerit. & alia
apparuerint, ab initio pharmacum sursum ac deorsum pur-
gans bibendum dato. & caput purgato, si pituitosa est per ea
quæ pituitā purgāt. Si verò biliosa, per ea quæ bilē. & si tem-
pus anni fuerit, & à natura nō est lienosa, & si quid ex relatis F
fuerit, serū dato. Decoquat autē hoc & bibat q̄ plurimo tēpo-
re. & ad vesperā vinum dulce aquosum, si opus habuerit. Ci-
bum verò ne cōtingat. Si verò debilis fuerit, sorbitione mo-
dica utat. & nō lauet. Postquā autē tēpestium esse tibi vide-
bit, à potu cesset. & post purgationē cibis utatur, ita ut absti-
neat à pinguib. & acribus, & dulcib. ac falsis. & ab olerib. acri-
bus. Utatur autē piscibus petrosis, & carnibus ouillis, aut vo-
lucrum, aut leporinis, pane frumentaceo. aut ex ordeo freso.
& oleribus coctis utatur, & sylvestribus quæ cruda eduntur,
item hortensib. acribus exceptis. & deambulet mane & à ci-
bo. Vbi verò his factis siccior esse visa fuerit, vteros fæce vi-
ni colluito. & tribus aut quatuor diebus interpositis, postea
acerba

A acerba infundito. & intermissione facta, si quidem sicca fuerit, quiescito. Et si à natura fuerit biliosa aut pituitosa, à victu verò & pharmacorū potione attenuata, & se recolligere non poterit, lac bubulum bibat per xl. dies, calidum de vacca. Præstat ramen pituitosam cibis q̄ paucissimis vti, quādiu lac biberit. Sit autem mēsurā sex heminarum Atticarū. Incipiatq; à duabus, & singulis diebus vnā apponat, donec sex fiant. & inde paulatim ad duas rursus descēdat. & post lactis potum, cibis reficito & per victus rationem & post lactis potum, mane ieiuna adiantum bibat. hoc siccatum, tustum, & exacte cribratum, in vino nigro odorato diluto exhibeto. Si verò reuertat̃ morbus, totā ipsam foueto, & rursus pharmacis infra

B purgato, & postea vteros colluito, si quidem natura fuerit pituitosa, per cnidiū granum, aut thapsiæ radicē. Si verò biliosa, scāmonix succo, aut colocynthide syluestri. hāc enim coniectā, duabus aque heminis affusis, coquere ad dimidias oportet, & huic mel, & oleū narcissinū aut anthinum ammiscere. Sit autē mellis quadrans heminae. olet verò hemiolū mellis, hoc est mēsurā ipsius tota, insuperq; dimidia. Postea verò colluendū est melle, & vino, & oleo solo. & suffitus adhibēdi, & tribus aut quatuor diebus quiescendū. Bibat autē adiantū. & si in vētre non cōceperit, morbus reuertit̃. & si morbus reuertitur, perit. Quū verò seniores morbus hic corripuerit, etiam vteri cōputrescunt. Valde verò paucae euadūt. Alius fluxus.

Profluuiū aliud.

Purgatur velut ex ovo crudo luteū subalbidum, & vlcerat

C pudendū. & tument pedes ac tibiae. & cauae oculorum partes intumescūt. & oculi humidi ac lachrymosi sunt. & si iter faciat, anhelatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Si verò euaserit, morbus pituitosus fuerit, & si nō purgata fuerit, febricitat, bile vehemēter cōmota. Seniores autem hic morbus magis inuadit q̄ iuniores. Quū sic habuerit, si quidē vehemēter intumuerit, pharmacū deorsum purgās bibendū dato, qđ pituitā & bilē purgat. Si verò nō fortiter tumuerit, & pituitā ipsam presserit, pharmacum sursum purgās dato. & si quidē potens fuerit, veratro purgetur. Sin minus, pharmaco quod bilem & pituitā ducit. Post pharmaca verò serum coctum bibendū dato, per plurimos dies, cū modico sale. Edat autē insuper mentā. Ad vespērā cibum ne attingat, sed modicum sorbeat, & vinū dulce insuper bibat, si opus habuerit. Si verò nō

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Lac asini-
nū pro sero* affuerit serum, lac asininū coquito, & exhibeto per quatuor D
dies. Ad vespērā verò eadē faciat, nisi febris noctu corripiat.
Si verò natura fuerit lienosa, aut flatuosa, & exanguis, neque
ferū, neq; lac bibat. Sed purgantibus infernè purgato: & vbi
tibi tēpestiuū visum fuerit, vteros colluito, primū quidē me-
dicamēto ex vini fēce, bis aut ter. Post hoc scāmōniæ succo.
Affundito autē ad hunc, vinū dulce, heminae Atticæ mēsurā,
& olei narcisīni maximè, quartā hemine partē. Postridie ve-
rò cum vini hemina colluito, & mellis quarta heminae par-
te, et resinæ tertia mellis parte. Oleū autē sit melli æquale. Si
verò ea quæ ab infusa collutione succedūt p̄dierint pituitosa,
etiam rursus colluito, interpositis iij. aut iiij. diebus. postea
grani cnidij duas portiones decorticato, et ipsas infundito. E
Si verò non affuerit cnidium granum, radicis thapsiæ portionē
vnā infundito. et postea isdē colluito. postq̄ autē purgata
fuerint ea quæ secedunt ad has collutiones, et si prodierit ali-
quid cruentum, velut ab vlcere, per acerba postea colluito. et
si post hæc ipsa interrogata, dixerit os vterorū durum esse, et
dolorē habere, eodē modo eo quod paratur cum butyro eol-
luito donec vteri fuerint reliccati, et sana esse videbitur. die-
bus verò inter collutiōes intermedijs, sambuci fructū bibat,
et leporis coagulū, et pepli corticē, et vrticæ semē, et mali pu-
nici dulcis corticē, ita vt de singulis pares portiones terat, et
polentā ac adiantū ammisceat, et in vino nigro odorato ie-
iuna bibat. cibus autē vtat̄ mollib. non falsis, neq; acrib. Car-
*Caro quæ
bis danda.* nes autē præstātiores sunt pisciū, aur volucriū, aut leporinæ. F
et lauetur calida nō multa. Si verò nō quiescat fluxus, sed re-
linquat̄, et vteri humescāt, medicamentū ex malicorio suf-
fuso. et postea virū accedat. et si in ventre cōceperit, sana eua-
dit. At seniores à morbo leuari non possunt, sed pereunt præ
*Profluuiū
aliud.* debilitate. Fluxus alius. Fluit subluteum velut ex ouo, et
viscosum, et vter unus intumescit, ac durus fit. et si cōtingas
dolet, et dentibus stridet, et febris occupat. et dolor ad pubē,
et ad pudēda, et ad imū vētrē, et ad lūbos irruit. et animi deli-
quium. et anxietates, et perfrigesationes, et sodor multus, et
pulsus ad manū accelerātes, debiles, deficientes. et statim pe-
*Medela mul-
la bis datur
tanquam de
seratis.* reunt. Si verò sup̄stes māserit, et color ipsi mutāt, et sit velut
faeus aut cera. et si corpus digito prematur, mollescit, et notē
velut in massa farinæ subacta fermēto imprimunt: et pedes
intume

- A** intumescunt ac crura. Hic autē morbus fit maximē, si in ipsis aliquid dilaniatū fuerit, aut intus cōputruerit in partu. Seniores autē magis afficiunt. & huiusmodi morbus nō est valde levis. Alius fluxus. Purgatur velut à carnibus assatis, humor, & pudendum exulceratur, & ad quācūq; aliā corporis partē destillarit. Et rigor, & febris acuta: densa, magna, & simul horror corripit. Dolores autem quales in omnibus fluxibus. Hæc tota intumescit, et infrā vmbilicū. et cruribus. et color fit morbi arcuati. Talis autem fluxus ex hoc fit. Postquam sanguis exhaustus, subbiliosus factus fuerit, et nō fuerit purgatus. Quum sic habuerit, pharmacū bibere oportet, Si quidē fortis fuerit, ex veratro. Si verò debilis, radicē et elateriū. et
- B** posteriore tempore lac caprinum. Aut pharmacum deorsum purgans dato, quod bilem et pituitā ducit. Vteros autem medicamento cum brassicæ decocto parato colluito. Bibat autem saluiā, hypericum, apij semen, ūngula in vino nigro austero. Ieiunæ autem hæc bibenda dato. Si verò vlceratum fuerit pudendum, postea butyro colluito. Deinde pharmacū bibendum dato, et vlcera butyro, resina, myrrha, flore agentī illinito. Perluantur autem myrti ac saluiæ ex aqua decocto tepido. Cibus vtatur neq; salis, neq; acribus. vt ne mordax vrina fiat. et à marinis prohibeāt, et carnibus bubulis, et ouillis ac porcinis. Alijs autem carnibus vtatur coctis. Edat etiā panem, et vinum vetus odoratum nigrum bibat. Si verò hæc fecerit, et sana nō fiat, totam foueto, et postridie pharmacum
- C** sursum purgās dato. Deinde intermissiōe facta, rursus quod infrā purget. et si quidem manserit fluxus post pharmaca, decoctum serum quotidie bibendum præbeto. Vesperī verò sorbitionibus, et vino dulci albo vtatur. Si verò non affuerit serum, lac asininū coctum per dies quatuor bibat. Ad vespēram autē ijsdem vtatur. Postea per dies quadraginta lac bubulum calidum bibat. et per diē nihil edat, vt ita dicā. Optimum enim hoc est. Nā et purgatur, et nutritur, et fluxus obtunditur ab huiusmodi lacte. Vesperī verò cōnet carnem volucris modicam assatam, et panem modicum subcineritium Bibatque insuper vinū nigrum vetus vinosum, quādiu lac biberit, si multa prodierint, et acrimonia vexarit. et si his factis in ventre cōceperit, sana fit. Quācūq; verò seniores sunt, in his morbus quandoq; reuertitur, et pereunt. Iuenculis autē non est

Profluvium aliud.

Curatio.

Nutricatus

HIPPOCRATIS LIBER II.

non est lethalis. Diuturna porrò est saniosi fluxus curatio. D
fluit autè talis subcruentus, velut à carnibus affatis humor, &
mordet velut muria, & corrodit ac exulcerat pudenda, & vte
rus exulceratur circūcirca, & fœmora, & aliæ partes, & vbi su
per vestes destillarit, tinguntur & ægrè elui possunt. & vter
attollitur ac durus fit, & ad cōtactum dolet. & calor corripit.
& dolor ad pudenda, & sedē, & imum ventrē, & laterum mol
litudinem, & coxas, & lumbos irruit. et impotētia adest. et co
lor mutāt, velut morbi arcuati. Si verò tēpus et morbus pro
ducatur, hæc omnia amplius corripunt. et cauæ partes attol
luntur, et pedes tumēt, et crura à lumbis. At hic morbus cor
ripit vbi quid de fœtu dilaniatum fuerit, aut in abortu, aut in
partu. Oportet autē fomenta adhibere, et suffire, et bibenda
præbere omnia ea quæ fluxū sistunt. et lac asininū et alia ex
hibere. et vomere si opus fuerit. Si verò sine febre fuerit, et
debilis febris habuerit, siccum fomentū adhibere melius est.

*Causa hu
ius morbi.
Medela.*

*Strangula
tio uaria.*

Quum ad caput conuersi fuerint vteri, et hac parte suffo
catio definit, caput grauat. Verūm alijs alicubi aliàs finis ha
betur. Signum autē hoc est. Venas in naso, et partes sub ocu
lis dolere dicūt. et sopor altior tenet. et spumat, vbi leuius ha
buerit. Hæc multa calida lauare oportet. Si verò nō obediat,
frigida etiā circa caput, ita vt laurum et myrrhū in aqua co
quas, ac frigefacias. Vnguēto autē rosaceo caput illinatur, et
odorata subter suffiātur. graueolentia verò sub nares. et bras
sicam edat, et succum sorbeat. Si verò ad cor progressi vteri
suffocent, et aēr impeditus violenter attrahatur, anxia est et
vomit. et qbusdā statim tractus deorsum cedit, et flatus exit. F
et aliqua quidem vomit spumosa. alicui verò quies cōtingit.
Quibus autē non decedunt, his porri semen, et peplum, trita
et tribus aquæ cyathis diluta, bibenda dato. Auxiliatur et a
ceti albi cyathus potatus. Aut iuniperi fructū et saluiā dato,
aceto aut vino ad has species ammixto, Oportet aut ipsam ca
lesieri. Aut adipē sumere anserinū, & ceratum resinatū ac pi
cem, in ipso liquefacere, & subdititias glandulas efformare.
Quum autē ad præcordia allapli strangularint, vbi hic fuerit
affectiois soliditas, & vomitus feruidus acris corripit, et mo
dico tempore mitior fit, & dolor ad caput & ad collum pene
trans. Tepefactoria igitur apponito, si sursum strāgularint.
Sub nares verò graueolentia suffito, sensim progrediēdo: Si
enim

- A** enim aceruatim vteri infra decedunt, turba oboritur: Odo-
rata verò infernè, & castoriū ac conyzā bibēda dato. Quum
verò deorsum tracti fuerint, abomināda subter suffito, sub na-
res autē odorata. Si verò dolores quieuerint, pharmacū deor-
sum purgās bibendū dato, & postea lac asininū aut serum bi-
bendum præbeto, si nō lienosa fuerit à natiuitate, aut exan-
guis, aut decolor, aut auriū sonitus habuerit, velut hæ quibus
propter cognationē morbi à iuuetute sunt familiares. At su-
pernum ventrē ne moueto, cæcutient enim, aut circa fauces
turbationes, & alia infestabūt. Verūm ptisanæ succū dato. Si
verò etiā valde facilis sit ad vomitū, vomat. Collutio autem
optima est ex narcisso. Subdititiū verò id quod ex canthari-
dibus præparatur. Quum vteri apud præcordia constiterint, *Cum super-
rior ventri-
culus non
uexandus.*
B suffocatur velut à veratro, & recta ceruice spirat, & stoma-
chus fortiter vellicatur. Quādā etiā vomunt quādoq; saliuā
acidā, & os aqua impletur, & crura perfrigerātur. Tales si nō
breui à præcordijs vteri discedant, loqui non possunt, & par-
tes circa caput ac linguā torpor occupat. Proinde ad vteros
quidē lanā quāmaximè fieri potest ad foramen apponito, *Curatio
quæ.*
ita vt pennæ obuolutā, vnguēto albo aut Aegyptio, aut Bac-
chario, aut amaracino tingas. In nares verò, de pharmaco
nigro ad caput præparato, specillo exceptū infarcias. Si verò
hoc nō fuerit, silphij succo nares illinas. Aut pennā aceto tin-
gito, & immittito, naresq; illinito. Aut sternutatoriū apponi
to. Quū autē cōclusum fuerit osculū & internus trames, ca-
storium in vino bibendū dato. Nares verò phocæ adipe illi-
nito. Lanam autē appositā finito, donec cōsidant. Quum autē
quieuerint, auferre oportet. Si verò ea ablata rursus recursa-
rint, lanā rursus eodē modo apponere. Sub nares verò cornu
capræ nigrū, aut ceruinū suffire, scalpū & in cinerē calidum
inspersum, quo maximè suffumigetur, & nidorē sursum per
nares quāmaximè potest trahat. Suffito etiā phocæ adipē,
prunis testæ impositis, ipsaq; obuelata, & capite imminente,
quo odor maximè ingrediatur, ita vt de adipe instilles, &
ipsa odorē sursum trahat, os verò clausum habeat. Et si quidē
sursum allapsi fuerint vteri, hæc facere oportet. Si verò ad he-
par cōuersi fuerint vteri, mulier derepēte voce destituitur, &
dentes cōserti sunt, & color liuidus fit. Derepēte verò hæc pa-
titur sana existēs. Cōtingit autē maximè virginib. antiquis,
& viduis

*Cum uteri
iecur ue-
xant.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

*Vterorum
inflammatio
diuersi-
corum af-
fectus.*

Medela.

Curatio.

& viduis quæ pepererūt aliquādo, & viduitatē agūt. Maxime verò cōtingit omnino nō ferentibus vterum, & sterilibus, ex partu. Nō enim prodit puerperij purgamentū, & nō intumescit vterus, neq; mollitur, neq; vomunt. Quū sic habuerit, tumore ab hepate cū manu infra leniter derrudito, & præcordia cū fascia deligato, & os aperito. Vinū verò odoratissimū dilutū infundito, quādo sanè etiā graueolētia ad nares adhibere ac suffire cōuenit, ad vteros verò odorata & suffimenta, & postquā sic curaueris, pharmacū deorsum purgās bibendū dare oportet, si quidē biliosa fuerit, quod bilē purgat. Si verò pituitosa, quod pituitā. Et postea lac asininū coctū bibendum præbeto, & vteros odoratis foueto. & medicamentū quod cū buprestī præparatur apponito, postridie verò netopū. Interpositis autē duobus diebus rursus vteros odoratis colluito, & postea intermisso die, aromatis suffito. Atq; hæc vidua faciat. Optimū autē in ventre habere. Virginē verò persuadeto vt viro cohabitaret. Ad nares autē nihil adhibeto, neq; medicamentū ieiuna bibat. Verū castoriū & conyzā in vino odoratissimo bibat per dies viginti, & caput odorato aliquo ne vngat, neq; aliquod odoratū olfaciat. Si verò vteri inflāmati fuerint circa latus, si cōtigeris durum apparet, & quum ad præcordia allapsi fuerint, strāgulant, & vomit pituitā acidā, & dentes stupeſcūt & vbi vomuerit, melius habere videtur. Quum verò deorsum processerint, discedunt de ventre aliās aliō. Maxime verò ad laterū mollitudinē quādoq; incidunt, & ad vesicā, & vrinæ stillicidiū corripit, & ad sedē, & cacare sibi videtur, & menses prius aut posterius solito hūnt, aut nō statim huic apparet. In hoc morbo si sursum strāgularint, tepesfactoria apponito, & graueolentia ad nares suffito, ad vteros autē odorata, & conyzā fœminā, & castoriū, in vino ieiuna bibat. Postquā verò ad naturā suā confederint, placidē suffito. Bibat autē vrinā cientia, Atq; hæc faciat quā diu dolores tenuerint. Vbi verò quieuerint, totā foueto. Deinde pharmacum deorsum purgās bibendū dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat: si pituitosa, quod pituitā ducit, & lac asininum bibendum dato, aut serum caprinū decoctum. Si verò lienosa fuerit, lac ne bibat, neq; serum, & in purgationibus, cibis vtatur mollibus, & per aluū secedentibus pisces autē meliores sunt carnibus, & vteros foueto, aut subdititijs purgato, ipsosque

- A** ipsosq; colluito, & vbi suffitū admisit, ad virum accedat. Solutio verò morbi cōtingit, vbi in ventre cōceperit. Si vteri ad latera allapsi fuerit, tussis obtinet, & dolor sub latus. & infidet vterus durus velut pila: & ad cōtractū dolet, velut ab vlcere, & cōtabescit, & videtur ipsi peripneumonia esse, & cōtrahitur, & gibbosa fit, & menses nō apparent, Aliquibus aut quibus prius apparuerunt, etiā pereunt: & si tunc prodeant, imbecilles sunt, & pauci, ac deteriores. & genitura nō fit hoc tēpore. Quum sic habuerit, pharmacū deorsum purgās bibendum dato, & multa calida lauato, & ex tepesfactoriis quacūque admiserit adhibeto, & à quibus sanguis purgatur ea apponito. Et lini semen torreto, tundito, ac cribrato: & peplum
- B** albū et saluiā cū tenui polenta, & caseū caprinū muria derasa. Hæc misce, vt casei sint partes duæ, reliquorū vero, et potetē nō salsa pars vna, et ieiunē in vino bibēda dato. Vesperi vero cyceonem crassum melle affuso exhibeto, et ex potibus quencunq; admiserit bibendū dato. Et frequenter fomentū adhibeto. et calidā aspergito. et per ceratū leniter mollito, ac à latere detrudito. et latus fascia lata deligato. Et lac bubulū q̄ plurimū ad dies quadraginta bibendū præbeto. Cibis autē vtatur q̄ mollissimis. Morbus hic uehemēs est et lethalis, et pauca etiā sic curentur effugiunt. Si vero in lumbis fuerint vteri, aut in lateris mollitudine, et spiritus sublimis iuerit, & suffocatio habeat, & anhelatio densa ipsam corripit et moueri nō vult: sulphur, aut bitumen, aut cicutā, aut myrrhā terito, et melle cocto affuso, glandulā longā efformato ac crassam, eamq; in sedem indito. Si vteri deuoluerint seipsas ad intermediam lumborū ac coxarū partem, dolor habet inum ventrem, et crura cōtrahuntur, et iuncturas coxarū ad sedem dolet. et quum aluū exonerat, dolores emergunt acuti, et steracus cum violentia prodit exigū, et vrina destillat, et pusillanimitas ipsam corripit. Quum sic habuerit, fistulā ad vesicā alligare oportet, et oleū calidum in vteros infundere. Et fomentum adhibere, aut multa calida aqua lauare, et in oleū et in aquam desidere. Suffire autē subter pudenda, graueolētia sub nares vero odorata. postq̄ aut dolor quieuerit, pharmacū sursum purgans dato. Infernū vero ventrē turbare nō oportet. Vbi verò vteri cōfederint, pharmacū deorsum purgās bibendū dato, et lac asininū, si nō fuerit lienosa. Postea fomēta adhibeto

*Cum uteri
latera pen-
tunt.*

Medela.

Curatio.

*Cum uteri
lumbos mo-
lestant.
Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

adhibeto vterosq; aspergito. & subdititiū purgatoriū quod D
cum lauro præparatur, & nō mordet, apponito. Deinde ro-
matis suffita, ad virū accedat. & si in ventre habuerit, sana fit.
Verū pleræq; steriles & cruribus mutilatæ sunt. Quibus-
cunq; osculum aliò inclinatur, & ad coxam allabatur. Cōtin-
gunt enim & hæc, quæ vterum purgari phibent, & geniturā
fufcipere, & liberos gignere. Hæc odoratis fouere oportet. &
post fomentū, digito reuellere & à coxa disparare. & postea
radulis & plumbeis fistulis immisis dirigere. Nō em̃ velo-
citer cogi potest, velut dictū est. Cū autē ad naturalem situm
redierit, & vteri aperti fuerint, subdititijs mollibus purgato
& alia cōuenienter facito. Quibuscunq; vteri ad coxā colla-
buntur, si nō breui discedāt, & rursus in locum suum redeāt, E
ad coxam resiccātur. Necessarium est autē osculum auersum
esse, & in supernis detineri. Quum verò auersum fuerit con-
clusum esse. Ex auersione verò ac cōclusionē, durum fieri, &
mutilatum esse. Vbi verò vteri cōclusi fuerint, mēses sursum
ad māmās delegare, & ad pectus ascendere facit, & imus ven-
ter attollitur, & inexpertæ in ventre se habere putant. Talia
enim patiunt, qualia pregnātes, vsq; ad septem aut octo men-
ses, et venter pro temporis ratione crescit, et pectora eleuan-
tur, et lac innasci videtur. Quum autem hoc tempus præterie-
rit, & māmæ gracilescunt ac minores fiunt, et venter idē per-
petitur, et lac euanescit, venter item eo tempore in quo se pa-
riturā sperabat, euanescit ac cōcidit. His verò contingentib⁹,
vteri modico tempore fortiter cōtrahuntur, et osculum ipso F
rum reperire nō datur. adeò omnia cōtrahuntur ac resiccantur.
et in māmīs tubercula fiunt dura, partim maiora, partim
minora. Hæc autem non fiunt suppurata, sed semper duriora.
Deinde ex ipsis nascuntur cancri occulti, Cū autem cancri
futuri sunt, prius ora amarescūt, et quicquid ederint, oīa ama-
ra esse vident. & si quis plura dederit, accipere renuūt, & cō-
pescenda faciūt. Mente verò percelluntur. & oculi duri fiunt,
& nō acutē vident: & ex māmīs dolores ad iugulū transfiliūt,
& sub scapulas. & sitis tenet. & māmæ graciles, & ipse per to-
tum corpus attenuatæ sunt, & nares sicce ac obstructæ sunt, &
nō leuant. Spiritus est imminutus, & nihil oīno olfaciunt, &
in auribus dolor quidem nō oboritur, verū aliquando callo-
sa cōcretio. Cū igitur ad hoc temporis progressæ fuerint,
sanæ

*Cum os ute-
rorum alio
uertitur.*

Curatio.

*Quid mulie-
res fallat.*

- A** sanæ fieri nō possunt, sed perçunt ex his morbis si verò priusquam huc perueniant curatę fuerint, et mēses soluti fuerint, sanæ fiunt. At verò curare tales oportet hoc modo. Primūm quidem omniū si adhuc fortem assumpseris, reliqui corporis respectu habito. quacunq; tādē purgatione opus habere videtur, medicamentū exhibeto. Vbi verò corpus præparaueris sic ad vterorū medelam procedito. Si verò totū corpus minime mouēdum esse videat, neq; morbi causę hinc proficisci, verūm vteri à seipsis morbū habeāt, curam hoc modo auspiciare. Primūm quidē vteros sic foueto. Ollę duas sextulas capienti, operculū imposito ac adaptato, vt nihil præterspiret, deinde verò operculi fundum pertundito ac foramen facito. In foramen autem arundinem indito longitudine cubitalē.
- B** Oportet autem arundinē operculo probē adaptari, vt penitus nihil præterspiret. Cū autē hęc paraueris, operculū ollę obdito, lutoq; oblinito. & vbi hęc feceris, fossam duorū pedum altitudine effodito, ea magnitudine quę ollam capere possit. postea verò ligna immissa vrito, donec fossa ab igne exscādescat. Quod vbi factū fuerit, ligna ac prunas quę crassissimę ac ignitę fuerint, eximito. Cinerē verò ac fauillā in fossa relinquito, Quū autē olla efferbuerit, et vapor sursum processerit, si quidem valde calidus fuerit vapor, abstineat. Si verò nō, summę arūdinis parti infideat, ipsamq; in vteri sto machum indat. Atq; sic fomentū admittat. Si verò perfrigere tur, prunas ignitas adjicito, cauēdo vt ne acutum fomentū facias. Si verò adiectis prunis, acutum fiat fomentū, magis q̄ cōuenit, prunas detrahito. At verò hoc fomentū clemētī cœlo parare oportet, vbiventus nō afflarit, neq; perfrigeret. Ipsam autem indumētis obuelatā esse oportet. Cæterum in ollam allium siccum injicere oportet, idq; magis cōminutum q̄ ea quę sunt contusa. & aquā affundere, quo ipsum permadescat, & aqua tribus digitis ipsum excedat. & phocę oleum superfundere, atq; sic calefacere, ac fomētum adhibere per multū tempus. post fomētum verò si potens fuerit, lauetur toto quidem corpore ad voluptatē, lumbis autē & partibus infrāvmbilicum, amplius. In cœnā porrò dato mazā, panem, & allium coctum. Postridie verò si quidem exoluta fuerit à fomento, eam diem intermittito. Sin minus, rursus fomētū adhibeto. A fomento verò si cōsiderare hoc potest, osculum contingere

*Cura quæ.**Fomentum aduerte.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

subeto, num fomentū ipsum vteros flatu implet. Si enim fla- **D**
tu implentur, osculum ex valida auersione, & ad coxā allapsu
magis dirigunt, ac aperiuntur. Tanq̃ igitur tale sit fomentū,
& hæc facere possit, sic fouere oportet. Quum autē fomentū
adhibebis, allium iniicere oportet, & phocæ adip. superfun-
dere. Atq; hoc faciendum est. donec vteri videbuntur inflati,
& osculum fortiter sursum tractū. Nam ad hoc fomentum
talīa cōtingent. Post fomentum verò dictā constituito, velut
priusquā fouebatur. Cū vero cōmoti fuerint vteri, ac facile
solubiles fiant, fœniculi radicibus foueto, & aliam ollam eo-
dem modo præparato. Radices autem fœniculi elotas cōtun-
dito, & in ollam mittito, & affusa aqua eodem modo fomen-
tum facito. Postea verò lauato: & ad vesperā mazam coenat. **E**
Si vero panem voluerit, & boldidia parui polyporū generis,
& sepiolas paruas, in vino ac oleo coquito, & edenda dato. At
inter fomenti adhibitionem, osculū cōtingere coneris, an fo-
mentum vteros propinquissimè adducat. Hos fouere oportet
ad dies quinq; vel sex. hominis consideratione habita. & si
quidem exoluat ac debilis sit, differre ad sufficiens tempus.
Si verò nō exoluat, fouere per oēm diem. Post fomenta verò
subdititia apponere conare, ex albicante tæda pinguisima.
Illitio autem sit oleum. facito autem hæc longitudine quidē
digitorum sex, numero vero quinq; vel sex. figuraverò in an-
gustum abeunte. Sit autem alterū altero paulò breuius. cras-
situde verò eius quod crassissimū est, sit digiti indicis, & for-
ma similis digito, summa parte tenuissima, in p̃cessu verò **F**
crassior. Hæc aut leuissima, ac rotundissima facito, cauēdo ne
vlla adsit fissura. Apponat aut primū id qđ tenuissimū est, &
vbi apposuit quiescat, obseruās ne excidat. Apponatq; primū
summā partē, deinde semper amplius, simulq; obtorqueat ac
circūcirca tædā intrò tradat: & vbi parum susceperit, in hoc
paruo se cōtineat, cauendo ne excidat. postea rursus eodem
modo intrò tradat, donec quatuor digitorum mēsurā intra
osculum vterorū recipiat. Cū autē hæc susceperit, alterum
postea apponat simul vt prius initum aufert, quo priusquam
osculum cōnieat recipiatur, dum adhuc rectum est & aper-
tum. Hoc aut ita cōtinget, si alterum eximatur, alterū autem
indat. Oportet autē & plūbū simile figura crassissimæ tædæ
formatū intrudere, quod cauum sit, quo cōtinere quid possit.
plumb

Cibus.

A plūbi verò amplitudo sit talis fabricata, qualis in vlcera impellitur, ita vt os ipsius leue sit, & nō sauciet, formato autem hæc velut etiā subdititia ex tædis. Quū autē factus fuerit huiusmodi plūbeus penicillus, adipe nullo trito ipsum expleto, & vbi ita præparatus fuerit, tædā quidem subtrahito, plūbum autē indito. Si verò plumbū appositū ardorē exhibeat, plumbū quidē detrahito, tædā verò rursus apponito. Et plūbum in aquā frigidā immergito, & postea rursus apponito, ac tædam eximito. Semper autē aliquid appositū esse oportet, & interdiu quidem melius est tædā habere, noctu autem plumbum. Si verò surgere voluerit, cum cautione hoc faciat, quo penicillus intus quiescat. Sin minus, statim rursus subdatur. Si verò ex tædis appositis nullā suscipiat, tenuiorē facito, donec suscipiat, ex his ad illa trāseundo, & obedientes vteros faciendo. Si verò neq; osculū aperiri poterit, neq; vteri propè accesserint, rursus ad veterē medicinā redito, à prima ad secundā, donec mollescat, & propinquissimè accedat. Et postquam aperti fuerint subdititia facta apponito. Sint autē magnitudine oliuæ. Horum autē alterum appositū sit donec lique scat, & deinde alterū apponito. Quum autē apponere voles, ipsum subdititiū medicamentū ex resina præparatum, in oleum rosaceū aut irinū tingito. Nam aliàs ab osculo vterorum recedit. Prius tamen plumbū appositū esse oportet, quo recto osculo, in internā osculi partē attrahatur. Postea verò mollitoria apponito. Lauet autem calida, & ante, & post subdititia medicamenta. Et in cœna exhibeto quid ex relatis marinis. Exhibeto autem duobus aut tribus diebus ab appositione, cōsideratione habita an osculū vterorū bene habeat, & purum sit. Quod si est, ab hoc subdititio quiescito. Postea verò mollitoria apponito. Quum verò inflammatū fuerit os vterorū, rursus eodē modo pharmaca apponito, reliquæque facito iuxta relatū modum. Vbi verò probè habuerit corpus, velut dictum est sufflato. Sed & osculum, & vteros sufflare oportet sic. Subdititiū factum cum ficu apponito, duo autem subdititia facito, & antequā subdas fomentū adhibeto ex forniculo prius relatum, posttridie verò post fomentū, apponito medicamentum, & quum apponere voles, præ omnibus subdititijs vbi prius laueris ipsam ita apponito, postera autem die mollitoria auxiliantur quādiu inflammati fuerint, post

HIPPOCRATIS LIBER II.

inflammationem verò alia facito iuxta priorem rationē, fa- D
 cito itē de hoc subditio talia, qualia de priore. Et si quidem
 in mense semel appositū, satis videbitur inflasse vteros, quie-
 scito. Si verò aliqua opus habuerit, rursus apponito eodē mo-
 do quo prius. postea verò vbi bene habere tibi visa fuerit, &
 tempestiuum esse, fomentum ex suffimentis præparato, præ-
 paratur autem hoc modo. Cyperum tusum præparato testæ
 conchæ mensura, & calamum vnguentariū eadem mensura,
 & iunci vnguentarij tantundem, cardamomi tantundē. Cu-
 mini item Aethiopici, anisi, & rutæ siccæ, & hyperici ac fœ-
 niculi seminis. Quū autē hæc præparaueris, vini austeri albi
 odoratissimi heminas sex in ollam infundito, & de contusis
 quadrante inspergito ac permisceto. Deinde vnguētī Aegy- E
 ptij optimi, aut amaracini, aut irini, triū obolorū pōdus affun-
 dito, permisceto, & molli fomēto plurimo tempore foueto.
 Ante fomentū verò lauato, & duos aut tres dies foueto. Quū
 autem foueri desierit, operculum quoddā fomēto imponere
 oportet, vt ne transpiret, postea verò tædis & plumbis vtete.
 Quum autē duobus aut tribus diebus fomētum adhibueris,
 alias duas aut tres intermittito. Intermedijs autē diebus bis
 in die lauato. Edat autē porrum coctum & crudum, & rapha-
 nos, & nasturtiū, & allium assatū ac coctum, & potus sit me-
 racior, & marinis prædictis vtatur. Quū verò intermedij dies
 præterierint, rursus fouere oportet, ita vt modicū de singulis
 contusis ad prius fomētum inspergas, & vinū insuper affun-
 das, si opus esse videbitur, itemque oleum, atq; cum hoc fo- F
 ueas. Postquā autē fomenta bene habere tibi visa fuerint, &
 osculum molle esse ac apertū, velut cōuenit, & ipsi vteri pro-
 pè: postera die à fomento, pharmacū quod cum myrrha præ-
 paratur apponito. Sunt autem appositicia duo, postridie verò
 post purgationem, mollitoria subdito, quandiu vteri fuerint
 inflāmati. Postea verò tædis ac plūbeis penicillis vtete. Post
 hæc intermissis diebus quotquot visum fuerit respectu ad
 inflammationes vterorū habito, & viriū corporis coniectura
 facta rursus velut scriptū est refoueto. Si quidē prius fomen-
 tum adhuc sufficiens esse videbitur cōiectis ad hoc suffimētis
 velut prius, & vino ac oleo affuso. Si verò inutile esse prius
 illud fomentū videatur, aliud ex integro præparato. Opor-
 tet autem hoc pharmacum renouare in singulis adhibitioni-
 bus,

Abus,quandiu subcruenta purgantur.Si verò talia purgata fuerint,quiescat. Diæta porrò hoc modo constituatur. Interrogato in quibus diebus menses ipsi prodierint,& ab his initio facto,hanc diætam præscribito.Primùm quidem multa calida lauetur,capite excepto. Quum autem cessauerit,caseum acrem,& rutam, vino nigro pari aqua temperato diluito,& postea polenta inspersa, statim ex balneo bibenda dato. Deinde prædium tempestiuè exhibeto. Edat autem mazam aut panem,& porrum coctum aut crudum,& de huiusmodi omnibus acribus præscriptis,& aliquando leguminis fracti decoctum:spumâ autem ne detrahito,& silphium multum de rasum addito, ac multa allia incoquito.Obsonijs autem vtatur pisciũ, chartilagineis omnibus coctis aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto:bolbidijs, polypodijs, in vino & oleo.& silphij semen tritum bibat.& quàm plurima tum in prandio, tum in cœna edat. Laetetur autem post cœnâ, quum requiescere volet. Hac diætâ ad dies quinque vel sex vtatur. post hos dies, mane ieiunæ sambuci fructus baccas sex, in vino meraco dato, & sepia: oua decem aut duodecim. Hæc tria simul in ane ieiunæ bibenda præbeto. post hoc verò pharmacum, portionem dato. At vbi interquieuit lauetur. Sit autè potio, ruta & caseus, atque sic prandeat præscripto modo. Serius autem cœnet. & semper bis in die lauetur. Hæc autè diætâ ad dies tredecim aut quatuordecim procedat. Quum verò hi dies præterierint, catapotia ex succo silphij fabæ magnitudine formato, atque hæc primùm dato, postea verò alia præscripta facito. Quum autè dies transacti fuerint viginti quinque in hac diætâ, reliqua quidem facito eodem modo. Ante prandium verò vbi prædere volet, allij segmenta quatuor, & caseum acrem tali magnitudine, terito & polentam modicam ammisceto, ac massam efformato, eamq; primum edendam dato. Ante cœnam verò meracum absorbeat, atque ita cibum capiat. De cætero verò eadem diætâ vtatur. Quum autem nouem dies reliqui fuerint ad tempus mensium, primùm hoc dato. Cum ouis & sambuco, cuminum Aethiopicum, & castorij obolum. Vbi verò duo dies reliqui fuerint, ab his omnibus potionibus ac catapotijs abstineat. Verùm pharmacum cum tæda præparatum ieiuna vbi lauit, sumat. Post medicamenti verò potum, mercurialem & brassicam simul in aqua

Victus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

cocta dato, cum aceto mulso dulci, aut fauorum cremore co-
cto, sale, silphio & oleo condita. Atque hæc in prandio eden-
da præbeto, & succos sorbendos. & potum meraciorem bi-
bat. Obsonijs autem vtatur polypodio cocto aut sepiolis &
hæc quidem in prandio. In cœna verò sumat carnem capri-
nam, aut ouillam, aut agninam percoctam, & porrum, & alia
actia, quæcunque voluerit. A cœna verò lauetur. & hæc sit
diæta postremis duobus diebus. Si verò ex hac diæta men-
ses non fuerint detracti, sequenti mense eandem diætā ab
initio repetito, vsque ad postremos duos dies. In quorum
priori apposititia facta apponat, iuxta superiorē rationem,
ex pharmaco in aqua facto. Apponat autem prælota. Ve-
rūm considerare oportet etiam vteros quomodo habent, quo
semper omni tempore bene habeant, & os rectum ac aper-
tum sit, & si ita visum fuerit ante appositionem fomenta ad-
hibeto. Quod si eruperint menses, si quidem frequentes fue-
rint, paucioribus lauacris vtendum est, & reliqua diæta ac cu-
ratione. Si verò pauciores, pluribus. Si verò significationem
de se præbuerint, rursus eadem diæta vtendum est, ac cu-
randum donec menses apparuerint. Quum autem semel ta-
libus prodierint, optimum fuerit in ventre concipere. At-
que hæc est omnium huiuscemodi morborum curatio. Si
vteri contingant coxam, & incumbant, dura ac solida sit co-
xa ad lateris mollitudinem, & dolores imi ventris, & ad ip-
sam lateris mollitudinem, & lumbos ac crura dolor incidit
ac extenditur, & suppurantur, & linamentis opus habent, &
percunt, nisi quid seces aut vras. Quum sic habuerint, phar-
macum deorsum purgans bibendum dato, & multa calida la-
uato, & vteros foueto, ita vt urinam veterem in peluim in-
fundas ac feruefacias, & supra ipsius cavitatē mulierem col-
loques vestibis contestam, vt ne præterspiret, & si frige fiat
urina, ferri igniti frustra in urinā immittas, & fomentum fa-
cias donec se obscure videre, & animo deficere dixerit. La-
uato autem calida aqua, & postea digito contingens os ute-
rorum ad sanam coxam trahat. Et noctu mollitoria apponat
Postquam autem dixerit directum esse, facto prius cum odo-
ratis fomento, rursus mollitoria quædam apponito. Imò &
plumbeos penicillos per triduum, singulis diebus vnum post
hos verò bryoniā albam, aut scillam per triduū, postea verò
confide

*Cum uteri
coxam dicem
percunt.*

Medela.

A cōsideratis mēſibus diſce, an bilioli ſint, aut pituitoſi, aut an ſanguis ſit corruptus. & ſi opus fuerit ipſi ſanguinē purgare, quocunq; maximē opus habere tibi viſa fuerit, id apponito. Et poſtea cū eiſmodi colluito. Apponito autē ſubdititia medicamēta, donec ſanguis purus educatur, & hoc per triduū fa cito. Deinde ceruinū adipē liquatū, molli lana eo imbuta apponat. poſtea per diē pulegium ſubdat. & aromatis ſuffita ſic ad virū accedat. Si verò ex partu morbus fiat, vbi ex vrinae fomēto penit⁹ purgata eſt, ſtatim ad odorata accedat, & poſtea lota, oleum album Aegyptium ad ſanā coxā apponat, & ſu per hāc decumbat. Si verò neq; ad hāc tranſmoueātur vteri, ieiuna pēonia grana nigra quinq; in vino odorato bibat. Et in cibo ſumat allia cruda, & aſſata, & cocta. Obſonijs autem vtatur pauciſſimis. Si verò ſana non fiat, ſimiliter ipſam purgato velut in priore dictū eſt. Cāterū in hoc morbo ſi non ſtatim in vētre habuerint, ſteriles ſiūt. Si verò ſic habuerint, mēſesq; nō ſiant, neq; febrilis calor corripiat, primū pharmacis ſurſum maxime purgato. Si verò debilis fuerit, deorſum. Et poſt pharmaci portionē, ſi pituitoſa eſſe viſa fuerit, vomat ieiuna, & accepto cibo, et plerunq; ſana fiet. Si vteri ad coxam decurrerint, mēſes craſſi exiſtentes nō prodeūt. Verūm dolor ad imum ventrē procedit, et ad lateris mollitudinem, & morſum percipit. Quū ſic habuerit, multa calida lauato, & allia plurima edenda dato, & lac cōuenienter bibendum. deinde vinum meracū. & totā foueto. & pharmacū ſurſum purgans exhibeto. Si verò debilior fuerit, infra. Si verò curata fuerit, vteros cum ſœniculo foueto, & abſinthium am miſceto. Poſtquā autem recens ſota fuerit, os vterorum ſenſim, cum digito ad ſanā coxam detrahito, ita vt & ipſum os, & partes circūcirca affectas leniter mollias, & mollitorium quoddā apponas, & poſtea plumbeos penicillos, & mox ſcil lam, deinde narcifſinū vna die interpoſita. Quum verò pura eſſe viſa fuerit, netopū apponat in lana. & poſtridie oleū roſaceum. At mētib. prodeantibus, melius eſt nō apponere. Si verò non prodeant, cantharidas quatuor ſine alis, ſine pedibus, & ſine capite. & pæoniae grana nigra quinq; & ſepiæ o ua, & apij ſemē modicū, in vino bibat. Et ſi dolor affuerit, & vrinē ſtillicidiū vexarit, in aqua calida deſideat. et aquā mul ſam aquoſam bibat. Si verò nō purgetur, rurfus pharmacum

*Cum morſu
bus ex para
tu contrahit
tur.*

Medela.

*Cum uterū
coxæ dicem
petunt.
Curatio.*

Medela.

HIPPOCRATIS LIBER II.

bibat. Si autem purgatio prodeat, ieiuna cum viro coeat. Si D
verò non prodeat, dato quod detrahat ipsam, respectu ad vi-
res mulieris habito. & tunc tutum est ut ad virum accedat. Si
enim in ventre habuerit, sana euadit. In purgatione verò si
multa prodeat, mercurialē edat, & polypos teneros coctos. &

Cum coxę dicę uexat. cibis mollibus utatur. Si puerperę vteri in coxā incubue-
rint, aut ad lateris mollitudinem, ad alteram coxam oleum
Aegyptium album, aut rosaceum apponito. Sed & in sanā co-
xam decumbere melius est. Bibat autē pæonię grana nigra
quinq; & sambuci fructus in tædis conchę testā maiore, &
castorium magnitudine fabę. Et cibis utatur mollibus. Con-
uenerit autem mercurialis ante cibum, cocta velut brasiica.

Medela.

Sorbeat autē & ipsam decocti aquam. & acria comedat, exce E
pris raphano & cenis ac nasturtio. Optima est & lactuca.

Vterorum morbi.

Quot verò morbos ex vteris fieri contingit? Dico autem
quū vteri ex loco moti fuerint, aliò aliàs allabuntur. Ad quē-
cunq; verò locum allapsi fuerint, dolores ingētes incumbūt.
Et si quis vesicam cōtingat, dolorem exhibent, & vrinam nō
fusiipiunt, neq; geniturā in seipsos trahunt, & ambo dolent.
& si non celeres solutiones fiant, vteri postea suppurantur iu-
xta eosdē locos, si ad ipsos decurrerint. Contingit autem hoc
& in laterū mollitudine, & in inguinibus, & super pectine.
Caterū in principijs quum dolor habuerit, sic curare oportet,
& tepesfactoria adhibere, & in aqua calida sedere. Bonum
enim & hoc est: aut spongijs ex calida aqua expressis fouere.
& pharmaca vteris cōmoda bibere. Si verò ad hæc non solua-
tur, pharmaco sursum aut deorsum purgare, utro tandē opus
fuerit. cognosces autem id hoc modo. Si enim ad inguina, &
pectinē, & vesicam irruerint, hæ purgatione sursum opus ha-
bent. Si verò ad laterum mollitudinē, et præcordia, hæ phar-
maco deorsum purgante indigēt. At verò huiuscemodi mor-
bi omnes senioribus magis q̃ iunioribus fiunt, ad menses sup-
pressos. fiunt etiā iuueniculis, vbi multo tempore viduę mē-
serint.

Cum uteri sedē petunt.
Medela.

Si verò ad sedem cōuertantur vteri, secessus recre-
menta impediuntur, & dolores occupant lumbos, et imū vē-
trem, et intestinū rectum ac podicem. Quum sic habuerit, ca-
lida ipsam lauare oportet, et lumbis fomentum adhibere, et
postea graueolentia subter suffire, et apponere quę purgant
et impellunt vteros. et bibenda dare quęcunq; libenter ad-
miserit

A miserit ex maximè conferentibus. Si verò incumbant in inguina, & vrinæ meatus, dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus. & vrinæ meatus obruratur, & vrinā nō emittit. Curare verò oportet hoc modo. Ad nares quidē odorata apponito,

Curatio.

Quā faciliē meri moruantur.

& vnguenta. Ad vteros verò graueolentia suffito. Porro omnis occasio vteros propellere potest, si quid mali habeant. Nam & à frigore pedum ac lumborum, & à saltatione, & terrore, & lignorū sectione, & cursu ad accliuē ac decliuem locum, & ab alijs multis propelluntur. Proinde hæc cōsiderare oportet, ad totum corpus respectu habito, quum præsentēs morbi affuerint. propter talia em̄ omnia necesse est plus aut minus ægrotare. & postquā hæc reluxerint, maximè hæc parte repētini morbi manifesti fiunt. Quū igit hæc aduenerint,

B penitius ex tota homine deprehendere oportet. Nā quæcūq; perfrigerationes crurum, aut stupefactiones ex frigore fiūt, hæ omnes etiam in vterorū morbis vteros eleuāt. In talibus itaq; aquā calidam affundere oportet vteris & circūstitis locis. & ipsos ac crura excalefacere, quū allapsi fuerint. Si circunuersi fuerint vteri ex partu ad dextrā partem, & puerperij purgamēta nō fiant, & dolor imum ventrē habet, & lumbos, & laterum mollitudinē. & dextrū crus grauatur, & torpor occupat. & non tremit, & osculum vterorum contingere nō potest, sed ipsos leues ac fortiter planos deprehēdet. Quū sic habuerit, pharmacū bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. magis verò deorsum. & totū corpus foueto, &

Cum post partū ad dextrā declinant.

Medela.

C præsertim vteros leniter. & calida bis in die lauato. & ex potibus quæcūq; libenter admiserit, experimento facto præbeto. & viro frequenter cōdormiat, & brassicā edat. Si vteri ad sinistram partē, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac vehemens habet lumbos, & laterū mollitudines, ac ipsum crus. & claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & postera die suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, & oleæ folia parum confringito, et gallā cōrundito ac cribrato, & hyoscyami tertiam chœnicis partē. Hæc mixta & olei hemina dimidia subacta in olla noua, per dies quatuor suffito. Nocte verò lac bubulum, & mel, & aquā bibat. & calida lauetur. Si vteri transuersim situm habeāt, & obliqui fuerint, itemq; os ipsorū, menses ipsi partim occultantur, partim prius cōspicui euanescent, & non si-

Sin sinistram petant.

Medela.

Cum obliquantur.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Medela.

miles sūt, sed deteriores & pauciores quā antea. & genitura **D**
nō sit hoc tempore. & dolor habet imū ventrē, & lumbos, &
coxā, & ipsa attrahitur. Quū sic habuerit, pharmacū infra pur
gās bibendū dare oportet, & calida lauare, ac fouere. Vbi ve
rō recens fota & lota fuerit, digito immisso os vterorum cor
rigat ac dirigat. & odoratorum suffitū admittat. & ex potib.
dato iuxta experimentū, quē libenter susceperit. Cibus autē
vtatur mollibus, & allia edat cruda ac cocta. & cum viro dor
miam. & in sanam coxā decumbat. Alteri verō fomentū ad
hibeat. Morbus autem hic agrē cedit. Si verō propinquissi
mi fuerint vteri frequēter vomat. Vteros autē graueolentib.
suffiat, donec in locū suū firmati fuerint. Dieta verō ventrē

*Cum uteri
extra natu
ram progre
diantur.*

non emolliente vtatur. Si vteri extra naturā progressi fue
rint, febrilis calor habet pudendū & imū ventrē. & vrina fre
quenter ac paulatim destillat. & pudendū vehementer mor
detur. Partitur autē hæc si recens ex partu viro cōdormierit.
Quū igitur sic habuerit, mirti baccas, & loti ramēta, in aqua
coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, atq; sic frigi
dissimam pudendo affundito, & leuiter trita hæc apponito.
Postea aquā lentiū cum melle & aceto bibens vomat, donec
vteri fuerint retracti. Sed & lectū a pedibus altiore facere
oportet. & pudendū graueolētib. suffire, nares autē odoratis.
Cibus verō vtat mollissimis ac frigidis. & vinū aquosum al
bū bibat. & ne lauetur, neq; cū viro coeat. Si penitus ex pudē
do exciderint vteri, dependent velut scrotū. & dolor corripit
imum ventrē, & lūbos, & inguina. & quū tempus pcesserit. **E**
nō volunt in suū locū redire. Morbus autē hic corripit, quum
recens ex partu laborarit, aut fatigata fuerit, vt vteros contra
ctu læserit: aut cum viro coiuerit in puerperiorū purgatione.

*Morbi ha
ius causæ.*

Curatio.

Quū sic habuerit, frigefactorie mitigātia apponere oportet
ad pudendum. & quod extra propendet depurgatū, malo pu
nico in vino nigro cocto abluere, & intro protrudere. Deinde
mel & resinam pari vtriūsq; portione colliquare, & in pu
dendū infundere. Et decūbat supina pedes sursum extensos
habēs. Postea spōgias apponat, & ad lumbos deliget. Quādiu
verō sic habuerit, a cibus quidē ablineat, potu verō parcissi
me vtatur, donec seprē præterierint dies. & si quidē sic obedi
re voluerint & redire, satis sit: Sin minus, summas vteri oras
derasas & ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes ad sca
lam

A lam deligato, vt caput deorsum pēdeat, & manu intro detru-
dito. Postea lauato, & crura ipsius vicissim colligato, atq; sic
per noctē ac diem finito, & modicū prisanæ succū frigidū da-
to, aliud autē nihil. Postera verò die reclinato, & cucurbitam
quā maximā ad coxā affigito, & multo tēpore trahere finito,
& vbi ipm detraxiseris ne scarificato, sed reclinatā finito, & ni-
hil prater succū prisanæ exhibeto, donec septē praterierint
dies. Si verò sitis vexet, modicū aquæ bibat. Quū autē septē
transierint dies, cibus mollissimis ac paucissimis vtatur. Vbi
verò ventrem exonerare voluerit, decumbēs id faciat, donec
quatuordecim prateriant dies. Deinde tepidis fomētis col-
luatur, melius autē est calida velut ex sole. & quā parcissimē
deambulet, & ne lauetur. Ventrem autem ne solueris. Cibus
verò paucissimis vtatur, neq; acribus, neq; salis. & pudendū
graucolentibus suffiatur. & postquā obambulare inceperit,
subligar gestet. Si verò extra pudendum os vterorum exci-
derit: vtpote ceruice vterorum propē pudendū sita, & ampla
existente, sit autē hoc magis sterilibus, contingitq; maximē
ex fatigatione, quum mulier laborarit, & vteri calefacti fue-
rint ac exudarint: tunc euertitur os ipsorum per ceruicem vt
quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, quā in
priori tēpore, & vbi hoc contigerit, procedunt vteri foras ad
frigus, & osculum ipsorum euersum prodit. Et si quidē breui
curata fuerit, sana fit. Verū sterilis penitus relinquitur. Si ve-
rò nō breui, osculū durū semper ipsi extra erit, & fluet illic a-
liās atq; aliās saniosus humor viscosus ac grauolēs. Et si mē-
ses prodierint, si adhuc eius ætatis fuerit, in lecto decumbet.
Temporis autē progressu huiusmodi morbus incurabilis fit.
& consenescent vteros foris habentes. Si verò vteri extra
prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, oleoq; ac vino illi-
tos rursus indito ac deligato, & grauolentia subter suffito.
Sub nares autem odorata. Si verò multo tempore vteri pro-
mineant, & stupidē perfrigerentur, multā calidam aquam af-
fundito, quo refocillentur. Si verò iam insentur, etiam aceto
ad aquā ammixto foueto: Sitq; hæc aqua aut lauri aut myrti
decoctum, & leniter protrudito, & cerato vnguento illinito,
& si paruerint, satis est: Sin minus, cum aqua abluito. & aceto
medico tepesfacto perfundito. Deinde illinito. Vbi verò con-
sederit, ablutos velut dictū est indito, & alia prædicta facito.

*Cum vteri
procidunt*

Medicæ

Oleum

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Cum os vte-
rorum tor-
quetur.*

Curatio.

*Vterorum
ulcera.*

*Cum ual-
de procidit
et nusquā
sistitur.*

Medela.

Oleū verò ne adhibeto, neq; aliud pingue, aut pinguitudinē **D**
habens. Si quid ex osculis vteri cōplicatū fuerit, menses nō
fiunt, aut pauci & prauī ac dolorifici. & quū viro cōdormie-
rit, dolet. & quicquid vir immiserit ex coitu exit, & contingi
nō vult, neq; attrahit geniturā. Et dolor habet imum ventrē
ac lumbos. & os vterorū ad contactum non cōparet. Quum
igitur sic habuerit, vrina veteri foueto. deinde vomat à lētis
decocto, melle & aceto ammixto. Postea aqua calida lauetur.
Deinde oleo albo Aegyptio in phialā argenteā aut æneam
infuso, & sale addito cōtecta phialæ infideat, & si quidē odor
olei per os ipsi penetrarit, ipsam pariturā esse, & postera die
sanā fore pñucia, ac cōfidere iube. & vbi dormire volet, oleū
Aegyptiū in lana apponat. Postridie verò cōsideret an os vte **E**
rorum magis sit directū. & si esse dixerit, per triduū odoratis
foueto, & subdititia quę nō mordeāt apponito, purgatoq; &
cū odoratis ac mollibus postea colluito, toridē diebus velut
prius. quū autē mēses p̄dierint, ieiuna, & illota, aromatis sus-
fita, ad virū accedat, Pleraq; verò ex hoc morbo steriles fiūt,
si nō curatus fuerit. Si vlcerati fuerint vteri, & extremē fo-
ras processerūt, oleo illitis manibus indito. et myrrhæ puræ
pilulas tres deuorādas præbe. et laurū viridem tritā bibat vi-
no dilutam. et sic sana fiet. Si in actum cōtracta fuerint pu-
denda, subdititium apponito. Anisi videlicet semen et apiij
tritum pudendis subdito Si vteri nō in loco manserint, sed
modo huc, modo illuc trāsierint, vt dolores exhibeāt, et nūc
incōspicui fiant, nunc exeāt velut sedes. et quū quidem supi. **F**
na fuerit, in loco maneant, quum verò surrexerit, aut ex som-
no expergiscatur, aut se inclinauerit, aut alium quendā motū
fecerit, exeunt. sepe verò etiā dum quiescit. Hāc quā maximē
quiescere, et nō moueri oportet. et lectū à pedibus sternere
altiore. et vomitibus vti. Oportet enim ipsos sursum reuel-
lere, et acerbis perfundere. et graueolētia subter, suffire. Sub
nares autem odorata. et ex malis punicis quodcūq; maximē
cōuenerit et nihil impedierit, in medio per vmbilicū perfo-
ratum, in vino tepefactū quā penitissimē subdito. deinde la-
ta fascia deligato ac circūdato, vt ne elabatur, sed maneat, et
quod opus est, faciat. et de peplo, cū caseo, et polenta biben-
dum dato, quēadmodum supra in allapsu scriptum est. et de
potionibus experimento facto, quācūq; maximē admiserit,
bibend

- A** bibendā præbeto. Cibis autē mollissimis vtatur, & cum viro ne dormiat, donec ad locū suum redierint. Si vteri exciderint, hederā siccissimam tritā, ac linteo alligatā apponito, & nihil pingue adhibeto. In potu autē exhibeto triticū recens, & peplum album, & syluiā, & cyperum, & anisum. Hæc trita vino diluta, cū fursuribus ordeï bis in die dato, pro vice heminam dimidiam. Si ad crura & pedes vteri conuertantur, cognosces sic. Magni pedū digiti cōuelluntur sub vngues, & dolor habet crura ac femora, & incūbit ac premit nervos circa femur. Quum sic habuerit, multa calida frequēter lauare oportet, & fōmentū adhibere si ferre poterit, & graueolētia subter suffire. Et femora rosaceo oleo inungat. Si verò loqui
- B** nō poterit, crura derepēte frigida reperiens, & genua, & manus, & si vterū cōtigeris, nō in suo mūdo est, & cor vibratur, & dentibus frendit, & sudor est multus, & alia quæ à sacro morbo correpti patiūtur, & quæ ab aure exsudāt. His frigidā aquam multā affundere oportet super crura & manus, & alia facere velut prius dictum est. Si cōmoti vteri aliquod allapsi fuerint, & dolorē exhibuerint, oleæ scabiem, & lauri ac cupressi ramēta in aqua cocta, lana excepta subdito. Quū mulier recēs enixa, onus maius quàm pro natura leuarit, aut timuerit, aut ligna secuerit, aut cucurrerit, aut alia quædā huiusmodi fecerit, vteri excidūt ob hæc maximè: aliquādo verò ad sternutationē. Non enim violatur, si per vim sternutās, nō apprehēderit nares. Prøluere itaq; aqua tepida vteros oportet. Deinde betæ succo feruefacto similiter, postea vino nigro meraco. Si verò non obediat, mollitoria facere oportet. Verū hæc facere oportet priusquàm perfrigerētur, & leniter introindere. Deinde crura extēdere, ac subalternatim ponere, & molle quiddā ipsis supponere, à potu verò cōerceri oportet tales quàm maximè, & vētrē custodire, vt ne exturbetur. Naribus autē odorata adhibere. Huiusmodi verò postea si nō quieuerint, sed moueātur, veratro purgare oportet. Et si non satis fuerit, etiā vomitus facere, & nō lauari, tacereq; ac quiescere. Si inflati fuerint vteri, vēter attollitur, & inflatur, ac sonitū edit, & pedes & caue faciei partes intumescūt, & color iniucūdus fit. Et mēsēs occultātur, & genitura hoc tēpore nō manet intus, & anhelat, spumatq; ac anxia est, & quū expersgiscitur è somno, recta ceruice spiratio ipsam corripit, & quicquid

*Procidētum
medela.*

*Quum uteri crura & pedes petūt.
Medela.*

*Quæ repente obmutescunt.
Curatio.*

*Procidētia mulierum.
Medela.*

Quum inflati uteri sint.

HIPPOCRATIS LIBER II.

quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & suspirat, ac tri-
 statur magis quā priusquā edit, & suffocatur, & nerui cōtra-
 huntur. Et vteri ac vesicæ dolēt, & manus cōtactū nō admit-
 tunt. Neq; lotiū emittūt, neq; geniturā suscipiūt. Quū sic ha-
 buerit pharmacū deorsum purgās bibendū dato, & calida la-
 uet, ac frequēter insideat toto corpore. Quandoq; etiā vsq; ad
 vmbilicū fomētū adhibeto, & interposito tēpore ea apponi-
 to à quibus purgetur, & nō mordeatur. Suffumiget autē odo-
 rata subter pudenda: sub nares verò graueolētia. Et portiones
 dato quæ vteros purgāt, & ad locū impellunt. Et mercurialē
 edat, & postea lac bibat, velut de latere scriptum est. Morbus
 autē hic nō est diuturnus. Si velut in callū indurati fuerint
 vteri, & osculum exasperatur, & menses occultātur. Quū au-
 tem prodierint, asperi apparēt velut arena. Si verò etiā digi-
 to cōtigerit, os vteri asperum cōperiet, & semper velut callus
 accrescit. Quum sic habuerit, cyclaminū terere oportet, & sa-
 lem ac sicum simul miscere, & cum melle glandulā efforma-
 re ac subdere, & fomento adhibito, purgātibus eluere. Edat
 autē mercurialem & brasicā coctā, & succū sorbeat. Itemq;
 porrum, & calida lauetur. Si verò velut in callum indurati
 fuerint, & mēses obtorquentur, & osculum ipsorū clauditur,
 & nō concipit, & velut aliud quid est, & si cōtigeris, velut la-
 pis illic esse videtur, & est os asperū ac multis radicibus præ-
 ditum, & nō leue aspectu, & qui ipsum considerat, digitū in-
 tromittere nō potest, & febris circūfrigerans corripit, & fre-
 mitus, & dolor vteros habet, & imum ventrē, & laterū mol-
 litudinē, ac lumbos. Patitur autē hæc, si ipsi corrupti menses
 cōputruerint. Quādoq; verò etiā ex partu, & frigore, aut ma-
 la diæta, & aliter. Medicamentū igitur bibendū dare oporteret,
 & multa calida aqua lauare. Oleo item vtēre, & fomentū
 adhibe. Quum autē recens lota aut fota fuerit, specillo im-
 misso aperito, & os ipsorū dilatato, idemq; cum digito simi-
 liter effcito, & mollitoria velut dictū est apponito, & portio-
 nes similiter bibendas dato, & eodē modo curato. Si verò
 obduruerint vteri, osculum ipsorū durum sit, & clauditur, &
 menses nō prodeunt, sed pauciores & deteriores, & dolor in-
 cidit, & febris & rigor corripit circa imū ventrē, & lumbos,
 & laterum mollitudinē. Quum sic habuerit, multa calida la-
 nato, & repectoria adhibeto, si dolor habuerit, & vteros
 multa

Curatio.

*Vteros
duritia.*

Medela.

*Duritia
alia.*

*Morbi bu-
lus causa.
Medela.*

*Quem ute-
ri obdure-
scunt.*

Curatio.

- A** multo tēpore cum aqua decocti cucumeris syluestris fouerō. deinde mollitoria apponito. Atq; hæc per triduum facito: & si ex cōtactu osculum vterorū molle apparuerit, ex crudo lino tres peniculos suppuratorios indito, primū tenuem, secūndum paulò crassiorē. Crassissimus aut sit magnitudine digiti parui. lōgitudine verò quinq; digitorū ita vt hos adipe anserino illito subdas. Sed & vbi fomentū adhibueris ex odoratis, glandē mollitoriā apponito: Aut nitrū tali magnitudine illitum, vt ne sauciet. Nō enim pungere oportet: & appositum sit ad duos dies. Decedit autē velut cortex & pellicula crassa. Intermissis verò tribus diebus, cyclaminū, cum narcissino subdito. Si verò hæc nō purgarint, cum multa cōsideratione apponito id quod cū pubresti paratur, & appositū maneat per diem: & vbi fortiter momorderit, glandē extrahat, & pudendū colluat cū aqua calida, & in oleo infideat: postridie verò lota, ceruinū adipē liquatū, & molli lana exceptum apponat. & si tibi adhuc purgatione opus habere videat, tribus interpositis dieb⁹, id quod cū narcissino parat subdito. postridie autē netopū. Deinde rursus trib⁹ diebus interpositis, vteros odoratis & pinguib. colluito. postridie verò pulegium per vnū diem apponito: & sequēti die cū aromatis suffūto ac foueto. Vtatur autē cibus acrib⁹, marinis, aut carnib. In mēsis verò castoriū bibat: & ieiuna illita suffūta, & cyceonē bibēs ad virū accedat. Si verò inter os vterorū nō suscipiat geniturā, sed durū fuerit, ac cōclusum, plumbeā penicillū apponat, velut dictū est per triduū, vbi calida lota est. & mollitorijs vtatur, & supina decūbat: & in aquā calidā infideat: & lanā vnguento imbutā apponat. Verū noctu magis apponere oportet. Iuxta coxas verò vestes laneas aut lineas molles supponat, vt ne corpus in alterutrā partem dilabatur. Vtatur & subdititijs mollibus, ex myrrha pinguisima, pice, cera, & adipe anserino. Sit aut myrrhæ dimidiū, reliquorū verò duplum, & in lana subdat: duo verò sint subdititia quorū alterū lota per diē subdet, alterū per noctē, donec molle factū fuerit: & vbi hoc detraxerit, aqua odorata colluatur. Aut grana cnidia decorticata quindecim, & Indici medicamēti aliquantulum, si ita vsum fuerit, in lacte mulieris masculum lactātis terito & cerui medullam, & alia quę dicta sunt, ac modicum mellis ammiscero. Sit autē lana qua hæc excipiuntur mollis & pura

*Cum semen
non admittitur.
Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

& pura, & ad diem subdat. Si verò fortius facere voles, myrrhæ parū qd ammisceto. Optimū autē est oui cādidum, & adeps caprinus. & mel, & oleū rosaceū: his ammiscere farinā, & tepefacere ad ignem oportet, & quod destillat lana colligere ac apponere. Aut adipē rubrum anseris aromatibus cōditum, & vnguentū rosaceum, permixta & lana excepta apponito. Præstat autem anseris adipem, & adipē ouillum, cerā albam, resinā, netopum, oleum rosac. hæc simul liquare ac miscere. Vbi verò lota est, hæc tepida intrò ad vterorum osculū apponat. Aut cerui medullam, & anseris adipem liquato, & rosaceo aut irino oleo ammixto, invalde molli lana apponito. Cum mulieri vteri duri facti fuerint, & ad pudēda exierint, dura fiunt inguina, & ardor in inguinibus est, & oīa cācerātur. Cum igitur sic habuerit, cucumeris syluestris internam partem, et fauum terito, et aquæ hemina affusa in sedē infundito, et purgatur. Si os vterorum durum fiat, et ceruix, præ siccitate, et morbus leuiter hæserit, ex digiti cōtactu cognosces. et si ad coxā deuoluantur, nihil acre adhibeto. Si em̄ exulceretur aut inflammet̄, periculum est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito ea quæ nō mordent, à quibus purgetur. Quū verò duri fuerint vteri, et sic doluerint, subdititia apponito, velut est cerui medulla, aut anserinus vel suillus adeps. et vnguētum irinum cum melle: et oui luteum, ac cerā albā, velut cataplasma emollito, et ordeaceā aut triticeam farinā, cum aqua et ruta coquito. Si vteri cōclusi fuerint, oscula ipsorum dura fiunt, et geniturā nō amplius suscipiunt, sed statim vbi cum viro cōdormierit, dum crura mouet, exit. et dolores imum ventrē, et lumbos, et inguina occupant. et mēses omnino nō prodeunt. Si verò eant, pauci et prauī ac decolores prodeunt. Cum sic habuerit, multa calida lauato, post balneum verò castorium cum pæoniæ radice, in vino nigro odorato permixta bibenda dato. Cibis autē velut puerpera vtatur. et si manifesti fuerint mēses, diem vnā intermittito, et totā foeto, et pharmacū potādum dato, si aduetæ fuerint, sutsum purgās, aut si egere visa fuerit, deorsum. Lac itaq; asininū, aut serum exhibeto, et leniter foueto, et mollitoria vtero apponito, et cyclaminū, et narcissinum. Cucumerū verò paruorū syluestrium internā partem sumito, et ex diuulsis semen eximito, ac lacte mulieris masculū lactantis affuso terito, myrrhæ

Duritia vterorum.

Medela.

Cum os uulue siccitate dure scit.

Medela.

Cum uulua claudicatur.

Medela.

A rha pura & melle optimo ammixtis, oleoq; Aegyptio albo. & ne liquidum facito medicamentum, sed siccū, atq; hoc in lanam mollem purā infarciat. & in oleo Aegyp. albo tingat, & lota apponat. Subligetur autē & sub testō maneat cūm purgatur. Postq̃ autē sufficiēter habere tibi visa fuerit, quiescat. Sin minus, rursus aliud apponat. postea verò obuolutā lanam mollem, rotundā faciat, & netopum immittat, & diemvnam subdat. postridie verò oleum rosaceum itidē in lana. Deinde rursus cerui adipem, etiā ipsum liquatum in lana. Lauet autē calida aqua semper ante subditiōum appositionē. Et odoratis leniter foueatur multo tempore. Postea verò vna interposita die, colluito. si quidē pituitosa fuerit, eo q̃ cum grano cnidio paratur. Si vero biliosa, eo quod cum scāmōnia. post hęc ambo, postridie etiā narcissino cū vino dulci colluito. Si verò narcissinū nō fuerit, cum anthino aut irino quā optimo. Sit autē olei tertia vini pars: deinde interpositis duobus diebus, id quod cum pulegio pręparatur vnū diem apponat. Si verò prodierint menses, ieiuna per triduū bibat castoriū, cum vino odorato albo: vbi verò defuerint menses, & stabiles fuerint, lauetur: & aqua frigida perluta, cyceonem bibat nō falsum. Cibus autem ne cōtingat: & cum viro dormiat duobus aut tribus dieb. Quāto verò tempore purgatur, mercurialem in aqua coquens, vbi cocta fuerit exprimat, & alliū ac cuminū, & salem subterat, & oleum his ammisceat, & modo succo affuso feruefaciat. Atq; hoc edulium ante cibos edat. Allium item coctū ac assatum quā plurimum accipiat. Si verò mercurialis non fuerit tenera, tritā cum brassica coquere oportet, & cōdire, & lenis erit: & si in ventre cōceperit sana euadet, & omnia ipsi iuxta ornatum procedēt. Si os vterorum cōclusum fuerit, sit fortē velut grossus. & si digito cōtigeris, deprehendes durum ac conuolutum, & digitum non admittit: & menses occultantur, & geniturā nō suscipis hoc tempore: & dolor habet in vtero, & lumbos ac laterum mollitudinem. Quādoq; verò etiam sursum ascendit & suffocat. Cū sic habuerit, pharmacum deorsum purgās bibendū dare oportet, & multa calida lauare, & apponere ea quę os molliunt: & specillum immittere ac aperire, itemq; digitum & similiter leuigare. Cū autem molle fuerit, apponere ea quę sanguinem purgāt: & potiones exhibere, & experiri vt

*Pituitosa et
biliosa pura
gatio.*

*Cū os uul
uæ claudin
tur.*

Medela.

Cum uteri clauduntur. præbeas quodcunque aliud libenter susceperit. Brassicam autem edat, & succum sorbeat. Si uteri cōclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & silphij semen, & cuminum Aethiopicum, & nitrum, & salem thebaicum, & adipem rhenalem, & farinam, & myrrhā, & resinam omnia simul seruefacito, & trito mixta, & in glandē efformata apponito. Si grumosi facti fuerint uteri, os ipsorum velut eruo plenum sit, & si contigeris, videbis ita habere, & menses non sunt, neque genitura intus manet. Quandiu sic habuerit, cyclaminum cortice detracto, & allium, & salem, & ficū, ac modicum mellis, terito, misceto, ac glandem formato, & ad os vterorum apponito. Itemque alia subdititia, quæ acria sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de portionibus dato eas quæ vteros purgant. Si uteri præter naturam hiarint, menses plures prodeunt & viscosi, et frequenter, et genitura intus non manet, et osculum hians est: et fieri non potest ut genituram attrahat. et febris ac rigor corripit infernum ventrem, et lumbos. Morbus autem corripit ex fluxu sanguineo. fit et quum menses suppressi derepentē eruperint. Diætæ itaque ratio prius relata est. Oportet autem subdititijs curare, in principio quidē purgatorijs simulque molli-
Medela. bus. Deinde leniter adstringentibus. et partes infra umbilicum per spongas fouere. cum myrti aut rubi aqua, aut ex oleæ aut rosarum, aut cœnantes, aut vitis foliorum decocto.

Quum per menstrua hiant. Si os vterorū hiarit amplius quàm in mensibus solet, menses ita fiunt plures et deteriores omnes et liquidiores. et per longius tempus, et genitura non attingit, neque manet, sed rursus exit. et si permanserit, osculum comperies disparatum, et impotentia præ mensibus obtinet: et levis est ac debilis vterus, et vterius procedit: et vires laxantur: et febris debilis, ac rigor, et dolor habet imum ventrem, et laterum mollitudinem ac lumbos: patitur autē hæc maximè, si quid in ipsa corruptum computruerit ac compactum fuerit. Quædam verò etiam ex partu patiuntur, aliæ etiam aliter. Quum itaque sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, et facilius iudicabitur. et si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto. et frigida lauato, ac intermissione facta colluito: et ex portionibus dato quacunque maximè libenter admiserit: et suffito ea quæ resiccant: et polypos edat ac mercurialem. Si verò

- A** non conclusi fuerint vteri velut oportet, in aqua desideat *Cum uteri non sitis clauduntur uel nimis patent.*
 in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut vitis aut oleæ folia, aut rosarum. Diæta verò sit quæ relata est in rubro fluxu. Optimum verò ipsi auxilium est sitis, frequentes vomitus, & prohibitiones balneorum. Quum vteri magis quàm conuenit, fuerint aperti, & non conclusi, & purgatione opus habent, & collutionibus, & suffimentis. Si verò menses effluerint, plures sunt & deteriores, & liquidiores, & frequentes. Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os cõtingas digito, comperies ipsum leue. Et impotētia ipsam præ mensibus corripit. Et febris ac rigor obtinet, & dolor imum ventrem, & lumbos, & laterū mollitudinem corripit, maximè si quid in ipsa corruptum cõputruerit, itemque ex partu, & aliter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, vbiçunque tandem dolor fuerit, velut in superioribus scriptum est. Si vteri inflammati fuerint, menses *Cum uteri inflammantur.* obtorquentur, & ceruix multis tenuibus venulis, ad telarum aranearum similitudinem variegatur. Et febris est acuta, & mentem percellens, & menses prauis ac paucis ipsi comparent. Et quum ieiuna fuerit, vomitus quidam ipsi superuenit. Quum verò quid comederit, reuomit. Et dolor occupat imum ventrem & lumbos, & animo linquitur, & per totū corpus perfrigeratur. Venter autem nunc durus, nunc mollis est, & incenditur & attollitur, & putat se in ventre habere. Quādoque verò ventris moles vacua apparet, & aluus aqua impletur, & **C** umbilicus prominet, & osculum gracile fit, & derepente apparent menses stridentes, & pauci ac prauis & attenuatur circa clauiculas & collum, & pedes intumescunt, & præsertim pedum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dato, & subdititijs vtatur, & fomētis vteri foueantur odoratis. Per diem verò plūbeis penicillis vtatur, & ante appositionē, aqua calida nō mordenti colluito, & post appositionem hoc infuso colluito. Cnestri duas portiones in aquæ hemina coquito, & aquam excolato ac infundito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Post hæc tres dies intermittito, deinde cū eo quod cū aceto paratur colluito, & ante cibū, mercuriale cū aliquātulo vino coquēs edat velut brassicā. & succū sorbeat, Si verò permanserit, pharmaca bibēda dato à quibus aqua de vteris purgatur. Cibis autē vtatur panibus,

HIPPOCRATIS LIBER II.

& oleribus coctis, flaccidis. Marinis autē potius quā carnibus. Aut extremis partibus coctis, flaccidis, & laboret quā plurimū, & ante & post cibū & quā minimū lauetur frigida, & à dulcibus ac pinguibus omnis generis arceatur. Diebus autē purgationū intermedijs, adiūtū bibat ieiuna in vino diluto. At morbus hic lethalis est, & paucæ effugere possunt, si nō in vētre cōceperint. In vterorū inflāmate menses obtorquentur, & quum ieiuna est, vomit. Vbi verò comedit, dolor habet imum ventrē & lumbos. Et totus vēter modo durior, modo mollis fit, & nō valde cōsidet. Alius magna fit, & non purgatur, & sibi prāgnans esse videtur, & patitur quæcunq; prāgnantes perpeti solent. Et si ventrē contigeris, leuem cōperies tumorem velut in vtre, & quum partus tempus esse visum fuerit, vteri cōcidunt, & menses pauci ac deteriores fiunt. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata verò sana euadit. Si inflammatus fuerit vterus, vellicatur. Si verò quid corruptum fuerit, ac vitiatum recruduerit, febris corripit acuta & magna, & horror durus, partes circa pudenda, & horribiliter afficitur, & mordetur, & cōcitur, & si quis digito contingat, rursus peius habet, & pungitur, & caput dolet acincipit, & caligo adest, & sudor frontis. Extremæ partes perfrigerantur ac tremunt, & sopor profundus aliquando occupat, & audire non potest. Neq; reliquus sensus operatur, fastidium cibi est multum, & stomachus & venter omnino nō continent cibum, & vociferatur, & exilit, & pectinem dolet, & inguina, & lumbos, & occultos pudendi locos, & cito moriuntur. Si verò dolores ad extremam debilitatem deduxerint, spōgijs calidis ex aqua & oleo expressis foueto, & subdititia mollia apponito, medullā cerui, apidem anserinum, & cerā albam, & oui luteum. Aut ceratum picatum cum resina subdito. Vino verò aut lacte caprino purgato, aut volucris iusculo. Vinum autē ne bibat, & ptisana succum sorbeat.

Ad dōlorem vterorum medicamentum infusile. Si dolor solū fuerit vehemens & violentus, caligo in vteris inest, & flatus non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur sic curare. Atriplicis syluestris semen, & betas simul trita ac tepesacta, in vteros infundito. Aliud dōlores vterorum sedans. Vini suauissimi pari aqua temperati tres semicon-

Quum dolor uteros molestat. Medela.

A gios Atticos sumito, & fœniculi radices ac seminis eiusdem trientem, & olei rosacei heminā dimidiam. Hęc in ollam no uam immittito, & vinum superfundito, deinde foueto. Ap-
posito autem & scillam, donec osculum molle factum fuerit & ad lationem idoneum ac apertum. Et quum in purgatio-
ne pustulæ circa osculum vteri exortæ fuerint, sic curato. Carnem bubulam, cum butyro aut adipe anserino & aniso tritis illine, & ipsam carnem in pudendum inde. Si ignis
B facer habuerit vteros, intumescunt pedes, & mammae, & cor-
pus. & dolor ipsam corripit. & recta ceruice spiratio fit. & do-
let laterum mollitudinem, & partes sub ventre, & pectora,
& caput. & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, &
poplites tremunt. Quandoque verò & in poplitibus liuidæ
fiunt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Ma-
ximè verò mammae attolluntur iuxta gentilitatis cognatio-
nem. Attamen non valde dolet. & febris ac rigor corripit. &
facies rubicunda fit. & sitis fortis est. & hepar resiccatur. Hęc
si prægnanti acciderint, moritur, & non poterit effugere.

*Erysipelas
uictorum.*

Si ignis facer in vteris fiat, tumores fiunt liuidissimi, à pe-
dibus exorsi vsque ad crura tota, & ad lumbos. Quanto verò
tempus amplius progressum fuerit, etiā pectus percipit, & in-
tumesceat. & tota perfrigeratur. & febris habet magna, & ri-
gor superuenit, & spiritus densus, & animi deliquium, & de-
bilitas, & dolor totius corporis. & tristatur, & mente varia-
tur. Et affectio ascēdit ex inferno vêtre ad lumbos, & ad dor-
sum, & præcordia, & pectora, & collum, & caput, & stoma-
chum, & mortua esse videtur. Quū autem dolor solutus fue-
rit, corporis habet lumbos, & inguina, & crura. & in poplitibus
liuores fiunt, & modico tempore melius habere sibi videtur,
deinde rursus affligit. & corpus pustulis cōpletur, & rubores
cōspicui ac manifesti faciē occupant. et guttur siccum est, et
lingua aspera. Hic morbus si prægnantē inuaserit, occidit. Sin-
minus, medelā adhibere oportet, et lac asininum bibendum
dare ac purgare. Si verò sic non soluatur, ventrem mollibus
frigefactorijs perfrigerare, et subdititijs non molestis et le-
uibus paulatim purgare. Itemq; vomere. Ad hoc cōmodum
est sambuci folia sumere cocta, cum origano, aut thymo, aut
ruta. Si verò febris dimiserit, etiā vinū ac cibos dulces dato.
Veruntamen paucae curantur. Aqua intercus si in vteris fiat.

Medela

*Aqua in-
tercus.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

menses prodeunt arenosi & aquosi, & non valde cruenti. In- **B**
 tumescit & vterus, & venæ, & propinquisimæ partes. & præ-
 gnans fit, deinde suffocatur, & mammæ fluunt, & imus ven-
 ter durus est, ac intumescit, & omnis circūcirca locus, & do-
 let si quis ipsum attingat. Et febris ac stridor dentium cor-
 ripit, et dolor vehemens laterum mollitudinē ac lumbos, et
 semen in somnis effudit, et peius habet. Hanc calida lauare
 oportet ac tepescere. pharmacum autem bibendum dare, et
 cum debilibus fouere, et cyclamini obolos tres in linteo de-
 liget ac apponat. Et cupressi succum in aqua madefaciat, ac
 cantharidas eadem terat, et modico tempore apponat, et per
multum tēporis interuallum. Efficax est. Subdititium. Cu-
 minum chemæ mensura, vna passa alba. Aliud. Vrticæ **E**
 semē, ari radix. Horū quodcunq; voles leuiter apponito, vbi
 verò expurgaueris colluat, ita vt detrahas et cum infuso pu-
 denda colluas. et simul cū viro dormiat. & si foetum ad par-
 tus tempus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. Alia aqua
 intercus vterorum. Subcluentium quiddā fluit saniosum, &
 purgatur, & mordet valde, & vlcerat pudēda velut muria, &
 circumscitas partes. & quocunq; destillarit, vlcerat, & color
 est morbi arcuati. De cætero verò purgatur copia velut in a-
 lijs fluxionibus. Morbus autem hic & debiliior est, & aliquā-
 do lethalis fit. si vteri egressi fuerint. Hanc curato velut eam
 quæ à fluxu albo vexatur, & lac asininum bibendum dato, &
 extenuato, & prædictis pharmacis curato. Eclegma. Quod
 delingitur ad aquā intercutē. Si aqua ex vteris fluat, sulphur **F**
 & anseris adipem delingat. Si ventus in vteris fuerit, flatus
 exit, & stridet, & tota intumescit, et febris habet et ardor, et
 ad hæc valde exilit præ dolore. et virum nō admittit, et val-
 de ægrè fert coitum, et erigi non potest, et velut onus graue
 ipsi in vteris iacet, et caput dolet, et anxia est, et loqui nō po-
 test. Si verò dolor accesserit, clamat, et dolet oīa, et lumbos,
 et pubem, et sedem. et vrina supprimitur, et vter suffocatur.
 et mori cupit. et præcordia distenduntur, et stomachus mor-
 detur, et os amarum est. et vomit acida et pura ac meraca. et
 frequenter ructat, et melius habet. Sin minus, intumescit. et
 si attigeris, renititur et dolet. Proinde vterū cum aqua mul-
 sa, et aceto mulso ac oleo colluere oportet. Et cuminum aut
 anisum tritum sumere, et lini folia terere, et volucrinum
 adipem

Medela.

**Ventus ute-
rorum.**

**Medela
quæ.**

- A** adipem cum ouls in aqua infundere. Subdititijs verò ac portionibus vtere, quæ ego describam. Desideat autè in oleo calido, et aromata in ipsum immittito, iunci adorati florè. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimum autem est molibus infulis ventrem purgare, aut glandem apponere quem *Ventris factis solutio.* admodum puero venter soluitur, lanam illotam cum melle. Si verò antiquior fuerit, cepam in oleum aut mel tinctam apponito. Aut taurinum fel, aut nitrum cum melle. Aut mali punici acidi nucleum, cum melle et ordeacea farina. Si mola ipsa innascitur à crassa genitura intus retenta, thymbrā tritā *Mola quæ fiat, et discutitur.* in aceto et aqua, liquidam bibendā præbeto. Aut hyoscyami semē tritum. et cum muria ac silphij succo et aceto colluito.
- B** Aut si opus fuerit cum aqua. Optimum verò est aquam mulsam infundere, cum aqua lērium, aut erui, aut floris violæ. Si verò purgata fuerit à talibus quæ sunt velut igne ambusta, myrtum coquito ac perluito, et myrrhā ac netopum cū lana apponito. Si ventus in vteris fuerit, ac momorderit, et qua transit dolorem facit, et præ ardore intumescit, et dolet, et virum auersatur, et coitum valde ægrè fert, et tenditur ac intumescit pecten, et erigi non potest, nec dirigi. Quum sic inueneris, scito quod ventus et genitura in vteris est, et propterea nunc ægroter. Accipe itaque mel, ceram, lini folia trita, et adipem volucrinum, et hæc in vino odorato tepefacta per clysterem in vteros infunde. Apponat autè folia lini. Aut semen lini terito, et in lanam inuoluito, et ad os vteri apponito. Sin minus, efficaciore vtere. Irinū et crocum, et lini folia, et adipem volucrinum terito, et lacte muliebri diluta, rasura de renibus linteolis derafa excipito ac illigato, et ad vteri osculū apponito. Et si pinguitudo carnosior enascatur, quod consummat indito, et mediocriter attenuato. Quæ enim valde attenuantur, raræ fiunt et abortiunt. Si verò genituram non suscipit vterus, sed dimittit, et calorem in seipso non habet, instrumentum parare oportet, cui insidens vaporem intra vterum recipiat, ita ut vestes circumcirca ponatur. Suffire autè oportet cassā, cinamomū, myrrhā, singulis pari portione vino sirao siue sapa subactis, et super prunas cōiectis. Modicè verò lauetur, et modice cibum sumat. Opitulat et subdititium huiusmodi. Myrrhā mollem cum melle efformato. Sit autè oblonga velut glās, et sæpe hæc facito virium respectu habito.

*Cum uento
sa sit uulua.
Medela.*

*Cum semen
reijcit.*

Suffimētū.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Profunt & pelecini in frumento nascentes, cum myrrhatr
 ti. Mel quoq; coquito, & cum tædis agitatū permisceto, & fa
 bæ Aegyptiæ magnitudinem apponito. fel item taurinum,
 & rhoem rubrū pari portione. Conyza herba est similis apio
 crispo, nascitur autē prope mare in locis arenosis, odor verò
 eius agrè tolerari potest. Hanc cum melle & vino apponito.
 Aut bulbion, cōspiciū autē in tritico, maximè Aegyptio, ac re
 simile cum imo Aethiopico: hoc & alliū & nitrum simul ap
 ponito. Verū antea lauetur. Quum mulier caput dolet, &
 finciput ac collū, & vertigo præ oculis obuersatur, & timet,
 & tristis fuerit, & vrinæ nigræ, & similia etiā per vterū pro
 deūt, & anxietas ac mœror ipsam tenuerit: atra bilis in vteris
 inest. Curet autē sic. Cucumeris syluestris anniculi internā
 partē, fel tauri, florem æris, cum bacchare terito, & subdititia
 formato. & pharmacū bibendum dato, ac lauato. Quū ve
 rò mulier vteros mordetur, & dolet, lancinaturq; , & bilē fla
 uam mingit, & vterus hiarit, & oculi fuerint velut morbo re
 gio affectorū: scito q̄ bilis in vteris est. Quapropter optimū
 est expurgare totū corpus, et ipsos vteros subdititijs, quæ bi
 lem educunt. Quum verò perfrigeratur vterus, et onus in si
 tum esse videtur, et color nō est clarus, et cōpactus est vterus.
 Quum sic habuerit, purgare oportet cum eo quod pituitā du
 cit, et attenuare, ac frequenter vomere. Quum mulieri ma
 le oluerit ex ore, et gingiuæ nigræ fuerint ac prauæ, caput le
 poris, et mures tres seorsim exure, et ex duobus muribus ven
 trem exime, hepar autē et rhenes non. et in pila lapidea mar
 mor, aut lapidem album tere ac cribra, deinde singulorū pa
 res portiones miscere, ac dentes cōfricare oportet et locos in
 ore. et pottea lana succidissima fricet, et cū aqua colluat. Tin
 gat autem lanam succidā in melle, et cōfricet dentes ac gin
 giuas, et internas ac externas partes. Terat item anisum, et
 anethi semen, et myrrham pondere duorum obolorum, atq;
 hæc in vini albi meraci hemina dimidia diluat, et cum his os
 colluat, et multo tempore in ore contineat. Hoc autē frequē
 ter faciat, et ieiuna gargarisset, et post cibum. Optimū verò
 est modico cibo vti, et optima quoq; ingerere oportet. Hoc
 pharmacum dentes purgat, et bene olentes facit. Vocatur au
 tem Indicum medicamentum. Quum mulieri māma aspe
 ra facta fuerit, stæbes aut rubi fructum, cum aqua et oleo co
 quito,

*Capitula do
lor.*

Medela.

*Dolor uul
uæ.*

*Vulua frige
scens.*

Medela.

*Oris malus
odor.*

*Mamma
asperitas.*

Aquito, et cataplasmate facto mammas integito, et betæ folia superponito. Deinde ex linteo velut pileū cōsuito, et magnitudine vt mammā capiat, atq; sic mammā indito. Si verò suppuretur, secato, et ex lana succida linamentum siue penicillū immittito, et eadē superponito. Postea verò ex lenticula cocta cum polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in pudendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascantur, viticis semen aut folia, cum fellis bubuli obolo permiscantur, et oleo cedrino subiguntur, et lana succida mollissima excipiuntur. Induntur autem tertio quoq; die, per noctē ac diem. Postridie verò vbi amouit, calida lauetur. et allium coctū ac crudum edat. et Ascarides exeunt ac moriuntur. Muria verò etiā

B colluere oportet. Ad faciem ornandam. Hepar tauri terito cum oleo illinito autem cum vino macerato. Fel autem fursures exterit. Sed et prisanæ succus similiter illustrat, et ouorum candidum, et farina lupinorum, et erui cum ficis in cataplasmate adhibita. Et brassicæ radix ac semen. Hæc etiā lentigines tollunt. Itemq; alcyoniū. Et si puluis faciē læserit, ceratum liquidum ex rosaceo præparatū sublinito, et aquā frigidam affundito. Et rugas leuigat hoc. In pila lapidea plumbaginem terito, et menstrua ex situ aqua affusa pastillos formato, qui vbi reliccati fuerint, oleo dilutos rugosæ faciei illinito. At si capilli defluant, ladanum cum rosaceo aut anthino vngueto terito, et cum vino illinat. Aut terram cimoliā cum vino, aut rosaceo, aut vmphacino, aut acacia. Si verò calua facta fuerit, cuminum impone, aut stercus columbinum, aut raphanum tritum. Aut cum cepa cōfricet, aut cum beta, aut vrtica. Cæterum solares appellatas maculas tollit, erui decoctum, betæ succus, ouorū candidum, prisana, cucumeris sylvestris radix sicca, cum vini fæce trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Item sesamo trito fricari, aut amygdalis amaris. et vrticæ semen, et allij cortex superligatus, et lepidium. Impetigines omnes extrahit. Acetum, manna thuris, pumex sulphur cum aceto, nasturtiū sylvestre vstum et in cinerē redactum, vipere exuiū, rumicis sylvestris radix. Teratur autem cum aceto vinoso. Si vero postulæ emergāt, etiā spuma argenti vtire. Potio ad fluxum rubrum commoda. Cornu cerui vstum, ad duplū crudæ ordeacæ farinæ ammisceto, atq; hæc in vinum pramiū insperfa bibat, et sistitur. Alia. Adianti

*Ascaridū
iectio.*

*Quæ faciē
ornent.*

Quæ erugent.

*Quæ capillum
flueniē
sistent.*

*Quæ naues
et similiter
tollant.*

*Impetiginē
quæ cū
trent.*

*Pocula rubri
profluuij.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

radicem tritam, & cicer torrefactum, & lentium farinam ex D
melle bibat, aut velut potum exhibeto. Aut farinæ tritici re-
centis acetabulum, gummi albi dimidiam, māuæ thuris ter-
tiam partē, & iunci odorati parū. Aut de pinu, vel cupressō
aqua dilue, & bibendū præbe. Bibat autem in die. Aut cornu
cerui comburito ac terito, & crudā ordeaceam farinā cum ce-
dri baccis quinq;, & vinum austerū nigrū cum tadis ammi-
sceto. Aut mali punici dulcis assati succū, cum vino nigro bi-
bat. Aut cupressi baccas tres aut quatuor, & myrti baccas ni-
gras, & simul, & ipsas per seipsas, ad robur corporis mulieris
respectu habito. Cum vino verò potio fiat. Aut castorij obo-

*Potio ado-
mnia uulua-
rum mala.
Sanguinis
narium se-
datio.*

lum in vino nigro austero terat, ac bibat. Potio ad fluxū, & E
omnes morbos qui ab vteris fiunt. Præonię semen & radices,
cuminū Aethiopicū, & melantiū in vino albo exhibeto. Aut
ferulę rasæ acetabulū, & porri succū, in vino albo diluto. Hoc
etiam ex naribus manantē sanguinē sistit. Aut malum puni-
cum in vino nigro coquito, ac decorticato, & interna in vino
nigro terito, & cum polentę farina exhibeto. Aut linum, vel
erylīmū tostū, & oleę folia viridis. et radicē nigrā aspalathi,
et peplum plenū, hæc trita in eodē vino diluto bibenda dato.

*Coagulum
asfininum.*

Aut coagulū asfininum et mali punici dulcis radicē, et gallam
omnia æquis portionibus, et mali punici dulcis succū, cum vi-
no bibat. Aut rumicis semē, cū gallæ parte externa circūrasa.

*Sanguinis
sistentia.*

Hæc simul terito, et postea cyceonē facito ac exhibeto. Si
sanguis largus ex vteris fluat, viticis folia cum vino nigro da-
to. Acerba item omnia fluxum sistunt, vino nigro ammixto. P

*Quæ fluo-
res sistant
et dolores
sedent.*

Ad fluxum et dolorē. Cancryos radicē in vino nigro bi-
bat. Si verò amplior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest.
Oportet autē vino et aqua diluere ac bibere. Si fluxus fiat,
cancros fluuiatiles in vino suffocato, et de tali vino cum aqua
bibēdum dato. Si verò adhuc ferat fluxus promalon siue my-
ricam torfeto, et tritā in vino dato. Aut porri succum. Si verò
multus deferat fluxus, muli stercus cōburito, terito et cum vi-
no dato. Si autē diuturnus fiat fluxus, spōgia cōbusta auxilia-
tur. Terēda est aut spōgia, et cum vino odorato exhibēda. Ca-
taplasma ad fluxus. Allium et portulacā, et apiū, et loti ac ce-
dri ramēta trita simul misceto. et cū aqua mulsā diluito, et ca-
taplasma facito. Aut rubi, et rhāni, et oleę folia trita simul mi-
sceto, et in aqua mulsā diluito, et cum polētā in cataplasmate
adhibeto

*Emplastru
somenta.*

A adhibeto. Aut sambuci & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loti ramēta, & mori folia, ac rose folia, cū vna passa ad cataplasma redigito. Fomēta ad fluxus. Loliaceam farinā torrefactā in posca meraciore coquito, & linteo illitā pro fomēto adhibeto. Aut lētes torrefactas ac decorticatās in crassiorē instar alicū farinā redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto. Aut eruū eodē modo. cōmoda est & saluia. Aut paleas ordeī in saluię & hyperici decocto coquito, & imposito. Aut loti ramēta & cupressi, in vuę passę cremore cocta, linteo inducito, ac p fomento adhibeto. Aut oleę folia, aut hederę, aut myrti, in aqua coquito, & cū his etiā ordeī paleas coquito. Aut furfures triticeos in aromatū aqua coquito.

B Aut furfures triticeos in vuę passę cremore coquito. Aut violę albę semē, vel radices coquito, & ad aquā decocti furfures triticeos ini cito, ac foueto. Aut cū eo decocto furfures triticeos subigat, & panē faciat, eoq; calido lanę inuoluto foueat. Aut in serpilli decoctum furfures triticeos ini cito, & eodem modo foueto. Sed & fomentū adhibendū est cū spongijs calidis, & cū mollibus lanis, si dolore vexet. & cū valis testaceis aqua infusa, & cū vesicis oleo calido plenis. Collutiones ad fluxus. Myrti folia, & lauri, & hederę in aqua coquito, & cū hac tepida colluito. Sābuci & lērisi folia in aqua coquito, & cū excolata leuiter tepida colluito. Aut cēnāthen, & cyperum, & vuas passas in aqua mulsa coquito, ac colluito. Aut cū scēnogræci aqua, aut rubi decocto, aut oleę viridis, aut cupressi, aut serpilli, aut mali punicę, aut radici violę albę, aut lenisici decocto leuiter tepido colluito. Aut medicamentum ex butyro, & resina, & adipe anserino infundito. Aut id quod ex medulla & adipe suillo præparatur. Suffitus ad fluxus. Ordeum tostū prunis inspersum suffito. Aut cerui cornu cū olis immaturis. Aut rhoē rubrū, & polentā torrefactā, cū oleo & vino duplo. Aut paleas ordeī, & sterus bubulū similiter. Aut loti ramēta, aut rhoem, aut cupressum siccam, cum vino nigro austero suffito. Aut galbanum, aut mannam thuris, aut resinā vino subactam, Aut caprę cornu, & gallam. & sistetur fluxus. Alij suffitus. Effodere oportet scrobē, & vinaceorum vuę duarum chœnicū Atticarum mēsuram torrefacere & de cinere in scrobem mittere, & vinum odoratū irrorare. Mulier aut circuminsidens, ac seipsam cōtegēs ac cōuoluens,

Diversa fomenta.

Collutiones

Sicca suffimenta.

suffitum

HIPPOCRATIS LIBER II.

suffitum admittit. Aut sordes pilorum circa sedē capræ siccas **D**
 tundito, et torreto, atque cum ordeo fracto, et oleo subactas
 suffito prunis insperfas. Aut ordeï paleas iisdē prunis inijci-
 to. Aut cupressi ramenta vnguento subacta suffito. Aut cicu-
 tã, aut myrrhã, aut thus, vnguento affuso suffito. Aut bitumē
 et ordeï paleas similiter. Aut cupressi radicem rosaceo oleo
 perfusam suffito. Aut ad calamū, iuncum odoratū, cyperū, a-
 pij semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffito. Similiter autē
 et resinã, prunis inijcito. Et cinamonū, et myrrhã, cum rubi
 folijs, aut rosarū folijs aut mēta, addito modico croco et sty-
 race. Hæc omnia simul terito ac suffito, oboli Attici pōdere,
 in cinere sarmentorū vitis, aut in stercore bubulo instar ace-
 tabuli formato. Sit autē ignis ex sarmentis vitis. Mulierē ve **E**
 rò imponito prius, vt ne odorē percipiat. Nā si odorē senserit,
 melius est nō suffire. Subdititia ad rubrum fluxum, Myr-
 rha et bulbion cū melle tritū, optimū præstant subdititium.
 Aut rosæ in aqua coctæ, quas sanē cum rosaceo vnguento tri-
 tas, ac lanę inuolutas apponito. Aut loti florē in aqua coqui-
 to, et deinde cum rosaceo vnguento terito, et in lana ad vteri
 os adhibeto. Aut cyperū, et irim, et anisum, singula parī por-
 tione, cū rosaceo vnguento trita, intro in vteri osculū derru-
 dito. Aut myrti nigræ folia in vino albo terito, et pini corti-
 cem ammisceto, et similiter facito. Aut cupressi fructum, et
 thus, parī portioē simul ambo in vnguento terito, et apponito.
 Si relicare fluxum opus fuerit, calaminthã in vino nigro co-
 quito, et linteo inuolutã apponito. Aut hyoscyami folia, et ci-
 cutã simul coquito: Similiter porrū, et maluã: et cerã ac anse-
 ris adipē ammisceto. Deinde tepida ad pudenda subdito. Aut
 vinū meracū, cum resina et malicorio cocto terito, ac simili-
 ter apponito. Aut cnicum cū vino tritū subdito. Aut loti ra-
 menta similiter. Aut lentisci folia. Aut rhoē melle cocto am-
 mixto apponito. Si verò nō cesset, Susinū, aut blitum herbã,
 quæ velut lingua est, in lana ad subdititium efformato. Ad
 fluxū aquæ subdititium et infusile. Si mulieri aqua fluat ex
 pudendis, resinã siccã, et myricæ folia, et lini semen, in vino
 terito, et volucrinū adipē ammisceto, et per clysterē in pudē-
 da infundito. Aut farinæ purissimæ chemã, siue conchæ tes-
 tam cauiorē, aut amyliū in lana ad vteri stomachū apponat.
 Alud similiter infusile. Quum aqua ex pudendo fluxerit,
 myricę

*Fluxum
quæ siccant*

*Fluxus a
quasi mede-
la.*

- A** myricæ folia, & thus, & resinā. cum anserino adipe terito, & per clysterē in pudenda infundito. Si pecten præ fluxu aquoso doleat, viticis semen cum melle terito, & in cataplasmate pectini probè adhibeto. Si fluxus sanguinolētus, aut albus, aut qualiscūq; fuerit, Sulphur & mādragorā in vino meraco terito, & lana excepta apponito. Et supina dormiat, & immota maneat. Aut malicoriū siccū in vino pramnio terito, ac bibendum dato. Ad fluxū albū potus. Hederæ albæ semen, & pini corticē, in vino austero exhibeto. Aut cornu cerui vsti partem vnā, crudæ ordeacæ farinæ partes duas, & cedri baccas quinque, aqua terat ac bibat. Quū ab uteris strāgulatur, castoriū & conyza in vino, & seorsim, & simul utrāq; bibat.
- B** Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis quantū duobus digitis apprehēdi potest. Aut radicis proniæ dimidiā portionem, in vino odorato bibendā dato. Quū verò uteri suffocant, & simul tussierit, sandaraches obolū, & sulphuris viui tantundē, & amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, misceto & in vino odorato exhibeto. Si verò adheferint uteri, ordeū terito, & vnā cū paleis, & cornu cerui, oleo subigito, & suffito. Quum autē sursum ascēderint, & cor ac stomachus prematur, & substiterint, myrrhā aut resinā, aut netopū, aut castoriū, aut sulphij succū bibendū dato. Quum uterus strangularit, spiritus autem acuatim sursum cōmotus fuerit, & grauitas incubuerit, & mens perculsa fuerit, et loqui nō potuerit, et perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, et oculi obscurantur: caput quā citissimè radito, et per fasciā supra umbilicū, si opus fuerit, deligatā detrudito. Dato autē castorium, et conyzā, et rutę aquā cuminū Aethiopicū, raphani semen, sulphur, myrrhā. Ad nares graneolētia, ad uteros bene olentia adhibeto. Si verò sustinuerit, etiā grani cnidij internam partē, albā illā, melle subactā ac mixtā, naribus illinito. Aut schinū scillæ speciē quæ mordeat. Quū autem dolor habuerit ac suffocatur, maluæ radicē, aut acetū mulsum, aut feniculi corticē, aut crethmū in aqua bibendū dato. Optimum verò est eructare, et sedentē collocare, et sternutationē facere, aut veratrū naribus admouere. Si verò sub septo trāsuer. so ac præcordijs uteri sedere videātur, derepente voce destituitur, et præcordia dura fiunt, et strangulatur, et dentes confert, et vocata nō audit. Oportet igitur sub nares suffiri lanā accensam,

*Pecten si
doleat.*

*Si albus
fluor de a
fluat.*

*Uterus strā
gulatione.*

*Uterus strā
gulationis
uexatio.
Medela.*

*Quum uter i
superiora
petunt.
Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

accensam, bitumen in ignem coniectum, & castoriū, & sul-
phur, & picē. Inguina verò & femora vngento odoratissimo
intus inungere. Aut stellas marinas nigras, & brassicā vino
odorato misceat, ac bibat. Aut myrrhæ obolos tres, coriādrī
parū, resinā, pæoniæ radicē, cuminū Aethiopicū, hæc in vino
albo & aqua trita, aut cum aqua mulsā diluta, leuiter tepida
bibat. Auxiliatur & peucedanū, aristolochia, cepæ lachryma,
panaces in vino aut aqua leuiter tepida datū. Vteros ad lo-
cum suū reducit, crotonis radix pota, aut cuminū Aethiopi-
cum, aut apiū, aut fœniculi & anisi semen, aut piper, aut myr-
rha, & papaueris succus potus. Si cor strangulatur, ab vtero
reprimitur, & spiritus habet, & anhelatio: Viticis, & pæoniæ
semen in vino bibere oportet. Aut abrotonum, & panaces, &
ammoniacum. Aut rutā, aut somnificū papaueris succū. Rur-
sus igitur si similiter habet, melāthiū terito, & melle subigi-
to, & velut glandulā efformato, ac pennæ circūdato, & appo-
nito. Aut philistion similiter subdito. Aut telephiū, aut ane-
mones folia trita, in linteum indito, & modica myrrha am-
mixta apponito. Si in lumbos vteri incubuerint, suffocatio
verò caput nō cōtigerit, polypos coctos edat, & vinū nigrum
odoratū meracum quā plurimū bibat. Quū verò velut ad
viscera cōuersi strāgularint, vinū cedrinū, & vinū Aethiopicū
bibat, & calida lauetur, & odoratis fomentis vtatur. Si ven-
to inflati fuerint vteri, aromata omnia in vnguentū immit-
tuntur, & laurus, & myrtus, & salvia, & cedri accupressi ra-
menta. Hæc cōtundito, & trita cribrato, & in vinum odora-
tum inspergito, & oleum rosaceū superfundito. Quum verò
transmoti vteri prefferint, ordeū vnā cum paleis, & myricā,
& cerui cornu, vino subigito, ac suffito. Quū assistētes stran-
gularint, funiculum lucernariū accendito, & præ naribus ex-
tinguito, quo fuligo & nidor ipsas ingrediātur, & picē, & ca-
storium, & peucedanū, & myrrhā, vnguento irino diluito, &
subacta apponat. Bibat autē resinam oleo dilutam. Si valde
strangularint, Aut testudinis iuxta mare natæ obolos tres, in
vini albi hemina, vel cyathis tribus tritos, bibēdos dato. Aut
cedro in lucernā infuso, lucernā accēdito, & vbi extincta fue-
rit, ad nares adhibeto. Aut cœnū foetidissimū similiter. Aut
lanā incensam sub nares mulieris suffito. Aut bituminis parū
tritū in vino albo bibat. Aut erylimi cōchæ testā, & castoriū
in vino

- A** in vino albo bibenda dato, et lauato. Si verò etiā tussiat, sandarachæ obolū, sulphuris vini obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, & castorij obolū, cū vino odorato misceto, & bibēda dato. Si verò strāgularint vteri, *Strangulatio uulue.* & strāgulatio cor cōtigerit, & os cōclusum fuerit, acetū calidū sorbendū dato, & os paxillo aut radio aperito, & vinū in odorū similiter exhibeto, & cū aceto mulso. Si verò valde strāgularint, & voce destituta fuerit, cepā in vino tepido tritā, in nares instillato & excitato. Si verò vsq; ad hepar ascēderint, & suffocatur, voce destituitur, & nihil videt, & dentes cōferit, & dura fit, & nihil sentit, & frequēter respirat, & non audit. Hāc sub præcordijs manibus cōprehensam frequenter inungito. Et dētibus cū paxillo diductis, vinū meracū tepidū infundito, si nihil prohibuerit. Et plerunq; statim melius habet. Si ad inguina incūbant ac innitantur, caprini stercoris pilulas, & leporis pilos phocæ adipe subigito ac suffito. Aut hederæ fructum, aut folia, aut corticē siccato, & quercus folia ac resinā ammisceto, oleoq; subigito ac suffito. Aut coaguli phocæ pellē cōterito, & spongiā ac muscū, cum phocæ adipe ammisceto ac suffito. Aut stercoris caprini pilulas, & phocæ pulmonē, ac cedri ramenta suffito. Sed & bubulū stercus suffito. Aut cornuū bouis ramenta, & bitumē. Aut spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hæc molli vnguento subacta suffito. Multa vero aromata in vnguentū iniicito. Aut vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinā pineā, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta à *Diuersa fomenta.*
- C** quibus discedūt. Stercus bubulum contusum, aceti dimidia mēsurā, & decocti erui ex qua marina aut dulci similiter dimidia adiecta, pro fomēto adhibeto. foueto autem leuiter & lenticulę decoctū bibendū dato, ac reuomendū. Et farinā sorbendā, & insuper vinū. Postridie verò granū cnidiū dato. Sed & quod vrinā ciet. Ciceris partes duas tritas, vuz passæ optimæ tertiā partē, affuso aquæ cōgio coquito, deinde excolatā aquā per noctē sub dio exponito, & postridie bibendā dato. & de cætero saluiā & lini semē, & polentā, bis per diē in vini diluti heminis quatuor dato. Aut olei heminas dimidias, tres foliorū sambuci manus plenæ mēsurā, hæc coquito, & cum calidis foueto. aut testis calidis immisisis fomentū facito, muliere in sella collocata, & vestimentis cooperta. Aut sambuci folia

HIPPOCRATIS LIBER II.

folia cū myrto coquito, & in excolata aqua paleas ordeī co- D
quito, & fomētum facito, si calorē sufferre poterit. Aut acetū,
oleum, mel, aquā. Hæc permixta ac valde feruefacta, in vesī-
cā infundito. Aut pini corticē, & rhois folia in aquā inijcito,
& fortiter coquito, & in excolatā aquā etiā ordeī paleas im-
mittito ac coquito, & affuso oleo foueto. Aut loti & cupressi
ramēta, aqua & oleo affuso, probē coquito, ac foueto. Aut cū
aromatis vnguentū infundito, & gallam inijcito, & rhamni
corticem, & polentā triticeā cum aqua. Si verò vteri extra
prominuerint, & depēdent velut scrotū: myrti baccas, loti ra-
menta, rubi & oleæ folia, simul coquito, & leuiter tepidē fo-
ueto. Aut cū vino vnā cum illis & cū graueolentib. similiter.

*Quæ vteri
prociunt.*

*Lenimenta
uaria.*

Externas autē partes cum oui candido oblinito. Cū verò E
perfrigeratur, & liuidæ factę fuerint, cum aqua calida. Mol-
litoria vteri. Adipē ouil. ouorum vitellum, mel, oleum rosa-
ceum sumito, & cū his farinā subigito, & ad lētum ignē tepe
facito, & quod destillat lana exceptū emollito ac apponito.
Aut adipē ouil. aromatis cōditum & nitrum rubrum, anseris
adipem, & oleum rosac. colliquata & lana excepta apponat.
Aut Anseris adipē, ouillum adipē, cerā albam, netopum, rosa-
ceum oleum. Hæc q̄ optimē permisceto, & tenuibus linteis
excipito, & statim vbi lota est, apponat tepida osculo vtero-
rum. Aut cerui medullā, & anseris adipem, in rosaceo oleo li-
quefaciat, & molli lana excepta subdat. Mollia subdititia,
quæ aquam ducunt, & mucos, & pelliculas, & non exulcerāt.
Myrrhā q̄ optimā, & salis granum, & picem aromatis imbu-
tam, terito & apponito. Aliud. Grana cnidia decorticata tri-
ginta. Indicum quod Persæ piper vocāt, & in hoc inest rotun-
dum, quod appellāt myrtidanum, cum lacte muliebri simul
terito, & melle diluito. Deinde lana molli ac pura excepta,
& pēnæ obuoluta subdito, & per diē finito. Si verò fortius fa-
cere voles modicū myrrhæ ammisceto, tertiā videlicet par-
tem siue trientē: & lanā mollē purā semisuccidā. Ex vteris
educūt, & osculū molliūt, narcissus, cuminum, myrrha, thūs,
abūinthiū, cyperis. Hæc ipsa per seipsa, & cū oleo rosaceo, aut
albo, aut Aegyptio. Apponatur autem vbi lota est. Aliud qđ
sanem cruentā educere potest. Cum tædis misceto myrrhā,
salem, fel taurinum, cuminum, mel, & in lana subdito. Aut
cumini folia similiter in vino trita. Aut silphij succū ad sicū

ammi

- A** ammiscero, & glandulā inde factam subdito. Idē facit & mori radix cū melle. & postea rosaceo illinito. Efficax est & alij caput integrū, & nitrum rubrū, & ficus pinguis, pari portione. miscero autē & gallā parū, & glandē facito, eamq; liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota cerui adipē in lana subditū habeat. Aliud quod cruenta omnia magis prioribus ducere potest, & mollire. Piper, elateriū, & lac muliebre miscero, & cū his terito etiā mel, & oleum albū, & cerui adipē, & linteo excepta subdat. Vehementer verò ducit omni-gena hoc. fici pingue, elaterij portiones duas, nitrum rubrum quantum elaterij, mellis parum, cū linteo aut cū lana glandē facito. Aliud. Netopum, fel tauri, nitrum, cyclaminū, gal-lam, cum melle terat. Postea verò lota adipem cerui subditū habeat. Aut pulegium & fel tauri tritum pēnæ obducatur, & in oleum Aegyptium tinctū subdat. Aut cyclaminum magnitu-dine tali cum æris flore. Aut anemones caput cum farina tri-tum pennæ obducito, & in oleo albo tingito. Aliud quod omnia ducit. Cucumeris sylvestris oblōgi interquā partem, exempto semine, cū lacte terito, & myrrham purā vna cū ip-sis, adiectoq; modico melle, & oleo Aegyptio, molli lana ex-cipito. Aut cucumeris sylvestris internā partē siccato, & mel-le affuso terito, ac glandē formato. Postquā autē lota fuerit, adipē subdat. Aut elaterij portiones tres cū aqua. Mollito-ria. Oui candidum, farinā, mel, ceram albā, hac simul tepe-facito, & quod destillat lana exceptum apponito. Aut adipē
- C** anseris, cerā albā, resinā, vnguentum rosaceum, cerui medul-lā liquefacito. Aut ouillū vel caprinū adipē, oui candidū, vn-guētum rosaceū. Ex his aut glandē facito, aut lana excipito.
- Fomenta per quæ vteri purgantur, si duri fuerint. Vinū suauissimū pari aqua tepere oportet, triū semicangiorum Atticorū mensura & fœniculi radices ac seminis eiusdē qua-dratē, & olei rosacei heminam dimidiā, in ollam mittere, cuius operculū foramē habet, & vinum superfundere, & arun-dine indita fomentum facere, & postea scillā apponere. Si dolores repētini irruerint, & animi deliquia affuerint. Rosa-rum folia, cinamomū, myrrhā purā, netopū, papaueris succū, hæc in pastillos drachmales efformato, & super frusto ampho-ræ candēti ponito, & pro suffimento vritor. Aut styracis mo-dicū in oleum mittito, ac vritor velut priore. Omnia quæ in

HIPPOCRATIS LIBER II.

vnguenta iniiciuntur tundito ac cribrato, & super sterco bu
 bulum mittito, itemq; styracē, & netopum, rosaceum oleū q̄
 optimum, & Aegyptium albū affundito, & post purgationes
 suffito. Aut lauri & myrti folia tundito, & cyperi fructū, cum
 vnguento albo Aegyptio subigito, addito etiā netopo, & su-
 per stercore bubulo suffito. Auxiliatur & manna thuris, & cu-
 pressi ramenta, & ciperi radix tusa. Sed & iuncū odoratum
 aromaticum, & cardamomum, et iridē tundito ac cribrato,
 atq; hæc omnia misceto, et rosaceū oleum ac netopum ipsis
 affundito, et vtitor in crassiore tritici farina. Aut resinam in
 recens formato fictili suffito, castorio, aut aliquo ex aroma-
 tis adiecto. Caput verò oleo rosaceo tingito, in aures autem
 myrteum, aut melinū oleum infundito. Et cicer albū, et vuas E
 passas coquito, ac decoctū bibendum dato. et in aqua calida
 desideat. Et oliuas albas priusquā oleum remittūt lancinato
 ac siccato, et in vino odorato terito, et acetabulum Atticum
 præbeto. Aut cātharidum ventres, aut adiātum, et nitrum ru-
 brum Aegyptium, et ferulæ radicem, et apij semen tritū, hæc
 exhibeto. Si verò vrinæ stillicidium corripiat, in aqua desi-
 deat, et vinum dulce bibat. Si maximè strangulāt in vterorū
 dolore, vinum suauissimū pari aqua tēperatū, trium semicon-
 giorum Atticorū mēsurā, et forniculi radices, et seminis eiū
 dem trientem, et olei rosacei heminā dimidiā. Hæc in nouā
 ollā mittito, et vino superfuso foueto. Et scillā apponat, do-
 nec osculū molle et amplū esse dixerit. et si exulceratum fue-
 rit, ac pustulæ ubiq; in ipsis fuerint, præstat adipe anserino cū F
 thure curare. Ad vterorum dolorem. Paucedanum, aristo-
 lochiā, panaces, hæc simul in vino dulci misceto, et tepesacta
 bibenda dato. Et peplū albū sorbeat, et vrticæ semen. Aliud
 fomentum siue suffimentum. Si dolor habuerit, malicorium
 punici dulcis, loti ramēta, oleæ folia sicca tusa. Hæc cum oleo
 subigere oportet, et super ignitū sterco bubulū mittere. Aut
 galbanum, myrrhā, thus, oleum album Aegyptium, super vi-
 tis sarmēta. Aliud fomētum fortius ex bitumine. Bitumē,
 radicem xanthij, pilos leporis, rutā, coriādrum siccum, hæc o-
 mnia terito, et formatas inde placētulas siue pastillos suffito.
 Aut ad picem, et sandarachā tūsā tritā, cupressi ramenta am-
 misceto, et vnguento affuso placētulas formato, et in ignē
 missas suffito. Aut cornu caprę in ramenta cōfectum oleo su-
 bigito,

*Strāguriæ
medela.*

*Vterorū do-
lor qui sede
iur.*

- A** bigito, & in ignem missum suffito. Aut effossa scrobe, vinea vix torreto, & cinerem in scrobem mittito, & vino odorato insperso, mulieri circumfidenti fomētum facito. Sint autem vineaceorum chænicos duæ, atq; hæc ipsa quàm maximè sicca. Si verò vterus doleat vsq; ad vesicam, porri semen cū aqua tritum bibat. Aut cyclamini radicem, in vino albo ieiunæ bibēdam dato, & calida lauetur, & subcalidam ieiuna bibat, & tepefactoria apponat. Aut alij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum, trita ac melle subacta apponito. & calida lauetur, & subcalidā bibat. Ad omnem vterorū morbum curandum. Lini scissi vnā cum stipula pugillū tenuiter tusum, in vino albo quàm suauissimo per noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepefacito. & in eo lanam molliissimā tinctā apponito, & vicissim priore detracta alia subdito. Opitulatur autem & crocus, & myrrha, & ponticæ nuces, albæ & pura lana excepta, & cū adipe anserino ac vnguento irino apposita. Si dolor vexarit ex subditijs purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundē, melanthium, cyperum, feseli, anisum, apij semen, netopum, mel, resinam, adipem anserinum, oui candidum, vnguētum Aegyptium, singula paribus portionibus in vino albo dulci, duarum heminarum mensura terito, & tepidis infusis colluito. Si dolor vehemens habuerit, cantharides, cyperus, calamus, iuncus odoratus, & iris profunt. Hæc in vino nigro coquito, ac vtitor.
- B** Alia collutio. Si dolor & vrinæ stillicidiū vexarit, porri succū, sambuci fructū, feseli, anisum, thus, myrrhā, vinū, in succum redigito, misceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulū, thuris tantundē, melanthij & cyperi tantundē, feseli, anisum, apij semen, netopū, mel, resinā, anseris adipem, oui candidū, vnguentū Aegyptiū, singula paribus portionibus in vino albo dulci diluito, ac infundito. Aut mercurialis aquā decoctā cum myrrha, thure, netopo. Aut saluiā, & hypericum, in aqua coquito ac infundito. Aut apij semen, anisum, melanthium, feseli, myrrham, casia fructum, in vino coquito ac colluito.
- C** Alia collutio. Si dolor fuerit vehemens post purgationem. Sambuci fructum, & lauri baccas, in vino nigro coquito ac colluito. Aut sambucū in aqua coquito, et aquam excolato, et vino dulci affuso colluito. Si post collutionem infusam dolor oboriat, aromata quæ in vngueta injiciuntur coqui-

*Morbi cuius
iusque utero
non sedatio*

*Doloris se-
datio.*

*Collutiones
variae.*

NOTHA

to, & de aqua duas heminas excolato, misceto autē adipē an-
feris, & oleum rosaceū, & tepida infundito. Amplius autē in-
fusum nulli, vt semel dicā, cōpetit quā duarū heminarū. Aut
mercurialē in aqua coquito, & ad succū, myrrhā ammisceto,
aut thus, & netopū pari mensura, & tepidū infundito. Si ve-
rō vteros doleat cyclamini radicē in vino albo ieiunā bibē-
dam dato. Et calida lauetur, & subcalidē bibat. Si ex ferui-
do & superficiali vlcere pudenda fuerint exulcerata, myr-
ti baccis in vino coctis colluat, & melilotū apponat. Et malī
punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrhā ac resinā
simul mixta vino diluito, & intinctū in his linteum subdito.
Et si vrinē stillicidiū corripiat, fomentū adhibeto, & pectinē
illinito. Desideat autē in decocto rosarū, aut rubi, aut myrti, E
aut oleæ, aut pampinorū vitis, aut iuniperorū baccarum, aut
saluiæ. Si vêtus in vtero obortus fuerit, & dolor vehemens,
& flatu nō exit, cuminū apponat. Et saluiam ac cyperū tusa
madefacito per noctē, & mane excolato, & lucidū ac clarum
cremorē in vas infundito, & crassiorē tritici farinā cum vino
albo ammisceto, & silphij succū magnitudine fabæ, cum fa-
rina coquito, & crudius sorbenda dato. Si columella in pu-
dendis nascatur, dolor obtinet. Et doloris quidē medela est
apij semen. Columellam verō refecare oportet. Si vlcera
in pudendis oboriantur, & pruritus corripiat, oleæ folia, &
hederæ, & rubi, & mali punici dulcis trita, & vino veteri di-
luta, cum recenti carne apponito, ita vt folia carni oblinas.
Et habeat subditam per totam noctem. Mane verō eximens F
& myrtum in vino coquens, cum vino pudenda colluat.

Nota ad finem primilibrī De morbis muliebribus adiecta.

*Tussis pue-
ri quē discu-
tiatur.
Venter qui
moueat.*

Ad tussim pueri. Thapsiā in polēta edendā dato. Aliud
Ex ovo afflato vitellū acceptū terito, & sesamū albū tostū,
& salem, cū melle delingēda dato. Ad aluū pueri soluendā.
Lanam illotā melle tinctā indito. Si verō antiquior fuerit
puer, ceparū internas partes tritas cum melle indito. Si lac
nō fuerit. Recētis tritici farinā elotam, melle ac oleo am-
mixto, tepidā sorbendam dato. Ad anhelitum pueri facit.
Thus in vino dulci, & illunies. Purgatorū. Glādulas fa-
cito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bituminis drachmis
duabus, felle bouis, myrrhæ drachmis tribus, elaterij potiōe
Hæc

A Hęc in vase æneo coquito, & anseris adipē ammisceto, & vbi vti voles, glādulis anserino aut ouillo adipe illinito, lana autem vttere molli. Vomitū soluit. Ocymi succus in vino albo. Aliud. Farinæ tritici recentis exsuccata aqua. Aut de malis punicis dulcibus & acidis succū exprimito, & deinde mel ammisceto. Corrosiuū sic paratur. Veratrū nigrū, sandaracham, squamā æris, singula paribus portionibus seorsim terito. Quum autē trita fuerint, ad vnā partē, duplā calcē ammisceto, & cedrine subacta illinito. Aliud corrosiuū pharmacum sic paratur. Florē æris purē cōbustum donec ruber fiat, terito ac vtor. Pharmacū nigrū. Squamā æris, & florem æris, seorsim ambo terito. Vbi verò cōtriueris, ita misce

*Vomitionis
remedium.*

B to. Duas aut tres pharmaci species facito. Vnam fortissimam quæ habet ad squamā, tertiā floris partē. Alterā, quæ quartā. Tertiā, quæ quintā. Hoc pharmacū ad omnia cōueniens est.

Illitio ad anginam. Roris marini semen, staphis syluestris, absinthiū, elateriū, mel. In doloribus podagricis. Abfcessus nitro trito aqua diluto, cataplasimatis modo integito, & tribus diebus non lauato. Vbi verò laueris, rursus nitrū rubrū crudū cum modico melle terito, & hoc semper vtor.

*Angina
& Podagra
medela.*

Inflammata illine portulaca cum farinæ massa, & lactucæ rubræ drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta oculatoria. Aes vstum, ærugo, fel capræ, myrrha, hæc dissoluuntur, & omnia simul trita vino albo diluuntur, postea in arundinem coniecta, sicca in vsum veniant. Puluillus. Misy præparatū in pila terito, & spumæ argenti chrysitidis appellatæ cinerē lotū ammisceto, Sint autē cineris partes tres, misyos vna. At misy in maza cōburito vitans ne diffuat. Nam dum torretur liquefit, vbi verò probè tostum fuerit, puniceū fit.

*Inflam-
mata.*

C Alius puluillus. Cerusa eodē modo cum misy tosto miscetur, velut chrysitidis cinis. Alius puluillus fortior prior. Spodiū cyprium ex fuligine lota, & cerusa, & misy torrefactum. Sunt autem duæ partes cerusæ de spodio, vna verò misyos. In hac anemonæ folia contusa exprimito, & in æris rubri vase ad solem exponito, & vt nihil illabatur cōtegito. Quū verò crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccatō, & siccatos quāmaximè fieri potest comburito, & postea perfrigeratos leuiter terito, & de spodio ex fuligine loto partem portionē misceto, deinde netopon instillato, & parum

N O T H A

terito, deinde melle diluito, & rescicata in vase æreo asseruato, ac vtitor. Puluillus mollis. Spodium cypriū, chalcitis nō lota leuiter trita, flos æris. Hæc paribus portionibus misceto ac terito. Alius. Spodiū cypriū, chalcitis leuiter trita, & cinis chrysitidis illotus. Hæc inter se terito. Alius. Spodiū lotū, chrysitidis, & æris flos, paribus partibus trita. Alius.

Vuæ acerbæ succus, & spodiū cypriū. Vuā immaturā in vigore cōstitutā sume, & succū per linteū, in vas æris rubri exprime, & aceti albi acerrimi tertiā partē ammisce, atq; sic in sole coque, & quinquies in die agita ac cōturba. Et vbi crassus factus fuerit succus, spodiū cypriū tritū ac adijce ac permisce, ita vt vbi sex aut septē dies in sole positus steterit, ad heminam succi Atticā, spodij drachmas octo immittas. Si verò acrius efficere medicamentū voles, minus de spodio: sin mollius, plus. Postea verò siccato hæc, donec in pastillos formari possunt. Deinde domi siccato, sursum in fumū suspensa, atq; hoc tandiu, donec testacea fiant, vt inter terendum nō adhareāt, postea sic vttere. Reponito autē in loco humiditatē nullā habēte. Alius. Spodium, chalcitidē, aceto albo subigito, deinde factos inde pastillos siccato, & vbi oculum sublinire voles, quā optimē terito, & vino veteri dulci cōcalefacito. Ad argemō oculi vlcus. Populi nigræ lachrymā, lac muliebre, misce ac vttere. Si oculum lachrymeretur, & dolor vexet. Mali punici dulcis succum expressum in æreo vase coquito, vt niger fiat instar picis. Si verò æstas fuerit, ad solē exponito, deinde liquidū sublinito. Si verò dulci lachryma fluat oculus, quum vna fuerit alba, valde matura, & gracilis in vite, decerptam exprimito ac excolato, deinde in sole siccato, & vbi siccus factus fuerit succus deradito, & æruginis dimidiū obolū attici ponderis ammisceto. Deinde hoc sublinito. Puluillus inspersilis. Plumbū & spodiū, æquis partibus, myrrhæ decimam partē, succi papaueris parum, vinū vetus, arida tere ac vttere. Alius, Accipitur scoria siue recrementum plumbi, & spodij tertia pars, & cerusæ tertia, & chartæ vstæ tertia, & myrrhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare voles, vitis lachrymā cū oleo illinito. Si verò etiā circa oculū tollere velis, euellito & illinito, & cū tenui cuticula discedet, & locus rubicūdus ac boni coloris erit. Ad intestinorū leuitatē.

108. a *Lachryma*
uo.

Deglabra
uo.

Licentia.

Lentes ac triticū recēs duarū chœnicū mensura aqua mēcerato,

- A** cerato, & vbi mollia facta fuerit, in pila aut mortario fortiter cōterito, deinde aquæ heminis sexaffūdito, ac fortiter cōmo ueto. & vbi purgamēta discesserint, ī ollā infundito, & modo melle affuso coquito, & valde cocta torrefacito, ac edēda prēbeto. Si verò sitierit, vinū vetustissimū bibat, atq; hoc vtať donec sanus fiat. Ad grauedinē. Si quis grauedinē habeat, *Grauedo.* myrrhā tritā ammixto melle: linteo excipiat, & nares cōfricet. Infusum sedis pituitā ducēs. Thapsiæ portionē, & vuas passas quadraginta: aut grani cnidij, aut cnestri potionem sumito, & mellis dimidiā heminā, ac olei tātundē ammisceto, *Pituita eductio.* & aqua marina diluito, in aqua furfures cocti sunt, aut ptisanā donec pinguis facta fuerit. Aut adipē betæ succo ammisceto, & nitri drach. decē. Aut salis heminā plenā aquæ marinæ ammisceto. Si verò bilē deducere voles, succi sulphij portionē, elaterij drach. vnā & dimidiā, colocynthis drachmā, terito & iisdem quibus prius diluito. Si autē vehemētius ducere velis, cucumeris syluestris internā partē quarta drachmę parte in dimidia aquā hemina macerato, & per sedē infundito, & si in egressu mordeat, ptisanæ succum postea infundito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tribus, internā cucumeris syluestris partē macerato, & salē, mel ac oleū ammisceto. & postea ptisanæ succū infundito. Aliud. Colocynthis drach. terito, & in lacte asinino macerato, ea dēq; misceto. Aliud. Cucumeris syluestris interioris drach. elaterij potionem, salis quantum tribus digitis apprehendi potest, mel, oleum, aqua marina diluito. At si stercus educere voles, nullum pharmacum bibito, sed alijs vtire. Infusum ad dysenterīā. Punici dulcis malicoriū in vino ad dimidias coquito, & olei, quartā heminæ partem ammisceto, & thuris quartā drach. partē. Aliud. Vnguēti rosacei dimidia hemina, ptisanæ succus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potiones duas tritas, in aquæ dimidia hemina diluito, & olei tantūdē affundito. Potio. Mala cotonea diffecato, & in aqua macerato, & vbi aqua odorē acceperit, bibēdam dato. Alia. Ptisanæ farinā in congiū aquæ missā, coquito donec pinguis fiat. Alia. Mala cōcisa siccata, & fauū mellis, in aqua macerato, ac simul terito, & vbi subdulcis facta fuerit excolato, & apij folia iniicito. Alia. Vnā passā albā, & calaminthē, & fauū mellis, in aquā mittito ac terito, donec aqua subdulcis fiat.

HIP.

A HIPPOCRATIS

COI LIBER DE STERILI-

BVS, IANO CORNARTO ME-

DICO PHYSICO

interprete.



E his quidem quæ accidunt mulieribus in singulis affectionibus, prius dictum est. Nunc autem ostendam ob quas causas mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariunt antequam sanentur. Causam verò hanc esse dico, si os uterorum omnino auersum fuerit à pudendo, non concipiunt. Non enim suscipiunt vteri

Cur quædã non ferunt conceptum.

genituram, sed statim foras exit. contigit autem hoc etiam si parum distortum fuerit os uterorum præter naturam à pudendo. Et si omnino conclusum fuerit os uterorum, neque sic suscipiunt. Neque si recens conclusum fuerit magis quam oportet. Singula verò relata manifesta sunt. Etenim si omnino auersum fuerit, aut conclusum, menses non prodeunt omnino, aut prodeunt violenter cum morbo, si sanguis coëgerit uteros pro more conuerti. Et si purgata fuerit mulier, aliquando os uterorum ipsi à pudendo auertitur. Si verò parum distortum, aut recens conclusum fuerit, prodeunt quidam menses, prodeunt autem violenter, & paulatim per multos dies. Hæc autem omnia manifesta fiunt, si sic habent, contingenti mulieri. & si horum aliquid fuerit, curata mulier fecunda fit. Quandoque verò etiam sua sponte. Hæc autem singula cur fiant, dicetur. Dictum autem est & in muliebribus morbis. Si leues fuerint vteri. Contingit autem hoc & ex natura quibusdam, & si vlcera innata magnas cicatrices reliquerint. Si leues igitur vteri fuerint, mulier in ventre non concipit. Nam genituram suscipiunt quidem vteri, si non alia aliqua causa obstiterit, non autem concipiunt, sed semen foras emittunt. Hoc autem maxime clarum sit contingenti, & si interrogetur an aliquando vlcera in uteros ipsi oborta fuerint. Menses verò sano quidem modo prodeunt in hoc morbo.

Cur quædã non concipiunt.

HIPPOCRATIS LIBER

*Cur ulcus
vulvarum
cuius curan-
dum sit.*

rūm talis plerunq; incurabilis est. & hæc causa est. vt in ven- **D**
tre ne concipiat. Si vlcus in vteris factum fuerit ab affectio-
ne quadam ex relatis, & non statim sanatum, sed impurum
factum fuerit, permanet vlcus ad multum tempus, quemad-
modū & id quod in aure existit. & malè olet mulier. & quā-
doque sanies malè olens ipsi ex pudendo fluit, & quandiu sa-
nè vlcus habuerit, in ventre nō cōcipit. Non enim cōcipiunt
vteri genituram. Huic autem menses sano modo procedunt.
Verūm ex contactu, & interrogatione, maximè clarum fit
de relatis. Curata verò fœcunda fit, exigua tamen spes est.

*Sterilitatis
causæ.*

Si quid ex mensibus in vteris remanens scissuram ac seg- **E**
mentum habeat, quod circa osculum aut paulò penitius ca-
lescat, & rursus frigescat, neque sic in ventre concipit. Impe-
dimentum enim hoc incumbens, geniturā quò oportet trāsi-
re non permittit. Et si quidem in principio curetur, sanescit,
& fœcunda fit. Si verò tempus accesserit, sterilis manet. Ma-
nifesta est autem affectio maximè ad contactum, Durum e-
nim quiddam intus est. Et si magis quàm conuenit vteri
hiarint, neque sic prægnaus fit. Non enim concipiunt vteri
semen genitale. Sed & hoc ad contactum clarum fiet, & mē-
ses acruatim prodeunt, & per paucos dies. Fit autem & na-
tura hæc affectio, & à relatis morbis. Et si quidē à natura fue-
rit, incurabilis est morbus: Sin minus, non sani prodeunt mē-
ses, vtpote muliere non existente sana, neq; sic prægnaus fit.

*Sterilitas
naturalis.*

Non enim compingitur semen à sanguine morbofo. Sed san- **F**
guis qui à corpore morbofo descendit, geniturā serosam fa-
cit. Serosa verò facta genitura, tēpore modico aut multo, fo-
ras progreditur vnà cum sanie. Atque hoc ex corpore mulie-
ris, & ex mensibus manifestum fit. Prodebunt enim ipsi men-
ses velut dictū est, siue biliosa, siue pituitosa, siue aquosa fue-
rit. At breui curata fœcunda fit: Sin minus, nō. Si verò mu-
lieri menses non prodeant omnino, aut ab omnibus relatis,
etiam sic nō concipit. Venæ enim sanguine plenæ, geniturā
nō suscipiunt: & in vteris aliquid inueterati sanguinis ines-
se necesse est, quod geniturā nutriri prohibet. Si verò pau-
ciores quàm debeant menses prodeant, neque sic prægnaus
fit. causæ verò in priore morbo relatæ sunt. fit autem hoc ma-
nifestum ex interrogatione. & si quidem à natura pauci mē-
ses prodeunt, incurabilis est, Si verò ab affectione aliqua ex
relatis,

*Cur non cō-
cipiant.*

A relatis, breui curata, fecunda erit. Et si plures quàm debent menses mulieri prodeant, neque sic in ventre concipit. Vteri enim sanguine euacuato, genituram non concipiunt, præ debilitate. Si verò etiam conceperint, sanguis multus derepente in vteros mulieris descendens, genituram suffocat. Manifestum autem & hoc est ex mensibus qui multi prodibunt. Et si quidem natura mulier multos menses demittit, sterilis fit. Si verò non natura, sed ab aliqua ex relatis affectione, breui curata fecunda erit. Et si os vterorum ex pudendo exciderit, neque sic concipit, Nam os durum fit, & genituram non suscipit, & intumescit, & propterea in totum infœcunda fit. Manifesta est autem hæc affectio, ex eo quod contingit. Et si non prodeant menses velut debent, sed deorsum processerint in sedem, neque sic in ventre concipit. Manifestum est enim, quòd os vterorum à pudendo auersum est, aut conclusum, & si quidem ad sedem auersum fuerit osculum, aut conclusum, curata fecunda fit. Vtrunque verò ex interrogatione ac responsione manifestum fit. Si enim menses semper sic prodierint, clarum est quòd his morbus causa est. Atque tot ac talia mulieribus contingunt, propter quæ nō pariunt antequàm curètur, & propter quæ omnino steriles fiunt. Quare mirari mulieres non oportet, quando coeunt quidem non autem sæpe pariunt. Experimenta per quæ indicatur an prægnans fiet mulier. Si cognoscere voles an mulier prægnans fiet, Butyrum & lac mulieris masculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, cōcipiet, Sin minus, non. Aliud.

*Conceptus
ta signa.*

C Netopum modicum lana exceptum subdat, & postea manè, an quod subditum est per os oleat, cōsideret, & si quidem oleat, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Cuicumque mulieri à subdititijs non valde fortibus, dolores ad articulos processerint, & stridor dentium ipsam habuerit, & vertiginè affecta fuerit, & oscitarit. Huic maior spes est vt prægnans fiat, quàm ei quæ nihil horum patitur. Aliud. Caput allij integrū depurgatum ac derastrum, ad vterum apponat, & postridie videat an per os oleat, & si oluerit, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Si cognoscere voles an mulier cōcipiet, anisum in aqua tenuissimè tritū bibat, ac dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicum corripuerit, concipiet. Sin minus, non. Prægnantem mulierem si non ex alio co-

*Prægnantis
signa.*

HIPPOCRATIS LIBER

gnoscas, ex hoc cognosces. Oculi videntur distracti ac caui- **D**
res, & candidum in oculis, albedinis naturam non habet, sed
liuidius apparet. Quæ in ventre habent, maculam solarem
in facie habent, & postquam conceperunt, vinum odio ha-
bent, & cibos auersantur, & oris ventris morfu, ac salua ple-
na fiunt. Mel & anisum tenuissimè terito, deinde in aqua
diluito, ac exhibero, & dormire finito, & si quidem tormen-
tibus ipsi fiat circa umbilicum, prægnans est: Sin minus, non est.
Post hæc autem omnia, farinam bibat, & mel, & origanū, in

*Conceptus
signa.*

*Signa ma-
ris vel fo-
etellæ.*

vino & oleo. Quæcunque in vtero habentes, maculam so-
larem in facie habet, foemellam gestant. Quæ verò bene co-
loratæ permanent, masculum plerunque gestant. Si papil-
læ sursum cōuersæ fuerint, masculum gestat. Si deorsum, fo- **E**
mellam. Accipe de lacte, & farinam misce, & pastillum for-
ma, & ad lentum ignem assa. Et si quidem comburatur, ma-
rem gestat. Si verò diffundatur, foemellam. Aut idem hoc lac
super folia emulctum contemplare. Et si quidem condensa-
tur, masculum gestat. Si verò diffusum fuerit, foemellam.

Curationes ad conceptionem experimento cognitæ. Si
qua liberorum generationem expetat, quæ sine liberis sit, &
si qua iam antea prægnans fuerit, nunc autem non pariat.

*Stomachus
mutat.*

Quum stomachus vteri durus fuerit totus, aut summa par-
te, & conclusus ac non rectus fuerit, sed ad alteram coxam
auersus, aut ad intestinum rectum inclinatus, aut in seipsum
contractus, aut labium stomachi sibi ipsi incubuerit. Vnde-
cunque igitur aut asper fuerit, aut callosus, sit autem durus & **F**
à conclusionè, & à callositate. His menses non apparent, aut
multò pauciores aut peiores quàm oportet apparent, & per
longius tempus. Et menses quidem iuxta sanitatem corporis

*Menses cur
inuicem na-
tura.*

& vterorum, exitum inueniunt. Itemque iuxta naturalem ac
iustum modum, & à calore & humiditate mensium, & sto-
macho non valde læso. At genituram rursus nō suscipit, pro-
pter læsionem, quæcunque tandem impediit susceptionem

*Medela
quæ conce-
ptum repa-
ret.*

à stomacho non bene habente. Huic post fomentū toto cor-
pori adhibitum, pharmacum bibendum dare oportet, & cor-
poris purgationem primū facere, siue sursum & deorsum,
siue deorsum solū. Et si quidem sursum purgans pharmacū
dederis, ante purgationem fomentum ne adhibeto, sed po-
stea. At fomento prius facto, pharmacum deorsum purgans
bibendum

- A** bibendum dato. Si verò sursum purgante nō opus habere videatur, præmisso fomento, deorsum purgans bibendum dato. Quum autē corpus probè habere visum fuerit, postea fomentum adhibeto, ita vt vteros frequenter insidere facias, in fomento quod maximè conferre visum fuerit. Inijcito autē in fomenta, cupressi ramenta, et lauri folia contusa, et multa calida saepe lauato. Quum verò recens lota et fota fuerit, vteri osculum dilatato, simulque dirigito si opus fuerit, cum specillo stanneo aut plumbeo, à tenui auspicatus. Deinde cū crassiore si admiserit, donec probè habere videtur. Tingito autem specillum in mollitorio diluto, quodcunque liquidum factum conferre videbitur. Specilla verò retro lata facito. Deinde lignis longis adaptato, ac sic vtor. At verò hoc tempore, in vino albo dulci quā suauissimo, et dā pinguisimā in tenuia frustra concisam coquens bibat, et apij semen contusum, et cumini Aethiopici semē, et thus quā optimū. De hoc ieiuna bibat moderata copia, per quot dies bene habere visa fuerit, et edat catulos pingues percoctos, et polypū in vino dulcissimo coctum, et de iusculo bibat, et brassicam coctam, et vinum album insuper bibat, et ne coenet, et bis in die laetur. A cibis verò hoc tempore abstineat. Postea verò si processerit secundum stomachum, et purgationem aliquam foras ostenderit, de portione aliquid bibat, per vnum atque alterum diem, et à specillorum vsu cesset, et conetur vteros purgare subdititijs, et medicamentis. Cuicumque verò: stomacho recto, et molli et sano, et probè habente, et in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, et per amplius tempus, et non sani: morbum perscrutatus quē vteri habent, et an corpus etiam aliquid conferat, cōperies causam à qua prægna non sit, et quum quidem sic habet, curationem facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationem incipiens à fortibus, prout tempestiuum esse videbitur, desinens autem in molliora, donec vterus probè purgatus esse visus fuerit, et stomachus consistere rectè habēs in sufficiente loco situs. Si verò à pharmaco et à portione non processerit, neque vbi ipsum bibit moderato tempore, à portione quidem hac cesset. Quum verò probè habuerit, per vsum specillorum os stomachi mollito, et vt hiet facito, ad viā subdititio præstandam, tum à medicamentis suffumigabili-

HIPPOCRATIS LIBER II.

bus, tum à mollitorijs. Postquam autem probè mollitum ac D
suffitū esse videbitur, appositis pharmacis vteri purgationē
facito, donec probe habere visum fuerit, incipiens à molli-
bus ad fortiora, delinens autem rursus in mollia odorata. ple-
raque verò ex fortibus medicamentis stomachū exulcerant,
& prohibent ne rectus consistat, & probe habeat ad genitu-
ræ susceptionem, & vterum siccum faciunt. Si verò mulier
à pinguedine vteros sibi laxos esse putet ad conceptionem,
attenuato ipsam quàm maximè, & ad reliqua gracilem faci-
to. Vernali autem tempore optimum est ad cōceptum. At vir
non sit ebrius, neque vinum album bibat, sed fortius ac me-
racius, & cibos edat fortissimos. & calida ne lauetur, & ro-
bustus sit ac sanus. & à cibis abstineat qui ad rem non condu- E
cunt. Quum autem mulier purgata visa fuerit, & stomachus
vteri rectè habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino
illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato, re-
ticulo loto nihil olēte deliget, linteo primū supposito. De
inde vbi galbanum ad ignem aut solem calefactum, ac pro-
be mollitum subdidit, quiescat. Postea mane exoluto reticu-
lo ac linteo, caput suum alicui olfaciendum exhibeat, & si
probe fuerit purgata, olet. Sin minus, non olet. Verū hæc à
cibis abstinens faciat. Si verò non fœcundæ apposueris, nun-
quam olet, neque purgata, neque aliàs, et si prægnanti appo-
sueris, neque sic olebit. Quæ verò sæpe concipit, & fœcunda
est ac sana, ei si apposueris, etiam si nō purgaris, olebit ipsius
vertex: alibi verò nō. Quum verò cognoueris ipsam rectè ha- F
bere, ad virum accedere iubeto. & mulier quidem à cibis ab-
stineat. Vir autem non sit ebrius. Verū frigida lotus, & ci-
bis paucis conducentibus pastus, & si mulier geniturā se con-
cepisse cognouerit, primo tempore non amplius ad virum
accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem vir dixe-
rit se emisisse, Mulier autem præ siccitate ignorat. Si verò v-
terus rursus reddiderit genituram eadem die, humidus erit,
& si humidus factus fuerit, rursus cum viro misceatur, donec
concipiat. Alia curatio. Vbi fomentum toti corpori ad-
hibueris, medicamentū bibendum dato sursum ac deorsum
purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibito, vte-
ros per fistulam duobus diebus foueto, cū vrina muliebri pu-
trida, nitro iniecto. Tertia verò die, cū vrina bubula. Quarta
autem

*Cum mulier
pinguis non
concepit.*

*Vinum ni-
grum ad cō-
ceptum fū-
cit.*

*Curatio
alia.*

- A** autem & quinq; foeniculi semen tritum, & sambuci folia ac lauri, & cupressi ramenta. Hæc coquito aqua affusa. Oporteret autem post fomentum, multa calida lotam, apponere adipem aromatis imbutum, statim à fomento, & ad noctē. Postea verò hoc preparato. Myrrham staten, butyrum, adipē anserinum, medullā cerui, resinā, & netopum. Horum singulorum æquales portiones permixtas ac liquefactas apponat in lana Milesia molli quàm optima. Deinde plūbeis penicillis quinque, ad octo digitorum longitudinem fabricatis, vterum aperito. Primus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Aperiantur autem per dies quinque, & semper lota apponat, & ex lumbis deliget, vt ne excidant, & semper vltius intrudat. Postremum verò quā penitissimè. Postquā autem aperueris, purgatoriū appone, chantaridas tritas quinque, & colocynthidis longæ internam spongiosam partē, & myrrham. Hæc melle cocto subacta, & in glandē efformata, lana inuoluito, excēpta summa parte. Deinde in oleū suauissimum tingito ac apponito. Vtere autem & hoc purgatorio, felle tauri, & flore æris assato, & nitro, & myrrha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo supnè phar maco obducto apponito. Vtere & buprestis cum myrrha. & elaterio cum melle cocto. & cantharidibus cum elaterio & myrrha. Postquam autem purgata fuerit, postridie vbi lauit vterum colluito. Cuminum Aethiopicum tritum, & melanthium, & resinā. & oleum, & mel, ac vinum dulce. Hæc mixta & tepesacta infundito. Postquā verò infuderis, erectā obambulare iubeto, quo collutio infusa cōcutiatur. Subdito autem crocum, & myrrhā, & thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita vt anserinum adipem ammisceas ac linteo oblinas. Atque hæc apponito per dies septem. Octauo verò suffitū facito, cum myrrha, bitumine, & ordeo oleo odorato subactis: his lento igni iniectis, ac suffito per fistulam facto. Postquā autem suffitum feceris, postridie castoris testem terito, vino albo affuso, & ipsum melle oblitū, & lanæ inuolutum, apponat in noctem. Mane verò eo sublato, ac emollito, ad virum accedat, & vbi cōdormijt, quiescat. & si non prima vice cōceperit, eodem rursus appposito, virum adeat. Cæterum hunc medicationis ductum incipere oportet vbi mēses prodierint. Desinentibus autē mētib; cōceptorio medicamē-

HIPPOCRATIS LIBER

*Cum con-
plius nō cō-
cipit.*

*Pus si in
uulua est se-
men perdit.
Medela.*

to appposito cōdormire. Priore verò tēpore neq; mulier ad vi-
rum accedat, neq; vir ad mulierē. Quum autem mulier non
cōceperit, prius cōcipere solita, vteri verò viri geniturā in se-
iplos suscipiunt: penitus necesse est mulierem, serosam hanc
facere. Quādoq; enim in vteris pus innascitur. pus autem in
vteris à tuberculis fit. Et sanè ob hoc genitura viri, qñ cum
viro coit, vteros non cōtingit, quo videlicet ipsa viri genitu-
ra cōpingatur. Nam pus ipsam dissipat, vt ne afferatur. Mor-
tificat enim pus, & putrefacit geniturā. proinde & pus ex
vteris expurgare oportet. & tuberculum in vtero sedare, quo
de cetero ne impediāt geniturā compingi ac afferri. Festi-
nare itaq; oportet ad expurgandam, priusquam pus in vteris
in callum cōcrescat. & vteros colluere hoc modo. Lac equi-
num coctum exactè colato, vt tenuissimū & purissimum eua-
dat, & hoc infundito, clysteris instrumento idoneo facto.
Et summa quidem clysteris pars leuis sit, argentea velut spe-
cilli, & statim modico intercedente spacio foramē perfore-
tur. Sint autem & alia foramina, nō magna, sed angusta, hinc
atque hinc, ex transuerso clysteris æquali interstitio distan-
tia. & clysteris quidem apex solidus sit. Reliquum verò totū
cauum sit, velut fistula. Alligare autē oportet vesicam suis for-
minæ, atq; hanc probè radere conficere. postquam autē alli-
garis, lac in vesicam infundito, foramina verò tenui linteo
obstruito, ne lac affluat. Vbi verò obturaueris, vesicam deli-
gato, & ipsi mulieri dato, cui collutionē infundere paras. Illa
verò exemptis obturamentis, in vterū indat. Ipsa enim sciet
vbi indere oportet. Postea autem tu vesicam manu premito,
quādiu pus foras effluerit. Manifestum autem hoc erit, vbi
nō amplius pus simul cum lacte exierit. palām enim clarum
est, quod non amplius inest. Atq; tunc cessare oportet, & post
hoc vbi paululū recreata fuerit, ad modicum tēpus, cucurbi-
tæ sicca fundum refecato, itemq; apicis summā partem, quo
perforata sit, ita vt similē efficias in reliquis, excepto apice,
velut clysterē: crassitudine verò paulò tenuior sit q̃ virile pu-
dendum. Hanc cucurbitam sic formatam vasi circumponito,
vase vino impleto. Sit autē vinum odorum fragrantissimum
& siccissimum ac vetustissimum. deinde lapidē nigrum pel-
lucidum in vinum inijcito. deinde cucurbitā ex ære albo fa-
ctā circumponito, & mulier circuminsideat, pudendum cir-

- A** cum cucurbitæ glandē adhibens qualiter oportet, quo cucurbita vera super æream emineat, duorum digitorum intra pudendum mēſura. Quum mulier geniturā ſuſcipere nō poterit, neceſſe eſt mēbranā ſuperexcreuiſſe in oſculo vterorum. Oportet igitur æruginē aris, & fel tauri, & ſerpētis adipē, ſimul miſcere, deinde pharmaco hoc lanā imbuere, & in bvyſinum linteum inuoluere, linteo melle ſublito, & facere ſubdiritium magnitudine maximæ oliuæ, & apponere ad pudendum per totā noctē. Supina autem iaceat. & in die auferat, & calida aqua lauet quā plurima ex myrti decocto. Apponat autem & poſtea ſingulis noctibus. & deinde cum viro coeat. Alia curatio. Marrubij foliorum manus plenæ menſurā, in vas articum iniſcito, & aquæ potabilis heminas Atticas quatuor affundito, & vbi per nouē dies præmacerauit, per alios nouē dies ieiuna, lota, duos cyathos de hoc bibat, pari mēſura paſſi albi ammixtā. Quum autē tertiā diem potādo tranſegerit, fomentum adhibeatur, cicutæ folijs in ignem miſſis, per nouem dies. & poſt fomentum lauetur. Atq; ſic rursus de hoc bibat. Quum verò per triduum fomentum adhibuerit, marrubium ipſum tritum in die apponat per triduū, & mercurialem tritā in melle Attico bis in die. præmaceretur autē in vini albi congio, hippomarathri & fœnicull radix, & rædæ pinguiſſimæ ramuli, & rubiæ quarta pars, & fœniculi ſemen, & verbenacæ radices multæ. præmacerenturq; diebus non minus quā nouem. & poſtea loto capite, in balneo heminam per diem de meri cremore bibat. & poſtea reclinata ſeiſſam cōcaleſciat. Atque hinc poſt potum, alternis diebus id quod ex felle paratur, per diem ad dies ſex apponat. Quū autē iam virum accedere vult probè purgata, hyoſcyami folia ac radices in aqua ferueſciat, & ex his quā calidiſſimis per triduum ad noctē fomentum adhibeat, & lota virum accedat. poſt hoc verò fomentum, etiā cerui pudendum ſiccum ſufficit: & de hoc in vinum album dilutum deradens, per triduum bibēdum, & quum partus dolor inſtiterit, bibendū dato. Nam hoc partum accelerat. Alia curatio. Fel tauri ferueſcito, & alumen melium, & cornu cerui uſtum terito, & permixtis ac in glādulas efformatis vtor. Aliud curatiuum. Cuminum in vino nigro coctum tritum, in glādē efformato & ad noctē apponito. poſt hæc verò ſcē vini albi tenuiſſimā

*Quum genitrix non ſuſcipitur.
Diedela.*

HIPPOCRATIS LIBER

videlicet fecis partē, cōburito, & cōbustā in pēna auferas, li-
teoq; illigatā, ad noctē subdas. & porrum coctum edat. post
hoc tragiū terat, & melle dilutū in noctē apparet. & deinde
tragij fructum tritū, in vino albo dilutū, tædæ ramētis adie-
ctis bibendū dato. & postea organū alternis suffito. & sic ad

*Qui conce-
pitur pare-
tur.*

*Cognitiobi-
liosa & pi-
uitiosa.*

virū accedat. Alia curatio ad mulierē parere nequeūtē. Si mu-
lierem parere nequeuntē, puerpurā facere velis, in mensib-
cōsiderare oportet, an biliosa sit, siue pituitosa. cognosces au-
tem utrū horum magis sit, si vbi mēses prodeūt, arenā tenuē
& siccam in sole substraueris, & de sanguine infuderis, & si
quidē biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus, luteus sit. Si ve-
ro pituitosa, velut mucus. Utrū igitur horū fuerit ventrē pur-
gabis, siue sursum siue deorsum opus habere videtur. Deinde

*Si qua alia
conceptum
impediant.*

intermissis tribus diebus, vteros purgato. & si humidius vte-
rorum osculum fuerit, acria apponito, quo cōmorsum & in-
flammatū os vterorū durū euadat. Si verò mulier internis
partibus non febrat, neq; præ vteris cōcipiat, neq; viro mi-
fceri queat, sed dormiat, & cibū auerfetur, vinum melle am-
mixto pudēdis infundatur. & myrrhā suffito. In sedem verò
glandes indat. & vinū adipe anserino ammixto, in pudendū
infundat. Deinde etiā oleum pari melle mixtum infundat.

Medela.

Si mulieri vteri gracilescāt, & osculum ipsorum exaspere-
tur, & concludatur, & menses ipsi non appareant, neq; concei-
piat. Sed febris corripit lenta, & dolores incidunt ei in lum-
bos, & imum ventrem. Morbus autem hic maximē fit, quum
quid in ipsa fuerit corruptum. fit autem & ex partu. Hanc ca-
lida lauare oportet, & fouere. Quum autē lota ac fota fuerit,
os vterorū dilatare cum specillo. & myrrham tritā cum pari
netopo apponat. Aut vnguentū, aut oleū rosaceum in linteo,
& plumbum instar glandis formatum apponat, felle bubulo

*Cum pin-
guedo cōce-
ptum impe-
dit.*

illitū. Et in quatuor diebus infecundas cognosces. & fomen-
tum adhibeto, & pharmacum bibēdum dato. Si verò præ-
ter naturam mulier fuerit crassifecta, in ventre non cōcipit.
Nam omentū crassum ac multū incumbēs, os vterorū depri-
mit, & genituram non suscipiūt. Hanc attenuare oportet, &
pharmacum deorsum purgās bibendū dare. & ad vteros ap-
ponere quod purgat, ac flatum inducit.

*Cum os vul-
uæ durum
est.*

Si os vterorum du-
rum fiat, aut ceruix, ex digiti contactu cognosceat. Itemque si
ad coxam auersū vteri fuerint. Quum sic habuerit, nihil acre
adhib

- A** adhibeto. Si enim os vterorū exulceraueris, quū inflāmatum fuerit, omnino periculum est ne sterilis fiat. Verū apponito quæ nō mordent, à quibus pituita purgatur. Quum menses mulieri prodierint, & præterierint, primū quidē caput purgare oportet. Deinde veratrū exhibere, siue semel siue bis opus fuerit. Postea verò fomentū adhibere, fomētatorio ex cucurbita constructo, sic autem facto. Aquam marinā in vas infundito, & porro immisso, fistulam cucurbitis imposito, & cum luto quā optimo illinito, vt ne transpiret. Deinde per sellam erectā quadrangularem, transmittito ipsam fistulam, quo duorum digitorum mensura emineat vltra sectionem. deinde prunas subaccendito. & in desessu caueat, & quum desideret, & quū surgit, vt ne cōburatur. Sed desideat dum adhuc frigidum est fomētatoriū, & surgat dum fistula est perfrigerata. In hoc verò fomento plurimam diei partem consumat, & in huiusmodi fomenti vsu ad quinque dies perseueret. Per decem verò dies pro porro, allium in fomentum immittito, & huius fasciculum contusum in aquā marinā inijecto. Postea verò reliquis diebus, ipsa sola aqua marina foueatur, vt vltra ne procedat pro totā curationē. Ceterū postremum fomentū quū à curatiōe desistere voles sic facito. Catulum recētissimum resecato, & aromatum omnis generis odoratissimorum ac siccissimorum species contundito, & interaneis catuli exemptis, aromata indito ac expleto. Subiectis autem lignis, & catulo in vas misso vinum odoratissimū affundito, & fomentum per fistulā facito. & si vires permittunt, totam diem cum hoc fomento ipsam foueto, ac interrogato, an odor aromatum per os olere videatur. non enim exiguum hoc signum est ei quæ curatur, ad conceptionem. Subdititijs verò vtere, croci quantum voles, & myrrhæ magnitudinem fabarum duarum, & salem sufficientem permisce illorum respectu, & fellis taurini fabarum duarū magnitudinē. Si verò mitiore vti voles, minus fellis ammisce: Si fortiore, plus. Hæc trita melle instillato tere, donec id quod teritur, fiat tale, vt digito efformare possis. Quāto autē magis triueris, tātō siccius, & viscosius, ac melius erit. Vbi autē efformaris crassius quā glandē, & summā partem acutā, & mediū crassius, & deinde consequenter quo ad vterum apponatur, in hoc ipsum surculos origani duos leuigatos infigito. Sint
autem

Cum menses plus iusto defluunt

HIPPOCRATIS LIBER

autem longitudinis sex digitorum. Deinde lana mollissima **D**
 furculos inuoluito & filo tenui superne deligato, & præmi-
 neat filum quatuor digitorum longitudine præ furculis infi-
 xis. postquam autem perfudit & puram seipsam fecit, ipsum
 ad vteri os apponat, linteum sub coxas subijciens, & per no-
 ctem appositum sinat. Erit autē ipsi purgatio aquosa. postri-
 die ubi surrexit, lauetur & ea die super fomentū ne infideat.
 Quum autem fomentum adhibuerit, & de fomento surrexe-
 rit, ceratum sit quā optimum prima illa die factū, & in ip-
 sum cerui maximē medullam cōmisceto: Sin minus, adipem
 anserinum. & quum à fomēto surrexerit, quotidie ubi se per-
 fudit, & puram circa ventrem fecit, cerato vterum inungat.
 Aut reliqua quidem omnia superioribus ammisceto, excepto **E**
 felle, organum verò leuissimē tritum in glādem permisce,
 & apponat. Aliud. Reliqua quidem omnia ad eundē mo-
 dum facta, verū pro organo ablinthium ammisceto, & eo-
 dem modo efformata apponat. Aliud. Ex tritico melan-
 thium deligito, & probē terito, melleq; ammixto in pilę for-
 mam redactum apponat. Verū febres inducit, et articulum
 tumefacit, et vehementer mordax hoc est. Aliud. Mel, et
 veratrum nigrum tenue non multum, coquito. Vehementer
 enim mordax euadet. Sed et hoc febrificū est. Eodem mo-
 do mel coctum, et elaterij potionem coquito, et factam inde
 glandem subdendā dato. et hoc febrificum est. Ducit autem
 et sanguinem. Quædam verò ex his etiam pelliculas. Si ve-
 rò voles, etiam dracontium derade (Est autem lene) et hoc **F**
 cum melle cocto aut crudo, in pilæ figuram velut magnam
 gallam efforma. Ceterum conare, vt physicus sis, ad hominis
 habitum ac robur respiciens. Ex his enim nullus est qui non
 omnia ad amussim faciat. Proinde ex his ipsis cōiecturā fa-
 ciens, totius corporis, et capitis purgationibus, medicamētis,
 et vteri fomentis, ac apposititijs vti conare. Hæc autem ele-
 menta tibi sunt. Verū medela horum vnicuique particula-
 ris est. Et ubi horum quid nō feceris semper in fomēto per-
 seueret. Hoc enim est quod mollit, et ducit serosos ac sanio-
 sos humores. Postquā verò ab hac curatione desineris, his que
 secundum naturam fiunt desinentibus, sanguinem de manu
 detrahare oportet. si quidem fortis fuerit, de ambobus bra-
 chijs. si vero debiliior, de altero sufficit. At verò diæta qua in
 his cu-

A his curationibus vti oportet, alibi à me indicata est. Si verò suffire voles, lolium ex tritico deligito, & molito, factoque igne sarmeticio lentissimo, in carinum mittito, & mulierem super sellam impositā, mollibus linteis instratam, sedere iubeto, eruribus quā maximè diductis. Atque hæc curatio si quidem sufficiens tibi fiat in quatuor mensibus, bene est: Sin minùs, ad hæc præcipe etiā vt ad virum ne accedat, eo tempore quo curatur. Inter curandum autē, tadam in aqua macerato, & ieiunæ cyathū bibendum dato, & penicillum stanneum assiduè subditum habeat, & cotyledonas siue vmbilicos veneris, vnā cum sale & cumino, in aqua coquito, & tepidam sorbendam exhibeto. Et latæ quidem cotyledones scæ-

*Cotyledo-
nis natura.*

B mellas gignere videntur: parux verò & conclusæ, masculos.

Conceptorium summum. Melanthium mulieri in vino nigro acerbato bibendum dato. Mulierem iuenculam fluxus ruber infestabat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac vena secta, nihil meliùs habebat. Videbatur autem hæc causa ipsi esse, vt ne conciperet. Dabam itaque ipsi vinum album, in quo aspalathi radices efferbuerant, manè & antè coenam, & fluxus sedatus est, & non longè post concepit, & peperit masculum, Erat autem corpore coloris candicantis, & probè carnosæ. De mola. Molæ porro cōceptus causa hæc est, Quum multi menses, modicū & morbosum semen conceperint, neq; foetus rectus sit, & venter plenus est velut prægnantis. Nihil autem in ventre mouetur, neque lac in mammis generatur. Mammæ autem turgidæ sunt. Hæc itaque & ad duos annos, sæpe etiam tres sic habet. Et si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest vt superstes maneat. Si verò plures, erumpit ipsi per pudendum sanguis mulieris ac carnosus. Et si hoc moderatè fiat, seruat. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidem talis est. Iudicare verò oportet ex plenitudinis mole, & quòd in ventre nō mouetur. Nam mas trimestris, scæmina quadrimestris motū habet. Postquā igitur tempore hoc prætergresso non mouetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnū signum, quòd lac in mammis nō generatur. Hæc igitur maximè quidem ne curato, aut certè cum prædictione. Et primū quidem totum corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat. Fortassis enim quod

*Mola con-
cepit.*

*Quibus di-
gnoscas.*

*Curatio
que.*

compactum

HIPPOCRATIS LIBER

*Vteri pur-
gationes.*

*Quæ uid-
et os ape-
riant.*

compactum est cōmoueris, id quod factus esse putatur, mu-
liere à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo san-
guinē educas: Sin minùs, subdititijs vtatur è buprestis, & di-
ctamnū creticū in vino bibat: Sin minùs, castoris testem.
& retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito,
& plurimum sanguinem detrahito, atque hoc maximè con-
iectura virium ipsius facta. Ad vteri purgationes, quum nō
fiunt, siue ex partu, siue etiam aliàs. Tædam pinguis-
simam in vino albo coquito, & trium cyathorum men-
sura vtatur. Aut pæoniæ grana quatuor, cumini Aethio-
pici parum, & seselis paulò plus. Aut cedri baccas. Si ve-
rò suffocationes affuerint, castorij parum. Si verò purga-
tione moderata ex partu facta, venter maneat, aut etiam fla-
tus conclusus, & dolore vexetur, siue cum febre, siue citra fe-
brem, succi scammonia quintam potionis partem, aut seseli,
aut aliud quoddam ex odoratis, & rutam in vino albo biben-
dam dato. Si autem bibere nolit, illitionē ad sedem facito,
velut verbi causa, ex felle taurino, & melle, ac litro. Si verò
ex purgationis corruptione dolore vexetur, & odoratis ex-
hibitis nihil cedat, & febris adsit, lactis caprini heminas
duas decoquito, deinde eo perfrigerato pinguedinē detrahi-
to, excolatoque, & aquæ mulsæ tertiam partem ammisceto,
quo dulcius fiat. Bibat autē hoc ter ieiuna. Si verò dolor non
quiescat, neque venter subeat, ad vesperā in calidam aquam
in folio insideat. Quum autem perfora fuerit, vbi inde surre-
xit, cum vino nigro austero aqua diluto, olei dimidia parte
addita, tepidè colluito, & inde dormiat. Subdititium vte-
rorum. Si conclusum fuerit, aut durum osculum vterorum,
Ficum albam expurgato, & nitrum Aegyptium purissimum
tritum ammisceto, & subdititium facito magnitudine gallæ
non magnæ, quod in lana molli in vnguētum irinū tinctum
apponat, per tres aut quatuor dies, prout visum fuerit. Post
hoc conducit fomentum odoratum. Postea verò molli quo-
dam opus est subdititio, quod saniosa maximè ducat. Deinde
mercurialem, si tenera fuerit, cum vnguento rosaceo, in lin-
teo ad diem ac noctem subdat. Ad idem. Fel taurinum
& salem feruefacito, & sulphure trito ammixto, in oblōgam
spiram ac tractum efformato, & ad duos dies ac noctes nu-
dam, ad ipsos vteros apponito. Et deinde rursus mercurialē.

Post

- A** Post hoc myrrham puram inspergito, & rosaceo ac irino vnguento ammixto diluito, indeq; vteri osculum quàm penitissimè illinat. Ad idem. Iridem odoratam contusam ac cribratam seorsim, & cyperi tâtundem, & crocomagna magnitudine massę manum implentis, vino odorato diluito, & ad vnguēti formam redigito, & splenijs palmi longitudine induēta ac illita, in paruam pixidem reconde, vt ne transpirent, & apponat. Si verò vlcerati fuerint vteri, aut osculum exasperatum fuerit, aut ab aliquo subdititio commorfi fuerint, adipē in lana illinito: & rosaceum ac cerę parum inungito. Quum pragnās corruperit fortum menstruum, & ad finem perferre non poterit, & tenuis præter naturā fiat, huius vteros purgare oportet, & ipsam medicamētis curare, & crassēfacere. Non enim ad perfectionem gestare poterit, donec seipsam refecerit, & vteri robusti facti fuerint. Si verò cōcipiat quidem, corrumpat autem fœtus bimestres, exactè eodem tempore, & neque prius neque posterius. & hoc perpessa fuerit bis aut ter eodem modo. Aut etiam ad amplius tēpus progressum corrumpat eodem modo. Huius vteri nō amplius extenduntur, fœtu in ipsis augescēte, & ex bimestri aut trimestri, ad ampliorem modum excedente. Verūm fœtus quidem augescit. Vteri verò non crescunt, & propterea multæ eodem tempore corrumpunt. Huius vterum colluere oportet, & subdititijs quàm maximè inflare, aut hisce medicamentis. Colocynthis internam partē tufam cribrato, & silphij parum, cum paulò ampliore melle cocto ammisceto, & hæc circum specillum obducito, ea crassitudine quantam stomachus ad vteri os suscipere potest, & semper vltra protrudito, donec ad internam vteri partem penetrarit. Quum autem pharmacū colliquuerit, specillum eximito, & rursus eodem modo paratum elaterium, & colocynthidē, syluestrem, similiter velut prius medicamentum apponito. Edat autem hoc tempore allium multū, & silphij caulem, & reliqua dięra vtatur, quæ flatum maximè in ventre inducere potest. Apponat autem subdititium tertio quoque die, donec bene habere visa fuerit. Quandoque verò pluribus diebus interpositis: & in summa, prout libenter admiserit. Interiectis autē diebus, vtatur mollibus, postquam verò per emollitoria osculum vteri preparauerit, & mēses apparuerint, paulūm remota

*Vulua ulce
ra.*

*Quæ ante
tempus fœtus
perdunt*

Medda.

HIPPOCRATIS LIBER

D
 rata, vbi iam sicca fuerit, cum viro coëat. Quum autem fla-
 tum in vterū inducere voles, alij caput integrum, & silphij
 succum, ad subditicia ammisceto. Quod si qua pręgnans de-
 cem menses perficere non possit, sed corrumpit, & hoc sæpe
 patitur, ex huius vtero aquam purgato, & ipsam medicamen-
Cur quę se tis curato, quo aqua purgetur. Si vero geniturā continens,
men retinet
ne concipiat non pręgnans fiat, id quod multis contingit, stomacho vteri
 præter naturam hi ante menses plures quam conuenit, & hu-
 midiores prodeunt, vt & id quod à femina prodit semen, ad
 fortificationem non concipiatur, & viri genitura insuper ac-
 cedens corrumpatur. Contingunt autem hæc, & corpore, &
E
 vteris ægotantibus. Verū oportet huic medicamenta de-
 orsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, totum
 corpus fouere, & vteros cum aceto & aqua marina, specillis
 ac ferramentis ignitis immisis. Conijciantur autem in fo-
 mentū curpressi ramenta, & lauri viridis folia contusa, & po-
 lycnemi folia. faciendum est hoc fomentum tempore oppor-
 tuno. post hoc verò lauetur, & fomentum adhibeatur ex loti
 ramētis, & rosæ, ac polycnemi folijs aceto incoctis. Ad finem
 autem suffitus fiat, ex verbasci folijs contusis ac loti ramen-
 ris. Verū ante lotionem suffito myrrham & thus, vtraq; æ-
 quis partib⁹ trita, & myrti ac lauri folia. His permixtis & in
 lentum ignem coniectis, recens adhibito fomēto suffito, bis
 in die, fomentum autem adhibeatur recens lotæ. Sed & post
 suffitum lauet, & vteri stomachum ad pristinam naturam re-
 ducat. Et si vires sufficiant, ante hæc omnia venam in manu
 sinistra secato, atque ita reliqua facito. Si verò stomachus sic
 habeat, menses autem non prodeant, aut vitiosè, aut minus,
 ad reliqua omnia ampliorem purgationē adhibeto, & sic cu-
 rato, subdititijs etiam vtēs si opus habeat, & ex prioribus la-
 uans, & suffitum faciens, ac siccans. Si mulier inuita abor-
 tum faciat, nec ita eiicere velit, triticum torrefactum & mo-
 litum, & vuam passam albā contusam, aqua mulsā dulci dilu-
 ta, modico oleo affuso, ieiunæ bibenda dato. postea raphani
 semen tritum, & acetum ac adipem anserinum, permixta bi-
 bat, & lauri folia trita apponat. Deinde bibat origanum, &
 pulegium, & polentam ex aqua, ita vt lauri folia tusa ac trita
 ammixto gūmi, aquæ inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipē
 opillum, & anserinū, & mel simul mixta ac trita diligenda
præ

- A** præbeto. Aut pastinacæ semen leuissimè terito, & lacti superstantem concretionem ammisceto, & adipem anserinum eliquatum. Hæc feruefacta sorbenda dato. Aut origani folia viridia, si haberi possunt, sin minus, sicca leuissimè trita, ex aqua bibenda dato. Aut lauri baccas leuissimè terito, & suis foeminæ adipem liquatū, & mel ammisceto, & simul omnia trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semen leuissimè tritum ex vino diluto bibendum. Si vteri genituram non contineant, plumbum, & lapidem qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, & linteo illigato, quo in muliebri lacte tincto, subditio vtatur. Aut æris florem tritum ac melle dilutum subdat. Quum vteri genituram viri eructant tertia die, necesse est mulieris, quæ hæc patitur, vteros callo repletos esse, *Quum semen non retineatur.*
- B** & nō potest viri genitura intus in vtero manere, sed excluditur, & propterea concipere non potest, quādiu callus in vtero fuerit. At calli expulsio sic fit. Pennas sumito minutissimas ac mollissimas, hisq; simul colligatis vteros illinito, quēadmodum oculos illinire solent, ita vt pennas exæques, ipsarumq; summas partes tenuissimo filo deliges, & multo rosa ceo illinas. Sic autem facito. Supinā reclinato, & sub medios lumbos puluinar subijcito, & specillū immittito, ita vt cruribus mulieris extentis, & hinc atque illinc diductis, specillum sursum ac deorsum vertas donec promineat: postquam autem videris in osculo vteri callum, optimum quidem hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed vltro sequatur. Si itaque in osculo vteri inhæret, volsella tenuissima præhensum extrahere conare, prouidus vt placidè hoc fiat, & nō violenter.
- C** Et postea viro condormiet. Si prægnanti menses compareāt, sterces asininum siccum, & rubricam, & sepiæ testam terito, & linteo illigata apponito. Aut pæoniæ semina nigra, in vino diluto trita bibenda dato. Si verò à coitu, imum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen rufum & muscum mollem, & adipem anserinum, mixta ac molli lana excepta imponito. Si vteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maximè pudenda, & sedem: & vrina paulatim destillat & pudendū mordet. patitur autē hæc si recens ex partu viro condormierit. Quum sic habuerit, myrti baccas & loti ramēta in aqua coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendis affundito, &
- Quum vulua procidit. Medela.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Quum uul-
us penitus
propendit.
Curatio.*

trita hæc apponito. Postea aquam lentium bibens, melle & D
aceto ammixtis, vomat donec vteri fuerint retracti. & le-
ctus à pedibus altior sit: & graueolentia sub pudenda suf-
frito, odorata verò sub nares. Cibis vtatur quàm mollissi-
mis, ac frigidis: & vinum aquosum album bibat, & non la-
uetur, neq; cum viro dormiat. Si verò omnino ex pudendis
exciderint, dependent velut scrotum, & dolor corripit. Hoc
autem contingit, quum ex partu laborarit, vt vteros concusse
rit, & cum viro dormierit in puerperij purgatione. Cùm sic
habuerit, frigefactoria apponat, & quod foris est depurgatū,
ac cum vino nigro vinoso, in quo malum punicum coctū est
ablutum, intrò detrudat. Deinde mel & resina, pari mensura
eliquata, & pudenda infundantur: & decumbat supina pedes E
sursum extentos habens: postea spongiar apponat, & ad lum-
bos deliget. Quādiu verò sic habuerit, à cibis abstinere oportet.
Potu verò quàm paucissimo vti, donec septem dies prætereant:
& si quidem sic redire voluerint, bene est: sin minus, summas
vteri partes deradito, lauato, & cerato picato illinito. Deinde
pedes ad scalā deligato, scalamq; iuxta caput pulsato, & cum manu
intrudito. Postea crura ipsius alternatim colligato, & diem ac
noctem finito in quiete, & modicū ptisanæ succum frigidum
dato, aliud autem nihil. Postera die ipsam reclinato, & cucurbitam
quàm maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere
finito: & cùm detraxeris, reclinatam iacere finito, & nihil
aliud præter ptisanæ succū exhibeto, donec septem præterierint
dies. Cibis autem tunc F
mollissimis ac paucissimis vtatur. Si verò ventrem exonerare
voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim dies
prætereant, postea surgat, & quàm parcissimè deambulet,
& non lauetur, & cibis modicis vtatur, sub pudenda
verò suffitus per graueolentia fiat. Et postquam obambulare
inceperit, subligar gestet.

HIPPO

AHIPPOCRATIS COI DE MORBIS PO.

PVLARIBVS LIBER PRI-
MVS, IANO CORNARIO
MEDICO PHYSI-
CO INTER-
PRETE.

*

SECTIO PRIMA.

Constitutio temporis prima.

B



N Thaso autumnni tempore, circa æqui-
noctium & sub pleiadas, aquæ multæ,
assiduæ, molles, velut in austrinis,
hyems austrina, parui venti aquilonar-
es, squalores, & omnino hyems quale
ver fieri solet. Ver autem austrinum, fri-
gidum, pluuiæ parux. Aestas plerunque

*Vergilia
Thasos.
Temporum
uarietates.*

C

nubila, aquarum inopia. Etesia parum, modicè, sparsim
spirarunt. Quum autem totus hic aëris status ad austrina
vergeret, ac cum siccitatibus fieret, ante ver quidem ex
priori statu, subcontrario & aquilonio fiente, paucis ob-
orta sunt febres ardentes, atque his omnino boni status, &
paucis sanguis erupit, neque ex his moriebantur, Tuber-
cula verò circa aurem alteram multis erant, plurimis ex
vtrisque, citra febrem erectè obambulantibus. Quibus-
dam verò etiam parum incalescebant. Extincta sunt omni-
bus absq; nocumento. Neque cuiquam suppurarunt, quem-
admodum ea quæ ex alijs causis sunt oborta. Erat autem
natura ipsorum hæc, laxa erant, magna, diffusa, non cum
inflammatione, doloris exortia, omnibus obscurè euāue-
runt. Fiebant autem hæc adolescentibus, iuuenibus, in vigo-
re constitutis, & ex his plurimis qui circa palæstrā & gymna-
sia exercebantur. Mulieribus verò paucis fiebāt. Plurimis ve-
rò tussis sicca, qui tussiebāt & nihil reiectabāt, & voces non
longè postea raucofæ. Quibusdam verò etiam interposito

*Causas.
Tubercula
secundum
aures.*

*Quibus hæc
fierent.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

tempore inflamationes cum dolore, in altero testiculo, quibusdam in utroque. Et alij quidem febres, alij non. Hæc autem plurimis laboriosè fiebant. De cætero verò, quantum ad ea quæ in officina medica ad chirurgiam pertinentia sunt, sine morbo degebant. At verò ante æstatis initium, & per æstatem ac hyemem, multi ex his qui longo iam tempore sub corrupti erant, tabidi decubuerunt. Nam & multis qui ambigui erant, tunc tabes confirmata est. Quibusdam verò primùm cœpit. Et his natura ad tabem vergebat. Moriebantur autem multi, & plurimi ex his. Et de his qui decubuerunt haud scio an quis etiã modico tempore superuixerit. Moriebantur autem citiùs quàm tales morbi transigere solent. Nam alios & longiores, & cum febribus cõiunctos, facilè ferebant, & non moriebantur. De quibus paulò post scribetur. Solus enim & maximus ex his qui tum vigeant, tabidus morbus multos occidit. Erant autem plurimis ipsorum affectiones huiusmodi: febres horridæ, continuæ, acutæ, in totum non intermittentes. Modus autem erat semitertianus, vna die leuiores, altera amplius exacerbescentes, & in summa acutiores increbescerent. Sudores verò semper, non per totum, frigiditas extremitatum multa, & quæ vix recalesceret. Alui turbatæ, biliosæ, ex paucis, puris, tenuibus, mordacibus, frequenter ad exonerandos se surgebant. Urinæ tenues, & crudæ, & decolores, & paucæ: Aut crassitudinem habentes, & subsidentiã parvã, non probè desidentes, sed cum cruda quadam ac intempestiva subsidentiã. Tussiebant autem, pauca, condensata, concocta, paulatim vix educentes. Quibus verò violentissima accidissent, his neque modicè concoctio aderat, sed cruda spueri perseverabant. Fauces autem plurimis horum ab initio, & perpetuò dolebant, ruborem habentes cum inflammatione, fluxiones parvæ, tenues, acres. Breui colliquefebant, & affligebantur, omnes cibos perpetuò fastidièntes, sitis exortes, & plerique circa mortem deliri. Et circa tabidos quidem hæc. Cæterum æstate iam & autumno, febres, multæ, continuæ, non violentæ, diu quidem ægrotantibus, non autem aliàs ita male habentibus obortebantur. Plurimis alui turbatæ, ita vt valde toleranter ferrent, & nihil memorabile lædebant. Urinæ item plurimis boni quidem coloris & puræ. Verum tenues, & post tempus circa iudicationem cõcoctæ. Tussiebant autem non valde,

*Hæmitri-
taos.*

*Urina qua-
les.*

*Mala au-
tumna.*

A valde, neque ea quæ per tussim reieciuntur difficultatem exhibebant, Neque cibum fastidiebant, sed etiã valde licebat ipsis offerre. In summa subægrotabant tabidi, nō tabido modo, febribus horridis parum insudātes, aliās alij, vt qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidem in totum nō intermittentibus, sed quæ iuxta naturæ febris tertianæ morē exacerbarentur. Iudicabantur autem quibus inter os breuissimæ essent, circa vigesimum diem. plurimis circa quadragesimum. Multis circa octuagesimum. Quibusdam neq; sic, sed vago modo & circa iudicationem deficiebāt. horum autem plurimis febres rursus nō multum tempus intermittētes reuersæ sunt. Ex residuiis autē in iisdem circuitibus iudicabātur. Multis verò ipsoꝝ producebātur, vt sub hyemē ægrota-
B rent. Ex omnibus porro in hac tēporis constitutione descriptis, solis tabidis lethalia acciderūt. In alijs aut febribus, nō.

*Tabes hæc
quæ.*

SECTIO SECUNDA.

Constitutio temporis secunda.

IN Thaso ante autumnū tempestates non tempestiue, sed derepēte in aquilonijs & austrinis multis, humidę & præerumpentes. Huiusmodi verò durabant vsq; ad pleiada, & sub pleiade. Hyems autē aquilonia. Aquæ multæ, largæ, magnæ. Niues. Plerumque mixta aëris serenitas. & hæc quidem fiebant omnia frigora verò nō admodum intempestiua. Iam
**Solstitium
hybernum.**
verò post brumale solstitium, & quando fauonius spirare incipit, posterior hyems magna erat. aquilonia multa. Niues &
C aquæ assidue multæ, & cælum procellosum ac nubilū. Hæc autē durabant & nō remittebāt vsque ad æquinoctium. Ver autem frigidum, aquolonium, aquosum, nubilum. Aestas nō valde æstiosa fiebat. Eteliæ assiduæ spirarūt, Mox circa arcturum in aquilonijs, aquæ valde multæ. Quum autē annus totus humidus & frigidus & aquilonius esset, per hyemē sano modo plerumq; habebant. Ante ver autem multi quidam & plurimi morbidè degebant. Primū igitur cœperunt lippitudines fluidæ, dolorosæ, humidæ, crudę. Lemę parue et multis difficulter erumpentes, plurimis reuertebantur. defecerūt sero ad autumnum. Aestate iam et autumnno, henterię, et dysenterię, et tenesmi, et alui profluuia ex biliosis, tenuib. multis, crudis, et mordacibus: quibusdā verò etiam aquosis. Mul-

Thasus.

*Solstitium
hybernum.*

Ver.

Aestas.

Eteliæ.

Arcturus

Ophthalmia.

Ventris fluores diuersi

HIPPOCRATIS LIBER I.

Stranguria tis autem & vrinae fluxiones cum dolore biliosae, aquosae, ra- D
mentosae, purulentae, cum stillicidio, non rheumales, sed his alia
pro alijs. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum crudorum re-
Vomitio. iectiones. Sudores. Omnibus undique multa humiditas.
Sudor. Fiebant autem haec multis erecte obambulantibus, non febrien-
tibus. Multis item febrientibus, de quibus paulo post scribe-
tur. In quibus autem omnia haec praescripta apparebant cum
dolore, tabidi fiebant. Iam vero autumno & sub hyemem, fe-
Febres di- bres continuae, & quibusdam ipsorum paucis ardentes, diurnae,
uersae. nocturnae, semitertianae, tertianae, exactae, quartanae, erro-
Quartana neae. Singulae vero praedictae febres multis fiebant. At arden-
erratica. tes & paucissimis obortae sunt, & ex aegrotis hi minimum la-
borauerunt. Neque enim sanguis erupit, nisi valde parum, & E
paucis. Neque delirabant, aliaque omnia tolerabilia erant. Iu-
dicabantur autem plurimis valde bono ordine, cum intermit-
tentibus in septem ac decem diebus. Neque mortuum aliquem
tunc in febre ardente noui, neque phrenitum tunc cuiquam
factam scio. At vero tertianae plures quidem quam arden-
tes febres erant ac grauiiores, verum ordinate in his omnibus a
prima accessione quatuor circuitus habebant, in septem autem
perfecte iudicabantur, neque ulli horum reuersae sunt. Quar-
tanae vero multis quidem ab initio ex ordine quartanae coe-
perunt. Quibusdam autem non paucis, ex alijs febribus ac mor-
bis abscessus ad quartanas fiebant, atque hos diu, quemadmo-
dum solent, & adhuc diutius tenebant. Diurnae vero quo-
tidianae, & nocturnae, & erroneae multae, multis & multo te- F
pore permanebant, & erecte obambulantibus, & decumben-
tibus. Plurimos horum sub pleiada, & usque ad hyemem, fe-
bres consequebantur. Multos conuulsiones, magis autem pue-
ros ab initio, & fiebriebant. & in febribus conuulsiones fie-
bant, & erant haec plerisque diuturna, verum innocua, nisi ad
haec, etiam ex alijs omnibus perniciies adesset. At continuae
quidem in totum, & nihil intermittentes, exacerbescentes au-
tem omnibus ad naturae tertianae modum, una die subleuan-
tes, & una exacerbescentes, omnium quae tunc fiebant violentis-
simaerant, & longissimaer, ac cum maximis doloribus, leni-
ter auspicientes, & in totum semper augescentes, & in iudicato-
rijs diebus exacerbescentes, & in peius procedentes, parum al-
leuantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbe-
scentes

A scentes, in iudicatorijs plerunque diebus peiores fientes. Rigores verò omnibus quidē inordinatē & erroneo modo fie-
bant, parcissime autem & minimē his. Verū in alijs febribus maiores. Sudores multi, his minimi, nihil alleuantes, sed subcontrario modo damna inferentes. Frigiditas extremitatum his multa, & vix recalescens. Neq; somni in totū, maximē verò hi etiam rursus soporosi. Ventres autem omnibus turbati & mali, his autem longē pessimi. Vrinæ verò plurimis horum aut tenues, & crudæ, & decolores, & post tēpus parum concoctæ iudicatorio modo. Aut crassitudinem quidem habentes, verum turbata, neque consistētes, neque subfidentes neq; concoctæ. Aut paucae, & crudæ, ac malæ, & subfidentes. Pessimæ autem hæ omnes. Et tusses quidem ad febres comitabantur. Verū non habeo quod scribam, an detrimentum aut vtilitas tūc ex tussi contigerit. Diuturna igitur & molesta, & valde inordinatē ac erroneo more, & citra iudicationem, plurima horū perseverabant, tum his qui perniciosē habebant, tum his qui non. Si enim aliquos ipsorum paululum relinquerent, statim rursus reuertebantur. Quibusdam verò paucis ipsorū iudicabantur, quibus brevissimē adessent, circa octogesimam diem & horum aliquibus reuersa sunt, vt plurimi ipsorū per hyemē adhuc ægrotarint. plurimis autem citra iudicationem defecerunt. Hæc verò pariter acciderunt, & his qui superstites manserunt, & qui non. Quum autē multa & varia fieret iudicationis impeditio ex morbis, maximum etiam ac pessimum signum perpetuò comitabatur, quòd plerique omnes cibos fastidirent, & ex his maximē hi, quibus etiā alia exitialia erāt. Siticulosi verò nō adeo intempestiuē in his febribus erant. Quum verò tempus produceretur, & dolores essent multi, ac colliquatio mala, his abscessus succedebāt, aut maiores quàm vt ferre possent, aut minores quàm vt quicquam proderent: sed statim recurrerent & ad peius courgerent. Erant autem quæ his fiebant hæc: dysenterix, tenesmi, lienterix & alui profluvia. Quibusdam etiam hydropes, partim cum his, & partim absque his. Quicquid autē ex his violenter accedebat, statim vires deiciebat: aut rursus nihil proderat. Papulæ parvæ, & non pro dignitate rationis excretionis morborum, & statim rursus evanescentes. Aut iuxta aures tumores, qui non soluebantur,

Tussis cum febre.

Ventris mal.

HIPPOCRATIS LIBER I.

& nullam de se significationem præbebant. Quibusdã in articulos, maximè verò in coxendicem, paucis iudicatorio modo cessantes, & statim rursus ad habitum ab initio inualescentes. Moriebantur autem ex omnibus, & plurimi ex his pueri iam ablactati, & maiores natu, octennes ac decennes, & nondum puberes. Fiebant autem hæc his, non sine prius scriptis. Priora verò multis, sine his. Solum verò bonum & maximū inter ea quæ fiebant signum, & quod plurimos in maximis periculis constitutos liberauit, quibus ad vrinæ stillicidium conuertebantur, & ad hoc abscessus fiebant. Accidit autē plerisque; vrinæ stillicidium, maximè his ætatibus. Fiebat & alijs multis, tum erectè obambulantibus, tum in morbis. Statim verò etiā magna quædam mutatio omnium, his fiebat. Alui enim etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebantur, cibosq; omnes libenter sumebant. Et febres postea mites erant. Verūm vrinæ stillicidium his diuturnum & laboriosum erat. Vrinæ verò his erant multæ, crassæ, variæ, rubræ, purulentæ cum dolore, Atq; hi omnes superstites manserunt, & nullum ex his mortuum noui. Quæcunque verò non periculosa sunt, concoctiones excrementorum omnes vndiquaq; tempestiuas aut bonas, & iudicatorios abscessus, considerare oportet. Concoctiones celeritatem iudicationis, & securitatē sanitatis significant. Cruda verò & inconcocta, & in malos abscessus conuersa, aut iudicationis sublationem, aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortem, aut eorundē recidiuas. Quod verò ex his potissimum futurum sit, ex alijs cōsiderandum est. Præterita dicito, præsentia cognoscito, futura prædicito. Hæc tractato. Exerceto circa morbos duo, vt iuues, aut non noceas. Ars ex tribus cōstat, morbo, ægroto, & medico artis ministro. Aegrotū cum medico aduersari morbo oportet. Capitis & colli dolores ac grauitates cum dolore, cum febribus, & sine febribus, Phreniticis quidem conuulsionibus, Sed & virosa vomunt, & quidam ex his subito moriuntur. In ardentibus autē & alijs febribus, quibus colli dolor, & tēporum grauitas, & caligo vertiginosa circa oculos, aut etiā præcordiorum distentio, non cum dolore fit, his sanguis per nares erumpit. Quibus autem grauitates quidē totius capitis, oris autē ventriculi morsus adsunt, & nauseabundi sunt, hi biliosa & pituitosa vomunt. Plerunque verò pueris

*Digesta
crudaq; qd
portendant*

*Medicinu
nus.*

*Medica
ars quibus
constet.*

Aris in talibus afflictionibus cōuulsiones fiunt. Mulieribus autem tum eadem, tum ab vteris dolores. Senioribus aurem & quibus iam calor superatur, paraplegiæ vocatæ, leues siderationes, aut insanix, aut oculorum priuationes.

Constitutio temporis tertia.

IN Thaso paulò ante arcturum, & sub arcturo, aquæ multæ, magnæ, in aquilonijs. Circa æquinoctium autè & vsq; ad pleiada, austrinæ pluuiæ pauca. hyems aquilonia. siccitates, frigidi venti, magnæ niues. Circa æquinoctium, hyemes maximæ. Ver aquilonium, siccitates, pluuiæ pauca frigida.

B Circa solstitium æstiuum aquæ pauca, magna frigora vsque ad canē. Post canē vsq; ad arcturum, æstas calida, æstus magni nō ex accessione augescentes, sed continui ac violenti. Aqua non delapsa est. Eteiz spirarunt. Circa arcturum pluuiæ austrinæ vsq; ad æquinoctiū. In hac autē cōstitutione, per hyemē quidē receperunt resolutiones ex sideratione, & multos inuaserunt. & quidā ex ipsīs subito moriebātur. Nā hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes degebant. Ante ver autē cœperunt febres ardētes, & vsq; ad æquinoctium, & ad æstatē durabant. Quicunq; igitur vere & æstate incunte statim ægrotare cœperunt, plurimi seruabantur, pauci vero quidā moriebantur. In autumnno iam & quum pluuiæ fierent, lethales erāt, & plures peribāt. Erant autē febrium arderium affectiones. Quibus quidē bene ac largē sanguis per nares erupit, per hoc maximē seruabantur. & nullum noui qui in hac constitutione mortuus esset, si rectē ipsi sanguis profluxisset. In Philisco enim & Epaminone ac Sileno, quarta & quinta die parum de naribus stillauit, & moriebantur. Pleriq; igitur ægroti circa iudicationē rigebāt, maximē hi quibus sanguis nō erupisset. Idem verò etiā postea insuper riguerunt, et exsudarunt. Quibusdā morbus regius accidit sexta die. Verū his purgatio per vesicā, aut aluus exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides qui decumbebat apud Aristocydā. nā huic & ex naribus sanguis erupit, et aluus turbata est, et per vesicā purgatus est. Vigesima die iudicatus est. nō velut Phanagoræ seruus, cui nihil tale factū est, et mortuus est. Sanguis autem plurimis erupit, maximē adolecentibus et in vigore cōstitutis, et talium plerique

Qualis tertia constitutio in Thaso.

Ver quale. Aestas.

Etesia.

Autumnus semper malus.

Philiscus. Epaminon. Silenus.

Heraclides Aristocides. Phanagoras.

HIPPOCRATIS LIBER I.

perierunt, quibus sanguis nō erupit. Senioribus verō ad morbum regium res deuenit, aut alui ipsis turbatae sunt, aut dysenterici facti sunt. Velut Bioni apud Silenum decumbenti contigit. Populariter grassabantur etiam dysenteriae per astatem. & quibusdam qui aegrotarunt, quibusq; etiam sanguis erupit, ad dysenteriam transitus factus est velut Eratonis filio & Mylo, qui multa sanguinis eruptione facta, in dysentericum statum delapsi superstitēs manserunt. Multis igitur maximē hic humor redundauit. Nam & quibusdā circa iudicationē sanguis non erupit, sed tubercula iuxta aures excitata euanuerant. Quae ubi euanuiscent, iuxta sinistri lateris mollitudinem, & ad summam coxā grauitas fuit. Quum autem dolores post iudicationem fierent, & urinae tenues prodissent, parum sanguinis profundere coeperunt. Verū circa quartam & vigesimam, abscessus ad sanguinis eruptionē fiebat Antiphonti Critobuli filio, quae sedata est, & perfectē indicatus est circa quadragesimam. Mulieres porro multae quidem aegrotarunt, pauciores autem quam viri, & pauciores etiam mortuae sunt. Plurimae verō grauiter ex partu laborarunt, & post partus insuper aegrotarunt, & haec maximē perierūt. Velut Telebuli filia, quae sexta à partu die mortua est. Plurimis itaq; in febribus menses apparebant. Quibusdam verō ex naribus sanguis erupit. & virginibus multis id primum factum est. Quibusdam & ex naribus sanguis, & menses proruperunt. Velut Dætharsei filiae virginis apparuerunt tunc primum, & sanguis largus è naribus fluxit. Neq; vllam mortuam noui, ex his quibus aliquid horum probè factum esset. quibus autem praegnantibus contigit aegrotare, omnes fetus perdiderūt, quas ego noui. Urinae verō plurimis boni quidem coloris, verū tenues & subsidentias modicas habentes, ex recrementis tenuibus ac biliosis. Multis autem alijs iudicatis ad dysenterias res deuenit. Velut Xenophani & Critiae. Urinae aquosae, multae purae, tenues post iudicationē, & subsidentia bona facta, & alijs probè iudicatis. Mentionē faciam eorum quib⁹ factae sunt, Bioni qui apud Silenum decubebat. Cratae quae apud Xenophanē. Aretonis filiae uxori Mnestrati. Postea verō oēs hi dysenterici facti sunt. Quod urinas minxerunt aquosas, cōsiderandum est. Circa arcturum autem multis vndecima die iudicatio facta est, & bis recidit

ux non

A uæ nou pro ratione fientes reuerſæ ſunt. Erant autem ſoporoſi circa tempus hoc, plures autem pueri, & hi omnium minimè moriebantur. At verò circa æquinoctium, & vſque ad pleiada, & ſub hyemem, comitabantur quidem febres ardentes. Sed & phrenitici plurimi tunc fiebant. & pleriq; horum moriebantur. fiebant autè & per æſtatem pauci. *Quum* igitur febres ardentes inciperent, ſignificationem de ſe præbebant quibus pernicies immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parum inſuper rigeabant, vigilēs erant, ſiticuloſi, anxij, parum exudantes circa frontem & clauiculas, nullus per totum, multum delirabant, tumores, triſtitia, extremitates ſubfrigidæ, pedes ſummi & maximè manu ſumme partes. Exacerbationes in diebus paribus. Plurimis autem quarta die dolores maximi, & ſudores plerunque ſubfrigidi, & extremitates non amplius recaleſcentes, ſed liuidæ, ſubfrigidæ. & neque ſitiebant. Ad hæc vrinae hiſ nigrae, paucae, tenuēs, & alui ſiſtebantur. neque ſanguis è naribus erupit vlli ex hiſ quibus hæc accidiſſent, ſed parum ſtillauit. Neque ad recidiuam vlli horum res deuenit. Sed ſexta die mortui ſunt cum ſudore. Phreniticis autem acciderunt præſcripta non omnia. Iudicabantur autem hiſ plerunque die vndecima, quibusdam vigefima. Quibus non ſtatim ab initio phrenitis cœpit circa tertiam aut quartam diem, ſed moderatè habebant primo tempore, hiſ circa ſeptimam morbus ad acumen tranſijt. Magna itaque erat morborum multitudo. Ex ægris autem maximè moriebantur adoleſcentes, iuuenes, in vigore ætatis cõſtituti, leues, ſubalbicæ cute, rectos itemq; nigros capillos habentes, & oculos nigros, & qui in quiete & ocio vixerat, & alta voce, aut gracili, aut aſpera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac ſpecie moriebantur. At in hac conſtitutione ex quatuor ſignis maximè ſeruabantur. Quibus videlicet ſanguis è naribus probè erupiſſet. Aut vrinae multæ, & multam ſubſidentiam habentes per veſicā prodiſſent. Aut per ventrem turbata, bilioſa tempeſtiuè proceſſiſſent. Aut qui dyſſenterici facti eſſent. Acciditq; multis vt non ex vno præſcriptorum ſignorum iudicarentur, ſed per omnia percurrerent. & grauius quidem habere videbantur, conſeruabantur autem omnes quibus hæc accidiſſent. Mulieribus autem & virginibus accidebant item præſcripta

Æquinoctium.

Postrema qualia in his.

Qui hoc morbo perirent.

Quatuor hæc lingue res ſeruabāt.

HIPPOCRATIS LIBER I.

scripta signa omnia. Quibus autem vel horum quippiam be D
ne accideret, aut menses largè apparent, per hæc seruaban-
tur ac iudicabantur, neque vllam interiisse noui, cui ex his
aliquid accidisset. Philonis enim filiæ sanguis ex naribus lar-
gè fluebat. Septima autem die intempestiuus cœnauit et
morta est. Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, la-
chrymæ inuitæ defluunt, his sanguinis à naribus eruptionē
expectare oportet, si etiam alia perniciose nō habeant. Nam
his qui male habent, nō sanguinis eruptionem, sed mortem
Tubercula significant. Tubercula iuxta aures in febrientibus cum do-
lore oborta, quibusdam febre iudicatorio modo deficiente,
Iudicationes neque sedantur, neque suppurantur: hæc biliosum alui pro-
fluuium, aut dysenteria, aut crassarum vrinarum subsidētia soluit. Velut Hermippo Clazomenio. Iudicationes autem E
ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut dissimiles.
Velut duo fratres qui simul eadem hora ægrotare cœperunt
Decumbebant autem iuxta theatrum Epigenis fratres. Ho-
rum seniori sexta die iudicatio facta est, iuniori verò septi-
ma. Recidiua facta est vtrisque simul eadem hora. Inter-
misit dies quinque. Ex recidiua iudicatio facta est vtrisque si-
mul in totū, die decima septima. Plurimis autē sexta die iudi-
catio facta est, intermisit sex. Ex recidiuis autem iudicatio fa-
cta est quinta die. Quibusdam verò septima iudicatus est
morbus, et septem diebus intermisit. Ex recidiua verò iudi-
catus est tertia. Quibusdam autem iudicatus est quinta, in-
termisit septem, redijt per tres, intermisit vnam, insuperque F
vnam rursus occupauit. Aliquibus verò iudicatus est sexta,
intermisit sex, redijt per tres, intermisit vnam, et vna iudi-
catus est: Velut Euagonti Daipharsis filio. Quibusdam
autem iudicatus est sexta, intermisit septem: ex recidiua ve-
rò iudicatus est quarta. Velut filiæ Aglaidæ. plerique igitur
ex his qui ægrotarunt in hac constitutione, hoc modo ægro-
tarunt. et nullum noui ex his qui superstites manserunt: cui
non, redijissent recidiuæ secundum rationem fientes, et ser-
uati sunt omnes quos ego noui, quibus hoc genus recidiuæ
factæ sunt. Neque ægrotantium hoc modo vllum aliquem
noui, quem recidiua iterum repetijset. Moriebantur au-
tem in morbis his plurimi sexta die: velut Epaminondas, et
Philiscus. Silenus, et Philiscus Antagoræ filius. Quibus autem tu-
bercula

*Philonis fi-
lia cur pe-
rierit.*

*Lachrymæ
non sponte
defluentes.*

*Tubercula
iuxta aures*

*Iudicationes
variae.*

*Theatrum
Epigenis.*

Euagonti.

*Aglaidæ
filia.*

*Epaminon-
das.*

Silenus

Philiscus.

Abercula iuxta aures facta essent, his iudicatio facta est vigesima die. *Restincta autē ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad vesicam conuersa.* Cratistonacti qui apud Heracleium habitabat, & Scymni fullonis ancillæ suppura-
uerunt, & mortui sunt. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit nouem, reuersus est morbus. Iudicatus est ex recidiua quarta die. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit sex, deinde redijt, & iudicatus est septima velut Phanocrito, qui decumbebat apud Gnathonem pictorem.

Tubercula post aures Cratistonax.

Heracleius Scymnus.

Phanocritos.

Gnathon

BSub hyemem circa solstitium hybernū, & vsque ad æquinoctium, perseuerabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Iudicationes tamen trāsmutatae sunt, & iudicatio facta est plurimis ab initio die quinta, intermisit quarta, recidiua facta est, ex recidiua verò iudicatio facta est quinta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est iudicatio pueris plurimis, imo etiam senioribus. Quibusdam verò morbus iudicabatur die vndecima. Reuertebatur decimaquarta, iudicabatur perfectè vigesima. Si verò aliqui insuper riguissent circa vigesimam his iudicabatur quadragesima. Superriguerunt autem plurimi circa iudicationem ab initio. Qui verò circa iudicationem ab initio riguerunt, etiam in recidiuis vnā cum iudicatione riguerunt. Riguerunt autem paucissimi vere, æstate plures, autūno adhuc plures, hyeme longè plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

C SECTIO TERTIA.

Morbos dinoscimus edocti, ex cōmuni omnium natura, & ex vniuscuiusq; propria, ex morbo, ex ægroto, ex his quæ offeruntur, ex eo qui offert. Ex his enim & breuioribus, & grauioribus redduntur: ex tota ac partiali constitutione cœlestium, & vniuscuiusq; regionis, ex victu, ex vitæ studijs, ex ætate cuiusq; sermonibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, vigilijs, insomnijs quibusdam & quando, vellicationibus, pruritibus, lachrymis, exacerbationibus, secessibus, vrinis, sputis, vomitibus, & quæ ex quibus, in quos, successiones morborum: & qui abscessus ad perniciem, & ad iudicationem: Sudor, rigor, frigiditas, tussis, sternutationes, lingultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes, sanguinis eruptiones,

Morborum cognitio & observatio uaria.

HIPPOCRATIS LIBER I.

eruptiones, hæmorrhoides, ex his autē, & quæ per hæc fiunt, **D**
Febriu spec- considerandum. Febres quædam continuæ sunt, quædam in-
cies. terdiu tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die in-
 termittunt. Semitertianæ, tertianæ, quartanæ, quintanæ, se-
 ptimanæ, nonanæ. Sunt autem acutissimi, & maximi ac gra-
 uissimi morbi, & maximè lethales, in continua febre. Secu-
 rissima verò omnium, & facillima ac longissima est quarta-
Quartana. na. Non enim solum ipsa à seipsa talis est, sed etiam ab alijs
Semitertia- magnis morbis liberat. At in semitertiana appellata, con-
na. tingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris
 maximè lethalis. Sed & tabidi, & quicumque ex alijs longis
Nocturna. morbis ægrotant, ex hac maximè ægrotant. Nocturna non
Diurna. admodum lethalis est, verum longa. Diurna longior. **E**
Septima - busdam autem & ad tabem vergit. Septimana longa est,
na. verum non lethalis. Nonana adhuc longior, & non letha-
Nonana. lis. Tertianæ exacta cito iudicatur, & non est lethalis.
Tertiana. Quintana pessima omnium est. Nam & antè tabem, & iam
Quintana. tabidis superueniens, occidit. Sunt autem modi, & consti-
Continua. tutiones, & exacerbationes singularum harum febrium, æquæ
 continuarum ac intermittentium. Velut verbi causa, Conti-
 nua quibusdam ab initio floret, & viget maximè, & ad deter-
 rius procedit. Circa iudicationem verò & vnà cum iudicatione,
Continua imminuitur. Quibusdam verò molliter incipit & sub-
febris ua- missè, augefcit autem & exacerbatur quotidie, Circa iudica-
rietas. tionem verò & vnà cum iudicatione, acruatim elucet. Qui-
 busdam leniter auspiciata augefcit & exacerbatur, & vbi ali-
 quandiu in vigore fuit, rursus remittit vsq; ad iudicationem,
 & circa iudicationem. Atque hæc contingere solent in omni
 febre, & in omni morbo. Oportet autem victus rationem ex
 horum consideratione offerre. Multa verò etiam alia signa
 his sunt cognata, de quibus partim scriptum est, partim scri-
 betur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinareque ac consi-
 derare, cui horum acutus ac lethalis sit morbus, aut à quo su-
 perstes sit futurus, & cui offerendum sit, aut non, & quando,
 & quantum, & quid offerendum erit. Quæ verò paribus
Decretoria diebus exacerbantur, paribus iudicantur. Quorum autem ex-
*paria vel*acerbationes in imparibus fiunt, ea in imparibus iudicantur.
non paria. Est autem primus iudicatorius, ex circuitibus diebus pari-
 bus iudicantibus, quartus dies. Deinde sextus, decimus, de-
 cimvsq;

A cimusquartus, decimusoctauus, vigesimus, vigesimusquartus, vigesimusoctauus, trigesimus, trigesimusquartus, quadragesimus, sexagesimus, octogesimus, & centesimus vigesimus. Ex circuitibus verò in imparibus diebus iudicantibus, primus est dies tertius; deinde quintus, septimus, nonus, vndecimus, decimusseptimus, vigesimusprimus, vigesimusseptimus, & trigesimusprimus. At verò nosse expedit, si aliter iudicatio fiat, extra præscriptos dies, recidivas fore significat, & fuerit sanè perniciofa. Oportet autem animaduertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse, ad salutem, aut perniciem, aut inclinationes ad melius, aut deterius. Erroneæ porro febres, & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & nonanæ in quibus circuitibus iudicentur considerandum est.

Iudicationes bonæ uel contra, quæ.

AEGROTI QVATVORDECIM I.

Philiscus prope muros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudauit, noctem laboriosam habuit. Secundo die omnia exacerbata sunt. Vespero ab infuso per clysterem adhibito bene habuit, noctem quietem. Tertio mane usque ad meridiem, visus est à febre liber esse. Ad vesperam febris acuta cum sudore, siticulosus erat, lingua resiccabatur, nigra minxit, noctem molestam habuit, nō dormiuit, omnino delirauit. Quarto omnia exacerbata sunt, urinae nigrae, nox tolerabilior, urinae melioris coloris. Quinto circa meridiem parum de naribus stillauit non mixtum. Urinae variae, quæ habebant innatantia quædam rotunda, geniturae similia, dispersa, non subsidebant. Subdita glande, flatuosa pauca prodierunt, noctem habuit laboriosam, somni parui, sermones, deliramenta, extremitates vndique frigidae, & non amplius recalescentes. minxit nigra, dormiuit parum, ad diem voce destitutus est, frigidum sudauit, extremitates liuidæ. Circa meridiem sexta die mortuus est. Huic spiritus ad finem usque velut reuocanti, rarus & magnus. Splen eleuatus est orbiculi gibbositate. Sudores frigidi perpetuò. Exacerbationes diebus paribus.

Philiscus quædam uariè agitatus.

Philisci mors.

AEGROTVS II.

Silenus habitabat in Platamone, prope filios Eualcidis. Hunc ex lassitudinibus, & potationibus, ac exercitijs intempestiuis febris corripuit. Cœpit autè ægrotare ex libris,

Silenus.

& cap

HIPPOCRATIS LIBER I.

& caput grauitas tenebat. & colli distentio erat. Ab aluo pri-
ma die biliosa, mera, spumosa, abundè colorata, multa pro-
dierunt. Vrinæ nigrè nigrâ subsidentiâ habentes, siticulosus
lingua resiccata, nocte nihil dormiuit. Secunda die febris a-
cuta, secessus plures, tenuiores, spumosi, Vrinæ nigræ, nox mo-
lesta, parum delirauit. Tertia omnia exacerbata sunt, præ-
cordij distentio vtrinque oblonga, ad vmbilicum submollis.
Seccessus tenues, subnigri. Vrinæ turbata, subnigra. Nocte
nihil dormiuit, sermones multi, risus, cantus, cōtinere se nō
potuit. Quarta per eadem. Quinta secessus meri, biliosi, le-
ues pingues. Vrinæ tenues, pellucidæ, parum resipiscebant.
Sexta circa caput parum sudauit, extremitates frigida, liui-
dæ. Iactatio multa, ab aluo nihil prodijt. Vrinæ suppressæ
sunt, febris acuta. Septima die voce destitutus est. extremita-
tes non amplius recalescebant. nihil minxit. Octaua sudauit
frigidum per totum sudorem: papulæ cum sudore rubra, ro-
tundæ, parua, velut vari permanebant, non abscedebant. Ab
aluo verò cum parua irritatione, stercora tenuia velut incō-
cocta, multa prodibant cum dolore. Vrinam reddebat cum
dolore mordacem. Extremitates parum recalescebant. Somni
tenues, soporosi. Vox intercepta. Vrinæ tenues, pellucidæ.
Nona per eadem. Decima potum non suscipiebat. Soporosus
erat, somni autem tenues. Ab aluo similia. Minxit acervatim
subcrassum, depositum subsidens, subsidentiâ crassæ farinæ
similis, alba. Extremitates rursus frigida. Vndecima mor-
tuus est. Ab initio huic & ad finem vsque spiritus magnus ra-
rus: præcordij palpitatio assidua. Aetas erat circa annos vi-
ginti.

*Quanta, ua-
rietas uide-
re.*

Sileni mors

AECROTVS III.

Herophon.

Herophonti febris acuta. Ab aluo pauca ab initio velut
in tenesmo. Postea verò tenuia prodibant biliosa, fre-
quentiora. Somni non aderant. Vrinæ nigra, tenues. Quin-
ta mane surditas. Exacerbata sunt omnia. Splen eleuatus est.
præcordij distentio. Ab aluo pauca, nigra prodierunt. delira-
uit. Sexta delirabat. ad noctem sudor, frigiditas. delirus
permanebat. Septima perfrigerabatur. Siticulosus, delirabat
noctu resipiscebant, obdormiuit. Octaua febricitauit, splen
minuebatur, intelligebat omnia. doluit iuxta inguē, tumor
primum è directo splenis. Deinde dolebat utraque tibias.

nox

A nox tolerabilis. Vrinæ coloris melioris partium subsidetiam habebant. Nona sudauit, iudicatus est morbus, intermisit.

Quinta reuersus est. Statim autem splen eleuatus est, febris acuta, surditas rursus. Post recidiuā tertia die splen minuebatur, surditas minor erat: crura dolebant, noctu sudauit. Iudicatus est die septimadecima. Neq; delirauit in recidiua.

*Herophan
liberatus est*

AEGROTVS IIII.

IN Thaso Philini vxorem, quæ filiam pepererat, quum purgatio secundum naturam facta esset, & aliàs leuiter degeret, decimaquarta à partu die febris vehemens corripuit cum rigore. Ab initio verò cor dolebat, & circa præcordium dexterum: muliebrium partium dolores. purgatio cessauit. Vbi verò glandem subdidisset, hæc quidem leuiora facta sunt.

*Philini con
iunx puer-
pera.
Thasus.*

B Capitis autem, colli & lumborum dolores permanebant. Somni non aderant. Extremitates frigidæ. Sirculosa erat. alius combusta: pauca egerebat. Vrinæ tenues, ab initio decolores. Sexta die ad noctem multum delirauit, & rursus resipiscebat. Septima sirculosa: secessus biliosi, abundè colorati. Octaua superriguit. febris acuta: conuulsiones multæ cum dolore, multum delirabat. Glande subdita exurgebat, multa que cum fluxione biliosa prodibant. Somni non aderant.

Nona conuulsiones. Decima parum resipiscebat. Vndecima dormiuit, omnium recordata est. Statim autem rursus delirauit. Vrinam autem reddebat cum conuulsionibus, aceruatam, multam: illis autem parum admonentibus, crassam albam: qualis est ex his quæ subsiderunt, vbi multo tempore sita, fuerint conturbata: non subsidebat, color & crassitudo talis, qualis est in vrinis iumentorum. Talia mingebat, quæ & ego vidi. Circa decimumquartum diem palpitaciones per totum corpus, sermones multi, parum resipiscebat. Verum statim rursus delirabat. Circa decimumseptimum voce destituebatur. Vigesima mortua est.

Morshuius

AEGROTVS V.

EPicratis vxorem, quæ decumbebat apud Archegetem, partui iam propinquam, rigor fortiter corripuit: nō incaluit, velut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die peperit filiam, & alia omnia iuxta rationem venerunt. Postridie à partu febris acuta eam inuasit, cordis dolor & muliebrium partium. Vbi verò glandem subdidisset, hæc quidē

*Epicrater.
Archege-
tes.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

leuiora facta sunt. Capitis autē & colli ac lumborum dolor. D
Somni non aderāt. Ab aluo modica biliosa, tenuia, pura prodibant. Vrinę tenues, subnigrę. Sexta die à quo febris ipsam corripuit, ad noctem delirauit. Septima omnia exacerbatasunt, vigilans delirauit, siticulosa, secessus omnes biliosi abūdē colorati. Octaua superriguit, plus dormiuit. Nona per eadem. Decima crura laboriosē dolebat. Cordis dolor rursus: capitis grauitas: nō delirauit. magis dormiuit: aluus restitit. Vndecima sudauit: minxit melius colorata, multam subsidētiā habentia: leuius degebat. Decimaquarta superriguit. febris acuta. Decimaquinta vomuit biliosa, flaua, satis multa. Sudauit sine febre. Ad noctem febris acuta. Vrinę crassę subsidentiam albam habentes. Decimasexta ad noctem exacerbata est, & cum molestia non dormiuit, delirauit. Decima octaua siticulosa, lingua combusta est: nō dormiuit. multum delirauit: crura dolebat. Circa vigesimam mane parum riguit, soporosa, quietē dormiuit. vomuit biliosa, pauca, nigra. Ad noctem surditas. Circa vigesimamprimam lateris sinistri grauitas, per totum cum dolore, parum insuper tussit. Vrinę cassę, turbatę, subrubrę, quę depositę non subsidebant, cetera leuiora: non sine febre. Statim ab initio fauces dolebat, rubor aderat, columella reuulsa, fluxio acris, mordax, falsa, perpetuō perseuerabat. Circa vigesimamseptimam febris libera, in vrinis subsidentia: latus dolebat. Circa primā & trigessimā febris corripiebat. aluus ex biliosis turbata est. Quadragesima die vomuit pauca biliosa. Iudicata est perfectē libera à febris die octogesima. E F

Lateris dolor.

Non perit.

Cleanactides.

AEGROTVS VI.

Cleanactiden qui supra Heracleum decumbebat, febris corripuit erroneo modo. Dolebat autem caput ad intus, & latus sinistrum: & aliarum partium dolores aderant, lassatorum modo: febres exacerbantur aliās aliter inordinatē. Sudores quandoq; quandoq; non. Exacerbationes vt plurimum in iudicatorijs diebus magis accedebant. Circa vigesimamquartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa, flaua, satis multa. Paulō pōst autem æruginosa. Ab omnibus alleuatus est. Circa trigesimam sanguis ex vtrisque naribus erumpere cœpit, atque hoc erroneo modo paulatim vsque ad

A ad iudicationem. Non autem fastidiebat cibum, neque siticulosus erat per totum tempus, neque insomnis. Vrinæ tenues, non decolores. Circa quadragessimam minxit subrubra, subsidentiam multam valde rubram habentia, alleuatus est, post hæc autem urinae variegandoque subsidentiam habebant, quandoque non. Sexagesima urinis subsidentia multa, & alba, & leuis. Remiserunt omnia, febres intermittebant. Vrinæ tenues quidem, verum boni coloris. Septuagesima à febre liber permansit diebus decem. Octogesima *Non moritur.* rignit, febris acuta corripuit, multum sudauit. Urinis subsidentia rubra, leuis, perfecte iudicatus est.

AEGROTVS VII.

B Metonem febris vehemens corripuit, lumborum gra- *Meton.*
uitas dolorosa. Postridie ubi aquâ bibisset satis multam, ab aluo probe prodijt. Tertia capitis grauitas. Secessus tenues, biliosi, subrubri. Quarta omnia exacerbata sunt. Fluebat à dextra nare bis sanguis modicus. Noctem molestè tulit. Secessus similes tertiæ diei. Vrinæ subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrum, diuulsum, non subsidebant. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudauit, iudicatus est. Post iudicationem insomnis, delirabat. Vrinæ tenues, subnigræ. Capitis lotionibus vsus est, dormiuit, resipiscebatur. Huic recidiua facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem.

AEGROTVS VIII.

E Rasinum qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris *Erasinus.*
vehemens corripuit post cœnam, nocte turbatus fuit, *Bootes.*
diem primam quietè, noctem laboriosè transegit. Secunda omnia exacerbata sunt, ad noctem delirauit. Tertia dolorosè, multum delirauit. Quarta molestissimè, ad noctem nihil dormiuit. Insomnia & ratiocinationes, deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta manè resipiscebatur ac intelligebatur omnia. Verum ad meridiem multum insanijt, continere se non potuit. Extremitates frigidæ subliuidæ. Vrinæ inconcoctæ. Circa solis occasum mortuus est. Huic febres perpetuò cum sudore, præcordia sublimia, distentio cum dolore. Vrinæ nigræ habentes quæ-

Moriuntur.

HIPPOCRATIS LIBER I.

dam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebant. Ab aluo stercora prodibant. Sitis perpetuo non valde. Conuulsiones multæ cum sudore, circa mortem.

ÆGROTVS IX.

Critonis casum uideto.

CRitoni in Thaso erectè obambulanti, pedis dolor fortis à magno digito cœpit. Decubuit eadem die, horridus, anxius, parum subcalescens, nocte desipuit. Secunda die tumor laxus per totum pedem, & circa malleolum subrubens cum distentione. Pusillæ nigræ, febris acuta, insaniit. Ab aluo verò mera, biliosa, sætis multa prodibant. Mortuus est altera ab initio die.

Secundo die hic moritur.

ÆGROTVS X.

Clazomenius.

Clazomenium qui ad Phrynichidæ puteum decumbabat, febris vehemens corripuit. Dolebat autem caput, collum, lumbos ab initio. Statim autem surditas. Somni non aderant. Febris acuta inuasit. Præcordium eleuabatur cum tumore, distentio non valde, lingua sicca. Quarta ad noctem desipuit. Quinta laboriosè omnia exacerbata sunt. Circa undecimam parum remiserunt. Ab aluo verò ab initio & usque ad decimam quartam, tenuia multa aquei coloris prodibant. Toleranter ea quæ ad secessum pertinent, ferebat. Postea aluus restitit. Urinæ perpetuò tenues quidem, verum boni coloris, & multa in medio suspensa habebant diuulsa, non subsidebant. Circa decimam sextam minxit paulò crassiora, habebant subsidentiam paruam, paululum alleuarunt, respicebat magis. Decima septima rursus tenuia. Circa utraq; aures tubercula extiterunt cum dolore. Somni non aderant, delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima à febre liber iudicatus est, non sudauit, omnia intelligebat. Circa vigesimam septimam coxæ dextræ dolor fortis, cito quieuit. Tubercula verò iuxta aures neque sedata sunt, neque suppurata, verum dolebant. Circa trigessimam primam profluuiū alui ex multis aquosis, cum eiusmodi quæ in dysenteria prodire solent. Urinas crassas mingebat. Tubercula circa aures sedata sunt. Circa quadragesimum oculum dextrum dolebat, obscurius videbat. Restitutus est.

Dromeades.

ÆGROTVS XI.

DRomeadæ uxorem quæ filiam pepererat, & alijs omnibus

- A** nibus secundum rationem factis, secunda die rigor corripuit. febris acuta. Cœpit autem prima die dolere circa præcordia fastidiosa ac nauseabunda, horrida, anxia. & sequentibus non dormiuit. Spiritus rarus, magnus, statim teuulsus. Altera à rigore die, stercora ab aluo bene prodibant. Vrinæ crassæ, albæ, turbatæ: qualis sit ex his quæ subsiderunt, vbi multo tempore sita, fuerit conturbata: non subsidebant. nocte non dormiuit. Tertia circa meridiem superriguit. Febris acuta. Vrinæ similes. præcordij dolor, fastidiosa ac nauseabunda. nox molestæ, non dormiuit. Sudauit per totum subfrigida. Statim autem rursus recalescens est. Quarta die circa præcordia parum alleuata est. Capitis grauitas cum dolore. in soporem incidit, parum de naribus stillauit. lingua sicca. siticulosa. Vrinæ tenues, oleosæ. parum dormiuit: Quinta siticulosa. fastidiosa. Vrinæ similes: nihil ab aluo. Circa meridiem multum delirauit, & statim rursus parum resipiscebat. exurgens in soporem incidit. frigiditas parua. nocte dormiuit, delirauit. Sexta mane superriguit. Statim autem recalescens est. Sudauit per totum. Extremitates frigidæ. delirauit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post conuulsiones à capite cœperunt. Statim mortua est.

*Mortua
hæc.*

ÆGROTVS XII.

- H**omo quidam calefactus cœnauit, & bibit amplius. Vomuit omnia noctu. febris acuta. Præcordij dextræ dolor. Inflammatio submollis ex interna parte. noctem molestè tulit. Vrinæ ab initio rubræ, crassæ, depositæ non subsidebant. Lingua sicca. non valde siticulosus. Quarta febris acuta. Dolores omnium. Quinta minxit leue, oleosum, multum, febris acuta. Sexta vesperi multum delirauit. Nec nocte dormiuit. Septima omnia exacerbata sunt. Vrinæ similes. sermones multi. continere se non potuit. Ab aluo cum irritatione prodierunt liquida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit. febris acuta. Sudauit calidum. A febre liber esse visus est. non multum dormiuit. A somno frigiditas, sputatio. Vesperi multum delirauit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas. multum delirabat. non dormiuit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt. delirauit. Vndecima mortuus est.

Hic perijt.

HIPPOCRATIS LIBER I.

AEGROTVS XIII.

D

MVlierem quæ decumbebat in littore, trimestri fortu-
gravidam febris vehemens corripuit, statimque lum-
bos dolere cœpit. Tertia dolor colli, capitis, iuxta clauicu-
lam, & manum dexteram. Statim lingua voce destituta est.
dextra manus resoluta est cum conuultione, velut his qui a-
liqua sideratur parte cōtingere solet. Delirabat penitus. no-
ctem molestè tulit, non dormiuit. alius turbata est, ex bilio-
sis, meris, paucis. Quarta die lingua voce soluta est. Conuul-
siones eorundem. dolores omnium permanebant. Iuxta præ-
cordia tumor cum dolore. non dormiebat penitus delirabat,
alius turbata. Vrinæ tenues, non boni coloris. Quinta fe-
bris acuta. præcordij dolor. planè delirabat. secessus biliosi. E
ad noctem sudauit, à febre libera. Sexta resipiscebat. Ab om-
nibus alleuata est. Verùm circa sinistram clauiculam dolor
permanebat. siticulosa. Vrinę tenues. non dormiuit. Septima
tremor. in soporem incidit, parum delirauit. dolores iuxta
clauiculam, & sinistrum brachium permanserunt. Reliqua
alleuata sunt. Omnia intelligebat. Tres dies à febre libera
mansit. Yndecima reuersa est, superriguit, febris vehemens
corripuit. Circa decimam quartam vomit biliosa, flaua, satis
multa. sudauit. A febre libera iudicata est.

*Non mori-
tur hæc.*

AEGROTVS XIII.

*Melidia.
Iunonis
templum.*

MElidiæ, quæ decumbebat iuxta Iunonis templum, ca-
pitis & colli, & pectoris dolor fortis cœpit. Statim
autem febris acuta corripuit. Menses pauci apparebant. Do-
lores omnium horum continui. Sexta die soporosa, anxia, F
horrida. rubor in maxilla. parum delirauit. Septima suda-
uit. febris dimisit. Dolores permanebant. Redijt. som-
ni, pauci. Vrinæ perpetuò boni coloris, verùm
tenues. Secessus tenues, biliosi, mordaces,
valde pauci, nigri, graueolentes prodi-
bant. In vrinis subsidencia alba,
leuis. Sudauit. Iudicata est
perfectè yndeci-
ma die.

HIPPO.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS PO

PVLARIBVS, LIBER II.

IANO CORNARIO. ME

DICO PHYSICO IN

PRETE

SECTIO PRIMA.



Arbunculi in Cranone æstiuū, pluebat in ardoribus aqua larga. Contingebat hoc per totum, & maximè ab austro. & subnascebantur quidem in cute sanies. dum autem intro concipiebantur, calescebant, & pruritum inducebant. Deinde pustulæ velut ab igne inustæ excitabantur, & sub cutem vri sibi videbantur.

*Carbunculi
Cranon.*

in ardoribus siccitatis. Febres plerunque citra sudorem. In his vero si minutæ imbris guttæ deciderint, magis sudatoriarum fiunt ab initio. At hæc difficiliora iudicatu manent, quàm aliter: Attamen minus, si non propter hæc fuerint, sed propter morbi modum. Febres ardentes in æstiuīs magis fiunt, & in alijs temporibus. Resiccantur autem magis æstate.

Autumno maximè ferinū, & oris ventriculi dolor, quanquā & ipse minus maleficus fuerit, ipso morbo tali existēte. Ascarides vesperi similiter huic, & illæ tūc infestant in die plerunq; non solū ideo quòd magis affligunt, sed etiā ipsæ per seipsas. In autūno acutissimi morbi & maximè lethales, & omnino similitudinē habēt, eo q̃ vesperi exacerbantur: tanquā annus ipse habeat circuitū morborū. Quale est dies morbi, quale est vespertinū tēpus ad exacerbationē: Tale est morbi, & vniuscuiusq; cōstitutionis inter se, vbi non quid in superiori specie fuerit innouatū. Sin minus, alia sane constitutione hæc imperium obtinuerint. Quare etiam annus ad seipsum hoc modo se habet. In quietis ac constantibus tēporib; & an-

*Ascarides
quando ma
gis uexant*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Perinthus.
D
 nis tempestiuè tempestiua præbentibus, boni status & iudicatu facillimi morbi fiunt. In inconstantibus verò, incòstantes & qui difficulter iudicantur: quum sanè in Perintho defecerit aut abundauerit quid, ut aut venti sint, aut non vèti: aut aquæ, aut siccitates: aut ardores, aut frigora. Ver autem omnino saluberrimum, ac minimè lethale. Circa principia morborum considerandum, an statim florèt. Clarum autem hoc sit ex incremento. Incrementa verò ex circuitibus. & iudicationes quoq; hinc manifestæ fiunt, itemq; ex acerbationibus in circuitibus, si citius accedant, aut non: & si diutius durent, aut non: & si magis affligant, aut non. Ex omnibus autem continuis aut intermittentibus, & diurnis, & vulneribus, & sputis, & doloribus. Itemq; tuberculorum inflammatio-
E
 nes, & quæcunque alia posterius apparent, fortassis autem & ex alijs communibus rebus, quæ quidem citius fiunt, breuiora sunt. Quæ verò tardius, longiora: quum etiam in circuitibus citiorè recursum, ac reliquum augmentum, morbus neget. Nam & eorum qui statim præcunt, velociores sunt iudicationes, quoniam & dolores, & continui ac fortes. Quæ verò ad melius iudicant, non statim apparent. Iudicatoria non iudicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis iudicationis. Quæ præiudicata sunt, si crudè iudicata fuerint, recidiuæ fiunt: Sin minus, iudicationis impeditioes aut malæ iudicationes. Possunt etiam fieri perniciofa, ea quæ nō parua sunt. Quæcunq; iudicatoria signa fiunt, eadē hæc si non fiunt, difficilis sunt iudicationis. Quæ verò contraria significant, malum: non solum si recurrant: sed etiā primariæ naturæ contraria repunt. Quemadmodū etiā malorum signū, ea quæ ad contraria repunt. Considerare verò sic oportet, in cibis, compressionibus venarum, tumoribus præcordiorū, sursum vergentibus, deorsum vergentibus. Sed & multa sunt eiusmodi, velut abortientium mammæ graciles fiunt, neq; enim cōtrarium est: Neq; tussis diuturnæ, quoniam ubi testis intumuit, cessant: & testis tumor à tussi cessat & alleuatur: quæ res cōmonefacit nos cōmunionis pectorum, mammarū, genituræ, vocis. Abscessus aut per venas, aut per ossa, aut neruos, aut cutem, aut alias emotiones. Boni autē sunt qui infra morbum fiunt, velut varices, lumborum grauitates ex supernis. Optimi verò potissimum sunt inferni, & longissimè infra
P

Tussis sedatio: testis tumore, & cōterd.

Abscessus boni.

vent

- A** ventrem, & remotissimi à morbo: & qui per effluxionē fiūt, velut sanguis è naribus, pus ex aure, sputum, vrina, quæ per effluxionem fiunt. At abscessus quibus hæc nō fiunt, sunt velut dentes, oculis, nasus, sudor. Sed & quæ sub cutē abscedunt foras tubercula, velut putrescētia, & quæ suppurantur, aut vitcus, aut eiusmodi pustulæ, aut squamæ, aut defluuium capillorum, vitiligines, lepræ, aut eiusmodi quæ abscessus sunt acervatim fluentes, & non semirepentes, & quæcunque alia dicta sunt. & si non pro rationis excretionis morbi dignitate fiat, velut Temeni nepti, ex morbo forti ad digitū decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendū morbum, recurrit. Mortua est. Abscessus aut per venas, aut per aluū, aut per nervos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalem medullam, aut secundum alias effluxiones, os, pudendum, aures, nares, ex vtero menses. Iudicationes postridie fiunt, velut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes: Quandoque ex tussi, & restis ipse à seipso. Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem sunt, non similiter perfectè liberant. Sanguinis eruptiones largæ ex naribus plerunque liberant, velut Heragoræ, quod medici non animaduertunt. Qui voces asperas natura habent, his etiam linguæ subasperæ sunt, & quæcunq; asperitates à morbis similiter. Quæ igitur duræ sunt linguæ à natura, etiā sine morbo hoc habēt. Molles verò tardiores sunt, & ad peccatum, & ad bonum, quàm prior natura. Consideranda sunt etiā longa capita, ex viuendi ratione, & ceruices longæ, ab inclinationibus. & venarum amplitudo & crassitudo, ab eisdem, & angustia, ac latitudines, & breuitates, ac tenuitates, ex contrarijs. Quorum venæ amplæ, & ventres, & ossa ampla, hi sunt qui tenues sunt. Pingues verò his cōtraria habent. & in his qui fame macerantur, mediocritates. Ab his cōsideranda ea sunt quæ præpropere incrementa vniciq; detrahunt, & quæ diminutiones adaugent. & ea quæ incrementa coadugent, & quæ corroborant. Et quæ sint communes venarum dissectiones. Pectinum ruptiones quæ quidem circa pubem fiunt, vt plurimum statim sunt innoxia. Quæ verò paululum supra vmbilicū in dextera parte, hæc dolorosæ sunt & anxiosæ & stercoris vomitum inducunt, velut etiā Pittaco accidit. Fiunt autem hæc, aut à plaga, aut vulsura aut alterius insultu. Quibus id quod medium est inter abdomen &

Temeni nepti.

Heragoras.

Lingua uocisq; diuersa.

Caput oblongum & ceruix.

Macri.

Pingues.

Quæ in his obseruatur.

Pittacus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

cutem inflatur, & non sedatur. Color est velut qui multum D
Quæ icur pallidus est, & qui ex candicante pallet: quoniam omne hu-
affectū & iusmodi ab hepate est, & ex hoc sunt hepatici in his morbi.
lien creant. & morbi regij ab hepate, ad subalbidum colorem vergunt.
 & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba laborant. Qui
 vero à splene sunt, tum hydropes, tum morbi regij, nigriores
 sunt. Sed & vlcera quæ agrè persanantur ex albidorum sunt,
Anulochus. qui ferè lentis colorem referunt: & cutis diffringitur ac la-
 bia, velut Antilochus habuit & Aleuas, ab humoribus ex cor-
 pore saluginoso, quod sub cute maxime, & à capite contin-
 git, quum à pulmone fuerit calefactum. Occasiones vnde
 quis agrotare cœpit, & considerare oportet, siue capitis sit
 dolor, siue auris, siue lateris. Signum autem sunt in quibusdā E
 dentes, & in quibusdā inguinum tumores. Vlcersa sientia
 ac iudicantia febres, & tubercula. Quibus hæc non sunt, iu-
 dicatio sublata est. Quibus intus relinquuntur, certissimæ re-
Milium quid ciduæ ac celerrimæ. Crudos ac liquidos secessus, milium
volat. solidum in oleo coctū sistit. Exemplo est nautæ puer, & My-
 riochaune.

SECTIO SECVNDA.

Cordis do- **M**ulier cor, hoc est os ventriculi dolebat, & nihil remie-
loris nude- tebat dolor. Huic polentæ pollen in mali-punici suc-
la. cum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, &
 non reuomebat, velut Charioni contigit. Mutationes pro-
 sunt, si non ad praua mutantur, velut his qui à medicamen- P
Dexippus. tis vorant febrim gratia. Fines in metaciōra desinentes,
Serapis. putrefactionem significant, velut Dexippo. Serapis ex li-
 quida aluo intumuit. Fruritus autem haud scio quot die-
 bus, non vltra. Habebat autem & abscessum quandam in la-
Stymara- teris mollitudine, qui nigrefactus oecidit. Et Stymargi v-
gus. xor ex ventris per paucos dies turbatione, vbi multum in si-
 stendo laborasset, & post pueri sexus fœminici quadrimestris
Moschus. ex corruptione discessum sana facta esset intumuit. Mo-
 scho è calculo laboranti fortiter, in superna palpebra or-
 deolum obortum est magis ad aurem. Deinde intro exulce-
 ratum est. Quinta & sexta die ex internis pus erupit. In-
 fernas affectiones soluit. Glandularum tumor ac inflam-
 matio circa aurem erat, itemque infernè in collo, è directo
 superni

- A** superni tumoris. Aristæi vxoris frater fatigatus in via incalcescebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fructui similes. Postea febris continua fiebat, & postridie sudor factus est, & alijs paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc autem febris tenebat. Erat autē sublienosus. Ex sinistra nare sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Iudicatus est. Postridie iuxta sinistram aurem tumor. Sequenti die etiam circa dextram, sed hic minor, & insuper repescebat. Hi euenerunt, & nō suppurati sunt. Qui ab Alcibiade venit, ei ex febribus modicis ante iudicationem testis sinister intumuit. Habebat autem splenem magnum, & sanè tunc iudicata est febris vigesima die. Deinde aliàs atque aliàs subincalescebat, & subfloribum spuebat. Cuidam manus dextra, & crus sinistrum quum ex tussi parū & nihil memorabile eiecisset, sūderationis modo resoluta sunt: alia verò nulla re alterata est, neque facie, neque mente: Nec verò adeò fortiter illis partibus. Cœpit ad melius procedere circa vigesimā diem. Factum autem hoc est illi fere circa mensium eruptionem, & fortassis tunc primū apparebant. Erat enim virgo. Apæmantus & pater fabri illius qui caput fregit, & Nicostrotus non extus fiebant quicquam. Erant autem alibi circa rhenes dolores. Interrogationes factæ sunt. dicebant ipsos semper repleti potu aut cibo. Dolores fortissimos quo modo dinouerit quis conspicatus, fuga, tolerantia, experientia, & timiditates indicant. Aqua quæ cito calefcit, & cito frigescit, semper leuior est. Cibi & potus experientia opus habent, an ad æqualitatem mancant. Dicendum quòd vbi sanguis effluxit, excalescunt, & quæcunque alia huiusmodi. Abortus masculus sexaginta dierum, in partium suppressionibus salubris. Hercules intumescebat mali ipsius die octaua. Magis ex dysenteria laborat, quisquis sanè etiam è tenesmo vexatur. Quedam lactans pustulas per corpus vbique habebat. Postquam autem lactare cessauit, sedata sunt per æstatem. Coriarij illius qui coriacea præparabat, vxori, quum peperisset & perfectè exoluta esset, visum est de secunda membranofum quiddam remanere: discessit autem quarta die malè. Nam vrina stillicidio vexabatur. Statim concipiens peperit masculum. Habebat autem iam multos annos, & postremum neque menses prodibant.

*Aristæus**Apæmantus.**Nicostrotus.**Aquæ congnitio.**Hercules.**Quæ lac præbebat. Coriarij uxor.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

bant. Quando autem peperisset, vrinæ stillicidium paululum **D**
intermittebat. Quædam priusquam conciperet, coxam do-
lebat. Postquam autem concepit, non amplius dolebat. Vbi
verò peperit, vigesima die rursus doluit. Peperit igitur ma-
sculum. Prægnanti in tibia infernæ dextera, tertio aut quar-
to mense pustulæ, ad quas manna thuris vtimur, itemque in
manu dextera iuxta magnum digitum: haud scio an peperit,
reliqui enim ipsam semestrem, habitabat autē velut ego pu-
to, in adibus Archelai ad rupem. Antigenis vxor habita-
bat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnosum quidem,
verum qui haberet maximas partes discretas, magnitudine
verò esset quatuor digitorum, & sine ossibus, deinde crassus
ac rotundus. Hæc autem anhelosa erat ante partum. Deinde
simul cum partu pus remouit modicum, velut ex furuncu-
lo vocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & diffi-
culter peperit, & non valde purgata est, tota intumuit. **E**
Deinde venter ipsi magnus fiebat. Reliqua verò reprimebantur.
& rubicunda prodibant vsque ad sextum mensem. Deinde
alba valde per omne iam tempus. Atque hæ fluxiones vene-
ri officiebant, & mera rubicunda ipsi profluebant. In diutur-
nis intestinorum leuitatibus ructus acidus fiens, antea nun-
quam factus, signum bonum, velut Demænetæ contigit. For-
tassis autem licet etiam arte parare. Nam turbationes eius-
modi alterant. Fortassis autem & ructus acidi intestinorum
leuitatem solunt. Sanata est veratri portione. Lycia postre-
mum splen magnus, & dolores & febris, & ad humerum do-
lores. Et vena quæ in splene est, in cubito secabatur. & salie-
bat quidem sæpe, Aliquando verò etiā non est secta, sed vna
cum sudore sanguis penetravit, aut sua sponte. Ex quo autē
prodibat, Splen dextera parte intēdebatur, spiritus intus du-
plicabatur, nō tamen magnus, mente mouebatur, contege-
batur, flatus inerat, non prodibat infernæ quicquam, neque
mingebat. Mortua est ante partum. Quæ circa fauces ad
alterutram partē repentia processerunt, exulcerata non sunt,
ad sinistra transiuerunt, ad splenem dolor venit citra iudica-
tionem. Hieroni iudicatio facta est decimaquinta die.

Coi sorori hepar eleuatum est splenico modo. Mortua est
secunda die. Bion simul multum mingebat quod non sub-
sidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat em̃ & splen
sursum

Archelaus
Antigenis
uxor.
Nicomachus.

Partus gemellarum.

Intestinorum
leuitas.
Demænetas

Lycia.

Hieron.
Bion.

A sursum in gibbum eleuatus, ac durus, superstes mansit, recidiua. Erant autē anginosorum affectiones hæc. Colli verticula intro vergebant, quibusdam ampliùs, quibusdam prope. *Qualis angina.* Et collum forinsecus conspicuam cauitatem intro habebat, & hac parte ad cōtactum dolebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam verò etiam valde rotundum, maiore circumferentia.

Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, verù iacētes. Partes sub maxilla tumida, nō inflammatis similes. Neque glandulae vlli intumuerunt. Sed magis secundum naturam, linguam non faciliē vertebant, ipsisque & maior esse videbatur, & prominentior, & sub lingua venae cōspicuae, deglutire non poterant, aut valde difficulter. Imò ad nares fugiebat, si valde cogerent, & per nares loquebantur. Spiritus autem his nō valde sublimis. Quibusdam verò venae in temporibus, & in capitibus ac ceruice eleuatae. At recrudescētibz, ex his, parū quiddam tempora calida, etiam si aliàs non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quā deglutire cupiebant, aut saliuam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat rectus, nec in alteram partem vergebat, hi neque leuiter sideratorum modo resoluebantur. An verò aliquem periisse viderim, in memoriam reuocabo. Quos autem nunc noui, superstites manserunt. Erant autē partim celerrimè alleuantia. Plurima verò ad quadraginta dies deueniebant, & in hoc pleriq; etiam sine febre. Multi verò etiā ad valde longum tempus, partem aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & vox indicabat, & columellae liquecentes significationem quandam prauam exhibebant, quāuis nullum grauis malum habere videbantur. Qui verò tumores ad alteram partem vergentes habebant, hi vnde verticula inclinata fuerunt, isthic resoluebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maximè conspicua, & in ore & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maximè infernè pro ratione immutabantur. Cæterum resolutiones leuiter sideratorū modo, non per totum corpus fiebant veluti ex alijs, sed vsq; ad manum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant, eaquē pauca ac difficulter. Quibus autem in rectum tumor tendebat, itidem expuebant. Quibus verò etiam cum febre,

HIPPOCRATIS LIBER II.

febre, hi multò magis & difficulter spirabant, & aliena lo-
quebantur, & venæ his magis eleuatae. Et pedes omnibus
quidem frigidissimi erant, maximè autem his. Et hi ad ere-
ctè standum impotentiores erant. Et quidam nò statim mo-
riebantur. Quos autem ego noui, omnes mortui sunt.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis.

Perinthus.

Etesia.

*Quæ febres
aigerent.*

*Aspretudi-
nes culicum
morsibus
similes.*

IN Perinthum circa solstitium ferè æstium venimus, fa-
cta autem est hyems clementi cœlo, austrina. Ver & æstas
valde sine aquis vsq; ad pleiadum occasum. Nam si etiam
quid aquæ cecidisset, id erat velut minutæ roris guttæ. Et
Etesia non valde spirarunt. Et qui spirarunt, diuulse id fece-
runt. Aestate febres ardentes populariter grassatae sunt
multæ. Erant autè sine vomitu, & alui turbatae ex tenuibus,
aquosis, non biliosis, spumosis, multis, quæ aliquando depo-
sita etiam subsidentiam habebant, ex quibus sanè etiam id
quod sub dño noctu exponebatur, simile erat. Aequales spe-
cie alui secessus semper, malum. In his multi soporosi erant,
& mente moti, hi verò ex somnis tales fiebāt. Quum autem
suscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimes, non
tamen valde. Urinæ tenues quidem plurimis & pauca, aliàs
autem non decolores. Sanguinis eruptiones è naribus non
fiebant, nisi paucis: neq; parotides iuxta aures, de quibus po-
steà scribam: neq; splenes attollebantur, neq; dextrum præ-
cordium, neque dolorosum valde, neque fortiter intentum
erat. Erat tamen quid quod iudicationem faciebat. Et maxi-
mè iudicabantur omnia plerunque circa decimam quartam
diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore, & valde paucis
recidiuæ fiebant. At verò sub minutas velut roris guttas
quæ in ætate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus
etiā quidam sudores statim ab initio fiebant, nò tamen ma-
ligno modo, & quibusdam sub hoc tempus etiā iudicatio fa-
cta est cum sudore. Fiebant autem in febribus æstiuis, circa
septimam, octauam & nonam diem, aspretudines in cute
miliaceæ, culicum morsibus maximè similes, non valde pru-
riginosæ. Hæ perseuerabant vsque ad iudicationem. Nulli
equidem masculo tales erupisse vidi. Mulier autè nulla mor-
tua est, cui hæ fiebant. Et graui auditu præditæ & soporosa
erant.

Derant. Prius autem non valde soporosa erant hæc, quibus illæ affuturæ essent. Non tamen in totum durabant, verum soporosa & somnolenta erant per ætatem, & vsq; ad pleiadum occasum. Postea verò magis vigilæ aderant. Sed neq; in totum ab hac constitutione moriebantur. Alium igitur per cibos sistere non dabatur, imò præter rationem putasset quis mederi conducere, etiamsi minus multa quibusdam prodiret, per hoc quod in frigore quis iaceret strato supposito. Nā vlcerat quidem frigidum, calefacit autem eiusmodi species sensum progrediendo adhuc magis, etiamsi nulla afflictio naturæ accedat: & in quibus, & qualia signa, & plura aut pauciora fientia, oscitatio, tussis, sternutatio, distictio cum oscitatione, eructatio, flatu: omnia talia corrumpunt. Quibus in

E febribus anxiosis, horridis, rubescunt facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis grauitates, resolutiones leuiter sideratorum modo, & menses si apparuerint, maximè quibus primum, sed & virginibus & mulieribus, quibus per tempus. Sed & quibus non in quo solet tēpore, aut velut oportet apparent. Deinde pallidæ fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & consequenter fit, & in quo tēpore, & in quibus. Valde biliosis, in febribus maximè, omnino quibusdam ad crura purgatio. Medicamentorū modos scimus, ex quibus qualia, & quæ fiunt. Non enim omnes similiter, sed alij aliter cōponuntur. Et alibi citius, aut serius, in manuum tractationes assumuntur, velut est aut siccare, aut tundere, aut coquere, &

F eiusmodi. Omitto plurima, quæ vniciq; & in quibus morbis, & quo tēpore morbi, ætatem, speciem, victum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiuscemodi. Zoilo iuxta murum ex tussi matura, febris acuta, & faciei rubor & alius intercepta, præterquam ad necessitatem coactè, lateris sinistri dolor, & auris è directo valde dolorosa, & caput non vsque ad eò. Spuens semper suppuratum ægrotabat. Sed alia iudicata sunt, & iuxta aurem pus multum erupit, circa octauam aut nonā diem. Principia verò noni diei ex dolore auris. Haud scio quomodo sine rigore iudicatio facta est. Sudauit caput valde. Et hic sudor firmus erat, quòd quidem ardor etiam sinistri lateris esset. Supernè vnà cum aure dolor sedatus, maximè circa scapulas. Sed & ante sputa multa, ab initio florida reiecta, & circa septimam aut octauā diem.

Deinde

Quibus perituri fuerunt.

Quæ obseruanda.

Zoilus.

HIPPOCRATIS LIBER II.

Deinde laboriosa. Alius restitit vsq; ad nonam & decimam diem. Dolor extinctus est. Tumor remittebat, & sudores fiebant parui, non autem iudicabant. Manifesta autē erant hæc tum ex alijs, tum ex secessu. Nam incipiente auris dolore, etiam venter turbatus est. Erupit autem ex aure nona die, & iudicatus est morbus decimaquarta sine rigore eadem die. D

Sed & sputum largius ibat, & maturius, postquā auris erupit. Sudores autem, & serpentina vlcuscula ad multum tempus, in capite fiebant. Resiccata sunt tertia die. Quæcunq; sine signo iudicationis iudicatorio disparent, malè iudicata sunt, velut Erysipelas ancillæ Polimarchi. In glandularū tumoribus febres, malum, exceptis diarijs. Et in febribus glandularum tumores, deteriores, qui in acutis ab initio vigorem remiserunt. Spiritus, præcordijs eleuatio mollis, & intentio neutra, in ipsis supernè rotundum, in dextris velut circumferentia suppuratoria, aliud longius magis, aliud diffusum, aliud deorsum repens, & hinc atq; hinc distentio vsq; ad vmbilicum. In omni sursum versus ē directio latione, si reuocetur, & in rotunditatem cōcludatur, quatenus quidem spiritus fuerit, citra iudicationem calore attenuatur. Si verò hunc effugerit, ad suppurationem procedit. Spiritus densi, parui, magni, rari. parui, rari: extra magnus, intra paruus, alius quidem extendens, alius verò vrgens, dupla intro reuocatio, velut superinspirantibus, calidus, frigidus. Medela assiduarum oscitationum spiratio longa. Non potantibus & vix, spiratio breuis. E directio etiam laterum intentio dolorosa, & præcordiorum intentiones, & splenis eleuationes, ē naribus eruptiones. Quæ relinquuntur post iudicationem, recidivas facere solent. Primū itaque lienis eleuationes, si non ad articulos finierint, sanguinis ē naribus eruptio sit, aut præcordij dextri intentio, si non penetrauerint vrinæ. Hæc enim est interceptio, utrorunq;, & recidivæ horum meritò fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet si non fiant, eos verò qui iam fiunt, declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui verò non valde, eos coadiuuare. Eos verò auertere, si omnino incommodi fuerint, maximè si hi affuturi sunt: si minus, si iam veniunt. Quarta die fientes sanguinis ē naribus eruptiones agrè iudicant. Febres quæ vna die inter-

mit

Febres ma-
la in glan-
dularum tu-
moribus.
diaria fe-
bris

E

F

A mittentes, altera superrigent, vnà cum iudicatione, ad septimum circuitum durant. Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo victu vso aluus suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & vigil sine somno. Pectinis intentio fortiter, æqualiter, paulatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respirans, & quum verteretur. Sine tussi verò excreabat subcrassa. Peplus ipsi data, à præcordio quidem depulit, transiit autem nihil. Postridie glandes duæ appositæ non apparuerunt. Vrina crassa & turbata. Subsidentia leuis & plana: & restitit aluus in turbulentia, venterque mollior erat. Et splen eleuatus, & deorsum vergens factus est. Potu utebatur aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare aquosus paucus venit: non autè valde infirmus erat ob hoc ipsum: & vrina subsidentiam habens. In subsidentia verò subalbum quiddam adhærens vasi, tenue, neque genituræ simile, neque dissimile. Defluxit hoc breui. Postridie iudicatus est, à febre liber, & subiit subuiscosum vndecima die. Hoc verò circa defluxum erat quid biliosum. Vrinæ verò purgatio multa, tum copia, tum subsidentia. & priusquam vinum bibere inciperet, ferè pituitæ similis. Penetrauit autem vndecima die, vt quæ non esset multa. Viscosa verò erant ster cora & turbata. Huiusmodi autem iudicatorio modo fiebat. Nam & Antigens in Perintho tale erat. Quæ circa linguas eleuantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis fiunt. circa debiles illorum articulos sunt. Nam ossium natura caussa est, vt hæc & indurentur, & distendantur.

C Collectio Hippostrati vxori ex quartana annua ad fastigium eleuata est, quum subfrigida palā esse videretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor: iudicata est hoc modo: & postea menses plures copia & tempore. Tunc enim suppressi fuerant. Abscessus non consistere visus est. In pulsanibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino decliui accliuæ fiat. Quapropter etiam deligationes in venarum sectionibus impetum faciunt: fortes verò sanguinem impediunt. Sanguineum & subbiliosum, ructū acidum facit. Fortassis autem ad atræ bilis morbum his desinet. Rigores incipiunt mulieribus quidem magis à lumbis, per dorsum ad caput. Sed & viris posteriore corporis par

T

*Scopus.**Antigens.**Principiū
horroris.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

te magis quàm anteriore, velut cubitis, femoribus. Sed & cu D
tis rara. Indicat autem pilus animantium. Quibus nihil in-
tra constitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt.

Apparentia in quibus mensibus fiunt. Labores in circuiti
bus. Quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitatibus
perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas
per prodeuntia: requirit diætam siccissimam. Quod citius
motum est ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad
longius tempus. Labores, circa quinquagesimum tertium
diem, & circa centesimum sextum. Labores tertio, quinto,
septimo, nono mense, & secundo ac quarto. Quæ nosse oport
et ad septimum mensem, aut à mensium fluxu numerandi E
sunt nouem menses, aut à conceptione: & ad septuaginta ac
ducentos dies, græci menses fiunt: & si quid amplius ultra hos
est, & aut masculis, aut etiam foemellis, hæc fiunt, aut contra
ria. A cibis & potibus humeri ac mammae inflantur: & im-
potentia, & inflationes in capite, incrementa faciunt, donec
ossa fuerint solida facta. Menstruarum purgationum cir-
cuitus est. Quæ ante has fiunt grauitates, similes sunt labori
bus octimestribus. Primipararum lac, alimento quidem
transmutationem accipiente, octimestri verò perficiente. Si
in vulneribus fortibus, tumor nō appareat magnus, malum.
Laxi bonum: sursum pascetes, peius Menstruæ purgationes
similes octimestribus, in tendentibus ad decimum mensem
fientes, malum. Quibus tumores in vulneribus, non valde
conuelluntur, neq; insaniunt. His autem derepente dissipatis, F
quibus quidem ad posteriores partes, conuulsiones cum do-
loribus, quibus autem ad interiores, aut insanix, aut dolores
lateris acuti, & dysenteria rubra. Tumores præter rationē
alleuantes, prauum: velut Andronici filio Erysipelas recurrit:
si non ad eundem locum rediens, bonum quid significet. Hoc
ex natiuitate circa aurem, ad pubem distributum est. Alteri
tertia ex natiuitate die factum, suppuratum est nona. Hic se
prima die sanus euasit. Maligniora sunt quæ derepente dis-
parent.

SECTIO QUARTA.

De venis.

*Hepaticus
na.*

Hepatitis in lumbis vsque ad magnum verticulum, in-
fernè etiam verticulis se ingerit: hinc subleuata per
hepar

A hepar, & per septum transuersum ad cor, & quæ quidem re-
cta est, ad clauiculas : hinc aliæ quidem ad collum, aliæ verò
ad scapulas, aliæ deorsum deflecentes, ad verticula & costas
declinant. Et ex sinistris quidem, vna propè clauiculas. Ex
dextris verò ad quendam ipsarum locum. Alia verò vtrinque
deflexa. Alia paulò inferius deflexa, vbi quidem illa deficit,
costis se ingerit, donec ad venam in ipsum cor accesserit, ad
sinistras deflexa. Infra autè decuruata ad vertebrae descendit
donec perueniat, & inde incipit eleuari ingerēs se costis re-
liquis omnibus, hinc atque hinc singulis ramulos præbens,
quum sit vna : à corde quidem ad locū quendā à sinistris ma-
gis procedens. Deinde infra arteriam, donec consumpta fue-
B rit, & venerit eo vnde hepatitis subleuata est. Priusquàm au-
tem eo venit, circa extremas duas costas diuisa est, & partim
ab hac, partim ab illa verticulorū parte progressa consumi-
tur. Quæ verò recta à corde ad clauiculam tendit, supra arte-
riam est : & ab hac, velut etiam iuxta lumbos infra arteriam,
ad hepar insilit, partim in portas & pinnas, partim in reli-
quum deinceps procedit paulò infra septum transuersum.
Septum autem transuersum adhæret hepati, neque facile est
ipsum separare. Duplices porrò venæ à clauiculis, alteræ
hinc alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt : quo
verò hinc, nondum scio. At Septum transuersum infra iuxta
verticulum quod est infra costas, qua rhenes ex arteria, ea
parte cōsurgunt : Verùm arteriæ ex ipso rhene oriuntur, hinc
C atque hinc ab arteria neruum habentes. Atque hac parte ali-
cubi in recurrente à corde Hepatitis definit. Cæterum ab *Dux aliæ*
hepatide per septum transuersum maximæ dux, altera *vena.*
hinc, altera isthinc, sublimes feruntur, multifidæque per
septum sunt, & circa ipsum consistunt in superna parte, at- *Duo nerui.*
que hæ magis sunt conspicuæ. Duo verò nerui à cerebro sub
os magni verticuli, ex supernis & ad gulam magis, ab vtra-
que arteriæ parte descendunt, & vterq; in seipsum incidens,
vni similis, vbi verticula & septum sunt, ibi desinunt, & qui-
dam ambigui, ex hac societate ad hepar & splenē ipsos ten-
dere putauerunt. Alius neruus ab vtraque verticulorum *Neruus*
parte iuxta clauiculam ad spinam procedit, ex obliquo ver- *alius.*
ticulorum, & ad costas distribuitur, & quemadmodum ve-
næ, sic hi per septum, ad mesenterium mihi tendere videntur.

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Nervorum
discursus.
Sacrum os.*

Vbi autem hæ deficiunt, rursus hinc vbi septum exoritur, ab eo coherentes ac continui existentes, iuxta mediū infra arteriam, deinceps ad verticula distribuuntur, quemadmodum venæ, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aeno ex assiduo leguminū esu, forminae & masculi, crurum impotentes facti sunt, ac vitam degerunt: Sed & his qui eruo vescuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est vt excandescentia inducatur, & coloris reparandi, & sanguinis in vasa subter curiculam colligendi gratia: itemq; læticia, & timor, & huiusmodi, & si quidem reliquū corpus simul ægrotarit, simul curare: Sin minus, satis est. Strumargi famula Idumæa erat, quæ vbi filiā peperisset, conuersum est ei vteri osculum, & dolor ad coxam & crus. Iuxta malleolū secta vena liberata est, & quidem quum etiā tremores totum corpus detinerent. Verūm ad causam deuenire oportet, & ad causæ principium.

S E C T I O Q V I N T A.

Naturæ indiciorum notio.

Physiognomia.

*Varix utrum
quid possit.*

Q Vicunque fului, naso acuto, oculis parvis, mali. Quicunque fului, simi, oculis magnis, boni. Hydropici rauos oculos habent, & calui sunt. Vocis gracilitatem soluit varix, ad sinistrum & dextrum testem, absq; horum altero fieri non potest vt soluantur. Magni, calui, balbi, gracili voce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut caluus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus, fortiter atrabiliarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, eos necesse est dum illa solvuntur, suppuratos fieri. Dolorem in locis infernis fortem, surditas soluit, itemque sanguis multus ex naribus erumpens. Insania magni morbi ex more fientis solutio. Si puerperis conuulsio fiat, febrem excitato: & cerato multo tepido in vesicam immisso, ac per clysterem infuso colluito. Si capitis os confractum fuerit, lac, & vinum ammixta aquæ pari mensura, bibenda dato. Si verò vlcus fuerit, internas venas secato, si non febriciteret. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fuerint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde ad præcordia, postea ad coxam, Omnia verò vt doleant fieri non potest. Ventositatem flatuosam venæ sectione, fluxionem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex vena magna est.

*Puerperæ
spasmos.
Capitis os
doluans fra-
ctumue.*

Si

- A** Si verò sua sponte multum fluat,ieiunet: aut aquæ partes duas,lactis quatuor bibat. Infœcundas fomentis ac medicamentis curato. Quicunque derepente voce destituuntur, si sine febre fuerint,ipsis venam secato. Pituitæ fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nares ad pulmonem. Quibus tussis sicca est,his non soluitur,nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. Si hydropticum tussis corripiat,siquidem statim animo linguatur,calidis omnibus vtatur:Sin minus,inebriato,ac cibis ipsum impleto.Venas autem internas secato,dum morbus magnus in intentione est. Solutio coxarum doloris,oculorum distortionem,cæcitas:testium tumoris, mammarum eleuatio. Si febre tenente,partes circa faciem graciles fuerint,in die impari,sequenti die soluetur. Hydropicus si tumorem in cruribus habens tussiat,malum. Si auris doleat, lacte vtatur.
- B** Si non in die impari febris dimittat, recidiuare necesse est. Cui vena in cubito pulsarit,insanus & iracundus est: cui verò quieuerit,stupidus.Vulnus si sanguinem fundat,vl-
cus ne madefacto, verùm caput calida rigato. Si os ventriculi doleat, panem calidum cum vino meraco exhibeto. Vomitus solutio.aquam calidam bibendam dato, & vomat.
- C** Quæcunque corrupta torpescunt, euulsa vena vlcerato, ac sanato. In conuulsione digitorum manus citra febre, venam secato, si non caput doleat: Sin minus,aquam calidam affundito. Ad oculos. Spodij partem duodecimam,croci quintam,nuclei oliuæ vnam,cerusæ vnam,myrrhæ vnam. Aquam frigidam super caput fundito.& allia cū maza edenda dato. Varices caluorum si non magni fuerint, furiosi sunt. Ad vitiliginem & lepram. Calcem in aqua adhibeto,vt ne exulceres. Secundarum purgatio si non discedant.Sternutatorium ad nares apponito,vt sternutet.& sternutantis nares ac os apprehendito.

*Vox repa-
ratio.*

*Tussis sic-
ca.*

*Vulnus
quando non
lauandum.*

*Vomitio quæ
paretur.*

*Diversa
medela.*

Varices.

SECTIO SEXTA.

Naturæ indiciorum notio.

C Aput magnum,oculi parui,balbi, iracundi sunt. Qui longæ vitæ sunt,plures dentes habent. Balbi,celeri lingua præditi,atræ bilis humori obnoxij,biliofi que sunt,oculis non nictantes,iracundi. Magnum caput, oculi nigri &

*Diversa
per aspectu
cognitio.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

magni, nasum crassum & simum habentes, boni. Oculi rai
 magni, caput magnū, ceruix tenuis, pectora angusta, cōgrue
 adaptati hominis sunt. Caput paruum habens, neque bal-
 bus esse poterit, neque caluus, nisi fuerit glaucus. In con-
 uulsionibus si vox in die impari soluitur, a magno morbo li-
 berat. Puerperæ febricitanti & dolenti aquam affundito,
 & ptisanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur
 septimo mense, aut nono, aut decimo, & voce firmatur, & ro-
 bur sequitur, & manibus validus fit: dum vox soluitur, omnia
 soluantur. Solutio enim similis est voci. Soluitur autē in die
 impari. Si venæ pulsauerint in manibus, & facies sana ac ro-
 busta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus sit
 morbus, qui sine conuulsione nō soluitur, aut sanguinis mul-
 ti ex naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturi
 dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fue-
 rit: Sin minus, farinam quā calidissimā dato, & vinum me-
 racum. In turbatione ventris, fabas coctas dato, si non su-
 pernæ partes abundē fuerint biliosæ. Aut cuminum cum fa-
 bis edendum dato. At interceptio morbi fieri non poterit,
 nisi in die impari. Neq; principium fieri poterit, nisi in die
 pari, itemq; mense ac anno pari. Nitrum autem Aegyptium
 & coriandrum, ac cuminum cum oleo terito, & ventri illini-
 ro. Qui moriuntur eos necesse est die impari, & mēse im-
pári, & anno impari mori. Bonū autē fuerit prædicere mor-
 tem, aut dolores fortes. Quorum oculi robusti nō sunt, his
 mors breui imminet. Si verò in impari anno fiat, ab vtrisque
 impares fieri necesse est. Si autē in anno pari & die pari, ne-
 cessariū est in impari die mori. Ex numero tertia fortissi-
 ma est. Anginē & lippitudinē venæ sectio. Vulnerato in-
 testino, respiratio prodit infernē incōspicua iuxta vulnus, &
 euacuatur pectora. Dato igitur lac & vinū, pari aquæ mensu-
 ra ammixa. Quorū pectora bilē generant, balbi, furiosi, &
 calui sunt. Quicūq; horū ex natiuitate etiā strabones, hi im-
 prudētes sunt, aut calculosi aut insaniētes. Quibus autē non,
 alterius mali solutio fit. Circa naturā plurimā viam habet, mā
 dextera, oculus dexter. & quæ infrā sunt hac parte. Nā &
 masculi dextris inhærēt. Mulieribus mēses vt sistas, cucurbi-
 tam maximam ad mammam affigas. Trimestris puer om-
 nia præ se fert, & lac tunc habet. Si multū fluat lac, necesse
 est factum

*Pueri natu-
ra.*

*Morbi na-
tura.*

*Mors quo-
modo.*

*Medela
angina, lip-
pitudinisq;
& percussio
intestini.*

*Mas dex-
tris hæret.*

A est fortum debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est foetus. Vena crassa est in vtraque mamma: quapropter maximam habent prudentiae partem. Vrinae stiliticidium soluit venae sectio. Si superni loci turgent qui sunt circa caput, vlcera purgatio, vomitus, hydrops.

*Straguria
qui soluitur*

A ventris turbatione, aut à tussi, si cancer fiat, os amare scit. Dato autem elaterium bibendum bis aut ter, si non balbus fuerit. Deligare verò oportet florem æris vltum, donec fuluus euaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oscitatione, dato vinum pari aquæ mensura ammixta. Ad auris dolorem cucurbitam affigito.

B Quicquid supernarum partium doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia hæc soluit. In voluulo molli, frigidum vinum multum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut erurum dolor fiat. Soluit autem & febris, & dysenteria citra dolorem. Si præcordia distenta fuerint, manu comprimito ac lauato. Ad paronychiam vnguium abscissum, galla nigra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si verò vomat, & non bibat, allij aut ceparum intritum dato. Ut mulier in utero concipiat, polypos paruos super flamma calidissima asatos, & ferè semiambustos, edendos dato. Et nitrum Aegyptium tritum, coriandrumque ac cuminum, in pastillos efformato, in pudendumque subdito. Si ex crapula caput doleat, vini meraci heminam bibat. Si verò aliter caput doleat, panem quàm calidissimum cum vino meraco edat.

Capitis dolor qui dicitur sentiatur.

C Si hominem calor corripit, non à bile, neque à pituita, sed aut à lassitudine, aut aliàs febriat, aquam multam calefacito, deinde ea superinfusa caput rigato, donec pedes sudarint: & farinam crassissimam coquito. Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam & calidissimam edens, ac vinum meracum insuper bibens, vestimentis contextus faciliè quiescat. Aut narcissi duo aut tria capita in cœna edat.

*Item in a-
nxiis*

Qui insania corripitur,
ei hoc signum præfigit,
sanguis colligitur
ipsi ad mammas.

Signa furoris.

HIPPOCRATIS^D

COI DE MORBIS PO

PVLARIBVS, LIBER III.

IANO


PHYSICO IN

TERPRET

*

SECTIO PRIMA. AEGROTVS I.

Pythion.



Pythion qui habitabat iuxta telluris tem-
plum. Cœpit tremor à manibus prima
die, febris acuta, delirium. Secunda om-
nia exacerbata sunt. Tertia eadē. Quarta
ab aluo pauca, mera, biliosa prodierunt.
Quinta omnia exacerbata sunt. tremo-
res perseuerabāt, somnī tenues, aluus re-
stitit. Sexta sputa varia, subrubra. Septima os distractum est.
Octaua omnia exacerbata sunt. Tremores perseuerabant.
Vrinæ ab initio quidem, & vsq; ad octauam tenues, decolor-
res, in medio pendens nubilosum quiddam habebant. Deci-
ma sudauit. Sputa aliquantulum matura, iudicatus est. & vrin-
æ subtenues circa iudicationem. Post iudicationem verò,
quadraginta diebus postea suppuratio circa sedem, & absces-
sus factus est cum vrinæ stillicidio. P. M. V. Q. S. hoc est,
probabile multitudine vrinæ quadragesima sanatum.

AEGROTVS II.

*Hermocra-
tes perit.*

Hermocraten qui ad nouum murum decūbebat, febris
vehemens corripuit. Cœpit autem dolere caput, lum-
bos. Præcordij distētio molliter. Lingua ab initio adusta est.
Surditas statim. somni non aderant. Siticulosus non valde,
Vrinæ crassæ rubræ, depositæ non subsidebant. Ab aluo ve-
rò non pauca combusta prodibant. Quinta minxit vrinæ
tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebant.
Ad noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus
est. omnia exacerbata sunt. non resipiscebat. Septima mole-
sta

- A** sta fuit. Vrinæ tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa vndecimam omnia visa sunt alleuata esse. Sopor coepit. Vrinæ crassæ subrubræ, infra tenues, non subsidebant. Placidè resipiscebat. Decimaquarta à febre liber, non sudauit, dormiuit, intelligebat omnia. Vrinæ consimiles. Circa decimam septimam redijt, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta. Vrinæ tenues. Rursus autem vigesima die iudicatus est, à febre liber, non sudauit. Cibum fastidiebat per totum tempus. resipiscebat, loqui non poterat, lingua arida, non sitiebat, dormiebat soporosus. Circa vigesimam quartâ calefactus est, aluus lubrica multis tenuibus fluens, et sequentibus diebus febris acuta, lingua combusta est. Septima & vigesima mortuus est. Huic surditas perpetuò perseuerabat. Vrinæ crassæ & rubræ non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes. gustare autem non poterat. P. S. S. V. S. M. hoc est probabile secessibus suppressis vigesima septima mortuum.
- B**

AEGROTVS III.

- Q** Vi in Dealcis horto decumbebat, capitis grauitatem, & tempus dextrum dolorosum habebat multo tempore. Cum occasione verò febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Ab aluo stercorea probè prodierunt. Vrinæ tenues, variæ, in medio pendens quiddam habentes minutim dispersum, velut farinæ crassiores, & genituræ similes. Tertia febris acuta. Secessus nigri, tenues, spumosi, subsidencia secessibus liuida. somno grauiore aliquantulum premebatur, molestè surgebat. Vrinis subsidencia liuida, subuiscosa. Quarta vomuit biliosa, flaua, pauca, paulo post æruginosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Secessus similes. Vrinæ similes. sudauit circa caput & clauiculam, splen eleuatus est. femoris dolor è directo. Præcordij dextri distentio submolli. nocte non dormiuit, parum mente motus est. Quinta secessus plures, nigri, spumosi, subsidencia secessibus nigra. nocte non dormiuit, mente motus est. Sexta die secessus nigri, pingues, viscosi, graueolentes. dormiuit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, siticulosus, non dormiuit, mente motus est. Vrinæ tenues, non boni coloris. Octaua seces-
- C**

HIPPOCRATIS LIBER III.

sus nigri, pauci, compacti dormiuit. intelligebat. siticulosus **D**
 non valde. Nona riguit. febris acuta. sudauit. frigiditas. men-
 te motus est. Dextro oculo distortus est. lingua arida, siticu-
 losus, insomnis. Decima circa eadem. Vndecima intelligen-
 bat per totum omnia, à febre liber. sudauit. vrinæ tenues cir-
 ca iudicationem. Duobus diebus à febre liber fuit, decima-
 quarta redijt. Statim autē nocte non dormiuit, penitus men-
 te motus est. Decimaquinta vrina turbata, qualis ex his quæ
 subsiderunt fit, quum fuerint agitata. febris acuta. penitus
 mente motus est. non dormiuit. genua & tibias dolorosa ha-
 bebat. ab aluo subdita glande, stercora nigra prodierunt.
 Decimasexta vrinæ tenues, habebant quid in medio vehens
 nubilosum. mente motus est. Decimaseptima mane extre- **E**
 mitates frigida, contegebatur, febris acuta. sudauit per to-
 tum. alleuatus est. intelligebat magis. non à febre liber, siti-
 culosus, vomuit biliosa, flaua, pauca. Ab aluo stercora prodie-
 runt paulò post nigra, pauca, tenuia. vrinæ tenues, non boni
 coloris. Decima octaua non resipiscebat. soporosus. Decima-
 nona per eadem. Vigesima dormiuit, omnia intelligebat.
 sudauit. à febre liber. non sitiebat. Vigesima prima parum
 mente motus est. paululum sitiebat. præcordij dolor, & cir-
 ca umbilicum palpitatio perpetuò. Vigesima quarta vrinis
 subsidentia. intelligebat omnia. Vigesima septima coxæ dex-
 træ dolor. vrinæ tenues, & subsidentiam habebant. in reli-
 quis commodissimè habebat. Circa vigesimam nonam ocu-
 li dextri dolor. vrinæ tenues. Quadragesima egeffit pituito- **F**
 sa, alba, aliquanto plura. multum sudauit per totam. perfectè
 iudicatus est.

SECTIO II. AEGROTVS IIII.

*Philistes
civis paria.*

IN Thaso Philistes caput multo tempore dolebat. & quan-
 doque etiam aliquanto grauiore summo pressus decubuit.
 Quum autem ex potationibus febres continuæ oborta es-
 sent, dolor exacerbatus est. nocte excalesfactus est primùm.
 Prima die vomuit biliosa, pauca, flaua primùm. postea verò
 plus æruginosa. Ab aluo autem stercora prodiebant. noctem
 habuit molestam. Secunda die surditas. febris acuta. præcor-
 dium dextrum distentum est, declinauit ad internas partes,
 vrinæ tenues, pellucidæ, habebant quiddam in medio pen-
 dens genituræ simile. Parum insaniuit circa meridiem. Ter-
 tiam

A tlam diem molestam habuit. Quarta conuulsiones. exacer-
bata sunt omnia. Quinta mane mortuus est.

AEGROTVS V.

*Charion
non perit.*

C Hæriorem qui decumbebat apud Demænetum, ex po-
tu febris corripuit. Statim autem capitis grauitas do-
lorosa. non dormiuit. aluus turbata ex tenuibus. biliosis. Ter-
tia die febris acuta. capitis tremor, maximè autè labij infer-
ni. paulo post rigor, conuulsiones, penitus mente motus est.
Noctem molestè tulit. Quarta per quietem, parū dormiuit.
parum delirauit. Quinta laboriose omnia exacerbata sunt.
delirium. noctem molestè tulit. non dormiuit. Sexta per ea-
dem. septima superriguit. febris acuta. sudauit per totum.

B iudicatus est. Huic perpetuò ab aluo secessus biliosi, pau-
ci, meri. Vrinæ tenues boni coloris, in medio nubilosum
quiddam pendens habentes. Circa octauam minxit vri-
nas melioris coloris, habentes subsidentiam albam, paucam
resipiscebat. febris intermisit. Nona redijt. Circa decimam-
quartam febris acuta, sudauit. Decimasexta vomuit bilio-
sa, flaua, satis multa. Decimasextima superriguit. febris acu-
ta. sudauit à febre liber, iudicatus est. Vrinæ post recidiuam
& iudicationem, melioris coloris, subsidentiam habentes.
Neque mente motus est in recidiua. Decima octaua parum
calescebat. insuper sitiebat. Vrinæ tenues, quod in medio
pendebat nubilosum erat. parum mente motus est. Circa de-
cimam nonam à febre liber, collum dolorosum habebat.

C Vrinis subsidentia. perfectè iudicatus est vigesima. P.M.B.
V.V.S. hoc est, probabilè multitudine biliosarum vrinarum
vigesima sanatum.

AEGROTVS VI.

Euryanax

E Vryanaetis filiam virginem febris corripuit. Erat autè
sine siti perpetuò, nihil ad gustandum admittebat. Ab
alua pauca prodibant. Vrinæ tenues, paucae, non boni colo-
ris. Incipiente autem febre circa sedem dolebat. Sexta die à
febre libera, non sudauit. iudicata est. Quod verò circa se-
dem erat, parum suppuratum est. erupit vnà cum iudicatione.
Post iudicationem septima die riguit, parum incaluit,
sudauit. post iudicationem octaua die, riguit non multum.
postea verò extremitates frigidae semper. Circa decimam
post factum sudorem, mente mota est. & rursus breui resipi-
scebat.

HIPPOCRATIS LIBER III.

ſcebat. Dicebant autem ex guſtato botro ipſam hæc pati. Die D
verò vna intermiſſa, rurfus duodecima multū delirabat. al-
uus turbata eſt ex bilioſis, paucis, meris, tenuibus, mordaci-
bus, frequenter ſurgebat. Die ſeptima ab ea qua mente mota
Hæc perijt fuit, mortua eſt. Hæc incipiente morbo fauces dolebat &
perpetuo ruborem habebat. & gurgulio reuulſus. fluxiones
multæ, parvæ, tenues, acres. Tuſſiebat, maturum nihil edu-
cebat. Omnes cibos per totum tempus ſaſtidiebat, neque vl-
lum aliquem appetiuit. ſine ſiti erat. neq; quicquam memo-
rabile bibit. Tacens nihil loquebatur. Triftitia deſperata
rurfus corripiebat. Erat autem & innata quædam tabes.

AEGROTUS VII.

Biton.

A Nginoſa illa quæ apud Bitonem erat, primū à lingua E
cepit. Vox nō clara, lingua rubra reſiccata fuit. Prima
die horrida, incaluit. tertia rigor. febris acuta, tumor ſubru-
ber, durus, colli & pectoris ex utraq; parte. extremitates fri-
gidæ, liuidæ. Spiritus ſublimis. potus per nares fundebatur.
deglutire non poterat. alui ſeceſſus & vrinæ ſuppreſſa erant.
Quarta omnia exacerbata ſunt. Mortua eſt anginoſa. P. S. S.
Q. M. hoc eſt, probabile ſeceſſibus ſuppreſſis quinta mortuā.

AEGROTUS VIII.

*Forum mē-
daciū.*

A Doleſcentem qui decumbebat in mendacium foro, fe-
bris corripuit, ex laſſitudinibus, & laboribus, ac curſib.
inſolitis. Prima die aluus turbata ex bilioſis, tenuib. multis,
Vrinæ tenues ſubnigræ. nō dormiuit. ſiticolofus. Secūda om-
nia exacerbata ſunt. Seceſſus plures, intēpeſtiuiores non dor- F
miuit. Mens turbata. parū ſudauit. Tertia moleſtè habuit. ſi-
riculoſus, anxius, multa iactatio. deſperatio. mēte motus eſt.
Extremitates liuidæ ac frigidæ. præcordij intēſio ſubmolliſ
vtrinque. Quarta nō dormiuit. Malum in peius procedebat.
Septima mortuus eſt. Aetate circa vigefimū annum erat. P.
N. S. M. hoc eſt, probabile nouationibus ſeptima mortuum.

AEGROTUS IX.

Tifamenum

Q Væ apud Tifamenum decumbebat mulier, ei volu-
loſa moleſtè procedebant. vomitus multi. potum con-
tinere non poterat. Dolores circa præcordia. Et in infernis
partibus iuxta ventrem dolores, tormina continua, non ſiti-
culoſa. incaleſcebat. Extremitates frigidæ perpetuò. anxia.
inſomnis. Vrinæ paucæ, tenues. ſeceſſus crudi, tenues, pauci,
prodeſſe.

A prodesse non ampliùs quicquàm poterat. Mortua est.

AEGROTVS X.

Mulierem ex his quæ apud Pantimedem degebant, ex *Pantime-*
abortu infantis, prima die febris corripuit. Lingua ari *des abortu*
da, siticulosa, anxia, insomnis. Aluus turbata ex tenuibus, *perit.*
multis, crudis. Secunda die superriguit, febris acuta, ab aluo
prodire multa, non dormiuit. Tertia die dolores maiores.
Quarta mente mota est. Septima mortua est. Aluus semper
lubrica, ex secessibus multis, tenuibus, crudis. Vrinæ pauca,
tenuës, febris ardens.

AEGROTVS XI.

Alteram ex abortu circa quintum mensem, febris corri-
puit. Ab initio soporosa erat, & rursus insomnis, lum-
borum dolor, capitis grauitas. Secunda aluus turbata est pau-
cis, tenuibus, meracis primùm. Tertia plura, deteriora, nocte
non dormiuit. Quarta mente mota est. Timores. Tristitia,
dexter oculus distortus est, sudauit circa caput sudorē modi-
cum, frigidum, extremitates frigida. Quinta omnia exacer-
bata sunt, multum delirabat, & rursus breui resipiscebant. Si-
ris, insomnis. Ab aluo multa, intempestiua, perpetuò prodi-
bant. Vrinæ pauca, tenuës, subnigra. Extremitates frigida,
subliuida. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide. *Mortua est*

AEGROTVS XII.

Mulierem quæ decumbebat in mendaciū foro, primùm
tunc enixam dolorosè masculum, febris corripuit. Sta-
Ctim ab initio siticulosa, anxia, cor dolebat, lingua arida, ven-
ter turbatus est tenuibus, paucis, non dormiuit. Secunda die
parum riguit, febris acuta, parū circa caput sudauit frigidū.
Tertia laboriosè ab aluo cruda, tenuia, multa prodierunt.
Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Insomnis. Quintam
laboriosè tulit. Sexta per eadem. Ab aluo verò prodierunt li-
quida, multa. Septima riguit, febris acuta, sitis multa, iacta-
tio. Circa vespérā frigidum sudorē per totū sudauit, frigi-
ditas, extremitates frigida, non ampliùs recalescebāt, & rur-
sus ad noctem riguit. Extrēmæ partes nō recalescebant, non
dormiuit, parum mente mota est, & rursus breui resipuit.
Octaua circa meridiē recalescēta est. Siticulosa, soporosa, fa-
stidiosa ac nauseabunda. Vomuit biliosa, pauca, sublaua. No-
ctem molestè tulit, nō dormiuit. Vrinam minxit multā acer-
uatam

HIPPOCRATIS LIBER III.

natam infcia. Nona remiserunt omnia, soporosa. Ad vespēā **D**
parū riguit. Vomuit pauca, biliosa. Decima rigor, febris ex-
acerbata est, nihil dormiuit. Mane multam vrinam subiden-
tiam habentem minxit, extremitates recalescētes sunt. Un-
decima vomuit virosa, biliosa. Non ita longē postea super-
riguit, & rursus extremitates frigida. Ad vespēam sudor, ri-
gor. Vomuit multum, noctem laboriosē transegit. Duodeci-
ma vomuit multa, nigra, graneolentia, singultus multus, litis
laboriosa. Decimatertia nigra, graueolentia, multa vomuit.
rigor. Circa meridiē voce destituta. Decimaquarta sanguis
per nares. Mortua est. Hinc perpetuū aluus lubrica, horrida.
Aetas circa annum decimumseptimum.

S E C T I O T E R T I A.

E

Constitutio temporis pestilens.

*Tempestas
alis & anni
pestilentis
descriptio.*

ANnus austrinus, pluuius. Ventī perpetuū quiescentes,
Quū squalores fuissent superioribus tēporibus ad an-
num, in austrinis circa arcturū aqua multē. Autūnus umbro-
sus, nubilus, aquarū copia. Hyems austrina, humida, mollis.
Post solstitiū longē postea, propē æquinoctiū serā hyemes.
Et iam circa æquinoctiū aquilonares ventī niuoli nō multo
tēpore. Ver rursus austrinū, sine ventis. Aqua multē perpetuū
vsq; ad canem. Aestas serena, calida, æstus magni. Etesia parū
dispersum spirarūt. Rursus circa arcturum in aquilonaribus
aqua multā. Quū autē esset annus austrinus, humidus, &
mollis, per hyemē quidem sani degebāt, exceptis tabidis, de
quibus scribetur. Ante ver autē simul cū fientibus frigori-
bus, sacri ignes multi, quibusdā cum occasione, quibusdā nō,
atq; hi maligni multos peremerūt. Multi fauces doluerūt.

P

*Qui morbi
uiguerunt.*

Voces vitia, febres ardentes, phrenitici, ora vlcere feruido
affecta, in pudēdis tubercula. Lippitudines. Carbunculi. Alui
turbata. Ciborū fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Vrinā
turbatē, multē malē. Diu soporosi, & rursus insomnes. Multē
iudicationes penitus interceptā. Quēdā ægrē fiētes. Hydro-
pes, tabidi multi. Atq; hi quidē erāt populares morbi. In sin-
gulis autē relatis speciebus ægroti, & moriebātur multi. Acci-
derūt autē singulis horū hoc modo. Multis equidē ignis sacer
cū occasione ex vulgarib; & valde paruis vulnusculis, in toto
corpore, maximē sexagenarij, circa caput si vel parū negle-
cta

Acta essent. Multis verò etiā in ipsa curatione, inflammationes magnæ fiebant: & sacer ignis multus, breui, vndique depascebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppurationes contigerunt: carniū & neruorum ac ossium elapsus magni. Erat autem & fluxio collecta nō puri similis. Sed alia quædam putredo, & fluxio multa ac varia. Quibus igitur circa caput horum quid fieri cōtigit, his glabrics totius capitis ac mēti fiebat: & ossium denudationes ac elapsus: & multæ fluxiones, & hæc in febribus, & sine febribus. Erāt autem hæc horrēda magis quā mala. Quibus enim ad suppurationem talium maturatio peruenit, horum pleriq; seruabātur. Quibus verò inflammatio quidem & ignis sacer discessit, talem autē nullum abscessum fecit, horum multi perierunt. Si militer autē & si alicubi in alia corporis parte horum quid oberraret, hæc acciderūt. Multis enim brachiū, & totus cubitus defluxit. Quibusdā verò hæc affligebāt latera, aut anteriorem aut posteriorem aliquā partem. Quibusdam autem totum femur, vel tibiæ denudabantur, & totus pes. Erat autem ex talibus omnium grauissimum, vbi circa pubem & pudenda accidisset: & circa vlcera quidem, & cum occasione, huiusmodi erāt. Multis autem in febribus, & ante febrem, & ex febribus ignes sacri inciderūt: & qui quidem horum abscessum fecissent per suppurationē, aut per alium turbatio quædam tempestiua, aut vinarū bonorum excretio contigisset, per hæc soluebantur. Quibus autem nihil horum accidisset, verū obscure disparuisset, hi lethales erāt. Plerunq; igitur plurimis accidit sacer ignis verē. consequebantur autem & per æstatem, & sub autumnum. Multa verò turbatio quibusdam, & circa fauces tubercula, & linguæ inflammationes, & abscessus circa dentes. Vocesq; multis significationem de se præbebant, quod essent vitiatæ ac impeditæ & inuolutæ, primum quidem, tabidis incipientibus, imò etiam ardenti febre correptis & phreniticis. Cœperunt igitur febres ardētes ante ver, itemq; phrenitis, post facta frigora: & plurimi tunc egrotarunt. Acuta verò & lethalia symptomata his aderant.

Similia hæc sunt morbo gallico qui nunc uiget.

Erat autem constitutio febrium ardentium hoc modo. Ab initio soporosi, anxij, horridi: febris acuta: nō valde siticulosi: non deliri. De naribus parū stillauit. Exacerbationes plerisq; diebus paribus. Circa exacerbationes obliuio, exolutio, & vocis

Febris ardētis modus.

HIPPOCRATIS LIBER III.

& vocis priuatio. Extremitates manuum ac pedum semper D
his frigidiores, præsertim circa exacerbationes: & rursus tar
dè ac non bene recalescebant, rursusq; & intelligebāt & lo
quebantur. Detinebat etiam ipsos sopor continuus, non som
nulosus. Aut vigilæ cum doloribus: plurimis horū alui tur
bulentæ, secessibus crudis tenuibus, multis. Vrinæ multæ, te
nues, nihil neque iudicatorij, neque boni habentes. Necverò
aliud aliquod iudicarium ita habēribus fiebat. Neq; enim
sanguis bene erumpebat, neq; alius aliquis abscessus iudica
torius fiebat. Moriebaturq; vnusquisq; prout contigit erro
neo modo, plerunq; circa iudicationes. Quidam verò diu vo
ce priuati. Multi sudantes: & his quidem qui perniciosè ha
bebant, hæc accidebant. Consimilia verò etiam phreneticis. E
Sine siti autem hi erant. Neq; quisquam phreniticus insani
uit, velut ex alijs, sed alia quadā mala ac lenta in somnū de
latione grauiter peribant. Erant insuper etiam aliæ febres,
de quibus scribetur. Ora multis vlcere feruido affecta, vlce
rosa. Fluxiones circa pudenda multæ, vlcerationes. Tubercu
la foris, intus, circa inguina. Lippitudines humidæ, longæ,
diuturnæ, cum doloribus. Eruptiones palpebrarum foris, in
tus, multorum oculos corrumpētes, quas ficus vocant. Erum
pebant etiam in alijs vlceribus multa, & in pudendis. Car
bunculi per æstatem multi, & aliæ quæ seps vocātur, pustulæ
magnæ. Herpetes multi magni. At verò circa aluum mul
tis multa & nociua acciderūt. Primū quidem tenesmi mul
tis dolorosè: plurimis autē pueris, & omnibus qui erant ante F
pubertatem. & plurimi horum peribant. Lienterici multi,
dysenterici, neq; hi valde dolorosè. Secessus autem biliosi,
& pingues, & tenues, & aquosi. Et multis quidem ipse mor
bus ad hoc decubuit: & sine febribus, & in febribus: cū dolo
ribus, tormina, & voluuli maligni, multorū quæ in corpore
erant, & suppressa erāt exitus: & exeuntia progressa dolores
non soluētia, & his quæ offerebantur difficulter cedentia.
Nam purgatione plurimos amplius lēdebant. Ex his autem
qui sic habebant, multi quidem citò peribant. Multi verò lō
gius vitam degebant: & in summa, omnes & qui longis mor
bis ægrotabant, & qui ex acutis, maxime ex his quæ per aluū
secedebant, mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit. Cibum
autem fastidiebant omnes, ob cūctos præscriptos morbos, in
quos

*Mala na
ria.*

*Palpebra
rum ficus.*

*Ventris ma
lum hos oēs
mccabat.*

A quos sanè ego incidi. Multi verò & maximè hi ipsi, & qui tales erāt, sed & alij, perniciosè habebāt: & siticulosi alij erāt, alij non. Ex his qui febribus alijsq; laborabant, nullus siticulosus intempestiuè. Sed licebat circa potum victus rationem constituere, prout velles. Vrinæ autem prodeuntes multæ quidem erant, nō pro potus ingesti ratione, sed multum excedentes. Verùm multa quædam malitia vrinarum eiectionum erat. Neque enim crassitudinem, neque concoctiones, neque purgationes bonas habebant. Nam in multis morbis purgationes per vesicam sientes bonæ sunt. significabant autem plurimis colliquationem, & turbationem, & dolores, & nullam iudicationem. Soporosi verò maximè phrenitici, & febre ardente laborantes erant. Sed & in alijs morbis omnibus maximis, qui cum febre fiebant. In totum autem plurimos aut grauis sopor comitabatur, aut paruos ac tenues somnos habebant. Multa præterea alia febrium genera populariter grassata sunt tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum, erronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes autem hæ cum multa turbatione fiebant. Nam alui plurimis turbatæ: horrores, sudores non iudicatorij: & urinæ velut præscriptum est. Atque hæc plerisque horum longa erant. Neque enim abscessus his sientes iudicabant, velut in alijs. Et omnia quidem omnibus difficulter iudicabantur, & nullæ iudicationes fiebant, & diuturnæ, maximè verò his: paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis prout contigit defecerunt. Moriebantur autem horum pauci ex hydrope erectè obambulantes. Multos verò etiam in alijs morbis tumores infestabant, maximè verò tabidos. Maxima autem & grauissima erat tabes, & plures occidit. Nam multi per hyemem incipientes, partim decumbebant, partim erectè obambulabāt. Ante ver autem plerique ex decumbentibus moriebantur. Aliorum verò tussis nihil defecerunt. Verùm æstate remiserunt. Aut sub autumnum omnes decubuerunt, & multi mortui sunt, plurimi verò horum diu ægrotauerunt. Cœpit igitur plurimis horum derepentè ex his afflictio. frequentes horrores erant, sæpe febres continuæ, acutæ: sudores intempestiui, multi, frigidi perpetuò. Multa frigiditas, & vix rursus recalescebant. Alui variè adstrictæ, & rursus breui hume-

*Quæ febres
uigerent.*

*Tabes gra-
uissima fuit*

HIPPOCRATIS LIBER III.

scentes. Et quę circa pulmonem erant omnia, infra distribue-
bantur. Multitudo vrinarum non bonarum, colliquationes
malę. Tussēs autem aderant quidem perpetuò multę, &
multa educentes matura ac liquida, non autem valde cum
doloribus. Sed etiā aliquantulum dolerent, valde tamen le-
niter omnibus purgatio à pulmone fiebat: fauces non valde
mordaces: neque falsugines quicquam infestabant. Viscosa
tamen & alba, & liquida ac spumosa multa de capite descen-
debāt. Magnum autem malum & hos, & alios comitabatur
ciborum fastidium, velut præscriptum est: Nam neque potū
cum cibo libenter sumebant, sed valde sine siti degebant.
Grauitas corporis. Soporosi. Plurimis ipsorum tumor, & ad
hydropem deueniebant. Horridi, deliri circa mortem. For-
ma tabidorum erat leuis, subalbida, lentis colorem referens
subrubra, raua. Pituita alba referti. Scapulas alarum modo e-
minentes habentes: & mulieres sic. Atque bilis item forma, &
sub sanguinea, febres ardentes, & phrenitides, ac dysenterię
hos tentabāt. Tenesmi iuuenibus pituitosis: longa alui pro-
fluua, acresq; secessus, & pingues, biliosis. Erat autem omni-
bus præscriptis grauissimum quidem ver, & multos occidit.
Aestas autem facilima, & paucissimi perierunt. Autumno ve-
rò & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij.

AEGROTI SE DECIM. PRIMVS.

Parijs.

IN Thaso Parium quendam, qui decēbebat supra Artemi-
sij ædes, febris corripuit acuta: ab initio continua, ardens,
siticulosa. principio soporosus, & rursus insomnis. Aluus tur-
bata in principio. Vrinę albę. Sexta die minxit urinā oleo-
sam, mente motus est. Septima exacerbata sunt omnia: nihil
dormiuit. Sed & urinę similes, & mēs turbata. Ab aluo verò
biliosa, pingua prodierūt. Deinde octaua parum de naribus
stillauit. Vomuit virosa pauca, parū dormiuit. Nona per ea-
dem. Decima omnia remiserunt. Vndecima sudauit, non per
totum. Circumfrigit quidem, verū breui rursus incaluit.
Duodecima febris acuta. Secessus biliosi, tenues, multi. In v-
rinis quiddam in medio vehebatur: mente motus est. Deci-
ma septima laboriosè transmissa est. Neq; enim somni, neq;
febris augeſcebat. Vigesima sudauit per totum, insomnis: se-
cessus biliosi, cibum fastidiens, soporosus. Vigesima quarta
recidua facta est. Trigesima quarta à febre liber, aluus non
suppressa

*Quę tabi-
dis species
hos vexabat*

urina oleosa

A suppressa est. Et rursus inclinauit. Quadragesima à febre liber. aluus nō multo tempore suppressa fuit. Cibū fastidiens, parum rursus febricitauit. & semper erroneo modo, partim sine febre, partim non. Nam etsi reliquisset & alleuata esset, rursus reuertebatur. Edulijs quoque multis & vitiosis utebatur. Somni mali circa recidiuas, mente motus est. Vrinæ crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, verū turbatas & prauas, & aluus iam adstricta erat, & rursus soluta, febriculæ continuæ: secessus multi, tenues. Centesimavigesima die mortuus est. Huic aluus assidue à prima die lubrica erat, ex biliosis, liquidis, multis. Aut adstricta ex feruidis ac crudis. Vrinæ verò perpetuò malæ. Sopores plerunq; cū doloribus, insomnis, cibum fastidiens, febris ardens continenter.

AEGROTVS II.

IN Thaso decumbentē apud frigidā, à partu vbi filiam peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta horrida, tertia die corripuit. Multo autē tēpore ante partū febriculosa erat, decumbēs, cibum fastidiens. Postquam autem riguisset, febres cōtinuæ, acutæ, horridæ. Octaua multū mente mota est, & sequētibus diebus, & breui rursus resipiscebat. Aluus turbata, ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis: sine siti erāt. Vndecima resipiscebat, verū soporosa erat. Vrinæ multæ, tenues, & nigræ, insomnis. Vigesima parū circumfrigit, & breui rursus incaluit, parum delirauit, insomnis. Alui secessus iisdē. Vrinæ aquosæ, multæ. Vigesima septima à febre libera, aluus adstricta est. Non multo tempore postea coxæ dextræ dolor fortis multo tēpore. Febres rursus comitabantur, & vrinæ aquosæ. Quadragesima dolores circa coxam alleuati sunt. Tussēs autem assiduæ, humidæ, multæ: aluus substitit. Cibum fastidiens. Vrinæ in iisdem, febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo verò modo exacerbescētes, partim ita, partim nō ita. Sexagesima tussēs quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorum concoctio fiebat, neque alius consuetus abscessus. Maxilla verò ex dextris diuulsa est: soporosa, rursus delirabat, & breui resipiscebat. Cæterum à cibis auersum animum habebat, & maxilla quidem ad locum suum redijt. Aluus autem biliosa, pauca egegit, febricitauit acutius, horrida, & sequētibus diebus voce destituta est, & rursus resipiscebat, ac loquebatur. Octoge-

*Puerpera
quæ passa
sit.*

signa morbi

HIPPOCRATIS LIBER III.

suma mortua est. Urina huic perpetuò erāt nigra, & tenues, & aquosa, & sopor comitabatur. Cibum auersans. Tristis insomnis: ira, molestia. Mens melancholica.

AE G R O T V S I I I.

*Pythion
Herculis
templum.*

IN Thaso Pythionem qui supra Herculeum templum decumbebat, ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta victus ratione, rigor magnus, & febris acuta corripuit, lingua arida, siticulosus, biliosus, non dormiuit. Urinae subnigra, quod in medio ipsarum pendeat, sublime erat. Secunda die circa meridiem frigiditas extremarū partium, & magis circa manus & caput, loquela & voce destitutus. Breuissimus ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Mox quieta. Sudauit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vesperī verò sub solis occasus parum frigit. Turbatio nocte dolorosè, nihil dormiuit. Ab aluo pauca cōpacta stercora prodierunt. Quarta manè quieta. Circa vesperam omnia exacerbata sunt, frigiditas, loquela, & voce destitutus, in deterius recalefactus est post tempus. Urinas minxit nigras in medio quid pendens habentes. Nocte quietè dormiuit. Quinta visus est alleuatus esse. Verū iuxta aluum grauitas cum dolore: siticulosus. Noctem laboriosè tulit. Sexta manè quieta. Vesperī dolores maiores, exacerbatus est. Vesperī clystere adhibito, ab aluo probè egressus. Nocte dormiuit. Septima die anxius, submolestè ferebat. Urinam minxit oleosam, noctu turbatio multa, delirabat, nihil dormiebat. Octaua manè parum dormiuit. Mox autem frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis imminutus. Vesperī rursus excalefactus est, mente motus est. Iam autem ad diem parum alleuatus est. Secessus meri, pauci, biliosi. Nona soporosus, anxius, quum excitaretur, non valde siticulosus. Circa solis occasus molestè ferebat, delirabat, noctem malam habuit. Decima manè voce destitutus, frigiditas multa, febris acuta. Sudor multus: mortuus est, dolores huic in diebus paribus.

AE G R O T V S I I I I.

*Phreniticus
moriatur.*

PHreniticus prima die decubens vomuit æruginosa, multa tenuia, febris horrida, sudor multus, continuus per totum. Capitis & colli grauitas cum dolore. Urinae tenues, in medio ipsarū pendentia, parua, diuisa: non sudauit. Ab aluo stercora acruatim egressus, multū mēte motus est, nihil dormiuit

Amiuit. Secunda mane voce destitutus, febris acuta, sudauit. nō intermisit. Palpitationes per totū corpus. Nocte conuulsiones. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

AE G R O T V S V.

IN Larissa caluus, femur dextrum doluit derepente. ex his *Caluus cito*
quæ offerebantur nihil proderat. Prima die febris acuta, *moriur*
ardens, quietē tenebat. dolores autē conſequebantur. Se- *Larissa.*
cunda femoris quidē remiserunt dolores. febris autem acuta
est. submoleſte ferebat. nō dormiebat. extremitates frigidae.
Viinarum non bonarū copia prodibat. Tertia femoris dolor
quieuit. Mentis emotio, & turbatio, & multa iactatio. Quar-
ta circa meridiem mortuus est celerrimē & acutiſſimē.

AE G R O T V S V I.

B**I**N Abderis Periclem morbus corripuit acutus, cōtinuus, *Pericles.*
cum dolore. Sitis multa anxietas. potū continere nō pote- *Abdera.*
rat. Erat autē ſublienofus, & capite grauatus. primo die ſan-
guis ē ſiniſtra nare erupit, multa tamē febris augeſcebat. V-
rinam minxit multam, turbatā, albam. depoſita nō ſubſide-
bat. Secunda omnia exacerbata ſunt. urinæ tamē craſſæ qui-
dem erant, verū magis ſubſidebant. & anxietas leuata eſt.
dormiuit. Tertia febris emollita eſt. Vrinarū copiaque con-
coctæ multam ſubſidentiam habebant. Nox quieta. Quarta
circa meridiem, multum calidum ſudorem per totum exclu-
ſit. A febre liber iudicatus eſt. non redijt. morbus acutus.

AE G R O T V S V I I.

C**I**N Abderis virginem quę decumbebat in ſacra via, febris *Virgo Ab*
ardens corripuit. Erat autē ſiticulofa & inſomnis. Menſes *deriana.*
autē primū ipſi deſcendebant. Sexta anxietas multa. ru-
bor. horrida. mœſta. Septima per eadem. Vrinæ tenues qui-
dem, verū boni coloris, venter non vexabat. Octaua ſurdi-
tas, febris acuta. inſomnis. anxia. horrida. intelligebat. Vrinę
ſimiles. Nona per eadem, itemq; ſequētib; ſic ſurditas per-
ſeuerabat. decimaquarta mens turbata. febris remiſit. Deci-
maſeptima ſanguis per nares fluxit multus. Surditas parum
remiſit. & ſequētib; anxietas. ſurditas aderat. & delira erat.
Vigeſima pedum dolor. ſurditas, deliriū intermiſit. ſanguis
pauc⁹ per nares erupit. ſudauit. à febre libera. Vigeſimaquar-
ta febris redijt. ſurditas rurfus. pedum dolor permanſit. men-
tis emotio. Vigeſimaſeptima ſudauit multum à febre libera.

HIPPOCRATIS LIBER III.

Surditas defecit. pedum dolor restabat. De cætero perfectè d iudicata est.

A E G R O T V S V I I I .

*Anaxion.
Thraciæ
portæ.*

IN Abderis Anaxionem, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit. lateris dexteri dolor assiduus. Siccam tussim habebat, neque expuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Urinæ boni coloris, multæ, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augescebat, & dolores non remittebant, & tussēs vexabant, difficultérque spirabat. Octaua cubitum secui. effluebat sanguis multus. velut debebat. Remiserunt quidem dolores, tussēs tamen siccæ comitabantur. Undecima remiserunt febres. parum circa caput sudauit. Tussēs adhuc. & quæ à pulmone prodibant, liquidiora erant. Decimaseptima incēpit pauca, matura spuerē. alleuatus est. Vigesima sudauit, à febre liber post iudicationem. alleuatus est. Erat autem siticulosus, & à pulmone prodeuntium purgationes non bonæ. Vigimaseptima febris redijt. Tussijt, eduxit matura multa. Urinis subsidētia multa, alba. Sine siti erat. bene spirans. Trigesimaquarta sudauit per totum, à febre liber. penitus iudicatus est.

A E G R O T V S I X .

*Heropy
thus.*

IN Abderis Heropythus erectè obambulās caput dolebat. Non multo autē tempore postea decubuit. habitabat prope superiorem viam. febris ipsum corripuit ardens, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorum, siticulosus, multa molestia. Urinæ tenues, nigræ, id quod in medio ipsarum pendebat, sublimē erat aliquando, quādoque non. noctem dolorose transēgit. Febris aliās aliter exacerbescēbat, plerūque inordinatē. Circa decimamquartam surditas. febres augescebant. Urinæ per eadem. Vigesima multum mente motus est. itēq; sequentibus. Quadragesima multus sanguis ex naribus erupit. & magis intelligebat. Surditas aderat quidem, sed minor. febres remiserunt. Sequentibus diebus sanguis erumpēbat frequenter & paulatim. Circa sexagesimā sanguinis eruptiones cessarunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis. & febres augescebāt. Non longo tempore postea dolores omniū infernarum partium. Contigitque aut febres esse maiores, & surditatē multā: aut hæc quidē remittere & leuiora fieri, infernarum

A ferrarum autē partium circa coxas, dolores esse maiores. Iā verò circa octogesimam omnia remiserunt. Nihil tamē defecit. Vrinæ enim boni coloris, & plures subsidantias habentes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimā alu⁹ multis biliosis turbata est, & tempore non modico multa talia prodibant, & rursus dysenterica cum dolore. Reliquorum verò quies erat. In summa, & febres defecerunt, & surditas cessauit. In centesima vigesima perfectē iudicatus est. febris ardens.

AEGROTVS X.

IN Abderis Nicodemū ex venere & potu, febris corripuit. *Nicodemus.*
Initio autem erat anxius. & cordis dolore vexabatur. *fi-*
B ticulosus. lingua combusta fuit. Vrinæ tenues, nigre. Secunda febris exacerbata est. horridus. anxius. non dormiuit. Vomuit biliosa, flaua. Vrinę similes. Nox quieta. dormiuit. Tertia die remiserunt omnia & quies erat. circa solis occasus rursus molestē ferebat. noctē laboriosē tulit. Quarta rigor. febris multa. dolores omniū. Vrinæ tenues, & quid in medio ipsarum pendēs. Sexta mēte multum motus est. Septima quies. Octaua alia remiserunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderāt quidem dolores, verū omnes minores. Exacerbationes autem & dolores huic ad finem vsque in dieb⁹ paribus magis erant. Vigesima minxit vrinā albam, quæ crassitudinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudauit multum. visus est sibi à febre liber esse. Vesperī verò rursus incaluit. &
C dolores ijdem. horror. sitis. parum mente mot⁹ est. Vigesima quarta multam vrinam albam, multam subsidantiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exudauit. à febre liber. iudicatus est.

AEGROTVS XI.

IN Thaso mulier morosa, ex mœrore cum occasione, erectē *Mulier*
lobambulans, in somnis facta est, & cibi fastidiēs. & erat *Thasia.*
ficulosa, & anxia. habitabat autē prope Pyladę ædes in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multi, tristitia, febricula tenuis. Mane conuulsiones multæ. Quum autem intermisissent conuulsiones illæ multæ, delirabat. turpia loquebatur. Dolores multi, magni, continui. Secunda per eadem. nihil dormiebat. febris acutior. Tertia cōuulsiones defecerūt. Sopor autem & in somnum grauiorem delatio ade-

HIPPOCRATIS LIBER III.

rat, & rursus vigiliæ. exilijs. continere se non potuit. multum delirauit. febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus exclusit. à febre libera. dormiuit. Penitus resipuit. iudicata est. Circa tertiam autem diem vrinæ nigrae, tenues. quod in medio ipsarum pendebat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt.

AEGROTVS XII.

Virgo larissa.

IN Larissa virginem febris corripuit ardens, acuta. in somnis. siticulosa. lingua fuliginosa, arida. Vrinæ boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriosè degebat. non dormiuit. Tertia ab aluo multa prodierunt aquosa cum virore pallida. itidemque sequentibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta vrinam egessit tenuem, paucam: habebat in medico pendens illud sublime, non subsidebat. mente mota est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus largè fluxit. quumque in horruisset, sudorem multum calidum per totum effudit. à febre libera. iudicata est. In febribus autem, & iam iudicatæ, menses tunc primùm prodierunt. Erat enim virgo. Perpetuò verò anxia erat. horrida. faciei rubor. oculorum dolor, capitis grauitas. Huic non redijt, sed iudicata est. Dolores diebus paribus.

AEGROTVS XIII.

Apollonius Abderita nus.

Cur hic adeo laborauit.

APollonius in Abderis erectè titubās obambulabat multo tempore. Erat autem magnis visceribus præditus. & circa hepar dolor multo tempore familiaris ipsum comitabatur. & sanè tunc etiam morbo regio tenebatur. flatuosus. coloris subalbi. Quum autem edisset ac bibisset intempestiuus carnē bubulam, incaluit parum primū. decubuit. Lacte verò vsus cocto & crudo, multo, caprino ac ouillo, & victu malo, omnium læsiones magnæ sequutæ sunt. Nam & febres exacerbatae sunt, & aluus nihil memorabile de ingestis egessit. Vrinæ tenues & paucæ prodibant. Somni non aderant. inflatio mala, sitis multa. soporosa. præcordij dextræ eleuatio cum dolore. extremitates vndique subfrigidae. parum delirabat. Obliuio omnium quæ loquebatur. mente mouebatur. Circa decimam quartam ex qua quum riguisset incaluit, decubuit, & insanijs. clamor. turbatio. sermones multi. & rursus quies. & tunc sopor accessit, postea verò aluus turbata, multis, biliosis,

A sis, meris, crudis. Vrinæ nigre, paucæ, tenues. Multa molestia. Secessus variè habebant. Aut enim nigri, & pauci, ac æruginosi erant: aut pingues, crudi, & mordaces. Per tempora verò videbatur etiam lactosa egerere. Circa vigesimam quartam lenitas erat. & reliqua quidem in iisdem perseverabant, parum autem resipiscebant: ex quo verò decubuit, nullius meminuit: Rursus autem breui desipiebat. Omnia in peius procedebant. Circa trigessimam febris acuta. Secessus multi, tenues. delirus. extremitates frigida. voce destitutus. Trigesimaquarta mortuus est. Huic perpetuò ex quo ego novi, alvus turbata. Vrinæ tenues, nigra. soporosus. insomnis. extremitates frigida. delirus perpetuò. phreniticus.

AEGROTVS XIII.

IN Cyzico mulierem, quæ gemellas filias magna difficultate peperit, & non valde purgata est, primum inuasis febris horrida, acuta. Capitis & colli grauitas cum dolore. Insomnis ab initio, taciturna ac tetrica, & non obsecundans, Vrinæ tenues & decolores. siticulosa. anxia plerunque. alius erroneo modo turbata. & rursus adstricta. Sexta ad noctem multum delirabat. nihil dormiuit. Circa vndecimam insaniit. & rursus resipuit. vrinæ nigrae tenues. Et rursus tempore interposito oleosæ. Et alius multis tenuibus turbata. Decimaquarta cōuulsiones multæ. extremæ partes frigidæ. nihil amplius intelligebat. vrinæ suppressæ sunt. Decimasexta voce destituta est. Decimaseptima mortua est. phrenitis.

Puerpera
Cyzicena
gemellas pe-
perit, &
morta est.

мѣта обрѣза

ÆGRÖTVS XV.

IN Thaso Dealcis vxorem, quę decumbēbat in Leio, febris horrida, acuta, ex mœrore corripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuò, semper tacita manibus palpabat, vellebat, scalpebat, pilos legebat. Lachrymę, & rursus risus. non dormiebat. ab aluo irrationes. nihil prodibat, parum commonita bibebat. vrinę paucę, tenues. Febres ad manum tenues. extremarum partium frigiditas. Nona multum delirabat. Et rursus sedata est. tacita. Decimaquarta spiritus rarus, magnus, per tēpus. Et rursus breuispira. Decima septima ab aluo irritatio turbulenta. postea verò ipsi potus percurrēbant, neque consistēbant. omnino nihil sentiebat. Cutis aridę circumtensio. Vigesima sermones multi, & rursus sedata est. voce destituta. breuispira. Vigesima prima mortua. Huic

Dealcis u
xor Thasie

HIPPOCRATIS LIBER III.

perpetuò ad finem vsque erat spiritus rarus magnus. Omni-
no nihil sentiebat. semper contegebatur. Aut sermones mul-
ti, aut, tacita perpetuò. phrenitis.

AEGROTVS XVI.

*Adolescens
in Melibœa*

Adolescens in Melibœa, ex potationibus & venere mul-
to tempore calefactus decubuit. Horridus autem & an-
xius erat. insomnis. & non siticulosus. Ab aluo prima die ster-
cora multa prodibant, cum multa defluxione. & sequentibus
multa aquosa cum virore pallida prodibant. Vrinæ tenues,
paucae, decolores. Spiritus rarus, magnus, per tempus. Præcor-
dij intentio submolliis, oblonga ex utrisque. Cordis palpira-
tio perpetuò continua. Vrinam minxit oleosam. decima sen-
sim mente motus est. moderatusque erat ac quietus. Cutis a-
rida & circundistenta. Secessus multi & tenues, aut biliosi &
pingues. Decimaquarta omnia exacerbata sunt. mēte mo-
tus est. multū delirauit. Vigesima insaniit. iactatio. nihil min-
gebat. paucos potus cōtinebat. Vigesimaquarta mortuus est.
phrenitis. Videtur porrò mihi æstas illa quæ tunc fuit, iux-
ta rationem commoditatem attulisse. Nam æstiuos morbos
hyems succedens soluit. Et hyemales æstas succedens trans-
mutat. Quanquam ipsa in seipsa quæ tunc erat æstas, nō sta-
bilis erat: sed derepente calida, & austrina, & sine ventis. At-
tamen ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam
verò artis partem esse arbitror, etiam de his quæ scripta sunt
recte, posse considerationem facere, ac iudicare. Qui enim
hoc nouit, & his utitur, non videtur mihi in arte multum fal-
li posse. Oportet autem exactè perdiscere vnamquamque tē-
porum constitutionē, & ipsum morbum. Et quid boni com-
munis sit in constitutione, aut in morbo. & quid mali com-
munis sit in statu, aut morbo. & qui morbus longus sit & le-
thalis. & qui longus. & non perniciosus ad vitam. & qui acu-
tus, ac lethalis. & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim
ordinem dierum iudicatoriorū considerandi, ac præ-
dicendi facultas datur. Et harum rerum gna-
ros scire contingit, quibus & quando,
& quomodo victum præscri-
bere oportet.

*Quæ & in
anni tempo-
ribus & in
morbis ob-
seruantur.*

Hippocra

A H I P P O C R A T I S **COI DE MORBIS PO-**

PVLARIBVS LIBER QVAR-

T V S.

M



Ost æquinoctiū & post pleiada qua-
 lia sunt erodentia & mucosa, quæ ca-
 put aperuerunt, suprâ aurem prodie-
 runt. Ei qui apud Leocydis edes ha-
 bitabat, in pede. Phanodico digiti
 in pede, in pectore. Qui tibiâ sectus
 est, hac parte etiam nigrefactus est.
 Erat vlcus magnū in externa tibiæ
 parte, & retro prodibat. Quū purum

factum esset, lateris dolor & pectoris sinistri ē directo, & fe-
 bres. Mortuus est à febre. Biliosum restiario abundē colora-
 tum. Et vstoria adhibenti circa æquinoctiū, sanguis multus
 deorsum prodijt. Seni valde vehementer abscessit, nō vltra
 quatuordecim dies. Vulnerato ab Antiphilo, vsto iudicatio

Antiphiloo

C sanguinē spuit, superstes manebat. & recidiua facta est postea
 Iudicatus est velut par erat, circa pleiadū occasum primū.
 Post pleiadū autē occasum, biliosus ad insanīā vsq; iudicatio
 facta est, superuixit, circa nonā diē, absq; sudore. Circa æqui-
 noctiū Chalcidoniū à portis delatus ad forū, ex ruprione cir-
 ca māmā dextrā dolēs, spuebat aliās atq; aliās pallēs subuiri-
 de. Vēter egerebat. Sudor auspicatus septima, tenuit plerūq;
 vsq; ad octauā. iudicatus est decima quarta. Circa quadagesi-
 mā tabercula exorta ipsi circa vtrasq; aures, haud immeritō
 putabatur suppuratus fore, nō factū est. Pectus Aristodemo
 vstum est. Philidis filio quū abscessus factus esset ex casu, &
 ipsi pectus vstū est. Erat autē dolor quidā etiā antea. post equi-
 noctiū autūnale recidiuē. & aliās vsq; ad solstitiū hyemale, &
 cum sole æstiuo. Acheloi vxor sexta die abortiuit, quū esset

*Chareidoo
nius.*

*Aristodemo
nius.*

*Philidis fi-
lius.*

Acheloui.

sanguinea,

HIPPOCRATIS LIBER III.

sanguinea, & horrida. & sudores. Iudicatio facta est decima- **D**
 quarta, quot mēsum fuerit foetus, haud scio. Masculum autē
 etiā alium ad dies viginti se abortiuisse dixit, an vera dixe-
 rit non scio. Circa solstitium hybernū aquilonares ven-
 ti erant. Morbo regio corripiebatur abundē colorati. & par-
 tim horridi, partim nō. Linguae combustae tertia die. Et tur-
 bationes circa sextam & septimam, atque hae diu durantes.
 Decimaquarta ventres resistentes, & in medicationibus non
 obediētes. Pro ratione febrium etiam nulli sudores. Splē-
 nes quibusdam parui ad praecordia dextra extēti, & ad ma-
 nū submurmurantes. Sanguinis fluxiones. & vrinis purgatio
 ac iudicatio. Multo autem magis infrā nitebantur. Nam &
 hoc sub illud tempus corripiebat. Quibus nō sic erat, splēnes **E**
 verō etiam eleuati, his sanguis ex sinistra nare. Solstitium
 praterierat, hyberna hyberno modo in Aquilonaribus, pau-
 lo verō post austrina erant, ad quindecim dies. Postea verō
 niues quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionē,
 morbi regij abundē colorati vigeant. qui non sincerē iudi-
 dicantur, recidiuabant. Post niues, austrina succedebant, &
 pluuiarū, grauedines eruperunt, & cum febribus, & sine febi-
 bus. Cuidam verō etiam, ad dentes, qui antea ex medio do-
 luerat: ad dextra, supercilium, & oculos. Erant autem & rau-
 coli, & fauces inflammatae. & glandulae isthic spongiae appel-
 latae intumescēbant. & tubercula circa aures, & maxillā mol-
 lia, & cū febre sedabant. Incipiētibus febricitare fiebant su-
 pernē, & in utraq; partes pleraque horū. & Spongiae quibus **P**
 dam sub autumnū & hyemem. Sed & porrigines. Et mul-
 tae omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant.

Sexta die virgini iudicata. sexta reuerterunt. iudicata verō
 sunt per sextam. Omnia in his temporibus sexta & octaua
 iudicabantur, circa pleiadum occasus. Meandri cæci vxor sta-
 tim cum pallore viride, & statim purulentum sputum circa sex-
 tam. & hepatis feruor, & deorsum secessus modicus. carno-
 purulenta sursum pauca, alba, lata expuebat. cibum fasti-
 diens. Mortua est propē vigesimam diem. Ex vicinis
 Thestoris famula, ex vistorijs: secessu bilioso, multo: praeco-
 rdio intenso: Sexta die ex suppressione alui ipsi tenuia, mul-
 ta, vna vice egeffit. & statim sudauit, & iudicata est. & alui
 substitit. eadem autem hora quum rignisset febricitauit. &
 rursus

A rursus eadē hora. Therсандri vxor quum pituita alba prædita nō valde esset, lactans acuta febre correpta est. Huic lingua combusta est, dum alia comburerentur, sub hoc tempus: *Thersandri uxor.* linguaque exasperabatur, velut grandine multa. Et lumbri- *Metrophā-* ci per os. Circa vigesimam autem non perfectè iudicata est. *ii filius.*

Circa pleiadum occasus Metrophanti filius, caput percussus ab alio puero, per testam : quum peruenisset ad duodecimam diem febricitauit. Occasio autem erat quòd quum dextergeret partes circa vlcus perfricuit, & perfrigeratus est, & labia statim sunt eleuata. Attenuata est autem cutis, multis locis vlterius ab vlcere, quum autem sectus esset non tardè, neque pus effluxit, neque alleuatus est. Iuxta aurem verò videbatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hac enim parte etiam vlcus erat. Postea & hoc non suppuratum est, & humerus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa vigesimam quartam. Post pleiadum occasum is qui aurem doluit, circa vigesimam diem postea voce destitutus est, & dextrarum partium impotens, sine febre sudauit, dextra auris, dexter oculus, consistebat non valde, & attrahebat quid ex inferna parte. A sinistris autem distortus est oculus grauiter dolens, collum durum factū est, tertia hora posteaquā doluit.

Post pleiadum occasum, seruus Attici à quartana correptus, stupidus sedatus est. Alius eodem tempore vera stupida infania, ex phrenitide ac lethargo mixta, correptus est. Ad coxas & crura venit dolor, quieuit, quoto die haud scio. *Attici seruus.*

C Eodem tempore horridi, vomentes, & post iudicationem cibum auersantes, & biliosi, & splenes magni, duri, dolorosi, & sanguinis eruptiones. Quibusdam verò eodem tempore, post pleiadum occasum, ex naribus sanguis biliosus ob splenes. In Cranone vxorem Nicostrati correptā decimaquarta die, statim occupauit impotentia colli, & aliarū partium, & cibus inclusus fuit vsq; ad decimam. Spiritus densus paruus, impotentia, palpans digitis, delirans, sudores, distracta sunt ad dexteram partem collum, os, oculus, nasus. Vrinarum subsidencia alba, eruum referens, alia alba, alia ramentosa, cū pallore subuirdis, farinam lentium referens. Huic quādoq; velut adiposum quiddam superstabat, atque hoc aceruatum, non multum dispersum, velut quod in medio ipsarū pendere solet disparatū, velut extrinsecus ex ouicula, postea verò etiā

Nicostratus.

Vrinarum varietas.

non

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

non subsidens minge batur, & alia quidē talis erat, alia sub- D
 fidens, alia talis modicē ad latitudinem dispersa, alia cōtur-
 bata, alia talis. Quod in medio vehi solet, nubeculæ subni-
 græ simile, quæ putaretur crassitudinem habere. Laxum autē
 aliud tenue, aliud tenue tale, aliud velut equi, aliud velut
 sunt caliginosa. Qui primus delatus est adolescēs, huic vri-
 na pura tenuis. Omniū secessus tenuis, multus sine bile, lin-
 gua valde aspera. Febris adurēs. insomnis. alius gibbosa. Hic
 mente motus est octaua arbitror die, proteruum in modum.
 exurgebat pugnabat. turpia fortiter loquebatur, quum talis
 non esset. Huic quū vrinæ multæ tenues prodixissent ex sup-
 pressione, somnus obortus est continuus. & sudor, qui iudi-
 catorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa decimam E
 diem. Verū postea rursus insaniit, & breui mortuus est vn-
 decima die. Occasionem fuisse puto quod meracum multum
 bibisset, priusquam insaniret. Paucos habebat annos, prope-
 modum viginti. Eumenis vxor autumno vomuit bilem
 atrā. Sed & odores manifesti erant, & febres horridæ, & cor-
 dis siue osculi ventris dolores, biliosa pauca vomebat, & lum-
 bricum. Secessus tenues per omne tēpus. Ante pleiadum oc-
 casum desinebant statim sanguinis eruptiones. & breuiorēs
 erant febres ac statim reuertentes breuibus recidiuis, & ci-
 bum auersantes, & velut excocti, & anxij, & cor dolentes, &
 ferini in iudicationibus, & rigore affecti, & biliosi. Adole-
 scens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex naribus mul-
 tus fluxit. itemque quarta ac quinta. Sexta compositē confi- F
 stebat. mente motus est. Septima die alius substitit. Sopor-
 sus erat. Recidiua tertia die. alius eniti cessauit. Vrinam non
 vidi. Circa iudicationē velut debebat. At verò circa pleia-
 dum occasum austrina, & pluuiæ erant. & tunc Adolefcens
 mucosa, subbiliosa, viscosa, multa cremēta egerebat. febris
 vehemens continua. lingua arida. Sexta iudicatus est. Septi-
 ma rursus inuasit, dimisit eadem die cum tremore. auris si-
 nistræ fluxio viscosa, crassa, die sexta. Puero ab vlcere pha-
 gedæna eroso, dentes inferni, & ex supernis ac infernis ante-
 riores, emergebant, cavitatem habebant. Quibus os ex pa-
 lato discedit, his medius confidet nasus. Quibus verò super-
 ni dentes anteriores, his latus est summus nasus. Qui quina-
 tus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices ha-
 bet.

*Eumenis
uxor.*

*Iuuenis al.
et.*

*Puer phage-
danosus
quid tulerit.*

A ber, singulis paribus ad vtrunque vicinum dentem con-
xis, extremitatibus omnibus ad internam partem reflexis.

Circa tertium dentem suppurationes plures quàm iuxta
alios omnes. Et ex naribus fluxiones crassæ, & à temporibus
dolores, ex hoc maximè fiunt. Corroditur hic, maximè quin-
tus, ex medio quidem nodum habebat vnum, duos autè an-
terius. Paruus primus intrinsecus iuxta duos corrodebatur.
Septimus radicem vnā crassā, acutam habebat. Athenadæ
puero masculo doluit à sinistra parte infernus dens, à
dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non
amplius doleret. Post pleiada clemens cœlum, nubilosum,
& caligines: iudicationes quintanæ, & sextanæ ac septima-

Puer athenadæ

B næ. Iam verò etiam diuturniores: febres recidiuantes, &
quandoque erroneæ, & cibum auersantes, & biliosæ: & dy-
sentericæ cibum fastidientes, febriculosæ. Circa pleiadum
occasum, austrina fortiter erant, sanguinis eruptiones: & fe-
bres tertianæ naturam referentes, & lenes. Qui in sutrina
decumbebat, sanguinem abundè biliosum è naribus effudit.
Secessus modicus: iudicatus est septima cum rigore. Seruus
in extrema caupona, quarta die sanguine è naribus effudit.
multa statim nugabatur: alius renitebatur. Præcordium do-
lorosum, durum. Ad subditam glandem sexta die subierunt
mala, cū pallore viridia. Septima mane iactatio: clamor mul-
tus: venarum pulsiones circa vmbilicum. In acutissimis fe-
bribus pulsus densissimi, & maximī. Quale est ad vesperam

*Quæ paten-
tentur hi.*

C exacerbati, tale erat in omni morbo. Cæterum ad princi-
pia, considerandæ sunt etiam exacerbationes, & an citius re-
deant, & continuitas, & anni tempus. Post pleiadum occa-
sum, austrina. Quæ quinta die iudicabantur, intermissa vna
repetebant. At verò laxa, pustulosa erant, velut Acanthio
Lapytō. Circa pleiadum occasum, subscabra, & aspera erāt
pruriginosa, nullas lachrymas emittentia: & magis quidem
hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. Hæc erant in
Pythodori vxore, & Capelio, cum febre, sub cuius initium
ferè Pythodori vxori coxæ impotentes: Post pleiadam oc-
casum horrores: sanguinis è naribus eruptiones. Sutor qui-
dam septima iudicatus est, vna intermissa, altera redijt.
Rursus quarta iudicatus est. Alius ex his qui à Leocyde ve-
nerant, septima iudicatus est. Alius quarta. Moschus dona-

*Quæ consi-
deranda.*

*Acanthio
Lapyto.*

*Pythoda-
rus.*

Sutor

*Glaucius
nomine.*

Moschus.

Largus

HIPPOCRATIS LIBER III.

*Tuberculi
auris.*

*Equo lapsus
pudulent
Tenedia.*

*Terramotus.
Antigenis
uxor.
Apemanti
uxor.*

Largus sanguis ex sinistra, modicus è dextra nare. Ad decimam quartam ad iudicationem, si quatenus debebant ab initio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decima septima fiebant. Circa aurem in dextra parte tuberculum, paruum intus durum, foris paruum laxum, dolorosum, nihil remittens, decimanona noctu factum est. Valde biliosis suppurationis, purgatio sepius atramento maxime similis. Qui cucurbitam affixit, cum in coxa esset dolor, huic ad crus deorsum venit, & melius habuit. Qui in ceramico ab equo lapsus est cui non statim cucurbita affixa est: vltus est intro, & vigesima die recrudit malum: sanguinis eruptiones fæculentæ, & erodentes. Tenedia quarta die abortiuit, masculum triginta dierum: alius liquida, tenuia, egeffit: lingua combusta fuit: iudicatio quarta die. Post pleiadum occasum lienosa, vsque ad quintum diem fluebant: iudicata sunt. Cuidam se prima die vrina velut erui lotura, similis ipsa sibi ipsi. postea pura recidiua. Intermitit etiam Megasis filio, verum sanguis non fluxit. Vrina velut Antigenis alba, crassa, similis. Circa solstitium hybernum, sydus non paruum, quinta & sexta postea terramotus. Quæ in Perintho morabatur anhelosa, Antigenis vxor, quæ non sciebat an prægnans esset, menses comparentes rubri. Venter aliàs atque aliàs paruus, aliàs magnus. Tusiens semper, velut si celerius iter perfecisset. Mensis erat octauus, sedata est prius febricitans. Apemanti fratris vxor, septima die abortiuit fœmellam velut dixit sexaginta dierum. Circa nonam turbata est. post iudicationem, dexteram partem dolebat, velut à recidiua. Hæc & concipiebat citò, & perdebat. Alia quædam in albis mensibus filiam peperit. Alia in rubris, velut conueniebat. Horridi, anxij, cibum auersantes, recidiuantes, biliosi, sanguine manantes, subsplenici, doloroso modo plurimi ex sinistris affecti. Apemanti vxori hac parte oculus distortus est dexter, ad alteram verò partem lateris mollitudo. Aristophonis filia tertia & quinta febricitauit: sicca plerumque perseuerauit. Venter tamen huic turbatus: ægrè iudicatio fiebat. vltra triginta dies cessauit. Pustulæ ex lassitudinibus non valde fortibus, perueniunt ad septimam liuidæ. Rigor ancillæ retrò Heroum obortus est. At verò albæ magnæ, neque ipsæ valde bonæ, graui sopore pressorum, & somnolentorum

A torum:& nō confidentium,& bile renitente:& siue lubrica, siue dura fuerit aluus, non confidentes. Zoili fabri pulsus *Zoilus.* Vrina & alui secessus moderatē decolor: pectinis distentio vtrinque in directum, vsq; ad vmbilicum, cum febre acuta: cibum auersans, siticulosus. Filia ædilis apud Tecomæum, quum obscurum esset ipsi quod vterum gesta- *Tecomæus* ret, secundi mensis initio erupit vomitus pituitosus, aliquando verò biliosus: difficulter peperit: perfectē purgata est. Vomitus similiter vsq; ad trigessimam diem perseuerauit: postea venter turbatus est, & vomitus cessauit. Lienteria, menses non prodibant per duos annos hyeme habuit hæmorrhoidas.

Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio *Cecrops.* prodibant, subscæculenta, edulia ex sanguine confecta colore referentia, ea ex spumosis bile abunde coloratis viridia erāt. Qui asinum ex pacto eleuauit, statim febricitauit. Tertia & quarta, & quinta, & septima, & octaua sanguis erupit: iudicatus est: aluus lubrica. Vir metallicus, præcordium dextrum intentum, splen magnus: aluus intenta, subdura, spirituosus, decolor. Huic ad genu sinistrum: recidiua. per totum iudicatus est. Temenæ filius habebat quid spiritus, vt viridantis palloris esset, ad dorsum: ad manus viridantis palloris. *Temenæ filius.*

Maritus Lechus puerperæ apud Sitodochum, arquato morbo infestatus, ad quem septima die ingressus sum, octaua moriebatur, neque mingens, neque egerens. Præcordia magna & dura, & spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectauit præ dolore. Huius vxor eiecit foemel- *C* lam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc à principio quidem pedum dolor tenebat. Desinente verò febre, spiritus non est solutus, sed intus relictus: dolor ad manus & brachium. Recidiua per lōgissimum tempus corripuit eos quibus vrina: ante iudicationem suppressæ fuerant. Quæ erat apud Temenen ipsius soror, cum rigore iudicata est. Quum autem viridans pallor citò desineret, manus & humeri doluerunt: horum autem cessante dolore, caput: oculorum palpebræ supernæ eleuatæ sunt, & lachrymæ profuebant: reliqua non noui. Iudicata est primū septima die. Menandri vinitor similiter, verū aluus ab initio tenuia egerebat: postea suppressa est, itemque vrina iudicata est, nō riguit, septima die: quoniam aluus antea turbata fuit. *Menander.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Potamonis
filius.
Hegesistratio
iuxta.*

Potamonis filio aluus non egerebat septima die: duobus diebus ante iudicationem rigit, quapropter neque vrina supprimebatur. Dens Hegesistratio, cui suppuratio iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum: & rursus sanatus est oculus: & secundum nares pus descendit crassum. Iuxta gingiuam carunculæ parvæ rotundæ abscesserunt. Huic circa tertiam diem suppuratio affutura putabatur: postea auerrebatur. Derepentè verò intumuit maxilla, & oculi. Quibus abscessus ad oculos in febribus ardentibus, hi maxillas rubent, & sanguinem ex naribus fundunt. Sed & quibus ad aures fiunt. Fortassis autem & abscessus ad articulos magis, non tamen clarè noui. Rigores tremulis, præcordij intentio. Menses apparuerunt decima septima, iudicatio fiebat ita perpetuè. Si tamen non sic intus permanississent, iudicabantur tertia: quædam quinta: quædam septima.

*Mulierum
diuersi morbi.*

Hegesistratio postremi duo dentes parte inter se contigua corrodebantur: postremus habebat supra gingiuam duos nodos, vnum iuxta cauernam, alterum ex altera parte. Qua verò parte duo nodi erant, ibi radices latæ similes singulis paribus coincidebant, ad alteram partem medietas vna rotunda. Mulier cui sanguis è naribus erupit quarta & sexta. Septima iudicata est, rubicunda erat.

*Temena
uxor.*

Mulier ex capite fortiter grauata, iudicatio facta est circa vigesimam. Vigesima præcordia æstuosa. Septima die non valde sanguis è naribus erupit. Secessus tenues: ad oculum dextrum circa octauam. Viro eadem, verum septima iudicatus est. Sublienosus è sinistra parte. Huic octogesima die, & diuturniores oculi affectiones: fortassis quoniam post iudicationem, & quia multæ. Vxor Temenæ spirituosa præcordia, & intenta. Menses per tempus apparuerunt. An verò etiam prægnans fuerit, haud scio, aluus primùm suppressa, & tunc vomebat: postea non amplius. aluus enim multa viscosa ac biliosa egerebat: præcordium non impediēbat. Vndecima ad magnum dextræ digitum inflammatio: alui egestio etiam penitus procedebat. Quibus contingentibus, melius habebat. Nam & in somnū delatio minor erat, & febris: & quodammodo facilius spirabat, quoniam supra malum vomitum, vomuerat. Decima sexta sensum factus est spiritus densus, & febris: mortua erat.

- A** Hęc febricitauit ante abscessum. Septima post abscessum periit. Erat & hęc rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti sororis, præcordia magna & splen, spiritus, secessus *Apemanti sororis fiaman bilis, aliquantulo stercore ammixto, lassus ex operibus.* Xigesima die ad pedes, & iudicatio certè lassis ad articulos, non ad oculum, præcordia verò erant intenta, & sanè erat etiam tussicula quædam modicè sicca. Quæ relinquuntur post iudicationem recidiuam faciunt. & in ipsis morbis quæ excernuntur, sputum præmaturum, alui secessus, in-temperies, & similia. Apemantus cui dolores in sede, in *Apemantus.* dextri lateris mollitudine, & iuxta vmbilicum paulò inferius, & è dextra parte: ante dolorem vrinam cruentam min-gebat, desijt tertia die. Et faber in altera parte, ex eadem *Vrina cruenta.* in directum, & hic quoque vrinam cruentam eiciebat. Quæ vbi cessasset, ambo subsidantias in vrinis habebant, & hoc tertia die. Apemantus autem plurimùm fouebatur. Alter verò non sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicostrato ac-*Nicostratus.* cidit aliquid iuxta vltimas partes à dextris, inferiùs quàm quibus in sinistris, longè verò subter lateris mollitudinem, vsque ad vmbilicum vtrisque. Anicula apud Sosileum al-*Anus.* ba pituita referta: Tibiæ duris tumoribus, albis, laxis, item-que penis, verùm minus. Erant autè & in partibus infra fe-mora, etiam si plerisque difficilis huc exitus patet: imo & in lumbis. & venter tenuis erat, præcordia submollia, spirituo-sa non valde. Erat autem desinentibus plurimis, etiam alia
- C** cura vbi glauci facti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulò moderatior erat. Coxæ verò ac cruris affectio-nes vterinæ erant, quum dolores esse putarentur. Apposito enim ac subditio medicamento odorato, ex farina & vn-guento, contigit vt breui discuterentur ac desinerent. Tem-pus autem abscessus ad oculum, annus. Circumcirca durus fuit, cui etià pustulæ non perfectè contabuerunt. Sunt autem & à disquamatis talla. Seruus in Hippolochi villa, cui in *Hippolochus.* præcordijs vtrinque quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulū habens infernè, qualis erat in fabri ferrarij vxore hydropica: Cui tenuia recrementa progressa partem ali-quam euacuauerunt. Erat autem & hoc ipsum ad dextrū pla-num quiddam, supra ea quæ circumferentiā habent eleuatū. Huic vmbilicus ex natiuitate denigratus erat, & vlcus pro-

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

fundum fiebat, & umbilicus non valde cicatricem contrahebat, & pudendum summa parte denudatum erat, quum non statim tale fuisset, neq; connatū, & adhuc magis fiebat. Hic plurimum vomebat, febris, cibi fastidiū, sanatus est. Verūm circa septimam à decubitu diem (nam & antea ægrotarat) aquam multā bibens, & fortassis aliter contemnens, iactabatur & aliquantulum conuellebatur. Desinente autē conuulsione, circa animaduersionem extinctus est. Antē hoc verō urinam acruatam minxit, & status cum crepitu prodierunt, & supernæ partes minimē sunt euacuatae. Quum autē mortuus esset, statim etiam & illæ fortiter emollitæ sunt, & reliquæ rubefactæ sunt, velut à flagris per totum corpus, excepta ea parte vbi tumor ille maximē eleuatus erat, & multū quoque calidus erat. Cuidam verō in Abderis deorsum erupit. Cuidam autem anteriore parte intumescere sine febre. Tumor ad contactum suppurato similis erat. Famulæ anhelosæ, quum vasa menstruum sanguinem funderent, anhelationes illæ cessabant: febris fiebat, mamma sinistra superne suppurata est, & ab initio etiam auris. Olympiodori famulæ sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad vigesimam, quemadmodum etiam febricitatibus, & secessus quales etiā æstate populariter grassati sunt, & quales Hipponactis. Hyle famula Aristidis octaua die in pharmacorū purgatione, infernē signa habuit, qualia facile ferunt, & si non præter rationem debilitantur, & neque spumosa, neque sub-

Famula anhelosa.

Olympiodorus.

Hyle angilæ.

Heraclida uxor.

Bulagoræ uilla.

Lachryma salsa.

Puerorum uitæ.

Fullo quid tulerit.

sanguinolēta, sed qualia sunt oua, velut Heraclidæ uxor purgata est multum, & facile tulit. Quæ in Bulagoræ villa depurgata erat, cepit febricitare ex splene. (Qui verō dextrum præcordium habent, non quidem sublime, verū intantum, hi etiam magis rubicundi fiunt) rubicunda quum esset, aluum in principio turbatam habuit, expectabam ad oculum decubitum. Huic septima die falsuginosa lachryma mordax ex oculis prodijt, & secundum nasum, & fauces, & aurem sinistram. Decima quinta sudauit cum rigore, non iudicabatur ante rigorem, pallida facta est valde, & faciei circumtensio ac contractio. Aurem ē directo splenis ac lateris dolebat. Pueris ventres turbati, & tussis sicca: quandoque ad humerum suppuratio fiebat in tussibus, posterioribus diebus. Fullo collum, caput, septima manus torpida. Nona

A crus torpidum. tussis cessauit. Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in ventre distracta erat ad sinistram partem.

In Cranone Lycino Grāmatico, ex febre biliosa ex splene, capitis grauitas, stridebat secundum pulmonem, in labijs vtrisque vlcera, intus rotunda, parua. postea etiā sanguinis quid ex nare ē directo manauit. Famulæ quam recens emptam vidi, cui duricies in dextris erat magna, non valde dolorosa. & venter magnus ac circumtensus. non similis hydro-picæ, & aliās pinguis ac mollis. & non valde difficulter spirans, verū decolor. Menses septem annis non prodierant. facta est dysenteria, & non tenesmo tentata. Et sub hęc duricies in dextra dolorosa erat. & febres tenues. & non vltra septem dies etiam aluus turbata est, secessus electrum referēs, subuiscosus, multus ad aliquot dies. Sanata est. & mēses postea prodierunt. & partes secundum ventrem molles fiebant.

& corpus boni coloris ac crassum ipsi erat. Minois vxor ex sectione, pressa ab eam administrantibus durius, marcorem ac corruptionem incidit, malo ad pulmonem deueniente, breui significationem de se dedit quotquot diebus supererat. erat & aliud quiddam intrinsecus. Quæ induntur in nares si febricitarint, si quidem solutus fuerit dolor, crassa per nares effluunt. Si verò neque dolor, neque febris, tenuia:

& fortassis feruida: Veluti tenue quidem Hegesippo, quum ad noctē quid indidisset. Crassum verò illi in Corintho eunucho simili, Celeuris filio erat. Maturi in morbis abscessus an iudicent signum est, si dum feruida sunt mala, non febricitarint: & dum molesta sunt, facile portarint: Velut quæ in sede acciderunt Charoni. Leambio verò quū intestinum vlcerosum esse putaretur, in dysenteria pharmacis curato, humerus & sedes vlcerata sunt in sinistra parte, citra febrē.

Cui à flatibus laterum mollitudo eleuabatur, & aliquantulum dolebat, huic quū lac vberius & meracius bibisset, & insuper dormisset, statim nausea & calor accedebat. Deinde ignem incēdenti, & pro cibis farinā crassiorem in craticula coctā comedenti, aluus substitit. & purulentum tamen quiddam egressit. Quum autem sedes esset inflāmata, sine febre & sine dolore sufficienter erat. hoc assero. Senex in lapideis vestibulis, lumbos doluit, & ambo crura, & vtrique dolores descendebāt ad femora, & quandoque tibias, & aliquādo ad

Lycinus

Grammaticus

cui.

Famula

quædam.

Minois

uxor.

Hegesippo

pus.

Celeuris

filius.

Charon.

Leambius.

Senis morbo

bus.

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

genua. & quum diutissimè durarent, recursiones multæ fie-
bant. tumor in pedibus, lumbis, tibia. breues inguinū tumo-
res. venter durus. & totus pecten intensus ac dolorosus. Ple-
runque compertus est etiam vesicam durā habere ac doloro-
sam. & papularum eruptiones, & calores oculis, auribus, nari-
bus, manu. Iudicationes, & alia per quæ cognoscimus de ipso
agro, an sudet, aut tangat, aut aliquid olfecerit, aut gustaue-
rit, itemque alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, venæ, nerui,
musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & à sanguine visce-
ra, venter, bilis, alij humores, articuli. & postea an doluerit iu-
xta aurem, iuxta ipsam collectum tuberculum, glandulā non
attingens, os non suppurans, & hoc disparuit, & tunc statim
febricitauit. Pulsus, tremores, cōuulsiones, singultus, circum-
spiratio, secessus, per quæ cognoscimus. Suppuratis oculis,
& dum erumpunt, vlcera magna fiunt, & dum secantur, pro-
funda. et vtroque modo oculi vlcérantur. Aristes ex pago
Amphilochi quarta die mente motus est. aluus subuiridia
egerebat, et somni salubres. albicantis coloris. Quibusdam
ab initio subtreml digiti, et labia vbi loquerētur, itidemq;
aliae partes: et proteruē lingua citiore ac volubiliore prædi-
ti: his rubor in facie maximè erat. Hi ebriosi erant, aut vo-
mitu commodè vsi intumescabant. Qui iuxta Medosadæ
ædes habitabat, cui tenuia, nō biliosa, aquosa, multa, per se-
cessum prodibant. præcordium cedens et gibbosum. soporo-
sus fiebat. Circa decimamquartā ad iudicationem maximè
progresso, rigor sine tremore. dissolutio. resolutio. contra-
ctio secessus et egestionis. soporosus. mente motus. ex somno
non inaniit. iudicatus est circa decimamquartam. nihil è iu-
dicantibus contrarium. Alius similiter in principijs seces-
sus subuiscosi, ex quibus quod crassum est iudicatorium est.
insomnis. postea subuiscosi, subbiliosi, maturi, biliosi, nō te-
nues: qui vbi compacti fieri cœpissent. iudicationes celeres.
Præcordium intentū apparuit inflammanti, aut venarum in-
tentarū modo, circa sextā. Postea dormiuit septima. iudica-
tus est circa nonā, albicantis colore ambo, non fului. Quum
secessus aquosi sub dio expositi essent, supernè leues, tenues,
ifatidi valde similes fuerūt: infernè verò subsidetiā habebāt.
Quibus in dextris disientio submollis, phrenitici sunt: si
nō soluaturs febre desinēte. Quibus autē à mollitudine ven-
tris in

*Quæ obser-
uantur.*

Aristes.

- A** tris in hac ipsa febre, quiddam collectum aut durum, dolore sum fit, & valde malignum diffundi nō potest, ex talibus fortassis suppurantur. In dextris tumores eleuati, si quidem si quis plurimū ac maximē premat, submurmurant, non valde maligni putandi sunt. Velut in dextris illi qui ex Amphilocho pago erat, & ei qui iuxta Medosade edes habitabat. Hi soporosi erant, & in somnis mente moti. Constitutiones quales in quibus temporibus ac regionibus magis & minus fiunt. Vigores morborum, & ad iudicationem, & quotidie. & an citius fiant aut serius, tertia quarta, circuitu. & in quibus circuitibus iudicantia, tumētia, cruenta, & non. Quibus abscessibus recidiuæ fiant, venæ temporum, & cōtractiones, &
- B** colorum mutationes ante iudicationes, ex rubro ad viridem ac pallidum, si non iudicent. & cutis circuntensiones absque iudicatione. & oculorum contractio, corporis duritia sicca. Qui quidem volentes lachrymantur, nō malum est. Quibus autem inuitis lachrymæ profluunt, malum. Quibus in dentibus circūcirca viscosa fiunt, malum est subhiare ac fixis oculis intendere. Qui in tibia vlcus habebat, & Attico vsus est, huic pustulæ eleuata, rubræ magnæ: atque hoc pro tussi quæ postea accessit, prius enim nō tussijt. In Aeno quicunque capite vulnerati horridi erāt, maligni & suppurati ex tenebmo, ex peregrinatione ac itinere dolor pedum, & inurbationibus lassitudines. Clinia cibū auersans, colliquescēs, purulentum, aliquando parum cruentum, purulentum tumidum eiecit. *Hippeæ* vxor hidropica, quæ etiam per tres annos vere incipiēte tussijt, amplius autem suppurata est, ad hyemem aquosa facta est, ab illis autē pharmacis curata melius habuit. Mortua est ancilla. Ex tussietibus qui manibus laborabant, velut seruus ille qui sarmēta obtorquebat, & Amyntæ filius, ambo sola aextra resoluti cessauerunt, quando quidem perpessi sunt hoc tussientes. *Qui tussit manus agitant.* Qui verò aut equitarūt, aut iter fecerunt, in lumbis ac femoribus resoluti sunt. Plurimæ verò tusses siccæ erant: Sin minus violente sanē.
- Vxor Emmyris modo non morbofo, absque febre, stupida esse videbatur. postea ad tremorem totius corporis res ipsa deuenit, & ad colliquationem, & cibi fastidium ac sitim, & frigida erat. Nyctalopes qui plurimam minxissent postea parum quiddam mingebant. Verum tussientes & insuper

*Hippeæ
uxor.*

*Qui tussit
manus agitant.*

*Vxor Em
myris.*

*Nyctalop
es.*

HIPPOCRATIS LIBER IIII.

*Emmyris
filia.*

febrientes tubercula ad aures habebant, erumpentia circa se D
ptimam aut octauam diem. Emmyris filia febricitabat, &
ex aure purulentum fluebat, circa octauam, aut pro comper-
to habeo. Quibusdam, verò etiam dens corrosus fuit, tertius
maximè ex supernis. Præ omnibus autem hic reperitur cor-
rosus. ad hunc dolor, & quibusdam etiam circumsuppuratio.
~~Quibus verò ad aures, hi magis tussiebant quàm illi.~~ Qui-
bus autem cum febribus ad suppurationem, septima recedit.
Cuidam postquam exacerbatus fuit, præcordium solutum
non est. alio autem emollita, inerant pauca subuiscosa, com-
pacta, non bona vrina cruenti coloris. spuebat autem sputum
~~spumofum.~~ Ille ad quem Cynicus me induxit, septima exa-
cerbatus est. circa decimam quartam iudicatus est. Disparen-
tia, mala sunt. purus fauces. pauca, lata, matura expuens. ex na-
ribus parum sanguinis stillauit. capite grauatus erat. Manuū
ac pedum dissolutio. aluus soluta profuit. pedes semper cali-
di. somni aderant ipsi, & iuxta aurem non extuberabat, quo-
niam matura spuisset.

*Demarati
coniux.
Senex cum
uxore.*

Demarathi vxor, pedes etiam in hor-
roribus callidi: siue ad suppurationem, siue non tendebat, pe-
rijt. Senex qui è vita decessit, ægrotabat simul cum vxore
sua, furiosum quiddā in se habebat. Postea verò vbi prodijf-
set, ab ipso lumbricus subcrassus, & modicus cibus, statim se-
datus, & dormiuit, & sanus erat hic senex, & corporis cutis
circūtenso. extremæ partes frigidæ, mollis, tremulus ab ini-
tio & labijs, & manibus, & voce, mente motus est, moderatè
hiabat, ac fixis oculis intendebat. non valde difficulter spira-
bat. diebus haud scio quot ultra viginti mortuus est. Qui-
busdam præcordia & aluus subegesserunt compressa, acerua-
tim, non cum murmuratione, velut in Abderis vermium spe-
ciem præ se ferentia. Quicquid contingit priore iudicato-
rios dies præcedente die, & mala & bona signa fiunt in die-
bus, quibus qui exacerbatur diuturniores fiunt: & quibus de-
finentes remorantur. Quædam non fideliter alleuabant, &
quædam per seipsa exacerbabantur. Sputa peripneumonicis
quibusdam biliosa, quum desinere volunt. Valde flaua bre-
uia fiunt. Si qualia sunt quæ in principijs adsunt, talia postea
appareant, hæc non valde concoqui puto: sed iudicare velut
ei qui apud præceptorem erat, & velut aliàs quoq; vidi. Ni-
cippus in febribus per somnum semē effudit: & nihil ad pe-
ius

Nicippus.

A ius processit. & hoc ipsum sæpe ipsi factum est, & nihil læsit. Prædictum est ipsi id desitum, postquam febres iudicatæ forent. & sic factum est. Critias in febribus ab insomnijs vexabatur quæ nouimus, & cessauit etiã ipse eadem somnare vnà cum iudicatione. Alcippus quũ haberet hæmorrhoidas, à curatione prohibebatur. Curatus insaniit. febre acuta succedente cessauit. In febribus acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut etiã à seipsis abstinētes, multũ sibi bibere posse vidētur: his aqua frigida data vt reuomāt, prodest. Biliofa enim aderūt. Quod nerui ipsi in seipsos trahunt, signũ est. Si quidẽ enim nerui in supernis manus sauciati fuerint, manus deorsum nutabit. dũ ab infernis neruis trahitur. Si verò contrà, vice versa. Tussient sicci tussim, qui testes affectos habēt. & ex tussi vena secta, ad testẽ solutio sit, & inflāmati tussiuūt. & in febribus ex inguinum tumoribus insuper tussiuunt.

*Critias.**Alcippus*

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS PO

PVLARIBVS, LIBER V.

ME

C

N Helide Olitoris vxor. febris corripuit ipsam acuta. & medicamenta bibens nihil sentiebat opis. In ventre infra vmbilicum erat quid durum, & altius altero, & dolores exhibebat fortes. Huc enim manibus cum oleo fortiter compressum ac emollitum est. & postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata est, & vixit. In Helide Timocrates amplius bibit. Insaniens autẽ ab atra bile, bibit pharmacũ, hic purgatus est, purgatio multã pituitã ac bilem atrã egerebat per diẽ. & ad vespẽrã purgatio cessauit, & dolorem pertulit in purgatione multũ. & quum

*Olitoris m-
xor.**Timocra-
tes.*

HIPPOCRATIS LIBER V.

polētā bibisset, somnus ipsum corripuit, & tenuit per noctē, donec sol oriretur. In somno autē præsensibus nihil respirare videbatur, sed mortuus esse. & neq; quid diceretur, neque quid fieret, sentiebat. Extentū autem fuit corpus & rigidum.

Scophus.

Scophus.

Verū viuebat, & excitatus est. Scōphus in Oeniadis pleuritide correptus, mortuus est septima delirus. Pharmacum autem bibit infra purgās. priore ante potionē die mētis cōpos erat, & purgatus est non multū. quum autē purgaretur, delirauit. Phœnici in Oeniadis & Andreæ fratribus maxilla altera intumuit, & labium quod est ante maxillā & oculum. & neq; intrinsecus quicquā spectātī apparebat, neq; forinsecus suppurabat. Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter eadem perpeffus est. Mortuus est autem alter septima die, & pharmacū bibit, & nihil profuit. Verum Phœnici circulus putridus exfectus est. & vlcus purgatum est magna ex parte priusquā moreret. Mortuus est autē & hic, vbi diutius vixisset.

Euridamus.

mus.

Euridamus in Oeniadis, in peripneumonia decima die incœpit delirare. curatus ad mentem redijt, & sputa erant puriora, & morbus ad melius procedebat, & somno multo perfusus est. & oculi morbum regium contrahebant. & mortuus est ad viginti dies.

In Oeniadis vir quidā morbo tenebatur, quum sine cibo esset, fortiter in ventre ipsius fugebat, & dolebat. & quum edisset ac cibi cōtriti essent, tempusq; post cibi esum accessisset, non longē postea idem hoc patiebatur. & tabescebat corpus ac consumebatur. & alimentum ipsi nō contingebat à ciborum esu. & per aluum secedebat cib' prauus & cōbustus. Quum verò recens cibum accepisset, eo ipso tempore minimē fugebat. neq; dolor aderat. Hic omnis generis pharmaca bibens sursum ac deorsum purgantia, nihil opis sentiebat. Vbi verò vena ipsi secta esset, in vtraq; manū, donec exanguis redderetur, postea vtilitatē percepit, & a malo liberatus est. Eupolemus in Oeniadis, dolebat coxā dexteram, & inguē, & cōmissuram propinquā ad coxā, ab inguine & coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est à talo, multus valde, & niger, ac crassus. & pharmacum bibit aluum deorsum purgās, & multum purgatus est. & melius quidē habebat, dolores autē non remittebāt. Sed suppuratā habebat, & coxā, & commissurā in ipsa ad sedē, & partem circa inguē, quibus locis etiā amplius dolebat. Pus autem ad os magis fiebat,

1. in 1. lib. 5. m.

Eupole-

mus.

A bat, quā ad carnē, in profundo, & per tempus sic habens negligebat, donec valde debilis fiebat. postea crustæ ipsi inuistæ sunt, valde multæ & magnæ, ac inter se propinquæ. & pus effluxit multū ac crassum. & mortuus est postea paucis diebus, tum præ magnitudine ac multitudine vlcerū, tum ex corporis debilitate. Huic si vna ampla sectio incisa fuisset, & per se actionē pus emissum esset, & si opus fuisset, etiā altera sectio facta esset: Hæc sanē in tēpore si facta fuissent, mihi quidē videtur quod sanatus esset. *Lycon* in Oeniadis, reliqua quidē eadem patiebatur, Verūm dolores etiā ad crus non ita valde progrediebātur, & nō factus est suppuratus, sed sanus multo tempore. Bibebat autem pharmaca. & cucurbitas adhibebat. & venam secabat. Atque his factis melius habere videbatur.

B Homo quidā Athenis prurigine toto corpore vexabatur, maximē autē testibus ac fronte, vexabatur autē valde vehemēter. & cutis crassa erat per totū corpus, & velut lepra aspectu, & ex nulla parte cutē apprehendere potuisset, præ crassitudine. Huic nemo opitulari potuit. Trāsgressus autē ad melum, vbi sunt calidæ balneæ, à pruritu quidē & cutis crassitudine liberatus est, verū hydropicus factus mortuus est. *Atheniensis quidam.* Athēnis virum cholera corripuit, vomebātque & deorsum egerebat, & dolebat: & neq; vomitus, neque per aluum secessus, fisti poterat, & vox ipsum destituebat: & ex lecto moueri non poterat: & oculi caliginosi ac caui erāt, & cōuulsiones tenebāt ab aluo, & intestino, & singultus. Verū secessus multo copiosior erat quā vomitus. Hic veratrū in lentium succo bibit, &

C alterum lentium succū insuper bibit, quātum potuit, & postea vomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo. frigidus autem factus est. & lauabat infernē vsque ad pudenda, calida valde multa, donec etiam supernæ partes calefactæ sunt. & viuebat. postera verò die, polentam bibit ex aqua. In Larissa vxori Gorgiæ menses suppressi erant per annos quatuor, præter valde modicos. Verū in vtero, ad quācunq; partem se inclinasset, pulsus exhibebāt ac grauitatem. Hæc mulier concepit & peperit, & puella viua nono mense edita est, vlcus habens in coxa. & secundæ consequentes, ac sanguinis fluxus valde multus, successerūt. postridie, & tertia die, ac quarta, etiam grumi sanguinis concreti. & febris tenebat vsq; ad decem primos dies. & de cætero prodijt ipsi sanguis ruber,

& facies

Atheniensis quidam.

Melos insula.

Atheniensis alter.

Gorgiæ cōiunx.

Partus cū ulcere in coxendice nono mense editus.

HIPPOCRATIS LIBER V.

& facies fortiter intumescibat, itemque tibiæ, ac pedes am- **D**
 bo, & alterum femur. & cibos non admittebat. Sitim autem
 habebat vehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vi-
 num autem nequaquam. At venter post primum puerū mo-
 dicè emollitus est, valde autem non confidit, sed durior erat.
 dolor autem non aderat. Quadragesima verò die à prima su-
 perfectatio excidit, caruncula quædam. & venter confidit om-
 neque tumores, & fluxio tenuis, ac sanguis olens prodijt,
 & sana euasit. Mulier in pheris caput circumcirca dolebat
 multo tempore, & nemo poterat illi quicquam opis confer-
 re neque dum caput purgaretur. Melius autè habebat, quum
 menses ipsi facile prodibant. Hæc quū caput doleret, ex sub-
 dititijs odoratis ad vterum appositis opem sentiebat, & mo- **E**
 dicè depurgata est. & quum concepisset, dolores caput relin-
 quebāt. Mulier in Larissa prægnans erat. Huic decimo mē-
 se sanguis prodijt multus per quatuordecim dies. Plurimus
 autem tribus diebus ante pueri editionem. Decimaquarta
 excidit ex vtero puer mortuus, habens dextrum brachium
 lateri adnatum, & tertia die noctu e adē hora qua puer, pro-
 dijt secunda, & purgamenta alba. deinde post hæc per tres
 dies ac noctes multa moderatè prodierūt. Postea febris cor-
 ripuit, per duos dies totidemque noctes. & dolebat omnem
 ventrem, & coxas, maximè verò pectinem. In Larissa Hip-
 posthenes peripneumonia apprehensus esse medicis videba-
 tur, erat autem nequaquam. Verū principio luctans in du-
 ro loco cecidit supinus, aduersario ipsi illapso, & lauatus est **F**
 frigida, & coenauit, & grauior factus esse sibi videbatur. Se-
 quenti autè febricitauit, & tussis apprehendit siccor, & spi-
 ritus densus. Quinta die cruentum excreauit, non multum.
 & delirare incipiebat. Quando tussiebat, dolebat pectus &
 dorsum. Sexta autem vbi sternutasset, sanguis fluxit è nari-
 bus, quatuor heminarum mensura. Ad vesperā neque loque-
 batur, neque sentiebat, neque quid fieret, neque quid dice-
 retur. Vndecima mortuus est. Per quinque verò dies, modo
 sapiens erat, modo non. Erat & sine febre. Spiritum autè nul-
 lum recipiebat, neque stertorē habebat. Non enim erat spu-
 rum. Scamandrus in Larissa, & in coxa marcorem habuit,
 & in osse diu disparato. Ipse verò sectus est sectione magna,
 etiam ad os ipsum, & postea vltus est & tunc die duodecima
 post

Pheræ.

*Mulier
Larissa de-
cimo mense
abortia.*

*Hippost-
henes.*

*Scaman-
drus.*

A post sectionem coepit conuulsio, & valde obtinuit, conuellebatur autem crus hoc vsque ad costas, & ad aliam quoq; partem coūulsio progrediebatur, flectebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra mouebat, & maxillæ compactæ riguerunt. Hic mortuus est coūulsus octaua die post conuulsionis inuasionem. Curabatur autem tepesfactorijs vtriculis, & fomentis erui, per totum corpus, & infusum per clysterem immissum est, & tunc modicum stercoreis prodijt, & pharmacum bilem abunde purgans bibit, ac insuper catapotium deglutiuit, & secessit quidem, nihil autem à catapotio opis sensit, & somnus modicus venit, & rursus pharmacū idem fortè ad vesperam bibit, ac sole emergere mortuus est. Videbatur autem muldò tempore morbū ferre potuisse, nisi ex phar-

B maci vi perijsset. Equiso Palamedis in Larissa vndecim annorum, percussus est in frontem suprà oculum dextrum, ab equo: & videbatur os non sanū esse, & exiliebat ex ipso modicus sanguis, & sectus est sectione magna vsq; ad secundam laminam, & curabatur sic habens ipsum os, quòd etiā antea statim os peperit. Vigesima tumor coepit circa autem, & febris & rigor, & in die magis intumescere ac dolebat tumor, & ab initio febricitauit ex rigore, & oculi intumuerūt, & frons, & tota facies. Patiebatur autē hæc in dextra magis capitis parte. Progressus est autem tumor etiā ad sinistram, nihil tamen hic læsit. Demum febris continua corripiebat. Atque hæc minora erant, vsq; ad octauam diem. Vixit autem

*Palamedis
equiso.*

C vltus, & per catapotium purgatus, & cataplasmate tumori imposito. At verò vlcus nullius mali causa erat. In Larissa Theophorbi filius vesicam scabiosam habebat, & viscosam vrinam mingebat, & dolebat dum & inciperet mingere, & dum desineret, & confricabat pudendum. Hic quum bibisset pharmacum vrinam ciens acre, in vesicā quidem nihil processit, verū multum purulentū & bilem euomit, & deorsum alia huiusmodi egerebat, & ventrē dolebat, & intrinsecus ardebat. Reliquum verò corpus frigidum erat, & totus resolutus est, & nihil assumere volebat. Huic exulceratus est venter fortiter valde, à vi medicamenti, & mortuus est tertia post potionem die. Vxor Antimachi in Larissa, prægnans erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tēpore præfastidio à cibo abstinebat, & per septem dies vterum dolebat,

*Theophor-
bi filius.*

*et venter a
vulso ex mē-
tus
Antima-
chi vxor.*

& cor.

HIPPOCRATIS LIBER V.

& cor. & febris corripiebat. eo tempore nihil per aliuū ege-
 rebat. huic datum est catapotium deorsum purgans fortius,
 quā cōueniebat, & euomuit bilem cōbustam præ cibi ab-
 stinentia & febre. Nam neque vllō potu utebatur, euomuit
 autem paucā violenter, & gumosa. & vbi cōcitata fuisset, ac
 ipsam emisisset, debilis esse videbatur. & nō volebat aquam
 bibens euomere. Postea verò dolor fortis tenebat infernum
ventrem: exulceratus enim erat à medicamento, & prodibat
 ipsi statim post stercus, subcruentū ramentosum. Semper au-
 tem amplior fiebat & debilitas, & cibi fastidiū: & purgamen-
 ti erant heminae quinque. Siscebantur autē aluus, aqua multa
 super ventrē affusa, aliud autē nihil potuit admittere. Mor-
 tua est circa mediam noctem. Videbatur viuere potuisse, si
 aquā bibere potuisset, ac statim vomere priusquā degluti-
 uisset. *Onesidemi* in Larissa, vlcera est aluum &
 intestinum, à bile sponte cōmota. & prodibat sursum ac de-
 orsum bilis & sanguis. & febris tenebat. Huic debili datum
 est pharmacū deorsum purgans in potu, debile, aquosum, ac
 modicū. & vomuit ab ipso multum. & infrā ampliū subiit.
 & vesperti redijt. Postridie febris erat, sed debilis. Aluus autē
 vlcerebatur, & adhuc eadem egerebat. Tertia die ad vespērā
 mortua est, quū febris valde fortis ipsam corripuisset. Qua-
 propter omnino moritura esse videbatur. Minime verò ideo
 quòd aquam frigidam biberat, donec vomitus tenebat. Post-
 quā autem perfrigeratus est supernus venter, depurgatus
 per aquam, succo frigido postea potō, sic postea infusum per
 clysterem immissum est. *Eudemus* in Larissa, hæmorrhoi-
 das habēs fortes, ac diuturnas, quum exanguis esset, bilis cō-
 mota est, sed leniter in corpore. & aluus turbata deorsum bi-
 liosa egerebat, & hæmorrhoides intumescabant. Pharmaco
 deorsum purgante potō, probè depurgatus est, & rursus bibit
 succum, & ampliū aluus turbata est, & dolor ad præcordia
 consistebat. Huic quum venter non probè haberet, sed adhuc
 curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt.
 & vomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, &
 non dimisit antequā occideret. Quandoque etiam quum
 rigor subrepens dimisisset, febris venit: & prodijt ipsi bilis &
 flatus, & partim prodibat, partim intus erat. & dolor in ven-
 tre. Hæmorrhoides autem extra intestinū rectum erant, re-
 liquo

*Onesidemi
 famula.*

Eudemus.

A liquo tempore à purgationibus auspicatè: & flatus per ipsas prodibat, & ad sternutationem principium fiebat. In Larissa vir quidam sauciatus est cominus ex manu per hastam latam à tergo, & summum eius penetrauit infra vmbilicum per multū spatium, quod liuidum erat & tumidum: postquā autem vulneratus fuit, dolor obtinebat primū fortis, & venter intumescerebat. Huic postridie datum est pharmacum deorsum purgās, & egeffit modicum cruētum, & mortuus est. Videbantur intestina huius non esse sana, & venter sanguine plenus esse. *Percussus hasta moritur.* Apellæus Larissæus ætatem habebat annorum circiter triginta, aut parum aberat. Corripiebatur autē morbo, à quo vexabatur noctu magis in somno, quā interdiu. Aegrotabat autem ad duos annos ante mortem. Vomebat bilem saluam aliquando vbi excitatus esset. Vomebat etiam nigrā. Hic purgatione à capite forti valde ad multum tempus purgabatur: & cū pharmacum bis bibisset, sex menses ipsum penetrauit. Erat valde vorax multi cibi: & cū corpus haberet biliosum, multum luctatus, valde riguit: & febris corripuit, ac morbus ad noctē: postridie sanus esse sibi videbatur, & rursus altera die. Sequēti verò nocte morbus inuasit coenatum à primo somno, & per noctē ac diem, & vsq; ad coenam tenebat. Mortuus est priusquam resipisceret.

Conuellebatur primū circa dextras partes, faciemq; ac reliquum corpus: postea in sinistris: & quum videretur quietus esse, soporem habebat ac stertebat: & rursus succedebat morbus. *Eumelus.* **C** Eumelus Larissæus rigida habuit crura, & manus, & maxillas, & non poterat neque extendere, neq; flectere, si non alius flecteret ac extenderet. Et neque maxillas diducere poterat, si non alius diduceret. Aliud verò nihil neque dolebat, neque edebat, nisi mazam, & aquam mulsam bibeat. Vigesima die sedens caput supinus. & caput ad lapidem vehementer offendit, & vertigo ipsi caliginosa offusa est, & paulò post surgens, sanus erat: & soluta erant omnia, præterquam post somnum vbi excitaretur, articuli modicè ligati erant. Erat autem duodecim aut tredecim iam annorum. & ægrotauit mēsis tribus aut quatuor. In Larissa virgo quæ sanguinem vomuit non multum, suppurata facta, febribus corripientibus, non liberabatur priusquam moreretur. *Virgo Larissæa.* Mortua est tertio mense. Ante mortem verò obsurduerunt ei aures.

HIPPOCRATIS LIBER V.

*Dyseridis
serua.*

res & non audiebat, nisi quisvalde exclamasset. Verum ante D sanguinis vomitum debilis erat. Famula Dyseridis in la-
rissa, quum iuuenula esset, vbi venere vteretur, fortiter cir-
cumcirca dolebat. Alias autem sine dolore erat. Concepit au-
tem nunquam. Et quum sexaginta esset annorum dolebat à
meridie, velut ex partu vehementer laboraret. Hæc cū ante
meridiem porrum edisset multum, postquā dolor ipsam cor-
ripuit vehemētissimus: & priores omnes excedens, exurgēs
asperum quiddam in ore vteri deprehendit: postea cū ipsa
animi deliquium incideret, alia mulier immissa manu, ex-
presit lapidem asperū, magnitudine verticilli fusi. Et sana
tunc statim, & postea erat. Maliensi currus onustus indu-

*Maliensis
quidam cal
catus curru*

ctus est supra costas, & costas confregit: & per tempus substiti- E
tit ipsi pus infra costas. Vstus sub splenem penicillis ac lina-
mentis vtebatur, & peruenit ad decem menses. Resecta verò
cute, cauerna apparuit ad tenue intestinum vtrinque proce-
dens, & ad rhenem, & ad ossa procedebat putrida. In hoc nō
animaduersum est, quod & corporis habitus biliosus erat, &
in corpore putredo sicca tenuis intestini multa: & aliarum
carnium, quas statim eijcere oportebat, si quis potuisset sic-
co pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nā ab hu-
midis nihil remittebant, sed putrescebant. A linamentis ve-
rò inditis quū humor sisteretur, rigor corripiebat & febris,
& magis putrescebat: affluebat autem isthic putridum quid-
dam, subnigrum, graueolens. Priusquam verò curationis ag-
gressio fieret, quotidie multum foras penetrabat. Erat autē P
nō probè fluidum. Cognitum est naturam morbi esse magis
remotam, quàm subter cutem. Quod si verò etiam omnia re-
ctè facta essent, tamen non videbatur seruari posse, etiamsi

*Autono-
mus capitis
vulnere mo-
rietur.*

ventris profluuium ipsum corripuisset. Autonomus in O-
milo, ex capitis vulnere mortuus est die decimasexta, in me-
dia æstate lapide ex manu ictus, in suturas in medio sincipi-
te. Quare non animaduerti ipsum secari opus habere: dece-
perunt enim me futuræ habentes in seipsis iaculi læsionem,
postea enim conspicuum id fiebat. Primum quidem ad clau-
culam, postea ad latus dolor fortisvalde: & euulsio ad ambas
manus venit. In medio enim capitis ac sincipitis vlcus habe-
bat. Sectus est autē die decimaquinta, & pus prodijt nō mul-
tum. Membrana verò cerebri imputrefacta apparebat. Fa-

*Famula si-
militer.*

Fa-
mula

A mula in Omilo ex capitis vulnere, duodecim annos nata, moritur in mediâ ætate, decimaquarta die. Ianuâ quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ruperat. Suturae verò in vlcere erant. Quare cognitum est rectè sectione opus habere. Secta est autem non velut oportebat, sed quantum relictum est, pus in ipso factum est. Octaua, rigor, febris inuadit: habebat autem non velut oportebat, sed quantum etiam prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona verò die reliquum resectum est: & valde modicum pus cum sanguine subtus apparuit: & membrana cerebri pura erat: & somnus quidem occupabat: febris autem non dimittebat. Conuulsio verò manum sinistram inuadebat. Nam in dextris magis vlcus habebat.

B Cyrenius in Omilo suppuratus factus, infernum ventrem *Cyrenius purulentus.*

ustus est, triginta diebus serius quam oportebat: & mansuetè se habebat: & resiccatus est pus in ventre. Verum in calidissimo tempore cedens fructus pomorum, & alios cibos non conferentes, à febre correptus est, & à vetric profluuiio: & mortuus est. Hecafon in Omilo, velut etiâ alter seriusustus est, attamen resiccatus est venter, modico excepto. Dysenteria verò arripiebat ipsum, quam ubi effugisset, omnia edebat donec totus intumuit, & erupit ipsi pus deorsum, & vetric profluuiio mortuus est. Hecafon in Omilo, ab immunditia non purgata, & à praua purgatione, dolorem acutum in coxa habebat: & hic quidem discessit, successerunt autem ipsi febres.

Hecafon

C & multo tempore in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque sitiens: & debilis, & horridus. Huic commodè quidem ablatus est morbus velut conueniebat. Opem autem percipiebat ex his quæ offerebantur. Tandem verò erupit morbus deorsum, & totus secessit præ multa bile: & mente motus est, & mortuus. Videbatur autem morbum euasurus esse.

Qui in Salamine in anchoram incidit, in ventrem sauciatus est, & circumcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non egessit deorsum, neque remouit. Mulier quæ iugulauit seipsam, suffocabatur: & datum est ipsi longè postea pharmacum deorsum purgans, & per secessum ipsi exiit. *Salaminus anchora uulneratus.* Qui ex Eubœa venit adolescens, quum multum esset deorsum purgatus, intermissione facta quietus febricitauit. Deinde quum putaret se purgatione sursum versus opus habere, non validam radicem veratri bibit, & post potionem quarta die *Mulier per se iugulata. Adolescens moritur.*

HIPPOCRATIS LIBER V.

mortuus est, nihil expurgatus. Verū somnus ipsum tenebat, & sitis sedari non poterat. Serua illa cui à catapotio sursum quidem pauca prodibant, ac suffocabant : deorsum verò multa, nocte mortua est. Erat autem barbara. Quidam homo Eubœus poto pharmaco deorsum purgâte, per tres dies purgabatur, & mortuus est. Habebat autem manum suppuratam vsq; ad cubitum. Symmachi filius à bile suffocabatur, noctu quum dormiret, & febris eum teneret. Pharmaci autem vbi bibisset, non continuit, neq; purgatus est diebus sex antequam moreretur. Qui iuxta curriculum habitabat quum noctu sanguinē vomuisset, postridie mortuus est, sanguinem vomens multum, & strangulatus. Ad splenem verò, & deorsum multus sanguis ipsi prodibat. Puer à mulo percussus ventrem & hepar, mortuus est quarta die. Spiritum autem densum habebat, & non intelligebat quicquā : & febris tenebat. Hermophili filius ægrotabat diebus vndecim. Febris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant : & primum quidem delirauit, nocte verò cessauit. Sequenti autem die voce destitutus iacebat stertens, distortos habens oculos, febricitans. Penna verò immissa vomuit bilem atrā, & quum infusum per clysterem immissum esset, stercus prodijt multum. Seruæ Aristionis pes sua sponte marcore corruptus obtorpuuit, iuxta medium pedis intrinsecus ex obliquo : & ossa putrida fracta abscesserunt : & prodibant paulatim fistulosa : & ventris profluuium succedebat, & mortua est. Mulier sana, crassa, à catapotio conceptus gratia accepto, dolorem habebat ventris, & tormen in intestino, & intumuit. Spiritus autem sistebatur : & desperatio erat cum dolore : & sanguinem vomuit nō multum : & emortua est quinques, vt vita decessisse putaretur : & neque vomitu facto ab aqua frigida laxabatur, neque dolor præsens, neque spiratio. Superfusæ verò sunt ipsi aquæ frigidæ amphoræ circiter triginta super corpus : & sanè hoc solum prodesse videbatur : & postea deorsum processit bilis multa. Quum autem dolor obtineret, nihil poterat succedere : & vixit. Antander à catapotio accepto, cætera sanus erat. Verū circa vesicam dolorem habere videbatur : purgauit ipsam celeriter multo purgamento : & à meridie dolor tenebat fortis valde : & in posteram diem strangulatio, & desperatio, & iactatio

Serua barbara peperit.

Vir hic etiā perit, Symmachi filius.

Puer à mulo vulneratus. Hermophili filius.

Aristionis seruæ.

Mulier concipere cupiens.

Antander.

- A** ctario. & vomebat, & nihil per secessum egerebat. & noctu patiebatur. & somnus non accedebat. post die verò egerebat multum, & postea sanguinem. & mortuus est. *Athena da puer.* Athenæ puerò masculino à Phagedæna vlcere corroso, doluit à sinistra parte dens infernus, à dextra supernus. Hulus auris dextera suppurata est, dum non ampliùs doleret. Sutor in *Sutor subu. la læsus per rija.* Piryo dum soleas veteramentarias sueret pupugit seipsum supra genu in femur, & ferre longum digitum immerlit. Huic sanguis quidem nullus effluxit. Vulnus autem cito clausum est. femur autem totum in tumorem eleuabatur, & procedebat hic tumor vsque ad inguen & lateris mollitudinem. Hic tertia die mortuus est. Quidam iuxta inguen *Sagitta percussus euasit.* sagitta percussus, quem nos vidimus, maximè præter opinionem opinionem seruatus est. Neque enim cuspis exempta est, erat enim valde in profundo: neque sanguinis eruptio vlla memorabilis fiebat: neque inflammatio: neque claudicauit. Cæterum cuspidem inuenimus nos, ipsamq; eximimus, quum sex iam essent anni, ex quo sauciatus erat. Suspicio autem erat hæc, inter medios nervos cuspidem occultatam fuisse, nullamque venam aut arteriam dissecatam esse.
- Q**ui percussus est spiculo acuto retrorsum paulò infra collum, vulnus quidem habebat non memorabile aspectu, neque enim in altum ferebatur, verum nò multo tempore postea exempto spiculo, distendebatur in posteriorem partem tractus, velut opisthotonici. & maxillæ ligatæ erant. & si liquorem aliquem in os sumeret, eumq; deglutire conaretur, rursus relidebatur ad nares. Cæteraq; statim peiora fiebant. & secunda die mortuus est. *Calce sub atrato cur. su hic perit.* Adolescens per asperam viam cursu facto, dolebat pernam, maximè inferna parte. Abscessum autem locus accepit nullum, velut qui colligeret humorem. Verum tertia die totus locus nigrescebat, vsque ad talum, astragalum appellatum, & vsque ad cauitatem quæ est ad pectus pedis. & quod denigratum erat, non diffringebatur, sed priùs moriebatur. Viginti verò dies ex toto cursu vixit. *Supercilio percussus sine oculi læsione sanatur.* Qui ad oculum percussus est, percussus quidem est in palpebram, descenderat autem cuspis altè satis, barba verò summum supereminebat. Secta palpebra, sublata sunt omnia. Nihil erat mali. Oculus enim permanfit, & compendio sanus factus est. Sanguis autè effluxit largè, & multa copia.

HIPPOCRATIS LIBER V.

*Virgo ma-
nu aperta
ueruicem
percussa
perijt.* Virgo illa pulchra Nerij filia, erat quidem annorū vigin- **D**
ti, verum à muliercula amica iudente, lata manu percussa est
in sinciput. & tunc quidem vertigine capta est, & sine spiritu
erat. & quum ad domū venisset, statim febris vehemens cor-
ripiebat, & caput dolebat, & rubor circa faciem erat. Septi-
ma die circa aurem dextram pus processit graueolens, sub-
rubrum, ampliùs cyatho & videbatur sibi meliùs habere, &
alleuata est. Rursus augebatur febris, & in soporē defereba-
tur. & loqui non poterat. & faciei pars dextera trahebatur,
& difficulter spirabat. & conuulsio ac tremor aderat. & lin-
gua detinebatur. & oculus stupidus erat. Nona mortua est.

*Cleomenis
filius.* Cleomenis filius hyeme initio facto cibum auersabatur,
& eius fastidio citra febrem vexabatur, & vomebat cibos ac **E**
pituitam. & per duos menses cibi fastidium durabat. Co-
co in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla me-
dicamenti potio conferebat. Verum vinum nigrum, & panis
esus, & balneorū abstinencia, & frictio, & lenis fots nō cum
multo fomento, sed placidē. Cuidam quæ circa vigesimum
ætatis annum, biberat pharmacum ad foetum perdendum,
accidit dolor, vomitus biliosorum, multorum, pallidorū ac
prasinorum. Quum bibisset, cōuulsio tenebat, linguam com-
mandebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum. & erat
ei lingua magna, nigra. Oculorum autem alba, erant rubra,
insomnis. Quarta mortua est ad noctem. Origanum po-
tum, oculis, & dentibus malum est. Puella quæ de rupe ce-
cidit, voce destituta, iactatio aderat. & vomuit ad noctē san- **F**
guinem multum. quum ad sinistram aurem impegisset, am-
pliùs inde fluebat. Aquam mulsam difficulter deglutiebat.
stertor. spiritus densus, velut morientium. Venæ circa faciem
distentæ. decubitus supinus. pedes tepidi. febris debilis. vo-
cis interceptio. Septima vocem rupit. calores tenuiores te-
nebant. superstes mansit. Pythocles ægrotantibus aquam,
& lac multa aqua ammixta dabat. Perniones pertunden-
di, & calefaciēdi sunt pedes sic vt maximē excalefacias igne
& aqua. Oculis incommoda sunt lenticula, fructus pomorū
dulces, & olera. Doloribus circa lumbos. & crura. &
coxam, ex laboribus abortis, aqua marinæ, aceti q; calidum
fomentum confert, ita vt vel aspergas, vel spongiam his im-
butam adhibeas. Deligare verò oportet lanis succidis, & pel-
libus

- A** libus agninis. Fullonibus inguina extuberabant dura, & sine dolore. & circa pubem, & in collo, similia erant tubercula magna. febris ante decimum diem. Tussi vexabatur à rptionibus. Tertio mense autem quarto venter colliquiuit. Calores successerunt. lingua sicca. litis. egestionēs deorsum malignæ. mortui sunt. Qui lapide in caput percussus est à Macedonē, & corruit. Tertia die voce destitutus erat. anxietas. febris tenuis. pulsus non valde in temporibus. Nihil omnino audiebat, neque sapiebat. non quietus, sed quarta mouebatur. humiditas circa frontem, & sub nasum, & vsque ad mentum. & mortuus est. Eniates in Delo iaculo ictus retro in latus, in sinistra parte, vlcus quidem sine dolore habuit. • Tertia verò ventris dolor vehemens. non egerebat. Infuso verò per clysterem immisso, stercus prodijt ad noctem. afflictio intermittebat. Sedes ad scrotum extabat. Quarta & ad puberem, & ventrem, dolor irruerat. quiescere non poterat. biliola vomuit abunde colorata. Oculi quales animi deliquium incidentium. Post quintum diem mortuus est. Calor quidam tenuis inerat. Ei qui hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum per corpus diffusus est. oculi caui. anxietas, molestia. Mortuus est priusquam concio solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. Polemarchi vxori hyemie anginosæ, tumor sub guttur. febris multa. vena secta est. cessauit suffocatio ex faucibus. febris comitabatur. Circa quintam genu dolor ac tumor sinistri, & circa cor videbatur ipsi aliquid colligi. & respirabat velut hi qui submersi fuerunt, respirant. & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, Engastrimythi quasi ex ventre loquentes Græcis appellati. Tale quiddam contingebat. Circa septimam aut nonam ad noctem alius deorsum prorupit, & multa liquida quæ mala putantur egeffit. Ipsa verò voce intercepta mortua est. Ventes subpurgare oportet in morbis, quum matura fuerint. Infrà quidem, vbi confidisse videris. Signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint: & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum verò, in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Ex casu vulnerato cu-

Fullo cui moritur.

Caput lapide percussus periit.

Eniates.

Quidam hepar iaculo percussus statim moritur.

Polemarchi vxor.

Cubiti lesio.

HIPPOCRATIS LIBER V.

Cleogeniscus.

Demarchus.

Aglaotelis filius.

Parmeniscus.

Aspasius.

Callimedon.

Melissander.

Hydropis Medela.

Bias pugil.

Timochares.

Canis syndus.

Polycrates.

bito, ob corruptionem cubitus suppuratur. Quum autem iam maturus est, viscosa sanies exprimitur. Velut etiā Cleogenisco, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem & valde ex iisdem pus nullum. Velut Aeschylli filio contigit. Suppuratis autem plurimis horror & febris succedebat. Pharimenisci filio surditas accidit. Contulit clysterem auricularium non adhibere. Verūm lana solūm indita perpurpare, & oleum infundere, aut netopum. Præcipere verò ut deambulet, mane surgeret, & vinum biberet album. Aspasij uxori dolor dentis vehemens, & maxillæ in tumorem eleuatæ sunt. Quum verò castorium & piper collueret, opem sentiebat. Callimedontis puero contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, sectio venæ brachij: & lini torrefacti cataplasma imponere subactum vino albo, & oleo imbutum, ita ut deligeretur neque calidum, neque valde coctum. Aut cum aqua multa coquatur fœnigræci, aut ordei, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua dolore corripere, & vehementer intumesceret, sectio venæ brachij, & alumen Aegyptium in principio sedabat.

Hydropicum laboribus fatigari oportet, sudare, panem edere calidum, in oleo bibere, non multum lauari, & caput tepidè. Vinum autem album & tenue, & somnus auxiliatur. Bianti pugili quum natura vorax esset, contigit ut in affectiones cholicas, bilis sursum ac deorsum exeuntis, delaberetur, ex carnis esu. Maxime verò ex porcinis carnibus crudioribus, & ex ebrietate vini odorati, & placentis ac dulcarijs ex melle, & cucumere, pepone, & lacte, & polenta recenti. In æstate verò affectiones cholicæ, & febres intermittentes. Timochari hyeme destillatio, maxime in nares, quum venere usus esset, resiccata sunt omnia. lassitudo, calor successit, caput graue, sudor à capite multus, defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam sanus sudare aduersus. Tertia die euasit sanus. Post canem febres fiebant sudorosa: & non perfrigerabantur omnino post sudorē, sed rursus amplius incalescebant: & longæ, & leniter sine iudicatione, & non valde siticulosæ, paucis in septem & nouem diebus cessabant. Undecima & decimaquarta, & decima septima, & vigesima iudicabantur. Polycratem febris

- A** bris inuadebat, & sudor qualis præscriptus est. Purgatio à pharmaco deorsum facta est. & febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parui, & circa collum, ad vesperam. Deinde in totum, & rursus incaluit. Circa duodecimā & decimam quartam diem febris augeſcebat, & seceſſus pauci. post purgationem sorbitionibus vsus est. Circa decimam quintam ventris dolor circa splenem, & lateris mollitudinem sinistram. Calidorum adhibitiones minus profuerunt, quàm frigidorum. Quum autem leni ac molli per clysterem infuso vsus eſſe, dolor ceſſauit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum indicem, & infernum os dextræ manus confregit. inflammatio ſucceſſit, & marcor, & febris.
- B** Subpurgatus eſt moderatè. Calores lenes, & dolores, de digito quid decedit. Post ſeptimum diem, ſanies exibat lenis. poſtea per linguam dixit ſe non omnia poſſe enunciare. Prædictum eſt opiſthotonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ conſertæ, & ad collum rigidæ. Tertia verò die totus conuellebatur in poſteriore partem cum ſudore. Sexta à prædictione mortuus eſt. Harpali filius ex libera *Harpali filius.*
ta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti acceperit. inflammatus eſt, & doloroſus erat. & vbi reſpoſitus eſt, & dolor remiſit proficiſcebatur ad agrum. rediens lumbos doluit, lauit, maxillæ ad noctem concerebantur, & opiſthotonus aderat. Saliua ſpumofa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus eſt. Thrinon Damonis filius, *Thrinon.*
- C** habebat circa tibiæ malleolū vlcus, iuxta neruum ſanè iam purum. huic à pharmaco corroſo contigit, vt opiſthotono moreretur. Profectò in omnibus ſuppurationibus, & his quæ circa oculum ſunt, dolores ad noctem. Tuſſes hyeme, maximè in aſtrinis, craſſa & multa alba exſcreantibus. & febres ſuccedebant leniter, & quinta die ceſſabant. Tuſſes autem circa quadraginta, velut Hegeliſoli. Eutytychydes ex cholericis affectionibus, in cruribus ad neruorum deſtentionem deſiuit, vnà cum ſeceſſu deorsum. Bilem multam abundè coloratam vomuit ad tres dies ac noctes, valdeque rubram, & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex poribus, neque ex cibis. & vrinæ ac tranſitus deorsum ſupreſſio multa, per vomitum *Andropia.*
ſæx molis prodijt, & deorsum quoque erupit, *Andro-*

HIPPOCRATIS LIBER V.

phani vocis interceptio. ignorantia. delirium. His solutis supererat adhuc diu multis annis, & recidiuæ fiebāt. Lingua verò per totum tempus permanebat sicca. & si non colutione vteretur, loqui non poterat, & plerunque erat valde amara. Aliquando etiam dolor ad cor, quem venæ sectio soluit. Huic aquæ potus, aut aqua mulsa contulit. Veratrum nigrum bibit. neque biliosum prodibat, sed modicum. Tandem hyeme decubuit, & mente motus est. & linguæ affectiones similes. calor tenuis. siue dolore. lingua decolor.

Nicanor.

Vox peripneumonica. de pectore stragula reijciebat, & se educi iubebat. Nihil autem poterat clare loqui. Ad noctem mortuus est.

Damocles

Nicanoris affectio erat, quum ad conuiuium progredieretur timor tibicinæ: quum sub initium vocis tibicæ, in conuiuio tibia canere audiuiſſet, præ timoribus turbationes. Vix se sufferre posse dixit, quum nox eſſet. Interdiu verò audiens, nihil commouebatur. Talia comitabantur ipsum multo tempore. Damocles qui cum illo erat, cæcutire, & corpore exoluto eſſe sibi videbatur: & non accessiſſet sanè ad præruptum locum, neque trans pontem, neque minimi scrobis altitudinem transgredi poterat, sed per ipsum scrobem. Hæc per tempus aliquod ipsi affuerunt.

Phœnis.

Phœnicis affectio ex oculo dextro talis: quædam erat, plerunque velut fulgur elucere putabat. Quum autem non diu ipsum continuisset, dolor ad tempus dextrum instabat, & per totum caput ac collum. Caput intumescibat retro ad verticula. & distentio, & duricies circum tendines. & ubi caput commouere, aut dentes diducere conabatur, non poterat, ut qui valde distendebatur. Vomitus ubi facti fuissent, prædictos dolores auertebant, & leniores faciebant. Sed & venæ sectio proderat, & veratri potio. eduxit autem varia & omnigena, maxime verò prasina. Parmenisco etiam prius incidebant tristitiæ, & decedendi è vita cupiditas. Quandoque verò rursus lætitia. Cononis serua ex capitis dolore incipiente, mente mota est. clamor. querelæ multæ. rato quies. Circa quadragesimum diem mortua est.

Parmeniscus.

Conon.

Decem autem diebus ante mortem voce destituta, & conuulsa fuit. Adolescens quidam multo meraco potu, supinus in habitaculo quodam dormiebat. Huic terpens Arges appellatus in os ingressus est. & sanè quum sensisset, & lo-

Adolescens.

qui non

- A** qui non posset, dentibus stridit, & serpentem deuorauit. & dolore magno tenebatur. & manus prætensas adhibebat, velut qui strangularetur. & iactabat seipsum. & conuulsus mortuus est. Timocharis seruus, ex atrabiliarijs esse putatus, à talib⁹ ac tot viris, similiter mortuus est circa easdem dies. Nicolai filius circa solstitium hybernum ex potationibus horruit. ad noctem febres. postidie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio fori adhuc plena esset, sudor totius corporis cessauit. Diopithis sorori in semitertiana, circa accessionem etiam cor grauiter dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die. & huiusmodi cordis dolor etiam alijs similiter aderat. Verumtamen
- B** sub pleiadis occasum, viris talia rariora fiebant. Epicharmi vxori antequam pareret, dysenteria erat. dolor vehemens. fecælus recrementa, subcruenta, mucosa. Vbi peperisset, statim sanata est. Polemarchi vxori in morbo articulari, coxæ dolor quidam vehemens. causa erat quòd menses non prodierunt. Vox interceptiebatur, per totam noctem vsque ad meridiem. Audiebat autem & sapiebat, & per manum significabat, quòd circa coxam esset dolor. Epicharmo circa pleiadum occasum, dolor humeri, et grauitas in brachium. anxietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ velut culicum morsus, verum modico tempore. postidie febricitauit. Siccitates multæ post Fauonium factæ sunt, vsque ad æquinoctium autumnale. Sub canem æstus magni. calidi venti. Febres sudorificæ. Tubercula iuxta aurem multis oborta sunt. Tychon in obsidione circa Datum, à catapulta percussus in pectus. et paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse aliquid de spiculo in septo transuerso. Et quum ipsi videretur, ad vesperam infusum per clysterem adhibuit, et pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transegit moleste. Statim verò vbi dies illuxisset, et medico, & alijs, melius haberi videbatur. Erat enim quietus. prædictio facta est, quòd vbi conuulsio fieret, breui esset moriturus. Sequenti itaque nocte moleste habens, in somnis, plerunque in ventrem decumbens, tertia exoriente die conuellebatur, et tunc mortuus est. Billo percusso in dorsum, spiritus multus per vul-

*Timocharis seruus.**Nicolaus.**Diopithes.**Epicharmus.**Polemarchus.**Euphranor.**Tychon.**Billus.*

HIPPOCRATIS LIBER VI.

nus cum strepitu processit sanguis erumpebat. Vbi verò medicamentum cruentis vulneribus destinatum adhibitum ac deligatum esset, sanatus est.

Phile.

Phanias.

Euergetes.

Aristippus

Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris. deinde os liuefactum est. mortuus est. Et Phanix & Euergetes filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discessit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum ventrem violenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est. ventris dolor vehemens, & breui ardebat. deorsum verò non egerebat. anxius erat. biliosa abundè colorata quum vomuisset, melius habere videbatur. paulò post rursus dolores vehementes, & venter velut in voluulis. calores. sitis. & in septè diebus mortuus est.

Neapolis.

Neapolis similiter percussus, eadem passus est: acri infuso per clysterè immisso, aluus deorsum erupit. color per corpus diffusus est, tenuis, pallidus, niger. oculi sicci, stupore rigidi, intus conuersi, intuentes in corde.

Metrodorus.

rus.

Metrodori filio ex dentis dolore, maxillæ marcor, & gingivarum carnis superexcrecentia. Moderatè suppuratus est. exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. Mulieri in Abderis, carcinoma obortum est circa pectus. et per mammam fluebat sanies subcruenta. obturata verò fluxione, mortua est. Plerique ex destillatione secundum dimidiam capitis partem dolebant. et humore secundum nares procedente febricitabant leniter. et in quinq; diebus perfrigerabantur. Et quæ in partu concussa fuit, dolor circa pectus et latus factus est. excreationes purulentæ. Tabes constitit. febres per sex dies.

Carinoma pectoris cur hæc necauit.

Rursus alui profluuiū. quies. febris. aluus adstricta est: et circa septimam diem mortua est. Anginosa quædam dextrā manum et crus doluit. febris tenebat debilis. strangulatio tertia die remisit. quarta conuulsa, voce destituta, stertor, dentium contritio, maxillarum rubor. Mortua est quinta aut sexta die. Signum circa manum subliuidum. Alia quoque in palato stertorosa. lingua sicca, peripneumonica. non desipiens, mortua est. Et in Olyntho hydropicus, derepente voce destitutus, desipiens per noctem ac diem, mortuus est.

Anginosa cur moritur.

HIPPO

HIPPOCRATIS


COI DE MORBIS PO

PVLARIBVS, LIBER VI.

IA

ME

IN



Vibuscunque ex abortu circa vterum, & tumoribus, ad capitis grauitatem conuertitur, & iuxta sinciput maximè dolores, & quicumque alij ab vteris: his in octo aut decem mensibus ad coxam morbus desinit. Acutum habentes caput, qui quidem validam habent ceruicem,

Plinius hinc plurima sumpsit.

robusti sunt tum aliàs, tum osibus. Qui verò caput dolent, & aures fluentes habent: his palatum canum est, & dentes inter se non è directo respondentes. Quibusunque os de palato discessit, his medius cōsudet nasus. Quibus verò inde vnde dentes prodeunt, his summus nasus simus fit. Puero- rum elucescentiæ simul cum pubertate, in quibusdam muta- tiones habent etiã alias. In rhenem dolor grauis, quū im-

plentur cibo, vomunt pituitam. Quum verò redundarint do- lores, æruginosa, & melius quidem habet. Soluuntur autem, quum cibus euacuati fuerint, arenulæ quæ fuluæ subsident, & eruentū mingunt, torpor femoris è directo, quiescere nō con- ducit. Sed exercitia, nō impleri, iuuenes veratro purgare, po- plitem secare, vrinā ciētibus purgare, attenuare, & mollire.

Menses aquosis diu permanēt. Quī verò nō breui prodie- rint, intumescunt. In Cranone antiqui dolores frigidi. re- centes autem calidi. ex sanguine verò plurimi. & quæ ex co- xa, frigida sunt. Quæ ad rigotes fortes progressa sunt, non valde mitigantur, nisi prope vigorem. Ante rigorem vri- narum suppressiones, si ex bonis fuerint, & alius egerat, & somni adint. fortassis autem & febris modus. fortassis etiã quæ ex lassitudinibus. Abscessus nō valde, quibus rigores.

Crurum

*achener ma-
nag. huc m-
ro gup. sed*

*Menses. Crata
feminatū. huius
Cranon. mon-
uam. n. d.
Lotium cū
retinetur.*

208

HIPPOCRATIS LIBER VI.

*Tubercula
quæ bona,
quæ non.*

*Tumor ar-
ticulorum.*

*Lachryma
sponte ma-
nus uel cõ-
tra.*

*Oculorum
signa.*

*Febrili dif-
ferentia.*

Crurum efforminationes, veluti si aut ante morbum iter fe-
cisset, aut statim ex morbo: eo quod fortassis ex lassitudinib.
in articulos abscessit ex quo crurum efforminationes. Tu-
bercula extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & æquali-
ter maturescantia, & non obdura, & deorsum vergentia, &
non bifida, meliora: contraria verò, mala: & quanto plus con-
traria, pessima. Ferinum autumno, & oris ventriculi dolo-
res, & horrores, & atra bilis. Circa initia exacerbationes
confidera, & in omni morbo, quale est ad vesperam exacer-
bari, & annus ad vesperam, & ascarides. Infantibus tussicu-
la cum ventris turbatione, ac febre continua, significat post
iudicationem bimestri, in totum vigesima die, etiam turno-
res ad articulos. Si quidem infra umbilicum constiterint, E
in infernis articulis superna, bonum: si verò supra, non simi-
liter morbum solvunt, nisi suppurata fuerint. Quæ verò in
humeris suppuratur tantillis, mustellæ cubito præditos, par-
uumque ac macilentum brachium habentes faciunt. Sol-
uerit autem & vlculorum infernè eruptio, si non rotunda
& profunda fuerint. Talia enim perniciofa etiam aliàs sunt
pueris. Soluerit itidem sanguis fluens. Magis autè in perfe-
ctioribus is apparet. Lachrymæ in acutis male habentibus,
vltroneæ quidem bonæ. Inuoluntariæ verò defluentes, ma-
læ. Quibus circumtenditur palpebra malum. Malus est
etiam oculus inarescens, velut spuma. & obscuratio oculorū
mala est. Et squalliditas mala. & qui intrinsecus corrigatur.
& rigentes. & qui vix cōuertuntur, & qui intus conuersi sunt, F
& quæcunque alia omittuntur. Febres aliæ quidem mor-
daces sunt manui, aliæ lenes. Aliæ verò non quidem morda-
ces, verum angescerent. Aliæ autem acutæ quidem, sed quæ à
manu vincantur. Aliæ statim adurentes, aliæ semper debiles,
siccæ. Aliæ saluginosæ. Aliæ inflatæ horrendi aspectus. Aliæ
ad manum humectæ. Aliæ rubicundæ valde. Aliæ valde pal-
lidæ. Aliæ liuidæ, & alia id genus. Distentiones corporis,
& articulorum duriciæ, malum. & ipse dissolutus. & confra-
ctiones articulorum, malum. Oculi audacia delirij signū
est. & oculorum deiectiones ac peruerfiones malum.

S E C T I O S E C V N D A.

Dilatare, constringere, alia quidem, alia verò non. Hu-
mores alios quidem expellere, alios verò siccare. alios
autem

A autem indere, & alia quidem parte, alia verò non. Attenuare, crassefacere, corpus, cutē carnes, & alia. & aliqua quidem, aliqua verò non. Leuigare, exasperare, indurare, mollire, alia quidem, alia non. Excitare, torpescere, & quæcunque alia huiusmodi. Deriuare, subcedentia statim reuellere, renitentibus concedere. Alium humorem nō prodeuntem ducere. prodeuntem verò simul effundere. operari simile, velut dolor dolorem sedat. Dissimilia, si vergant sursum eleuata, infernè soluere, & contraria per eadem: velut est capitis purgatio, venæ sectio, quando non temerè detrahitur.

Abscessus velut glandularū tumores, signum quidem sunt earum partium quæ germina habēt, sed & aliarum. Maximè *Tumores quid per- tendant. Spiritus uarietas.*

B verò circa viscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi: extra magni, intus parui: intus magni, extra parui: alius extendens, alius vrgens: dupla intro reuocatio, velut superinspirationibus. calidus. frigidus. Medela assiduarum oscitationum, spiratio longa. In non potantibus, & vix, spiratio breuis. E directo & laterum & præcordiorū intentiones, & splenis eleuationes, & è naribus eruptiones. & aures è directo. Horum plurima etiam ad oculos. Vtrum igitur omnia: aut quæ quidem ex infernis sursum, è directo: qualia sunt quæ iuxta maxillas, aut circa oculū aut aurē: quæ verò ex supernis deorsum, non è directo: Atqui & anginosi rubores, & laterum dolores è directo. Aut etiam quæ infra hepar sunt ex supernis distributa, velut in testes ac varices: Considerāda sunt hæc quo, & vnde, & propter quid.

Venæ temporum non confidentes, neq; viriditas splendida, si spiritus intus relinquatur, aut tussis sicca, non ferina: vt in articulos decumbat expectare oportet, è directo distentionum secundum ventrem vt plurimum. Habēt autem horum plurimi, & facies rubicūdas, & ex natura sunt modi albidioris & de naribus sanguis non erumpit, aut parum erumpit. & si quidē ex affusis intus relinquatur, paratus est abscessus.

Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & iniucunditas, & cibi fastidium, eodem modo. Febres autem non acutæ, eiusmodi sunt, verū reuertentes. Quæ relinquuntur post iudicationem, recidias facere solent. Primum itaque splenis eleuationes, si non ad articulos finierint, aut sanguinis è naribus eruptio sit, aut dextra præcordij intensio: si non penetraue-
rint

HIPPOCRATIS LIBER VI.

rint vrinae. Hæc enim est Interceptio vtrorunq; & recidiuæ D
horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant, Eos verò qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui verò non valde, eos coadiuuare. Eos verò auertere, si omnino incòmodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si iam incipiunt. Quartanæ sanguinis è naribus eruptiones aggre iudicant. Febres quæ vna die intermittentes, altera superrigēt vnā cum indicatione, ex quinque ad septem circuitus durant. Quæcunque tertianæ naturam habent, his nox molesta ante exacerbationem: Quæ verò sequitur tolerabilior plerunq; est. Tussis sicca parum irritantes à febre adurente, non pro ratione siticulosæ, neque linguæ torrefactæ, non feritate, sed spiritu. Constat id inde. Quum enim loquuntur, aut hiant, tunc tussiant: quum verò nō, minime. Hoc autem in febribus ex lassitudinibus obortis maxime contingit. Nihil temere affirmandum, nihil contemnendum. Contraria paulatim facta accessione adhibenda sunt, & interquiescendum. Dolenti capitis partem posteriorem, recta vena in fronte secta profuit. Successione præcordiorum ex qualibus qualia alterant, & viscerum inflammationum qualia possunt, siue ex hepate spleni, & vice versa: & quæcunque huiusmodi. Reuellere oportet, si non qua oportet repant. Si verò qua oportet, his oscula aperire oportet, qualiter singula repunt. Latæ pustulæ non valde pruriginosæ sunt: Quale Simon habebat hyeme, qui vbi ad ignē inungeretur, aut calida lauaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbitror si quis calida fomenta adhibuisset, opem ferre potuisse. Quæcunque concoqui oportet, conclusa esse conuenit. Contraria verò siccare, & aperta esse. Oculorum fluxiones, si alias conducere videtur, reuellere ad fauces conuenit. Et vbi eructatio conducit, & quæcunque alia huiusmodi. Transitus apertos esse oportet, veluti nares, & alia quibus opus est, & velut opus est, & qualia, & qua parte, & quando, & quantum opus est, velut sudores, & alia sanè omnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonum signum est. In paruis autem, contraria significans bonæ significationi, malum. Apud magnum Theatram vbi mulier retrò heroum, morbo regio superueniente permāsit ipsi.

Quartana diurna.

Tertianæ.

Tussis sicca.

Capitis doloris medicinalis.

Simon.

Oculorum fluxiones.

facies

Apud

A Apud Temenæ neptim ille nigricantis erat coloris. In *Temenes.*
 Perintho genituræ similis vrina talis, quæ esset iudicatoria, *Lotium ge-*
 etiam pectinis affectionum. Nam huiusmodi vrinæ talia sa- *nitali semina-*
 nant: quoniam neq; flatu multo, neq; stercore multo egres- *ni tale.*
 so euacuabantur. Non enim profecto magnum erat præcor-
 dium. Brasicam septima die quis comedit, quum adhuc dif-
 ficulter spiraret, postquam pecten emollitus est, rectè spirans
 factus est: alius ipsi expulit. De sanguine seroso, quoniam *Sanguis fe-*
 in pavidis talis, aut in his qui vigilarunt: & siue malus, siue bo- *rosus in qui-*
 nus. Quibus splen deorsum vergit, pedes & manus, & ge- *bis sit.*
 nua calida sunt: nasus & aures semper frigida. Num propter *Lienosorum*
 hoc quòd tenuis sanguis? Num & natura talem hi habent? *signa.*

B Suppurationibus vmbilicus terminus, quibus suppuratu-
 ris ventres turbantur. Splen durus non supernè, infernè
 rotundus, latus, crassus longus, tenuis longus. Minus capitis
 grauedine laborantibus. Circa ægrotantem administra- *Quid medi-*
 tio, & de morbo interrogatio: quæ narrat qualia, quomodo *co agendum*
 accipiendi sermones: quæ ad ægrotantem, quæ ad præsentem, *erga lan-*
 quæ ad externos. Quod in calidiore, solidiore, in dextris: *guentes.*
 & nigri propterea, & venæ extrinsecus, & multò biliosiores:

Concretum est, compactum est citius: vbi motum est, desi-
 nit, & tardius augefcit, & ad amplius tempus. Quòd soli-
 dum factum est, & biliosius, & sanguinolentius est: Hic cali-
 dior est locus animali.

SECTIO TERTIA.

C Vtis raritas, ventris densitas: cutis constrictio, carnum *Caluities*
 incrementum: ventris torpor, vniuersorum confusio: vā *caussa.*
 forum immundicia, cerebri consumptio. Quapropter & cal-
 uities, instrumentorum attritio. Detractio cursibus, luctis,
 quiete, multis celeribus deambulationibus, carne ouilla, ma-
 za cocta plerunque, panis modicus. Detractionis signum,
 eandem horam diei seruare, derepentè enim trahitur. Re-
 mittito labores, aut defluet. Similiter enim totum concidit:
 Quum verò iam conciderint, carnes suillas affatas exhibe-
 to. Quum autem implentur, signum est, quòd corpus rursus
 floridum fit. In exercitationibus signum, sudor fluens gut-
 tatim, qui exit velut ex canalibus: aut collapsio ex eleuatio-
 ne. Mulier quam primùm curauim in Cranone, splen ipsi ma-
 gnus natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor
 plerunque

HIPPOCRATIS LIBER VI.

plerunq; supernè. Sed & infernè, decimaquarta. Minus his **D**
qui ex capite grauedine ac raucedine laborât, vbi febre cor-
repti fuerint, recidiuæ velut puto fiunt. Quicquid suppura-
tur, non reuertitur. Ipsa enim maturatio, & iudicatio simul,
& abscessus. Quibusdam vbi venere vtuntur, venter infla-

*Damago-
ra & Ar-
cesilao quid
in Venere
passi sunt.
Frigus ue-
niens quid
faciat.*

tur, velut Damagoræ. Quibusdam verò in hoc strepitus, Ar-
cesilao verò etiam intumescebat. Flatuositas simul causâ
est in his qui scapulas alarum modo eminentes habent. Sunt
enim flatuosi. Frigidum valde, venas rumpit, & tussim mo-
uet, velut nix, glacies : & constringit, velut sunt eminentiæ
oblongæ & rotundæ, Pherea & Gongronæ, à satyrorum cir-
ca aures eminentis, & arborum quarundam tuberculis ap-
pellatæ. Simul causâ sunt etiam durities. Post mictionē con-
cretio, pueris magis, num quòd calidiores? Figuræ magis
alleuantes, velut qui sarmenta manu neſtebat & obtorque-
bat, præ doloribus decubens, arrepta paxilli summa parte su-
pra seipsum infixa, inhærebat, & melius habuit. Quē ex mō-
tano labore circa pontem ego vidi crura iactantem, altera ti-
bia minimè extenuabatur, femoribus autem valde. Vrinę &
genitura non supprimebantur. Quæcunq; laterum natu-
ræ scapulas alarum modo eminentes habent, propter causâ

*Rigores
unde inci-
piant.*

debilitatem in destillationibus malignis, siue excretio fiat,
siue non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidē
magis à lumbis, & per dorsum, & tunc ad caput. Sed & viris
posteriore corporis parte magis quàm anteriore. Horremus
enim magis exterioribus quàm interioribus corporis parti-
bus, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior: Indicat autē
pilus. A quibus autem alijs rigent, fortassis vlceribus, inci-
piunt à vasis. Summa, ex natiuitate, & causâ, & plurimis
rationibus, & paulatim in cognitionem venientibus colligē-
tē & addiscentem, an similia sint inter se, & an nō similia
sint inter se: quo ex dissimilitudinib⁹ similitudo fiat vna. Sic

*Sanguis de
naribus qui
bus manet,
& pueris
quando in-
cipit.*

sanè fuerit via. Sic etiam eorum quæ rectè se habent proba-
tio, & non rectè se habētium redargutio. Sanguinis ex na-
ribus eruptio, aut subpallidè nigricantibus, aut rubicundè pal-
lentibus, aut subpallidis. Parū demittentem crassefacere
oportet sicco. Alijs verò minus crassificatione opus est. Sic-
co autem opus est albo. velut galla, alumen. Postquam ve-
nere vti inceperint, aut hircire, sanguis ipsi⁹ è naribus erum-
pit.

A pit. In accessibus alij quidem strepitum edunt: velut Arce- *Arcefilaus.*
 filaus. Alij verò accessuri, horridi fiunt ac rugosi. Alij post-
 quam accesserint, ventre inflantur, velut Damnagoras. Mu- *Damnago*
 tationes cauendæ. Cibus modicus, non de lassari, non sitire. *ras.*
 Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Re-
 nutritio vice versa. Cutis confidentis corrugatio, renutritæ
 extensio. Rugosum, leue, vtriusq; signum: itemq; subbiliofum
 & subrubrum: Sic etiam detractas esse mammas, graciles au-
 tem sursum tractas esse & circumtensas, etiam si quis non
 propterea putauerit id fieri, sed in carnosiss. Clauiculæ con-
 spiciuæ, venæ pellucidæ. Herodicus febricitantes interficie- *Herodicus.*
 bat circuitibus, luctis, multis fomentis, mala est febriculosi-
 tas, inimica fami, luctis, circuitibus, cursibus, frictioni: labo-
B rem labore. Ipsi venarum rubor, liuor, pallor, laterum do-
 lores molles. Non sitire faciunt, continere os, tacere, ven-
 tum cum potu frigidum inducere. Occationes vnde ægrota-
 re cœperint, considerare oportet, siue capitis fuerit dolor, si-
 ue auris, siue lateris. Signa sunt dentes, & in quibusdam in-
 guinum tumores. Vlcera sientia ac tubercula iudicantia fe-
 bres. Quibus hæc non fiunt, iudicatio sublata est: Quibus in-
 tus relinquuntur, certissimæ, recidiuæ, ac celerrimæ. Sputa *Hæmoro-*
 rotunda delirium significant, velut in Pleno. Qui Hæmor- *rhoidas pa-*
 rhoidas habent, neq; pleuritide, neque peripneumonia, neq; *tientes d-*
 phagædena, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi *quibus tuti.*
 figuram habentibus corripuntur, fortassis autem neque le-
C pris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen intempesti-
 uè curati, talibus non tardè correpti sunt, & sic perniciosè fue-
 runt: & quicumque alij, abscessus, velut fistulæ, aliorum me-
 dela sunt. Decubitus humorum ad aliquem locum, in qui-
 bus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos impe-
 dit. Alterius loci morbos loca excipiētia, aut ob dolorem,
 aut ob grauitatem, aut propter aliud quiddam liberant, aut
 quòd alijs sunt communicationes. Propter inclinationem
 non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationē
 talia spunt. Conuenit quibusdam sanguinem detrahere,
 tempestiuè in talibus. In alijs autem velut in his, non con-
 uenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni,
 pleuritis, bilis.

HIPPOCRATIS LIBER VI.

SECTIO QVARTA.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem ex-
orta non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua
fit, pro ratione recidiuarum. Recidiua verò fiēte, rursus in-
tumescent, & permanent, velut febrium recidiuæ in simili
circuitu: his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, al-
ba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinosis febrili-
bus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si ve-
rò ultra hoc, etiam sanguis è naribus largè eruperit, etiā val-
de. Cui intestinū in dextra parte dolebat, & articulari mor-
bo correptus est: erat quietior. Postquā autē hic curatus fuit,
magis dolebat. Agasis filia quum esset puella, densum spiri-
tum habebat. Mulier autem facta, à partu nō diu dolore cor-
reptā leuiter, magnum onus sustulit. & statim quidem in pe-
ctore aliquid crepuisse visum fuit. Postera die & anhelationē
habebat, & coxam dexterā dolebat: & cū hac doleret, tunc
etiam anhelatio habebat: coxæ verò dolore cessante, etiam
anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio verò florida:
Vbi verò confidisset sputum, vomitu bilioso tenui simile e-
rat. Dolores maximè erant quum manu laboraret. Hanc ab
allio arcere visum fuit, porroque ac ouicula, & boue, In re-
bus autem agendis à clamore, & excandescencia. Cui in
capite tumor depascendo proserpebat, ei primū alumen
vstum profuit. Habuit alium abscessum, fortè quod os ab-
scessurum esset. Abscessit sexagesima die supra aurē, sursum
ad verticem vulnus erat. Intestina crassa habet, qualia sunt
canis, verū maiora. Dependent autem ex medianis mem-
branis. Mesocolis hac parte appellatis. Hæ verò ex neruis, de
spina sub ventrem. Aegrotantibus gratificationes, velut
est purè præparare potus ac cibos, & ea quæ videt: molliter
ea quæ contingit. Aliæ gratificationes, quæ non magnope-
re lædunt, aut faciliè reparari possunt, velut frigida, vbi hac
opus est. Aliæ gratificationes sunt, introitus, sermones, ha-
bitus, vestitus ægrotanti, tonsura, vngues, odores. Aqua de-
cocta partim vt aërem admittat, partim vt vas non plenum
sit, & operculum habeat. Quod ex sanguinis eruptioni-
bus, aqua inter cutem corripiuntur. Si qualia oportet pur-
gari, purgentur, faciliè ferunt. In Aeno legumina comeden-
tes assidue, foeminae, mares crurum impotentes facti sunt, &
perman-

*Archige-
nes.*

Agasis.

*Capitis tu-
mor.*

*Quæ medi-
cus erga læ-
guē agat*

*Legumina
in Aeno.*

A permanferunt. Sed & eruum comedentes, genuum dolores habebant. Palam vigilans calidior externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens vice verfa. Calidæ naturæ frigiditas, potus, aqua, quiefcere, fomnus in frigore, cōtecto, fomnus fedentium, erectorum nictatio. Debiles viſtus, frigidi: robuſti verò calidi. Aquarum arte nō præparatarum, quæ quidem ab æthere excreta eſt, aut cum tonitruo, æſtiva: procelloſa verò mala. Aqua vorax, vigilia vorax. Percalidam naturam calido tempore, in frigore cubile craſſefacit: in calido attenuat. Exercitatio ſanitatís eſt veſci citra ſaturitatem, non refugere laborem. Inter vigilandum ſiti leui ſomnus medela eſt. Siti verò ex ſomno, vigilia in quibusdam. Quibus plurimus calor eſt, maxima voce præditi ſunt. Nam & plurimus eſt frigidus aer. Ex duobus autē magis magna etiam quæ generantur exiſtunt. Ventrículo calidi, carne frigidi & tenues, hi eminentes venas habent, & iracundiores ſunt. Terra ſiccitatibus ſquallida, volucrum genus abundat. Hircire incipiens, vter teſtis extra apparuerit, ſiquidem dexter, maſculum: ſi verò ſiniſter, fœmellam protendit. Oculi prout validi fuerint, ita etiam corpus: Sed & color in peius aut melius vergit. Iuſtum eſt autē, prout ſe habuerit alimentum, ita & quod forinſecus eſt ſequi. Signa lhetalia, per cutem, nares, calidus vapor: vbi prius nares frigidum ſpiritum emiſerunt. Signa verò vitalia, contraria ſunt. Labores cibos præcedant.

Qualitas ciborum & aquarum.

Sanitas. Somnus.

Volucrum abundantia

Oculi.

Mortis & vitæ ſigna.

SECTIO QVINTA.

C Morborum naturæ medici. Inuenit natura ipſa ſibi ipſi aggreſſiones, non ex præmeditato, partim velut & nictare, partim verò & ea quæ lingua ſubminiſtrat, & quæcunque alia huiuscemodi, non edocta natura, & nullo magiſtro uſa, ea quibus opus eſt facit. Lachrymæ, narium, humiditas, ſternutatioes, auris ſordes, oris ſaliuæ eductio, ſpiritus introitus, exitus, oſcitatio, tuſſis, ſingultus, non eiſdem omnino modi. Urinæ ſecceſſus, & flatuſ, & huius alterius, alimenti, & tranſpirationis, & ea quæ fœminis ſolis adſunt, & in reliquo corpore ſudores pruritus, corporis diſtentiones cum oſcitatione, & quæcunque huiuscemodi. Hominiſ anima ſemper producitur uſque ad mortem. Si verò efferbuerit, vnà cum morbo etiam ani-

HIPPOCRATIS LIBER VI.

ma corpus depascitur. Morbi connutriti, in senecta, & D per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio, contra sententiam non consentire affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit, quæcunque ex calido sunt. Excandescencia retrahit cor & pulmonem in seipsa: & ad caput calida ac humidum. Læticia vero relaxat cor. Labor articulis & carnibus: cibus, somnus, visceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In vulneribus sanguis concurrit, opitulandum igitur ut va-

*Dolor au-
ris qui leue-
tur.*

*Lingua no-
ta uaria,*

*Sordes au-
ris quid por-
tendant.*

*Cibaria
qualia.*

*Destillatio
nis reme-
dium.*

*Coitus qui-
bus proficit.*

*Veratri pur-
gatio.*

*Sanguis
per somnū
intro fugit.*

*Cibi frigi-
dissimi.*

*Cucumis
agrestis.*

cum expleatur. Si auris doleat, lana digito obuoluta oleum calidum instillato. Deinde lanam intus in volam manus positam, sub aurem subdito, ut aliquid ipsi exiisse videatur. postea in ignem immittito, Dolus. Lingua vri- E nam significat. Linguae virides cum palore biliosa. Biliosum autem à pingui: Rubicundæ verò à sanguine. Nigræ ab atra bile. Sicca à fuliginoso ardore, & vterina parte. Albæ verò à pituita. Vrina concolor cibo, & potui, & qualis intus est humidi colliquatio. Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: quapropter per hanc humores cognoscimus. Si sallæ carnes gustanti, redundantia signum. Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, morbosum vteri vas est. Hominibus sordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara verò non. Terram mutare commodum est in longis morbis. Debiliores cibi breuem vitam habent. In fluxionibus ad coxam, venas retro aures secato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido F ventriculo præditos, fortes potus accibi perturbant. Atra bilis velut similis est hæmorrois. Augescentes morbos coitus. Frigiditas ea quæ in ventre sunt indurat. Coitus ea quæ in ventre sunt indurat. Eum qui veratrum bibit, si citius purgare volueris, lauare oportet aut comedere. Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor à superiore ventre, febris ab inferiore magis. Attractio, pulmo, siccus ardor: Superuacuatum siccus & somnus multus. Frigidissimus cibus, lentes, milium, cucurbitæ. Ulceræ exoriuntur si quis dum impurgatus est laborauerit. Mulier, capra, elaterium aut cucumerem syluestrem comedentes, pueris purgatio. Calido corpori, id quod comedit, intrinsecus frigiditas est, forinsecus autē dolor à sole, igne, vestitu, in tempore

A tempore æstiuo. Contrario verò contrario modo. Cibi partim celeriter superantur, partim tardè.

SECTIO SEXTA.

*Ciborum
uarietas*

Carnes attractices, & ex ventre, & extrinsecus. Indicium est sensus ipse, quòd expirabile ac inspirabile est totum corpus. Calidissima venula sanguinis multitudi-
ne, id quod fuliginosum est, exèrit, & statim secernit. Et quibus quidem pingue, bilis flaua: quibus autem sanguis, atra. Mentis, memoriæ, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res veneræ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore ac regione calidior erit. In doloribus proximum ventrem purgato, sanguinis autem ventrem secato. Vitiatio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sternutationes, plantarum succi, in quibus vim habent, & cyceonis mixtura. Maleficorum autem lac, allium, vinum feruefactum, acetum, sal.

B Homo ex lassitudinibus ex itinere, imbecillus, grauatus, expuit. Tussiuit enim ex vertice. febris acuta, ad manum submordens. Secunda die capitis grauitas, lingua combusta fuit, naris vnguibus conscalpta sanguinem non effudit. Sinister splen magnus & durus dolebat. A quartana correpti, à magno morbo non corripuntur, Si verò corripiantur prius, & succedat quartana, liberantur. Pro qualibus qui morbi. Bilis sit, velut de vulneribus dixi, quòd sint biliosæ. Caliditas acrimoniæ signum est. Turbationes, transitus. Nam mente motis dolores laterum desinunt: quibusdam febres, quibusdam non. Sed cum sudoribus. quibusdam autem cum turbatione, quibusdam verò cutis arida & circumtensa ac fuliginosa. Torpefactiones quales ex quilibus, & quales illi cui coxa. Per aures, ex auribus, plerunque tertio die moriuntur. Quibus cutes circum-

*Quartana
d quibus im-
munes præ-
stet tutoque
Deliratio
quibus pro-
fit.*

*Dolor auri-
um ma-
gnus tertio
die plerum-
que tollit.
Locorum
mutatio
quos iuuat.*

C tenduntur aridæ ac duræ, sine sudore: quibus laxæ sunt ac raræ, cum sudore moriuntur. In recidiuis mutationes pro-
sunt. His transmutare oportet ad ea quæ conueniunt, antea quàm male afficiantur, velut Cherioni. Quæ irritantur ex quilibus, stridulæ faucium asperitates terminum præseri-
bunt. Quibus quidem id quod sanum est, relinquitur, cau-
sa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deligato, aut ei-
cito, aut ressecato, aut exurito. Quibus verò non; non;

HIPPOCRATIS LIBER VI.

Sanguis de Quibus sanguis multus fuit ex naribus, qui quidem de- **D**
naribus flu- colores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus verò
ens quibus colores rubicundi, non similiter. Et quibus capita sunt quæ
proflu. facile tolteant, prodest: Quibus secus, non. Quibus nares na-
Quales sint tura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi mor-
qui nares hu- bosus sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, vice
midas ha- versa. Sputa rotunda, mentem emouent, veluti illi in Plin-
bent. thio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est quin-
Rotunda to die. Vrina multam subsidentiam habens, à mentis e-
sputa. motione liberat, qualis erat Dexippi. Post pilorum de-
Dexippus. fluuium, quartana febris non ultra annum. Aurium eru-
Piper den- ptiones æstate quinta die fiunt. Quandoque verò etiam diu-
tes iuuat. tius durant. Ita & circa ginginas, & circa nares suppuratio- **E**
Natura os- nes. Quibus in dentium dolore, de supercilio tenuia de-
sium, neruo- scendunt, his à pipere probè affricto postridie crassiora de-
rum, uenari- scendunt, si etiam alia non obtinuerint. Nam Hegesippo so-
carnis. & poriferum inditum non obtinuit, sed magis & violentius in-
cæterorum super prouocauit. Ofsium naturam ex capite colligere o-
qui cogno- portet, deinde neruorum, & venarum, & carnum, & aliorum
scatur. humorum, & supernorum ac inferorum ventriculorum, &
Lycinus. mentis, & morum, & eorum quæ per annum fiunt, tempore
 quodam anni præcociore, velut pustulæ & huiuscemodi. Si-
 mile enim est his quæ quotidie citius aut serius accipiuntur.
 id Similiter & biliosum, & sanguineum corpus atrabilia-
 rium fit, si non habet euacuationes. Lycino postremum
 splen magnus dolorosus, in quarta aut quinta. **F**

S E C T I O S E P T I M A.

Tussis. **T** Vsses cœperunt circa solstitia hyberna, decimaquinta
 aut vigesima die, ex frequenti australium & aquilona-
 rium ac niuosorum transmutatione. Ex his aliæ breuiiores.
 aliæ diuturniores fiebant, & post has multæ peripneumoni-
 cæ affectiones. Ante æquinoctium rursus plerisque reuer-
 rebatur, quadragesima vt plurimum ab initio die: & aliqui-
 bus sanè valde breues ac iudicatu faciles erant, aliquibus au-
 tem fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginæ abortæ.
Anginosi quibusdam leues syderationes, alijs Nyctalopes, atq; hi ma-
Lusios. gis pueris. Verùm peripneumonice affectiones valde breues
Syderati. erant. Fauiciū verò inflammationes post tussim, aut omnino
 parum

A parum pro tussi fiebant, atque hæc breues, magis autem Nyctalopes. Anginæ vero & leues syderationes, aut duræ & siccæ, aut paruæ & raro matura educentes: quibusdam vero etiam valde. Qui igitur aut vocibus amplius se fatigarunt, aut riguerunt, in anginas magis desierunt. Qui vero manibus laborauerunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui verò equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impotentiæ resolutoriæ obortæ sunt, & ad femora ac tibias lassitudo ac dolor. Durissimæ autē & violentissimæ tussēs erant quæ ad leuem syderationem ac resolutionem perducebant. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant. In principijs vero nō ita valde. Plerisque autem horum tussēs in medio remiserunt, sed perfecte non defecerunt, verum cum recidiua affuerunt.

*Vox labor
& cat-rou
tum qui fec
rati*

*Tussis uita
rietas.*

B Quibus voces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem, Quidam vero parum. Sed neque peripneumonica affectiones ulli horum fiebant, neque leues syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem præbuit, sed in sola voce iudicabantur. At vero Nyctalopica affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex alijs causis fiebant. Fiebant autem pueris maximè. Oculorum autem nigrae partes aliquantum variegabantur, quæ pupillas paruas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam paruos oculos habebat, & plurimi rectos capillos ac nigros. Cæterum mulieres non similiter à tussi afflictæ sunt. Verum pauca febricitarunt, & ex his valde pauca ad peripneumonicam affectionem deuenerunt, atque hæc seniores, & omnes superstites euaserunt, Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter velut viri prodirent, & quod nequaquam similiter ut viri morbis corripiuntur.

*Lustiosi
pueri qui
fuerunt.*

*Mulieres
aliter uexa
bantur.*

C At Anginæ liberis duabus oboriebantur, atque hæc mansuetissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & violentissimæ fiebant, ipsasque celerrime perimebant. Viris vero multis fiebant, qui partim euaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites ac toleratu faciles erant. Qui vero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus verò etiam venæ circa tempora & ceruicem attollebantur, his aliquantum malæ erant. Pessimæ ve-

*Angina
uexatio.*

HIPPOCRATIS LIBER VI.

ro his quibus & spiritus sublimis coëleuabatur. Hi enim **e** etiam incalescebāt. Nam sicut scriptum est, ita consortia affectionum habebant. Et quæ quidem primū scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant. Quæ verò posterius, non sine prioribus. Celerrimè autem moriebātur, vbi febrili rigore insuper riguissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non ventris turbatio, non venæ sectio, neque quæcunque alia tentavi. Secui etiam venam sub lingua, quosdam & sursum purgaui. Hæc igitur omnino in ætate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in siccitatibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur.

Sanguinis venarum suppressiones faciunt animi deliquiū. figura alterata, interceptio, linamētum intortum, appositio, **e** deligatio. Inguinum glandularumq; tumores plurimi fiebant, eo quòd hepatitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, veluti Posidonix. **P**osidonix. Quibus sanguis erumpebat, morientes fronte non exudarunt, sed velut contracti præ siccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male habebant. Ventrium abundantix turbationem ferunt, velut Posidonix: & quæ animalcula in aluo inducunt. In attenuatione circumtensio ante obitum, & vmbilicus oblongus ipsi protractus est: & gingivarum dentes ambientium exulcerationes. Multa de vnoquoque rectè præcipi possunt, quæ partim eadem possunt, partim non: velut est talia diffundi, exolui, & educi, & indu-rari, & maturari, & vbi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea quæ relinquunt. **f**

Hydropicos citius secare oportet, tabescentes statim v-rere, caput secare, & huiusmodi. Hydropicorum pecti-nem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multis genibus. Affectiones circa cor siue ventriculi o-sculum Xenarcho, & calidum aceruatim exspirare, & vlcus per euacuationem ab initio fouere. Vox qualis est irascen-tibus, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit. & oculi ta-les fuerint ex natura turbulenti, quales sunt vbi irascuntur hi qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, ve-lut verbi causa, Morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura æger fuerit, ex tali morbo superstes euadet: & alia eodem modo. Tussis laboriosæ contingunt locos læsos, & **maximè**

Xenarch?

Tabes.

*Tussis sic-
ca.*

- A** maximè articulos. Sed & in febribus lassitudinem inducentibus, tusses siccae ad articulos decumbunt cum febre, si inrus relinquuntur. Spiritus tabescentibus obscuri mali, & non parientibus, & quicumque alij tales ab eadem constitutione. Tabescentibus autumnus malus. Malum item ver, quum fici folia cornicis pedibus similia fuerint. In Perintho vere plurimi ægrotarunt. Simul causa fuit tussis per hyemem populariter vagata. & alijs quicumque diurni sunt morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Quibusdam vero diurni non sunt oborti, velut his qui dolores rhenales habent. Sed & alijs, velut homo ille ad quem Cyniscus me adduxit. Dolorum in lateribus, & pectore, & alijs partibus, tempora an multum differant considerandum est. Nam quum melius habuerint, rursus deterius habebunt, non delinquentes. In longis dysenterijs cibi fastidia mala, tum alias, tum si insuper febrierint. Vlcera circumglabra maligna sunt. Lumbos dolenti recursus ad latus, & pustulæ quæ seps vocantur. Rhenum affectiones non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Quæ in somnis exacerbantur, & quibus extremæ partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia quæ circa somnum fiunt eiusmodi: & quibus contraria.
- Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Apparentia in quibus mensibus fiunt.
- Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitate perficitur: & quicquid in nonaginta mouetur, in triplicitate perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia, diæta sicca opus habet.
- Quod citius discretum ac motum est, rursus augetur tardius, & ad longius tempus. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense: & secundo ac quarto.

Hæc ex parua tabula consideranda sunt.

Victus ratio sit repletionem, vacationem, ciborum, potuum. Mutationes horum qualia ex qualibus, prout se habent.

Odores delectantes, offendentes, implentes, placantes. Mutationes ex qualibus, prout se habent. Illabentes, ingressos aut egressos spiritus, aut etiam corpora. Sermones qui audiuntur, alij meliores, alij offendentes. Et à lingua ex qualibus qualia alliciuntur. Spiritus tanta calidi-

A Corpus, actio, in considerationem ducatur. Visus, auditus, nasus, tactus, lingua, cogitatio consideretur. Tumores in supernis palpebris relictī, dum alia circumcirca gracilescent, recidiuas faciunt: In extremitate verò subrubicundi, duri, & valde viscosi, & insurgentes ac inhaerentes in his sunt, velut Pharsalio Polymedi. Erumpentes tumores aut liuores, in lippitudinibus aut vlcerebus: Sed & quæ deferruntur ex tuberculis ac suppurationibus, quia signa sunt.

Polymedes

Circa mensem tormina circa vmbilicum, & dolores, quandoque à porro: Sed & ab alio his postea. Sacri ignes quibusdam à collo, & circa has partes, in facie iudicabuntur: Nigri etiam quibus à collo, mali erant: & si pustulae essent, malae erant: & quibus alius turbata esset. Adamantus a-
B trabiliarius à peplijs pluribus vomuit aliquando nigra, quandoque à cepis. Febres in quibus vlcerantur labia, fortassis intermittentes: & tertianis perfrigerationes. At amburentes statim ad manum soluuntur semper. Quales inest in articulis considerandum, an non suppurantur.

Adamantus

Consuetudo autem, ex quolibet sani degimus, victus modis, tegumentis, laboribus, somnis, rebus venereis, mentis affectionibus.

Quanta observatio medicorum debeat esse.

Quomodo morbos ferant, à quibus quæ figuræ, ad quos locos conuerſi sunt, quando coeperunt, affuerunt, deliuerunt. In quibus intemperans horrendus. Contrariae in morbo victus rationes, qui facile, qui ægrè toleratur. Victus rationes quantum fieri potest cognoscendæ. Nam non nosse, multarum calamitarum res est. Bonis autem medicis similitudines pariunt errores ac difficultates. Verum contraria facit causa & occasio. Scio quòd difficile est ratiocinari ac cognoscere vias, veluti si sit acuto capite, simus, subaridus, biliosus, ægrè vomens, facile vomens, niger, iuuenis qui temerè vitam degit: Hæc simul inter se consentire difficile est. Cui fistula refringebatur, tussiculæ permanere impediabant.

Similitudo

Cui apex hepatis complicatus erat, eum concussi, derepente dolor sedatus est. Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex vocabatur, hic quum annorum vigintiquinque esset, sæpe per somnum semen effudit: & interdium quoque frequenter ipsi prodibat. Quum autem ad annum trigessimum peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est.

Satyrus pollutione mortuus est

In Abd

HIPPOCRATIS LIBER VI.

Palæstra
custos. In Abderis palæstræ custos, qui Scheneus dicebatur, multum luctatus aduersus fortio-rem, & in caput lapsus, digressus multam bibit frigidam aquam. Postea illa nocte vigilæ obortæ sunt, angustia, & extremarum partium frigiditates. Postridie ingressus ad domum, & glandula aluo subdita, non subijt, verum parum minxit, prius autem nihil minxerat: ad noctem lauit, nihilo minus vigilæ & angustia aderant. delirauit. Tertia die frigiditas extremarum partium, excalefactus sudauit. pota autem aqua mulsa tertia die mortuus est.

*Melancholici comitialesque com-
municant.* Atrabiliarij, etiam comitali morbo corripitur plerunque solent, & vicissim comitiales fieri solent atrabiliarij, Vterque verò morbus magis fit, prout ad alteram partem inclinarit. Si quidem enim ad corpus inclinarit, comitiales fiunt. Si verò ad animum, atrabiliarij melancholici dicti.

Phaethusa Pytheas. In Abderis Phaethusa Pythææ vxor, priore quidem tempore fecunda erat: quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore suppressi sunt. postea dolores & rubores ad articulos oborti sunt. Hæc autem vbi contigissent, & corpus virile factum est, & hirsuta penitus euasit. & barbam produxit, & vox aspera facta est. Et quum nos omnia tentassemus, quæ ad menses detrahendos conferre visa essent, non prodierunt, sed mortua est, quum non ita multo tempore postea vixisset. Idem hoc contingit etiam Namysia Corgippi vxori in Thaso. Visum est autem omnibus medicis, in quos sane ego incidi, vnam spem esse, si menses secundum naturam prodirent, Verum & huic prolici non potuerunt omnia nobis molientibus, sed paulo postea mortua est.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS PO-

PVLARIBVS LIBER SEPTI-
MVS.

A



Ost canem febres fiebant sudorificæ, & non perfrigerabantur penitus post sudorem, sed rursus incallescabant: & leniter longæ, & iudicatu difficiles, & non valde siticulosæ. paucis in septimo & nono desinebant, alijs vndecimo, & decimoquarto, & decimoseptimo.

*Canis sy-
dus.*

*Polycra-
tes.*

Polycrati febris, & sudor, qualis descriptus est. à medicamento purgatio deorsum vehementer. & febris adeò lenis facta est, vt obscura consisteret, præterquam in temporibus. & sudores ad vesperam, circa caput, collum, pectus. Deinde rursus etiam per totum ventrem, & rursus incallescerebat. At circa duodecimum & decimumquartum febris aucta est, & modicæ alui subegestiones. post purgationem vsus est sorbitionibus. Circa decimumquintum dolores ventris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidorum appositio minus profuit quàm frigidorum. Quum infuso per clysterem molli vsus esset, cessauit dolor. Idem quoque Cleocydi profuit, ad

Cleocydes.

C

umbra desidens respirare solet, is qui per æstum inter fecit. Decima septima itaque die desidens in sellam, animi deliquium incidit, & multo tempore sine voce ac sensu iacebat, & vix aquam mulsam suscipiebat, fibras in collo distendens, vtpote faucibus resiccatis, ac omni virium exolutione præsentente. Vix itaque intra seipsum erat. & calores leniores fiebant. Postea verò desijt morbus vigesima secunda die. Pythodoro eodem tempore febris continua. octauo die sudor obortus est, & rursus incallescerebat. Decima rursus sudor. duodecima sorbuit succum. & vsque ad decimāquartam obscura erat, in temporibus autem cōparebat. & sine siti erat. & ipse sibi ipsi sanus esse videbatur. Sudores fiebant omni die. Decima quinta iusculum pulli sorbens vomuit bilem, & aluus infra exturbata est. & febris exacerbata est. rursus desijt. & sudores

*Pythodo-
rus.*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

dores fiebant multi. & corpus totum perfrigeratum erat, ex- **D**
 ceptis temporibus. Pulsus non defecit. Videbatur quieuisse
 modico tempore vt incallescere se putaret. Vigesimaquarta
 quū iam gustāret cibos multis diebus, & prāsus esset, multa
 erat febris, & ad vesperam delirium, accedente simul etiam
 somno. Detinebat itaque iam cōtinua & vehemens, & quā-
 doque vnam, quandoque duas noctes vigilabat reliquo verò
 tempore somnus abundē contingebat, vt operosum esset ex-
 citare. & delirium in somno. & si quando ex somno excitatus
 esset, vix ipse suiipsius erat. Sitis exors. Spiritus moderatus,
 talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post
 septimam recidiuæ succi exhibebantur. post decimam quar-
 tam cibus. Circa primos septem eructabat, ac reuomebat: **E**
 quandoque cum potu subbiliosum, citra anxietatem, donec
 aluus deorsum soluta est. Sudores post recidiuam defecerūt,
 nisi quis circa frontem esset tantillus vt vix significationem
 de se prāberet, lingua ex somno si non collueretur, subalba
 prā siccitate. & ruptiones vlcera circa ipsam, & in labio
 inferno, & circa dentes. alui egestionēs paucae. Circa decimā-
 quitam vt recidiua facta est, frequentiores & viscosæ. De-
 coctum malicorij sedauit ipsas. Vrinæ quales sunt diuturnæ.
 Sub vltimum tempus dolor pectoris deglutienti potum. &
 manus in pectore. Cuminum & ouum absorbēti sedatus est.
 linguæ raritas profuit. Quinquagesima à prima circa arctū-
 rum, sudores breues iuxta lumbos & pectus. & corpus perfrige-
 rabatur, exceptis temporibus, valde modico tempore. Pri- **F**
 ma & quinquagesima remisit, nec iterum apprehendit. Era-
 tolaus filius circa æquinoctiū autumnale dysentericus fiebat,
 & febris tenebat. Egestionēs alui erant biliosæ, tenues, mul-
 tæ, & moderatæ subcruentæ. Dolor autem ventris vehemēs.
 Vbi serum & lac bibisset, silice candefacta immissa, dolores
 & subcruentæ egestionēs moderatiores fiebant, sed biliosæ
 comitabantur: & sæpe ad exonerandam aluum surgebat, sed
 minore dolore. Febricula verò & ægroto, & multis, omnino
 nō adesse videbatur per omne tempus, post primos sex dies,
 adeò obscura erat. Verū iuxta tēpora pulsus erat. & lingua
 prā siccitate subalba. & moderatē liticulosus, & sine somno.
 Sorbitionibus autem iam utebatur & vinis. Quum iam ad
 decimum quartum diem peruenisset, tubercula circa aurem
 oborta

Eratolaus.

*Tubercula
aurium.*

A oborta sunt, tum alteram, tum vtrancq; dura ac cruda: omnia disparuerunt, moderatè autem dolorosa erāt. Quum autem non desinerent egestionēs, & semper biliosæ essent, absorbēti herbam in farina, biliosæ egestionēs & dolores ad tēpus aliquod mitiores facti sunt: liquidas verò multas sæpe egebat, & cibos valde auersabatur, & omni necessitate coact⁹ admittebat. Calor autē, & lingua, & sitis tales sequebantur quales dicti sunt: & sudores nulli. Obliuio verò huiusmodi quædam. Vbi interrogasset de eo quod paulò antea audiuiisset, modico interposito tempore rursus interrogabat: & rursus repetebat, velut qui non dixisset: & se desiderare obliuiscēbatur, nisi quis ipsum commonefecisset: & ipse sibiipsi conscius erat huius affectionis, neq; ignorabat. Spiritus qualis sano. Ultra trigesimum verò vsq; ad quadragesimum diem, & dolor vētris multum auēscēbat, & supinus decumbebat, & se conuertere ne tantillum quidem poterat: & quia dolor vehemens erat, alijs qui cibum exhiberent opus habebat. Alui egestio erat multa, & discreta, tenuis, & calores vinosi, quæcunq; tandem ingessisset, & quandoq; subcruenti. & cor poris dolor: colliquatio extrema, & impotentia: & ne alio quidem subleuante surgere amplius poterat. In medio verò umbilici ac ossis pectoris, circa hanc sedem adhibita manu, talis palpitatio erat, qualis neque à curru, neque à timore circa cor generari possit. Bibenti lac asinum coctum, nouem heminarum Atticarum mensura ad duos dies, biliosa purgatio vehemens oborta est, & cessauerunt dolores, & ciborum appetentia accessit. Postea verò bubuli lactis crudi quatuor heminas Atticas bibit, pro vice vna cyathos duos, in diem, primùm sextam aquæ partē ammiscens, & vini nigri austeri parum. Semel autem in die cibum capiebat ad vesperam. Panis erat ad mensuram dimidię choenice subcinceritius, & pisciculus petrosus simplex, aut caruncula capræ aut ouiculæ. Potus lactis post primos decē dies, ad quadraginta vsq; sine aqua, cum vini nigri modica parte. Post septuagesimum iam à primo diē, à balneo ad noctem, sudor exiguus obortus est. Vtebatur autem modico potu, & post cibum potu austeriore. Ctesicrati lac in farina magis quàm serum caprinū contulit, quum dolor esset circa totum ventrem, & dolores cum multa ad egerendum surrectione, ac subcruenta egestionē,

& tumor

Obluio huiusmodi quæ.

Ctesicrates

HIPPOCRATIS LIBER VII,

Adrianus & tumor circa pedes, ferè iam ad dies vigintiquinque esset. **D**
Caneas. Et Adriano eadem contulerunt. Verum Caneæ filio lac
Cydes. asinum coctum. Cydis filio circa solstitium hybernium

rigor & febris, & auris dextræ dolor, & capitis dolor. Talis
autem auris dolor statim à paruo puero ipsum comitabatur,
fluidus, fistulosus, & grauis odoris. Quum autem ita se habe
ret, plerunque doloris exors erat. Tunc autem dolor erat ve
hemens, & capitis dolor. secunda aut tertiadie bilis vomit
us: desidenti exonerandi ventris gratia, prodijt excremen
tum subbiliosum viscosum, velut ex ovo subpallidum. Quar
ta & quinta ad noctem aliquantum delyrabat: & dolor capi
tis ac auris vehemens, & febris. Sexta alui egestio à mercu
riali: & calor, & dolor cessasse videbatur. Septima velut san
nus. In temporibus autè dolor non defecit, sudor nullus ob
ortus est. **F** Octaua succum sorbuit, ad vesperam autè betæ suc
cum, & in noctem somnus: & valde doloris exors: & nona læ
tabatur ad solis occasum. Verum ad noctem capitis & auris
vehemens dolor. Contigit quoque aurem pure manare cir
ca hoc tempus quum maximè doleret statim à principio. To
tam verò noctem nonam, & sequentem diem, ac noctis ma
gnam partem, neminem noscebat. Verù suspirans perseuera
bat, in die verò intra seipsum erat: & dolores cessabant, & ca
lor moderatior erat. Quum autem sorbuisset mercurialem,
vndecima egeffit per aluum pituitosa, mucosa, maleolentia,
duodecima & decimatertia moderatè habebat. Decimaquar
ta initio mane facto, vsq; ad meridiè per totum corpus suda
bat cū somno & sopore multo, vt operorum esset ipsum exci
tare: ad vesperam experrectus est, & corpus quidem modera
tè perfrigeratum est, in temporibus autem pulsus perseuera
bat: decimaquinta & decimasexta succis vsus est. Decimase
ptima venit rursus dolor eorundem ad noctem, & delyrium:
& pus fluebat. Decima octaua & decimanona ac vigesima, in
sani modo degebat. Vociferabatur autem attollere seipsum
nitens, sed capiti dominari non potens, manibus protentis
semper aliquid frustra venabatur. Prima & vigesima sudor
exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vigesima
secunda sudor circa faciem plurimus erat. Voce autem hoc
tempore, si quidem valde conaretur, quæ volebat perfe
ctè loquebatur. Si verò ex tempore citra conatum semiper
fecta.

A fecta. et os exolutum. et maxillæ et labia semper in motu, velut qui loqui vellent. et oculorum frequens motus ac intuitus. et color in dextro oculo velut dictum est, subruentus. et palpebra superna intumuit. et iuxta maxillam rubor in fine. et venæ omnes in facie manifestæ adeoq; contractæ. et oculis non amplius nictabat, sed intentè intuebatur, et palpebras diducebat ad supernam partem, velut fieri solet vbi quid in oculum incidit. et quum biberet, descendens potus in pectora et ventrem strepitus audiebatur, qualis et Charadii. Spiritus leniter semper moderatus. lingua qualis est peripneumonici cum pallore albicans. ab initio et semper capitis dolor. Collum semper immobile vt vnà cum capite circumgeretur opus habebat. et pars secundum spinam ex collo recta ac inflexibilis. decubitus quales dicti sunt, et nō semper supinus decumbebat. At pus iam serosum album, multū negotij ad detegendum cum spongijs exhibebat. odor eius valde excellens, circa postremum tempus pedum contactum non valde percipiebat. *Harpalidæ* sorori prægnanti circa quartum aut quintum mensem, tumores circa pedes aquosi fiebant. et oculorum cauæ partes intumescebant. et totum corpus in tumorem eleuatum erat, velut in pituita alba affectis, tussis sicca. rectæ ceruicis spiratio, et eiusmodi anhelatio. et quandoque strangulationes à spiritu, vt sedens in lecto perseveraret. decumbere autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine febre erat leniter. et foetus ad plurimū tempus immobilis erat, veluti corruptus, et translabebatur. Comitabatur autem anhelatio ferè ad duos menses. At quum fabis melle ammixto, et eclegmate mellis vsa esset, et Aethiopicum cuminum in vino bibisset, melius habuit. Postea tussiendo eduxit multa, matura, pituitosa, alba, et spiratio illa cessauit. peperit autem foemellam. *Polycrates* vxori ætate circa caniculæ sydus febris. Spiritus matutinus minor, à meridie magis et paulò densior spiritus. Tussis et excreatio statim ab initio, similis purulentis. Intus circa arteriam et fauces sublibilabat stridula asperitate, facies boni coloris. in maxillis rubor, non abundè coloratus, sed leniter floridus. Progressu verò temporis et vox rauca, et corporis colliquatio. et circa lumbos eruptiones. et aluus circa postremum tempus liquidior. Se-

HIPPOCRATIS LIBER VII.

*Vetula lan-
guens eua-
sit.*

Vactor.

ptuagesima die febris extrinsecus valde friguit. in tempori- **D**
bus autem quies. Spiritus verò frequēti-
or fiebat. Verum post
hanc quietem spiritus densior, adeò vt sedens perseueraret,
donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat. sudores
prauī. intuitus valde modesti, vsque ad extremum tem-
pus. Dies accefferunt ipsi perfrigeratæ plures quàm quin-
que. Post primos autem purulentum exscireare perseuera-
bat. Mulieri supra portas habitanti iam seniori febricu-
la oborta est: quæ quum iam desineret, colli dolor vsque
ad spinam & lumbos, & harum partium non valde potens
erat. Maxillæ erant compactæ. & dentes in seipsos, plus
quàm vt specillum admitterent. & vox balbutiens, eo quòd
resolutum, & immobile ac debile esset corpus. prudens ta- **E**
men erat. Calefactorijs & aqua mulsa tepida, tertia ferè die
hæc laxauit, & postea succis & iusculis sana euasit, id quod
ad finem autumnalis temporis contigit. Apud Harpalidem
vñctor, crurum ac manuum impotentior circa autumnum
factus, bibit temerè medicamentum sursum ac deorsum pur-
gans. ex purgatione febris. & ad arteriam defluebat fluor,
qui loquentem impediret, & faceret vt inter loquendum an-
helaret, similiter vt anginosus raucosus. Strangulatio deglu-
tienti, & alia quæ in angina. Verum tumor non erat. Febris
autem & tussis augetur, & excretio liquidæ ac multæ
pituitæ. Progressu temporis & dolor circa pectus ac mam-
mam sinistram. Quum autem exurgeret, aut cōmoueretur,
anhelatio multa, & sudor à fronte & capite. & faucium affe- **F**
ctio mollior erat, dolore ad pectus descendente. Ab initio
igitur fabis melle ammixto utebatur. Postquam autem fe-
bres detinebant, magis aceto mulso calido, & mellis delin-
ctu multo. Vbi præterijssent dies quatuordecim omnia desi-
uerunt. & manuum ac crurum non longè postea potens fa-
ctus erat. Chartadi febris ardens, vomitus bilis multus, &
infra alui egestio. vigiliæ, & iuxta splenem tumor rotundus.
Tertia die mane surrexit, strepitu circa ventrem citra do-
lorem percepto. Vbi verò aluum exoneraret, sanguinis re-
centis plus quàm congiij mensura subiit. & vbi iterum atque
iterum cohibuisset, grumi concreti. anxietas circa cor & os
ventriculi & sudor per totum ferè corpus. & febricula frige-
scere videbatur. & primùm prudens erat, progrediente verò
die, &

- A** die, & inquietudo maior, & anxietas, & spiritus paulò densior, & confidentius ac benignius quàm pro tempore homines compellabat, ac excipiebat, & quædam animi deliquia accedere videbantur. Quum autem exhiberent aliqui succos, & aquam de farina crassa in ipsa macerata, non cessauit: sed spiritus, ad vespërâ valde multus erat. & iactatio multa, & ad dexterâ, & ad sinistra transmouens seipsum nullo tempore quiescere poterat, pedes frigidi. In temporibus & capite calor magis propinqua iam morte, & sudores multi, & bibenti strepitus audiebatur, circa pectus & ventrè, descendentis potus. Quod verò pessimum erat, vbi dixisset sibi aliquid infra subire velle, & oculis intente intuitus esset, non diu se
- B** cohibens mortuus est. Hermoptolemi vxori hyemis tempore febris, & capitis dolores, & quum bibisset, vt quæ difficulter deglutiret, surrexit, & cor se sanasse dixit, lingua liuida ab initio. Occasio videbatur ex horrore post balneû facta esse. Vigilabat & nocte & die. Post primos dies interrogata, non adhuc solùm caput, sed & totum corpus se dolere dixit. Sitis quandoque vehemens, quandoque moderata. Quinta & sexta & vsque ad nonam fermè deliriû, & rursus ad seipsam loquebatur semiperfecta cum sopore, & aliquando manum ad dealbatum parietem protendebat, & puluim quendam frigidum ad caput situm, etiam pectoribus adhibebat, & stragula quandoque reijciebat, & in oculo dextro subcruentum quid erat, & lachrymabatur. Vrina autem erat quæ in
- C** pueris semper pessima est. Ex aluo egerebat ab initio quidem subfulua, postea verò aquosa valde, & huiusmodi coloris. Vndecima moderatius calida esse videbatur, & quandoque sitis exors fiebat, adeò vt nisi quis dedisset, non peteret. Somni post primùm tempus contingebant moderatè interdium, ad noctem vigil erat, & ad noctem magis dolebat. Nona venter exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam vndecima. Sequentibus verò moderatè multum ad egerendum surgebat, & talis egestio erat. Erant autè in prioribus diebus indignationes & eiulationes, velut pueri, & vociferatio, & timores, & circumspectiones, vbi sopore excitata esset. Verùm decimaquarta operosum erat ipsam continere exilientem ac clamantem derepente & pertinaciter, velut ex plaga, & vehementi dolore ac timore, velut si quis ipsam

*Hermo-
ptolemos.*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

apprehensam modico tēpore detineret. Deinde rursus quie- D
 tem habebat, & sopore pressa dormiens perseverabat omni-
 no non videns, quandoque neque audiens, & totam hanc
 diem ad utrumque, modo ad tumultum, modo ad quietem
 transmutabat. Sequenti nocte per aluum subijt quid cruen-
 ti, velut mucosum: & rursus velut limosum: postea prasina
 valde ac nigra. Decimaquinta repentinæ iactationes, & ti-
 mores, & vociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem effera-
 tio, & indignatio, & eiulatio, nisi ipsi cito quod vellet porre-
 ctum esset, & cognoscebat quidem omnes & omnia statim
 iam post primos dies, & oculi subcruentū illud sedatum est.
 Verū infania iuxta temporis occasionem, & vociferatio, &
 mutatio prædicta sequebatur ad soporem, audiebat inæqua- E
 liter, aliqua valde, & si submisit quis loqueretur: aliqua ve-
 rò clarius eloqui oportebat. Pedes semper æqualiter cum re-
 liquo corpore calidi, vsque ad extremos dies. Verū deci-
 masexta minus. Decima septima moderatius quàm alijs die-
 bus habens, ad noctem horrore ipsi oborto, se cōtrahens ma-
 gis febricitabat, & sitis multa erat, reliqua similia sequeban-
 tur. Tremores autem circa manus fiebant, & aliquantū con-
 cutiebat caput, & oculorū intuitus pravi, & sitis vehemens,
 vbi bibisset rursus postulabat, & rapiebat ac large bibebat.
 neque auellere ipsi poterant, lingua sicca, valde rubicunda.
 & os totum ac labia vlcera erant ac sicca, & ambas manus
 ad os admouens manducabat quum tremula esset, & si quis F
 aliquid ad manducandum aut sorbendum obtulisset, large ac
 furiosè deglutiebat ac sorbebat, & signa circa oculos mala.
 Diebus autem tribus aut quatuor ante obitum, horrores
 quandoque incidebant ipsi, adeò vt contraheret corpus, &
 contegeretur, & anhelaret, crura distendebantur, & pedes
 frigidi erant. Sitis similis, & mentis affectiones similes, &
 surrectiones ad egerendum aut inanes, aut paucis & tenui-
 bus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema
 tertia & vigesima, oculus magnus mane erat, & circumspe-
 ctio brevis, & quietem agebat, quandoque etiā absque con-
 tectione ac sopore. Ad vespeream verò dextri oculi motus,
 qualis videntis, aut aliquid volētis, ab externo angulo ad na-
 sum, cognoscebatque & interroganti respondebat. Vox post
 multa subblāsa, & præ vociferatione fracta ac raucosa.

Amph

- A** Amphiphradis filio æstate lateris sinistri dolor, & tussis. *Amphi-
phrader.*
& alui egestiones multæ, aquosæ, & subbiliosæ, & febris cessasse videbatur circa septimam. Tussis aderat. Color subalbidus ac subpallidus. Circa duodecimam cum virore subpallidum spuebat. Spiritus pgressu morbi semper densior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus & arteriam. Sorbitionibus utebatur. prudens per omne tempus. circa vigesimā octauam mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras. *Caupo.*
- B** Caupo peripneumonicus. alius statim subibat. Circa quartam sudor multus. febricula cessasse videbatur. tussicula nulla, vt ita dicam. Quinta, sexta & septima detinebat febris. sudor octaua. Nona excreauit pallidum. decima subibat alius aceruatim nō sæpe. circa vndecimam mitius habebat. Decimaquarta sanus. Hermoptolemo post pleiadis occasum febris accessit. Tussis non valde. lingua peripneumonica. nona exudauit. totus frigidatus est, velut videbatur. obtulerunt ipsi succum. circa meridiem calefcebat. Vndecima sudor. & alius erupit biliolis egestionibus. Tussicula accessit. Decimaquarta pallidum excreauit. & stertebat Decimaquinta quum per totum tempus prudens mansisset, mortuus est. Alius quidam in palato stertens. lingua sicca, peripneumonica, prudens mortuus est. Et Posidonius ad huc æstate instante, iuxta pectus, & præcordia, & latus, multo tempore dolebat, citra febres. Multis autem annis antea suppuratus fuerat. hyeme verò quum inhorruisset, dolor augescebat. & febricula tenuis. & excreatio purulenta. tussis cum stridula asperitate circa fauces. & stertens. quum prudens esset mortuus est. Balis filius quum ex monte penitus aberrasset, sexta lingua praua, subrubra. & vocem læserat inter aberrandum. oculi colorati, natantes velut dormitantium. color reliqui corporis non valde velut in morbo regio, sed subpallidum, liuidum. vox praua. lingua obscura, peripneumonica. non prudens. Spiritus ad manum malus, non densus, neque magnus, frigidi pedes lapidosi. Circa nonam mortuus est. Quædam apud Metronem anginosa, dexteram manum ac crus doluit. Febricula tenebat debilis suspiratio die tertia remansit. Septima cōuulsa. vox intercepta. Stertor. dētium collisio ac consertio, maxillarum rubor. Hæc non longè vitam protraxit, quinta aut sexta mortua est. Si-

*Angino-
sus perit.*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

- Bionhydropicus.** gnum circa manum subliuidum. Bion ex hydropico diu-
turno cibū auersabatur ad multos dies. et vrinæ stillicidio
vexabatur. In sinistro genu abscessus fiebat. suppuratus est.
Cusiphon. mortuus est. Cteliphon hydropicus ex febre ardente mul-
ta. et prius hydropicus ac splenicus, valde repletus est et scro-
tum, et crura, et peitoneum membranam aluum ac intestina
ambientem. Ad finem tussis et suffocationes fiebant ad no-
ctem, magis à pulmoue, velut pulmonicis ac tabescentibus.
Tribus aut quatuor diebus ante diem obitus, rigor. febris.
circa femur dextrum intus ad venam mediam ab inguine
collectio velut ignis feri, subliuidum habens ruborem. ad
noctem cordis ac oris ventriculi dolor. et non longè postea
vocis interceptio strangulatio cum stertore. et mortuus est. **E**
- Prodromus.** Et in Olyntho hydropicus, de repente voce priuatus, no-
ctem et diem desipiens, mortuus est. Prodromi filius, æsta-
te subblæsus, æstuosus. lingua ipsi subarida, obscura. egestio
Leophorobidæ. alui deorsum multa. Superstes euasit. Leophorbidæ febris
acuta post solstitium hybernium. præcordiorum et ventris
dolor alui egestionis liquidæ, biliosæ, multæ. et interdiu so-
porosus. lingua peripneumonica. tussis non inerat. Duode-
cima nigra pauca et prasina egeffit. Decimaquarta febricu-
la cessasse videbatur. Postea verò sorbitionibus utebatur.
Decimasexta os valde salsuginosum siccum fiebat. ad sum-
mam vesperam horror, febris. Vigesima prima circa meri-
diem rigor, et sudor. febris desijt, verum calor adhuc sub-
erat tenuis. ad noctem rursus sudor. et vigesima secunda ad **F**
noctem sudor. et calor remisit. At prioribus diebus omnibus
sine sudore erat. Aluus autem humecta fuit etiam in putata
postea recidiua. Quæ supernè habitabat Theoclis cogna-
Theocles. ta, sub pleiadas febris acuta. sexta videbatur cessasse. lauit
velut febre sedata. septima mane maxilla valde rubicunda,
vtra nō memini. In vespera febris venit multa. et animi de-
liquium, et vocis interceptio erat. non longè verò postea su-
Theodorus dor. et quies cessante morbo septima die. Theodori vxori
in febre vehementi sanguinis eruptio facta est, hyeme. v-
bi febris desijisset circa nonam: non longè postea, lateris de-
xtri velut ab vtero grauitas. Sed et primū, et sequētibus die-
bus, obortus est dolor vehemens iuxta pectus. et fomento ad
latus dextrum adhibito, remiserunt dolores quarta die. spūs
denūtor

A densior.arteria vix respirās subfibilabat.et supina difficulter se vertere poterat.ad noctem febris acutior , et delyriū breue fiebat. Quinta mane mitior esse videbatur. sudor de facie diffundebatur primū modicus: deinde inulto tempore per totum corpus ac pedes. Postea verò videbatur ipsi febris remisisse. Erat autem ad manum frigidius corpus arteriarum. Quæ verò in temporibus sunt etiam magis saliebant,et spiritus densior,et aliàs atque aliàs delyrabat.et omnia ad deterius:lingna perpetuò alba valde:et tussis non inerat,nisi tertia ac quinta die ad breue tempus. Sitis non erat. Spuratio erat.Præcordium dextrum valde eleuabatur circa quintam. verū postea mollius.egeſtio tertia die à balneo stercoris modici. Quinta rursus liquidi modici. Vēter autem mollis.Vrinæ acerbæ,cineris speciem referentes. oculi velut delassatæ difficulter suspiciebat ac circūferebat oculos. Quinta ad noctem ægrè affecta fuit,& delyrium sequebatur. Sexta rursus eadem hora qua plenum solet esse forū,multus sudor diffundebatur,incipiebat à fronte ad totum corpus.ad multū tempus prudenter res suas disponebat. ad meridiem verò valde delyrabat.& perfrigeratio similis erat omnia verò circa corpus grauiora.Ad vespērā tibia ipsius ex cubili decidit,& puer præter rationē minabatur,& rursus silebat,& ad quietem conuertebatur.Circa primū somnum sitis multa, & infania, & erecta sedebat,& præsentibus conuiciabatur.& rursus conticuit,ac in quiete erat. & videbatur reliquum noctis sopore pressa esse. Verū oculos non claudit. Ad diem indicabat pleaque nutibus,corpore quiescens,& moderatè intelligēs. Sudor rursus eadem hora.similiter oculi demissi, ad infernam palpebram magis incumbentes,rigidè ac stupidè intuentes. albæ oculorum partes pallidæ & mortiferæ.et totum corpus pallidum ac nigrum.manum plerunque ad parietem,aut ad stragula habebat. strepitus autem habēri magni fiebant, respuebat.et sursum ad nasum absorbebat. et floccos legebat. et faciē obuclabat. Post sudorem manus velut in glaciē congelatę.sudor sequebatur frigidus.corpus ad manum frigidū exsilebat,vociferabatur.insaniebat.spiritus multus. manus tremulæ fiebant,sub mortem progressæ iam etiam cōuulsæ. septima die mortua est. Sexta die in nocte stratum modicè perminxit,quod minxerat de festucis detrahebat viscosum,

HIPPOCRATIS LIBER VII.

*Antiphane-
ses.*

genitura simile. Vigilabat per omnes dies, post sextā vrina D
subcruenta. Antiphanis filio hyeme, lateris dexteri do-
lor, tussis, febris, edebat, deambulabat etiam febriens. Vide-
batur ruptio facta esse. nona remisit. febris non reliquit. tussis multa. & crassa ac spumosa spuebat. latus dolebat. Circa
decimam quartam & rursus vigesimam febres desinere vide-
bantur, & rursus corripiebant. erat autem calor tenuis, &
parum quid relinquebat. Tussis quandoque deficiebat, quan-
doque abundabat, cum multa suffocatione. Tunc verò remit-
tebat. & excretio post hos dies multa, cum strangulatoria
tussi. & purulenta supra vas efferuentia ac spumantia prodi-
bant. & in faucibus plerunq; stridula asperitas subsibilabat.
anhelatio semper detinebat, & spiritus densior. rarò bene E
spirabat. Ultra quadragesimum diem, prope sexagesimum
opinor, oculus sinister excæcatus est, cum tumore, sine dolo-
re: nec longe postea etiam dexter. & pupillæ valde albæ ac
siccæ fiebant. & mortuus est post excæcationem, non pro-
gressus ultra septē dies, cum stercore ac multa deliratione.

*Thessalio-
n Polemar-
chos.*

Similia & ex similibus eodem tempore contigerunt etiam
Thessalioni, feruentia, & spumantia, & purulenta, & tusses,
& stridula asperitates. Polemarchi vxori hyeme anginosę
tumor sub gutture. febris multa. vena secta est. cessauit stran-
gulatio ex faucibus, febris comitabatur. Circa quintam ge-
nu dolor & tumor sinistri, & circa cor dixit sibi videri ali-
quid colligi. & respirabat velut respirāt. hi qui sub aquā mer-
si fuerunt. & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore F
loquuntur, engastrimythi, quali ex ventre loquentes appel-
lati. Tale quid cōtingebat. Circa octauam aut nonam ad no-
ctem alius prorupit, ac liquida multa, acruata & graeolen-
tia egeffit. vox interceptiebatur. Mortua est. Aristippus in
supernum ventrē violenter ac grauiter sagittæ ictu petitus
est. ventris dolor vehemens. & breui ardebat. deorsum verò
nihil egerebat. anxius erat. biliosa abundē colorata quum vo-
muisset, melius habere videbatur. Paulò post dolores rursus
vehementes. & venter similiter ardebat. velut in voluulis. ca-
lores & sitis. in septem diebus mortuus est. Neapolis per-
cussus similiter, eadem passus est. acri infuso per clysterem
immissio, alius deorsum erupit. color per corpus diffusus est
tenuis, pallidus, niger. oculi squallidi, stupore rigidi, intus
conuer

Aristippus

Neapolis.

A conuerſi, intentè intuentes. Et qui in hepar percuffus eſt iaculo, ſtatim color qualis eſt mortuorum per corpus diffuſus eſt. oculi caui. anxietas, moleſtia. Mortuus eſt prius quàm cōcio ſolueretur, in qua die percuffus eſt. Qui caput percuffus eſt lapide à Macedone ſupra tempus dextrum, ita vt fiſſura ſaltem facta diſſectio contigiffet, vertigine affectus eſt & cecidit. Tertia die voce deſtitutus erat. anxietas. febris non valde vehemens. pulſus in temporibus velut tenuis caloris. nihil audiebat, neque ſapiebat, neque quieſcebat. humiditas circa frontem, & ſub naſum, vſque ad mentum. Quinta mortuus eſt. Eniates in Delo iaculo percuffus eſt retrorſum in latus, iuxta ſiniſtram partem. vlcus quidem ſine dolore. Verùm tertia die ventris dolor paruus. non egerebat. inſuſo per clyſterem immiſſo, ſtercus prodibat, & dolor deficiebat. ſedes extra ad ſcrotum extabat. quarta die etiam ad pubem, & totum ventrem, dolor vehementer irruebat. quieſcere non poterat. bilioſa vomuit abundè colorata. oculi cum virore pallidi, quales in animi deliquijs. Poſt quintā mortuus eſt. Erat autem calor quidam tenuis in ipſo. Billo percuffo in dorſum, ſpiritus multus per vulnus cum ſtrepitu prodibat, & ſanguinem fundebat. Verùm deligatus emplastro cruentis vulneribus commodo, ſanus euasiſit. Contigit & infeli-ciſſimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris. Deinde liuefactum eſt os. mortuus eſt. Et Phaniæ & Euergetæ filio, liuefactis oſibus, & febricitantibus, cutis ab oſſe diſceſſit. & pus ſubtus depaſcebatur. His dum perforarentur, ex ipſo oſſe egreſſa eſt ſanies tenuis, ſeroſa, ſubpal-lida, graueolens, lethalis. Contingit autem talibus etiam vomitus accedere, & ad ſinem conuulſiones: & vt clangoroſam vocem edant, ac impotentes fiant, & ſi in dextris fuerit vulnus, in ſiniſtra parte: ſi verò in ſiniſtris, in dextra. Theodori filio nona die in ſole verſato, febris acceſſit decima die, ex denudatione iuxta os nullius momenti. In febre verò denudarum eſt. diſceſſit cutis. multum clangoroſus erat. Vig-eſima ſecunda venter eleuatus eſt maximè circa præcordia. Vig-eſima tertia mortuus eſt. Quibus oſſa fracta fuerint, his ſeptima die febres. Si verò calidus fuerit tempus, etiam citius. At ſi magis fracta fuerint, etiam euſtigio. Et Exar-modi ſamulus ſimiliter dolorè habebat ad femur, non è di-

*Eniates.**Billo.**Phaniæ
Euergetes.**Theodorus**Exarmod*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

recto vulneris. & factus est clangorosus. & colli erat dolor. D

*Posidocreo
Isagoræ.*

Et Posidocreon tertia conuulsiō. calor non relinquebat. mortuus est die decimoctauo. Isagoræ filius percussus est retro in caput, contuso ossē ac nigrefacto quinta die superstes euasit. os autem non discessit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum medium, & os dextræ manus confregit. inflammatio successit. & marcor. et febris. subpurgatus est. quinta calores moderatē remiserint, itemque dolores. de digito quid decidit. Post septimum diem sanies exibat leniter. Postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictio facta est opisthotonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ consertæ, et ad coluin rigidæ. Tertia die totus conuellebatur in posteriorem partem, cum sudore.

Harpalus.

Sed à prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepti, inflammatus est, et valde dolorosus erat. et ubi repositus est, et dolor remisit, proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit. lauit. maxillæ ad noctem conserebantur. et opisthotonus aderat. saliuā spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiam aut malleolum vlcus, iuxta neruum iam purum. Huic à pharmaco corroso contigit, vt opisthotono moreretur.

Thrinon.

Menon.

Menoni sub arcturum et prius, ex febre æstiuā, et alui profluuiō ægrē affecto, et ex itinere delassa. to, dolor lateris sinistri et tussis quæ ex destillatione quidem etiam prius aderat, verum tunc valde intenta erat, et vigilabat. et febrem statim ab initio ægrē ferebat. et erectus sedens tertia die spuebat pallidum. arteria ex stertore subbibulabat. Circa quintam spiritus moderatē densus. pedes tibiarum, extremæ partes plerunque frigida, et extra stragula. alui egestio ab initio fiebat biliosa, neque valde modica, neque multa. septima, octaua, et nona, leuius ferre videbatur, et somni aliquid contingebant. et quæ exscreabat crudiora erant. decima, et vsque ad decimamtertiam, alba et pura. et præcordium mollius fiebat. sinistrum tamen distentum. et melius spirabat. Subdita glande moderatē alius subijt. Decimatercia rursus pallidū spuebat. Decimaquarta magis. Decimaquinta prasimum. Aluus autem maleolentia, biliosa, liquida, multa demisit. sinistrum præcordium eleuabatur. Decima

- A** cima sexta autem etiam valde intumuit. & spiritus iam ster-
torosus. sudor circa frontem & ceruicem. raro ad pectus. ex-
tremæ partes, & frons, leniter permanebant frigida. Salta-
tio verò venarum circa tempora detinebat. Somni soporosi
noctem ac diem postremo tempore. Vrina ab initio cruda,
cineris speciem referens. Circa decimā, & vsque ad decimam
tertiā tenues, & nō decolores. Verū à decimatertia qua-
les ab initio. Cleocho lateris dolor & febris. remisit febris, *Cleocho.*
sudauit per totum corpus. In vrina multa erant quæ fereban-
tur ac innatabant. postea turbata est. Circa Pleiadum occa-
sum Olympiadē vxorem, foetum octimestrem gestantem, ex
casu febris acuta corripuit. lingua æstuosa: sicca, aspera, palli-
da. oculi pallidi. & corpus mortiferū. foetum corrumpit quin-
B ta die facilè liberata est. & somnus vt videbatur soporoso-
vesperi excitantes nō sensit. sternutatorium adhibitum per-
cepit. potionem suscepit & succum. deglutiens potionem ali-
quantum tussiuuit. vox non soluebatur, neque ipsa quicquam
alleuabatur ex morbo oculi tristes ac submissi. spiritus subli-
mis per nasum trahebatur. color prauus. sudor circa pedes, &
crura, vbi iam morti propinqua esset. mortua est. *Nicolaus.*
concupinæ ex febre ardenti, abscessus iuxta horam fiebant
ab vtraque parte, paulo posterius alter, quum iam febris re-
mittere videretur, velut tumor laxis. Circa decimum quar-
tum magni citra signa sedati sunt. recidiua facta est. Color
qualis mortuorum, lingua aspera, valde densa, subalbida. Siti-
culosa. alui egestio deorsum multa, liquida, male olens per
C omne tēpus. Ante finem corruptum est corpus præ multitu-
dine egestionis. Mortua est circa vigesimum diem. *Andreas*
ante pleiadem horror, febris, vomitus. Ab initio semitertia-
na apparebat. Verū tertiana erat. Quum rursus in foro versa-
retur, inhorruit. febris acuta. vomitus bilis meracæ. delirium
ad noctē quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter.
Sexta à mercuriali probè egeffit aluus. Septima difficilior
& sequētibus iam diebus febris magis cōtinēter affligebat,
& sine subdore ab initio, et siticulosa. Maximè verò os relic-
cabatur, et potionē nullam libenter admittebat, quum mul-
ta iniucūditas circa os esset, lingua sicca, inarticulata, asperi-
tas efflorescebat, cum pallore albicans. Vigil, anxius. exolu-
tus, fractus, lingua præ siccitate quādoq; subleſa, donec ma-
defecit

HIPPOCRATIS LIBER VII.

defecisset. succum maxime admittebat. Nona aut decima cir-
ca aurem sinistram, atq; etiam alteram, tumores parui citra
signa apparuerunt. Urinæ semper non decolores, verum sine
subsidentia. Decimaquarta sudor circa supernas partes non
multus, sed moderatior. Color circa decimam septimam eua-
nuit. Alius post decimam sicca, citra glandem subditam non
egerens. Circa vigesimam quintam pustulæ per totum corpus
pruriginosæ calidæ, velut igne ambusta. Dolor autem erat cir-
ca locos sub alis, & latera: transiit ad crura citra signa, & de-
siuit. Balneum proderat & vnguenti illitio cum aceto. Mense
verò secundo aut tertio fortassis, ad rhenes dolor, qui etiam
antea quandoque fuerat, sedatus est. Aristocrati circa sol-
stitium hybernium lassitudo, & horror, & calor. Postea tertia
die incepit lateris dolor itemque lumborum. & tumor sub
alis intium sumens, per totum dextrum latus durus, rubicu-
dus, liuidus, velut ab igne celefactus & inustus. anxius. om-
nia moleste ferens. valde siticulosus. lingua subalbida. Urinæ
non procedebant. crura subfrigida. alui egestio à mercuriali
modica, liquida, subalbida spumosa, ad noctem spiritus ele-
uabatur. sudor circa frontem. partes infernæ frigidæ. collum
inflabatur. tussis non inerat. mortuus est prudens. Onesia-
naëti circa autumnum lippitudo. postea verò febris quarta-
na. Incipiente quartana cibos valde adursabatur, in progres-
su verò libenter accipiebat. Sed & Polichari in quartana,
similia circa cibum accidebant. Mnesianaëti alui egestio
ante febrem, & postea, ad multum tempus sequebatur, multis
albis mucosis prodeuntibus: & quandoque paucis sanguine,
citra dolorem. Strepitus autem in ventre. Post febrem absces-
sit citra sedem tuberculum durum, quod multo tempore in-
concoctum comitabatur, erupit ad intestinum, & foris fistu-
losum fiebat. Deambulante verò ipso in foro, splendores præ
oculis obuersabatur, & solem non valde videbat, Quum au-
tem parum discessisset, extra seipsum erat. & collum conuul-
sum est. Postquam autem domum deportatus est, vix suspe-
xit, & ipse vix sui ipsius erat. Primum autem collustrabat cir-
cunstantes. & corpus perfrigeratum est. vix verò recalfactus
est vtriculis & fomentis adhibitis. Postquam autem ipse intra
seipsum esset, & exurgeret, non volebat exire, sed timere di-
xit. Si verò quis de grauibus morbis differeret, subducebat
se præ

*Aristocra-
tes.*

Onesianaëx

*Polychares
Mnesianaëx.*

E

F

- A** se præ timore. Quandoq; etiam caliditatem sibi ad præcor-
dia allabi dixit, & oculorū splendores comitari, & alui ege-
stio multa, & sæpe, & similis h̄veme cōtingit, facta est venæ
sectio, datum est veratrum, bibit lac bubulum, prius autem
asininum, contulit, & alui egestionem sedauit. Aquæ potus ab
initio, deambulationes quoq; & capitis purgationes. *Anecher-
us.*
- B** cheri filio hæc cōtingerunt, h̄veme in balneo dum vngeretur
ad ignem, calefactus est, & statim in comitiales cōuulsiones
incidit. Postquàm verò multæ factæ essent cōuulsiones, cir-
cumspect, nō apud sese erat, quum autem intra seipsum esset,
rursus postridie mane correptus est ac conuulsus, spuma non
valde. Tertia lingua inarticulata. Quarta per linguā signi-
ficabat. Quinta loqui nō poterat, sed in principiis nominum
hærebat lingua valde, & conuulsio fiebat, & extra sese erat.
Quum verò hæc remitterent, lingua vix in suum statum re-
stituebatur. Sexta abstinebat ab omnibus, & sorbitione, &
potu, & à nulla ampliùs affectione corripiebatur. *Cleochus.*
- C**leocho ex lassitudinibus ac exercitijs melle per dies aliquot vtenti,
tumor ad genu dextrum obortus est. Immo potius ad infer-
nam partem circa tendines sub genu, circumibat subclaudi-
cans, & sura intumescerebat, ac dura erat, & ad pedem, & ad
malleolum dextrum, & tubercula ad gingiuas circa dentes
magna, velut vuz acini, liuida, nigrefacta, doloris exortia,
vbi cibum non caperet. Sed & crura doloris exortia erant, si
non exurgeret. Venit enim & ad sinistrum tumor, verum mi-
nus liuescebat. In tumoribus circa genua ac pedes velut sup-
purationes erant. Tandem verò fieri non poterat, vt staret,
aut calcaneis insisteret, sed in lecto decumbebat. Calores ma-
nifesti, quandoque cibum auersabatur, non valde siticulosus,
neque ad sedem surgebat, anxius, & quandoque etiam pusil-
lanimitas tenebat, veratrum exhibitum est, & capitis purga-
tiones. Ad os pharmacum ex manna thuris, cū alijs ammi-
xtis profuit. Ad vlcera in ore, sorbitio lenticulæ commoda
erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores à secundo vera-
tro, dolores tantū ad genua decumbenti venerunt. Humor
autem & bilis abscessit ad genua, etiam pluribus diebus an-
te veratrum. Pisistrato humeri dolor, & grauitas diuturna
deambulanti & alias sano, h̄veme verò incidit multus late-
ris dolor, & calor, & tussis, & excreatio sanguinis spumosi.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

Simon.
 & in faucibus stertebat. Verū facile ferebat, & apud seipsum D
 erat, & calor remisit, simulque & excreatio, & stridula aspe-
 ritas, & circa quartam aut quintā diem sanus. Simonis vx-
 ri in partu concussa dolor circa pectus & latus, tussis, febres,
Euxenus.
 excreationes purulentæ, tabes, ad sex menses febres, & alui
 profluvia semper. Ad finem febres cessauerunt, post cessatio-
 nem substitit aluus, & post septem dies mortua est. Euxeni
 vxorem ex fomentis vt videbatur, calores nullo tempore re-
 linquebant, magis tamen ad vesperam augeſcebant, sudores
 fiebant per totum corpus. Febre ad augmentū tendente fri-
 giditas pedum, quandoq; etiam tibiæ & genuum fiebat.
 tussicula sicca ad modicū tempus, febre exacerbari incipien-
 te, deinde cessabat, per multum autem tempus etiam totius E
 corporis rigor fiebat. Sitis exors semper. Vbi medicamētum
 bibisset, & serum, magis læsa est. Ab initio omnino sine do-
lore erat, & bene spirabat. Medio vero tēpore lateris dextri
 dolor fiebat, & tussis cōmota est, & anhelatio, & excreatio-
 nes parvæ albæ ac subtenues, & horror non ampliùs ex pedi-
 bus, sed de collo & dorso, & aluus liquidior, remisit febris
 cū multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio verò erat va-
 ria, mortua est post remissionē septima die quum esset men-
 te prudens. Polemarchi vxor æstate incepit febrire, dimi-
 sit autē ipsam febris sexta die, titubans obambulabat, ad no-
 ctem calores. Rursus interposito tempore corripuit febris, &
 non dimisit tribus ferè mensibus, tussis multa, excreatio pi-
 tuita. Postquā verò viginti durasser diebus, spiritus sem. F
 per densus, in pectore strepitus, plerunque sudor, mane febris
 mitior, & horrores quandoq; corripiebant, somni fiebant, &
 aluus aliquando humectabatur, & rursus restitabat, modera-
 tē cibum gustabat. At medio tēpore ad genua & tibias do-
 lor, & ad flectendum ac extendendū alio opus habebat. Per-
 seuerabant crurum affectiones vsque ad finem iam propin-
 quum & intumuerunt pedes vsq; ad tibias, & ad contactum
 dolebat, & sudores ac rigores desierunt. Febris autē semper
 intendebatur. Ante obitum aluus erupit, prudens permane-
 bat. Tribus ante obitum diebus, in faucibus stertebat, & spi-
 ritus reuertebatur. Mortua est. Hegesipolis filiulus quatuor
Hegesipolis.
 ferè mensibus dolorem circa vmbilicū corrodentem habe-
 bat. Progressu tēporis augebatur dolor. Percutiebat vētrem,
 vellicabat.

- A** vellicabat. calores corripiebant. contabescebat. ossa reliqua erant. pedes tumeabant. Testes, venter, partes circa vmbilicū inflata. Num & quibus futurum est vt alius exturbetur: cibū auersabatur. lac solum admittebat recens. & alius liquida erat, & subcruenta sanies subibat, male olens: alius ardebat. mortuus est vbi vomuisset modicū pituitosum, adeo vt quis genituram putasset. Plateæ filio vbi mortuus esset futura capitis valde cauata est. Quum autem ægrotaret, semper manu sinciput cōtingebat, maximè morti propinquus. Non dolebat autē caput. & in femore sinistro sub inguen partes inferiores liuidæ. Testes autem graciles erant. Similia etiam Hegetoridæ filio. mortuus est. Præterquā quod vomitus plures sub obitum contigerunt. Hippie soror hyeme Phrenitica. mente aberrans. manibus negotiū exhibens. lancinans seipsam. Quinta & sexta ad noctem voce destituta, soporosa. inflans in maxillas & labia, velut dormientes. septima mortua est. Osander vbi inhorruit, lateris dolor, & ad genua dolor, itemq; ad femur. vbi comedisset delyrabat. breui mortuus est. Cleotimo sutori aluo liquefacta multo tempore, & calore oborto, iuxta hepar tumor tuberculofus ad imum ventrē descendit, & alius liquida fiebat. & aliud ipsi tuberculum iuxta hepar sursum ad præcordiū. mortuus est. Quibusdam capitis dolor vehemens cum calore: quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem, & secundum nares humor quidam decedit tenuis, aut maturus: aut ad aures: aut ad fauces ex capite securius. Quibusdam vero hæc sicca. At marcor vehemens periculofus est. Si vero affuerit anxiosus, aut biliosus vomitus, aut stupor oculorum, aut vocis interceptio, & raro quid loquitur, aut delyrium, lethalia hæc sunt & conuulsoria. Quicunq; verò ex destillatione dimidiā capitis partē dolent, & humore secundum nares decedente insuper febrient leniter, in quinta aut sexta perfrigerantur. Echecrati cæco capitis dolor vehemens magis ad posteriorem partem, & colli quo loco connexio est, & ad verticem procedebat. Progrediente tempore & ad aurem sinistram. & dimidia capitis pars dolorosa erat. mucosa semper procedebant leniter combusta. & calor comitabatur tenuia. & cibum auersabatur. in die melius habebat. ad noctem verò dolebat. Postquam autem pus per aurem erupit, cessauerunt omnia. erupit

Plateæ.

Hegetorides.

Hippias.

Osander.

Cleotimus.

Similia hæc aphorismis.

Echecrates

HIPPOCRATIS LIBER VII.

pit autem circa hyemem. Num & omnibus suppurationib⁹, D
& affectionibus circa oculum, dolores ad noctem? Quibus
tusses hyeme maximè austro spirante crassa & multa excrea-
tibus, febres accedunt: leuiter autem quinta die sedantur.
Tusses verò circa quadragesimā, velut Hegesipoli. Quibus
calores multi quandoq; sedantur, hi non per totum corpus,
sed aut circa ceruicem, aut sub alis, aut capite sudantes libe-
rantur. Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante
febris aduentās, acuta corripuit, stragula reijciebat: sopor cū
dolore. Vrinæ erant rubræ velut erui lotura: subsidentia sta-
tim ab initio multa, alba: postea etiam subrubra. Septima à
glande subdita parca prodierūt: sopor detinuit sine dolore:
humiditas in fronte: somnus ad noctem, & calor mitior. octa E
ua succum admisit: soporosus permansit vsq; ad vndecimam.
Hac autem die etiam calor maximè cessauit. Postquam verò
tussis erat, excreatio perseuerabat semper multa, facilis. pri-
mum viscosa, alba, crassa, postquam autem concocta esset: si-
milis purulentis. Vrinæ ab vndecima die puriores: subsiden-
tia aspera. decimatertia dolor ad dexteram. vsq; ad lateris mol-
litudinem, ad imū ventrem. Vrina supprimebatur. Potus cal-
lyphylli cōtulit. Decimaquinta rursus dolor. decimasexta ad
noctem magis dolor præcordij incipiebat ad ventrem. Mer-
curialis aqua subduxit. Calor intra vigesimū euauuit, & ex-
creationes secutæ sunt crassæ, Melius habuit ad quadrage-
simum. Subpurgandi sunt ventres in morbis, vbi purgan-
da matura fuerint: Inferni quidem, vbi confidisse videris. si- F
gnum habes si non anxij fuerint, neq; capite grauati: et quū
calores mitissimi, et quū post exacerbationes cessarint. Su-
perni verò, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim et hi ele-
uātur, quum anxij, et grauati supernis partibus fuerint. pro-
pterea verò in principijs purgandum non est, quoniam sua
sponte in his temporibus expurgantur. In cubiti processu
ex casu sauciato, cubitus marcore corruptus suppuratur. ma-
turatione verò fiente, viscosa sanies ac glutinosa exprimitur
et breui supprimitur: velut et Cleogenisco, et Demarcho A-
glaoetelis filio. Similiter autem et valde ex iisdem pus nullū:
velut Aeschyli filio contigit. At vbi suppuratur plurimis hor-
rores et febres accedunt. Alcmani ex rhenum affectioni-
bus se recolligenti, et sanguine deorsum detracto, sursum ad
hepar

Charites.

Cleogenis-
cus.

Demar-
chus.

Aglaote-
les. Aeschy-
lus.

Alcma-
nus.

A hepar conuersus est morbus, & ad cor dolor vehemens. & spiritus præ dolore detinebatur. & aluus difficulter egerebat parua caprini stercoreis pilulis similia. anxietas non inerat. Verum rigor quandoq; & febris corripiebat. & sudor. & vomitus. & in dolore non conferebat aqua marina per clysterem infusa. Verum fursurum decoctum infusum contulit. A cibo abstinuit ad dies septem. aquam mulsam meraciorem bibit: postea lentis succum, quandoq; verò ex lenticula fresca decoctum. Inde bibit aquam: postea catulum coctum: & mazę parum, quæ potissimum diu antea confecta esset. progressu verò temporis, aut ceruices bubulas, aut extremas partes suillas coctas, vnà cum priore aquæ potu: quies, tegmen, ad rhenum affectionem infusum per clysterem ex cucumere syluestri. *Parmeniscus.* *Surditate medela.* *Aspasius*
B Parmenisci filio surditas, contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana expurgare, & solum oleum aut netopum infundere. deambulare. mane surgere. vinum album bibere. oleribus abstinere. pane & piscibus petrosis nutrir. *Castorium.* *Aspasius*
 Aspasij vxori dentis & maxillæ dolor vehemens. Castorium & piper colluens, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidij vrinæ affectionem ipsi sedauit farina cum rosaceo. Capitis dolores ex vtero sedat castorium. Plurimas vteri affectiones status faciunt, Signum sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, & dolores circa rhenes ac coxas. Ad hoc aurem confert, aromatatum tertiam partē, farinæ duas, in vino odorato albo coquere, & linteolo illita cataplasmatibus modo imponere, qua parte ventris dolores ab vtero affligunt. *Callimedus.*
C Callimedontis filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, venæ brachij sectio: & seminis lini torrefacti cataplasma, vino albo ac oleo subactum ac imbutum, ita vt neq; calidum, neq; valde coctum deligatur, Aut cum aqua mulsâ coquatur fœni græci, aut ordeï, aut tritici farina. *Melissæder*
 Melissandro quum gingiua dolore corripereetur, & vehemēter intumesceret, sectio venæ brachij, & alumē Aegyptium in principio sedabat. Eutychedi ex cholericis affectionibus, ad neruorum in cruribus distentionem desuit, vnà cum secessu deorsum. Bilem multam abundē coloratā vomuit ad tres dies ac noctes valde subrubram. sub vomitum bibit. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex po-

HIPPOCRATIS LIBER VII.

*Arcuati
morbi me-
dela.
Calligenes*

tibus, neq; ex cibis: & vrine ac transitus deorsum suppressio: D
per vomitus fex mollis prodijt, & deorsum quoq; erupit. Re
gio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere,
bibere non multum, lauare caput calida multa, sed potius te
pida, vinum album, somno nō multo vti. Calligeni circa vi
gesimū quintum ætatis annum destillatio, tussis multa, quod
desuebat per vim educebat: nihil infrā p̄sistebat. annos qua-
tuor perseuerabat. Ab initio calores tenues fiebant. Veratrū
non profuit, sed modicus cibus, & cōprimi corpus, edere pa-
nem, bibere vinū nigrum, obsoniorum quorūcunq; esus, ab-
stinētia ab acribus, salis, pinguibus, succo sulphij, olerib⁹ cru-
dis, multa deambulatio. Lactis potus nō contulit, sed sesamū
purum, crudum, acetabuli mensura bibere, cum vino molli. E

*Timochar-
res.*

Timochari hyeme destillatio, maximē in nares. Quū ve-
nere vsus esset, resiccata sunt omnia. lassitudo, calor successit.
caput graue. sudor à capite multus. desuebat autē & per to-
tum corpus. Erat autē etiam sanus sudare aduetus: tertia die
sauatus est.

Cleomenes.

Cleomenis filius hyeme initio facto cibū auer-
sabatur, & eius fastidio citra febrem vexabatur: & vomebat
cibos ac pituitam. Duobus autem mensibus cibi fastidium
durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide.

Cocuz.

Huic nulla medicamenti potio contulit, verū vinum ni-
grum, & panis esus, & balnearū abstinentia, & vnctio, & fri-
ctio ab vnctione, & fouere non valde, neq; multo fomento.
sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues ac diuturnæ, si
maturæ in nares processerint, profunt. Quibus præganti-
bus ex casu, aut cōuulsione, aut plaga, aut dolores leniter fiūt F
his in tribus diebus manifestum sit, an foetum corrumpet.

Pythoclis.

Cuidam quæ circa vigesimum ætatis annum biberat vltro
pharmacum adfoetum perdendum, accidit dolor: vomitus bi-
liosorum, multorum, pallidorum, prasinorum, nigrorum. Quum
bibisset, tertia die conuulsio corripiebat: linguam cōmande-
bat. Ad quartā diē ad ipsam ingressus sum: lingua nigra, ma-
gna, oculorū albæ partes, erant rubræ: vigilabat: quarta mor-
tua est ad noctem. Pythocles ægrotantibus aquā, & lac mul-
ta aqua ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertun-
dere oportet, & calefacere, ita vt quā maximē excalefacias
igne & aqua. Oculis incōmoda sunt lenticula, fructus po-
morum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, aut coxā,

aut

Ant ciura, ex laboribus obortis, aquæ marinæ aceti quæ calidum fomentum confert, ita vt vel aspergas, vel spōgiam his imbutam adhibeas. Deligare verò lanis oportet. Origanum potum, oculis & dentibus malum est. Puella quæ de rupe cecidit, voce destituta, iactario ipsam tenebat, vomuit ad noctem sanguinem. Quum ad sinistram aurem iniegiſſet, amplius inde fluebat. & aquâ mulsam difficulter deglutiebat. stertor habebat. Spiritus densus velut morientium. Venæ circa frōtem intentæ. decubitus supinus. pedes tepidi. febris multa, aliquādo acuta. maximè expauescebat. septima vocem rupit. calores tenuiores erant. superstes euasit. Nisantes humeri dolorem habebat, in æstate obortum ex abscessu. profuit ipsi corpus & humerum in aqua marina madefacere, ad multum tempus, & per tres dies vinum album aquosum bibere, simul vt in aqua marina decumberet, ita vt & in ipsa vrinam eijceret. Fullo in Syro phreniticus, quum moueretur cruribus tremulis. corpus velut à culicibus cōpunctum. oculus magnus. motus brevis. vox fracta, sed clara tamen. vrina pura subsidentiam non habens. Num propter alui ex thapsia egestionē, decima octaua die morbus remisit, euanescebat citra sudorem? Nicoxenus in Olyntho similiter septima die videbatur à morbo liber esse cū sudore. Sorbitiones assumebat, vinū, botrum ex sole. Decima septima die ingressus sum ad ipsum. lingua ardebat, calor foris secus non valde fortis. exolutio corporis vehemens. vox fracta, vt operosum esset exaudire. clara tamen. tēpora collapsa, oculi caui, pedes molles ac tepidi. iuxta splonem distentio. Infusum per clysterem nō valde suscipiebat, sed resiliebat. prodiit stercus cōcompactum modicū, & aliquid sanguinis, arbitror ab infuso. Vrina clara, pura. decubitus supinus. crura diducta ac disparata, ob exolutionē. penitus vigil. Intra viginti dies calor euauit. Potus erat aqua de farina crassa in ipsa macerata. Sed & de pomis simulq; mali punici succus. & lentis torrefactæ, & farinæ lotura cocta, frigida, tenuis sorbitio. Superstes euasit.

Nisantes

B Fullonum inguina extuberant dura & sine dolore. & circa pubem ac collum similia erant tubercula magna. febris antediem decimū. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mense aut quarto venter colliquiuit. Calores successerunt. lingua sicca, sitis. egestionēs deorsum malignæ mortui sunt.

Fullo.

Nicoxenus

Fullonū tubercula.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

*Cholerica
bille malum
quod fiat.*

Cholerica bilis sursum ac deorsum eruptiones, ex carnis D
esu, maximè suilla crudioris, & ex cicere, & ebrietate vini
odorati veteris, & insolatione, & ex sepijs, & locustis, & gama
maris: & ex olerum esu, maximè porri & ceparum: Insuper
& à lactucis coctis, & brassica, & rumicibus crudioribus: & à
placentis ac dulciarijs & mellitis libis, & à fructibus pomor-
um, & cucumere pepone, & vino lactei teporis, & eruo, &
polenta receti. Cholerica affectiones magis in aestate fiunt,
& febres intermittentes, & quibus horrores accedunt. Hæ
quandoque malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt.
Verum cauere oportet. Iudicat autem tales morbos maximè
quinta & septima & nona dies. Melius tamen est cauere vsq;
ad decimam quartam. Pherecydæ post solstitiū hybernū, E
noctū lateris dextri dolor etiam prius fieri solitus cessauit.
pransus est, & egressus horruit. febris ad noctem. doloris ex-
ors. tussicula quædā sicca. Vrina non multa. subsidentiā mul-
ta. Ab initio ramentosa. glabra, diuulsa: post dies quatuor tur-
bulenta, subsidebant. & vrina non decolor, subsidentiā ha-
bens, & collectio nō apparebat in matula, ubi perfriguisset.
Tertia die aluus sua sponte egeffit. Quarta subdita glande,
stercoracea & biliosa prodierunt. Fluxus erat liquidus. Som-
nus ad noctem non valde. Verum interdiu aliquantum dor-
miebat. Sitis non vehemens. Quarta ad noctem maximè cu-
tis circa frontem, & reliquum corpus mollis, semper super-
excedens. febris vincebatur ad manū, & sub ea humescebat.
pulsus in fronte valde obscurus. venarum grauitas in cōuer- F
sionibus, & in omnibus egestionibus ad modicum tempus.
semper doloris exors. ab initio anxius, & paulatim vomebat.
Septima à glande subdita, egeffit ter biliosum ac stercora-
ceum, liquidum valde ac pallidum. & iam aliquantū delyra-
bat. & humiditas modicè quādoq; circa frontem. stragula in
faciem ducebat. oculos frustra velut si quis videret cōtrahe-
bat, & rursus nictabat. & stragula reiciebat. Nona die sudor
mane obortus ad pectus perseverabat donec moreretur. & fe-
bris, & delyratio augebatur. Circa frontem sudor plurimus
græuolens. color valde albus. cutis sub pilis interpuncta. præ-
cordium dextrum eleuatum. demisit à seipso biliosa. Octaua
apparebāt velut culicum morsus. ante mortem tussiendo re-
iecit velut ex muco fungos, compacta quædam, alba pituita
circum

*Pherecy-
des.*

A circundata. Exscrearat autē & antea parua, alba, lactea. post
 cenam in somno horruit. mane surrexit, capite grauatus hor
 ruit. vomuit. capite grauabatur. ad noctem remiuit. vsque ad
 meridiem leniter horruit. rursus noctem grauiter tulit. Se
 quenti die febris acuta. capitis torpor. vomitus multæ bilis,
 quæ plurima prasina erat. cessauerunt omnia. somnus ad no
 ctem. mane perfrigerabatur. sudor & humiditas per plurimā
 corporis partem. iuxta splenem manu indicabat ad modicū
 tempus collectionē doloris exortem, statim euauit. ad no
 ctem vigil. circa fori tempus exacerbabatur febris. anxietas.
 vertigo. tormen. capitis dolor. vomitus prasinus, leuis, visco
 sus velut pituita. circa solis occasum cessauerunt omnia. su
 dor capitis, colli. post vomitum egeffit per aluum stercora
 cea, liquida, biliosa, neque nigra, neque inconuenientia. No
 ctem moderatē habebat, itemque sequentē diem. ad noctem
 rursus vigil. Vomitus mane similiter & sequenti die, citra an
 xietatē. dolores capitis post sudorē cessarunt. ad vespērā oīa
 remiserunt. Nona nō amplius vomuit. magis calefactus est.
 Reliquis nō videbatur febrile. Venę in temporibus saliebāt.
 doloris omnino exors. sitis semper erat. Nona quum ad sellā
 surrexisset valde animo linquebatur. à glāde subdita egeffit
 ramenta nigra & biliosa colore, quantū stercoracei destilla
 bat. vox fracta. in conuersionib. grauis oculi caui. cutis fron
 tis circumtensa. alioqui bene spirabat. moderatus erat. ad pa
 rietem plerunq; conuersus. flexibilis in decubitu, incuruatus
 quiescens. lingua alba, leuis. Circa decimā & postea, vrinę ru
 brę in circuitu, in medio exiguum quid albū. Duodecima ad
 glandē subditā, similia destillabāt biliosa & ramentosa. post
 glandē animi deliquiū. postea os resiccabāt. Colluebat sem
 per. & si non valde frigida esset aqua, calidā esse dicebat. ni
 uē leniter gustabat. sitis nō inerat. stragula semper de pecto
 re repellebat. Chlamydem calefieri nō sinebat. ignis procul,
 isq; paruus, vtriusq; maxillæ rubor. postea lingua inarticula
 ta. recalescebat vnum aut duos dies. cessauit. *Androphani*
 vocis interceptio. ignorātia. delyrium. His sedatis supererat
 multis annis, & recidiuæ siebāt. lingua permanebat per totū
 tempus sicca, & si collutione non vteretur, loqui nō poterat.
 & plerunque erat valde amara. Aliquando etiā dolor ad cor.
 Venę sectio soluit hęc. aquæ potus, aqua mulsā. Veratrū quo

HIPPOCRATIS LIBER VII.

que bibit nigrū, biliosum nō prōdibat, sed modicum: Tandē **D**
hyeme decubuit, & extra se positus mente motus est. & lin-
guar affectiōes similes. calor tenuis. lingua decolor. Vox pe-
ripneumonica. de pectore stragula reijciebat, & se educi iu-
bebat, velut micturū, quum nihil clarē loqui posset, neq; a-
pud seipsum esset. educebāt ipsum. ad noctē mortuus est. duo
Nicanor. bus aut tribus diebus decubuit. Nicanoris affectio erat, quū
ad conuiuium progredieretur timor tibicinā: quū sub initium
vocis tibix, in conuiuiō tibia canere audiuisset. prae timori-
bus turbationes, vix se sufferre posse dixit, quū nox esset. In-
terdiu verō audiens nihil cōmouebatur. & hāc multo tem-

Damocles. pore ipsum comitabantur. Damocles qui cū illo erat, excu-
tire, & corpore exoluto esse sibi videbatur: & sanē praeptū **E**
locum non accessisset, neq; trans pontē, aut minimā altitu-
dinis scrobem, ausus fuisset trāsgredi, prae timore ne caderet
sed per ipsum scrobem ibat. hoc ad tempus quoddā ipsi ade-
rat. **Phœnix.** Phœnicis affectio erat, ex oculo dextro plerunq; velut
fulgur elucere putabat. Vbi verō nō diu ipsum clausisset, do-
lor ad tempus dextrū vehemens oriebatur. postea etiā ad to-
tum caput, & collū. caput intumescibat retro ad verticula. &
distentio ac duricia erat circum tendines. Si itaq; conaretur
cōmouere caput, aut aperire dentes, nō poterat, vtpote valde
distentus. Vomitus si quādo oborti essent, relatos dolores a-
uertebāt, ac mitiores faciebāt. & venar sectio profuit. & vera
Parmeniscus. trum duxit omnigena, & nō minimē pralina. Parmenisco
etiā prius incidebāt tristitia, & desiderium excedēdi ē vita. **P**
Olynthus. quādoq; verō rursus latus erat. At in Olyntho aliquādo au-
tumū tempore, voce priuatus decumbebat, quietē agens, ita
vt parū saltē loqui conaretur, ac inciperet. Immo etiā si quid
loquutus esset, rursus voce destituebatur. somni aderāt. quā-
doq; verō vigilia: & iactatio cum silentio, & anxietas, & ma-
nus ad praeordia velut dolenti. Aliquando auersus iacebat
quietē agēs. febris perpetuā. & facile spirabat. Postea dixit se
cognoscere ingressos. Bibere quādoq; tota die ac nocte, etiā
si potus exhiberetur, nō volebat: quādoq; verō vrina derepen-
te correpta, omnem aquā ebibebat. Vrina crassa velut iumē-
Conon. ti. Circa decimā quartam remisit. Cononis serua ex dolore
capitis incipiente, extra se mēte mota erat. & clamor. & que-
relar multar. rarō autem quies. Circa quadragesimum diem
mortua

A mortua est. Decem verò diebus ante mortem, voce destituta & conuulsa fuit. Timocharis seruus ex atrabiliarijs esse quū putaretur à tot ac talibus viris, mortuus est similiter circa eosdem dies. Nicolai filius circa solstitium hybernū ex potationib⁹ horruit ad noctem febres. postridie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio adhuc fori plena esset, sudor toti⁹ corporis cessauit. & statim rursus calefactus est. vomit⁹ similis. Quarta ab aqua mercurialis egeffit stercoracea & liquida. Vrina cineris specie, qualis est aqua mercurialis, nō dissimilis, subsidētia nō erat, neq; vrina multa, pauca quādā in medio vehebātur innatātia. dolores præcordij sinistri & lumborū. Putabat se ex vomitu insuper respirare, & insuper respirabat, quādoq; dupla respiratione. lingua alba, habens ex dextra parte cōcretionē adnatā instar lupini. Parum siticulosus erat. vigil. prudēs. Sexta dexter oculus maior dū videret. Septima mortuus est. Verū alius ante mortē eleuata fuit. & mortuo posteriores partes rubefactæ sunt.

Timocharis.
Nicolaus.

B Metoni circa pleiadum occasum febris. lateris sinistri dolor vsque ad clauiculā, atq; is adeò vehemens vt quiescere nō posset. & inflāmatiō tenebat. alui egestio multa, biliosa. In tribus ferè diebus cessauit dolor. Calor autē circa septimum aut nonū. Tussis inerat. excreationes neq; biliosæ, neq; multæ fiebāt, verū pituitosæ. tusses comitabātur. cibos gustabat. quādoq; velut sanus exibat. Corripiebant autē aliquando calores tēnes modico tēpore. sudores fiebāt ad noctem. Spiritus in calore densior. maxillarum rubor. circa latus grauitas, & sub alas, & ad humerū, tusses tenebant. medicamentū per superna eduxit biliosā. Tertia à medicamēto erupit pus, verū ab initio morbi quadragesima. repurgabatur circa trīgintaquinq; alios dies, & sanus euasit.

Meton.

C Vxori Theotimi in semitertiana anxietas, & vomitus, & simul horror incipiente febre. & sitis. progrediente tempore incipiente febre calor ingens. Vbi aquā mulsam bibisset, & vomuisset, & horror, & anxietas sedata sunt. & mali punici succum postea accepit.

Theotimi.
uxor.

Diopithis sorori in semitertiana, cordis dolor grauis circa accessionem, & comitabatur is totam diem. & huiusmodi cordis siue oris ventriculi dolor etiam alijs similiter aderat.

Diopithes.

Veruntamen sub pleiadis occasum viris talia rariora fiebant. Vxori Apomoti in semitertiana circa arcturum, ve-

Apomoti.
uxor.

HIPPOCRATIS LIBER VII.

hemens cordis dolor circa accessionē. & vomitus. & strangu- D
lationes ab vtero simul instabant, & ad dorsum dolores iuxta spinam. Quum autē huc ipsi peruenirent, cordis dolores cessabant. *Terpidas.* Terpidæ matri à Dorisco, quum abortus factus E
Doriscus. esset mense quinto gemellorū, ex casu, ab altero quidem statim, velut in tunica quadam liberata est. ab altero vero prius aut posterius quadraginta diebus. Postea autem concepit in ventre. At anno nono dolores vehementes circa vētrem ad multum tempus, quandoq; incipiebāt ex collo ac spina, confidebant autem ad imum ventriem & inguina: quandoq; ex genu dextro, confidebāt autem ad eundem locum. Et quum quidem iuxta ventrē dolores essent, aluus eleuabatur, quum vero sedarentur, cordis dolor coincidebat. Verū strangulationes non aderant. Sed frigiditas corporis, velut in aqua iacentis. Tempore quo dolor fiebat, per totum corpus dolores spargebantur, mitiores his qui ab initio erant. alliū, sulphiū, acria omnia non cōferebant, neq; dulcia, neq; acida: neque vina alba. Verū nigra, & balnea rara. Ab initio quoq; vomitus vehementes fiebāt, & ciborū exclusiones. & circa dolores mēses non apparebant. *Cleomenes.* Cleomenis vxori circa fauonij flatus, ex nausea & lassitudine, lateris sinistri dolor, ex collo ac humero auspicatus. febris & horror, & sudor. Inccepit autem febris, & non desijt, sed augescebat. & dolor vehemens. tussis. excretatio subcruenta, pallida, multa, lingua alba. alui egestionēs moderatæ, liquide. vrinæ biliosæ. Quarta ad noctē mēses prodierūt multi. cessauit & tussis, & excrea- F
Epicharmus. tio, & dolor. calor autem tenuis. Epicharmi vxori ante partum dysenteria. dolor. alui egestionēs subcruentæ, mucosæ. *Polemarchus.* Vbi peperisset, statim sana erat. Polemarchi vxori in morbo articulari coxæ dolor derepente, mēlibus non prodeūtibus. Vbi betæ succū bibisset, vox supprimebatur per noctem, & vsq; ad meridiem. attamen audiebat, & sapiebat, & manu significabat, dolorem esse circa coxam. *Clinias.* Clinix sorori seniori vomitus, quicquid acceperisset per quatuordecim dies, citra febrem. cruentorum vomitionum reiectiones. & contracta strangulatio ad cor procedebat. Castorium, seseli, mali punici succus, sedauerunt omnia, abscessit autem dolor moderatus ad lateris mollitudinē bulbi succus. & vinū lactei teporis, *Pausanias* austerū. & panes quàm paucissimi cum oleo. Pausaniæ filiam

- A** filiam ex fungi crudi esu, anxietas tenebat. strangulatio. dolor vētris. Aquā mulsam calidam bibere ac vomere profuit. & balneum. In balneo fungum euomuit. & vbi illa cessatura essent, exsudauit. *Epicharmo circa pleiadum occasum, humeri dolor, & grauitas vehemens ad brachium. anxietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ velut à culicum morsu. Post fauonium siccitates fiebant, vsq; ad equinoctium autūnale. Sub canem, æstus vehementes, & ventri calidi, & febres sudorificæ. & statim aliquantum recalescebant. Tubercula vero iuxta aurem multis fiebant. Aniculæ à tussi vexatæ circa nonam diem. Adolescenti splenico ancillæ* *Epicharmus. Euphranor.*
- B** filio, aluo liquefacta, circa idem tempus. Ctesiphonti sub arturum, ferè circa septimam. Adolescenti solū suppurata sunt. *Ctesiphon.*
- Eratylli filio euauerunt. Circa vtraq; tēpora, nullæ exudationes. lingua præ siccitate blæsi. Recti venti spirauerunt multi ac frigidi. & niues ex clemēti cœlo quandoq; fiebant, & post æquinoctium, austrina aquilonaribus permixta. aquę multæ. populariter grassatę sunt tusses multæ, magis autē in pueros. Circa aures multis talia, qualia Satyri habent. Quandoq; vero ante hoc tempus hyems valde hyberna erat, cum niue & pluuijs aquilonaribus. Timonactis filio fermè bimestri pustulæ in cruribus, & in coxis, & lumbis ac imo ventre. & tumores valde rubicundi. His autem sedatis, conuulsionēs & comitiales fiebant, sine febribus, multis diebus. & mortuus est. *Timonax.*
- C** polemarchi filio contigit quidem vt priore tempore suppuratus esset, & exscrearet. postea vero calores ipsi erāt, & hydropicus erat, & splenicus, & anhelosus. ad locum accliuem si quando accederet, impotens. & siticulosus. quādoq; etiam cibum leniter auersabatur. & siccæ tussiculæ ad multū tempus ita fiebant. titubās obambulabat. & si non facile solubilis esset aluus deorsum, plena reddebatur. & anhelatio ac strangulatio magis fiebant. Tandem autem defluxus & excreatio superuenit, ac tussis. Excreatio crassa, pallida, purulenta, & febris vehemens cessasse videbatur. & tussis mitior. & excreatio pura. Redijt rursus febris acuta. spiritus densus. mortuus est. Verū antea riguerunt pedes, & postea perfrigeratus est. Spiritus magis interclusus est. Vrina substitit. extremæ partes perfrigeratę sunt. prudens mortuus est, tertia die à recidiua. *Polemarchus. Thynus.*

HIPPOCRATIS LIBER VII.

- Epicharmus.* inedia macerato,alui egestio multa. Verum cum bile,& ani-
mi deliquio,& sudore multo fiebat. perfrigeratus est valde.
voce destitutus erat totam diem ac noctem. Instillatum pri-
sanæ succum continuit. sapiebat. bene spirabat. Epichar-
mi filio accidit ex via & potu cruditas. Postridie mane an-
xietate oborta, vbi aqua, acetum, salem bibisset, euomuit pi-
tuitam. Postea rigor apprehendit. lauit febricitans. Pectus
dolebat. Tertia mane statim sopor modico tēpore tenebat,
& delirabat. & febris acuta. grauitur morbum tulit. Quarta
vigil. mortuus est. Aristoni vlcerato pedis digito, cum febre
loquelæ obscuritas. Carcinoma ascendit vsq; ad genu. periit.
Erat autem nigrum, subaridum, graueolens. Cui carcino-
ma in faucibus vstum est, sanus euasit à nobis. Polyphan-
tus in Abderis caput dolebat in febre vehementi. Vrinæ te-
nues, multæ. Subidentia densæ & conturbatæ. Quā autem
non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibi-
ta sunt. Postea ad collum dolor vehemens. Vrina prodijt ru-
bicunda conturbata velut iumentī. mente motus est phreni-
tico modo. Mortuus est in vehementibus conuulsionibus.
- Eualcides.* Consimiliter etiam Eualcidæ famula, quum multo tempo-
re densæ urinæ prodijissent, & capitis dolores adessent, phre-
nitica facta mortua est, eodē modo ex vehemētibus dolori-
bus. Nam urinæ densæ ac cōturbatæ, certū signū sunt dolo-
ris capitis, & conuulsionis, ac mortis.
- Halicarnassensis.* Halicarnassensis qui
in domo Xanthippi diuersabat, aurem hyeme dolebat, &
caput non mediocriter. Erat autem annorum circiter quin-
quaginta. Vena secta ex iuxta Mnesimachum. læsum est ca-
put euacuatum, ac perfrigeratum. Non enim facta est suppu-
ratio. Phreniticus factus est, & mortuus. Vrinæ erant & huic
densæ. In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore cor-
ruptio maxillæ, & gingiuarum vehemens carnis excrescen-
tia. mediocriter suppuratio facta est. exciderūt dentes mola-
res, & maxilla. Anaxenor in Abderis, erat quidem spleni-
cus, & viciati coloris. Contigit autem ipsi vt tumor circa fe-
mur sinistrū obortus, derepēte euanesceret. Non multis ve-
rò postea diebus oborta est ipsi circa splenem velut pustula
nocturna ab initio, insuperque tumor ac rubor durus. Post
diem quartum febris ardēs oborta est. & liuefacta sunt om-
nia circumcirca, & putrida videbantur. mortuus est. Verum
prius

- A** prius subpurgatus est, & intelligentiam habebat. Clonigus in Abderis, erat quidem nephriticus, mingebat autem sanguinem paulatim plerumque difficulter. Vexabat etiam aluus dysenterica. Huic mane quidem dabatur lac caprinum, & aquæ quinta pars, ita ut ex ambobus compositum totum essent heminae tres. Ad vesperam autem, panis valde assatus, obsonia, beta aut cucumis. Vinum nigrum tenue. Dabatur etiam cucumis pepo. Hac verò victus ratione quum vteretur, & aluus substitit, & urinae purae prodibant. Bibit autem lac donec urinae restitutae sunt. *Mulier Abderitana.*
- B** filio in Abderis umbilicum mediocriter sauciato, fistula parua relicta est. & quandoque etiam lumbricus per seipsum satis crassus penetrauit. & quum febrirer, vomebat biliosa, quandoque verò & hæc ipsa per fistulam prodibant. Allapsum est & intestinum ipsi ad fistulam, & velut fistula corrodebatur, & rursus refringebatur. & cusses permanere prohibebant. *Python Pella.*
- C** Pythonis filio in Pella febris statim incepit multa. & in somnum collapsio. & cum vocis interceptione somni fiebant. & aluus dura per omne tempus. At glâde ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verum breui aluus rursus eleuabatur. & febris exacerbabatur. & collapsio in somnum per eadem. Quum autem idem ductus esset, datum est medicamentum quoddam ex his quæ cnico, & cucumere syluestri, & peplo constant. & biliosa egestio erupit. & statim sopor sedatus est. & febris mitigabatur. & omnia leuiora facta sunt. & iudicatus est in die decimaquarta. *Eudemus.*
- Eudemus splenem vehementer dolebat. imperarunt ipsi medici ut multum ederet, & vinum biberet modicum, tenue, & multum deambulet. non mutatum est quicquam. Vena secta est cibos ac potus parce sumpsit. deambulationes fecit sensim augmento facto. Vinum bibit nigrum, tenue. sanatus est. *Philistides.*
- Philistidi Heraclidæ uxori cœpit febris acuta. rubor. faciei, ex nulla manifestâ causa. paulo post in die rigorem habuit. quum non recalesceret, cōuulsio facta est in digitis manuum ac pedum. paulo post recalescens. minxit urinas compactis quibusdâ innatantibus, nubeculosas, diuulsas. nocte dormiuit. secunda die rursus riguit. paulo magis calefacta est. & rubor minor. & conuul

HIPPOCRATIS LIBER VII.

cōuulſiōes fiebāt moderatiores. Vrinæ cōſimiles. noctē dor
miuit, parū vigilauit, quū nulla moleſtia premeretur. Tertia
die minxit coloratiora, modicā ſubſidentiā habentia. eadem
hora rigor apprehēdit. Febris acuta, ſudor ad noctē per totū
corpus. Verū veſperi color ad morbi regij modū permuta-
tus eſt. noctu dormiuit, ac per totum corpus ſudauit. Quarta
ſanguis ex ſiniſtra nare probē fluxit. & mēſes pauci cōparue-
runt ordinatē. Rurſus autē eadē hora febris exacerbata eſt.
Vrinæ compactis quibuſdā innatantibus pauca. Alius natu-
ra quidem dura, verū multo magis ſubſtitit, neq; quicquam
prodibat, ſi non glandem ſubdiſſet. noctē dormiuit. Quin-
ta febris mitior. & ad veſperam per totum corpus ſudabat. &
mēſes prodierūt. & noctē dormiuit. Sexta minxit aceruatam
multam vrinā, compactis quibuſdam innatātibus, modicam
ſubſidentiam habentem, concolorē. Circa meridiem verō pa-
rum rigore tenebatur. aliquantum incaluit. ſudauit per to-
tum. noctem dormiuit. Supina parum calefacta eſt. facile tu-
lit. ſudauit per totum. vrinæ boni coloris. Iudicata ſunt om-
nia. Tychon in obſidione circa Datum, iſtus eſt catapulta
in pectus. & paulo poſt riſus erat circa ipſum tumultuoſus.
Videbatur autē mihi medicus eximens lignū, reliquiſſe fer-
rum in ſepto trāſuerſo. & quū ipſi ita videretur, ad veſperam
inſuſum per clyſterē adhibuit, & pharmacū deorſum purgās
dedit. Noctē primā tranſegit. Statim verò vbi dies illuxiſſet,
& medico, & alijs melius habere videbāt. erat enim quietus.
Prædictio facta eſt, quòd vbi conuulſio fieret, non tardē mor-
iturus eſſet. Sequentē noctem moleſtē ferens, inſomnis ple-
runq; in vētrem decūbens. Tertia mane cōuellebatur. Circa
meridiem mortuus eſt. Eunuchus ex venatione & diſcurſu
hydropicus factus eſt. Quidam circa Elealcis fontē, ad ſex an-
nos habuit ex equitatione inguinū tumorem, varices, & co-
xendicum dolores. Qui lateris mollitudine tabuit, ſeptima
die mortuus eſt. Præpotent crudi falſa cum melle. Scor-
tatio turpis, dyſenterix medela eſt. Leonidæ filix natura
concitata, auerſa eſt: auerſa, in iram excaudit: vbi ira excau-
dit, reconciliata eſt. Medicus non intellexit. puella mortua
eſt. Philotimi filius puber venit ad me in Iechina, caluarię
os habens medicina deſtitutum: in quo videbam occultas ra-
tiocinationes non eſſe conſtantes.

HIPP

Tychon.

*Cur hic re-
petatur, non
video.*

*Eunuchus.
Elealcis
fons.*

Leonides.

Philotimus

A HIPPOCRATIS COI LIBER DE VICTVS

RATIONE IN MORBIS ACV-
TIS, IANO CORNARIO
MEDICO PHYSI-
CO INTER-
PRETE.

*

B *Priscorum medicorum tres fuisse familias meminit Galenus li-
bro primo de Curandi uia & ratione. Una eorum fuit medicorum,
qui Coo in insulam incolebant, quorum fuit princeps Hippocrates.
Alia Rhodiorum. Tertia scilicet auctores Cnidii uocabantur
d Cnido insula, una ex quinque Cycladibus. Horum placita Hip-
pocrates, hoc loco Cnidias sententias uocat.*



*Vi Cnidias appellatas sententias conscri-
berunt, rectè quidem scripserunt ea quæ pa-
tiuntur ægroti in singulis morbis, & quo-
modo quædam ipsorum euenerunt: & ha-
stenus quidem etiam qui medicus non sit,
rectè conscribere possit, si probè ex singu-
lis ægrotis quæ patiuntur didicisset. Quæ*

C *verò medicum ante discere oportet, ægroti non referente,
horum pleraque omissa sunt, alia in alijs, & quædam valde
commoda ad coniecturam. Quum autem ad cōiecturam di-
catur, quomodo singula curare oporteat, in his multa aliter
sentio quàm velut illi prodiderunt. Et nō solum ob hoc non
laudo. Verum quòd etiam paucis numero vsi sunt medica-
mentis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis relata
sunt pharmaca aluum deorsum purgantia exhibenda, & se-
rum ac lac pro tempore. Si quidem igitur hæc bona essent,
& morbis conuenientia, in quibus exhibenda esse monue-
runt: longè magis laudanda essent, eo quòd quum pauca sint
sufficiunt. Nunc verò res non ita habet. Qui tamen postea
eam tractationem repetuerunt, magis sanè medico modo,
de his quæ singulis exhibenda sunt, transfegerunt. At neque
veteres*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

veteres quicquam memorabile de victus ratione conscripserunt, & quanquam magna hæc res sit, eam omiserunt: attamen multos in singulis morbis modos, multiplicemque ipsorum diuisionem non ignorarunt aliqui. Cæterum numeros singulorum morborum clarè pronunciare volentes, non rectè scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo quis agrotantium morbum æstimet, quod alter ab altero aliqua re differt: & ideo non putet eundem morbum esse, si nō idem nomen habeat. Mihi verò placet, vt in vniuersa arte mentem adhibeamus. Nam quæcunque opera bene ac rectè tractat, ea singula bene ac rectè facere oportet: & quæ cito, cito: & quæ purè, purè: & quæ citra dolorem tractare oportet, ita facere vt quàm minimus dolor sentiatur: & alia omnia eiusmodi insigniter præ alijs ad meliorem modum transigere oportet. Maxime verò laudauerim medicū qui in acutis morbis, qui plurimos homines occidunt, præ alijs insigniter ad meliorem partem excellat. Sunt autē hi acuti, quos veteres nominauerūt pleuritidem, peripneumoniam, phrenitidem, & febrem ardentem, & alij morbi qui ex his hærent, quorū febres omnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim nō pestilentis morbi modus quis cōmunis grassatus fuerit, sed sparsi fuerint morbi, & nō similes ab his morbis plures moriuntur, quàm ab alijs omnibus. Idiotæ igitur non valde cognoscunt eos qui in his, alijs præstant: aliarumq; curationum magis aut laudatores, aut vituperatores existant. Et profectò magnum signū hoc est, quòd populares minimè de his morbis intelligentiā habeant, veluti quos studio consequi oportet. Nam qui medici non sunt, medici esse videntur, maxime propter hos morbos. Facile est enim nomina ediscere, quæ proferri solent apud agros his morbis affectos. Si enim quis ptisanæ succum nominarit, & vinum tale, aut tale, aut etiam aquam mulsam, omnia hæc eadem plebeis hominibus, & meliores, & deteriores medici dicere videntur. At res hæc nō ita se habet, sed in his sanè vel maxime alij ab alijs differūt. Videntur autē mihi digna esse quæ scribantur maxime hæc quæ ignorantur à medicis, maxime scitu cōmoda, & quæ magnas vilitates, aut magna detrimenta asserunt. Quæ itaque ignorātur hæc sunt. Cur nam in acutis morbis, aliqui medici omne æuum terunt, ptisanas non colatas exhibentes, & rectè se

*Acuti
morbi qui.*

A & se medicari putant. Aliqui verò plurimi faciunt, vt nullū ordeum ager deuoret. Magnum enim detrimentum afferre arbitrantur. Verū per linteum excolantes succū exhibent. Quidam verò ipsorum neque ptisanam crassam dederint. neque succum: atque hi partim donec ad septimū diem ager perueniat, partim verò perpetuò, donec iudicatus fuerit morbus. Sanè huiusmodi quæstiones ne proponere quidē medici consueuerunt: fortassis autem neque si proponantur, comperiantur. Proinde calumnam incurrit tota ars apud vulgus adeò magnam, vt neque omnino medicinam esse putent. Nā in acutis morbis intantum inter se differunt artifices, vt quæ alter exhibet optima esse putans: ea alter iam mala esse existimet: & ferè ob id artem vaticinationi similem esse dixerint. Quia vates eādem anem, si sinistra appareat, bonā esse ducunt: si dextra, malam. Et in aruspicina talia sunt, alia in alijs. Verū aliqui vates contraria his dicunt. Affero autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatā plurimis ac maximè cōmodis in arte. Nam agrotātibus omnibus plurimum ad sanitatē confert, & sanis ad securitatē, & his qui se exercent, ad bonum habitum, & ad quod quisque voluerit.

Ptisana igitur rectē omnibus frumentaceis edulijs prælatā esse videtur, in morbis acutis, & laudo sanè eos qui ipsam prætulerunt. Nam viscositas ipsius levis est, & continua, & iucunda, & lubrica, & moderate humida, & litim eximit, & facile eluitur: si fortè & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura quā maximè tumesceri solet. Quicunque igitur ptisana in hisce morbis vtuntur, nulla die vasa vacua fieri permittant, vt ita dicam, sed vtantur, & non intermittant, si non aut ob medicamento, aut infusi per clysterē vsum, intermittere oporteat. Et qui quidē bis in die cibum capere soliti sunt, eis bis dāda est: qui verò semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verū sensim progressu facto, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sanè opus habere visum fuerit. At verò copia sufficit ab initio dare non multa, neq; minus crassam: sed vt consuetudinis gratia quid ingeratur, & vt ne multa vasorum vacuatio fiat. Cæterum quod ad augmentum copię sorbitionis attinet, si quidem siccior fuerit morbus, quā quis putarit, nō ita magna

Artificū
differētiā

Ptisana
laus.

Ptisana
quando ex-
hibenda.

quibus non
conuenit
vñs neq;
hibito in
pncipio

copia

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

copia dare oportet, sed ante sorbitionē, aut aquam mulſam, D
aut vinum præbibendum exhibere, vtrum ex his conuenien
tius fuerit. Vtrum verò conueniat, in ſingulis modis refere
tur. Si verò os humeſcetur, & à pulmone prodeuntia qualia
oportet fuerint, ſorbitionis copiam, vt in ſumma dicam, au
gere oportet. Quæ enim citius & magis humeſcantur, cele
ritatem iudicationis ſignificant. Quæ verò tardius & minus
tardioſam iudicationem ſignificant. Et hæc quidem per ſe ta
lia omnino exiſtūt. Verum multa quoque alia commoda o
mittuntur, ex quibus coniecturas facere oportet, quæ poſtea
referētur: & quanto copioſior purgatio fuerit, tanto plus da
re oportet, vſq; ad iudicationem, maximè duobus à iudica
E
tione diebus, quibus ſanè quinta, aut ſeptima, aut nona iudi
care videtur: ita vt etiam parium ac imparium dierum ratio
nem habeas. Poſtea verò ſorbitione quidem mane vtendum
eſt. Veſperè verò ad cibos tranſeundum. Conueniunt autem
talia vt plurimum his qui ſtatim tota ptiſana vtuntur. Nam
& dolores in pleuriticis ſtatim ſua ſpōte ceſſant, vbi memo
rabile quid ſpuere ac expurgari cœperint: & purgationes lō
gè perfectiores ſunt, & minus ſuppurati ſiūt, quàm ſi quis a
liter victum ſuppeditet: & iudicationes ſimpliciores, & me
lius iudicantes, & minus reuertētes. Ptiſanam porrò ex opti
mo hordeo factam eſſe oportet, & quàm optimè coctam, &
præſertim ſi non ſolo ſucco vti velis. Nam vnà cum reliqua
ptiſanæ virtute, lubricitas facit, vt ordeum dum deglutitur
non lædat. Nuſquam enim adhæret, neque ſecundum thora F
cis rectitudinē morā trahit. Lubriciſſima autem eſt, & ma
ximè ſitim eximit, & facillimè concoquitur, & debiliſſima
eſt, quæ optimè cocta eſt, quibus omnibus opus eſt. Si quidē
igitur non opem tulerit quis quantum opus eſt, vt ſufficiens
ſit eiufmodi ptiſanæ ſorbitionis modus, multis modis læde
tur. Etenim verbi cauſſa, quibus cibus intus concluſus eſt, ſi
quis non facta deorſum euacuatione, ſorbitionem dederit,
dolorem ſi adeſt amplius exacerbauerit: & ſi nō adeſt, ſtatim
induxerit: & ſpiritus denſior fiet. Hoc verò malum eſt. Pul
monem enim reſiccet, & præcordium, & pectinem, ac ſeptū
tranſuerſum dolore affligit. Quinetiam ſi lateris dolor aſi
duus eſt, & ad calefactoria non remittit, & ſputū non prodit
ſed circa putrefactionem ac concoctionē valde viſcoſum fit,
ſi non

pro plus.
magis. ſeq

quibus nō ex
hibenda
ptiſana

- A** si non soluerit quis dolorem: aut ventrē mollito, aut vena secta, vtrum tandem horū cōducet: ptisanam autem ita habentibus dederit, cita mors talium cōtinget. Propter has igitur causas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota ptisana vtūtur, septima die & citius moriuntur, partim mente lassi, partim ab erectæ ceruicis spiratione, & stertore suffocati. Tales verò veteres sydere ictos esse putauerunt, ob hoc quidē maxime, nō minus autē q̃ & mortuis ipsis latus liuidū reperitur, vt simile quid plagæ appareat. Causa verò huius est, q̃ prius quā dolor soluatur, moriuntur. Citò enim anhelosi fiunt. Præ multo autem ac denso spiritu, velut iam dictum est, valde viscosum circa concoctionem fit sputum, & egressum fieri prohibet. Imò stertorem inducit, cartilaginosis pulmonis arteriarum partibus bronchijs appellatis impactū: & vbi ad hoc deuenerit, lethale iam plerūq; existit. Nam & ipsum sputum impactum, prohibet quidem spiritum intrò ferri, cogit autem citò extra ferri. Atq; sic mutuam opem ad malum inter se conferunt, dum & sputum impactum, densum spiritum facit: & hic cum densus sit, sputum insuper viscosum facit, & lubricum fieri, ac elabi impedit. Occupant autem hæc, non solum si ptisana intempestiue vtantur: verum multo magis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quā ptisana idoneum sit, proinde plerūq; consimilia sunt auxilia, & his qui tota ptisana vtuntur, & his qui succo ipsius: his verò qui neutro horum, sed solo potu, quandoq; etiam diuersimodè auxiliari oportet. At verò hoc modo omnino facere oportet. Si cui à cibo recens accepto, & aluo nondum subeuacuata, febris incoepit, siue cum dolore, siue sine dolore, inhibenda est sorbitionis exhibitio, donec putarit cibum ad infernam intestini partem secessisse. Vtendum autem est potu aceti multo, si dolor affuerit, hyeme quidem calidi, ætate verò frigidi. Si verò multa fuerit sitis, etiam aqua multa, & aqua. Postea verò si dolor aliquis affuerit, aut periculosi aliqd apparuerit, danda est sorbitio neque multa, neque crassa, atq; hæc post septimum, aut nonum diem, si validus æger fuerit. Si verò non subiit vetustior cibis ei qui recens cibum accepit, si quidem validus sit, & ætate vigeat, infusum per clysterem adhibendum est. Si verò debiliior fuerit, glande vtendum est, si non sua sponte probe prodierit. Tempus porro exhibe-

*transantiss
delouis rem
dia*

*pleuritis
multa ac den
sa spiratio p
viresca*

*Quid obser
uandum.*

*Clysteris et
glandis diff
rentia*

ide infra
389

Z. *Lateris do-
loribus qui-
bus subue-
niendum.*

da sorbitionis hoc maximè obseruare ab initio, & per omne D
morbum oportet. Quum quidem pedes frigidi fuerint, inhi-
bere oportet sorbitionis exhibitione. Maximè verò & a po-
tu abstinendum est. Vbi verò calor descenderit ad pedes, tunc
exhibere conuenit, & putare in omnibus morbis, & non mi-
nimè in acutis, & maximè in his qui magis febriles ac peri-
culosissimi sunt, tempus hoc magnam vim habere. Ut edum
est autè primùm quidem maximè succo. Deinde verò ptisana
iuxta prædictas coniecturas diligèti facta cōsideratione. Cæ-
terum pleuritis, hoc est dolor lateris, siue ab initio fiat, siue
postea, calefactorijs quidem primùm non alienum est tētare
dissoluere. Ex calefactorijs verò optima est aqua calida in
vitre, aut in vesica, aut in vase æneo, aut testaceo admotā. Ve-
rùm molle quid antea ad latus supponere oportet. Lenitatis
ergo. Cōmodè etiā spōgia mollis, magna ex aqua calida ex-
pressa apponitur. Cōtere verò stragulis ipsum fomentum
oportet. Nā & ampliore tepore sic sufficiet & durabit, & si-
mul vt ne vapor ad ægrotantis spiritū afferatur, nisi fortassis
& hoc ad aliquid cōmodū esse visum fuerit. Aliquādo enim
ad aliquid cōmodat. Insuper autè & ordeum, & eruū in aceto
diluto, ita vt paulò acidius sit quàm vt quis bibere possit,
dissoluta ac feruefacta, & in marsupia coniecta, apponere o-
portet, & fursur eodem modo. Siccum autem fomentū præ-
bent sal & milium torrefactum, in laneis sacculis cōuenien-
tissimum. Nam & leue, & lene est miliū. Soluit autè huius-
modi mollitorium fomentum, etiam dolores ad clauiculam F
pertingentes. Sectio autem venæ non similiter soluit dolorē
si non ad clauiculam pertingat dolor. Quod si ad calefacto-
ria dolor non soluatur, non multo tempore calefacere opor-
ter. Resiccat enim hoc pulmonem, & suppurationem facit.
At si quidem dolor ad clauiculam de se significationem præ-
beat, aut grauitas ad brachium, aut circa mammā aut supra
septum transversum: venam secare prodest in cubiti flexura
internam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahare,
donec multò rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicun-
do liuidus. Vtrunq; enim contingit. Si verò sub septo trans-
uerso fuerit dolor, ad clauiculam autem de se significationē
non præbeat, aliū mollire oportet, aut veratro nigro, aut
peplio, ita vt veratro quidem daucum, aut seseli, aut cuminū,
aut

*Ad clauic-
ulam dolo-
re extenso
medela.*

A aut anisum, aut aliud quid ex odoratis amasceas, peplio vero silphij succum. Sed hæc inter se si misceantur, confimilis modi existunt. Ducit autem nigrum veratrum melius, & ad iudicationem commodius quam peplium. Peplium vero flatus magis erumpere facit. Ambo autem hæc dolorē sedant. Sedant item alia multa aliu subducentia medicamenta. Verum hæc inter ea quæ ego noui optima sunt. Alioqui & ea quæ in sorbitionibus exhibentur aliu subducentia medicamenta opitulantur, quæcunq; non valde iniucunda sunt, aut ob amaritudinē, aut propter aliam quādam iniucunditatem, aut ob copiam, aut colorē, aut aliquam suspicionē. Ptisanam tamē statim insuper sorbendam dare oportet, postquā medicamentū bibit, non memorabili copia pauciorē, quā quantā sumere adfuetus est. Nam & rationi consentaneum est, in media purgatione sorbendam nō dare. Quum autem cessauerit purgatio, tunc minus sorbeat de ea, quā adfuetus est. Postea vero reducat semper ad maiorem copiam si & dolor sedatus fuerit, & nihil aliud aduersetur. Idē mihi sermo est, si etiam ptisanæ succo uti opus fuerit. Melius enim esse assero, statim omnino incipere sorbere, quā præuacuatīs iam vasis sorbere auspicari, aut tertia, aut quarta, aut quinta, aut sexta, aut septima die, si sanē non iudicatus fuerit morbus ante hoc tempus. Præparationes autē & his confimiles faciendæ sunt, quales dictæ sunt. De sorbitionis igitur exhibitione ita sentio. Sed & de potu, qualem cunq; tandem quis ex describendis sumpturus est, eadē mihi penitus sermonis ratio est.

C Noui autem etiam medicos maximē contraria facere his quæ fieri oportebat. Omnes enim volunt, ubi sub morborum initia homines fame præmacetarūt, duobus aut tribus, aut etiā pluribus diebus, sic sorbitiones exhibere, itemq; potus: & fortassis etiam par ipsis esse videtur, ut magna corpori mutatione fiēte, etiam magnū quid valde contra obijciatur. Verum mutare quidem nō parum, bene habet. Rectē tamē mutatio transferenda est, & ex mutatione adhuc magis exhibitio eorū quæ per os sumuntur. Maximē igitur lædi poterint, si non rectē mutationem fecerint, hi qui tota ptisana utuntur. Poterint etiam lædi qui solo succo utuntur. lædi quoq; possunt qui solo potu utuntur. Minimē verō hi. Oportet autē & in sanorum adhuc hominum victu addiscere quæ conferunt.

*pro aliquo
quoniam legi*

*idē in p. 2
392: c.*

*Error me-
dicorum.*

*in morbis
sanorum
consideranda*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

Si enim sanis tales aut tales victus multū differre videntur, D
tum in alijs quibusdam, tum in mutationibus: quomodo nō
etiam in morbis multum differant, & maximè in acutis? At-
qui facile est hoc addiscere, quòd simplex victus cibi ac po-
tus, ipse sibiipſi ſemper ſimilis, ſecurior omnino eſt ad ſani-
tatem, quàm ſi quis de repente ad alium meliorem, magnam
mutationem faciat. Nam & his qui bis in die cibum ſumūt,
& his qui ſemel, repentine mutationes noxas ac ægritudi-
nes inducunt. & eos ſanè qui prandere non adſueti ſunt, ſi
pranſi fuerint, ſtatim infirmos facit hoc, & toto corpore gra-
ues & debiles, & pigros. Si verò etiam inſuper cœnauerint,
acidum ruſtantes. Quibusdam verò etiam alui liquida ege-
ſtio oboritur, quum præter conſuetudinem ventriculus gra-
uetur, ſolitus reſiccari, & non bis intumescere, neq; bis cibos
coquere. Auxiliatur igitur his, mutationē rursus adæquare.
dormire enim oportet velut nocte reducta poſt cœnam, hyc
me quidem, abſque frigore, & ſtate verò, abſq; calore. Si verò
dormire nō queat, vbi multam lentam deambulationē non
ſtando oberrauit, nihil cœnet, aut pauca, eaq; innoxia. Inſu-
perq; minus bibat, & potum non aquoſum. Talis autē adhuc
magis affligetur, ſi ter in die ad ſatietatē cibum acceperit, &
adhuc magis ſi ſæpius. Quanquàm ſanè multi ſint, qui facilē
ferunt, ſi ter in die cibū copioſe accipiāt, qui ita ſunt adſueti.
Quin & hi qui bis in die cibū capere ſoliti ſunt, ſi pranſi nō
fuerint, debiles & infirmi ſunt, & ad omne opus timidi, &
ventriculi oſculum dolēt. Viſcera enim pendere iſtis viden-
tur: & calidā ac cum virore pallidam vrinā mingunt, & alui
egeſtio comburitur. Quibusdam etiam os amareſcit, & oculi
caui ſiunt, & tempora palpitant, & extremæ partes perfrige-
rantur. Et plerique ex his qui pranſi non ſunt, cœnam edere
non poſſunt. Si verò cœnā ſumpſerint, ventriculum grauunt,
& multò magis ægrè in lecto degunt, quàm ſi etiam pranſi
uiſſent. Quum igitur talia hæc ſanis fiāt, ob victus dimidiæ
diei mutationem præter conſuetudinem: apparēt neque ap-
ponere, neque detrudere commodum eſſe. Si igitur hic qui
præter conſuetudinem ſemel in die cibum accepit, vbi tota
die vaſa vacua fecit, quantum conſueuit cœnauerit, veriſimi-
le eſt iſtum, ſi tūc quum impranſus eſſet doluit ac ægrotarit,
& vbi cœnauit grauis fuit: multò magis grauari. Si verò etiā
long

*Conſuetudo
multum po-
teſt.*

*Jeiuuij inſoliti
incommoda*

A longiore tempore euacuatis vasis, postea derepente cœnaue-
rit, adhuc magis grauabitur. Qui igitur præter consuetudi-
nem vasa vacua fecit, ei hanc diem rursus adæquare sic con-
ducit absque frigore, & calore atq; labore, Hæc enim omnia
grauiter tulerit. & cœna multo minor exhibenda est, quàm
consuevit, eaque non sicca, sed modi humectioris & postea
bibat potum non aquosum, neque pauciorē quàm pro cibi
ratione. Sed & postera die pauca prandeat, quo sensim pro-
gressu fiēte ad cōsuetudinem reuertatur. Qui tamen super-
nas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pi-
tuitosi autem supernis partibus, cibi præter morem abstīnē-
tiam omnino facilius ferunt. Quare etiā semel in die cibum
B præter morē capere, facilius vtique iidem tulerint. Sufficiēs
igitur & hoc signum est, quod maximē mutationes eorum
quæ circa naturas nostras ac habitus cōtingūt, maximē mor-
bos faciunt. Non igitur licet intempestiuē, neque vehemen-
tissimas vaforum vacuationes facere, neque vigentibus mor-
bis, & in inflammatione cōsistentibus, cibos exhibere, neq;
licet derepente in tota re quicquam, aut huc aut illuc muta-
re. Multa verò his cognata, ex his qui ventri contingunt,
itemq; alia referre quis possit, quod facilē quidam ferunt ci-
bos, quibus adsuēti sunt, etiā si natura non sint boni. Simili-
ter etiā potus: ægrē autem ferunt cibos, quibus adsuēti nō
sunt, etiā si non sint mali, similiter etiā potus. & quæ qui-
dem multus carnis esus præter consuetudinem assumptus fa-
C cit, aut alliū, aut silphium, aut succus ipsius, aut caulis, aut alia
huiusmodi, magnas quasdam peculiāres vires habentia, mi-
nus admiretur quis vbi talia dolores ventriculis magis quàm
alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris quantam
maza turbationem, & molem, & flatum, & tormen ventricu-
lo inducat, si præter morem ingesta fuerit, ab eo qui mazam
edere non est solitus: aut qualem sitim panis ipse calidus in-
gestus inducat, & repentinam repletionem, ob siccandi vim,
& quod tardē trāsīt: & quā diuersas inter se affectiones fa-
ciant, & panes valde puri, & qui ex toto sunt collati, præter
consuetudinē in cibo accepti, itemq; maza sicca præter mo-
rem, aut liquida, aut viscosa: & quale quid faciant polentē re-
centes non adsuētis. & aliæ his qui recētib; vti adsuēti sunt
itemq; vini & aquæ potus, præter morē derepente vicissim

*Cibosi diffiniri
vntiosi, tunc
cibi abstinentia
ferant*

*ferienda re
pentina mu-
tatio*

*Calidus
panis sitim
adfert.*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

permutatus, & aquosum vinū, & meracū, prater cōsuetudinē D
derepente potatū. Illud enim humiditatē in superno ventre
inducit, & flatū in inferno. Hoc verò venarū palpitationem,
& capitis grauitatē ac sitim. Quin & album vinū, & nigrum
si quis prater cōsuetudinē permutet, etiam si ambo vinosā
fuerint, tamē multa in corpore alterarint, vt minus mirū es-
se quis dixerit. dulce & vinosum vinum nō idem posse, si de-
repēte permutata fuerint. Porro huiusmodi aliquam partem
sermoni contrario patrocinari oportet: quòd mutatio victus
his facta est, corpore non mutato, neq; ad robur, vt cibos ap-
ponere opus sit, neq; ad debilitatē, vt detrudere oporteat. In-
super autē & robur coniectandum est, & morbi vniuscuiusq;

*in dicta insi-
tenda qd
consideranda
legi
ciborum aut ad
sectionem inter
dendum multa
minus, sub
trahere deo
oio spemur
in expedit, &
ager sufficit
passit, donec
morbus ma-
turecat*

modus, & hominis natura, & consuetudo victus aegri, non ci E
borum solum, sed etia potuū. Multo autē minus ad additio-
nem procedendū est. Nam detractiōem omnino tollere se-
pe conducit: vbi suffecturus est aget, donec morbi vigormā
turecat. In quibus autem hoc faciendum sit, scribetur. Mul-
ta verò etiā alia relatis cognata scribere quis possit. Hoc ta-
men melius testimonium est. Non enim cognatū est rei illi
de qua plurimus à me sermo habitus est, sed ipsa res oppor-
tunissimū est documentū. Nam ab acutorū morborū initio,
aliqui quādoq; eadem die qua morbus incēpit, cibos come-
derunt: aliqui postridie: quidā etiā sorbuerunt quicquid obla-
tum esset, quidā etiam cyceonem. Omnia autē hec deteriora
quidē sunt, quā si quis alio modo victū instituisset, multo ta-
men minus detrimentū afferunt in hoc tēpore peccata, quā si F
quis primis duobus aut tribus diebus, penitus vasa vacua fe-
cisset, & quarta aut quinta die, tali victu vsus esset. Deterius
tamen est, si omnibus his diebus valis euacuatis, in postero-
ribus diebus hoc modo victū instituat, prius quā concoctus
ac maturus sit morbus. Etenim hoc modo mortem plurimis
manifeste affert, si nō omnino facilis fuerit morbus. Quæ ve-
rò ab initio cōmittuntur peccata, nō similiter, vt illa medelā
omnem respuunt, sed multò facilius correctionē admittunt.
Hoc igitur maximum documentum esse arbitror, quod pri-
mi dies sorbitione tali vel tali, nō sint priuādi, in his qui pau-
lo postea talibus, aut talibus sorbitionibus vsuri sunt. Fun-
ditus igitur ignorāt, tum hi qui granosa ptisana vtūtur, quòd
ab ipsa lædūtur, quū sorbere inceperint, si duobus, aut tribus,

*Errores ab
initio coma
missi facili-
ter corri-
guntur.*

quis primis duobus aut tribus diebus, penitus vasa vacua fe-
cisset, & quarta aut quinta die, tali victu vsus esset. Deterius
tamen est, si omnibus his diebus valis euacuatis, in postero-
ribus diebus hoc modo victū instituat, prius quā concoctus
ac maturus sit morbus. Etenim hoc modo mortem plurimis
manifeste affert, si nō omnino facilis fuerit morbus. Quæ ve-
rò ab initio cōmittuntur peccata, nō similiter, vt illa medelā
omnem respuunt, sed multò facilius correctionē admittunt.
Hoc igitur maximum documentum esse arbitror, quod pri-
mi dies sorbitione tali vel tali, nō sint priuādi, in his qui pau-
lo postea talibus, aut talibus sorbitionibus vsuri sunt. Fun-
ditus igitur ignorāt, tum hi qui granosa ptisana vtūtur, quòd
ab ipsa lædūtur, quū sorbere inceperint, si duobus, aut tribus,

*in grano textu legitur κριένδεα πρισάκνη - i. condita aut
rem ptisana, κριέν am. i. condita.*

Aut pluribus diebus antea vasa euacuauerint: tum hi qui succo vtuntur, quod sorbentes læduntur, vbi nõ rectè sorbitionem inceperint. Tunc tamen cauent, & magnam noxam afferre cognoscūt, si priusquam maturus factus fuerit morbus granosam ptisanam sorbuerit æger, succo vti adfuetus. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, quod medici ægros non rectè ad victum perducūt. Sed in quibus morbis valà vacua facere non oportet, his qui sorbitionibus vti debent, vasa vacua faciunt. In quibus verò ex vasorum vacuatione, ad sorbitiones mutationem facere nõ oportet, in his mutatione faciunt, & hoc plerunq; absolutè. Aliquãdo verò in his temporibus mutationem ad sorbitiones faciunt ex vasorum vacuatione, in quibus sæpe ex sorbitionibus ad vasorum vacuationem accedere expediebat, si ita morbum exacerbari contingat. Aliquãdo autem & cruda attrahuntur de capite, & à thoracis regione, biliosa, & vigilie ipsis coincidunt, ob quas non coquitur morbus: & tristes ac amarulèti fiunt, & delirāt, & splendores ipsis ob oculos obuersantur, & aures sonitu plenæ sunt, & extremæ partes perfrigeratæ, & vrinæ incoctæ, & sputa tenuia, & salsa, & meræo colore tincta, ac pauca, & sudores circa collum, & anxietudines, & spiritus in latione sursum versus offendens, densus, aut etiã valde magnus, supercilia distenta ac grauata, deliquia animi praua, & stragulorum de pectore reiectiones, & manus tremulæ. Quandoque verò labium infernum concutitur. Hæc autem in principijs comparentia, vehemētis delirij significatione præbent, & plerumque ægri moriuntur. Qui verò effugiunt, aut cum abscessu, aut cum sanguinis è naribus fluxione, aut ex crassi puris sputo effugiunt: aliàs verò minimè. Neq; enim talium rerū peritos medicos esse video, quomodo debilitatos in morbis dinoscere oporteat, & quæ ex vasorū vacuatione efficiuntur, & quæ propter aliam aliquam irritationem, & quæ propter do lorem, & præ acumine morbi: itemq; quot affectiones, & omni genas species, natura nostra & habitus singulis pariat: & quidẽ quum talium cognitio, aut ignorãtia, salutẽ aut mortem afferat. Maius enim malum est, si ob dolorem & morbi acumen debilitato, exhibet quis potum, aut sorbitionem copiosorem, aut cibum, ob vasorum vacuationem debilem esse existimans. Indecorum etiam est ob vasorum vacuationem

In lexico graeco legitur.
 ΚΕΡΑΥΥΕΙΝ
 ΚΕΡΑΥΥΕΙΝ
 ΔΙΝ. cf. ΚΕΡΑΥΥΕΙΝ. quod est uasa per in medium uacuare. cf. ΚΕΡΑΥΥΕΙΝ
 in media

HIPPOCRATIS LIB. DE VICTVS

debilitatum non cognoscere, & victu premere. Affert equi- **D**
dem periculum aliquod & hoc peccatum, verum multo mi-
nus quam alterum. Multo autem magis risu dignum hoc pec-
catum est quam illud alterum. Si enim alius medicus, aut etiam
idiotior, ingressus cognouerit ea quae contigerunt, & edenda ac
bibenda dederit ea quae alter prohibuit, palam auxilium tu-
lisse putabitur. Talia vero faciunt, ut artifices maxime ab ho-
minibus vituperentur. Videtur enim ipsis ille qui ingressus
est medicus aut idiota, velut mortuum suscitasse. Scribentur
autem de his quoque signa, ex quibus singula dinoscere oportet.
Consimilia tamen illis quae circa ventrem contingunt,
& haec sunt. Nam si totum corpus praeter consuetudinem multum
quiescat, non statim magis robustum fit. Si vero etiam ubi multo **E**
tempore quieuit, derepente ad labores prodierit, vitiosum quid-
dam palam operabitur. Ad eundem modum etiam singulae cor-
poris partes. Nam & pedes tale quiddam operabuntur, & alij ar-
ticuli laborare non adfueri, si interposito tempore derepen-
te ad laborandum prodeant. Eadem etiam oculi & dentes per-
petientur, & quaecunque tandem pars. Nam & lectus praeter
morem mollis dolorem inducit, itemque praeter consuetudi-
nem durus. Sed & si sub dio lectus praeter morem sternatur,
corpus indurat. Quin & talium omnium exempla scribere
satius fuerit. Si quis enim accepto vlcere in tibia, neque valde
periculoso, neque adeo contemnendo, ita ut neque ipsi ita dif-
ficulter, aut adeo facile vlcera sanescant: statim prima ab ini-
tio die decumbens curetur, & nequaquam crus eleuet, hic sa- **F**
ne hoc modo citra inflammationem fuerit, & sanus multo
citius sic fiet, quam si obambulans curetur. Attamen si quin-
ta aut sexta die, aut etiam prius surrexerit, & progredi vo-
luerit, magis utique affligetur ac dolebit, quam si statim ab
initio obambulans curatus esset. Si vero etiam multum dere-
pente se fatigauerit, multo magis dolebit, quam si illo modo
curatus, in illis diebus ita se fatigasset. Perpetuo igitur haec
omnia inter se testimonium praebent, quod omnia quae dere-
pente multum supra modum huc & illuc mutantur, laedunt.
Multiplex igitur in ventre laesio est, si ex multa vaforum va-
cuatione, plus moderato derepente ingeratur. Quin & in re-
liquo corpore, si ex multa quiete, ad ampliorem laboris de-
repente deueniat, multo magis laedetur, quam si ex multo
cibo

*Corporis
labor.*

- A** cibo ad vasorum vacuationem transmutetur, & si ex multo labore derepente ad ocium ac segniciem exciderit. Oportet tamen & his corpus quiescere. Oportet item illis ventrem à ciborum copia quiescere. Sin minus, & dolorem in corpore inducet, & totius corporis grauitatem. Plurimus itaq; sermo de mutatione huc atque illuc à me habitus est, eo quod hæc nosse ad omnia commodum sit, & ad hoc præsertim de quo nobis sermo erat, quòd in acutis morbis ad sorbitiones mutationem faciunt ex vasorum vacuatione. Facienda enim est mutatio velut ego iam iubeo. deinde non est vtendum sorbitionibus priusquàm morbus maturus factus fuerit, aut aliud quoddam signum apparuerit, vel vacuatorium, vel irritatorium, circa intestinum, aut circa præcordia qualia scribentur signa. Vigilia fortis, potus & cibos crudos & inconcoctiones facit. Et rursus in contrariam partem mutatio, dissoluit corpus, & excoctionem ac capitis grauitatem inducit. Vinum porro dulce, & vinosum, & album, ac nigrum, & aquam mulsam, & aquam, & acetum mulsum, his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce minus caput grauatur, quàm vinosum, & minus mentē ferit, & magis quàm alterū per aluū & intestinū subit. Viscera verò magna facit, splenē & hepar. Quare neq; his qui amara bile abundant commodum est. Nam & siticulosum in talibus est, & flatuosum in superno intestino: non tamen inferno intestino inimicū pro flatu ratione, & quidē quum non valde penetret flatu à vino dulci, sed circa præcordia moretur. Certè per vrinam hoc minus exit omnino quàm vinosum album. Sputum vero magis educit dulce quàm alterum. & quibus quidē siticulosum est dum bibitur, his minus quàm alterum vinū educit. Quibus verò siticulosum non est, his magis quàm alterum educit. At verò album vinosum vinum, plurima ac maxima ex parte iam & laudatum & vituperatū est, in dulcis vini enarratione. Ad vesicam autē magis penetrat quàm alterum: & quum vrinā cieat, ac semper perrumpat, multum in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attamen quæ in vesica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet propellatur. Bonæ verò hæ notæ sunt de vini vtilitate ac detrimento, quas seniores me non nouerunt. Fuluo verò vino, & nigro austero, in his morbis ad hæc vti poteris, si ca-

*Sorbitionibus
qñ vtendū*

*Vigilia im
modica.*

*Vinū dulce
ce. quibus uti*

*Vinum dulce
quibus uti*

*Vinum ala
bum.*

*Fuluum uia
num.*

HIPPOCRATIS LIB. DE VICTVS

pititis grauitas non affuerit, neque mentis perculſio, neque
 ſputum ab aſcenſu prohibeatur, neque vrina ſuppreſſa ſit: al-
 ui autem egeſtiones humectiores ac ramentoliores fuerint.
 In talibus ſanè, vel maximè conuenerit ex albo tranſmuta-
 tionem facere, & ſi qua his ſimilia exiſtunt. Hoc verò in-
 ſuper intelligere oportet, quòd ſi aquoſum fuerit vinum, ſu-
 pernas partes omnes, & eas quæ circa veſicâ ſunt, minus læ-
 det. Verùm partibus circa inteſtinum magis proderit, ſi me-
 racius fuerit. Aqua verò mulſa ſi bibatur per totum mor-
 bum in acutis morbis, in totum quidem his qui amara bile
 abundât, ac magna viſcera habent, minus cõmoda eſt quàm
 his qui tales non ſunt. Siticulofa tamè minus eſt dulci vino.
 Pulmonem enim mollit, & ſputum moderatè educit, & tuſ-
 ſim lenit. Habet enim vim quandam exteſoriam, quæ ma-
 gis moderatò ſputum viſcoſum facit. Vrinæ etiam ſufficien-
 ter ciet aqua mulſa, ſi non aliqua ex viſceribus affectio pro-
 hibeat. Sed & biliſa per aluum magis egerit, quandoq; bo-
 na, quandoque magis quàm conuenit colore ſaturata, ac ſpu-
 moſiora: atque hoc biliſis & magna viſcera habentibus ma-
 gis cõtigit. Sputi igitur educationem, & pulmonis mollitio-
 nem, aquoſior aqua mulſa magis facit. At ſpumofas alui ege-
 ſtiones, & biliſa magis quàm cõuenit colorata, ac magis ca-
 lida, meraca aqua mulſa magis ducit quàm aquoſa. Talis au-
 tem egeſtio habet quidem & alia magna nocumenta: Neq;
 enim ex præcordijs ardorè extinguit, ſed concitat, & anxiam
 moleſtiam, ac membrorum iactationem facit: Verùm & in-
 teſtina & ſedem exulcerat. Horum autem auxilia ſcribentur.
 Qui igitur aqua mulſa vtitur, abſque ſorbitiõibus, pro alio
 potu, in his morbis, hic multum ſucceſſum percipiet, & non
 in multis ſucceſſu deſtituetur. Quibus autem danda ſit, &
 quibus non, & ob quas cauſas non danda, maxima ex parte
 dictum eſt. Damnata verò eſt aqua mulſa ab hominibus, vo-
 luti quæ bibètes ipſam extremè debilitet: & propterea mor-
 tem accelerare putata eſt. Verùm hoc propter eos qui ſeipſos
 fame conficere conſtituerunt, dictum eſt. Aliqui enim aqua
 mulſa ſola in potu vtuntur: nimirum velut talis exiſtat. At
 hoc non omnino hoc modo ſe habet. Sed ſi ſola bibatur, mul-
 tò quidem fortior eſt, quàm aqua, ſi non aluum exturbet. Sed
 & vino albo ac tenui, & parum aquæ ferente, & inodoro,
 aliqua

*Aqua
mulſa.*

- A** aliquatenus fortior est, aliquatenus debilior, Multum tamen differt & vini & mellis meracitas, ad vtriusque vires. Nam etiam si duplam mensuram vini meraci quis bibat, respectu mellis quod delingat, multo tamen fortior fuerit ex melle solo, si alium non turbarit. Nam & multo plus stercoris ipsi prodibit. Si tamen prisane sorbitione vtatur, insuper autem *Aqua multa quando obstitit con- tra.* aquam multam bibat, valde ipsum replebit, ac flatus excitabit, & visceribus circa praeordia incommoda erit. At si ante sorbitionem aqua multa bibatur, non ita laedit velut si insuper bibatur, sed etiam aliquo modo proderit. Ceterum cocta aqua multa, aspectu quidem multo melior est quam cruda. Splendida enim & tenuis, albaque ac pellucida fit: Sed
- B** quam ipsi virtutem attribuam, qua crudam praecellat, non habeo. Neque enim iucundior est quam cruda, si mel bonum esse contigerit, debilior tamen, & minus stercoris ducens, quorum neutro ut castigetur aqua multa opus habet. Proximè verò vtendum tali cocta, si mel prauum fuerit, & impurum, & nigrum, & non boni odoris. Coctura enim maiorem partem turpitudinis prauitatis ipsius detrahere poterit. At verò acetum multum appellatum si bibatur, saepe quidem commodum esse in his morbis comperies. Nam & sputum educit, & facilem spirationem facit. Tempora verò huiusmodi habet. Et enim quod valde acre est, nihil moderati fecerit, ad sputa quae non facile prodeunt. Si enim educeret ea quae stridulam asperitatem faciunt, & lubricitatem induceret, & guttur velut dilataret, pulmonem vtique leniret. Ipsum enim mol- lit, & si quidem haec contingerent, magnam sanè utilitatem afferret. Aliquando verò id quod valde acre est, educationem sputi non obtinet, sed insuper viscosum id facit, & laedit. Maxime autem hoc perpetiuntur hi qui etiam alias perniciosè habent, & qui neque tussire, neque exscreare inhaerètia possunt. Ad hoc igitur vires aegroti insuper coniectare oportet, & si spem de ipso habeas, exhibere. Exhibere autem oportet si dederis, summe tepidum: atque tale paulatim, & non large. *modus exhibendi exm...* Quod verò parum acre est, humectat quidem os & fauces, sputum item educit, & sitim sedat, & praecordio & visceribus quae sunt hac parte lene est, & detrimenta ex melle hac parte prohibet. Quod enim biliosum est in melle castigat. Flatus etiam erumpere facit, & ad mictionem proritat. Intestini
- tamen

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

tamen infernā partem humestiozem facit, & ramenta inducit. Quādoq; verò etiā malum hoc fit in acutis morbis, maxime quidem, quòd flatum penetrare, imò recurrere facit. Insuper autem & aliās debilitat, & extremas partes frigefacit. Atque hanc solam læsionem ex aceto mulso cōtingere noui, quæ sanè digna sit vt scribatur. Parum autem de huiusmodi potu, nocte & ieiuno ante sorbitionem præbibendum dare commodum est. Sed & vbi multum temporis post sorbitionē intercessit, bibere nihil prohibet. His verò qui solo potu degunt absq; sorbitionibus, propterea non est cōmodum semper & perpetuò hoc vtī, maxime propter rasurā aut exasperationem intestini. Quum enim stercore vacuum sit, magis utiq; hæc induxerit: & quum vasorum vacuatio adsit, postea etiam aqua mulla vires detraxerit. Si tamen opitulari apparuerit ad totum morbum multus huius potus vsus, parum acetī affundere oportet, vt saltem cognosci possit. Ita enim & ea quæ lædere solet, minime læserit: & his quæ auxilio opus habent, opem tulerit. Cæterum vt in summa dicatur, acridines siue aciditates ex aceto, amara bile abundantibus magis conferunt, quàm atrabiliarijs. Amara enim dissoluuntur, & in pituitam transeunt, dum ab ipso attolluntur. Nigra verò fermentantur, & attolluntur ac multiplicātur. Acetum enim nigra sursum ducit. Mulieribus autem omnino magis aduersatur acetum, quàm viris. Dolores enim vteri inducit. Aquæ porro potui in acutis morbis, nullum aliud opus habeo quod attribuā. Neque enim lenit tussim in peripneumonicis, neq; sputum educit, sed minus quàm alia, si quis semper aquæ potu vtatur. Si tamen inter acetum mulsum & aquam mulsam parum aquæ absorbeatur, sputum educit, propter qualitatis potuum transmutationem. Inundationem enim quandā inducit. aliās autem neque sitim sedat, sed exacerbat. Est enim naturæ biliosæ biliosa, & præcordio mala, imò pessima fit ac biliosissjma, & vires maxime prosternt, vbi in vacuitatē ingressa fuerit. Sed & splenem auget & hepar, vbi inflammātū fuerit, & fluctuat ac superinnatat. Nam & tardi transitus est, eo quòd frigida est & cruda ac incoctilis, & neque per alium secedit, neque per vrinas transit. Insuper autem & propterea læsionem inducit, quòd à natura stercus non subducit. Si verò etiam dum adhuc frigidi sunt pedes, aliquando bibita fuerit,

Acetum.

Aqua.

- A** fuerit, hæc omnia multò plus lædit, ad quodcunque tandem ipforũ peruenerit. Vbi tamẽ in his morbis suspicatus fueris, aut capitis grauitatem vehementẽ, aut mentis percussione, penitus à vino abstinendum est, & aqua in tali vtendum: aut vinum aquosum & albũ penitus dandum, & penitus in odorum, & post ipsius potum aqua modica insuper bibenda. Ita enim robur vini caput & mentem minus percellet. In quibus autem potu ipsius maximè vtendum sit, & quãdo valde multa, & quando moderata, & quando frigida, & quando calida, partim prius dictũ est, partim pro temporis occasione dicitur. Cæterum de reliquis potibus, qualis est ordeaceus, & qui ex herbis fiunt, & qui ex vua passa, & vuarum expressarũ retrimentis, & ex tritico: & cnico, & myrti baccis, & malo punico, & de alijs, vbi alicuius ipforum vsus cõrigerit, scribetur circa ipsum morbum: quemadmodum etiã de alijs compositis medicamentis. *Balneũ* verò in multis morbis opẽtulerit eo vtentibus, ad aliquos quidem assidue, ad aliquos nõ item. Quandoq; verò minus eo vtendum est, propterea quòd homines ad hoc sint imparati. In paucis enim domibus præparata sunt necessaria instrumenta, & nec ministri velut opus est parati habẽtur. Si verò nõ omnino bene quis lauetur, non modicam læsionẽ incurret. Nam & tugurio fumum non habente opus est, & aqua larga, & balneo multo, & nõ valde largè affuso, si sanè non ita opus fuerit. Et defriccione quidem potius vtendum non est. Si verò defricetur, calido vtendum est ipso defrictorio medicamento, eoq; multiplici magis quàm aliàs receptũ est, & insuper nõ pauca aqua perfundendum, & citò perfundendũ. Breui quoq; via ad solũ opus est; & vt facilis sit insensus, & facilis item exitus. oportet autem eum qui lauatur esse moderatũ ac taciturnũ, & nihil ipsum operari, sed alios & perfundere, & defricare. Debet etiam postea multa aquæ mixtura parata esse, & celeres perfusiones fieri, & spongijs vtendum est pro strigili, & nõ valde siccum inungendum est corpus. Caput tamen rescicatum esse oportet, quantũ eius fieri potest maximè, ita vt spongia extergatur, & neque perfrigerari caput oportet, neq; extremas partes, neque reliquum corpus. & neq; eum qui recens sorbitionem accepit, neque eum qui recens potum sumpsit, lauare oportet. & neque sorbere, neq; bibere cito post balneũ. Ma-
- gnam

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

gnam tamen partem ægro tribuere conuenit, si sanus balnei
 valde amans fuit, & lauari adfuetus. Tales enim magis appe-
 tunt, & loti vtilitatem sentiunt, & nō loti læduntur. Conue-
 nit autem in totum magis peripneumonijis, quā febribus
 ardentibus. Nam dolorem lateris & pectoris ac dorsi balneū
 lenit, & sputum maturum facit ac educit: & facilē spiratio-
 nem reddit, & lassitudinē eximit. articulos enim & cutis su-
 perficiem mollit. Sed & vrinam ciet, & capitis grauitatē sol-
 uit, & nares humectat. tot igitur bona balneo adsunt, quibus
 omnibus opus est. Si verò apparatus penuria aliqua fuerit, in
 vna re vel pluribus, periculum est ne magis lædat balneum
 quā prosit. Singula enim ex ipsis magnū detrimentū affe-
 runt, si non à ministris vel cōuenit preparata fuerint. Mi-
 nimē verò tempestiuum est eos lauare, quibus alius in mor-
 bis liquidior iusto est. itēque eos quibus plus iusto adstri-
 cta est, & non prius subijt. Sed neq; debilitatos lauare oportet,
neq; ex ciborum fastidio nauseantes, aut vomentes, neq;
eos qui biliosum eructant, neq; eos quibus sanguis ex nari-
bus erūpit, nisi minus quā pro occasione cōuenit fluat. Oc-
 casiones autē nosti. Si verò minus quā pro occasione fluat,
 lauare expedit, siue totum corpus ad reliqua inde opem sen-
 tiat, siue caput solū. Si igitur preparationes cōmodæ fue-
 rint, & æger bene suscepturus est balneum, quotidie lauare
 conuenit. Eos verò qui balneo delectantur, etiam si bis in die
 laueris, nihil peccaueris. Cæterum balneis vtī, multo magis
 licet his qui tota prorsus vtuntur, quā his qui solo vtuntur
 succo. Licet autem & his aliquādo. Minimē verò his qui po-
 ta solo vtuntur. Sunt tamen ex his quoq; quibus licet. Con-
 iectare verò ex prescriptis oportet, & quibus balneum in sin-
 gulis victus modis persuturum est, & quibus non. Quibus
 enim aliquid horum deest cōmodorum, quæ balneum facit,
 & quæ balneo commodant, lauare non oportet. Quibus verò
 nihil horum deest, & adsunt ipsis signa in quibus lauari con-
 ducit, lauare oportet. Febris autem ardens fit quum resic-
 catæ venulæ, hora æstiuā acres ac biliosos serosos humores,
 in seipsas attraxerint: & febris multa detinet, & corpus velut
 ex ossium lassitudine detentū, delassatur ac dolet. Fit autem
 plerunque & ex longo itinere, & longa siti, quum resiccatæ
 venulæ acres ac calidas fluxiones in seipsas attraxerint. Fit
 autem

alari atilitas

*alim in quibus
not*

*balneo inter
tibus tenuis
not*

*iii Febris ar-
dens quā
fiat.*

A autem lingua aspera ac sicca, & valde nigra, & dum circa vē-
trem mordetur, dolet: & alui egestiones valde liquide ac pal-
lidæ fiunt: & sitis vehemens inest, itemq; vigiliæ. Aliquādo
etiam mentis emotiones. Huic & aquā, & aquam mulsam a-
quosam coctam, quantū voluerit, bibēdam dato: & si amarū
fuerit os, vomere conducit, & ventrem per clysterem sublu-
ere. Si verò ad hæc non solvatur, lacte alinino cocto purgato.

Salsum autem nihil, neq; acre exhibeto. Non enim sufferet.

Sorbitionem verò donec extra iudicationes fuerit, ne dato.

Et si sanguis ex narib. fluxerit, soluitur affectio, itemq; si su-
dores accedāt iudicatorij, genuini, cū vrinis albis & crassis,
ac subsidentijs leuibus: & si abscessus aliquis fiat. Si verò abs-

B que his soluta fuerit, recidiva rursus ægritudinis continget.

Aut coxæ, aut crurum dolor emerget: & crassa expuet, si sa-
nus futurus est. Febris ardentis genus aliud. Alius subit,

si plena est, lingua aspera, sicca, salsuginosa. Vrinæ interce-

ptio: vigilia, extremitates frigefactæ. Tali si non sanguis ex

naribus fluxerit, aut abscessus circa collum fiat, aut crurū do-

lor, & sputa crassa spuerit (hæc autē suppressa alio fiunt) aut

coxæ dolor, aut pudendi liuor, non iudicatur: & testis inten-

sus iudicatorium signum est. Sorbitiones attractorias dato.

Verum in acutis morbis venam secabis, si vehemens appa-

reat morbus, & qui ipsum habeant in vigoris ætate fuerint,

& robur ipsis affuerit. Siquidē igitur angina fuerit, siue ali-

quis alius ex pleuriticis morbus, eclegmatis delinctu repur-

C gato. Si verò debiliores appareant, si plus de sanguine detra-

xeris, infuso alui per clysterem tertio quoq; die vttere, donec

in tuto fuerit æger, aut etiam fame opus habeat. Præcordia

inflāmata non ex flatuum interceptione: sepi transuersi in-

tentiones, aut spirituum protensiones: in rectæ cervicis spira-

tione sicca, quibus pus non subest. Verum ex flatuum interce-

ptione, affectiones hæc accedunt. Maxime autem & hepatis

dolores, & splenis grauitates, & aliæ inflāmationes, & supra

septum transuersum dolores ac morborum collectiones, sol-

ui non possunt, si quis prius medicamētis purgare aggredia-

tur. Nam venæ sectio in talibus principalis est. Deinde infu-

sa per clysteres, si non magnus & vehemens fuerit morbus.

Sin minus, etiam postea medicamēto purgante opus est. Sed

& post venæ sectionem, purgans medicamētum securitate ac

modera

*pharmacop
on et ephib
dys. et inglu
drey di de
Causos. supra
alius. 186. 6.
102. c*

*condictiones re
quisitis ad ven
sectionem in
morbis ceda
menter au
Præcordio tis
tum inflam
mationes
unde.*

*vena quibus
seruata*

*uens sectio pro
cedit purgatio
ne*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

moderatione opus habet. Quicumq; verò ea quæ inflamma- **D**
 ta sunt, statim in principio morborum medicamēto soluere
 aggrediuntur, hi de intento quidem ac inflammato nihil au-
 ferunt: non enim remittit affectio quæ adhuc cruda est: quæ
 verò morbo resistunt ac sana sunt, colliquefaciunt. Debili ve-
 rò fiēte corpore, morbus inualescit. Quum autem morbus
 corpori præualuerit, tale iam incurabiliter affectum est. Ut
 aliquis derepentē voce priuatus fiat, venarum interceptio-
 nes faciunt, si sano hoc contingat absque manifesta, aut alia
 forti causa. Venam igitur secare oportet, in brachio dextro
 internam & sanguinem detrahēre, iuxta habitum ac etatem
 rationem inētudo, an plus aut minus oporteat. Coincidunt
 autem plurimis ipsorum hæc: ruborēs faciē, oculorum sta- **E**
 bilitates, digitorum in manibus distentiones, dentium stri-
 dores, pulsationes, maxillarum contractiones, extremitatum
 perfrigeratio, spirituum per venas interceptiones. Quum
 dolores accesserint, atræ bilis & atrium fluxionum affluxus
 fiunt. Dolent autem partes internæ dum mordentur. Cōuer-
 sæ verò, & valde siccæ fiētes venæ intenduntur, & inflāma-
 tē affluētia attrahunt. Vnde corrupto sanguine, & spiritibus
 non potentibus naturales in ipso vias permeare, perfrigera-
 tiones fiunt ex statione, & vertigines, & vocis interceptio, &
 capitis grauitas, & conuulsiones, si iam od cor, aut hepar, aut
 ad venam deuenerint. Hinc morbi comitiales fiunt, aut semi-
 syderati, si in ambientes locos fluxiones inciderint, & à spi-
 ritibus pertransire non potentibus resiccata fuerint. Quare **F**
 talibus, fomentis prius adhibitis, venam secare oportet sta-
 tim ab initio, dum adhuc eleuati sunt omnes affligentes spi-
 ritus, ac fluxiones. Facilius enim auxilium admittunt: & refe-
 ctis viribus, & consideratis iudicationibus, medicamentum
 exhibere sursum purgans, si non alleuetur: ad infernam verò
 aluum, si nō subeat, infusum per clysterem adhibere. Postea
 verò lac asiniuum coctum dato, & non minus quàm duode-
 cim heminas bibat. Si verò virium robur adsit, plures quàm
 sedecim. Angina fit quum fluxio ex capite multa ac gluti-
 nosa, tempore hyberno aut verno, ad venas iugulares influ-
 xerit, & hæ fluxionem ampliolem, propter amplitudinem,
 attraxerint. Cū autem frigida & glutinosa sit, spiritus trā-
 situs obturabit, & sanguinis transitus obturans, propinquas
 sanguin

*Vocis in-
 interceptio.*

*Comitiales
 morbi unde*

*Angina
 quando fit.*

A sanguinis partes congelat, ipsumq; immobilem ac stabilem facit: quā natura frigida sit, & obturandi vim habeat, & propterea suffocantur, lingua liuescente, & rotūda fiēte ac reflexa, propter venas quæ sunt sub lingua. Præcisā enim vna, quam aliqui columellam vocant, vena crassa ab vtraq; parte est. Cū igitur hæ plenæ sint, & in linguam innitantur, quæ rara est ac spongiosa, propter siccitatem: cōtingit vt ipsa præ violentia humorem ex venis suscipiens, ex lata fiat rotunda: ex bene colorata, liquida: ex molli, dura: ex facile flexibili, inflexibilis: adēd vt æger citō suffocetur, si non quīs citō auxilium ferat, venæ sectionem à brachijs faciens, & venas sub lingua secans. & eclegmarum delinctu curans, & calidos gargarismos exhibēs, & caput radens. Debet autem & ceratum collo ac capiti circumponere, & lanas obuoluere, & spongijs mollibus ex aqua calida expressis fouere. Bibat autem æger aquam, & aquam mulsam, non frigida. Succum verō ptisanæ tunc sumet, quum iam ex iudicatione in tuto fuerit. Quum verō æstiuo vel autumnali tempore, fluxio calida ac nitrosa, de capite defluerit, vtpote ex tempore acris ac calida facta: talis vbi est, mordet, & vlcera, & spiritu implet, & ceruicis spiratio accedit, & siccitas multa, & quæ videntur gracilia apparēt: & tendines posteriores in collo distenduntur, & velut in tetano distenti esse videntur: & vox abrupta est, & spiritus paruus est, & retractio spiritus densa ac violenta accedit. Talibus arteria vlcera, & pulmo ardet, quum non possint extrinsecum spiritum inducere. Et si his affectio nō vltionea ad externas colli partes deferatur, grauior ac ineuitabilior est, & propter tempus, & q̄ à calidis & acris sit humoribus. Si febris corripiat, veteri stercore non subeunte, aut à cibo recens accepto, siue cum dolore lateris, siue absq; eo, quietem agere oportet, donec cibi descenderint prius ad infernam aluum: potu verō vtī aceto mulso. Quum autē ad lumbos grauitas deuenerit, infuso per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Vbi verō purgatus fuerit. victum præscribere ex sorbitione primū, & aquæ mulsæ potu. Deinde ex cibis ac piscibus coctis, & vino aquoso, modico, ad noctem. Interdiu autem, ex aqua malsa aquosa. Quum verō status graueolentes prodierint, glandula subdititia, aut infuso per clysterem vtendum erit. Sin minus, in aceti mulsā

Angina rursus.

*Aliud an
gine genus*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

potu cohibere oportet, donec ad infernam aluum descende-
 rint cibi, deinde sic per infusum clysteris subducere. At
 si mollem ac vacuum ventrem habenti febris ardens acce-
 dat, si tibi commodum esse visum fuerit medicamentis pur-
 gare, intra tres dies id ne feceris, sed quarto. Postquam verò
 medicamentum exhibueris, sorbitionibus vtere, observans
febrim exacerbatōnes, vt nunquam exhibeas quum sunt,
aut futura expectantur, sed vbi desinunt, aut quieuerunt, &
quam longissime à principio. Quum verò frigidi sunt pedes
 neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quicquam e-
 iusmodi dato, verum maximum hoc esse ducito, vt expectes
 donec valde fuerint calfacti. Deinde sic id quod cōducit ex-
 hibe. Plerumque enim futura exacerbatōnis febris signum **E**
 est pedum frigiditas. Si verò in tali tempore exhibueris, ma-
 ximè per omnia peccaueris. Morbum enim non parum auge-
 bis. Quum autem febris desinit, vice versa pedes reliquo
 corpore calidiores fiunt. Augetur enim frigefaciens pedes,
 accensa ex thorace, ad caput flammam remittens. Vniuerso
 autem calore aceruatim sursum concurrente, & ad caput ex-
 halante, merito pedes frigidi fiunt, vt qui excarnes & ner-
 uosi natura existant. Insuper autem etiam quum longè
 à calidissimis locis absint, perfrigerantur, calore ad tho-
 racem coaceruato. Et rursus iuxta proportionem, quum
 febris soluitur, & in tenues partes dirimitur, ad pedes ca-
 lor descendit. Hoc igitur tempore & caput, & thorax ipso-
 rum perfrigeratur, qua de causa sorbitio exhibenda est. Nam **P**
 vbi pedes frigidi fuerint, neccessè est ventriculum calidum
esse, & multo fastidio plenum, & præcordium intentum, &
corporis iactationem, propter internam turbationem: &
mentis abalienationem, & dolores, & ager distrahitur,
ac vomere cupit, & si praua vomuerit, dolet. Postquam
 verò calor ad pedes descendit, & vrina progressa est, etiam
 si non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tempore sor-
 bitionem dare oportet: alioqui perniciola est. Quibus
 verò perpetuò aluus in febribus liquida est, his præcipuè
 pedes calefaciens, & ceratis integens, & fascijs obuoluens,
 animum aduerte, vt ne sint reliquo corpore frigidiores. Si
 verò calidi sunt, calefactorium nullum adhibe, sed con-
 serua vt ne perfringerentur: potu autem vtendum est quàm
 paucissi

ste' quarta die
 t J. argato

orbitio qn
 landa est

gi Pedum fri
 gus febrim
 accessum
 denotat.

car pedes
 rigidi fiant

Pedum ca-
 lor.

Alui solu-
 ta curatio.

A paucissimo, aqua frigida, aut aqua mulsa. Quibus autem in febribus aluus liquida est, & mens perturbata, & multi ex talibus floccos auferunt, & nares scalpunt, & paulatim quidem respondent si interrogentur, ipsi verò à seipsis nihil aptum dicunt: talia atrabilia esse mihi videntur. Talibus igitur ita se habentibus, si aluus liquida fuerit, ac colliquerit, videtur mihi sorbitiones frigidiores ac crassiores exhibere oportere, & potiones aluum sistentes, & vinoliores magis quam adstringentes. At quibus in febribus vertigines ab initio, & capitis pulsus fiunt, & vrinæ tenues, in his expectare oportet, vt ad iudicationes febris exacerbetur. Nec verò admirarer, si delirarent. Quibus in principio vrinæ nebulosæ, aut etiam crassæ sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia contulerint. Quibus verò in principio vrinæ tenues, tales ne purgato, sed si visum fuerit, infusum per clysterem adhibeto. Hos sic curare conducit. Aeger corpore quietem agat, vngaturque ac æqualiter contegatur. Potu vtatur aqua mulsa aquosa: & sorbitione succi ptisanæ ad vesperam. Aluum verò ab initio per clysteris infusum subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa ventrem commoueris, vrina non concoquitur, sed absque sudore ac iudicatione, febris ad multum tempus durabit. Sorbitiones autem vbi propè iudicationem fuerit, ne dato, si turbetur: verum quum remiserit turbatio, & ad melius procedet. Obseruare verò etiam omnium febrium iudicationes oportet, & in hoc tempore sorbitiones detrahere. Solent autem longæ fieri hæc febres, & impetuosos humorū de loco ad locum illapsus habere, si quidem infernæ partes frigidæ fuerint, circa aures & collum. Si verò non fuerint frigidæ, alias mutationes habent. Fluit autem sanguis ex naribus, & alui his exturbantur. Quibuscunque verò febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendunt: & decumbētes in eodem loco decubitus non sustinent, & extremæ partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia ac custodia opus habēt. Degant autem hi vt nihil ipsis exhibeas aliud, quàm acetū mulsum aquosum. Sorbitionem verò ne exhibe, donec febris desierit, & vrina concocta fuerit. Decumbere autem debet æger in domo obscura, & in stratis quàm mollissimis reclinatus esse, ita vt multo tempore decubitus in eodem loco toleret,

pulsus
urina

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

*Urinarum
cognitio.*

& quàm minimum se iacet. Hoc enim talibus maximè pro- D
dest. Super præcordium verò, lini semen linteum illitū impo-
nito, obseruando vt ne horrescat æger dum apponitur. Sit
autem summè tepidum, aqua & oleo coctum. Coniectare ve-
rò ex urinis oportet id quod futurum est. Si enim crassiores
ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si verò tenuiores ac ni-
griores, deteriores. Si autem mutationes habent, temporis
diuturnitatem significant: & necesse est vt morbus & ad de-
terius, & ad melius, inæqualitatem permutet. Cæterum in-
constantes febres sinere oportet, donec constiterint. Quum
verò constiterint, & victu, & curatione conuenienti occur-
rere, speculatione secundum naturā facta. Sunt autem aspe-
ctus ægrotorum multi. Quare animaduertendum est medi- E
co, vt ne aliqua manifesta causā ipsum lateat, neq; ex his quæ
ratiocinatione cognoscuntur, neq; ex his quæ ad numerum
parem aut imparē apparere oportet. Maximè igitur nume-
rum imparē vereri oportet. Nam hi dies in alterutrā par-
tem ægrotos inclinare faciunt. Primum itaque diem obser-
uare oportet, quo æger debilis esse cœpit, cognito principio
ex quo, & quādo. Præcipuum enim hoc est vt sciatur. Quum
verò ægrum interrogaueris, etiam hæc omnia considerabis.
Primum quidem quomodo caput habet, an doloris exors sit,
nec grauitatem in seipso habeat. Deinde præcordia & late-
ra an doloris exortia sint. Si enim præcordiū dolorosum fue-
rit aut eleuatum, aut obliquitatem aliquā habuerit, aut satie-
tatem: aut lateris dolor affuerit, & vnā cum dolore, tussicu- F
la, aut tormen, aut ventris dolor. Quum horum quid affuerit
in præcordio, aliuū maximè infusus per clysterē soluere opor-
tet. Bibet autem aquā mulsam calidam coctam. Consideran-
dum verò est an dum exurgit, animi deliquium incidat, an
bona spiritus tolerantia ipsum habeat: & inspicienda alui
egestio, num vehementer nigro colore prodierit, aut pura,
quales sani hominis sunt egestiones: & an febris ad tertium
diem exacerbetur. Vbi verò valde probè tales consideraue-
ris in his morbis tertia die, ad hæc iam etiam alia contem-
plare, & si quarta simile quid tertiæ habuerit ex iisdem illis,
æger in periculo versatur. Et signis autem, nigra alui ege-
stio, mortem significat. Quæ verò sani hominis egestioni
similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signū est. At
si glande

*Signa va-
leudinis.*

A si glande subdita non obedierit, & spiritus bona tolerantia affuerit, si vbi ad sedem exurrexit, aut isthic in lecto, animi deliquium inciderit: Hæc vbi ægroto, aut ægrotæ, ab initio affuerint, delirium futurum expecta. Intentus autē sis quoq; ad manus. Si enim tremulæ fuerint, tali sanguinis de naribus destillationem futuram expecta. Inspicere verò ipsas nares oportet, an spiritus æqualiter per vtrasque feratur. & si multus feratur è naribus, conuulsio fieri solet. Si verò conuulsio fiat, tali mors expectanda est: & bene habet si quis hoc prædicat. Si verò in febre hyberna, lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, tali remissio febris contingere solet: at tamen fame talem macerare oportet, & aquæ mulsæ potu, ac ptisanæ succo conseruare, ita vt fidem ne habeas febrium remissioni. Nam qui talia signa habent, de vita periclitantur. Vbi verò hæc cognoueris, ac probè contemplatus fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. Quum verò in febribus horrendum quid acciderit quinta die, aut alius de repente liquida deiecerit, & animi deliquium incidat: aut vocis priuatio contingat, aut conuulsio, aut singultus fiat: ex his anxiosus fieri coger solet, & sudores sub naso, & circa frontem ac ceruicem à posteriore capitis parte oboriri. Qui verò hæc patiuntur, spirituosi facti non longe postea moriuntur. Quibus autem in febribus crura fiunt tuberculosa, atque hæc tubercula moram trahentia non maturantur, febribus perseverantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita vt partes circa fauces graciles existant, & tubercula non matura facta, sed extincta fuerint: talibus sanguis è naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionē morbi significat. Sin minus, morbum longum. Quanto autem minus fluxerit, tanto deterius est, & longitudo maior. Si verò reliqua facilima fiant, tali dolores ad pedes expectare oportet. Si autem contigerint pedem, & dolorosus esse perseveret æger, & calore affligatur, ac non solvatur, paulatim & ad ceruicem dolores peruenient, & ad clauiculam, & humerum, & pectus, & articulum. Nam & hunc tuberculosum fieri oportebit. His autem extinctis, si manus contrahantur, aut tremulæ fiant, conuulsio talem corripit, & delirium. Sed et pustulæ in supercilio oriuntur, et rubores habet, et palpebra altera ad alteram progerminat, et inflammatio dura detinet, &

*In ægro
quæ con-
sideranda.*

quinta die

*febris hæc
periculosa
est*

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

*Delirij si-
gna.*

oculus vehementer intumescit, & delyrium valde augefcit. D
Noctes autem plus quàm dies delyrij significationem præ-
bent. Multa verò signa ad imparè numerū magis fiunt, quā
ad parem. Vtro autem horum numerorum fiant, lethalia exi-
stunt. Tales verò si quidem ab initio medicamentis purgare
volueris, ante quintum diem id facito, si venter murmurarit.
Sin minus, impurgatos finito. Si verò murmurarit, & alui e-
gestionibus biliofa fuerint, scammonio dato moderatè purga-
to. In reliquo verò victu potus ac sorbitiones parcissimè ex-
hibeto, quo melius ager habeat, si nō remissione facta deci-
mumquartum diem transgressus fuerit. Quum febricitan-
ti decimaquarta die vocis interceptio accesserit, non cito so-
lutio contingere solet, neque liberatio à morbo fieri, sed tē- E
poris diuturnitatem tali significat. Quum itaque apparuerit
in hac die, longius protrahetur morbus. Quum febrienti
quarta die lingua conturbata loquitur, & alius biliofa li-
quida egerit, talis delyrare solet. Sed obseruare ac assequi e-
uentus oportet. Aestiuo ac autumnali tempore in morbis
acutis, sanguinis destillatio repentina, firmitatem ac multā
inflammationem circa venas significat, & in posterum diem
tenuium vrinarum apparitiones. & si ætate viguerit, & cor-
pus in exercitio, aut bene carnosum habuerit, aut atrabilia-
rius fuerit, aut ex potu manus tremulas habuerit, bene habet
vt delyrium, aut conuulsionem prædicat. Et si quidem in die-
bus paribus accedat, melius est. In iudicatione verò pernī- F
ciosum, si non multus aceruatim concitatus sanguis, redun-
dantiæ exitus faciat per nares aut per sedem: aut abscessus,
aut præcordiorum dolores, aut ad testes, aut ad crura dolo-
res inducat. His autem concoctis, exitus fiunt sputorum, craf-
sarum vrinarum, leuium, albarum. Febri singultuosa fil-
phij succum, acetum mulsū, daucum tritum, bibenda dato.
& galbanum in melle. & cuminum in eclegmate delingen-
dum. & ptisanæ succum post hæc sorbendum. Talis autem
effugere non potest, si non sudores iudicatorij, & somni
æquales accesserint: & vrinæ crassæ & acres decurrerint,
aut ad abscessum morbus decubuerit. Nux pinea, & myr-
rha, in eclegmate dentur. Bibendum autem talibus ace-
tum mulsū quàm minimum dato. Si verò valde siticulosi
fuerint, aquā ordeaceam. Peripneumonicas ac pleuriticās
affectio

*Singultus
medicla.*

Peripneu-

A affectiones sic considerare oportet, an acuta sit febris, & dolores lateris alterius, aut vtriusque: & dū spiritus sursum feratur an doleat: & an tusses adsint, & sputa prodeant fulua, aut liuida, aut etiā tenuia, & spumosa, & florida: & si quid aliud diuersum habeat, ab his quæ illis fieri solēt. Hunc sic degere oportet. Si quidem dolor sursum tendat ad clauiculā aut circa mammā, & brachium, venā in brachio secare oportet internam, vtra tandem fuerit parte, in ea ipsa: detrahare verò sanguinē iuxta corporis habitum, & tempus, & ætatē, & colorem, plus & confidenter. & si acutus fuerit dolor, ducere vtiq; ad animi deliquiū. Postea verò infusum per clysterem adhibere. Si verò sub thorace fuerit dolor, & valde distēdat, pleurico medicamento aluum subpurgato, & interim dum purgatur, nihil dato. Post purgationē verò acetum mulsum. Medicamentum autem purgans exhibeto quarta die. Verū per tres ab initio, infusum per clysterem adhibeto: & si hinc nō alleuetur, sic subpurgato. Custodia autem fiat vsq; ad febris quietem ad septimum diem. Deinde si in tuto esse videatur, succum modicū ac tenuem primū melle ammixto exhibitō. Si verò faciliē educat spurū, & bene spiret, ac doloris exorsit circa latera, etiā paulo crassiorē ac ampliorem, & bis in die dabis. Si verò non faciliē liberetur, potionem pauciorē, & modicā sorbitionem, succum tenuē, eumq; semel, & in quo tempore melius degit, exhibeto. Cognosces autem hoc ex vrinis. Sorbitionem enim exhibere in his morbis nō prius oportet, quā vrinas concoctas, aut sputa matura facta esse videris. Si verò is qui medicamentum accepit, frequēter & multum purgatus fuerit, necesse est dare, verū pauciorē ac tenuiorē. Non enim poterit dormire, præ valorū vacatione: neque similiter coquere: neque iudicationes sustinere ac expectare. At vbi crudorum colliquationes factæ fuerint & ea quæ renitunt abiecerit, nihil obstabit. Matura verò sunt sputa quidē, quum similia fuerint puri. Vrinæ autem subsidentias habētes subrubras, velut est eruū. Nihil autē prohibet & ad alios laterum dolores tepefactoria apponere & cerata. Inungere autē crura ac lumbos oleo calido, et pinguedinem illinere. præcordia verò ex lini semine integere vsq; ad mās. At vbi in vigore est, peripneumonia, auxilium non admittit, si non expurgetur: et malum est si æger difficulter spi-

monica affe-
ctiones.

pleuritis
quæ vna
secunda

sanguinis
ad animi de-
liquiū
uenit: sed

adueras qd
in sangui-
nis extrahio
nō debet fieri

unica vice
sed per plures
uere sectiones
et debemus

accere egros
tametsi vsq;
ad animi de-
liquiū

et sic intellexit
hupp:
qm Celsus

agerit in: aph: li: om-
ne nimis

nature int-
mice sed q
pallidiz fieri
tutius est

idē 382.6

Dd 4

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

*Peripneu-
monia me-
dela.*

Dysenteria

Tetanus

rauerit: & vrinę tenues & acres, & sudores circa collum ac ca-
put fiant. Tales enim sudores prauī sunt, prae suffocatione, &
impetu ac violentia, superantibus morbis, si nō vrinae multae
ac crassae prodierint, & sputa matura exierint. Vtrū autē ho-
rum sua sponte venerit, morbum soluit. Ad peripneumo-
niam medicamentum quod delingitur. Nux pinea & galba-
num, in melle Attico. Abrotonum in aceto mulso. Piper ve-
raturum nigrū feruefacito, & pleuritico in principijs dum do-
lor vexat, bibenda dato. Bonum est & panacem in aceto mul-
so feruefacere, & excolare, ac bibendum dare, tum hepaticis,
tum in doloribus septi transuersi. Et quaecūque ad ventrem,
aut ad mictionē impellere oportet, haec in vino & melle da-
bis, illa ad ventrem, cum aqua mulsa aquosa copiosiore bibē-
da dato. Dysenteria sedata abscessum, aut tumorem aliquem
faciet, si non ad febres, aut sudores, & vrinas crassas, & albas,
ac valde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad varicem, aut ad
testem, aut ad crura, aut ad coxam dolor decubuerit. In fe-
bre biliosa ante septimum diem, cum rigore morbus regius
accedens, soluit febrem. Verū sine rigore si accedat, extra
temporis occasiones, perniciosus est. Tetanus lumborum
in anteriorem ac posteriorem partem distentio: & in atrabi-
liarijs, vbi spirituum per venas interceptiones fuerint: venarū
sectione soluuntur. Quum autem à tendinibus vehemen-
ter in anteriorem partem reuelluntur, & circa collum ac fa-
ciem sudores fiunt, dum prae dolore mordentur ac resiccantur
tēdines vsque ad sacri ossis finem exporrecti, qui crassio-
res spinam continent, qua parte maxima ligamenta exorta,
deorsum ad pedes vsque desinunt: Tali si non febris & som-
nus accesserit, & sequentes vrinę concoctionē habentes pro-
dierint, & sudores iudicatorij, vinum creticum vinosum bi-
bendum dato, & farinam coctam edendam. Et cerato vngito
ac illinito, & integito crura vsque ad pedes, vbi calida aqua
prius in scapha perfudisti: brachia quoque ad digitos vsque
integito: & lumbos ac spinam à collo vsque ad coxas pingue-
dine incerata molli pelli illita circūdato, ita vt etiam ante-
riores partes complectatur: & interposito tempore, per vtri-
culos calida aqua infusa foueto, & circumtento linteo ipsum
reclinato. Alium verò ne valde soluas, nisi glandula subditi-
tia, si multum tempus fuerit, quo absque egestionē permāsit.

& si

A & si quidē in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, Mei radicem in vino odorato tritā, & Daucum bibēda dato, mane vbi ieiunus est ante calidā perfusionē. & post hāc breui farinā coctam, tepidam, plurimam edat. & vinum vbi vnerit, bene temperatū insuper bibat. & si quidem in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, pradicere oportet. Morbi porro omnes soluuntur, aut per os, aut per aluum, aut per vesicā, aut alium aliquē eiusmodi articulū. Verū sudoris species omnibus communis est. Veratrum dare his oportet, quibus à capite fluxio fertur. Quicunque verò ex abscessibus, aut venæ ruptūra, aut propter intemperantiam, aut ob aliam quandam fortem causam, suppurati fiunt, talibus veratrum ne dato. Nihil enim profuerit, & si quid perpetietur eger, veratrum in causa esse videbitur. Si verò corpus dissoluatur, aut dolor in capite sit, aut aures obturatæ sint, aut nares, aut sputatio: aut genuum grauitas sit, aut corporis tumida moles præter consuetudinem, dato quicquid tandem horum contigerit, si non ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex tristitia, neque ex curis, neque vigilijs hāc fiant. & si quidem horum quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationem instituito. Dolores ex itinere, laterum, dorsi, lumborum, coxarum, & quicunque respirantes dolent, causam manifestam habentes. Sæpe enim ex crapulis & cibis flatuosis, dolores procedere solent, & ad lumbos, & ad coxam. Quibus verò ipsorum talia fuerint, vrinæ difficultas ipsis accedit. Horum autē causa iter est, & grauedinū ac raucedinum. Quicunque ex victus ratione contingunt. Pleraque vnusquisque prout præter cōsuetudinem victu vsus fuerit maximē annotat. Nam qui nō soliti sunt prandere, si pransi fuerint, multus ventris tumor ipsis accedit, & dormitatio ac repletio. Si verò insuper cœnauerint, aluus exturbatur. His vbi balneo vsi sunt, dormire conducit. Vbi verò dormiuerunt, deambulare lenta ac multa circuitione. & si quidem aluus euacuata fuerit, cœnare, & bibere vinum paucum, meracius. Si verò euacuata nō fuerit, corpus oleo calido illinere. & si sitierit, vinū aquosum album aut dulce bibere ac quiescere. Si verò nō ob dormierit, āpius quiescere. Reliquus victus similiter vt his qui crapula grauantur, constituatur. Quod verò ad potus attinet, qui quidem aquosi sunt, tardioris trāsitus sunt, & intus

*Morbora
solutio.*

*Veratro
purgandi
sunt quibus
d capite de
stillatio flux
it*

*Crapula
morborum
parens.*

Medela.

HIPPOCRATIS LIB. DE VICTVS

obuoluntur, & circa præcordia redundât, & ad mictionem non decurrunt. Tali verò potu repletus, nullum opus celeriter perficere poterit, ex his quæ intento corpore per violentiam aut celeritatem perfici solent. Quiescat autem quàm maximè, donec vnâ cum cibis concoctus fuerit. Quicumque verò potus meraciores sunt, aut austeriores palpitacionem in corpore, & pulsationem in capite inducunt. His commodum est vt insuper dormiant, & calidû quid sorbeant, ad quod maximè iucundè affecti sunt. At verò ieiunium ad capitis dolorem ac crapulam malum est. Cæterum qui semel in die cibum capiunt, hi & impotentes sunt, & calidam vrinam min-
gunt, præter consuetudinem vasa vacua habentes. sit autem & os salum ac amarum, & in omni opere tremunt, & tēpora ipsis distenduntur, & cœnâ concoquere non possunt, velut si pransi essent. Hos autem minus bibere oportet quàm soliti fuerunt, & mazam liquidiorē pro pane sumere: & ex oleribus, rumicem, aut maluam, aut ptisanā, aut betas. Bibere verò vinum inter cibum, moderatū & aquosius: & à cœnâ modicè deambulare, donec vrina descēderit, ac minxerint. Utantur autem & piscibus coctis. Edulia porrò maximè de se significationem præbent. Allium flatum, & dolorem circa thoracem facit, & capitis gravitatem, & anxietatē, & si quis alius dolor antea fieri consuevit, eum exacerbauerit. Vrinam autem ciet, & hoc bonum habet. Optimum verò est vt quis ipsum edat, si aut ebrius est, aut ad potationem ire volet. Caseus flatum, & adstrictionem, & ciborum accensionem facit, quum crudum & incoctile sit edulium, pessimum autē est repletos ipsum inter potum edere. Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & viridia. His autem vtendum non est nisi cum cibis. Vnumquodque verò ex ipsis sua pecularia vitia habet. Cicer flatum, tum crudum, tum frictum, & dolorem inducit. Lens adstringit, & turbationē inducit, si cum cortice sumatur. Lupinus minimè inter hæc mala habet. Silphij caulis & succus, quibusdam quidem maximè, inexpertis autē non transit per ventrē. Verum vocatur hoc malum cholera sicca. Fit autē maximè vbi cum multo caseo mixtus fuerit, aut cum carnis bubulæ esu. Nā & atrabiliarie affectiones à bubularū carniū esu exacerbantur. Est enim insuperabilis ipsarū natura, & non cuiusvis ventriculi

Allij natura.

Casei operatio.

Legumina.

Cicer.

Lens.

Lupinus.

Silphium.

A triculi est ipsas concoquere. Optimè tamē ipsas concoxerint, ac summuering, qui percoctis & quàm verustissimis vtantur.

*Caprinae
carnes.*

At caprinae carnes quaecunq; in bubulis insunt mala, omnia habent, itemq; à concoctione alienitatē: & flatuosiores sunt ac ructus ampliores faciunt, & cholera generant. Sunt autem odoratissimae, solidae, ac iucundissimae, optimae, & percoctae, & frigidae. Verū iniucundissimae & graueolentes ac durae, pessimae: imò etiam recentes. Optimae verò sunt æstatis tēpore:

*Porcinae
carnes.
Suillae.*

pessimae autumnō. Porcinae verò carnes prauae sunt, quū fuerint crudiores aut ambustae. Magis autē cholera generant, & turbationē faciunt, Suillae autem optimae sunt omnium car-

B sunt, neq; tenues, neq; veteris victimae ætatē habent. Edere verò ipsas oportet absq; pelle, & subfrigidas. In cholera sicca venter inflatus est, & strepitus insunt, & dolor laterū ac lumborum. Secedit autē nihil deorsum, sed aluus adstricta est. Talem adseruato vt ne vomat, sed aluus subeat. Infusum itaque calidum ac pinguisimū quā citissimè per clysterē immittere: et oleo illitum in aquā plurimam calidā dimittito, in solum reclinās, et calidā paulatim affundēs. Et si calescēt ipsi aluus subierit, morbus solutus est. Dormire quoq; tali cōducit, et bibere vinū tenue, et verus ac meracius, et oleū dato, vt et quiescat, et aluus subeat, et soluatur morbus. A cibis verò et alijs abstineat. Si verò nō remiserit dolor, asinū lac bibendū dato, donec purgatus fuerit. At si liquida fuerit aluus,

C et bilis subeat, et tormina sint, et vomitus, ac suffocationes: his optimū fuerit quiescere. Bibere verò aquā mulsam, et nō vomere. Hydropum duae naturae sunt: quorum alter sub carne si fieri aggreditur, inuitabilis est. Qui verò cum inflationibus sit, multa bona fortuna opus habet, maximè autem ærumnis, et fomentis, ac temperantia. Edat autem sicca et acrida. Sic enim vel maximè vrina eiecerit, et plurimum viribus polluerit. Si verò difficulter spirauerit, et tempus verum fuerit, et simul ætas, viguerit, et viriū robur adsit, de brachio sanguinem detrahre oportet. Deinde panes calidos ex vino nigro et oleo tinctos edat: et quā minimum bibens quamplurimum laboret. et carnes suillas carnosas edat cum aceto coctas, vt aduersus accliuēs deambulationes reniti possit. Quicunque infernum ventrem calidum habent, et alui

*Aqua inter cutem
duo genera.*

egest io

HIPPOCRATIS LIBER DE VICTVS

egestionem acres & inæquales ipsis prodeunt præ colliquatio
 ne: his si quidem potentes fuerint, veratro albo reuellere o-
 portet. Sin minus, succus tritici horni crassus, frigidus dādus
 est, & lenticulæ fresæ decoctum, & panes subcineritij, & pi-
 sces febrienti quidem cocti, non verò febrienti, assati: & vi-
 num nigrum non febrienti: sin minus, aquam à mespilis, aut
 myrti baccis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut vitium
 cœnanthe. Si verò febris non habeat, & tormina adsint, lac
 asininum calidum modicum primùm, deinde sensim fiente
 progressu amplius, & lini semen, & triceam polentam, & fa-
 bas Aegyptias, exempto eo quod in ipsis amarum est, molita
 ac trita hæc inspergens bibat: aut ova semiconcreta assata
 edat, & similaginé, & milium, & alicam coctam in lacte: hæc
 cocta frigida edat, & quæ his similia existant, tum pocula, tū
 edulia in cibo assumat. Maximi momenti circa victus ratio-
 nem, est obseruare ac cauere, tū in acutis, tum in longis mor-
 bis, & intensiones febrium, & remissiones, quo temporum oc-
 casiones scias, quando cibos exhibere non oportet, & quādo
 tuto exhiberi possunt. Insuperque quando plurimum ab in-
 tentione absint. Nosse porro oportet eos quibus caput dol-
 let ab exercitationibus, aut cursibus, aut profectio-
 nibus, aut venationibus, aut ex alio quopiam intempestiuo labore; aut
 ex re venerea. decolores item, raucosos splenicos, exangues,
 spiritu-
 sos, & siccam tussim habētes, ac siticulosos, & flatuo-
 sos, & venarū interceptiones: & eos qui intenta habent præ-
 cordia, & latera, & dorsum, & torpescētes, & obscure viden-
 tes, & quibus aurium sonitus incidunt, & qui vrinariam fistu-
 lam vrinam non continentem habent, & morbo regio labo-
 rantes, & quorum alui cruda eijciunt, & quibus ex naribus,
 aut per sedem sanguis vehementer erumpit, & qui tubercula
 habent, & quibus vehemens dolor incurrit, & nō supraue-
 rint: ex talibus nullum medicamento purgandum esse. Peri-
 culum enim habebis, & nihil opis afferes, & spontaneas libe-
 rationes ac iudicationes tolles. At si sanguinem alicui de-
 trahere cōducit, solidam aluum facere oportet, atque sic de-
 trahere, & fame macerare, ac vinum auferre. Postea victu cō-
 ueniente, & fomētis humidis, reliquam curationem perage.
 Si verò aluus densa ac adstricta esse videatur, molle infu-
 sum per clysterem immitte. Si verò medicamentum dare vi-
 sum fue

item, in Art
 quæ in re
 queritur. Sed
 legendum aut
 ex re uenita
 decolores, rau-
 cosos, etc.

medica-
 montum
 bg pro
 Sanguis
 quomodo
 mittendus.

A sum fuerit, per veratrū tuto sursum purga. Deorsum verò nulum talium. Optimum autem est ad mictionē, & ad sudores, & ad deambulationes perducere, & leni frictione vti, ut ne habitum densum efficias. Si verò in lecto decumbat, alij ipsum fricēt. Et si quidem in thorace supra septum transversum, affectio ipsum infestarit, plurimum resideat, & minimè ipsum reclinent, quandiu vires tolerant: & sedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si verò in inferna aluo sub septo transverso dolores habeat, decumbere conducit, & nullo motu moveri tali corpori cōfert, extra defricitionem. Qui verò ex inferna aluo solvuntur dolores, per urinas & sudores, si moderatè delabuntur, sua sponte solvuntur, qui parvi sunt. vehementes autem parvi sunt. Tales enim aut pereunt, aut absque alijs morbis sani non fiunt. Verum qui huiusmodi sunt incumbunt ac firmantur. Potio hydropico.

*Hydropici
potio.*

Cantharidas tres, detracto capite vniuscuiusque, & pedibus, & alis, corpora videlicet ipsarum in tribus aquæ cyathis terito. Quum autem is qui bibit doluerit, calida aqua perfundatur. Bibat autè prius illitus, ieiunus: & edat panes calidos ex oleo. Medicamentum sanguinem sistens. Fici succum lana exceptum intus ad venam appone. Aut coagulo intorto nares obturato. Aut chalcitidem digito prius efformatam apprime, & cartilagine extrinsecus vtrinque comprime: & aluum lacte asinino cocto solue, & caput rade, & perfrigeretia adhibe, si calidum tempus fuerit. Sefamoides sursum purgat. potio eius est drachma dimidia in aceto mulso trita. Cōmiscetur etiam veratri tertia porionis pars, & minus suffocet. Ad trichiasin, id est pilos pungentes in palpebris nascentes. Immissum in acum foramen habentem filum, in summa supernæ palpebræ margine deorsum versus perpunctione facta transmittre, & aliud itidem sub hoc infernè trahice: & extenta fila consue ac deliga, donec decidant. & si quidem satis habuerit, bene est. Sin minus, & quid defecerit, rursus eadem facito. Sed & hemorrhoidas eodè modo transmittes, filo lanæ succidæ crassissimo ac maximo in acum immisso, ac deligato. Securior enim fit curatio. Deinde cōpressionem facta medicamento erodente vtere, & ne proluet donec deciderint: semper vnam relinque. Postea verò resectis viribus veratrum dato. deinde exerceatur & exudet, & ante

*Sanguinem
sistens.*

Trichiasis.

*Hæmor-
rhoides.*

exercita

exercitationē mane frictio multa fiat. Verūm à cursu absti-
 neat, & ebrietate, & ab acribus, origano excepto. Vomat au-
 tem per interpositos dies septem, aut ter in mense. Sic enim
 quā optime habuerit corpus. Vinum verò fuluū, austerum,
 aquosum ac modicum bibat. At verò ad suppuratos, scillæ
 frusta rotunda secta in aqua coquito, & vbi valde bene effe-
 buerit, diffundito, & alia affusa coquito, donec ad cōtactum
 percocta ac mollia apparuerint. Deinde leuiter tritis cumi-
 num frictum ammisce, & sesama alba, & amygdalas recen-
 tes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea
 vinum dulce bibendum. Sorbitiones verò sumat, peplum,
 appellatum meconium album, tritum acetabuli parui men-
 sura, in aqua loturæ farinæ recentis dilutum ac coctum, mel-
 le affuso tepidum absorbens. Atque sic degat per diem. De-
 inde supputans ea quæ eueniunt cœnam dato. Fabarū item
 depuratarum quadrantem, & rubiæ sarmenta duodecim, te-
 rito, misceto, coquito, & pingui addito delingenda præbeto.

*Oculorum
medela.*

Ad oculos. Spodium lotum probè velut farinæ massam
 subactum, nō liquidum, vix immaturæ acerbæ succo hume-
 ctatum leuiter terito, in sole resiccato, & vt ad illitionē com-
 modum sit humectato: quum verò siccum factum fuerit, leui-
 ter trito sicco oculos sublinito, & angulos conspergito. Ad
 eosdem. Ebeni drachmam, æris vsti obolos nouem, croci
 obolos tres. Hæc trita in coticula terito, & vini dulcis hemi-
 nam Atticam affundito, deinde ad solem obuelata exponi-
 to, & vbi cocta exaruerint, ipsis vttere. Ad dolores oculo-
 rum. Chalcitidis drachmam, vix expressæ vt duæ partes
 sint reliquæ, myrrham & crocū terito, & mustum admisce-
 to, & ad solem coquito, ac illinito. Sint autem in vase æneo.

*Strangula-
tio vuluæ.*

Earum quæ ab vtero strangulantur cognitio. Digitis duo-
 bus comprimito, & si senserit, vteri strangulatio est. Si non,

*Hydropi-
corum cata-
potia.*

conuulsio. Ad hydropicos. Pepli meconij appellati, aceta-
 bulum paruum Atticum rotundum, potio vna, squamæ æris
 specilla lota tria. Hæc leuiter trita, & cum farina recenti ag-
 glutinata, ac in catapotia efformata, deglutienda dato. Pur-
 gant aquam deorsum. Aliud, quod stercora per aluum expel-
 lit. In caricas succum tithymalli instilla, in singulas septies.

*Solutio ven-
tris.*

deinde in nouum vas compositas reconde, ac exhibe ante ci-
 bum. Aliud. Peplum, quod & meconium appellatur, aqua af-
 fusa

A fusa trito ac excolato, & farinam placētārum torrefactarum
ammiscens, & mel coctum affundens, hydropicis edendū
dato: & vinum dulce aquosū, & aquam mulsam aquosā
insuper bibendam. At meconium, quod primum excremē-
tum à pueris prodit, collectum recondito, ac curato.

Meconium

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE IUDICATIONIBVS

NIBVS I.

ARIO

MEDICO P.

interprete.

B



E iudicationibus quæ cito ad melius
tendunt plerunq; eadem signa sunt,
quæ etiā sanitatis. Sudores enim opti-
mi sunt, & celerrimè febrē sedāt, qui
in iudicatorijs diebus fiunt, & febrē
perfectè summouēt. Boni quoq; sunt
qui per totum corpus fientes, morbū
facilius ferre faciunt. Qui verò nihil

*Sudores qui
boni.*

horum faciunt, incommodi sunt. Densari verò oportet alui
egestionem, morbo ad iudicationē tendente. Sit autem sub-

Oletum.

C fulua, & non valde graueolens. Commodum est & lumbricos
exire ad iudicationē. Vrina autem optima est, quæ habet al-
bissimā subsidentiam, & leuē ac æqualem, per totum tempus
donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim securum ac
breuem fore morbū. Si sudore oborto morbus deficiat: &
vrina fulua albā subsidentiam habēs cōspiciatur: his eadē die
recidua febris fiet, atq; hæc quinta die citra periculū iudi-
catur. His qui in breuissimo tēpore sani euadēt, omnia ma-
xima signa fiunt. Nam magis sine dolore degūt, & extra pe-
riculū, & noctu dormiunt, & alia signa secura præ se ferūt.

*epitoca
Vrina
lumbricos
in bonas*

Quibus in febre non lethali capitis dolor, & alia signa cir-
cūstant, in his bilis dominatur. Quibus inceperit dolor pri-
mis diebus, & quarta & quinta magis premūtur, hi septima
à febre liberātur. Febres iudicantur in iisdē numero diebus,
ex quib

*Capitis do-
lor.*

400.

HIPPOCRATIS LIBER

Febres lenes

ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fientes quarto die desinunt, aut prius. Lethalissimæ verò & signis horredissimis fientes, quarto die aut prius occidunt. Primus igitur ipsarum insultus sic definit. Alter ad septimum deducit. Tertius ad vndecimum. Quartus ad decimumquartum. Quintus ad decimumseptimum. Sextus ad vigesimum. Atque hæc in acutissimis morbis, per quatuor ad viginti, appositiones fiunt. Non potest autem quicquam horum integris diebus exactè numerari. Neque enim anni ac menses totis diebus constant. In febribus ardentibus bona signa apparètia, qualia in sanis scripta sunt, si quidem minora fuerint, ad tertium diem remissionem indicant. crassiora verò, in crastinum crassa autem, eadem die. In febribus ardentibus si posterius septimo die morbus regius accedat, iudicium est sudoris. Nam morbus non solet exudare, neque vquam alibi abscessum facere, sed sanus fit. Necessè autem est ubi calor febris discessit, & humorè in seipsum attraxit, febre contingere iudicationem, per urinas prodeuntes, aut etiam alui egestionem, aut sanguinis ex naribus fluxum, aut mictionem multam, aut per multam humiditatem, sudorem, aut vomitum, Mulieri verò etià per mensium viam. Maxime igitur hæc iudicationem faciunt, & quicquid his propinquum contingit. Facit autem & alias iudicationes, sed minus quàm has. Si verò septimo die morbus regius accedat, aut posterius, in febre ardente, & difficilis multi sputi secessus, tum in ardētibus, tum in alijs febribus: si nullo talium signorum fiente dimiserit febris, necessè est tales iudicationes pro illis fieri, aut magnorum tuberculorum abscessum, aut dolores ex abscessu vehemētes, aut colliquationes humorum ex calore. Iudicationes & remissiones eorum quæ febrem ardentem significant, longiorem morbum faciunt. Si verò fortia fuerint, mors plerunque sequitur. Reliquæ verò ardentes secutæ desinunt septimo aut decimoquarto die. Solet autem & ad lypyriam deuenire, & detinet maxime xl. dies, & in Epialum transit. & lypyria eadem quoque die corripit ac dimittit. Fit autè & capitis dolor: Si verò lypyria non dimiserit in xl. diebus, sed producta fuerit, & holor habuerit caput, & dellyret æger, ipsum purgato. Desinente verò febre ardente si accedat morbus regius, non solet amplius exudare,

Morbus regius.

- A** re, neq; vsquam alibi abscessum facere, sed sanus sit. Tertia in septem circuitibus plerunq; iudicatur. Quibuscunq; in febribus intolerabilibus septima, aut nona, aut decima quarta morbus regius accedit, bonum: si non dextrum præcordium durum fiat. Sin minus, ambiguum. Acuti morbi in quatuordecim diebus plerunq; iudicantur. Sudores febricitanti si fiant tertia die, & v. & vij. & ix. & xj. & xiiij. & xxj. & xxxj. hi sudores morbos iudicant. Qui verò non sic fiunt, dolores significant. Concoctiones vrinarum paulatim maturescentes, si in iudicatorijs diebus concoctæ fuerint, morbum soluunt. Exemplum vrinarum vlcera facere oportet. Nam vlcera si repurgantur pure albo, celerem curationem indicant. Si verò in saniosos humores transmutentur, maligna fiunt. Eodem modo & vrinæ significant. Si ex dolore tennes fiant, ex occasione ratiocinari oportet, ex qua morbus accessit, & hanc inspicere vbi sedatur. Nam hac deficiente, alijs signis qualia conueniunt accidentibus, non putandum est morbo liberationem contingere. Si doluerit caput, & ex hoc febris accedat, & hinc non sedetur: dolore non cessante febris non iudicatur: & plurima talia iudicationis lōgæ sunt ad melius, etiam in his quæ ad sanitatem tendunt.
- In præcordijs tumores molles, & doloris exortes, & ad contactum cedentes, diuturniores quidem iudicationes faciunt, minus autem horrendas tuberculis his contrarijs. Eodem modo habet & de tuberculis in reliquo ventre. Ex vrinis si quidem id quod mictum est, purum fuerit: subsidentiam verò albam ac leuem habuerit, diuturnior fit morbus, & minus quàm optima secuta est hæc vrina. Si verò & vrina subrubra fuerit, & subsidentia subrubra ac leuis: diuturnior quidem hæc morbum quàm prior significat, sed valde salutarem. Quicunq; podagrici morbi fiunt, hi in quadraginta diebus ab inflammatione liberi sedantur. Sed in his pleraq; longæ iudicationis ad melius sunt. Quæ ad mortem tendunt, in die ac nocte iudicantur, quæ videlicet debilitationis signa sunt, velut epti medicamenti, exturbationis alui & fursum, & deorsum, anxietatis, & aliorum huiusmodi. Si igitur horum signa in die ac nocte submoueantur, bene est. Sin minus, lethalia esse putanda sunt. Sudores pessimi sunt frigidi, & circa ceruicem fientes. Hi enim mortes, & morborū

Acuti morbi. idē infra. 510
Sudor decretorius.
Lotiorum maturatio digestiōe.
Vlcera.

Capitis dolor cū febre.

Præcordia turgida.
Tubercula.
Vrina.

Podagrici.

Debilitatis signa.

Sudor frigidus.

HIPPOCRATIS LIBER

longitudinem præsignant. Alui egestionēs variæ, diuturniores quidem sunt nigris & alijs lethalibus egestionibus, nihilo verò minus perniciosæ. Sunt autem tales, ramentosæ, biliosæ, cruentæ, prasinæ, nigræ: & aliquādo simul omnes prodeunt, aliquando singulæ particulatim. *Vrina* si quandoque pura micta fuerit, quandoque subsidentiam albam ac leuem habens, diuturnæ tales sunt, & minus securæ quàm optima *vrina*. Si verò fulua ac tenuis fuerit *vrina* multo tempore, periculum est ne sufficere homo possit, donec concocta fuerit *vrina*. & si aliàs superstitis futuri signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locos infra septum transuersum. In febribus si mutationes habeat *vrina*, diuturnitatem temporis.

significat, & necesse est agrotum mutari & ad deteriora, & ad alteram partem. Si *vrinæ* ab initio non similes fuerint, sed ex tenuibus crassæ fiant, & penitus tenuēs, tales ægrè iudicant ac inconstantes sunt. Frigidi sudores cum acuta quidem febre, lethales sunt: cum mitiore verò, lōgitudinē morbi significant. Et ubi in corpore caliditas aut frigiditas, hic morbus est: & ubi in toto corpore mutationes repētinae fiūt, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio transmutetur, morbi longitudinem significat. Si febricitanti sudor accedat febre non deficiente, malū. prolongatur enim morbus, & humiditatem significat. Febricitanti frigidi sudores accedentes, longam febrem significant.

Sudor sani.

Sudor multus intemperatē siens sano, morbum significat, æstate minorē, hyeme maiorē. Alui egestionēs si in idem concedere ac cōsistere permiseris, velut ramenta subsident: si pauca, modicus est morbus: si multa, multus: his infusum per clysterē adhibere conducit. Quibus verò in egestionē infernē bilis atra subsidet, si copiosior, maior est morbus. Si paucior, minor. Si venæ pulsarint, & facies sana fuerit, & præcordia non mollia, sed in tumorem eleuata, diuturnus est morbus, & absque conuulsione non soluitur, aut multa sanguinis ex naribus fluxione, aut vehementi dolore. Et palpitaciones

Pulsus uenarum.

Breui mori tui signa.

in manibus, diuturnæ febris signū sunt, aut brevis iudicatio nis in deterius: & in his pleraque quæ ad mortem tendunt.

Febris continua.

His qui breuissimo tempore perituri sunt, maxima signa ab initio fiunt. Nam & difficulter spirant, & noctu non dormiunt, & signa periculosa præ se ferunt. In febre continua si quis

- A** si quis quarta die & septima affligatur, & vndecima non iudicatus fuerit, plerunque perit. Quicumque à distentione antrorsum ac retrorsum corripiuntur, in quatuor diebus pereunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt. In febribus ardentibus si accedebat morbus regius, & singultus quinto die, lethale est. Recidivæ fiunt in his, quibus desinētibus vigiliæ fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolores vniuscuiusq; membri: & quibus febres sedantur, neque signis solutorijs fientibus, neq; in iudicatorijs diebus: & si deficiente febre, & sudore accedente, urinā fulvā minxerint, albam subsidentiā habentem, his febris recidivā eadem die expecta. Hæ verò recidivæ quinto die iudicantur extra periculum, & si ex iudicatione facta urinā rubicundam, rubram subsidentiā habentem minxerint, etiam his recidiva febris fit eadem die: & pauci ex hac servantur. Quum recidit febris ardens, plerunq; etiam exudat. Et si reuertens tot diebus detineat quot prius, etiam terito recidivat, si non impari die dimiserit reuerfa. Plerunq; si crudæ sint urinæ, & alia signa non secundum rationē eveniant, morbus in die iudicatoria recidivat. Quandoque verò etiam reuertitur in die iudicatoria, his talibus relictis. Abscessus circa aurem quibus circa iudicationem fientes non suppurantur, his submotis recidiva fit, iuxta recidivarum rationē, similis circuitu: in his spes est ad articulos abscessum fieri: aut urina crassa, qualis est alba in quartanis de lassatorijs, liberat ab abscessu. Quibusdam verò horum etiam sanguinis è naribus eruptiones fiunt. Hæc autem sanguinis eruptio quartanas non soluit, neque morbos qui per alui egestionem sanari solent.
- A**trabiliarijs cum phrenitide occupatis, si hæmorrhoides oboriantur, bonum est. Quicumque insaniunt sua sponte liberati ex morbis, his insaniam soluit dolor ad pedes progressus, aut ad pectus: aut tussis vehemens oborta. Si verò horum nihil fiat, insania soluta oculi priuatio contingit. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, si hæc sedata fuerint, suppurati fiunt. Dolorem in locis infernis fortem soluit aut surditas, aut sanguis multus è naribus erumpens.
- Insania magni morbi ex more fientis solutio. Quibus in febribus ardentibus coxarum dolor, oculorum distortio, aut cæcitas, aut testium tumores, aut mammarū eleuatio, febrem

Tetanos.

Morbus regius.

Signa recidivæ
ad alit
abs fastidii,
morborum
fientibus absq;
causa manifestis

Febris ardens.

Urinæ crudæ.

Abscessus
circa aurē.Phrenitis,
Insania.

Causæ solutio.

HIPPOCRATIS LIB. DE IUDICAT.

*Tremor.
Surditas.*

*Subiti doloris
medela
Morbus
aqua subter
cutem.*

Pituita alba.

Alui profluuium.

Capitis dolor.

*Lippitudo,
Spasmos.*

ardentem soluit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxus. In D febre ardenti si insuper corripiat rigor, exudare solet. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. Quibus in febribus ardentibus tremores oboriuntur, mentis emotio soluit. Quibus in febribus aures obsurduerunt, his non soluta febre, insanire necesse est. Soluit autem sanguis ex naribus erumpens, aut alius biliosa egerens, aut dysenteria accedens, aut coxarum, aut genuum dolor. Quibus febribus rigor accedit, febris soluitur. Quibus dolores fiunt derepente, praecordium eleuatum est supernè, & si circa spuriam costâ graues dolores fiunt, his solutio fit venæ sectio, & purgatio deorsum. Non enim corripit febris vehemens locis impotentibus. In his qui ab hydropse detinentur, si aquositas per ventrem ad vesicam aut ventrem fluat, solutio fit. Si à pituita alba occupato, alui profluuium vehemens accedat, solutio fit. Qui ab alui profluuiio multo tempore detinentur vnâ cum rursi, non liberantur, si non dolores vehementes in pedibus inciderint. Si verò vult commutatio ac correctio naturæ fieri, postquam non amplius alius profluit, aut inanem omnem egestionem habuerit, flatus foras prodeuntes accidunt. Nullum itaque humorem manifestum habent. Quare ei qui ita habet secure exhibere scies ea quæ conueniunt, & si voluulus accedat, vinum frigidum multum meracum paulatim bibendum dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Soluit autem & febris, aut dysenteria. Caput circuncirca dolenti ac ægrotanti, si pus per aures, aut per nares fluxerit, soluit morbum. Quibuscunque sanis derepente dolores oboriuntur in capitibus, & statim voce priuantur, ac stertunt, hi in septem diebus pereunt, si non febris corripuerit. Caput circuncirca dolenti, quicumque ex supernis locus doluerit, cucurbitam affige. Soluit dolor ad coxas, & genua, & anhelatio, quicquid horum factum fuerit. Lippienti ab alui profluuiio corripì, bonum est. A conuulsione aut distentione neruorum vexato, febris accedens soluit morbum. Si à febre detentum conuulsio corripuit, sedatur febris eadem die, aut postridie, aut tertia die.

Hippocr

*uig. lilyus de lori
S. 79 de lori*

AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE DIEBVS

IUDICATORIIIS, IANVS COR-

NARIO M
PHYSICO I.
TERRETI



Agnam artis partem esse arbitror, *Potissimè*
de his quæ rectè scripta sunt posse *huius artis*
considerationem facere ac iudicare. *pars.*
Mens quâ
do non fals
litur.
Prima mot
orum obs
eruatio.
Qui enim hoc nouit, & his vitur,
nō videtur mihi in arte multū falli
posse. Oportet autē exactè perdisce
re vnamquāque temporū constitu-
tionem. & quenq; morbum. & qui
morbus sit bonus, & qui periculofus

aut in constitutione, aut in morbo. & qui morbus longus sit
& lethalis: & qui longus, & non perniciosus ad vitam. & qui
acutus ac lethalis: & qui acutus, & superesse sinens. Ex his e-
nim ordinē dierum iudicatoriorū considerandi ac preceden-
di facultas datur. & ex his cognoscere datur, quibus & quādo

& quomodo victum præscribere oportet. Maximū itaque
signum in ægrotis qui victuri sunt, si nō præter naturā fuerit
febris ardens, & alij morbi eodem modo. Nihil enim horrē-
dum, neque lethale sit in his quæ secundum naturam sunt.
Secundum est, si non etiam ipsum tempus simul cū morbo
impugnet. Plerumque enim hominis natura, vniuersi potesta-
tem non superat. Postea verò si partes circa faciem graci-
lescant: & venæ in manibus, & in oculorū angulis, & super-
cilijs quietem habeant, quum prius non quieuisent. Huic si
vox fuerit debiliior, & sit leuior: & spiritus rariior ac tenuior,
sequenti die remissio morbi contingit. Hæc igitur considē-
rare oportet ad iudicationes: & an bifida linguæ pars velut
salua alba obducitur, & an in summa linguæ hoc idem factū
sit, verū minus. Si quidē igitur parua hæc fuerint, ad ter-

Secundæ

Tertiæ

Lingua san
liuioja

• HIPPOCRATIS LIBER

*Oculorum
notæ.*

Morbi acuti unde.

*Cacutiens
signum.*

*Præ oculis
quæ cursiva
te uidentur.*

*Somnia quæ
uixent.*

*Morbi bu-
ius causa.*

*Tetanos
quotuplex.*

tium diem remissio fit morbi. Si verò aliquanto crassior sit saliuæ, in crastinum. Si verò adhuc crassior, eadem die. **Quin** & albas oculorum partes in principio morbi denigrari necesse est, si inualuerit morbus. Hæ igitur si puræ fiât, perfectâ sanitatem indicant: leniter quidem, tardius: vehementer autem, citius. Cæterum acuti morbi fiunt à bile, ubi in hepar influxerit, & ad caput constiterit. Hæc igitur patitur hepar. Intumescit & expanditur ad septum transfuersum præ tumore. & statim ad caput dolor irruit, maximè verò ad tempora: & æger auribus non acutè audit. Sæpe etiâ oculis non videt. & horror, & febris corripit. Atq; hæc quidem ab initio morbi ipsi fiunt ex interuallo, quandoq; vehementer, quandoque minus. Quâto autè morbi tēpus magis progressum fecerit, tanto maior fit dolor in corpore: & pupillæ oculorum sparguntur, & obtuse videt: & si digitū admoueris ad oculos, nō sentit, eo quòd non videt. Quòd autem non videat, inde cognoueris. Non enim nictat dum digitus admouetur: & flocos aufert de stragulis, si quidē viderit, pediculos esse putās. Et quū hepar magis expansum fuerit ad septum transfuersum, delirat: & ob oculos sibi aduersari putat reptilia, & alia omnigena animantia fera, & milites armatos pugnantes, & ipse aduersus ipsos pugnare sibi videtur: & talia dicit velut qui videat, & egreditur, & minatur si quis ipsum egredi nō permittat. Et ubi surrexerit, crura eleuare non potest, sed cadit. Pedes autè semper fiunt frigidi. Et quum dormierit, exilis à somno, & insomnia horrēda videt. Hoc autè cognoscimus q̃ ab insomnijs exilit ac perterretur, postquā ad sanā mentem redijt. Exponit enim insomnia hæc, qualiaq; & corpore fecit & lingua loquutus est. Atq; hæc quidē sic patitur. Quandoq; verò etiâ voce priuatur, per totā diem ac noctem multū aceruatū spiritū respirās. Postquā verò delirare cessauit, statim ad sanā mentē redit. Et si quis ipsum interroget, rectè respondet, & intelligit oīa quæ dicuntur. Deinde rursus paulo post in iisdem afflictionibus iacer. Hic morbus accidit maximè in peregrinatione, & si alicubi desertā viam iuerit, & timor ipsum ex spectro corripuerit. Corripit etiam alijs modis. Tetani tres. Si quidem ex vulnere tetanus, siue distentio neruorum antrosum ac retrorsum fiat, æger hæc patitur. Maxillæ cōgelantur ac rigent, velut ligna: & os aperire non potest.

A potest, & oculi frequenter lachrymantur ac distrahuntur, & dorsum rigit, & crura flectere non potest, neq; manus, neq; spinam. Quū verò lethalis fuerit, potus & cibi quos prius ac cepit, per nares quandoq; redeunt. At opisthotonos, retrorsum fiens distentio, reliqua quidem eadem ægro inducit vt plurimum, fit autē quū in ceruice tendines retrorsum agrotarit. Aegrotat autē, ab angina, aut ab vna, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquando etiā à capite febribus accedentibus cōuulsio succedit. Iam verò etiā à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partem, & præ dolore dorsum ac pectora rigent, & eiulat. Hic cōuellitur vehementer, vt vix detineatur à præsentibus, ne è lecto excidat. Alius tetanus est mi-

Opisthotonos.

B nus lethalis prioribus, fit autē ab iisdem, & totum corpus similiter conuellitur. Febris ardēs prædictis non similiter fit. Vrit enim semel vt necesse sit febricitare. Sitis igitur multa hominem tenet, & febris vehemens. lingua verò rumpitur exasperata, & sicca fit: & color ipsius primū quidem pallidus est, velut solet. progressu verò tēporis nigrescit. Et si quidem in principijs nigrescat, citiores iudicationes fiunt. Si verò posterius, diuturniores. Coxendicum morbus ex his maximè causis fit in plerisq;: si quis diutius in sole versetur, & coxendices fuerint calfacti, & humor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quodd autem id quod resiccatur condensatur ac cōpingitur, hoc magnum signum est. Aeger enim articulos vertere ac mouere non potest, præ dolore articulorum,

Spasmus.

Causos.

C & eo quod verticula sunt cōpacta. Dolet autem magis lumbos & verticula ea quæ sunt ex obliquo coxarū, & genua. Cōsistit autem dolor plurimo tēpore in inguinibus simulq; coxendicib; acutus ac æstuosus, & si quis ipsum erigat aut trāsmoueat, eiulat præ dolore quā maximè potest. Quandoq; verò etiam cōuulsio accedit, & rigor ac febris. Fit autem à bile & pituita: fit etiā à sanguine: & dolores cōsimiles ab omnibus morbis: & rigor & febris aliquando corripit debilis.

Ischiaca.

assignavit proleone

Morbus in mor-

giu. 6. 15. 16.

2. dixit sicut

154. sed se-

lutione vi-

Morbus regius acutus est, & celeriter occidens. Color totus malicorij speciem refert, & est vehementer cum virore pallidus, quemadmodum lacerti cum virore pallidiores. cōsimilis autem est cutis. Et in vrina subsidet velut eruum fuluū & febris & horror debilis habet. Quandoq; etiam fragula habere non sustinet, sed mordetur ac raditur matutino tem-

Et 4

22. 155. 12.

HIPPOCRATIS LIBER

Peripneumonia.

pore, ubi nondum cibum acceperit, internis partibus. Deinde **D** viscera plerunque sugunt. Et si quis erigat ipsum aut alloquatur, non sustinet. Hic ut plurimum moritur intra quatuordecim dies. Has autem ubi effugerit, sanus fit. Peripneumonia talia facit. Febris vehemens tenet: & spiritum densum ac calidum respirat: & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolores circa scapulas, & claviculas, & mammam: & grauitas in pectoribus, & delirium. Quandoque verò doloris exors æger est, donec tussire inceperit. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saluam autem albam & spumofam primum spuit. Lingua flaua est, verum progressu temporis nigrescit. Si quidem igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Si verò posterius, tardius. Tandem verò etiā **E** rumpitur lingua, & si digitum apponas, inheret. At liberationem à morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc autem patitur æger minimum diebus quatuordecim, ad summum vnā & viginti: & tussit hoc tempore vehementer: & vnā cum tussi purgatur, primum quidem saliuam multa ac spumosa. Septima verò & octaua die, ubi febris in vigore fuerit, & humida sit peripneumonia, crasstor: sin minus, non. Nona verò & decima, cum virore pallida ac subcruenta. Duodecima autem vsq; ad decimamquartam, multa & purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quorum verò & natura, & morbi constitutio sicca est, in his minus. Cæterum de iudicatorijs diebus, etiam iam ante à me **F**

Febrim de tertoria.

ip: 6 pntem: 315

dictum est. Iudicantur autem febres quarta die, septima, vndecima, decimaquarta, decima septima, vigesima prima. Et his autem acutis quædam etiam trigesima. Deinde quadragesima. postea sexagesima. Quum verò hos numeros excesserint, diuturna in febrium constitutio fit.

HIPP

HIPPOCRATIS

COI LIBER PRAENOTI-
TIONVM, IANO CORNA-

RVM MEDICO PHI-

SICO INTER-

PRETE

gal 9^o de mor-
bis 7 lib^o 1^o
de progn^o
de saltis mor-
bis acutis in
tunc aut



Medicum prænotionē adhibere, optimū esse mihi videtur. Prænoscens enim & prædicēs apud ægrotos, & præsentia, & præterita, & futura, & quæ ipsi ægroti relinquunt exponens, fidē utiq; fecerit, quod ægrotorum res magis cognoscat, quare audebunt homines

Quæ medi-
ci sunt.

seipso medico cōmittere. At verò curationē optimē fecerit, ubi prænouerit futuras affectiones. Sanos equidē facere omnes ægrotos impossibile est, hoc enim præstātius esset, quàm prænoscere in posterū euentura. Quādoquidē verò homines moriuntur, alij priusquā medicū vocent, præ violētia morbi: alij verò accito etiā medico, derepentē vita decedunt, quidā ubi vnā vixerūt diē, quidā tempore paulō diutiore, anteaquā medicus per artē aduersus singulos morbos repugnet: itaque nosse oportet taliū affectionū naturas, quantū corporū vires excedūt. Simul verò & si quid diuini in morbis inest, etiā huius prænotionē ediscere. Ita enim meritō admirationi fuerit,

C& medicus bonus extiterit. Nā quos superstites manere possibile est, eos adhuc magis rectē cōseruare poterit, ex multo tēpore antea consiliū adhibēs ad singula. & tum morituros, tum seruandos, prænoscens ac prædicēs, & culpa exors fuerit. Considerare porrò hoc modo cōuenit in morbis acutis, primum quidē faciē ægroti, an similis sit his quæ in sanis sunt, maximē verò an ipsa sibi ipsi. Ita enim optima fuerit. Si verò maximē cōtraria simili fuerit, horrendissima est. Talis autē fuerit, nasus acutus, oculi caui, tēpora collapsa, aures frigidae ac contractæ, & extremitates aurium auersæ, & cutis circa frōtem dura & circūtēta ac arida, & color totius faciei pallidus, aut etiā niger, & liuidus, aut plumbeus. Siquidē igitur in principio morbi facies talis fuerit, & nondū ex alij coniecturam facere licuerit, interrogare oportet, num vigilauerit ho-

Quæ medi-
ci cogno-
scenda.

Facies
Hippocra-
tica.

HIPPOCRATIS LIBER

mo, aut alui excrementa valde liquida sint, aut fames aliqua **D**
 ipsum teneat. Et si quidē horū aliquid cōfiteatur, minus gra-
 ue esse putandū est. Iudicantur autē & cognoscuntur talia
 in die ac nocte, si ob has causas facies talis fuerit. Si verō ni-
 hil horū esse dicat, neq; in prædicto tēpore cōsidat. nosse cō-
 uenit mortī proximū esse, At si vetustiore existente morbo,
 aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit facies, de his in-
 terrogare oportet, de quibus etiā prius iussit: itēq; alia signa
 cōsiderare, & in vniuersa facie, & in corpore, & in oculis. Si
 enim lucē fugiāt, aut inuolūtariē lachryment, aut distorque-
 ant, aut alter altero minor fiat, aut albas partes rubētes ha-
 beāt, aut venulas liuidas aut nigras in ipsis habeāt, aut lemæ
 ac sordes circa oculos appareant, aut etiā instabiles, aut emi-
 nētes, aut caui vehemēter facti, aut squallētes & obscuri fue-
 rint: aut color totius faciei alteratus fuerit. Hæc omnia mala
 & pernicioſa esse putandū esse. Cōsiderare verō cōuenit etiā
 oculorū subapparitiones in somnis. Si em̄ albæ quid partis
 subapparuerit, palpebris nō cōmissis, si id nō ex alui pfluui-
 o, aut medicamēti potione fuerit, aut agrotus nō ita dormire
 cōsueuerit, malū signū & valde lethale est. Si verō retorta, aut
 cōtracta fiat, aut liuida, aut pallida palpebra, aut labiū, aut na-
 sus, cū aliquo ex alijs signis, mortī p̄ximū esse sciēdū est. Le-
 thale est etiā habere labia resoluta, & pendētia, & frigida, &
 albicātia facta. Decūbentē agrotū à medico deprehēdi cōue-
 nit in latus dextrū aut sinistrū, & manus, & collum, & crura
 modicē inflexa habentē, & totū corpus flexibile sitū. Ita em̄ **P**
 plurimi ex sanis decūbunt. Optimi autē sunt decubitus qui
 sanorū decubitibus similes existūt. At verō supinū iacere, &
 manus, & collū, & crura extenta habere, minus bonū est. Si
 verō etiā pronus fiat, & de lecto ad pedes dalabatur, magis
 horrēdū est. Si verō nudos quoq; pedes habere cōperiat, nec
 admodū calidos: & manus, & collū, ac crura inæqualiter dis-
 iecta, ac nuda, malū est. Anxietatē enim significat. Lethale est
 & hiantē semper dormire: & crura supini iacentis valde in-
 curuata esse ac cōplicata. At in ventrē decūbere, si quis nō sit
 adſuetus dū sanus fuit ita dormire, delyriū significat, aut do-
 lorē locorū circa ventrē. Cæterū erectū sedere velle agrium
 in morbi vigore, in omnibus morbis acutis malum est, pes-
 simum autem in peripneumoniciſ pulmōne inflammato.

Denti

*Oculorū si-
gna.*

*Dormien-
tium conie-
ctatio.*

*Cubatio
qualis.*

- A** Dentibus stridere in febribus, quibus nō familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est. Verum prædicere oportet ab utrisque periculum futurum. Si verò etiā delyrus hoc faciat, perniciosum valde iam existit. Ulcus autem siue prius factum fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim periturus est homo, ante mortem liuidum ac siccū erit aut etiā pallidum & siccū. At de manuum latione ita sentio. Quæ in febribus acutis, aut peripneumonijs, aut in phreniti de, aut capitis dolore, ante faciem feruntur, & frustra venantur, & festucas legunt, & floccos de vestibis euellunt, & de pariete paleas detrahunt, eas omnes malas & lethales esse.
- B** Spiritus densus dolorem significat, aut inflammationem, in locis supra septum transuersum. Qui verò magnus expiratur, & per multum temporis interuallum, delyrium indicat. Si verò frigidus ē naso & ore expiretur, valde iam perniciosus est. Bonam autem spirationem valde magnam vim habere ad salutem, in omnibus acutis morbis putare conuenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicantur. Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus iudicatorijs fiunt, & febrem perfecte submouent. Boni verò sunt, qui per totum corpus fientes, hominem facilius morbum ferre faciunt. Qui verò tale quid non effecerint, incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantum circa caput & faciem fientes, & circa ceruicem. Hi enim cum acuta quidem febre, mortem præsignificant: cum mitiore verò, longitudinē morbi. Et qui per totum corpus fiunt, similiter significant his qui circa caput. At verò milioformes, & solum circa collum fientes, mali sunt. Qui verò cum guttis fiunt, & euaporant, boni sunt. Considerare porro conuenit sudores in summa. fiunt enim aliqui propter corporum exolutionem, aliqui propter inflammationis vigorem. Præcordium optimum est doloris exors, & molle, et æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. At inflammatū, aut dolorē exhibens, aut dextræ partes inæqualiter affectæ ad sinistras: hæc omnia obseruare oportet. Si verò etiam pulsus inierit in præcordio, turbationem significat aut delyrium. Verum oculos talium insuper intueri oportet. Si enim oculi frequenter moueantur, furiosos hos fore timor est. Tumor in præcordio durus existens et dolorosus, pessimus quidē est si per totum

Stridor dentium quid portendat.

Spiritus

Sudores qui salubres & contra.

A præcordijs nota.

HIPPOCRATIS LIBER

totum fuerit præcordium. Si verò fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Significat autem eiusmodi tumores, in principio quidem, mortem breui affuturâ. Si verò viginti dies transgrediatur, tum febris detinens, tum tumor non confidens ad suppurationem conuertitur: Contingit autem his in primo circuitu, etiâ sanguinis eruptio è naribus, & valde prodest. Verû interrogare conuenit, an caput doleant, aut hebetem visum habeant. Si enim horum quid fuerit, ad eum locum repit. Magis tamen in iunioribus quinque ac triginta annis, sanguinis eruptionem expectare cōuenit. At verò molles tumores, & doloris exortes, & qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si verò trāsgrediatur sexaginta dies febris detinens, & tumor non confidat, suppuratum fore significat & hunc, & eum qui in reliquo ventre est eodem modo. Quicunq; igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculū mortis breui affore significat. Qui verò molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. Cæterū tumores in ventre minus faciunt abscessus, quàm hi qui sunt in præcordijs. Minimè verò hi qui sub vmbilico consistūt, ad suppurationem conuertuntur. Sanguinis verò eruptionem, ex supernis locis maximè expectare oportet. Omnium autem tumorum diuturnorū circa hos locos, suppurationes considerare conuenit. Sunt autem suppurationes hinc fientes hoc modo considerandæ. Quæcunque extra vertuntur, optimæ sunt, quæ paruæ sunt, & quàm maximè foras emittentes, & in acutum fastigiata. Quæ verò magnæ sunt, & lata, & minimè in acutum fastigiata, pessimæ sunt. Quæcunque verò intro rumpuntur, optimæ sunt quæ nihil cum externo loco communicant, sed sunt contractæ, & doloris exortes, & totus externus locus concolor apparet. At verò pus optimū est, si est album & æquale, & leue, & quā minimè graueolēs. Quod verò huic contrarium est, pessimum est. Aquæ porro inter cutem, ex acutis morbis obortæ, omnes malæ sunt. Neque enim à febre liberāt, & valde dolorosæ sunt, ac lethales. Incipiunt autē pleræq; à laterum mollitudine, & à lumbis: aliquæ verò etiam ab hepate. Quibus igitur à laterū mollitudine & lumbis, principia fiunt, his & pedes intumescunt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quæ neque dolore

pus est bonum
ii, Hydropis
origo.

A ex laterum mollitudine ac lumbis soluant, neq; ventrē molliunt. Quibusq; verò ab hepate aquæ inter cutē oriuntur, his tussis tussindique promptitudo accedit, & nihil memorabile expuunt, & pedes tument, & venter non egerit nisi dura, & coactus, & circa aluum fiunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum cōsistentes, tum cōfidentes. Caput autem & manus, & pedes, si frigida sunt, malū est, vbi & venter, & latera calida sunt. Optimū verò est & totum corpus calidum esse, ac molle. Conuerti autem facilē conuenit ægrotum, & in attollendo se leuem esse. Si verò grauis esse appareat, & reliquo corpore, & manibus, & pedibus, magis periculosum est. Si verò supra grauitatem, vngues &

B digiti liuidi fiāt, mors euestigio expectanda est. At si digiti ac pedes penitus nigrescūt, minus perniciosi sunt quā liuidi. Verū & alia signa considerare oportet. Si enim facilē ferre videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindicer, morbum ad abscessum verti spes est, ita vt æger quidē superstes māsurus sit, corporis verò partes nigrae factæ casuræ. *Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale.* Quod verò ad somnos attinet, quemadmodum secundum naturā consuetum nobis est, interdiu vigilare oportet, noctu dormire. Si verò hoc fuerit transmutatum, pelus est. Minimè verò lædi æger poterit, si dormiat manē ad tertiam partem diei. Qui verò ab hoc tempore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum autē est nō dormire, neque noctu, neque interdiu. Aut enim præ dolore ac afflictionibus vigiliæ adsunt: aut deliriū aderit ab hoc signo.

Egestio alui optima est, mollis & cohærens, & secundum horam, in qua etiam à sano egerebatur. Iuxta copiam verò, pro ratione ciborū ingestorum. Tali enim cōringente exitu, venter infernus sanus fuerit. Si verò liquida fuerit egestio, conducit neque stridere, neque frequentem esse, & paulatim secedere. Delassatur enim homo ex frequēti desessu, & vigilias vtique cōtraxerit. Si verò sæpe aceruatim egerit, periculum est ne in animi deliquiū incidat. Quin & iuxta copiam ingestorū egerere oportet, bis aut ter in die, & noctu semel. Plura verò mane, quemadmodum in consuetudine est homini. Inspissari autem oportet egestionē, morbo ad iudiciationem tendente. Sit autem subfulua, & non valde graecolens.

Commod

*Hydropis
diuersas.*

*Testes.
Somnus.*

*Alui ex-
crementa.*

HIPPOCRATIS LIBER

idem
98. 442. Commodum est & lumbricos rotundos cum egestionem prodire, morbo ad iudicationem tendente. Oportet autem in omni morbo mollem esse ventrem, & iusta mole præditum. D

claus
At verò aquosum valde, aut album, aut pallidum, aut viride, aut vehementer rufum, aut spumofum stercus egerere: Hac omnia mala sunt. Malum insuper est & quod exiguum est, & viscosum ac album: & quod subpallidum aut subviride ac leue. His verò magis lethalia fuerint stercorea nigra, aut pinguis, aut liuida, aut æruginosa, & malè olentia. Quæ verò varia sunt, diuturniora quidē his sunt, nihilominus autem perniciofa. Sunt autē talia, ramentosa, & biliosa, & cruenta, & præsina, & nigra, aliquādo simul inter se exeuntia, aliquando particulatim. Flatum porro sine strepitu ac crepitu prodire optimum est. E

claus
Melius autem est & cum strepitu exire, quàm isti hic reuolui. & qui sic progressus est flatu, aut dolere quid hominē significat, aut delirare: nisi sua sponte homo ita flatum emittat. Cæterum præcordiorum dolores ac tumores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit, murmur in præcordio obortum, & maximè quidem si pertransierit cum stercore, & vrina, ac flatu. Sin minus, etiam ipsum per se si transierit, prodest. Prodest item si subdescenderit ad infernos locos. Optima verò est vrina, quum fuerit alba subsidencia, & leuis & æqualis, per totū tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, & morbum fore breuem. Si intermiserit, & aliquādo quidem pura mingatur, aliquando verò subfudet album ac leue, diuturnior fit morbus, & minus securus. Si verò fuerit & vrina subrubra, & subsidencia ipsius similis, & leuis, diuturniorem quidem hæc morbum quàm prior significat, sed valde salutare. At subsidentiæ in vrinis crassiores polentæ partes referentes, prauæ sunt. His autē peiores sunt, laminosæ. Albæ verò & tenues valde malæ sunt. Verū his deteriores sunt furfuraceæ. Nubeculæ quæ feruntur in vrinis, albæ quidē bonæ sunt, nigrae verò malæ. Quandiu verò fulua fuerit vrina & tenuis, morbum incōcoctum esse significat. Si verò & diuturna fuerit talis existens, periculū est ne sufficere homo possit, donec vrina fuerit concocta. Lethaliores autem sunt vrinae, & foetidæ, & aquosæ, & nigrae, & crassæ. At tum in viris, tum in mulieribus, nigrae vrinae pessimæ sunt. In pueris autem

Atem aquosa. Quicunq; urinas tenues & crudas mingūt multo tempore, si alia veluti superstitibus futuris signa fuerint, his abscessum expectare oportet ad locos infra septum trāuersum. Sed & pinguedines supernè instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sunt enim colliquationis signa. Considerare verò conuenit in urinis in quibus nubeculae sunt, an supernè aut infernè sint: & quales habeant colores. Et quæ quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis eas bonas esse putare, ac laudare. Quæ verò sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec verò decipiat te, si vesica morbum aliquem habens, eiusmodi urinas reddiderit. Non enim torius corporis signum est, sed ipsius per se vesicæ. Vomitus cōmodissimus est, ex pituita ac bile quā maximè permixtus, & non crassus valde, neq; multus. Nam meraciores, deteriores sunt. Si verò id quod vomitu reiectum est præsini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum: quicunque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. Si verò omnes colores idē homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerriam autem mortem significat liuidus vomitus, si graecolens fuerit. Omnes verò subputridi ac foetidi odores, in omnibus vomitibus mali sunt. Sputum verò in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas sūt, citò ac faciliè expui conuenit, & flatum sputo valde permixtū apparere. Si enim longè postea post principium doloris, expuerit quod flauum est, aut fuluum, aut quod multam tussim inducit, & nō valde permixtum est, deterius est. Nam & flauum meracum, periculosum est: & album ac viscosum & rotundū, inutile est. Malum est & quod viride est valde, itemq; pallidum, & quod spumofum. Si verò ita fuerit meracum, ut etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est quā illa.

C Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emittat pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonē morbis, & antecessisse, & succedere, malū est. At in alijs morbis lethalissimis sternutationes profunt. Sputum autem flauum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione, in principio morbi reijciatur, salutare est, & valde prodest. Si verò septimo die, aut posterius, minus securum est. Omnia sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Pessima verò sunt nigra, velut

*nubeculae
infernae
nere
parse: et in
liu. vide
vomitus*

Sputum.

*Pulmo qui
non purgat
malum est.*

*Sputa quæ
mala.*

descri

HIPPOCRATIS LIBER

descriptum est. Quæ verò dolorem sedant, omnium optima D
 existunt. Quicunq; dolores ex his locis non sedantur, neq;
 ad sputorum purgationes, neque ad stercoreum alui subdu-
 ctionem, neque ad venæ sectiones, & victus rationem ac me-
 dicamenta, eos ad suppurationem verti sciendum est. Ex sup-
 purationibus quæcunque dum sputum adhuc biliosum est,
 suppuratur, perniciosæ valde sunt, siue biliosum illud in par-
 te, siue simul cum purè expuatur: & hoc potissimum si mor-
 bo ad septimū diem progresso, suppuratio ab hoc sputo pro-
 cedere incipiat. Timor autem est eum qui talia expuit, mori
 rurum esse decimaquarta die, si non aliquod bonū signū ipsi
 acciderit. Sunt autem bona hæc: facile ferre morbum, bene
 spirare, à dolore liberatum esse, sputum facile tussiendo reij- E
 cere, corpus æqualiter calidum ac molle apparere, sitim non
 habere, vrinas & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut
 descriptum est: hæc singula nosse conuenit accidere ut quæ
 bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo non
 morietur. Si verò aliqua ex his accesserint, aliqua non, non
 ampliore tēpore vita producta, decimaquarta die homo pe-
 ribit. Porro mala signa his contraria sunt: ægrè ferre mor-
 bum, spiritum magnum & densum esse, dolorem nō sedari,
 sputum vix tussiendo reijcere, valde sitire, corpus inæquali-
 ter à febris teneri, ventrem quidem ac costas fortiter calidas
 esse, frōtem verò & manus ac pedes frigidos. Vrinas autem
 & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptū est:
 hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserint F
 horum aliquid ad sputum, peribit utiq; homo priusquam ad
 decimumquartū diem peruenerit, aut nono die, aut vndeci-
 mo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quòd hoc sputum
 lethale sit valde, & non perducatur ad decimumquartū diem.
 Proinde & mala & bona signa expendentem ex his prædi-
 ctiones facere oportet. Ita enim potissimum veritatē conse-
 qui quis poterit. At verò aliæ suppurationes rumpuntur
 plurimæ quidem vigesimo die, aliæ verò trigesimo, aliæ quæ
 dragesimo, aliquæ verò ad sexaginta dies perueniunt. Con-
 siderare verò futuræ suppurationis principium oportet, sup-
 puratione facta ab ea die qua primū homo febricitauit, aut
 si fortè ipsum primū rigor apprehēdit: & si pro dolore gra-
 uitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat.

Hæc

*Suppura-
tiones.*

Bona signa.

Mala signa.

*Pus quādo
rumpit.*

- A** Hæc enim in principijs suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationū fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si verò suppuratio fuerit in altero latere solum, vertere & considerare oportet in his, num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius: & reclinato ægro in latus sanū interrogare ipsum, an videatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit. Cæterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris nō dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu verò amplior: & sudores multi oboriuntur, tussesque, ac tussendi promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuūt: & oculi caui fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & vngues quidem manuum curuantur, digiti verò calescunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos nō appetūt, & pustulæ per corpus enascuntur. Quæcunque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis valde habere oportet. Quæ verò breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principijs fiunt. Simul autem & si aliquanto difficilius spirauerit homo. At verò quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet. Si quidem enim dolor in principijs fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseuerās, ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tūc expectare oportet, aut etiā prius.
- C** Si verò quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necessè verò est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante puris eruptionem. Ex his autem maximè superstites manent hi quos febris eodem post eruptionem die dimiserit: & qui cibos citò appetiuerint, & à siti liberati fuerint: & si vëter parua & compacta egefferit, & pus album & leue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Ac optimè quidē sic ac celerimè liberatur. Sin minus, hi quibus proxima his cōtigerint. At verò intereunt hi quos febris non dimiserit, aut vbi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalescens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiuerint, & si vëter liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride, & liuidum

Suppuratio
rū cognitio.

idem. 43.

HIPPOCRATIS LIBER

ex illis signis
conferre fa-
cienda est

Tubercula
purum.

et

abscessus
purum

expuerint, aut pituitosum & spumosum. Si hæc omnia conti-
gerint, pereunt. Quibus verò ex his quædā accesserint, quædā
non, non aliqui intereunt, aliqui in multo tēpore superstites
evadunt. Verū ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his, tum
in alijs omnibus coniecturā facere oportet. Quibuscunq;
ex inflammati pulmonis morbis, abscessus circa aures fiūt, &
suppurantur, aut ad infernas partes, ac fistulantur, hi supersti-
tes evadunt. Verū huiusmodi sic cōsiderare oportet. Si & fe-
bris derinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputū pro ra-
tione nō prodierit, neq; bilioſa, neq; solutu faciles, & mera-
cæ alui egestionēs fuerint, neq; vrina valde multa, & multā
subsidentiam habēs: indicatur autē superstes futurus ab om-
nibus reliquis salutaribus signis, tūc abscessus huiusmodi fo-
re sperandū est. Fiunt autē partim ad infernas partes, quibus
videlicet inflāmatio aliqua circa præcordia affuerit: partim
in supernis, quibus præcordiū molle & doloris exors perma-
nerit, & ubi spirandi difficultas, quæ per tēpus aliquod affuit,
desierit citra aliā manifestā causſam. Ceterū abscessus ad cru-
ra, in pulmonis inflāmationib⁹ fortib⁹ ac periculosis, omnes
quidē viles sunt, optimi verò sunt, qui dum sputū iam in mu-
tatione est, fiunt. Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro flauo
purulēto fiēte, & foras procedēte: ita securissimē homo su-
perstes evaserit, & abscessus absq; dolore celerrimē sedabit̃.
Si verò sputū non bene processerit, neq; vrina subsidentiam
bonā habēs apparuerit, periculū est claudum fore articulum,
aut multum molestiarū exhibiturū. At si evanescat & recur-
rant abscessus, sputo non prodeūte, febreq; permanēte hor-
rendum est. Periculū enim est ne deliret homo & moriatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflammatione, seniores magis
intereunt. Ex alijs autē suppurationibus, iuniores magis mo-
riuntur. Dolores cum febre fientes circa lumbos & infernas
partes si septū trāversum attigerit, infernas partes relinque-
tes, perniciosi valde sunt. Proinde alijs quoq; signis animum
advertere oportet. Nam si quod etiā ex alijs signis malū ap-
paruerit, desperatus est homo. Si verò assiliēte ad septū tras-
versum morbo alia signa nō mala accesserint, hunc suppura-
tum fore multa spes est. Quicunq; verò suppurativruntur,
quibus quidem purum pus fuerit, & album, & non foetidum,
hi servantur: quibus autem subcruentum, & cœnosum, hi pe-
reunt,

E

F

A reunt. Porro vesicae durae & dolentes. penitus quidē horrendae ac perniciosae sunt, perniciosissimae verò quae cū febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicis ad occidendū sufficiunt, & alui nō egerunt hoc tempore, nisi durū quiddam, & hoc coactē. Soluit autē vrina purulenta mixta, quae albā ac leuem subsidentia habet. Si verò neq; ab vrina quicquā remiserit dolor, neq; vesica molliatur, & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi aegrū moriturū esse timor est. Atque hic modus potissimū pueros corripit septēnes, donec ad quintumdecimū annum peruenerint. Febres iudicantur in eisdem numero diebus, ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimae febres, & signis securissimis nitētes, quarto die desinūt, aut prius. Malignissimae verò, & signis horredissimis fiētes, quarto die aut prius occidunt. Primus igitur ipsarū insultus sic desinit. Secundus autem, ad septimum producitur. Tertius ad vndecimum. Quartus ad decimumquartū. Quintus ad decimumseptimum. Sextus ad vigesimum. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis, per quatuor ad viginti, ex additione desinunt. Non potest autem quicquam horum integris diebus exactē numerari. Neq; enim annus, & menses, integris diebus numerari possunt. Postea verò eodem modo iuxta eandem additionem, primus circuitus quatuor & triginta dierū est, secundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in horum principijs difficillimū est cognoscere eos qui in plurimo tēpore iudicabuntur. Simillima enim sunt ipsorū principia. Verū à primo die animaduersionem facere oportet, & prout singuli quaternarij adduntur considerare, & non latebit te quo vertetur morbus. Fit autem & quartanarum febrium cōstitutio ex huiusmodi ordine. Qui porro morbi in breuissimo tēpore iudicabuntur, faciliores cognitu sunt. Maximae enim differentiae ab initio ipsis sunt. Qui enim superstites ab ipsis euasuri sunt, facile spirantes, & doloris exortes sunt, & noctu dormiunt, aliaque signa securissima habent. Qui verò morituri, aegrē spirātes fiunt, delirātes, vigilantes, aliaque signa pessima habentes. Vt igitur his ita contingentibus, cōiectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta vnamquamq; additionem, tendentibus ad iudicationem morbis. Iuxta eandem rationē mulieribus quoque iudicationes fiunt

Ex vesica
nota.

Febriu de a III
cretoria.

hac eadem
vide. 511

396.

HIPPOCRATIS LIBER

ex partu. Capitis dolores fortes & continui cum febre, si **D**
Capitis do- quidem lethaliū signorum quid accesserit, perniciosi valde
lor assiduus sunt. Si verò absq; talibus signis, dolor viginti dies trāsmise-
quando ma- rit, & febris tenuerit, sanguinis à naribus eruptionē, aut ab-
lus. scēssum quendā ad infernas partes expectare oportet. Sed &
 quā diu dolor recens fuerit, similiter sanguinis è naribus
 eruptionem, aut puris eruptionē sperare cōuenit, cum aliās,
 tum si dolor circa tempora & frontē fuerit. Verū sanguinis
 eruptio magis expectanda est iunioribus trigintaquinque
Auris do- annis, senioribus verò puris eruptio. Auris dolor acutus cū
lor. febre cōtinua ac forti, horrendus est. Periculum est enim de-
 liraturum esse hominē, ac periturū. Proinde quum hic mo-
 dus minimē tutus sit, cito mentem aduertere oportet etiam **E**
 alijs signis, à primo statim die. Pereunt autē iuniores homi-
 nes septimo die, & adhuc citiūs, ex hoc morbo. Senes verò
 longē tardiūs. Nam & febres & deliria minūs ipsis accidūt.
 & hac de causa aures antea suppurantur. Verū his quidem
 ætatibus recidiuæ morbi contingentes, plurimos occidunt.
 At verò iuniores priusquā suppuretur auris, pereunt. Nam
 si pus albū effluxerit ex aure, spes est iuuenē superstitem euā-
 surum esse, si sanē & aliud quoddam bonū signum ipsi acce-
 dat. Fauces exulceratæ cum febre, horrendæ sunt. Verū
Fauciū ex- si quod aliud item signum accedat, ex his quæ antea mala es-
ulceratio. se iudicata sunt, in periculo hominem versari prædicendum
 est. Anginæ horrendissimæ sunt, & citissimē accidunt, quæ
Angina neque in faucibus quicquam conspicuum faciunt, neque in **F**
uarietas. ceruice: verū plurimum dolorem exhibent, & erecta cer-
 uice spirationem inducunt. Hæ enim eodem die suffocant,
 secundo item ac tertio & quarto. Quæ verò alioqui similiter
 dolorem exhibent, attolluntur autem, & in faucibus rubores
 faciunt, perniciosæ quidem valde sunt, verū prioribus ma-
 gis diuturnæ, si rubor fuerit magnus. Quibuscunq; verò fau-
 ces & ceruix simul rubuerint, hæ anginæ diuturniores sunt,
 & ex ipsis maximē euadunt, si & ceruix, & pectus ruborem
 habuerit, & erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. Si ve-
 rò neque in diebus iudicatorijs dissipetur erysipelas, neque
 tuberculum ad externam partem conuertatur, neq; pus tuf-
 fiendo reijciat, facileq; ac sine dolore degere videatur, mor-
 tem significat, aut ruboris recidiuam. Securius est autem tu-
 morem

A morē & ruborē quā maximē foras verti. Si verò ad pulmonē vertatur, & delirium inducit, & quidā ex ipsis suppurati plerumque fiunt. Gurguliones periculosi sunt ut & rescentur, & scarificentur, quā diu rubicundi fuerint & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales alijs machinamentis attenuare conari oportet hoc tēpore. Quum verò totum iam fuerit secretum, quod sanē vuam appellant, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac uti, si & tempus permittat, & homo non stranguletur. Quibus febres cessant, neque signis solutorijs apparentibus, neque in diebus iudicatorijs, his reuersuras esse expectandum est. Quæcunque febris longiorem moram traxerit homine alioqui ad salutem disposito, ita ut neque dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquā aliam manifestā causam: huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulum. vel maximē infernum. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tēpore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare verò statim oportet abscessum si febris detinens viginti dies transmiserit. Senioribus autē minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At verò huiusmodi abscessum expectare oportet febre continua existente. Verum ad quartanam deducetur, si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad autumnum appropinquaret. Quemadmodum autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt: Ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, & senioribus. Cæterum hæc nosse expedit abscessus magis hyeme fieri, tardiùsque cessare, & minus recurrere. Quicumque verò in febre non lēthali, dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis obscurum quiddam apparere, si & osculi vētris morsus huc accefferit, ei biliosus vomitus aderit. Si verò etiam rigor accefferit, & partes infra præcordium frigidas habuerit, citius adhuc vomitus aderit. At si quid biberit aut ediderit sub hoc tempus valde cito vomet.

Porro quibus horum dolor fieri inceperit primo die, hi quarto magis quā quinto premuntur: septimo verò liberantur. Plerique tamen ipso tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maximē quinto, liberantur nono, aut vndeci-

HIPPOCRATIS LIBER

mo. Qui verò incoeperint quinto die dolere, aliaque iuxta D
 rationem priorū iplis fiant, his ad decimumquartū morbus
 iudicatur. Fiunt autē hęc & viris, & mulieribus, maximē in
 tertianis. Iunioribus verò fiunt quidem & in his, verū ma-
 gis in continuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus-
 cunque verò in huiusmodi febre caput dolentibus, pro eo
 quod obscurum quiddam præ oculis appareat, visus hebetu-
 do contingit, aut splendores ob oculos obuersantur: & pro-
 osculi ventris morfu, in præcordiorū dextra aut sinistra par-
 te aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflamma-
 tione: sanguinem de naribus his, pro vomitu fluxurum esse
 expectandum est. Magis tamē & hic in iuuenibus sanguinis
 eruptionem expectare oportet, his autem qui triginta sunt E
 annorum, & seniores adhuc, minus verū vomitus in his ex-
 pectari debent. At verò pueris conuulsiones fiunt, si febris
 furit acuta, & venter non egresserit, & vigilarint, & terrean-
 tur, & eiularint, & colorem mutarint, & viridē siue pallidum
 aut liuidū, aut rubrū cōtraxerint. Fiunt autē hęc promptis-
 simē quidem pueris nuperrimē editis, vsq; ad septimum an-
 num. Seniores autem pueri, & viri, non amplius in febribus
 corripiuntur cōuulsionibus, si non quid ex signis fortissimis
 ac pessimis accesserit, qualia sanē in phrenitide fieri solent.
 Perituros porrò & superstites futuros, tum pueros, tum alios,
 ex omnibus signis cōiectare oportet, prout singula de singu-
 lis perscripta sunt. Atque hęc & de acutis morbis, & de his
 qui ex ipsis fiunt, dico. Qui verò rectē prænoscere volet, & E
superstites futuros, & morituros: & quibus per plures dies,
& quibus ad pauciores morbus duraturus est: eum signa om-
 nia ediscere, & iudicare posse conuenit, ita vt vires ipsorum
 inter se conferendo expendat, quemadmodum perscriptum
 est, & de alijs, & de vrinis, & de sputis, vbi simul & pus & bilē
 ægrotus tussiendo reiecerit. Quin & impetus morborū sen-
 per populariter grassantium cito animaduertere oportet, &
 tēporis constitutionem non ignorare. Probē tamen id nosse
 expedit de cōiecturis certis, & alijs signis, & nō ignorare q
 in omni anno, & omni tempore, mala malum, bona bonum
 significant. Nam & in Libya, & Delo, ac Scythia, præscripta
 signa vera comperiuntur. Proinde sciendum est, minimē dif-
 ficile esse, in iisdē regionibus posse aliquem pleraq; ex ipsis
 assequi

*sanguinis r
 in febribus
 signa*

*Conuulsiones
 noli*

*Libya, De
 los, Scythia
 pro omni-
 bus ponun-
 tur.*

A assequi, si memoria tenens ipsa, iudicare ac rectè expendere sciat. Cæterum nullius morbi nomen desiderare oportet, quod hic non est adscriptum. Omnes enim qui in prædictis temporibus iudicantur, ex iisdem signis cognosces.

HIPPOCRATIS

COI PRAEDICTIO-

NVM, LIBER I. IANO COR-

NARIO MEDICO PHI-

SICO INTER-

PRETE.

B



Oporosi in principijs fientes, cum capitis, lumborum, præcordij, colli dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum aliàs, tum quarto ab initio die. Alui proluuium valde rubicundum, malum quidem est in omnibus morbis, non minimè verò in prædictis.

Alui proluuium.

Linguae asperæ & resiccatæ, phreniticæ. In turbatis vigilantibus, urinae decolores, nigrae, innatantes, in sudoribus, phreniticæ. Insomnia etiam in phreniticis manifesta sunt. Sreatio frequens, si sanè & aliud quoddam signum affuerit, phrenitica sunt. Qui relinquuntur in præcordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum aliàs, tum in sudoribus. Prædebilitatorum desipientiæ pessimæ, velut etiam Thrasynonti. Phreniticæ vehementer affectiones, tremulæ desinunt. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate & vigilijs, cito insaniam affore denuncient.

*Lingua.
Urina.
Insomnia.
Sreatio.*

Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parui, suffocatorii, quando hiarit æger ut os claudere & aperire non facile possit, mentis emotionem portedunt. Ex talibus phrenitici fiunt, & perniciosè affecti. In phreniticis in principio mansuetudo. Verum frequenter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alui egestio, malum: quemadmodum & Archecrati. Num & in his torpor fit? Rigor in his pessimus. Quibus melancholico modo mente

*Thrasynō.
Phrenesis.
Vomitus.
Fauciū dolor.*

*Archecrates.
Melancholicum eacoethes.*

HIPPOCRATIS LIBER I.

motis, tremores accedunt, malignum hoc est. **Mente moti** D
acutè, vbi insuper febrierint, cum sudore phrenitici fiunt.
Phrenitici paucibili, strepitum valde percipientes, tremuli.

Furiale signum. Ex vomitu nauseabundo oborta, clangorosa vox, oculi pul-
Hermozygæ uillum incumbentem habètes, insaniam portendunt: quem-
admodum etiam Hermozygæ vxor, insania acutè correpta,
gas. voce destituta mortua est. In febre ardenti sonitibus auriû

Tinnitus accedentibus, cum visus hebetudine, & grauitate in naribus
aurium qua accedente, melancholico modo mente mouentur. Mentis
lis. percussiones cum voce clangorosa, linguæ conuulsiones tre-
mulæ: & voces tremulæ fientes, mortem alienât. duricies in

Linguæ his perniciofa est. Linguæ tremulæ signum sunt mētis non
spasmi. firmæ. In biliosis meracis alui egestionibus, spumosa floru E
Linguæ lentia mala, tum alias, tum si cui lumbi antea doluerint, &
tremor. mente motus fuerit. Rari circa latus in his dolores, desipien-
tiam significât. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ.

Olecula spu Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In vocis
mosa. interceptione, spiritus veluti his qui stragulantur præ ma-
nibus expositus, malus est. Num & talis mentem emouet?

Singultus Modicè feroces mentis emotiones, ferinæ sunt. Molestè
quando mu ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre exsu-
lus. dent partes supernæ, phrenitim portendit: quemadmodum

Vocis inter ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre exsu-
ceptiones. dent partes supernæ, phrenitim portendit: quemadmodum
etiam Aristagoræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes

Aristago in phreniticis permutationes, conuulsoriæ. Vrinæ quæ min-
ras. guntur à non recordantibus, nec commonefactis, pernicio-
sæ. Num his minguntur velut si subsidentiâ conturbassent?

Vrinæ clan Palpitantes per totum, num voce destituti moriuntur? Spu-
destinæ. tationes in phreniticis cum perfrigeratione, nigræ reuo-
muntur. Surditas, & urina non confidentes, valde rubicun-
dæ, innatantes, mentis emotionem portendunt. His mor-
bo regio corripì malum est. Mala est & ex morbo regio fa-
tuitas. Hos voce quidè destitui, verum sentientes esse contin-

git. Arbitror autem & aluos his perûpere, velut cõtigit Her-
mippo, & mortuus est. Surditas in morbis acutis & turbu-

Hermippo lentis consequens, mala. Mentis emotiones tremulæ, obscu-
Surditas ræ, palpatoriæ, valde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho
malû in his. in Co. Torpores ex rigore, non valde apud seipsos sunt. Do-

Didymar- lores circum vmbilicum palpitantes, habent quidem aliquid
ebus. quod mentem emouet. Verum circa iudicationem his spiri-

A tus acervatus cum prompta tensione penetrat. Et dolores circa suram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatarit quid in vrina, dolore circa femur dissipato, mentis emotionem portendit. & qualia circa aurium sonitus contingunt, talia existunt. In aluo liquida, lassato, caput dolenti, siticulosi, vigilant, obscure loquenti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est vt mente moueantur. Exudantes & maxime circa caput, in morbis acutis submolestè ferètes, malum, tum alias, tum in vrinis nigris. & turbidus spiritus in his malus.

Impotentia præter vacuatorum vasorum rationem contingentes, non existente vasorum vacuatione, malum. Alui interceptæ, sed parua, nigra, velut caprarum stercora ad necessitatem coactè emittentes, nasus in his erumpens, malum.

B Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore fastidioso ac nauseabundo, hi si exudent, malum est. Num his tremores fiunt? Sed & vox velut in rigore conspicua? Extremitates si in vtranque partem cito transmutentur, malum est. Et sitis huiusmodi, mala est. Ex moderato ferox responsio, malum.

Vox acuta, his præcordia intro trahuntur. Oculus hebes, malus: & fixus ac caliginosus, malus. Vox acuta clangorosa, mala. Dentium stridor perniciosus est, quibus non & sanis familiaris est, Suffocatio in his valde mala. Faciei bonus color, & vehemens toruitas, malum. Egestionès alui desinentes in spumosas meracas, exacerbatoriæ sunt. Vrinarum in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones,

C pessimæ. Perniciosa si citra signa, leuia facta fuerint, mortem significant. In morbis acutis biliosis valde albæ, spumosæ, circumbiliosæ egestionès, malæ. Malæ item & vrinæ eiusmodi. Num his hepar dolorosum est? Vocis interceptiones in febribus conuulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio deueniunt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortem inducunt. Febres ex præcordiorum doloribus malignæ. Sitis præter rationem soluta in acutis morbis, mala est. Sudor multus cum febribus acutis fiens, malus est. Et vrinæ dolorosæ, malæ sunt.

Et rubicundæ ex his florulentia detentæ, itemque æruginosæ, malæ sunt: & paruas apparere veluti stillas. Et vomitus cum varietate, mali sunt, tum aliàs, tum si propius inter se prodeant. Quæcunq; in diebus iudicatorijs, cum an-

impotentia

*extremis
perniciosus
idem 424*

*Vox acuta.
Dentium stridor.*

Lotij interceptiones.

Mortis signum.

Silentium in febribus perniciosum.

Sitis.

Sudor.

Vrinæ malæ.

Vomitus malus.

HIPPOCRATIS LIBER I.

xietudine, absque sudore perfrigerantur, malum est: Et quæ D
ex his insuper riguerint, mala sunt. Vomitus meraci, an-
xiosi, mali. Sopor num ubique malus est. Ignorantia cum
rigore, malum. Malum item obliuio. Perfrigerationes ex
rigore non recalescentes, malæ sunt. Sudantes ex perfrige-
ratione recalescentes, malum. In his ardor dolorosus in late-
ribus, & insuper rigere, malum est. Aestuarii rigores aliqua-
tenus perniciosi: & flammea facies cum sudore in his mala
est: In his posteriorum partium frigiditas, conuulsionem ac-
cerfit. Exudantes vigiles recalescentes, malum. Ex lum-
borum recursu, oculi distortio malum. Dolor in pectus fir-
matus cum torpore, malus. Hi si insuper febriant, acutè ardē-
tes, moriuntur. Qui nigra reuomunt, cibos auersantur, de- E
hiri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut
clausum habent, eos medicamentis purgare nō oportet. Per-
niciosum enim est: Neque intumescētes, vertiginosos, in le-
uiter vagando deficientes, cibos auersantes, decolores. Ne-
que in febre fractos, si soporosi fuerint. Perniciosum enim
est. Oris ventriculi dolor, cum præcordio distento, & ea-
pititis dolor, malignum; & quidpiam anhelosum. Num hi re-
pente moriuntur. velut in Dysode. Huic etiam vrinæ vehe-
menter fermentatæ, erant valde rubicundæ. Colli dolor
malum quidem in omni febre, pessimum autem his quib⁹ ti-
mor est vt insaniant. Febres soporosæ, lassatorias, caligino-
sæ, vigilias inducentes, exudantes, malignæ. Horrores frequē-
tes ex dorso, celeriter translabentes, molesti, vrinæ interce- P
ptionem dolorosam significant. Qui anxie se instantes, ei-
tra vomitum exacerbantur, male habent. Perfrigeratio cum
duricia signum malum. A ventre tenuia non sentienti pro-
dire, ei qui est apud seipsum, perniciosum: velut Hepatico.
Vomitiones exiguæ biliosæ malæ, tum aliàs, tum si insu-
per vigilauerint ægri. Nasus in his destillans, perniciosum
est. Quibus ex partu alba detinentur cum febre, surditasque
adeſt, & in latere dolor acutus, hæ pernicioſe mente mouen-
tur. In febribus ardentibus subperfrigerantibus, egestio-
nibusque alui biliosis aquosis frequentibus, oculorum distor-
tio signum malum est, tum aliàs, tum si stupore prehensi de-
tineantur. Siderationes repentinæ ei qui exolutè ac diu-
tinè insuper febriit, perniciosæ sunt: quale quiddā passus est.
Numenij

Sopor.
Ignorantia
Obliuio.

Oculi dis-
tortio.

qui purgandi
non sunt

Qui cito mo-
riuntur.
Colli dolor
pessimus.

Perfrigera-
tio.

Egestio clau-
destina
Pernicies
feminarū.

Siderationes

A Numenij filius. Ex lumborum dolore ad os ventriculi re-
 cursiones, febriculosa, horrida, reuoluentes aquosa tenuia
 multa, mente mota, voce destituta, nigrorum vomitu facto
 moriuntur. Oculi contracti in morbo acuto mala. Num
 anxia se iactantibus citra vomitum, lumbos dolentibus, si fe-
 rociter mente moti fuerint, spes est vt nigra per aluum pro-
 deant? Fauces dolorosa, graciles, cum aegre tolerabili mo-
 lestia, strangulatoria, perniciofa acutè. Quibus spiritus re-
 trahitur, vox autem strangulatoria est, & vertebra intro con-
 fidet, his in fine velut contrahente quodam spiritus fit. Ca-
 put dolentes, & stupore detenti delirantes, aluo intercepta,
 oculum ferocem præ se ferentes, florescentes, opisthotono
 posteriorum partium conuulsoria distentione corripuntur.

*Numenius**Oculi con-
tractio.**Dolor fua-
cium.**Capitis do-
lor.*

B In oculorum distorsione, febriculoso, lassato, rigor perni-
 ciosus Et soporosi in his, malum. In febribus ad præcordiū
 dolores, sine voce, si sudore non soluantur, maligni sunt. His
 dolores ad coxas, vna cum febre ardente, & si aluus acerua-
 rim eruperit, perniciosum. Quibus voces cum febribus de-
 ficientes post iudicationem, hi tremantes ac soporosi mo-
 riuntur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducen-
 tes, stuporis detentionem inferentes, præcordia variantia,
 & ventris tumor, cibis interceptis, in sudoribus: Num his
 turbidus spiritus, & genitura simile quid superueniens, sin-
 gultum indicat? Sed & aluus spumosa, biliosa, insuper ege-
 rit? Splendidum in his mictum prodest. Venter autem his

*Oculorum
distortio.**Præcordio-
rum dolor.*

C insuper turbatur. Quibus sopor fit spumosis prodeunti-
 bus, his febris exacerbatur acuta. Ex capitis dolore vocis
 interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in
 seipos, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes, His
 insuper rigere, non malum est. Manus tremula, caput do-
 lentes, collum dolentes, subsurdi, mingentes nigra den-
 sata: quibus hæc sunt, his nigra ventura esse expectare o-
 portet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutio-
 ne, stupore detinente, perniciofa. Lateris dolor, ex spu-
 tis biliosis, citra rationem si euauerit, mente mouentur.

*Manus tre-
mula.**osoris in fer-
re Johi**Lateris do-
lor.**Cervicis do-
lorum sue
dore*

Ex colli dolore, soporoso, sudanti, aluus inflata, si sa-
 nè ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sub-
 luta: ex his ea quæ biliosa non sunt supprimuntur. Talia
 verò si seruentur retenta, longius ægrotat. Num ita-
 que pro

HIPPOCRATIS LIBER I.

Aspasius

*Lumborum
mala.*

*Capitis do-
lor graui-
dis pernici-
sus.*

que proluuia quæ biliosa non sunt, meliora sunt? & flatuo- **D**
so tumori profuerint? Alui circumtensio, ad necessita-
tem liquida demittens, cito intumescens, habet quid con-
uulsorium, velut etiam Aspasij filio. Superrigere his perni-
ciosum. Ex his conuulsus factus ac inflatus, vbi diutius ægro-
tasset, ori putrefactio viridis superuenit. Quibus circa lum-
bos tenues diuturni dolores, ad præcordium se reuoluentes,
& ciborum fastidium inducētes vnā cum febre: his ad caput
dolor intentus progressus, repente conuulsorio modo occi-
dit. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem ali-
quanto magis exacerbantur, cum vigilijs, & delirio in som-
nis, aliquando urinas inuoluntariē emittentes, in conuulsio-
nes soporosas desinunt. A principio exudantes urinis con- **E**
coctis, ardentes qui citra iudicationem perfrigerantur, bre-
ui circum circa ardentes: Torpidi item, soporosi, conuulsi,
perniciose affecti sunt. Vterum gerentibus capitis dolores,
soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt. Fortassis autē his
etiam conuulsorium quid pati contingit. In faucibus gra-
cilibus dolores strangulatorij, habent quid conuulsorium,
tum aliās, tū à capite oborti, Velut etiam Thrasynontis con-
sobrinæ. Tremores cōuulsorij fientes in sudoribus, reuer-
ti solent. Iudicatio his fit vbi superriguerint. Superrigent hi
ardore circa ventrem prouocati. Lumborum dolor, & ca-
pitis dolor, & oris ventriculi dolor, cum excreatione violen-
ta, conuulsorium quid habet. A ventre subliuida, turbulen-
ta: & loria tenuia ac aquosa, suspecta. Fauces exasperatæ **F**
parum, & venter murmurans inanibus ad egerendum surre-
ctionibus, & frontis dolores, & palpantes, delassati, in stragu-
lis ac vestimentis dolorosi. Quæ ex his augentur, difficilia
sunt. Somnus multus in his cōuulsorius, & dolores in fron-
tem graues, & mictio difficilis. Urinæ suppressio quibus
rigores, & in conuulsorijs affectionibus: velut & ipsa vbi in-
horruit, sudauit. Meracæ desinentes purgationes, omni-
bus quidem exacerbatoriæ sunt, His verò etiā valde. Ex ta-
libus etiam circa aurem abscessus exurgunt. Turbulentæ
ferocissimæ è somno excitationes, cōuulsoriæ sunt tum aliās
tum cum sudore. Et colli, & dorsi perfrigerationes appa-
rentes, sed & per totū corpus: In his etiam spumosa mictio-
nes, vnā cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, cōuul-
sionem

A sionem propè adesse significant. Cubiti ac colli dolores conuulsorij. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cū saluē sputatione. In his in somnis sudores, boni. Num & sudore leuari, plurimis non malum est? Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exudantes caput dolentes, aluo intercepta, conuulsi fiunt. Subfriabiles liquidæ alui egestionēs, perfrigerantes nō sine febre, malæ sunt. Rigores ex his vesicam & ventrem occupantes, dolorosi. Proinde soporem his habere aliquid conuulsorij, non sanè mirum apud me fuerit. Quæ in acutis vomitorio modo trahuntur, mala sunt. Et albæ alui egestionēs, difficiles. Non viscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perueniunt. Num ex his soporosi torpidi fiunt? Morbi ex talibus diutius durant. Num circa iudicationem hi arescentes difficulter spirantes? Quæ ex lumbis ad collum ac caput progressa sunt, & leuis syderationis modo resoluerunt, conuulsoria fiunt & mentem emouentia. Num & soluuntur talia cōuulsione? Ex talibus variè ægrotant, & per eadem progressi. Conuulsiones in his quæ ab vtero strangulantur sine febre, faciles sunt, velut etiam Dorcadi. Vesica intercepta tum aliàs, tum cū capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quæ in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num id quod tale est, etiam mentem emouet? Num & ossium circa tempora dissectiones, conuulsionem accersunt? aut si quis ebrius verberetur, aut sanguis multus effluat in principijs, num hoc facit conuulsionem? In sudore sputa defluentia febricitanti, leuia sunt. Num ad dies aliquot alui humectantur? arbitror. Num his ad articulos abscessus fiet? Quæ modicè ferociter mentem emouent, atrabiliaria sunt. Si verò à muliebrum purgationum retentione fuerint, ferina. Hæc verò sæpius accidunt. Num & cōuulsæ fiunt hæ? Num & vocis interceptiones cum sopore, conuulsoriæ sunt? velut coriarij filia, quæ muliebribus purgationibus præsentibus affici cœpit. Quibus conuulsis oculi intentè relucet, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario, malæ sunt: velut in splene magno si ex dextra nare fluat. Et circa præcordia eodem modo res se habet. Verùm cum sudore hoc peius est. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus,

*Sanguinis
fluxus ex nare
rio*

HIPPOCRATIS LIBER I.

doribus, perfrigescentia maligna ac praua. Post sanguinis eruptionē, nigrorum per aluū transitus, malus. Præua sunt etiam valde rubra. Num verò quarto die hæc sanguinis eruptio contingit? Soporosi ex his conuulsione moriuntur. Num nigris prægressis, & ventre tumefacto? Vulnere sanguinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti loquentes lateenter moriuntur. Post modicam sanguinis eruptionem, & nigrorum egestionem, in acutis surditas malum.

Sanguinis egestio in his perniciofa. Verum surditatem soluit. Lumbis dolentibus oris ventriculi dolores accedentes, signa hæmorrhoidum fluxionis futuræ sunt. Arbitror autem & hos prægressæ hæmorrhoidum eruptionis signū esse. Sanguinis eruptiones statis temporibus fientes, siticulosæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint, in comitalem morbum finiunt. Morbi qui statim turbulentisunt, insomnes, sanguinem de naribus stillantes, sexta die alleuati, noctu afflixaerunt, postridie exudarunt, in somnumque delati mentem emouerunt, hi largè sanguinē fundent. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui malè afficiuntur, si non vrinæ concoctæ fuerint. In iudicatorijs perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessimæ sunt. Capite grauati, iuxta sinciput dolentes, insomnes, sanguinē profundunt, tum aliàs, tum si quid ad collum contendat. Vigilijs infestati, derepente cum inquieta iactatione, sanguinem fundunt, tum aliàs, tum si quid antea perfluxerit. Num vbi inhorruerunt? Colli dolores, oculi valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant. Quibus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent, Num aluus intestinorum leuitate corripitur, & obdura fit, aut ascarides insunt, aut vtrunque? Quibus ex lumbis recursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os ventriculi dolentes, saniosis ac serosis humoribus pleni, largè sanguinē profundunt. Sed & aluus his turbulentis erumpit. Quibus ex sanguinis eruptione larga ac frequēti, nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa aluo dolorosi sanguinē profundunt. Cum quadā verò fluxione, facile ferunt. Num hi multos frigidos sudores excludunt? Conturbata in his vrina non mala, neque id quod genituræ simile in ipsa residet. Verum frequenter

- A** quenter hi aquosa mingunt. Quibus in surditate & torpore parua est à naribus destillatio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his confert, & alui perturbatio. Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his mentes muliebres decurrunt. At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis è naribus signum est. Et per nares sanguinè effundere spes est, ea quæ caput concutiunt: Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinè profundunt, aut mentes deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Et circa ventrem palpitationes cum præcordij intensiōe sublonga ac tumente, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi. Quæ larga, violenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducit. Venæ sectio soluit. Frequentes & paulatim fientes ad egerendum surrectiones, subflauæ, viscosæ, modica stercoracea habentes, cum præcordijs ac lateris dolore, morbo regio participant. Num autem his suppressis hi exoluuntur? arbitror sanè, & sanguinem profundunt? His tēsiō lumborū, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant. Præcordij tēsiō, cum capitis grauitate ac surditate, & quæ ad hæc consequenter diuexant, sanguinis eruptionem indicant. Vn- *Sanguinis*
signa
decimo die sanguinis stillicidia difficilia, tum aliàs, tum si
superstillaerint. Qui in horroribus simul iudicatorie exudarunt, postridie verò postquam inhorruerunt præter rationem vigilant, eos sanguinem effusuros esse arbitror. Quibus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionem sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac capitis dolores, & totius corporis impotētia quædam, sanguinis eruptiones soluunt. Sed è tempore sic soluuntur. Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, citò & modicè concoquuntur, malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. Subsoporati, morbo regio affecti, nonvalde sentientes, quibus singultus, his aluus erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exoluuntur. Num his etiam abscessus iuxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinx malæ, tum aliàs, tum si antea sopor apprehenderit. Num iuxta aures abscessus parotides dictos, in his fore spes est? Ex torminoso subsidētia limosa subliuida, mala est. Num ex præcordijs dolet puto dexterum? & exoluitur? Num abscessus
- parotidis signa*
- iuxta

HIPPOCRATIS LIBER I.

iuxta aures talibus parum dolorosi? Alius erumpens his in D
omnibus pernicioſa eſt. In anxioſis quibuſdam vigilijs ab-
ſceſſus circa aures maximè. Ex voluulis graueolentibus, in
febre acuta, præcordijs ſublimibus diutius permanentibus,
abſceſſus circa aures oborti occidunt. Ex ſurditate leniter
abſceſſus circa aures fiunt, tum aliàs, tum ſi anxioſum quippiã
ſuccedat, & ſoporofi: inter hos adhuc magis. Abſceſſus iux-
ta aures leuiter ſyderatis mali ſunt. Quæ cõuulſorio mo-
do exacerbantur, cum ſtuporis detentione, abſceſſus iuxta
aures producant. Conuulſio, tremor, anxietas, cum ſtuporis
detentione, paruos circa aures abſceſſus exacerbant. Num
quibus abſceſſus ſunt iuxta aures, capitis dolore affecti ſunt?
Num & ſupernis partibus exudant, num inſuper rigēt quoq; E
aliquo modo? Deinde & alius erumpit, & ſoporofum quip-
piam habent? Num & aquoſæ vrinæ alba innatantia habentes,
& quæ variè exalbidæ ſunt, ac foetidæ, abſceſſus iuxta au-
res faciunt? Num quibus tales vrinæ, frequentes ſanguinis è
naribus ſtillæ profluunt? num & lingua his leuis eſt? Qui-
bus magnum & frequentem ſpiritum habentibus, morbus
regius, & febres acutæ cum præcordijs duris perfrigeratæ
ſunt, num his abſceſſus magni ad aures conſiſtunt? So-
poroſa, anxioſa, præcordia dolentia, vomitoria parua ſym-
ptota. In his abſceſſus iuxta aures oboriuntur. Antea verò &
ea quæ circa faciem fiunt. Aluo nigra ſtercorea egerente,
ſopor inſuper apparēs, abſceſſum iuxta aures producit. Tuſ-
ſiculæ quæ ſunt cum ſputatione abſceſſum circa aurē ſubmo F
uent. In capitis dolore ſopor & ſurditas, circa aurem abſceſ-
ſum aliquem eructat. Præcordij diſtentio cum ſopore an-
xioſo, ac capitis dolore, abſceſſus circa aurem attollit. Dolo-
roſi aurium abſceſſus, citra iudicationē diſſipati, mali ſunt.

*Tuſſicula
aurium ab-
ſceſſus mol-
lis.*

HIPPOCRATIS COI PRAEDITIONVM LIBER

II. IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

P. M. D. C. C. C. C. C.

Medicor



Edicorum prædictiones narrantur *Prædictio*
multæ, & variæ, & admirandæ, qua- *nes has deo*
les ego quidem neque ipse prædi- *dit.*
xi, neque alium aliquem prædica-
re audiui. Sunt autem aliquæ ex ipsis
huiusmodi. Hominem pernicio-
se affectum esse, & medico ipsum
curanti, & alijs videri. Verum medi-
cum alterum superuenisse ac dixisse,

se, Non peribit hic homo, verum cæcus euadet. Item ad

alium qui omnino malè habere videbatur, ingressum præ-

dictisse, hominem quidem euasurum esse, verum manum clau-

vit p. l. m.
h. m. b. c. b.
266.
dam habiturum, & ad alium quendam qui similiter super-

stes fore non putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore,

verum pedum digitos nigrefactos putrefactione corrupē-

dos esse. Et aliæ huiusmodi prædictiones in tali prædictio-

nis specie dicuntur. Alius autem prædictionis modus est,

ementibus ac negotiationes tractantibus prædicere, alijs

mortem, alijs insaniam, alijs alios morbos: & ad hæc omnia,

etiam ea quæ prioribus temporibus facta sunt, prædicere, ac

omnia vera narrare. Alia porro adhuc forma prædictionum

est, athletas & eos qui morborum causa exercentur ac se fa-

tigant cognoscere, si quid aut circa cibum deliquerint, aut

alteratum quippiã ederint, aut potu vberiore vsi fuerint, aut

deambulationem intermiserint, aut res venereas quasdam

C exercuerint. Horum omnium nihil illos latet, adeo vt etiam

minima quæque, in quibus non paruerit homo, exactè co-

gnoscant. Hi omnes prædictionum modi esse feruntur.

Ego verò talia quidem non varicinabor, Verum signa scri-

bam, ex quibus & sanos futuros homines, & morituros con-

iectare oportet: & tum breui tempore, tum longiore, sanos

futuros, aut perituros. Scriptum est autem à me & de absces-

sibus, quomodo singulos considerare conueniat. Arbitror au-

tem & eos qui de claudicationibus prædixerunt, alijsque e-

iusmodi, confirmato iam morbo prædixisse, & quum iam

manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si mo-

do intelligentiam habuerunt: multò sanè magis quàm pri-

usquam abscessus fieri inciperet. Spero item & alia præ-

dictisse, magis humano more quàm refertur, quæ videlicet

HIPPOCRATIS LIBER II.

ementibus & negotiationes tractantibus prædixisse dicuntur mortēs, & morbos, & insanias. Atque hæc mihi videntur talia facta esse, & nulla mihi videtur esse difficultas prædicendi, si quis circa talia studium ac curam adhibere velit. Primum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos, quis non cognouerit? Deinde deliraturi non diu latere possunt, si quis nouerit quibus his morbus cognatus est, aut prius aliquando insaniuerunt. Si enim hi homines ebrioli fuerint, aut carnes vorauerint, aut vigilauerint, aut in frigore aut calore inconsideratè versati fuerint, multus timor est ex tali victus ratione, ipsos deliraturos esse. Et eos qui hæmorrhoidas habent, si quis hyeme multo potu uti viderit, & bono colore præditos, de his prædicere licet, quòd ad ver multa spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores & aquatici sub æstatem fiant. Verùm omnia hæc addiscere, ac prædicere oportet, si quis in talibus studijs palmam ferre expetat. Licet enim ex scriptis prædicere, & mortem, & insaniam, & bonam habitudinem. Possem autem referre & alia multa huiusmodi, sed quæ facilima cognitu sunt, visum est mihi scribere. Consulo autem ut quàm prudentissimè agant, tum in reliqua arte, tum in huiusmodi prædictionibus, illius probè memores, quòd si cui successerit prædictio, is apud ægrotum intelligentia præditum in admiratione fuerit. Si verò quis aberrarit, supra hoc quod odio habetur, fortasse etiam insanire videbitur. Quapropter iubeo ut tum alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quamquam sanè & audiam, & videam, neque iudicare rectè homines ea quæ dicuntur, ac fiunt in arte, neque narrare.

Caterùm de his quæ exercentur ac laboribus se fatigant, eas asseuerationes quas afferunt hi qui ipsas asseunt, neque esse puto, neque si quis putat, prohibeo. A nullo enim signo, neque bono, neque malo, læduntur suspensiones, cui signo fide habita quis sciat, an rectè pronunciatum sit, aut secus: alioqui per me licet ut si quis velit credat. Non enim ego impedimento sum. Arbitror autem si quid veri ab ipsis dicitur, aut his qui de his qui exercentur, asseuerant, aut illis cui prius scripti sunt: primum quidem hunc qui cognouit, ex signis coniectasse. Deinde verò ambigüe & humano more prædixisse: & simul eos qui id narrant, monstrosius quàm

Per hæc exempla hæc confirmat.

Prædictio de morbis

Parcius prædictio.

A quàm factum fuit recensere. Nam neque in morbis facile est peccata cognoscere, etiam si decumbat homines, & victu pa-
rum nutriente utantur, ut non adeò multa intueri opus sit
cum qui hæc considerandi curam suscepit. Alij enim bibunt
solum. Alij ad hoc quòd bibunt, aut sorbitionem, aut cibum
paucissimum assumunt. Necessè igitur est eos qui vberiore
potu vsi sunt, magis difficulter spirare, & plus vrina: eijcere,
Eos verò qui sorbitionem aut cibum auxerunt, magis & siti-
re, & febrere. Si verò quis utrisque, & potu & cibo, immodi-
cè vsus fuerit, ad hoc quòd febrit, & difficulter spirat, etiam
ventrem circumtentum & maiorem habebit. Licet porrò &
hæc, & alia omnia experimentis optimè explorare, quæ &
habemus, & omnibus rectè utimur. Primum equidem & in-
telligentia, & oculis cognoscere facile est, hominem in eo-
dem loco decumbentem, & exacta victus ratione utentem,
si non paruerit, aut obambulando, aut multa edendo. Dein-
de qui manibus contrectauit ventrem ac venas, minùs falli
potest, quàm qui non contrectauit. Et nares in febrienti-
bus quidem, & multa & bene significant. Odores enim mul-
tum inter se differunt. At verò in sanis & recto victu uten-
tibus, haud scio quare vel in hoc experimento faciendo uti
possim. Postea audiendo, vocem & spiritum auribus co-
gnoscere datur, quæ in sanis non similiter sunt manifesta,
sed qualiter etiam antea. Quòd si etiam mores morbo-
rum ac ægrotorum didicerit medicus, non tamen quicquàm
C prædicere oportet. Non enim difficilius spirabit homo,
morbo adhuc errante, & febriet acutius febre, & venter
intentus fuerit. Quare propter hæc non tutum est prædica-
re priusquàm statum accipiat morbus. Verùm post hoc tem-
pus, quicquid præter rationem acciderit, dicere oportet.
Manifesta verò sunt mala, quæ propter ægri inobedientiam
fiunt. Nam & spirandi difficultates, & alia huiusmodi po-
stridie sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc
iudicationem considerans dixerit, non delinquet. Atque
ego quidem hunc considerandi modum nunc consulo, tum
de his qui domi manent, tum de his qui exercentur, item-
que de alijs omnibus, qualia peccata committant. At exa-
ctam illam narrantes rationem & audio, & derideo. Quum
enim parum inobedientes fuerint homines, haud scio quo-

*Diversitas
languentium.*

*Varia ob-
servatio.*

*Quando nō
prædicen-
dum.*

*Modus ob-
servandi
qui.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

modo id deprehendere possim. Si verò maiora fuerint peccata, quē in modum cōsiderare oporteat, scribam. Oportet autem primū hominē, in quo quis per inobedientiam admissa cognoscere velit, per totum diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sole præsertim recens orto. hoc enim tēpore subeuacuatus fuerit, & adhuc ieiunus est, & nullo labore fatigatus est, præterquā maturinis deambulationibus, in quibus minimē inobediēs est, si sanē ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodierit. Quare necesse est eum qui iusta victus ratione vitur, hac hora maximē æqualiter habere, & coloris, & totius corporis constitutionem. Quapropter & is qui huius considerationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & oculis, eo tempore. E

*Quæ præ
cæteris ob-
seruentur.*

Contemplari præterea oportet hominis mentem, & mores, & corporis vires. Alij enim alia facilius aut difficilius imperata faciunt. Primū igitur is cui inedia imperata est, si plura comederit & biberit, per hæc manifestus fiet, & tumidius corpus ipsius apparebit, & plenius ac coloratius erit, si non excrementa alui malè ipsi processerint. Erit item animosior ad ferendum laborem. Considerandum etiam an ructum edat, aut à flatibus vrgeatur. Hæc enim fieri solent his qui ita affecti sunt, propter hoc peccatū. Si verò dum edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatū non ederit, aut ebrius factus fuerit, aut à cœna larga nō obambulauerit, hoc modo explorare oportet. Si quidem cœnam non ederit, solito autem more deambulauerit, iucundiores aspectum præ se feret, & vegetior ac operosior in exercitijs erit. Verū alui egestio modica & compacta maximē in hoc fuerit. Si verò cœna sumpta nō deambulauerit, ructū utiq; edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo nō minor apparebit, & inter laborandum magis quā antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit. & transitus alui maiores, ac minus viscosi his fuerint. Quod si neq; cibū cōsumpserit, neq; deambulauerit, pigrior utique fuerit ac tumidior. Si verò ebrius factus fuerit, sudabit magis quā antea, & difficulter spirabit, & ipse seipso grauior erit ac humidior. Sed & lætior erit, si nō caput ipsi affligatur. Quod si vxore semel vsus fuerit, vegetior utiq; erit, & magis solutus. Si verò sapius rē peregerit, durior euadet, & squallorem quendam habebit, & decolora-
rior

*Cuius quid
his faciat.*

A tior ac magis lassatus erit. Porro egestionis alui procederet oportet his qui laboribus exercentur, quandiu parum e-derint, ac parum potauerint, modicas & duras, atque hoc quotidie. Si verò tertio quoque die, aut quarto, aut ex longiore intervallo prodierint, periculum est aut feбри, aut alui profluuiο corripiendos esse. Quaecunque verò egestionis liquidiores sunt, quàm ut in transitu conformentur, hæ sanè omnes peiores sunt. At verò his qui multum edunt, & multum laborant, egestionis transitum mollem, oportet esse sic- cum, & copiam ciborū ingestorum pro ratione laboris. Pro- cedunt autem ab æquali ciborum copia, his quidem qui mi- nimum laborāt, plurimæ egestionis, his verò qui plurimum laborant, modica, si sani fuerint, & iusta victus ratione utan- tur. Nam ad hæc coniecturam facere oportet. Liquidio- res autem egestionis, & sine febribus fientes, & quæ septima die, aut citius iudicantur, commodæ sunt, si semel vna vice omnes fiant, & non reuertantur. Si verò insuper febrerint homines, aut alui profluuiā redierint, si longa fuerint, peni- tus mala sunt, siue biliosa fuerint, siue pituitosa, siue cruda: & victus ratione propria, singula opus habent, iterumque me- dicamentis alia alijs. Cæterum vrinam iuxta portionis co- piam mingere oportet, & semper æqualem, & quā maximè acervatim, & momento paulo crassiores, quàm id quod in potu acceptum fuit. Si verò fuerit aquosa, & copiosior quàm pro eo quod bibi imperatū est, significat hominem non obe- dire, sed copiosiore potu uti: Aut non posse renutrirī, quàm diu talia vrinam faciunt. Si verò paulatim stridat vrina, aut medicamentis hominem opus habere significat, aut morbuū aliquem circa vesicam habere. At sanguinem mingere, raro quidē & sine febre ac dolore, nihil mali significat, sed las- titudinum solutio fit. Si verò sæpius mingat, & aliquid ex his accesserit, malum est. Verū prædicere oportet, siue cum do- lore mingatur, siue cum febre, fore ut insuper pus mingat, at- que ita dolores ac afflictiones quiescant. Crassa verò vrina albam subsidentiam habens, aut circa articulos dolorem ali- quem, aut tumorem significat. Aliæ verò omnes subsidentia in vrinis eorum qui exercentur, à morbis circa vesicā sunt, id quod ipsi manifestum faciēt. Cum doloribus enim erunt, & tales ut difficulter quis ab ipsis liberari possit. Atque hæc

*Oletum quod
le omnium
esse debeat.*

*Lotium
quale.*

*Sanguinis
minctio.*

*Puris min-
ctio.*

*Crassum
lotium.*

*debet legi
tenue & ga-
sic est enim*

*ca litera
qm si vrina
est crassa et
excoctida et
alba subside-
ntia habens
aliquid siatua*

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Hydropi-
sis.*

Phthisis.

Podagra.

*Morbis sa-
cer.*

*Qui Hy-
dropes sa-
niantur.*

quidem de his scribo, & huiusmodi alia dico. Caterum ex **D**
his qui exactam ac certam prae-dictionum rationem prae-di-
cant, cum aliquibus ipse conuersatus sum, cum aliquorum ve-
ro filijs ac discipulis rem contuli, quorundam verò scripta
accepi. Quare quum probè sciam qualiter quisque ipsorum
sentiat, & exactas certitudines nusquam compererim, hæc
scribere aggressus sum. At verò de aqua inter cutem, &
tabidis, & podagris, & his qui à morbo sacro appellato cor-
ripiuntur hæc dico, ex aliqua quidem parte de omnibus idè.
Nam qui hos morbos congenitos habet, is ægrè ab ipsis li-
berari potest. Reliqua verò singulatim scribam de singulis.
Eum qui ab hydropo, siue aqua inter cutem correptus est, &
superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet, **E**
ita vt natura se exerat, simulque facile concoquat, & benè spi-
ret, sitque sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidū ha-
beat, & non circa extremas partes colliquatum. Melius est
autem vt tumores potius habeat in extremis partibus. Opti-
mum verò est neutrum horum habere. Nam molles ac graciles
esse conuenit extremas partes, itemque ventrè ad contactū
mollem. Tassim verò adesse non oportet, neque firim, neque
linguam resiccati, tum reliquo tempore, tum post somnos,
quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere o-
portet. & vbi multum satis comedit, non affigi. Aluum ve-
rò ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem
tempore egerere recrementum molle efformatum. Vrinam
autem apparere cōuenit, pro studiorum ratione, & vinorum **F**
mutatione transeuntē. Laborem verò ferre oportet facile, &
lassitudinis exortem esse. At optimum quidè est hominē ita
per omnia dispositum esse, & sic securissimè sanus fieri pote-
rit. Sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit vt super-
stes euadat. Qui verò nihil horum habuerit, sed contraria,
eum desperatum esse scito. Qui autem pauca horum habue-
rit, quæ bona esse dixi, si hydropo laboranti adsint, huic exi-
gua spes restant. Cui verò multum sanguinis sursum ac de-
orsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multā
qua repletum iri timor est, atque hic hydrops breuissimi
temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verum de hoc
alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores
facti emartescunt ac rursus attolluntur, hi magis cōualescūt
quàm illi

A quàm illi qui ex sanguinis eruptione implent. Verùm fallunt hi hydropes ipsos ægrotos, faciuntq; vt ipsi à medicis discedant ac pereant. De tabescentibus quod ad sputum ac tussim attinet, eadem dico quæ de pectore suppuratis scripsi. Oportet enim eum qui probè liberari vult, facile sputum per tussim reijcere, & id esse albū, & æquale, & eiusdem coloris, & ab inflammatione alienū. Quod verò à capite defluit ad nares conuerti, febrē autem non inuadere, vt ne à cœnis prohibeatur, neque sitiat. Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorum. hominem verò quàm minimè tenuem esse oportet. Pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum. &

*Phisicorū
bona signa*

B os ipsius paruum sit, & robuste carnosum. Quicumque enim hæc omnia habuerit, maximè superstes erit. Qui verò nihil horū habet, interitui proximus. Quicunq; verò pectore suppurati facti fuerint, dum iuuenes sunt, ex humorum illapsu, aut fistula, aut alio quopiam huiuscemodi, aut ex abscessus recursu, hi non euadunt, nisi valde multa bona signa ipsis accesserint. Pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex alijs morbis longis pleriq; ad hoc tempus maximè moriuntur. Cæterum ex alijs minimè superstites manēt & virgines, & mulieres quibus ex suppressis mentibus rabes oborta est. Si verò aliqua virgo, aut mulier euasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide ac purè apparere, aut nulla spes est. Qui verò ex sanguinis eruptione, pectore suppurati fiunt, & viri, & mulieres, & virgines, non minus euadūt. Verùm signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescentium collectis, & superstitē futurum, & periturum prædicere oportet. Maximè verò euadunt ex sanguinis eruptione, hi quibus dolores sunt atrabiliarij, & in dorso, & in pectore: & qui post eruptionem minus dolent. Nam & tussēs non valde insuper accedunt, & febres pleræque perseverant, sitim faciliē ferētes. At reuersiones eruptionis sanguinis maximè fiunt his, si nō abscessus succedat. Optimi verò sunt abscessus sanguinolentissimi. Quibus autem in pectoribus dolores insunt, & per tempus attenuantur, & tussunt, ac difficulter spirant, neque febribus insuper corripientibus, neque suppurationibus succedentibus, eos interrogare oportet, quum tussiant, & difficulter spirent, an & compa-

*Quo tempore
ibi pereunt.*

Phisicis mulierum.

Suppuratis

*Qui abscessus
sunt meliores*

HIPPOCRATIS LIBER II.

Podagra.

Etum quiddam & modicum odorem habens tussiendo reij- **D**
 ciant. De podagricis hæc dico. Quicūque aut senes sunt, aut
 circa articulos callos tofaceos concretos habent, aut arum
 nose viuunt, ac siccam aluum habent: hi omnes sani fieri nō
 possunt humana arte, quantum ego noui. Sanant quidem hos
 optimæ dysenterix si successerint. Sed & aliæ eliquationes
 valde profunt, quæ ad infernos locos repunt. Qui verò iu-
 uenis est, & circa articulos nōdum tofaceos callos concretos
 habet, & accuratè viuit, & laboris amans est, & aluum bonā
 habet ad obediendū pro studiorū ratione, hic sanè medicum
 intelligentiam habentem nactus, sanus fieri poterit. Ex his
 porro qui à sacro morbo corripiuntur, difficillimè quidem li- **E**
 berantur hi quibus à puero contigit morbus, & simul ad vi-
 rilem ætatem peruenit. Deinde hi quibus corpore in vigo-
 re ætatis constituto factus est, & fuerit à vigintiquinque an-
 nis, vsque ad annum quadagesimum quintum. Post hos au-
 tem, quibus factus fuerit morbus, nullam significationē præ-
 bens ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capi-
 te initium capere videtur, aut à latere, aut à manu, aut pede
 facilius curatur. Verū differunt etiam hæc morbi genera.
 Qui enim à capite initium sumunt, ex his grauissimi sunt.
 Deinde qui à latere. Qui verò à manibus ac pedib⁹, maximè
 sanari possunt. Cæterum horum curā aggredi oportet medi-
 cum, qui medēdi modum nouit, si homines fuerint iuuenes,
 & laboris amantes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis
 stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæc atrabiliarix men- **F**
 tis emotiones non sunt conducibiles. Alij verò qui ad infer-
 nas partes conuertuntur abscessus, boni sunt. Longè verò o-
 ptimi & hic sunt, qui sunt sanguinolentissimi. Quicunq; ve-
 rò senes apprehēdi incipiunt, maximè moriuntur. Et si nō pe-
 reant, statim celerrimeq; per se liberantur, à medicis autem
 minimè opem ferunt. At quibus pueris oculi repentè dis-
 torti fuerunt, aut maius quoddam malum perpelsi sunt, aut
 tubercula sub ceruicem oborta sunt, aut vocem graciliorem
 adepti sunt, aut tussēs siccæ diurnæ adhærent, aut maiori-
 bus factis dolor procedit ad ventrem, & non exturbatur, aut
 in lateribus distortionēs habent, aut venas crassas circa ven-
 trem varicosas, aut omentum descendit, aut testis magnus fa-
 ctus est, aut manus tenuis & impotens, aut pes aut tibia tota
 clauda

*Sacer mor-
bus.*

*Comitialis
senes tollit
ferē.*

A clauda facta est, citra aliam causam: his omnibus morbum antea factum fuisse, scire oportet, praeter his vniuersis. Et plurimi qui pueros educant, si interrogentur confitebuntur: quosdam vero etiam res latet, negantque se scire quicquam tale factum esse. Qui porro de vlceribus cognoscere volet, quomodo singula finient, eum primum hominum species perscrutari oportet, tum eas quae meliores sunt ad vlcera, tum quae deteriores. Deinde aetates nosse, in quibus singula vlcera curatu difficilia existunt. Locos item in corporibus perspectos habere, quantum alij ab alijs differunt. Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia haec nouerit, is sane sciet etiam quomodo singulorum euentus continget. Qui vero non nouerit haec, non nosse poterit quales fines vlcerum erunt. Species equidem bonae sunt haec. Leues, & commodatae, & bonis visceribus praeditae, & neque valde carnosae, neque durae. Iuxta colorem vero sit species alba aut nigra, aut rubens. Haec enim omnes bonae sunt, si pure sunt. Si vero pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus aut liuidus fuerit, peius est. Species vero quae praescriptis contrariae sunt, eas deteriores esse scito. At vero quod ad aetates attinet, tubercula quidem suppurata fiunt, & itru- mofa haec plurimos pueros occupant, & facillime ex ipsis liberantur. Senioribus vero pueris & adolescentibus, minus quidem oriuntur, verum difficilius ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valde fiunt, verum, caria

C Graecis dicta, ad modum faui concreta, horreda: & cancri oculi submersi, & ex pustulis nocturnis herpes, donec sexaginta annos transmiserint. Senibus autem nihil talium tuberculorum accedit, verum cancri & occulti, & summas partes occupantes, & commoriuntur. Caterum ex locis subalares difficiles curatu sunt, & laterum mollitudines, ac femora. Nam & morae in ipsis sunt, & recidivae. Ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti, & praesertim pedum. Quibus autem in obliqua linguae parte vlcus sit diuturnum, in his dentes confiderare oportet, an quis iuxta illam vlcus partem acutior sit. Vulnere magis lethalia sunt, quae in venas crassas in collo ac inguinibus infliguntur. Deinde quae in cerebrum, & in hepar. Postea quae in intestinum & vesicam. Sunt autem haec omnia perniciofa valde, non tamen ita ut nemo ex his

Quae ad vlcera uicerat ut facienda. Aetatem et locorum differentia.

Quae hominum species & qui colores probi.

Struma.

Herpes.

Locus fauicia curatu difficilia.

Vulnera lethalia sunt.

HIPPOCRATIS LIBER II.

euadat, velut putatur. Nam & loci qui hæc nomina habent, D
multum inter se differunt, & iidem modi. Multum etiam dif-
fert corporis ipsius hominis structura. Aliquando enim neq;
febricitat, neque inflammatur sauciatus. Aliquando etiam
citra causam febricitat, & aliqua corporis pars omnino in-
flammat. At quādo is qui vlcus habet, delirat, & facile fert
vulnus, tunc vulnus aggredi oportet, velut iuxta medicinæ
& accedentium rationem, euentum habiturum. Moriuntur
enim homines ab omnis generis vulneribus. Multæ enim
venæ sunt & tenues, & crassæ, quæ sanguinem fundentes oc-
cidunt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia tem-
poris occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sen-
tiat. Multa verò vulnera in locis vilibus ac non malis esse, & E
nulla re graua videntur, & tamē sic dolore affligit plaga, vt
respirare non possit. Alij verò præ vulneris dolore, quod sa-
nè graue nulla re erat, spiritum quidem duxerunt, verum de-
lirarunt, & febrientes mortui sunt. Quicunq; enim aut cor-
pus febricitans habet, aut mentem turbatam, talia patiun-
tur. Sed neq; hæc admirari oportet, neq; formidare, illud ex-
pendendo, quod & animæ & corpora hominum plurimum
differunt, & vim maximam habent. Quæcunque igitur vul-
nera tempus nanciscuntur, aut corpus & mētem huiusmodi,
aut ita gliscentem sanguinē, aut magnitudine tanta fuerint,
vt homo ad curationem adduci ab eius contemptu non pos-
sit, ab his quidem discedere oportet, qualiacunq; tandem fue-
rint, diarijs animi deliquijs exceptis: alia verò omnia aggre-
di, quæ recens sunt incussa, quo & febres effugiant homines,
& sanguinis eruptiones, & nomas vlcerum proserpentes, hi
qui euadent. Exactissime verò & ad plurimum tempus, eo-
rum quæ grauissima sunt custodiam facere oportet. Nam ita
facere iustum est. At verò nomæ lethalissimæ sunt, quarū pu-
tredines profundissimæ & nigerrimæ ac siccissimæ existūt.
Prauæ etiam sunt ac periculosæ, quæ nigram saniem remit-
tunt. Albæ verò ac mucosæ putredines, minus quidem occi-
dunt, magis autē reuertuntur, & diuturniores sunt. Herpe-
tes autem minimè omnium vlcorum quæ depascendo proser-
punt, periculosi sunt. verum maximè difficulter submoueri
possunt, quemadmodum canceri occulti. In omnibus autē ta-
libus febrem superuenire vna die confert, & pus quàm albis-
simum.

*Quæ vulne-
ra curanda*

*Nomæ quæ
mala sint.*

*Herpetes
quæ mala
non sint.*

*aliquæ periculosæ
aliquæ difficulter sanabiles*

A limum ac crassissimū. Cōmodat & corruptio nerui, aut etiā
osis, aut etiā amborū, tum in profundis, tum in nigris putre
dinibus. Nam in corruptionibus pus multū fuit, & putredine
soluit. Porro ex capitis vulneribus lethalissima sunt
quæ ad cerebrum pertingunt, velut etiam antea scriptum est.
Grauia sunt & huiusmodi omnia, os nudum maguū, os in
farctum, os diffractum. Si verò etiā osculum vlceris paruum
fuerit, fissula verò osis aliquandiu permanserit, periculosius
est. Hæc autē omnia grauiora sunt, si & iuxta futurā sunt, &
ex locis semper periculosiores summi in capite existūt. Cete
rū in omnibus memorabilibus vulneribus interrogare oportet,

*Capitis uul
nera.*

*Quid in his
percendum.*

B conciderit homo, aut an in soporem altiorē collapsus sit. Si
enim horum quippiā factum fuerit, ampliore custodia opus
habet, nimirum quum cerebrū vulnus tunc perceperit. Si ve
rò nō recens sauciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet,
ac consilium capere. Optimum quidē igitur est, neque feбри
re eum qui vlcus in capite habet, neque sanguinem insuper
ipli erupisse, neque inflammationem, neque simul vllum ali
quem dolorem accessisse. Si verò quid horum apparuerit, se
curissimum est vt in principio fiat, & modico tēpore perma
neat. Cōducit autem in doloribus, etiam inflammatione ex
vulneribus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in
venis apparere. Quæ verò in acutis morbis cōferre febribus
scripti ea etiam in his fieri cōducit, & eadem hic quoq; bona

*Quæ in his
conferant
vel contra.*

C esse assero, contraria verò mala. At incipere febrē in capitis
vulnere quarta die aut septima, aut vndecima, valde lethale
est. Iudicatur autem plerisque, si quidem quarta vulneris die
febris inceperit ad vndecimā. Si verò septima die febris in
choarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si ve
rò vndecimo febrē inceperit, ad vigesimam, quemadmo
dum in febribus descriptum est, quæ absque manifestis cau
sis fiunt. Cæterum in principijs febrium, siue delirium ac
cesserit, siue alicuius membri tideratio, perituum hominem
sciendū est, si nō omnino aut ex optimis signis aliquod acce
dat, aut corporis vires adsint. Verū considerabis modū. Nam
homini adhuc spes salutis, sed claudū fieri articulum in quē
incubuit necesse est, etiam si superstes maneat homo. Por
rò vulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & nervos
coniun

*quam rati
et conseru
has sunt m
ni rati
in his prin
febris dicit
Mortis not
te in his.
Claudela
saite qui
membra
fiant.
est.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Vulneris ob
seruatio.*

*Medullæ
tergi affe-
ctus signa.*

*Fauces
etruentæ*

Lippitudo.

coniungentes penitus præsecant, clarum est quod claudos ef- D
ficient. Si verò ambiguum fuerit de neruis, quomodo se ha-
beant, si quidem fuerit acutum telum quod rectum vulnus fe-
cit, melius est obliquo. Si verò graue & obtusum fuerit id quod
vulnerauit, nihil refert. Sed plagæ profunditatē & alia signa
considerare licebit. Sunt autem hæc. Pus si insuper accedat
ad articulum, duriores fieri necesse est. Si verò etiam tumo-
res simul permanferint, hunc locum ad multum tempus du-
rum esse necesse est, & quum sanum iam est vlcus, tumorem
permanere necessarium est, simulque flecti ac extendi, quæ-
cunque dum articulus incuruus est, curantur. Quibus verò
etiam neruus elapsurus esse videtur, securius de claudicatione
prædicere licet, tum aliàs, tum si inferiorum neruorum ali- E
quis fuerit exolutus. Ex his autem cognoscet neruum qui ex-
cidet. Pus album & crassum, multo tempore defluit, dolores-
que ac inflammationes circa articulum in principiis fiunt. Ea-
dem fiunt etiam si os elabatur. At verò dissectiones in cu-
biti gibbis, præsertim quæ sunt cum inflammatione, ad sup-
purationem perueniunt, sectionesque ac vstiones. Medul-
la verò spinæ si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia aliqua cau-
sa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, ut neque si
tangatur percipiat, & ventre ac vesica, ut circa prima tempo-
ra, neque sterqus, neque vrinam egerat, nisi ad necessitatem.
Quum autem vetustior factus fuerit morbus, non urgente ho-
mine, & sterqus prodit, & vrina. Moritur autem postea, non
multo interposito tempore. Quod si verò cuipiam fauces F
implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, cui ne-
que caput antea doluit, & qui neque tussim habuit, neque ve-
muit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec
pectoris, nec dorsi, huius considerandæ sunt nares, & fauces,
an vlcus aliquod habere compareat in hoc loco, aut hirudi-
nem. Oculi porro lippientes optime permutantur, si & la-
chryma, & sordes, & tumor, simul fieri inceperint. Si verò la-
chryma fordi fuerit permixta, & non valde calida: Sordes au-
tem alba fuerit & mollis, & tumor leuis solutus: Si ita hæc se
habuerint, oculus cõglutinabitur ad noctes, ut doloris exors
sit, atque hoc modo res minimè periculosa fuerit, ac minimè
diuturna. Si verò lachryma procedit multa & calida, cum pau-
cissima sorde, ac paruo tumore, atque hoc ex altero oculo tã-
tum,

- A** tum, tunc diuturnum valde fit malum, verum non periculosum, & doloris exors est hic modus. Et iudicationem in his maximè expectare oportet, primam quidem ad vigesimam diem. Si verò hoc tempus transmittat, ad quadragessimā expectanda est. Si verò neque in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. Per totum autem tempus hoc, sordem considerare oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maximè sub iudicationis tēpus. Si enim desinet, hæc faciet. At si vtriq; oculi hæc perpetiātur, in maiori periculo sunt, ne vlcerentur. Verum iudicatio brevioris temporis erit. Sordes autem siccae valde dolorosæ sunt, sed cito iudicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si verò tumor magnus fuerit, dolorisq; exors & siccus, periculo vacat. Si verò cum dolore fuerit, malus est, si siccus sit, & periculū est ne vlceretur oculus ac cōcrescat. Sed & grauis est tumor, si lachrymā coniunctam habeat, itemq; dolorem. Si enim lachryma procedit calida ac salsa, periculum est & pupillam exulcerari, & palpebras. Si verò tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, viris quidē palpebrarū euersionem prædicere oportet: mulieribus autem & pueris exulcerationē ac euersionem palpebrarum. At si sordes pallidæ aut liuidæ fuerint, & lachryma multa accalida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & vigiliæ his accesserint, necesse est vlcus in oculo factū esse, & timor est quoque vt talis rumpatur. Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere verò his futura oportet, ita vt respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quæ ex oculo fluūt, & ad dolores itemq; vigilias. Postquam verò & oculum cōtueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculus, malum est & difficile vt sedetur. Si verò & putredo tali suberit, penitus inutilis oculus redditur. At verò alios vlcerum modos prædicere oportet, locos considerando, & putredines, & profunditates. Necessarium enim est iuxta vlcerū vehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rumpuntur oculi, & postea prominent, vt extra locum oculus sit, his & tempore, & arte, opem ferre non datur, ad hoc vt videant. Parum verò oculorū transmotiones sedari possunt, si nihil mali accesserit, & homo iuuenis fuerit. At vlcerum cicatrices, quibus nihil

*Cum acies
oculorum
extuberal
de visu auctu
est.*

hil

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Pupillarum
color.*

hil aliud mali affuerit, omnes & à temporibus, & ab arte, D
opem ferre posse putandum est, maxime recentissimas, & in
iuuenū corporibus. Cæterum ex locis maxime oculi lædu
tur, si exulcerantur. deinde pars quæ est supra supercilia, po
stea quicquid vicinissimum his locis fuerit. Pupillæ verò
flauescentes, aut argenti speciem referentes, aut ceruleæ, non
bonæ sunt. His autem paulo meliores sunt, quæ aut minores
apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, siue ex causis
tales factæ fuerint, siue sua sponte. Caligines & nubeculæ,
& cicatrices subalbicantes, leuigantur ac delentur, si nō vul
nus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricem habue
rit in hoc loco, aut vnguē pterygion dictum. Si verò splen
dicans cicatrix in nigra oculorum parte fiat, partem aliquam E
nigredinis dealbat, aded vt si multò tempore permaneat, &
aspera & crassa, etiam memoriam sui relinquat. Porro iudi
cationes quemadmodum in febribus scripsi, ita & hic se ha
bent. Verum signa edoctum, iuxta differētiās lippitudinum
prædictionē facere oportet, quum pessima signa accesserint,
diuturnarum lippitudinum, velut de singulis perscriptū est:
quum verò apparuerint optima signa, breuium. Tunc enim
septima die desituras esse prædicendum est, aut propè hoc
tempus, & alioqui securas esse putandum est. Reciduias autē
expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neq;
in diebus indicatorijs, neq; signis bonis cōspectis. Omnium
verò maxime vrinæ statim in oculorum affectionibus con
siderare oportet. Nam temporū occasiones repentinæ sunt. F

*Præcipua
in his obser
uatio.*

*Dysenteria
quæ mala.*

Dysenterix si quidē cum febre inuaserint, aut varijs alui
egestionibus, aut cum hepatis inflāmatione, aut præcordij,
aut ventris: aut quæ dolorosæ fuerint, aut cibos intercipiūt,
sitiq; inducunt: hæ omnes malæ sunt. Et qui sanè plurima
horum malorū habuerit, citissime peribit. Cui verò paucis
sima talium affuerint, huic plurimæ spes sunt. Moriūtur au
tem ex hoc morbo maxime pueri quinquennes, & seniores
adhuc, decennes. Reliquæ verò ætates minus. At quæ dy
senterix commodæ sunt, hæc mala hæc nō inducunt. Verum
sanguine & ramenti egestis, desuerunt septima die, aut de
cima quarta, aut vigesima, aut quadragesima, aut intra hæc tē
pora. Huiusmodi enim egestionēs, etiā eos qui prius sunt in
corporibus, morbos sanant, antiquiores quidē diutius tem
pore,

A pore, recentiores autem in paucis diebus submouere possunt. Nam & quæ vterum gestant, etiam ipsæ euadunt superstites magis ad partum, & ex partu, & fœtus conseruant, sanguine & ramētis egestis, etiam per multos menses: nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signū ex his quæ in dysenterijs fieri scripsi, accesserit. Si verò aliquod illorum apparuerit, & fœtui perniciem significat, & prægnanti periculum, si non post fœtus effugium, & secundæ exolutionē, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat.

Leuitates porrò intestinorum, lienterizæ græcis appellatae, hæc quidem sunt continuæ & diuturnæ, & per omnem horā, & cum strepitibus, & sine strepitibus exturbantur, & similiter noctu ac interdiu incumbentes, & egestionē subeunte, aut valde cruda, aut nigra & leui ac graueolente: hæc omnes malæ sunt. Nam & sitim inducunt, & potum nō ad vesicam promouent, vt per vrinam eiiciatur, & os exulcerant, & ruborem eleuatū in facie efficiunt, & maculas solares varios colores habentes. Simul autem & ventres emollitos, & sordidos ac rugosos reddunt. Ex talibus autem homines impotentes fiunt, ad cibum capiendum, ad deambulandum, ad faciendum alia quæ facere debent. Estq; morbus hic grauissimus senioribus. Vehemens est etiam viris. Reliquis autem ætatibus multò minor. Quisquis autem neq; in ætatibus his est, quas malè tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex ūgnis habet, quæ mala esse scripsi, hic securissimè dispositus est. Indiget autem curatione hic morbus, donec & vrina pro ratione eius quod in potu acceptum est, procedat. & corpus ab egestis cibis augmentum cupiat, & à malis coloribus liberatum fuerit. At verò alia profluvia alui, quæ sine febre sunt, & breui tempore durant, & mitia existunt. Aut enim eluta sedabuntur, aut sua sponte. Prædicere autem oportet excretionem subitus erumpentem delituram esse, quum tangenti ventrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis flatus penetrarit. Sedes autem euertuntur ac prociidunt, viris quidem, quos vbi hæmorridas habent, alui profluium corripit: pueris autem calculo laborantibus, & in dysenterijs longis ac meracis: Senibus verò quibus muci agglutinati insunt. Porrò ex mulieribus, quæ magis aut minus in vtero concipere solent, ita considerationem facere conuenit

Lienteria.

*Medela
quæ.*

*Alui pro
fluvia.*

*Sedis proci
deniæ.*

*Mulierum
fecunditas
cognitio*

HIPPOCRATIS LIBER II.

uenit, primùm quidem specierum, Paruæ enim ad cōceptio-
nem præstantiores sunt maioribus, tenues crassis, albæ rubi-
cundis, nigrae luidis. Quæ item venas conspicuas habet, me-
 liores sunt quàm quibus non apparent, Carnem autem vbe-
 riorem habere, aniculæ malum est, mammas autem tumidas
 ac magnas, bonum. Atq; hæc quidem ad visum exposita sunt.
 Verùm interrogare oportet etiam de menstruis purgationi-
 bus, an omnibus mensibus compareant, & an copia satis ma-
 gna, & an boni coloris sint, & æquales in singulis tēporibus,
 & in iisdem mensium diebus. Sic enim has fieri optimū est.

*Vteri quali-
tas.*

Locum verò in quo conceptio fit, quem sanè vterum nomi-
 namus, sanum esse oportet, & siccū, ac mollem. Sit item neq;
 retractus, neque pronuus, neque os ipsius sit auersum, neque
 conclusum, neq; euersum. Fieri enim non potest vt cōceptio

*Conceptus
impedimēta*

fiat, quodcunq; tandem talium impedimentorum affuerit.
 Quæcunq; igitur mulieres in vtero concipere non possunt,
 verùm pallidæ apparent, neq; febre, neq; visceribus in causâ
 existentibus, hæc capite se dolere docent, & menses sibi malè
 ac meracos prodire. Siue autem breui, siue longo tempore,
 ipsi sic affectis menses non comparuerint, vteri in his purga-
 tione opus habent. Quæcunq; verò bene coloratæ sunt, &
 carnem multam ac pinguem habent, & venulas occultatas,
 & dolore carent, & menses his aut omnino non apparēt, aut
 modici & meraci prodeunt: Hic modus difficilimus est ad
 cogendum vt concipiant. Si verò mensibus comparentibus
 inculpate, & mulier sic corpore disposita fuerit, & non conce-
 perit, locus in quo est vterus in causâ est, vt fecunda foetu

*Post ulcus
qualis locus
Cum ulcus
in altera par-
te est quid
pariant.*

fieri non possit. Aut enim reuulsus est, aut euersus. Nam &
 alia quæ isthic fiunt cum doloribus decolorationeque ac col-
 liquatione fiunt. Quibus porrò vlcus factum fuerit in vte-
 ro, siue ex partu, siue ex tuberculo, siue ex alia quadam causâ
 his febres & inguinum tumores succedere necesse est, & do-
 lores in his locis. Si verò & puerperij purgamenta simul fue-
 rint intercepta, hæc mala si fuerint, omnino meraciora sunt
 & diuturniora. Et ad hæc præcordiorum ac capitis dolores.
 Ulcere autem facto & sanato, locum hunc leuiorem ac du-
 riorem fieri necesse est, & minus concipere posse. Si verò so-
 lum in sinistra parte fiat vlcus, & mulier in vtero concipiat,
 siue dum adhuc habet vlcus, siue vbi iam sana est, masculum

magis

- A** magis enixurā esse spes est. Si verò in dextra parte vlcus fiat, & mulier concipiat, foemineum magis fore foetum expectandum est. At si febres corripiant concipere non potentem, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an vteri vlcus aliquod habeant, aut aliud quippā ex malis de quibus scripsi. Si em̄ in hoc loco nihil mali subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quòd concipere non possit, sanguinem vomituram esse mulierem expectandum est, menses autem tali necessariò euauerunt. Si verò febris soluta fuerit à sanguinis eruptione, & menses cōparuerint, in vtero concipiet. Si verò priusquam sanguis erumpat, alui extremēta liquida facta fuerint paruo modo, periculum est perituram esse mulierem antea quā sanguinem vomat. Quaecunq; in vtero se concepisse putant, & non cōceperunt, & per multos menses falluntur, menstruis purgationibus non apparentibus, & ventres augeri ac moueri vident: hae & caput dolent, & collum, & prae cordia, & in mammis lac ipsis nō est, nisi modicū quiddam, atque id aquosum. Postquam verò ventris tumiditas exoluta fuerit, ac molles factae fuerint, in vtero cōcipient si non aliud quoddam impedimentum ipsi fiat. Nam haec affectio bona est ad mutationem in vtero faciendam, vt post hoc tempus in vtero concipiant. At his quae cōceperunt, dolores hi non fiunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & lac in māmīs gignitur. At verò eas quae à diuturnis fluxionibus vexantur, interrogare oportet an caput doleant, & lumbos, & infernam ventris partem. Interrogandę sunt etiā de dentium stupore, & visus hebetudine, & aurium sonitu. Quaecunq; autem dum ieiunae sunt, subbiliosa vomunt per multos dies, quum neque vterum geltent, neque febricitent, eas interrogare oportet an lumbricos rotundos simul vomāt. Si enim hoc non consententur, praedicendum est ipsis futurū esse. Fit autem hic morbus maximè quidem mulieribus: deinde verò etiam virginibus, alijs autem hominibus miuus. Quibuscunq; verò sine febribus dolores fiunt, mortem quidem non inducunt, verū plerique diuturni sunt, & multas mutationes ac recidiuas habent. Modi autem hi sunt. Primū quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues, aliqui multò grauiore. Vtrosq; verò hoc modo considerare oportet. Quicunq; hebetem visum habent, & rubor quidam ipsis sit

*Concepimus
fallacia.*

*Quid ab his
petendum.*

HIPPOCRATIS LIBER II.

in oculis, & pruritus frontem vexat, his sanguis sua spōte manans opitulatur. Atque hic modus necessariò simplex est.

Quid his prosit. Quibus verò dolores circa caput & frontem, ex magnis ventis fiunt, & ex frigoribus quum vehementer calfacti fuerint, eos grauedines quidem maximè perfectè liberant. profunt autem & sternutationes, & muci in naribus fientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coactè. Grauedines autem fiunt perfectè, adeò vt & tussis succedant: & sternutationes succedentes si dolores non sedauerint, necesse est tubercula & decolorationes his succedere. Quibus autem dolores sine manifestis causis fiunt, & diurni, & in toto capite, suntque ipsi & graciles, & debiles, his prædicendum est morbum longè grauiorem priore esse. Si verò etiam ad collum, & ad dorsum dolor descendat, caput relinquēs, & rursus ad caput recurrat, adhuc grauior sit. Verum omnium horum grauiissimus est, si ex capite ad collum ac dorsum tendat. Vtilitates autem his ex abscessibus fore expectandum est: aut vbi pus per tussim reiecerint, aut hæmorrhoidas habēt, aut pustulas in corporibus enatas. Confert etiam caput furfures habens. Torpores & puncturæ purginosæ velut ab vrtica, quibus per caput discurrent, aliquando per totum, aliquando per aliquam partem. Sæpe verò & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur, velut per caput discurrere, hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguam punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus sit, & qui difficilius submoueri possit. Verum absque hoc facilis est. Modi verò vtilitatum consequendarum ex abscessibus cōtingent, veluti antea scriptum est. Sed tamen abscessus minus in his succedunt, quàm in illis. Quosunque verò vnà cum doloribus vertigines corripunt, malum agrè exolubile ac furiosum existit. Senibus autem maximè hic modus sit. At alij morbi circa caput, & viris, & mulieribus, cum securitate vehementissimi sunt, & diuturniores: fiunt autem & adolescentibus, & virginibus in ea pubertatis ætate, & maximè circa mēsum progressum. Mulieribus verò in capitis doloribus, alia quidē omnia fiūt, quæ & viris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ & affectiones atrabiliaræ, his minus quàm viris, si non menses penitus aboliti fuerint. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauisunt ad multum tempus, & continenter, non tamen morbi regij

A regij modo: hi siue viri sint, siue foeminae, caput dolent, & lapides ac terram comedunt, & haemorrhoidas habent. *Pallor.* Pallidi vero cum virore colores qui diuturni sunt, & morbus regius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent, verum pro lapidum ac terrae esu, praecordia hos magis affligunt quam alteros. Quicumque vero multo tempore pallidi apparent, & facies in tumorem eleuatas habent, eos caput dolere sciendum est, aut circa viscera dolorem habere, aut in sede malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparitionibus, plerisque non vnum aliquod horum malorum apparet, sed plerumque multa, aut etiam omnia. Qui nocte vident, quos *Nyctalopes* sanè nyctalopes vocamus, hi morbo corripiuntur iuuenes, *pes.* aut pueri, aut etiam adolescentes, & liberantur sua sponte, aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibusdam vero & per totum annum permansit. Quapropter de tempore coniectare oportet, ita vt & ad morbi robur, & ad aegri aetatem respicias. Abscessus autem his profunt insuper apparentes, & ad infernas partes fluentes. Verum non valde accedunt, propter iuuentutem. At mulieres non corripiuntur ab hoc morbo, neque virgines quibus menses comparent. *Temporis dolor.* Quibus autem lachrymarum fluxiones diuturnae fuerint, & hi nyctalopes fiunt, eos interrogare oportet an caput doluerint antea quam haec reuelarunt. Quicumque dum neque febricitant, neque decolores sunt, saepe & verticem & tempora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum

C in facie, aut grauitè loquantur, aut dentes doleant, his sanguinem per nares erupturum esse expectandum est. Quibus vero ex naribus sanguis fluit, hi alioqui sani esse videntur, hos autem vel splenem in tumorem eleuatum habere comperies, vel caput dolere, & splendicans quiddam ipsis ob oculos obuersatur. Plerisque vero horum simul & caput & splen, hoc modo se habere apparent. Gingiuae vitiatae, & ora gra- *Lien non* ueolentia his sunt quibus splenes magni. Quicumque vero *sanus quid* habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis *ferat.* contingunt, neque oris graueolentia, horum tibiae vlcera praua habent, & cicatrices nigras. Quibus partes sub oculis vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies. Si vero etiam in pedibus tumores accesserint, aquam etiam habere videbuntur. Verum & ventrem, & lumbos in-

HIPPOCRATIS LIBER II.

*Distortio-
nes faciei.*

spicere oportet. At verò distortionem in facie, si nulli alij D corporis parti communicent, cito sedantur, aut sua sponte, aut ad necessitatem coactæ: reliqui verò syderati fiunt.

Quibus vnà cum hoc quod mouere non possunt, morbo-
sa corporis pars attenuatur, hi in sanitatem restitui non pos-
sunt. Quibus autem colliquationes non accesserint, hi sani
euadent. Cæterum de tempore quando sani erunt prædican-
dum est, respectu habito ad vim morbi, ad tempus, & ad
ætate hominis, & ad anni tempus, ita vt eius rei memor sis,
quod vetustissimi morbi, & pessimi, & qui reuoluuntur, gra-
uissimè obediunt: itemque hi qui sunt in vetustissimis cor-
poribus. Sed & autumnus & hyems, ad tales morbos submo-
uendos minorem commoditatē exhibent quàm ver & æstas. E

*Humero-
dolor.*

Dolores porro in humeris fientes, qui quidem ad manus
descendunt, torporesque ac dolores inducunt, his abscessus.
non succedunt, verum nigram bilem vomentes sanantur.
Qui verò isthic in humeris manent, aut etiã ad dorsum pro-
grediuntur, eos puris, aut atræ bilis vomitu effugiunt. Ve-
rùm de his ita considerationem facere oportet. Si quidem
enim facilè spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilē ipsos
vomituros esse spes est. Si verò difficilius spirauerint, & in
faciem ipsis color incurrit, qui prius non erat, siue rubicun-
dus siue niger, eos magis pus sputuros esse sperandum est.
Ad hæc verò considerandum est etiam, an in pedibus tumo-
res sint. Nam & hoc signum in his consentit. Atque hic mor-
bus viris vehementissimus esse solet, à quadagesimo anno F
vsque ad sexagesimum. Qua ætate etiam coxendicum mor-
bus maximè affligit. Porro de coxendicum morbo sic con-
siderationem facere oportet. Quibuscunque senioribus &
torpores vehementissimi sunt, & perfrigerationes tum lum-
borum, tum crurum: & qui pudendum arrigere non possunt:
& quibus alius non egerit, nisi ad necessitatem coacta, &
prodit ipsis multus stercoraceus mucus: his maximè diutur-
nus morbus erit, prædicendumque est annum vt minimum
duraturum esse morbum, ab eo tempore quo incepit, & opem
ad ver & ætatem expectandam esse. At verò iuuenibus non
quidem minus doloris inducit coxendicum morbus, verum
breuior est. Nam quadagesimo die liberantur. Sed neque
torpores vehementes accedunt, neque perfrigerationes cru-
rum

*Coxendicu
morbus*

Arum ac lumborum. Quibus autem hic morbus est quidem in lumbis ac ruribus, non autem affligit adeo ut decumbat, considerare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandum insuper est, an in femore torpores insint, & ad poplitem progrediantur, & si hoc confiteatur, rursus interrogandum, an & per tibiā ad summum pedem procedant. Quicumque enim pleraque horum confessi fuerint, his dicendum est, quod crura ipsis aliquando calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes vertatur, eos confidentes esse iube. Quibuscumque vero coxas & lumbos non relinquens, ad supernas partes conuertitur, malum id esse prædicandum est. At quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur, non podagrico modo: in his comperies viscera magna, & in vrina subsidentiā albam. Et talis si tempora eleuarit, dicet se sæpe dolere, dicet etiam sudores sibi nocturnos oboriri. Si vero neque in vrina subsidet talis subsidentiā, neque sudores fiunt, periculum est ne aut claudi fiant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem meliceridavocant, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his quibus in pueritia & iuuentute sanguinis ex naribus fluere solitus desijt. Proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in iuuentute facta fuerit: & an pruriginosæ velut ab vrtica puncturæ, & in pectore, & in dorso insint: & quibus alui dolores fortes inducant, citra exturbationes: & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si verò etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandum est an caput doleant. Hoc enim fatebuntur. Quibus verò ex his alui dolores in dextris fuerint, dolores his vehementiores fiunt, & præsertim quum ad præcordiū iuxta hepar reliquæ doloris fuerint. His autem doloribus prædest strepitus statim in aluo obortus. Postquam autem dolor quieuerit, vrinam crassam ac cum virore pallidam mingunt. Atque hic modus nequaquam lethalis est, verum valde diuturnus. Quum autem iam vetustus fuerit morbus, homines ab ipso cæcutiunt. At de sanguine interrogare oportet, an in iuuentute fluxerit, & de visus hebetudine, & de vrinæ

HIPPOCRATIS

*Impetigi-
nes.*

Leuca.

*Leuca un-
de.*

*Lepra un-
da.*

euacuationis pallore, itemque de strepitibus an insint, & D
succedentes prosint. Hæc enim omnia fatebuntur. Impeti-
gines & lepræ, & vitiliginis albæ, leucæ appellatæ, quibus
quidem iuuenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut
paulatim conspectum in multo tempore augefcit: his non
putare oportet abscessum esse, eam papularum eruptionem,
sed morbum. Quibus verò horum aliquid factum est mul-
tum & derepente, hoc sanè fuerit abscessus. Fiunt autem leu-
cæ quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus ta-
bidus appellatus. Lepræ verò & impetigines, ex morbis ab
atra bile factis. Ex his autem facilius sanantur ea quæ in ma-
ximè iuuenibus fiunt, & quæ recentissima sunt, & in mollis-
simis ac carnosissimis corporis partibus producuntur. E

HIPPOCRATIS

COI COACAE PRAENOTIO-

NES.

ME-


*Qui post ri-
gorem pe-
teant.*

*Perfrige-
ratio.*

*Pavor &
tristitia si-
ne causa.*

*Ignorantia,
obliuio.*

*Rigores
soporosi.*



Vi ex rigore perfrigerantur, caput ac
collum dolentes, voce destituti, in super
exudantes, postquã se recollegerint, mo-
riuntur. Molestè ferre morbum cum
perfrigeratione, pessimum est. Per-
frigeratio cum duricia perniciofa est.

Ex perfrigeratione, timor, & tristitia
præter rationem, in conuulsionem fi-
nit. Ex perfrigeratione vrina intercipi pessimum est.

Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio.

Soporosi rigore aliquatenus perniciosi, & flammeus in
facie color, cum sudore, in his malignus est. In his frigiditas
posteriorum partium conuulsionem accersit. Et in sum-
ma, posteriorum partium frigiditas, conuulsoria est. Ex
dorso horrores frequentes, & cito transeuntes, ægrè tolerari
possunt. Vrinæ enim interceptionem dolorosam signi-
ficant.

A ficant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor continenter vexans, corpore iam debili existente, lethalis est. Qui frequenter exudant, ac insuper rigēt, perniciosum hoc est, & in fine suppurationem habere comperiuntur, ventresq; perturbatos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui verò decima septima die rigorem habuit, & quarta ac vicesima insuper riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolentes, exudantes, malignum id est. Horrore affecti, multum insuper exudantes, difficili malo implicantur. Rigores multi torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores sunt, hi ægrè iudicantur. Quibus sanis horrores frequentes sunt, hi ex sanguinis fluxione suppurantur. Horror & spirandi difficultas in doloribus, signa tabis sunt. Ex pulmonis suppuratione, & circa ventrem aliquando ac claviculam dolores, & anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. Horrore affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, aluos humectas habent. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum vigilijs ac delirio in somnis, aliquando urinas inuoluntariè emittentes, in cōuulsionē desinunt. Continui rigores in acutis, prauī sunt. Ex rigore, cum capitis dolore exolutiones, perniciosæ. Cruentæ in his urinae prauæ. Rigor cum distentione neruorum in posteriora occidit. Qui in horruerunt & exudarunt iudicatorio modo, & postridie præter rationē horruerunt, si quis non vigilijs infestetur, neq; cōcoxerit, ei sanguinē erupturum esse puto. Urinæ cum rigore suppressæ, malæ & cōuulsoriæ, tum aliàs, tum si quis antea graui sopore pressus fuit. Spes autē in his est abscessus retro aures fore. Rigores velut in febre tertiana, si in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt. Si verò contrario cōuellentibus modo exacerbentur, cum rigore & febre, perniciosum est. Vocis interceptiones ex rigore, soluuntur tremore. Et insuper rigentes tremores succedētes iudicant. Qui ex rigore cum capitis dolore exoluuntur, in periculo versantur. Cruenta urina his mala est. Quibus rigor, his urinae suppressio. Conuulsio in febre, manuum, ac pedum dolores, maligni sunt. Malignus est & doloris ex femore progressus. Neq; genuum dolor bonus est. Sed & surarum dolores maligni sunt, mētemq; emouent, tum aliàs, tum si urinae subsidētia in medio innatet. Febres ex præcordi-

Rigor continuus.

Horror qui malus.

Rigores multi.

Horror & dyspnœa.

Horrentes quales.

Rigor continuus.

Rigor optothotonodes

Lotium retentum malum est.

genuum & surarum dolor

HIPPOCRATIS

rum dolore malignæ sunt, sopor in his pessimus est. Qui fre-
 quenter exudare cū præcordij intensione nō cessant, plerunq;
 malignè habent. & dolores in summū humerum ac clavicu-
 lam incumbētes, in his prauī sunt. Febres tertianæ naturam
 referentes, cum anxietudine, malignæ sunt. Vocis interce-
 ptiones in febre malæ sunt. Lassati, caligantes, vigilantes,
 soporosi exudantes, recalcēcentes, male habent. Lassati cum
 horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalcēcti in morbo
 acuto, male habent, tum aliàs, tum si circa hæc sanguis de na-
 ribus stillarit. E regio morbo abundè colorati, moriuntur, al-
 ba verò alui egestio in his præcedit. Febres tertianæ naturā
 referētes erroneæ, in pares dies trāslapsæ, difficiles sunt. An-
 xietudines in diebus iudicatorijs, si in his sine sudore perfrige-
 rentur, & omnes qui sine sudore perfrigerantur citra iudi-
 cationem, male habēt. Et qui insuper riguerūt ex his, vbi vo-
 muerunt meraca, anxij, tremuli in febre, malum. Qui ex ri-
 goribus, paruis sudorib. perfrigerantur, malū. Exudātes, vigi-
 lantes, recalcēcentes, malum. Qui insuper exudant in febre,
 malignè habent. Quibus biliosa est alui egestio, his circa pe-
 ctus morsus & amaritudo, malum est. In febribus inflata al-
 uo, flatu non erumpere malū. Lassati, singultientes, stupore
 detenti, mali. Præter consuetudinem quid facere, velut est,
 proponere sibi aliquid, & expectare aliquid, prius nō consue-
 tum, aut cōtrarium, malum est, & mentis emotioni proximū.
 Qui morbi in malis signis leuantur, & qui in bonis non re-
 mittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in
 morbis acutis submolestè ferētes, malū, tum aliàs, tum si vri-
 næ sunt nigræ & turbidus spiritus in his malus. Extremæ
 partes si in vtranq; partē cito trāsmutentur, malū est. Sed &
 sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferox responsio, malū.
 Vox acuta, malum. Præcordia his intro trahūtur. Qui ex per-
 frigeratione sudorosa cito recalcēscunt, malum. Qui acutis
 exudāt submolestè ferētes, malum. Qui præter rationē nulla
 existente vasorū euacuatiōe, impotētes fiunt, malū. In febre
 tractus velut à vomitu, in screationem desinēs, malum. Tor-
 por in vtranq; partē cito trāslabēs, malum. Sanguinis stillæ
 pusillæ, malæ. In acuto morbo sitis præter rationem soluta,
 malum. Qui ad manū exiliunt, male habent. Quibus cum
 febre ardēte, tumores somnolenti, torpidi fiunt, his dolor in
 latu

Febres ter-
 tianæ
 in pa-
 res

idem 909.

anguinis
 stillæ

A latus superueniens levis fideratiōis ac resolutiōis modo occidit. Suffocatio in acutis ægris attenuatis, perniciofa. In perniciosis iam parui tremores, & vomitus æruginofus. Qui in potibus fubftrepunt, & fubmurmurāt in ficcis: & qui difficulter deglutiunt fpiritu tuffiēte, perniciofe habēt in acutis perfrigeratis. Rubores in manibus ac pedibus, perniciofi.

Efflantes & refracti, in fomis leuiter fufpicientes, morbo regio abunde colorati moriuntur, alba alui egeftio in his præcedit. In febribus mētis emotiones taciturnæ, in eo qui voce priuatus non eft, perniciofæ funt. Liuiorē fientes in febre, breui mortem affore fignificant. Quibus in febre dolo-

liuiorē

B re lateris fiente, alui multa aquofa ac biliola egerit, hi alleuantur. Quibus verò inedia confequenter accedunt, ac fudores, cū bono faciei colore, & aluo liquida, ita vt adfit etiā aliquis cordis, feu potius oris vētris dolor, hi vbi longius ægrotarunt, peripneumonicorum modo moriuntur. Febrienti fi

fi atrabilis in principio, fufum aut deorfum prodierit, lethale eft.

Qui cum perfrigerationibus, nō fine febre, fupernē exudant, moleftē ferētes & phrenitici, in acuto morbo perniciofe habent. Dolores modicē acuti, ad clauiculam ac fufum tranfeuntes, perniciofi. In longis perniciofis morbis, fedis dolor lethalis eft. Si debiliter iam affecti, non videant, aut non audiāt, aut labiū, aut oculus aut nafus ipsis diftorqueāt, lethale eft. In febribus inguinis dolor, morbum diuturnum fignificat. In febribus iudicationes impeditæ ac fublata, tem-

sedis dolor

C poris quidē diuturnitatē inducunt, non autē perniciofæ funt. Febres ex doloribus vehementibus diuturnæ. Mentis emotiones tremulæ, palpatoriæ, phreniticæ funt. & dolores circa furam, in his mentem emouent. Quicunq; in febre cōtinua, voce deftituti iacentes, oculis cōiuentes niſtant, hi fi poſtquam fanguis ipsis ex naribus fluxit, & vbi vomuerūt loquātur, & ad feipſos redeant, feruantur. Si verò hæc nō fiant, difficulter fpirantes facti breui moriuntur. Qui melius habuerunt, fi poſtridie exacerbentur, malum eft. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbentur, malum eft. Num & tales exacerbationes phreniticæ funt? Quibufcunq; definunt febres, non in diebus iudicatorijs, his recidiuæ funt. Qui in principio tenues, cum capitis pulſu, & vrina tenui, ad iudicationem acerbātur, his nihil miri eft fi & mētis emotio in fuperq; vi-

inguinis dolor

aph 4: 61.
pro. 5: 25

HIPPOCRATIS

gilia accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus turbulentus, quibusdam conuulsionem significat. Turbulentæ cum ferocia excitationes mentem emouentes, malæ sunt, itemq; conuulsoria, tum aliâ, tum cum sudoribus. Conuulsoria etiam videntur colli ac dorsi perfrigerationes, imò etiam torus corporis. In his mictiones sunt pelliculosæ. Deliria cum sopore, conuulsoria. Mentis emotiones modicè feroces, ferinæ sunt, sed & conuulsiones significant. In morbis longis, ventris præter rationem tumores, conuulsorij. Affectiones statim turbulentæ, vigilias inducentes, sanguinem de naribus stillantes, sexta die alleuantes per noctem, verum postridie rursus affligentes, exudâtes in somnum delatæ, mentem emouentes, largè sanguinem fundunt, & morbos soluunt. Aquosa vrina talia significat. Qui cum relatis, ab atra bile mēte moti, tremuli fiunt, maligne habēt. Delirium in spiritu & sudore, lethale est. Lethale est & in spiritu ac singultu. Insomnia in phrenitide euidētia bona sunt.

In phrenitide egestionē alui albæ, & torpor malum. Rigor his pessimus est. In phreniticis in principijs affectiones mansuetæ, ac frequenter transmutationē habentes, male sunt. Quibus ab atra bile mēte motis, tremores fiunt, malum est. Qui ab atra bile mēte moti, tremuli fiūt, ac saluā fundūt, nū sanè phrenitici sunt? Mente moti, acutè insuper febriētes phrenitici fiunt. Phrenitici parum bibentes, Arepitum valde percipientes, tremuli, aut conuulsi. In vehementer phreniticis, tremores lethales sunt. Deliria circa necessaria, pessima. Quæ ex his exacerbantur lethalia sunt. Mentis percussiones, voces clangorosæ, linguæ cōuulsiones tremulæ, & voces tremulæ fientes, mentē alienāt. Duricies in his perniciosa est. Prædebilitatorum deliria pessima. Affectiones in phreniticis frequenter transmutationem habentes, cōuulsoria, prauæ. Phrenitici cum perfrigeratione saluā fundentes, vomitum nigrum indicant. Qui variè agrotant, & frequenter soporosi mente mouentur, his nigrū vomitū expectandum esse dicito. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, stupefactoria sunt. Tumores iuxta aurem in morbis longis prauis sunt: Sanguinis fluxiones ac vertigines insuper apparentes, perniciosæ. Febres vertiginosæ, & cum voluulis, & sine voluulis, perniciosæ. Anhelosis febris postea acuta. Cum præcor

A præcordio intecto perfrigeratis, magnus circa aurem tumor.

Quibus in febre dolores circa lumbos & infernas partes fientes septū transversum contingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt, tum aliās, tum si aliud quoddam signum prauū accedat. Si verò alia signa nō fuerint praua, suppuratum fore timor est. *idem in*
Pueris febris acuta, & alius sup-
pressa, cum vigilijs, & calcitrare, & colorem mutare, & rubo-
rem habere, conuulsorium est. Affectiones statim turbulen-
 tæ, vigilias inducentes, & nigra cōpacta egerētes, partim san-
 guinē fundūt. Affectiones cū vigilijs & anxietudine repen-
 tina, sanguinē fundūt, tū aliās, tū si quid etiā antea, pfluxerit.
 Num & qui modicē perfrigerati postea horruerunt? At qui
 circa exacerbationes tussunt, & parum exudūt, malignē ha-
 bent.

B Ad latus dolore ac suffocatione accedente, hi suppu-
 rantur. Quibus in febribus cōtinuis pustulæ per totum cor-
pus erumpunt, lethale, si nō purulentus abscessus fiat, maxi-
mē autem circa aurem his fieri solet. In morbo acuto exter-
 nas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitire, malū
 est. Febres cōtinuæ per tertiam diē augescentes, periculosæ.

Quibus febris aliquādo intermittit, periculo vacat. In fe-
 bribus longis, aut tubercula, aut dolores, in articulis fiunt: &
 si facti fuerint, non sunt inutiles. Capitis dolor in morbo
 acuto, præcordium reuulsū, non profuente ex naribus san-
 guine, ad phrenitidem deuenit. *typhica*
Febres typhicæ, bilis sur-
sum ac deorsum effusione nō accedente, nō soluuntur. Mor-

C bus regius ante septimum diem accedens, malum. Septimo
 verò ac nono, & vndecimo ac decimoquarto, iudicatorius est
 si non præcordia induret: sin minus, ambigua res est. Fre-
 quentes per eadem recidiuæ, circa iudicationē sanguinolē-
 tæ, nigrorum vomitū faciunt, fiunt aurē & tremulæ. Dolo-
 res qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarū gene-
 ris morbū faciunt, & grumosum sanguinē egerūt. In febr-
 ibus secundum venam quæ est in collo, pullus ac dolor, in dy-
 senteriā desinit. Color qui sæpe in calore transmutatur, vti-
 lis est. In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cum præ-
 cordij intensione, iuxta aurē abscessum facit. Qui ex mor-
 bis longis se refocillātes bene cibū accipiunt, & nihil profi-
 ciunt, hi malignē recidiuā incidunt. Quibus in febribus ve-
 næ in tēporibus pullant, & facies sana est. & præcordium nō
 molle,

HIPPOCRATIS

molle, diuturnū morbum significat, & non desinentem: citra D
multi sanguinis ex naribus fluxum, aut singultum, aut cōul
sionem, aut coxendicum dolorem. In febre ardente si al
uus eruperit, mortale est. Ex alui dolore laborioso, febris
ardens, perniciosa. In febribus ardentibus si aurium soni
tus accedant, cum visus hebetudine, & grauitate secundū na
res, melancholico modo ab atra bile mente mouētur, sangui
ne ipsis non erumpēte. Tremores in febribus ardentibus,
mentis percussio soluit. In febre ardente fluxio sanguinis
ex naribus, quarta die, mala est, si nō aliud quid boni coinci
derit. Verū quinta minus periculosa est. Qui ex febribus
ardentibus aliquātulum perfrigerātibus, cum egestionibus
alui aquosis ac biliosis laborant, oculis malum est, tum aliās E
tum si stupidi fiant. Febris ardens rigore superaccedente
soluitur. Febres ardentes recidiuare solent, & vbi per dies
quatuor significationem de se prābuerunt, postea exudant.
Sin minus, septima die. Febres ardentes quatuordecim dies
dijudicant, aut alleuātes, aut perimentes. Ex febre arden
te, abscessu purulento circa aurem non fiēte, non valde ser
uantur. Letargici, tremuli ex manibus, somnolenti, discolo
res, tumidi, pulsibus tardi sunt, & partes sub oculis eleuatas
habent, & sudores insuper accedunt, & aluos biliosas, & intē
peratas subtumidas habent. Si verō obaridas habuerint, vri
nae & egestionēs alui latenter ipsis progrediuntur, vrina ve
lut iumentorum est, potum non expetunt, neque aliud quic
quam. Postquam verō resipuerint, collum dolorosum se ha
bere dicunt, & sonitus per aures transire. Qui verō ex le
thargicis seruantur, plerunq; pectore suppurati fiunt. F
Quibuscunque in febribus tremores circa iudicationem cessant,
his temporis progressu abscessus dolorosus suppuratus in ar
ticulos fit, & vesica dolorosa. Febrientibus quibus rubores
sunt in facie, & dolor capitis fortis, & venarū pullus, his san
guinis fluxio plerunq; contingit. Quibus autem cibi fasti
dia sunt, & oris vētriculi morsus, & multum saliuā, his vomī
tus fit. Quibus verō ructus adsunt, & flatūs, strepitus ac ele
uationes ventris, his fit alui exturbatio. Qui diutius se
cure ex febre continua laborant, citra dolorem aut inflam
mationem, aut aliam causam, his abscessus expectandus est
cū dolore ac tumore, & magis in infernis partibus. Expecta
re autem

Letargici
~~peruntur~~

Letargici
~~peruntur~~

~~peruntur~~

- A** re autem oportet abscessus, his magis qui trigessimū annum egrediuntur. & tunc expectare abscessus oportet, ubi viginti dies febris trāsmiserit. Senioribus autem minus fiunt, & ubi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo inuadentes, autumno maximè in quartanam leniter transeunt, & hoc magis his qui triginta annos exceſſerint. Abscessus autem hyeme magis fiunt, & tardiùs desinunt, & minùs recurrunt. Quibus verò saepe recidiua contigit, his si semestri tempus trāsmiserint, tabes coxendicum leniter accedit. Quaecunque signa febrī se opponunt, & non abscessus significationem habent, maligna sunt. Febres quæ neque in diebus iudicatorijs, neque post solutorium signum decesserunt, recidiuant. Acuti morbi in diebus quatuordecim iudicantur. Tertianā exquisita in quinque aut septem circuitibus, aut ad summū in nouem iudicatur. Quibus febrē incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiēte distillat, & vrina subsidentia albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat. Morbi acuti iudicantur, sanguine de naribus fluente, in die iudicatorio: & sudore multo fiēte, & vrina purulenta ac vitri formam referente, prodeunte & bonam subsidentiam habēte, & aceruatim exeunte: Abscessu item memorabili fiēte, & aluo mucosa & cruenta derepente egerente: & vomitibus non prauis fiētib; circa iudicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam iudicationem significant. Turbulenti verò cum dolore corporis, inconstantes sunt. Septima die, aut nona, aut decimaquarta, fluxiones sanguinis à naribus fiētes, plerumque febres soluunt: Similiter & alui fluxio biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet: & genuum ac coxendicum dolor: & vrina concocta ad iudicationem. In muliere verò etiā menstruæ purgationis fluxus. Quibus in febribus sanguis abūdè undecūq; profluxit, his in refectionibus à morbo alui humectantur. Qui in febribus exudant, caput dolentes aluo suppressa, conuulsi fiunt. Mentis emotiones modicè feroces, & ferinum, & conuulsionem significant. Conuulsio in febre fiens, & eadem die desinens, bona est. Conuulsio in febre fiens, sedat febrē eadem die, aut postera, aut tertia. Si verò tempus in quo inceptit, transgrediatur, & non desinat, malum est. Febres intermittētes, verū inæqualiter caleſcentes,

~~abscessus~~morborum
forma iudicatoria

somni

significatio
de
iudicatione
significatio
et 43

HIPPOCRATIS

tes, aluo inflata, pauca egerente, in his post iudicationē lum- **D**
 borum dolore sequuto, alui erumpunt. At amburētes ad ma-
 num, torpidæ, siticulosæ, anxiosæ, in his aluo suppressa gra-
 uati exoluuntur. Quandoque verò & rubicundæ in pedibus
 ambustiones, eadē significant. Hybernæ febres quartanæ,
 leniter in acutos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax
 cum febre acuta, & alio signo maligno, lethale est. Cæterum
 sine signo malo, transgrediens vigesimū diem, sanguinis aut
 puris fluxū ē naribus, aut abscessus ad infernas partes signi-
 ficat: fluxiones quidē iunioribus trigintaquinque annis, se-
 nioribus verò, abscessus. Si verò circa frontē ac tempora fue-
 rit dolor ille pertinax, fluxiones. Quibus capitis sunt dolo-
 res, & sonitus aurium, citra febrem & vertigo, & vocis tarditas, **E**
 & manuum torpor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut
 obliuiosos fore expecta. Qui caput dolent, stupore corre-
 pti, delirantes, aluo suppressa, oculo ferociente, florulenti, hi
 in posteriorem partem conuelluntur. Capitis succussiones;
 oculi rubicundi, mente manifestē emouentes, perniciosæ
 sunt. Non commoriuntur hæc, sed circa aurem tumorem fa-
 ciunt. Capitis dolor, cum sedis & pudendorū dolore, & tor-
 pore, & impotentiā inducit, & vocem resoluit. Hæc hor-
 rendæ non sunt, verū somnolenti ac singlutientes fiunt no-
 no mense: ex quibus soluta voce, in idem restituntur. Qui
 in capitis dolore ascaridas habent, his surditas & sopor con-
 sequens, abscessus circa aurem excuscat. Qui caput dolent,
 stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundum habentes, **F**
 sanguinem effundunt. Capitis concussiones, & aurium so-
 nitus sanguinem effundunt: aut mulieri menses deducunt,
 tum aliās, tum si iuxta spinā ardor consequatur: fortassis au-
 tem dysentericis fluxiones. Capite grauati, iuxta sinciput
 dolentes, vigilijs infestati, sanguinem effundunt, tum aliās,
 tum si quid ad collum se extendat. Vomitus in capitis do-
 loribus æruginosi, cū surditate, vigilantribus, cito insanīā ex-
 citant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corporis
 tremula quxdā impotētia, sanguinis eruptio soluit. Quin
 & tēpore hæc soluuntur. Verū vesicæ in hoc supprimuntur.
 In acutis capitis doloribus, & in torpidis cum grauitate,
 conuulsionēs fieri solent. Capitis dolorē soluit pus per na-
 res, aut sputa crassa, & non olentia. Soluit item vlcerum eru-
 ptio

A ptio. Quādoq; & somnus, & alui fluxus. Capitis dolor moderatus, cum siti cibum capiente, aut cū sudore nō solvente febrem, abscessus in gingiuis, aut circa aurē significat, aluo non exturbata. Capitis dolor soporosus cum grauitate, conuulsorium quid facit. Caput dolentes, siticulosi, aliquatenus vigilantes, obscuri cognitu, impotentes, ex aluo liquida delassati, num mente mouentur? Caput dolentes, surdastri, manibus tremuli, collum dolentes, mingētes nigra condensata, vomentes nigra, perniciosē habent. Caput dolētes, exudantes, aluum suppressam habentes, conuulsioni obnoxij sunt.

Sopor vbique malus est. Soporosi in principijs sientes, cum capitis lumborum, colli prae cordij dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tū aliās, tum quarto ab initio die. Malum est etiam alui profluuium valde rubicundum. Soporosi ab initio exudantes, vrinis concoctis ardentes, verū citra iudicationem perfrigescentes, & breui rursus ardente, torpidi, soporosi, conuulsi, perniciosē habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciosi sunt. Soporosis delassatis, surdis factis, aluo erumpente si rubicunda egesta fuerint circa iudicationem profunt. Soporosi, anxiosi, prae cordium dolentes, parū vomentes, abscessus iuxta aurem habent. Antea verò circa faciem tumores cum sopore. Morbi derepentē mentem percellentes cum anxietudine, sanguinem profundunt. Soporosa, anxiosa, dolorosa prae cordia, frequēter parū spuētia. Tumores circa aurem habent. Soporosi, num aliquid conuulsorij habent? Affectiones soporosa, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, prae cordia variantia, & ventrem tumidum habentes, cibū fastidientes, aluo suppressa exudantes, num his turbidus spiritus, & geniture simile quid pertrāsens, singultū significat? Nū & aluus biliosa insuper egerit? Splendidū in his mictum prodest. Ventres quoq; his insuper turbantur. Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septem moriūtur. Has verò si effugerint seruātur. Quibus aut ex his resectis os disparatū repertū fuerit, hi pereunt. Caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habentibus, fluxio ē nare larga crassa, mala est: Hi vbi oculum antea doluerint, rigent. Num & iuxta tempora ossium disruptiones conuulsoriz sunt? Auris dolor pertinax, cū febre acuta, & alio quodam

idem. 324.
c. 17. 17. 17.

HIPPOCRATIS

Auris dam signo aliquantū maligno, iuuenes quidem septima die D
occidit, & citius delirio correptos, si nō multum pus effluxe-
rit ex aure, aut sanguis ē naribus, neque aliud quoddam bo-
num signum compareat. Seniores autem tardius, & minus
tollic. Nā & aures suppuratōne prāueniunt, & minus deli-
rant. Verū multi ex his recidiuant, atq; sic pereunt. Surditas
in acutis ac turbulentis consequēs, malum. Malum etiā in lō
gis. In his autē dolores etiam ad coxas deducit. In febribus
surditas, aluum sistit. Aures frigide, & pellucidæ, & contra-
ctæ, perniciosæ. Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, le-
thale. Sonitus aurium, cum visus hebetudine, & narium gra-
uedine, mentem euomet, & sanguinem profundit. Quibus
surditas cum capitis grauitate, & præcordij intentione, & ad E
splendorem turbatio, sanguinem profundit. In febre acuta
aures obsurdescere, furiosum est. Valde surdi, in accipien-
do tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. Accedente
ægritudine surditas, & vrina subrubicunda subsidentiā nō
habens, sed id quod in medio innatat, mentē euomet. Mor-
bo regio corripī, in his malū est. Mala est & ex morbo regio
satuitas. Hos voce priuari, sentientes tamē esse cōtingit. For-
tassis autem & alius malē his afficitur. Quæ circa autē do-
lorose excitantur, perniciosæ sunt. Rubores circa aurem ex
progresso dolore, in febribus fiētes, signum quidem sunt e-
rysipelātis in facie futuri. Sed & cōuulsiones ex talibus fiūt,
cum vocis interceptione ac exolutione. Tumores circa aurē
ex plurimis graueolentibus cum febre acuta, & præcordio F
intento, tardius excitati, occidunt. Tumores circa aurem
leuiter syderatis, mali. Tumores circa aurem in longis mor-
bis non suppurātes, lethales. Aliuero his deorsum feruntur.
Num quibus abscessus sunt iuxta aures, caput dolēt? Num
& supernis partibus exudant: Num & insuper rigent? Num
& alui erumpunt, & quid soporosum habent? Num & aquo-
sa est vrina, alba innatantia habens, & aliquantum varia,
exalbida, graueolentia. Abscessus iuxta aurem submouent
tussiculę cum sputationibus fiētes. Vrinę in abscessibus re-
trō aures citō & modicē maturescentes, malæ sunt. & sic
perfrigerari, malum est. Abscessus circa aurem in morbis
diuturnis suppurati, non valde albo & inodoro pure, occi-
dunt, & maximē mulieres. Abscessus iuxta aurem, ex acu-
tis

A tis morbis maximè in febribus ardentibus fiunt : & si non iudicationem fecerint , & maturescant , aut ex naribus sanguis fluxerit , aut vrinæ subsidetiam crassam habuerint , ægri pereunt. Pleriq; verò talium tumorum antea propulsantur. Verùm considerare oportet insuper etiam ipsas febres , siue augeantur , siue remittant , atque sic pronunciare. Ex surditate ac torpore , de naribus aliquid destillare , difficultatis aliquid habet. Vomitus his conueniet , & alui turbatio. Ex surditate leniter abscessus iuxta aures fiunt , tum aliàs , tum si quid nausæ accedat. Sed & soporosis ex his , etiam magis abscessus ad aurem fiunt. Surditatem ex febribus , sanguinis è naribus fluxio soluit : itemq; alui turbatio. *facies*

B ex tumida humiliatur , & vox leuior ac debilior fiens , & spiritus rarior ac leuior , remissionem in sequentem diem significat. Faciei corruptio , lethalis. Verùm minus , si propter vigilias , aut famem , aut alui exturbationem fiat : Et si id quod propter hæc corruptum est , sedetur per diem ac noctem. Talis autem fuerit , oculi caui , nasus acutus , tempora collapsa , aures frigide ac contractæ , cutis dura , color pallidus aut niger. Liuescens verò ex his palpebra , aut labium , aut nasus , breui lethale est. Faciei bonus color , & toruitas , in morbo acuto malum est. Frontis ex his contractio , phrenitidis signum est. Circa faciem color bonus , & sudores non febrientibus stercora vetusta subesse significat , aut victus rationem inordinatam. Rubores circa nasum , alui humesceris signa sunt.

C Dolores circa præcordia aut pulmonem si suppurentur , malum est. Oculorum puritas , & albas ipsorum partes , ex nigris aut liuidis puras fieri , iudicatorium est. Si igitur citò purgentur , celerem iudicationem significat , Si tardè , tardiorum. Caligo oculorum , aut si alba ipsorum pars rubescat , aut liuescat , aut venulis nigris impleatur , bonum non est.

Malum est etiam lucis splendorem fugere , aut lachrymari , aut distorqueri. Et alterum minorem fieri , malum est : & oculos frequenter agitare , ac iactare , aut paruas lemas acordes circa ipsos , aut concretionem tenuem albicantem habere : aut albam partem maiorem fieri , nigram verò minorem : aut nigram sub palpebram supernam occultari. Mala est etiam oculorum cavititas , & expressio valde foras , & splendoris extritio , vt pupilla extendi non possit. Et extremitatum

oculorum consideratio

idem. 401

HIPPOCRATIS

palpebrarum curvitas, & oculi fixi, & assiduè niſtare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendum nō committere, pernicioſum eſt. Malus eſt & oculus peruerſus. Oculorū rubor in febre ſiens, alui diuturnā malignam affectionem ſignificat. Circa oculos puſtularum eruptiones in virium reſectionibus, aluum prorumpere faciunt. In oculorum diſtortione febrici, laſſato, rigor pernicioſus: & ſoporofi in his malè habent. *Febris liq*
ntibz bona Viro lippienti, febre ſuperueniente, ſolutio. Sin minus, periculum eſt ne cæcus fiat, aut pereat, aut utrūq.

Quibus lippientibus capitis dolor accedit, & ad multum tempus concomitatur, periculum eſt ne cæci fiant. Lippiēti alui profluuium ſua ſponte prodiens vtile eſt. Oculorum obſcuratio, & oculus fixus, caliginofus, malum. Oculorum obſcuratio, cum animi deliquio, breui cōuulſionem inducit. E

Oculorum reſtitudo in morbo acuto, & motus velox, & ſomnus turbulentus, & vigiliæ, & quandoq; ſanguis è naribus ſtillationes, nihil boni. Qui febres ad tactum non adurentes habent, phrenitici ſiunt: & magis ſi ſanguis fluxerit.

Lingua quę in principio quidem inhorruit, in colore verò permanet: progreſſu autem temporis exaſperatur, & liueſcit & rumpitur, lethalis eſt. Si verò valde nigreſcat, in quartadeſima die iudicationem fore ſignificat. Periculoſiſſima autē eſt nigra, & cum virore pallida. Linguam circa biſfidam ſuā partem, velut ſaliua alba abduci, febris remiſſionis ſignum eſt, ſi quidem id quod ſuperinductum eſt, craſſum fuerit, eadem die. Si verò tenuius, poſttridie. Si verò adhuc tenuius, tertia die. Eadem ſignificāt etiam huiuſmodi, ſi circa ſummam linguam fiant, verū minus. Lingua tremula cum rubore iuxta naſum, & aluo liquida, ſi reliqua ſine ſignis ſint circa pulmonē, malū eſt, & celeres purgationes, pernicioſas ſignificat. Lingua citra rationē tenera ſiens, & cum cibi ſaſtidio nauſeabunda, cum frigido ſudore, ex aluo liquida, nigrorum vomituum, ſignum eſt: laſſitudo in his mala eſt. Lingue tremulæ quibuſdam etiam aluum liquidum quandoque faciūt. Denigratæ verò in his, celerem mortem ſignificant. Num lingua tremula mentem non firmā ſignificat? Linguae aſperæ & reſiccatae, phreniticae ſunt. Dentes collidere aut ſtridere, quibus non familiare, id eſt à pueris, furioſum ac lethale eſt: iam verò delyrās ſi hoc faciat, penitus lethale eſt. Per-
nicio

A niciosum autē est & resiccare dentes. Dentis corruptio abscissum circa gingiuā factum soluit. Ex dentis corruptione, vehemens febris superaccedens, & delirium, lethale est. Si verò seruentur, vlcera suppurabunt, & ossa discedent. Quibus circa palatū humoris collectio sit, plerūque suppuratur.

Dolores vehementes circa maxillas, periculum est ne ad ossis educationē deueniant. Labium contractum, alui biliosae eruptionem significat. Sanguis de gingiuis, ex aluo liquidus perniciosus. Sputi excreationes in febre, liuidae, nigrae, biliosae, si quidem supprimantur malae sunt, secedentes verò pro ratione, vtilis. Quibus sanguinolenta sputa, ac tussis supprimuntur, his corpus velut à pustulis rubescit. Verum ante

B obitum exasperatur. Scretio frequēs, si sanè & aliud quoddam signū affuerit, phenitidē indicat. Vocis interceptiones cum exolutione, pessimae. Modicæ feroces mentis emotiones, malae & ferinae sunt. Quibus vox cum febre deficit, & cum iudicatione intercepta, tremuli moriuntur. Vocis interceptiones in febre convulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio deueniunt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducunt. Vocis interceptiones cum exolutione stupefactorio modo, perniciosae sunt.

Voces contractae post inedicamēti sumptionem, num pravae sunt. Plerique horū exudant, & ventres humectos habent.

In vocis interceptione spiritus, velut his qui stragulantur, praemanibus expositus, malus est. Num & mentem emouet?

C Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, febricitantes cum sudore laxantur in seipsos, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes. his insuper rigere, malum non est. Mentis emotiones cum vocis interceptione, perniciosae. Vocis interceptiones insuper rigentibus, lethales. Tales autē leniter caput dolent. Vocis interceptiones cum exolutione, in febre acuta sine sudore, sunt quidem lethales, minus verò quam cum sudore. Verum diurnitatem temporis significat. fortassis autē & qui ex recidiva tale quid patiuntur, tutissimi sunt. Perniciosissime autē ex talibus habet quibus sanguis ex naribus fluit, & quibus alui humectantur. Vox acuta, planctum referens, & oculorum obscuratio, convulsorium est. Dolores his ad infernas partes, toleratu faciles sunt. Cum voce tremula, solutio alui praeter rationē, in his moram trahentibus diuturnis, perniciosa

HIPPOCRATIS

Spiritus

est. Frequentes subſoporataꝝ vocis interceptiones conſiſten- D
tes, tabem præſignant. Spiritus qui denſus quidem & par-
uus eſt, inflammationē & dolorē in locis principalibus ſigni-
ficat. Magnus autē & per multū tempus delirium aut con-
uulſionem. Et frigidus quidē lethalis eſt, lethalis autē eſt &
febriculofus & fuliginofus. Verūm minus quā̃m frigidus. &
qui magnus foras exſpiratur, paruus verò intro: & paruus fo-
ras, magnus verò intro, peſſimus ſanē eſt, & morti propin-
quus. Itemq; extendens, & vrgens, & obſcurus, & dupla intro
reuocatio, veluti ſuperinſpirantibus. Bona autem ſpiratio, in
omnibus morbis qui cum febre acuta ſunt, & in quadragin-
ta diebus iudicantur, magnū momentum ad ſalutem habet.

Fauces

Collum durum & doloroſum, & maxillarū colligatio, & E
venarū iugularium palpitatio fortis, & tendinum diſtentio,
perniciouſum. Dolores in faucibus gracilibus ſtrangulato-
rij, à capitis dolore originē trahentes, conuulſorij ſunt. Fri-
giditates colli ac dorſi apparētes, Sed & totius corporis con-
uulſoria, in his miſtiones ſiunt craſſiorē farinam referentes.

Quibus circa fauces irritamēta ſunt, hiſ tumores circa au-
rem leniter erumpunt. Fauces doloroſæ, graciles, cum agrē
tolerabili moleſtia, pernicioſæ acutæ ſunt. Quibus ſpiritus
retrahitur, & vox ſtrangulatoria eſt. & vertebra intro conſi-
det, hiſ in fine velut cōtrahente quodam ſpiritus ſit. Fauces
modicē exaſperatæ, & aluus vanis conatibus nitens, frontis
dolores, ægri palpando cōtreſtantes, doloroſi: quæ ex hiſ au-
geſcunt, difficilia ſunt. Dolores fortes circa fauces, tumores E
circa aurē, & conuulſiones efficiunt. Colli item ac dorſi dolo-
res. Cum febre acuta cōuulſiones pernicioſæ. Colli & cu-
bitorum dolores, conuulſorij. A facie autem hi, & ſecundum
fauces. Pallidi, graciles, ſaliuam ſputantes. In hiſ in ſomniſ
ſudores boni ſunt. Num & ſudore leuari, plurimis non malū
eſt? Dolores ad infernas partes hiſ toleratu faciles ſunt. In
dorſi ac pectoris dolore, miſtio cruenta ſuppreſſa, pernicioſa
eſt doloroſe. Colli dolor malum quidē in omni febre, peſ-
ſimum autē hiſ quibus timor eſt vt etjam inſaniant. In pe-
ctoris dolore febriculofa, aluus turbata, torpida, nigrarum
egeſtionū ſigna ſunt. Dolores parui in acutis iuxta fauces
graciles, in gracili vbi hiarit, nō facilē os contrahente, men-
tem emouent. Ex hiſ phrenitici pernicioſe habent. Fauces
exulcer

A exulcerata in febre, cū alio signo ex his quæ difficilia sunt, periculosa sunt. In febribus dērepente suffocari, & deglutire non posse, citra tumorem, malum est. Collum conuertere non posse, neque deglutire, vt plurimū lethale est.

Præcordium

Præcordium molle esse conuenit, & doloris exors, & æquale. At inflammatum, aut inæqualiter se habens, aut dolens, signum est ægritudinis non leuis. Tumor verò in præcordijs durus & dolorosus, pessimus quidem est, si iuxta omnes partes fuerit. Ex his autem qui ab vna parte sunt, minus periculosus est qui à sinistris est. Significant autē in principio quidem tales, mortē citam. Si verò viginti dies transmittant, febre manente, suppurationem. Contingit autē his in primo

B circuitu, etiam sanguinis eruptio e naribus, & valde prodest. Plerunq; enim hi caput dolēt, & visus obscuratur, & magis in his sanguinis eruptionē affore expecta. In ætatibus autē annorum trigintaquinq;. Senioribus verò minus. At verò molles & doloris exortes tumores, diuturniores iudicationes faciunt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies transgredientes, febre manente, suppurantur. Consimilia verò significant & tumores circa ventrē, his qui sunt in præcordijs. Verū minus suppurātur hi quā illi. Minimē verò qui sub vmbilico consistunt. & fiunt etiā hi quidē in tunica, illi verò sursum diffusi. Lethales autem sunt ex ipsis, quicunq; intro rupti fuerint. ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidē foras rumpuntur, optimum est vt in breuissimā & acutissimā

C molem colligantur: quæ verò intro, vt neq; mole, neque dolore, neq; colore, foris se manifestas faciant. Contrariū autē pessimum est. Quædā verò ex his propter puris crassitudinē, nullam de se significationē præbent. Porro recentes in præcordijs tumores, si non cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis soluit murmur in præcordio obortū, & maximē quidē si pertrāsierit per vrinas, & alui egestionem. Sin minus si etiam ipsum pertransierit. Prodest autē & si subdescēderit ad infernos locos. ~~Pulsus~~ Pulsus in præcordio cū tumultu, mentis emotorius est, & magis si oculi frequēter moueantur. Oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, febre perfrigerata malum, tum aliās, tum si insuper exudarint. Dolores ad præcordium irruentes, tū aliās mali sunt, tum si aluos humectēt. Peiores autē sunt, si breui fiant. & tumores circa aurē ex his

HIPPOCRATIS

emergētes, maligni sunt, & aliz suppuraciones. Oris vētri- D
culi dolores cū tormine vētris animalcula erūpere faciunt.

Oris ventriculi dolor seniorē frequenter impetens, mor-
tem repentinā significat. Quibus præcordia eleuantur, al-
uo suppressa, malū est, maxime autē in morbis tabidis, lōgis.
& quibus alui humectantur, in præcordio inflāmatio suppu-
ratoria est, quibus ante mortem nigra per aluum subeunt.

Præcordiorū distētio cum sopore anxioso, in caput dolen-
te abscessus circa aurem attollit. Post præcordiorū tumo-
rē, biliosis spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa au-
rem attollit. In dolore præcordiorum submurmurāti, lum-
borum dolor superaccedēs in febribus, ventres vt plurimū
humectat, si non flatus eruperit, aut vrinæ copia prodierit. E

Ex præcordio diutinē afflicto, & aluo graecolenti, absces-
sus circa aurem, occidit. Quibus à præcordiorū doloribus,
aluus paulatim subuiscosa egerens, pauca stercoracea effun-
dit, num etiam sanguinē effundit? Quibus derepente dum
sine febre sunt, præcordij & oris vētriculi dolor, & circa cru-
ra, ac infernas partes, & aluus in tumorem eleuata est: soluit
venæ sectio, & alui fluxio. His febrile nocuum est. Longe e-
nim & vehementes febres fiunt, & tusses, & spiritus & singul-
tus fiunt. His autem ad solutionem tendentibus, dolor fortis
coxarum, aut crurum, aut puris sputum, aut oculorum priua-
tio succedit. Quibus dolores præcordiorum, oris ventricu-
li, hepatis, partium circa vmbilicum, hi sanguine per aluum
egesto, seruantur: non autē egesto, moriuntur. Quibus præ- F
cordia non mollia, facies sana, nō liberantur citra multi san-
guinis ex naribus fluxum, aut conuulsionem, aut coxædicum
dolorē. Dolores ad præcordia in febre. voce intercepta, si-
ne sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores fiūt.

Iuxta ventrem in febre palpitaciones, mentis emotiones
inducunt, Sanguinis autem fluxio horrorem efficit. Dolo-
res in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, mali-
gni sunt. His ad coxendices dolores fiunt, & ipsi vnā cum fe-
bre ardente, aluus deorsum erumpēs, perniciosum est. Do-
lores circa vmbilicum palpitatorii, habēt quidem & aliquid
mentis emotorium, verū circa iudicationem pituita his a-
ceruatim copioso cum dolore penetrat. Post aluum supres-
sam, præcordia subleuata in tumorem, mala sunt, maxime
tabescen

A tabescentibus iam diu, & quibus alui humectantur. Anxietatem in prae cordio sentientibus, tumores circa aurem oborti, ipsos occidunt. Duricies circa ventrem cum dolore, in febrientibus cum horrore, cibum auersantibus, si alio insuper parum humectata, purgationem non faciant, ad suppurationem peruenient. Dolor supra umbilicum, & lumborum dolor, si medicamentis non soluantur, in hydropem siccum desinunt. Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbantur, grumosum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis sanguinis fluxionem inducunt. Ex lumborum dolore sanguinis fluxiones largæ fiunt. Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, & manus torpidæ, & oris ventriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis largè profluet. Sed & alui his deorsum erumpit, & mens turbata est ut plurimum. Ex dorsi dolore ægritudinis principia difficilia sunt. In lumborum dolore pertinaci, & ampliore alui subductione, à veratro vomere spumosa multa prodest. Spinæ distortionem ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio soluit. In lumbis dolentibus oris ventriculi dolores insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiam prægressæ. Affectiones ex lumbis ad collum & caput transeuntes levis siderationis modo resoluentes, conuulsoriæ, mentis emotoriæ sunt. Num tales etiam soluuntur conuulsionibus? Aut taliû alui ægrotant per eadem prodeuntia? Ex lumborum doloris recurso, oculorum distortio, malum. Dolor in pectus firmatus torpore, malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborum dolore recursiones ad os ventriculi febriculosæ, horrorem inducentes: Sic affecti reuomentes tenuia aquosa, mente moti, voce destituti, nigro rum vomitu facto moriuntur. Diuturni circa lumbos, & tenuie intestinum dolores, & ad præcordia dolores, si ægri cibos auersentur vnà cum febre, his dolor intentus ad caput progressus, repente ipsos occidit conuulsorio modo. Quibus lumborum dolor est, hi male habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tibijs in rigore? Num lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, non vomentibus, modicè ferociter mente motis, spes est nigra proditura esse? Lumborum dolor in ventriculi os dolente, cum excreatione violenta, habet quid conuulsorium. Rigor vnà cum indicatione alt-

Lumbi

HIPPOCRATIS

quatenus horrendus est. Lumborum dolor sine causa ma- **D**
nifesta sæpe impetens, maligni morbi signum est. Lumbo-
rum dolor cum sopore anxioso, malus est. Lumborum di-
stentio ex muliebrium mēsum multitudine, ad suppurationem
tendit. & variè prodeuntes viscosi, graueolentes, stran-
gulatorij menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt.
Arbitror autem tales etiam aliquantum delirare. Quibus
lumborum dolor, & lateris, sine causa manifesta, hi regium
morbum incurrunt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptio-
nibus in diebus iudicatorijs vehementes, pessimæ sunt.

*Sanguinis
xio*

Vice versa sanguinem erumpere, malum est. velut in sple-
ne magno ex dextris. & circa præcordia eodem modo se res
habet. Vulnere sanguinem fundentia, insuper rigentia, ma- **E**
ligna. Sic affecti loquentes latenter moriuntur. Affectio-
nes quæ quinta die sanguinem large fundunt, sexta insuper
riguerunt, septima perfrigeratæ fuerunt, & repente recalefa-
ctæ, in his alui malè afficiuntur. Post sanguinis eruptionem,
nigrorum per aluum egestio, mala. Mala autem sunt & rubi-
cunda valde & æruginosa. Quarta die tales fiunt sanguinis
eruptiones. Soporosi ex talibus conuulsi moriuntur, nigris
prægressis, & ventre tumefacto. Post sanguinis eruptiones,
& nigrorum egestionem, in acuto surditas, malum. Sanguinis
egestio his perniciosa. Surditas autem soluit. Quibus san-
guinis eruptiones plures, his temporis progressu alui malè
afficiuntur, si non vrina concocta prodierit. Num & aquosa
vrina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione **F**
larga frequenti, multa sit alui cum nigris egestio, ea autem
suppressa, sanguinis fluxiones: hi aluum dolēt. vnà verò cum
quibusdā flatibus, facile tolerant. Num tales multis frigidis
sudoribus exudant. Conturbata in his vrina, mala non est:
neq; id quod genituræ simile in ipsa residet, verum plerunq;
hi aquosa mingunt. Quibus de naribus in surditate ac tor-
pore pauca destillant, habent quid difficultatis. Vomitus
his conducit, & alui perturbatio. Magnæ in principijs san-
guinis eruptiones, circa resectionem aluos humectant. Flu-
xiones ex naribus largæ, per vim suppressæ, quandoq; con-
uulsionem prouocant. Venæ sectio soluit. Vndecima die
fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum aliàs, tum si
bis superstillauerint, & rursus stillauerint. In sanguinis flu-
xione

A xione multa, aut singultus, aut conuulsio, mala est. In his qui decolores vsque ad septem annos vires recolligunt & spiritus in vijs aceruatus, & terræ cōcupiscentia, sanguinis corruptionem ac exolutionē significat. In morbis longis coruæ comparentes sanguinis fluxiones, perniciosæ sunt. Vertigines ab initio sanguinis narium fluxio soluit. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus perfrigescētia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida, mala est. Qui aluo suppressa sanguinem effundunt, & vna cum sanguinis effusione insuper rigent, his aluum velut ex intestinorum leuore lubricam hæc faciunt, itemq; durât, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones statis temporibus fientes, siticulosæ, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi mortem inducunt. Ex hæmorrhoidæ parum apparente, vertigines obortæ, paruam ac modicam siderationē significant, soluit venæ sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitantes per totum, num etiam voce intercepta moriuntur? Tremores conuulsorii fiētes in sudoribus reuerti solent. Iudicatio his fit, vbi super-riguerint. Superrigent autem hi ardore circa ventrem prouocati. Somnus multus in his conuulsorius, & ad frontē grauitates, & mictio difficilis. Conuulsiones antea non cognitæ in strangulatis ab vtero, faciles sunt. Conuulsoria sine sudore spūta defluentia in febriēte, lenia sunt, His insuper alui aliquantum humectantur. fortassis autem & ad articulos aliquid abscedet. Quibus conuulsi oculi intente relucēt, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, cum stuporis detētionē, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parui iuxta aurem tumores conuulsionem significant, aluo male affecta. Conuulsiones & tetanicas distentiones febris accedens soluit.

Conuulsio ex vulnere lethalis est. Conuulsio in febre fiens, perniciosa est. Minimè verò pueris. Seniores septem annis in febre nō corripiuntur conuulsione. Sin minus, perniciosum est. Conuulsionem soluit febris superueniens acuta, quæ prius non fuit. Si verò fuit prius, iam exacerbata. Prodest & vrinæ transitus vitri speciem referens, copiosus, & alui fluxus, & somni. At repentinas cōuulsiones soluit febris, alui fluxus. In conuulsionibus vocis interceptio diu durans,

conuulsio

5 61 427

HIPPOCRATIS

mala est: parua autem, aut linguæ siderationem, aut brachij, D
 aut dextrarum partium significat. Soluitur autē vrinis mul-
 tis aceruatis derepentē prodeuntibus. Sudores autem paula-
 tim fientes profunt, Aceruati verò, itemque sanguinis detra-
 ctiones aceruatae laedunt. In distentionibus & ante & re-
 tro fientibus, & in tergū solū cōingentibus, si maxille soluā-
 tur lethale est. Lethale est etiam sudare in distētionē in dor-
 sum fiente, & corpus dissolui, & in eadē affectione reuomere
 per nares, aut clamare, aut nugari, si ab initio vox intercepta
 fuit. In posteram enim diem mortem significat. Febriles in
 dorsum distentiones, vrinæ genituræ similes solvunt. An-
 ginae quæ neque in collo, neque in faucibus, quicquam con-
 spicuum faciunt, verū suffocationem vehementem ac spi- E
 randi difficultatem inducunt, eadem die & tertia occidunt.
 Quæ verò tumores & ruborem in collo accipiunt, in cæteris
 quidem consimiles sunt, verū diuturniores. Quibuscunque
verò & fauces, & ceruix, & pectus, simul rubuerint, diutur-
niores sunt, & ex ipsis maxime seruantur, si non recurrerint
rubores. Si verò dissipentur, neque tuberculo foras conuerso
ac collecto, neque pure leniter ac sine dolore exsereato, ne-
que in diebus iudicatorijs, perniciosæ sunt. Num etiam sup-
purati fiunt? Securissimum autem est ruborem & abscessus
quàm maxime foras verti. Erysipelas verò foris quidem ac-
cedere, commodum est, intro autem conuertere, lethale. Con-
uertitur autem intro, quum disparente rubore pectus grauatur,
& difficilem spirationem habet. Quibus verò anginae ad F
pulmonem vertuntur, partim in septem diebus pereunt, par-
tim euadentes suppurati fiunt, si non eductio pituitosa fur-
sum ipsis fiat. Quibus per pulsationis venarum vehemen-
tiam, sterus derepentē per aluum secedit, lethale est. In an-
ginis sputa gracilium subarida malum. Anginosi in linguis
tumores, circa signa disparentes, perniciosi: & dolores dispa-
rentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. In angini-
nis qui non breui concocta exspuunt, perniciose habent. In
angina dolores ad caput, citra notas, cum febre, perniciosi.
In angina dolores ad crura, citra notas, cum febre, pernicio-
si. Ex anginis citra indicationem præcordij dolor, cum
impotentia ac torpore fiens, occidit occulte, etiam si valde
mansuetè se habere putent. Ex anginosis citra notas at-
 nuatis,

Angina

Anuatis, dolor ad pectus & ad aluum progressus concitatus, pus egerere facit, aliàs autem eius qui exoluitur tale est. In anginis omnia perniciofa sunt, quæ non manifestū dolorem faciunt. Sed & ad crura dolores diurni procedunt, & difficulter suppurantur. Ex angina sputa viscosa, crassa, valde alba, quæ violenter educuntur, mala sunt. Et omnis eiusmodi maturatio, mala. Purgatio multa deorsum, tales levis siderationis modo perimit. Ex angina, subarida frequentia sputa, cum tussi, lateris dolorem inducentia, perniciofa: itemq; ea quæ inter potandum per tussim subemergunt: & deglutitio violenta, mala. Pleuritici quibus in principio sputationes penitus purulentæ sunt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si verò has effugerint, non multo melius habentes, septima, aut nona, aut vndecima suppurari incipiunt. Quibus supra aurem rubor, & similiter veluti pleuritici calescunt, & aluus biliosis ac graueolētibus exturbatur, hi vigesima ac quadragesima die periclitantur. Vbi verò has effugerint, seruantur.

pleuritis

Pleuritides sicca ac sine sputo difficilimæ sunt. Horrendæ quoq; hæ in quibus dolores supernè sunt. Pleuritides sine cōuulsionibus, grauiores sunt his quæ cū cōuulsionibus sūt.

Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa fit, hi septima die iudicantur. Quibus autem tertia aut quarta die, circa nonam. Bulla subliuida fiente in lingua, in principio, qualis est ferri tincti in oleum, difficilior solutio contingit: & iudicatio quidem ad decimumquartū diem peruenit, sanguinem autem plerunque spuunt. Spurum in pleuriticis tertia die maturari ac exspui incipiens, citiores solutiones facit: verum posterius, tardiores. In doloribus pleuriticorum commodum est aluum molliri, sputa colorari, strepitus in pectore non fieri, vrinam bene procedere. His autem contraria, difficilia sunt: itemq; sputū dulce fieri. Biliosæ simul & sanguinæ pleuritides, plerunque nona aut vndecima die iudicantur, & maxime sanantur. Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles sunt, quinta verò aut sexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimā perueniunt, & non valde seruantur. periclitatur autem maxime septima die ac duodecima. Vbi verò bis septem dies effugerint, seruatur. Quibus pleuriticis strepitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi regij colore infectus, ac caligi

HIPPOCRATIS

caliginosus, hi pereunt. Qui ex pleuritide suppurati sunt, D
in quadraginta à ruptione diebus expuunt. Sputum in om-
nibus pleuriticis ac peripneumoniacis facile ac cito expui
conuenit, & flauum sputo ammixtum esse. Quod verò longè
post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam
tussim inducens, malum est. Prauum autem penitus est fla-
uum meracum, & viscosum, & album, & rotundum, & cū vi-
rore pallidum valde, & spumofum, & liuidum, & ærugino-
sum. Reius autem aliquanto est id quod ita meracum est, vt
nigrū appareat. At sanguine non multo permixtum flauum,
in principio quidem salutare est, septima verò die, aut po-
sterius, minus tutum. Sanguineum verò valde, aut liuidum,
statim in principio periculosum est. Praua sunt etiam sputa, E
spumosa, & flaua, & nigra, & æruginea ac viscosa, & quæcū-
que cito colorantur. At mucosa ac fuliginosa, & cito coloran-
tur, & securiora sunt. Quæ verò intra quintum diem ad co-
ctionem colorantur, meliora sunt. Omne porro sputum non
soluens dolorem, malum est: soluens autem, bonum. Quicun-
que verò cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut
permixtum, plerunque decimaquarta die moriuntur, si non
mali aut boni quippiam ex præscriptis superueniat. Sin mi-
nus, pro ratione, maximè autem his quibus eiusmodi pus se-
ptima die incipit. Bonū verò est & in his & in omnibus cir-
ca pulmonē morbis, facile ferre morbū, à dolore liberatū es-
se, sputum facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totū
corpus æqualiter calefcere, ac molle esse. Et ad hæc somnos, F
sudores, vrinas, alui egestiones, bonas esse. Mala autē sunt his
cōtraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum accē-
serint, seruari homo poterit. Si verò partim affuerint, partim
non, nō vltra decimūquartum vita producta peribit. Quòd si
contraria signa accedant, citius etiam. Quicunq; verò dolo-
res in his locis non sedantur, neque ad expuitions, neque
ad venarum sectiones, ac victus rationes, suppurantur. Qui-
buscunque autem ex peripneumonia abscessus circa aurem,
aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi
superstites euadunt. Fiunt autem his quibus & febris, & do-
lor affuerit, & sputum pro ratione non prodierit, neq; bilio-
sa alui egestiones, solutuq; faciles ac meracæ fiunt, neque
vrina crassa valde, & multam sublidetiam habens: & alia sa-
lutaria

abscessus

A lutaria habuerint. Fiunt autem ad infernas quidē partes, his quibus circa præcordia inflamatio fit: ad supernas verò, quibus præcordiū molle & doloris exors fuerit, & vbi per tempus aliquod difficulter spirauerint, ac citra manifestam causam cessauerint. At abscessus ad crura in periculosis inflammationibus pulmonis, omnes quidem cōmodi sunt, optimi autem, sputo purulento pro flauo fiēte. Non procedente verò sputo secundum rationem, neque vrina bonam subsidentiam habente, periculum est claudum fore hominē, aut multum molestiarum exhibitura res est. Si verò recurrerint abscessus, febre consequente, & sputo nō procedente, periculum est ne moriatur ac deliret. Quicumque verò peripneumonici nō purgati sunt iudicatorijs diebus, sed mēte moti quatuordecim dies effugerunt, eos periculum est suppuratos fieri.

B

Peripneumonia ex pleuritide trāsmutata, securiores sunt his quæ ab initio sunt. Corpora exercitata ac densa citius à pleuriticis ac peripneumoniacis morbis pereunt quàm inexercitata. Grauedines & sternutationes in morbis circa pulmonem, & antecessisse, & succedere, malū est. Reliquis autē sternutatio non incommoda est. Peripneumoniacis quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflammatae sunt. Quibus verò dimidium, vna iuxta quam apparet. Et quibus ad vnā clauiculā dolor fit, his superna pulmonis sala vna ægrotat. Quibus autem ad ambas clauiculas dolor fit, ambæ supernæ pulmonis alæ ægrotant. Quibus iuxta C mediam costam, media. Quibus ad discriminationem, inferna. At totam vnā partē dolentibus, omnia iuxta hanc partem dolent. Siquidem igitur aortæ appellatae, vtrinque appendentes pulmonis partes, valde inflammatae sunt, vt ad latus afsideant, hac corporis parte resoluuntur, & liuores foris circa costam habent. Hos autē veteres ietos, siue syderatos vocabant. Si verò non valde inflammatae sunt, vt nō afsideant; dolor quidem fit per totum, non tamen resoluuntur, neq; liuores habent. Quibus verò totus pulmo inflammatus fuerit, vna cum corde, vt ad latus allabatur, hi toti resoluuntur, & iacet æger frigidus, sensus exors. Moriturque secunda aut tertia die. Si verò etiam sine corde contigerit, minus diu viuunt. Quidam autē etiā seruantur. Qui suppurati sunt, maximè ex pleuritide ac peripneumonia, eos calores comitan-

cut, Suppurato
ra signa

עם יחסי
ממנו.

183

HIPPOCRATIS

tur, interdiu tenues, noctu vehementiores, & nihil memora-
 tu dignum spuunt, & circa collum ac claviculam sudant, &
 oculi cavi fiunt maxillæ verò rubent. digiti summi deterius
 calefcunt ac asperantur. Ungues curuantur, ac perfrigerantur,
 & circa pedes tumores habet, & circa corpus pustulas, & ab-
 stinent à cibis. Diuturnæ igitur suppurationes, signa hæc ha-
 bent. Quæ verò breui rumpuntur, ex notis ad eas cōsequen-
 tibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simul
 autem & si aliquādo difficilius spirauerit homo. Rumpuntur
 autem plurimæ suppurationes, partim vigesima die, partim
 quadragesima, partim sexagesima. Quibus igitur dolor in
 principio incumbit intentus, & spirandi difficultas, & tussis
 cum sputatione, ad vigesimū diem aut citius, eruptionem ex-
 pecta. Quibus autem leuiora hæc sunt, iuxta rationē. Suppu-
 tare autem oportet tempus, à quo primū doluit, aut grauatus
 fuit, aut febriit, aut si quando rigor corripuit. Necesse est
 autem præcedere & dolorem, & spirandi difficultatē, & spu-
 tationem, ante ruptionē. Quibus igitur & febris statim post
 ruptionem decedit, & cibum appetunt, & pus faciliè educitur
 album, inodorū, leue, eiusdem coloris, & à pituita liberum, &
 alius parua cōpacta egerit, plerunque breui seruantur. Quos
 verò & febres sequuntur, & sitis, & cibi fastidium, & pus liui-
 dum, aut cum virore pallidū, aut pituitosum, aut spumosum,
 & alius in super liquida sit, moriuntur. At quibus aliqua ex
 prædictis accesserint, aliqua non, horum aliqui pereunt, ali-
 qui multò tempore seruantur. Qui suppurati futuri sunt, F
 primū saluginosum spuunt, deinde dulcius. Quibus in
 pulmone tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta
 post ruptionem. Has verò transgredientes plerunque tabidi
 fiunt. In lateris dolore, stillatio sanguinis de naribus, ma-
 la est. Quos suppuratos mitius habentes, sputorum gra-
 uæolentiæ sequuntur, eos recidia occidit. Qui ex pleuri-
 ticis exspuunt purulenta, subbiliosa, rotunda: aut purulen-
 ta suberuenta progressu tempore, perniciosè habent. Perni-
 ciosè item qui nigra fuliginosa spuunt: aut quibus velut à vi-
 no nigro sputa fiunt. Quicunque sanguinem spumosum
 spuunt, dextrum præcordium dolentes, de hepate spuunt,
 & multi pereunt. Quibus dum concutiuntur pus cræno-
 sum & graueolens prodit, plerunque pereunt. Quibus à
 pure

suppuratos
 sputa

sanguinis spumosi
 ab Hippocr. lib.
 de rac. mulieb.
 pag. 237. d.

A pure specillum coloratur, velut ab igne, plerunque pereunt.

Cum lateris dolore, non tamen pleuritico, & turbulentis tenuibus lenibus, hi phrenitici euadunt. In morbis pulmonis valde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt. Cum raucedine, sputa viscosa, sanguinolenta, mala. Si verò etiam quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. Dolores ad collum his attenuatis perniciosi. Raucedo cum tussi, & aluo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia vrinæ crassæ in

principio, deinde ante quartum diem attenuantur, lethale est. Qui in peripneumonijs siccis pauca concocta educunt, horrida res est. Rubores in pectoribus sublatis, talibus perniciosi sunt. Lateris dolor in sputo bilioso præter rationem

B euanescent, mentem emouet. Febres intermittentes ob suppurationem, pleræque sudorificæ sunt. Suppuratis surditas oborta, cruentam egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cum febre diuturna, puris educationem fore significat. Horrore affecti frequenter ad suppurationem deueniunt. Sed & febris tales ad suppurationem perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia sequuntur, oris ventriculi dolore ac sudore aliquantulum vexantur. Facie flores habente, & aluo liquidiore, suppurationes circa pulmonem habent. Erectæ cervicis spirationes facit hydros sciscus. Convulsiones omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio intentos inducunt: & postea quoque aliquos commonefaciunt. Verum difficillimæ sunt circa thoracem, &

C maximè periculosæ. Quibus est vomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammam, thoracem, & dorsum: quibus hæc omnia sunt, breui moriuntur. Quibus autem non omnia, neque valde, tardius. Inflammati autem sunt diebus quatuordecim ad summum. Sanguinem spuenter confert, ut sint sine febre, & tussiant, ac doleant leuiter, & ut sputum tenue fiat ad dies bis septem. Febrile verò & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spueri, incommodum est. Quibus latus subleuat in tumorem ac calidus est, & inclinatis in alterum, grauitas aliqua impendere videtur, his pus ex vna parte est.

Suppuratis pulmonem per aluum pus secedere, lethale est. Quicunque vulnerati in thoracem, externa vulneris parte sanati sunt, interna non, periclitantur ne suppurati

fiant

*sanguinis
sputum*

HIPPOCRATIS

fiant. Quibus autem debilis inducta est intus cicatrix, facile D
refringitur. Ex peripneumoniacis suppurationibus seniores
magis pereunt, ex reliquis iuniores. Quibus suppuratis
dum cōcutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus pu-
ris habēt hi, quān quibus paucis, si difficilius spirent & me-
liorem colorem habeant. Quibus autem strepitus quidem
nullus fit, verū difficultas spirandi fortis, & vngues liuidi,
hi pleni sunt pure, & perniciosē habent. Qui spumofum
sanguinem vomunt, dolore infra septum transuersum non
existente, de pulmone vomūt, Ex quibus quidem magna in
ipso vena rumpitur, multum vomunt, & in periculo versan-
tur. Quibus verō minor, minus educunt, & securiores sunt.

Quibus tabidis sputum in igne grauem nidorem olet, & E
capilli de capite fluunt, pereunt. Quibus tabidis in mare
expuentibus, pus ad fundum fidit, breui pereunt. Sit autem
mare in æneo vase. Quibus tabidis capilli ex capite deflu-
unt, à profluuiio alui moriuntur. Et quibus tabidis alui pro-
fluuia accedunt, moriuntur. In tabescentibus sputa sup-
pressa, mentem ad nugæ garriendas emouent. His spes est
hemorrhoidem apparere posse. Tabes periculosissimæ sunt,
à ruptione venarum crassarū, & à defluxu de capite. Aetates
periculosissimæ sunt ad tabem, ab anno decimo octauo, vsq;
ad trigessimūquintū. Pruriginosa corpora post aluū sup-
pressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus
cum febre, fluxiones ad gingiuas & dentes comparentes, ma-
la sunt. In omoibus in tumorem eleuata præcordia, mala F
sunt, in tabidis autē pessima. Ex his qui diutina tabe perni-
ciosē consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehēdun-
tur. Pustularum eruptiones velut ferro lancinatae, habitus
tabem significant. Difficuler spirantes ex putredine, mul-
ta cruda educentes in tabe, perniciosē habent. Quibus he-
paticis multum est sputum cruentum, siue subputridum, siue
biliosum meracum, statim perniciosum est. In hepatico
colliquatio cum rauedine, malum, tum aliās, tum si aliquan-
tum tussiat. Hepar dolentes, os ventriculi dolentes, sopo-
rosi, rigorem habentes, & aluum turbatam, tenues, cibum a-
uerfantes, multum exsudantes, purulenta per aluum egerūt.
Hepar derepentē circumcirca dolentibus, febris accedens
dolorem soluit. Qui sanguinem spumofum spuunt, præcor-
dium

A dium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur.

Quibus hepar vstis, velut amurca prodit, lethale est. Hydrops ex morbis acutis dolorosi fiunt, ac perniciosi. Incipiunt autem plerique à laterum mollitudine, aliqui etiam ab hepate. His igitur quibus à laterum mollitudine initium sumunt, pedes tument, & alui profluuia diuturna sequuntur, aluum non mollientia, neque dolores ex lumbis & laterum molitudine soluentia. Quibus verò ab hepate, tussis adhuc promptè ob-

oritur, & pedes tument, & aluus dura egerit, eaque ad necessitatem coacta, & tumores circa ipsam fiunt, partim in dextra, partim in sinistra, & rursus sedantur. In hydropicis siccis, vrinae stillicidia mala. Mala etiam vrinae paruas subsidetias habentes.

B Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes perniciosae sunt, & inter se signa praua sunt, & aluos humectant. In biliosis aluus turbata, egerens parua geniturae similia, mucosa, & dolor circa pubem inducens, & vrinae non facile solubiles prodeuntes, ex talibus in hydropem desinunt.

Hydropico febrienti, vrina parua, & turbata, perniciofa est. In aqua inter cutem incipiente, alui profluuium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum soluit. In hydropico sicco sui significatione praemittente, tormina circa intestinum tenue insidentia, mala sunt. Et hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops qui ad curationem remisit recurrens, desperatus est. Hydropicis circa venas aqua, in aluum prolapsa, solutio fit.

C Dysenteria intempestiue suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut in articulis facit. Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit? Dysentericis vomitus biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta, humor ad purulentiam deuenit, his id quod superstat, valde album ac multum erit.

Dysentericae, subrubrae, limosae, largae egestionis alui, in flammis valde rubicundis coloribus solutae, infaniae timorem inducunt. Dysenteria non longa splenicis commoda est, longa verò mala. desinente enim si hydropes, aut intestinorum leuitates fiunt, lethale est. In intestinorum leuitatibus, cum animalculis, dolores tormine soluti, partes circa articulos tumefaciunt, ex talibus squamulae rubicundae pustulosae: hi ubi exudarunt velut flagris caesi rubescunt. Qui in longis intestinorum leuitatibus, una cum animalculis, tormi-

HIPPOCRATIS

na patiūtur, & doloribus afficiuntur, his solutis intumescūt. **D**
 Insuper rigere his malū est. Intestinorū leuitates cū spirā-
 di difficultate, & lateris pūctura, in tabē desinūt. Voluulo-
 sis vomitus, & surditas, malū. Vesicæ duræ & dolētes, omni-
 no quidem malæ sunt, pessimæ verò cum febre cōtinua. Nā
 dolores ab ipsis vesicis, ad occidendū sufficiūt, & alui his nō
 valde egerunt. Soluit autem hos vrina purulenta prodians,
 albam ac leuem subsidentiam habens. His verò non solutis,
 neque vesica mollescente, in primis circuitibus, ægrum mo-
 riturum esse timor est. Fit autem hoc maximē à septem an-
 nis: vsque ad decimumquintum. Calculosi ita figurati, vt
 lapis ad vrinarium meatum non illabatur, facillē mingunt.
 Quibus tuberculum est circa vesicam, quod mingendi dif- **E**
 ficultatem inducit, ad omnis generis figuras vexātur: huius
 autem solutio fit, purē erumpente. Quibus vrina clandesti-
 nē allabitur ad pudendum, exoluantur desperati. In vrinæ
 stillicidio voluulus accedens, septima die perimīt, si non fe-
 bre accedente vrina aceruatim prodeat. Torpores, & sensus
 stupiditates, præter morem sientes, futuræ syderationis si-
 gnum sunt. Qui ex vulnere impotentes fiunt corpore, fe-
 bre quidem accedente citra rigorem sanantur: non autē acce-
 dente, syderati fiunt dextra aut sinistra parte. Syderatis si
 hæmorrhoides accedant, vtile est: Si verò frigiditates & tor-
 pores, malum. In syderatis ex spiritus ægra latione, sudor
 accedens, lethale. Rursus autem in his ipsis si febris accedat,
 solutio fit. Syderationes derepentē exolutorio modo sien- **F**
 tes, insuper temporis progressu accedente, perniciosæ sunt.

Quibus ex aliqua ægritudine, ad aquam inter cutem res
 deuenit, his alui siccæ excrementa caprini stercoris pilulis
 similia egerunt, cum eliquidatione mucosa, & vrina non bo-
 na, & distentiones circa præcordia, & dolores ac tumores cir-
 ca ventrem, & dolores circa laterum mollitudinem, & iuxta
 spinæ musculos accidunt: febres item, & sitis, & tusses siccæ
 sequuntur. & circa motus spirandi difficultas, & crurum gra-
 uitas, & à cibis abstinere, & paucis ingestis explentur.

Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profluuium
 sedat. At tristitiæ cum silentio, & hominum auersiones, leni-
 ter eo modo affectos occidunt. Qui ex timore cum per-
 frigeratione mente mouētur, febres cum sudoribus, & som-
 ni

A In vocem aliquantum intercipientes, hæc solvunt. Ex insania, ad raucedinem cum tussi, fit discessus. In furiosis conuulsio accedens, dissipationem facit. Mentis emotiones taciturnæ, non quiescentes, oculis circumspicientes, spiritum extra efferentes, perniciosæ sunt. Faciunt autem & leues syderationes diuturnas. Sed & ita affecti ad insaniam deueniunt. Qui verò in ventris turbatione ita exacerbatur, his nigra circa iudicationem prodeunt. Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas, & grauitas ex leui causa, & aluus suppressa, superno ventriculo probè officium suum præstante, his coxendicum morbus, aut rhenû dolor, aut vrinæ stillicidium fortassis contigerit. Quibus infernæ partes affliguntur, pruritibus antea fortibus obortis, his arenosa vrina fit, & supprimitur. Qui verò ex his perniciosè habent, his mens obtorpescit. Qui circa articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigorem, hi circa ventrem & inguina rubescunt, velut ex plagis dolorosis, & moriuntur.

B Morbo regio affecti, non ita subtili sensu præditi, quibus singultus sunt, his alui erumpunt. Fortassis autè & suppressio fit, hi viridanti pallore inficiuntur. Dolores iuxta latus, in febribus tenuiter cōsistentes, citra notas, venæ sectio leferit, siue cibum auersetur æger, siue præcordium sublime habuerit: & in perfrigeratione, nō sine febre torpidos, sanguinis detractio lædit: & putantes se melius habere, hi moriuntur.

C Caput & pedes, & manus perfrigerari, aluo & lateribus calidis, malum est. Optimum autem est, totū corpus similiter calidum ac molle esse. Conuerti autem conuenit facile ægrotum, & in attollendo se leuem esse. At grauitas totius corporis, & manuum ac pedum, mala est. Si verò etiā ad grauitatem liuidi fiāt digiti ac vngues, mors propinqua est. Si verò penitus nigrescāt, minus perniciosi sunt liuidis. Verū etiam alia considerare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddā ex bonis signis subindicat, morbus ad abscessum vertitur, & partes corporis nigrefactæ decidunt.

Testes & pudenda reuulsa, malum significant. Flatum sine strepitu ac crepitu prodire, optimū est. Melius autè est & cum strepitu exire, quàm isthic reuolui, etiam si tali modo progressus, dolorē & desipientiā significet: si non volens homo vltro flatum ita emittat. Vlcus liuidum & siccum, aut

Decubitus

cum virore pallidum, lethale est. Decubitus optimus est, D
 velut quis sanus solitus fuit. At supinum iacere, cruribus ex-
 tentis, bonum non est. Si verò etiam delabatur pronus ad pe-
 des, deterius est. Lethale autem est & hiare, & dormire sem-
 per, & crura supinè iacentis valde incuruata esse ac compli-
 cata. In ventrem autem decumbere, si quis non sit adsuetus,
 delirium significat, & dolores circa ventrem. At pedes nu-
 dos habere & manus, si quis non vehemèter calidus sit, & cru-
 ra dissecta, malum est. Anxietatem enim significat. Ceterum ere-
ctum sedere velle, malum est in acutis, pessimum autem peripneu-
monicis ac pleuriticis. Dormire verò oportet noctu, inter-
 diu vigilare, Contrarium autem malum est. Minimè verò lædi
 æger poterit, si dormiat manè ad tertiam diei partem. Verum E
 postea somni mali sunt. Pessimum autem est non dormire, neque
 die, neque nocte: aut enim præ dolore & afflictione vigilarit,
 aut ab hoc signo delirabit. Quibus tempora secantur, con-
 uulsio ex cõtrariis sectioni partibus oboritur. Quibus cere-
 brum cõcussum fuerit & doluerit, percussis, aut aliàs lapsis,
 hi statim voce priuantur, & neque vident, neque audiunt, & ple-
 runque moriuntur. Quibus cerebrum vulneratur, febris ple-
 runque ac bilis vomitus accedit, & corporis syderatio, atque ta-
 les perniciosè habent. Ex ruptis capitis ossibus, difficilima
 cognitu sunt ea, quæ circa suturas rumpuntur. Rumpuntur au-
 tem maximè à grauibz ac rotundis telis, & ex his quæ ex
 subcontrario afferuntur, & non ex plano loco. At verò de qui-
 bus ambiguum est, rupta ne sint an non, iudicare oportet, F
 exhibitio ad manducandum in vtranque maxillam asphodeli
 caule, aut ferula, ita vt animaduertere iubeas, an os aliquod
 ipsi strepere videatur. Nam fracta strepere videntur. Pro-
 gressu verò temporis, fracta partim septima, partim decima-
 quarta, partim etiam aliter significationem de se præbent.
 Nam & carnis ab osse discessus fit, & os liuidum, & dolores
 sanie effluente. Hæc autem ægre iam auxilium admittunt.
 Quibus omentum excidit, necesse est putrefieri. Si in-
 testinum quoddam ex gracilibz dissectum fuerit, non co-
 alescit. Nervus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præpu-
 tium, non coalescit. Quodcunque os in corpore rese-
 ctum fuerit, aut cartilago, non augetur. Ex vulnere con-
 uulsio accedens, mala est. Ex vulnere bilis vomitus acce-
 deas

A dens malum, & maximè in capitis vulneribus. Nervi crassif si vulnerantur, plerunque claudi fiunt, & si obliqui vulnerantur præsertim, & si musculorum capita, maxime in femoribus: Moriuntur maxime ex vulneribus, si quis cerebrum sauciatus fuerit, aut spinalem medullam, aut hepar, aut septum transversum, aut cor, aut vesicam, aut venam crassam. Moritur autem etiam, si in arteriam & pulmonem valde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percusso, paucior spiritus per os procedat, quàm is est qui ex vulnere elabitur. Moriuntur autem qui in intestina vulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue ex crassis vulneratum fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. Si vero parua & recta, quidam euadunt. Minime verò moriuntur vulnerati in paribus corporis ubi hæc non sunt, aut ab his quàm longissimè absunt. At verò visus obscuratur in vulneribus sientibus in supercilium, & paulo altius. Prouè autè vulnus recentius est, maximè vident. cicatrice verò diutius tardante ac senescente, magis obscurari contingit. Fistulæ difficilissimæ sunt, quæ in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, & cauæ sunt, & procedunt ac sanie manant semper, & caruncula in osculo ipsis inest. Curatu autè faciliores sunt, quæ in mollibus & carnosiss & non nervosis existunt. Morbi hi ante pubertatem non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix circa tibiæ, fluxus sanguineus, cancer non congenitus, vitiligo leuce dicta non à natura insita, defluxus medullæ spinalis, hæmorrhoids, voluulus chordasus appellatus non cognatus. Horum morborum nullum ante pubertatem fore expectandum est. Verum ab anno decimoquarto, usque ad quadragesimum secundum, natura corporis morborum omnis generis ferax sit. Rursus ab hac ætate, usque ad annos sexagintatres, non fiunt strumæ, neque lapis in vesica, nisi prius existat, neque defluxus medullæ spinalis, neque nephritis, nisi ex alia ætate comitetur, neque hæmorrhoides, neque fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usque ad senectutem absunt morbi. In mensibus muliebribus qui aquosi ante partum prodeunt, mali sunt. Ora feruido aphthæ vlcere affecta, vterum gestantibus, non sunt bona. Num & alui humectantur? Dolores ex laterum mollitudine, ad intestinum tenuè transeuntes, in morbis longis, ex corruptione fœtus non valde purgata, perniciosi sunt. Quæ ex partu ac fœtus cor-

*ide 144
vulnera
scethalia*

fistula

*Qui morbi
ante pubertatem
non fiunt*

HIPPOCRATIS

ruptione multa repente concitata, supprimuntur, difficilia sunt. Rigor his infestus est, & alui turbatio, tum aliàs, tum si præcordium doleant. Vterum gestantibus dolores capitis soporosi, cum grauitate fientes ac conuulsione, plerunque mali sunt. Quibus dolores pertinaces ex mensibus, circa supernam partem, & intestinum tenue, aluos humectant, aliquantum cibos auersantur. His circa iudicationem, delationes in somnum fiunt, & impotentes ex capitis dolore exsudent, ac perfrigerantur. Tales recidiuè plerisq; fientes post remissionem, cito occidunt. Spiritus qui cum suspirijs extra feruntur, & colliquatio præter rationem, in vterum gestantibus abortum facit. Dolor ventris post partum, in his purulenta purgat. Torpidæ, & præsertim in motibus, cum impotentia fractæ, circa iudicationem vexatæ, anxiosæ, multum exsudent. Alui his humectæ, malum. Menses non supprimi cōmodum est, ex talibus comitiales morbi fiunt, vt arbitror, quibusdam verò ventris subductiones diuturnæ, quibusdam hæmorrhoides. Prægnantibus præcordij dolor, malum & alui his subeuntes, malū. & insuper rigere his malum. Dolor ventris in talibus, minus malū, si limosa purgentur.

Quæ ex talibus facile pariunt, post partū vehementer molestantur. Prægnantibus tabescentibus quibus rubor in facie fit, stillationes de naribus fientes hūc auertunt. Quibus ex partu prodeūit alba, his verò suppressis cum febre surditas, & dolor acutus ad latus fit, mente mouentur, & perniciose habent. In gestantibus vterum salsuginosa, significant post partū molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes indurant. singultus in his malum. Ad pedes & ad lumbos distentiones ex mensibus, suppurationem inducunt, itemq; ea quæ de aluo viscosa graecolentia cū dolore prodeūit. Strangulationes quoq; ex præscriptis suppurationē faciunt. Vterinæ in ventriculis duricies dolorosæ acutè, perniciosum.

Vterum iam gestantibus ex feruido vlcere fluxiones dolorosæ, malū. Hæmorrhoids his pessimum. Quibus aluo tumefacta, ad pudendum rubor deuenit, mensib. albis humidis derepente progressis, in longis febribus moriuntur. Conuulsionis, si menses in principio apparuerint, febre non accedente, solutio fit. Vrinæ tenues cum aliquantula nubecula in medio consistente, rigorem significant. Si à quarta die

sanguis

urina
nota nubes
culā gisitare
in m. l. 10. 404.

- A** sanguinis fluxus fiat, diuturnitatē significat, & aluus erūpit, & crurum tumores. Vterum gerentibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt, fortassis autē his etiā conuulsorium quid pati contingit. Quæ ante partum, iuxta modum bilis sursum ac deorsum erumpētis, doluerūt, facile quidem pariunt, verū si febricitēt, malignē habēt: tum, si alius tum si circa fauces quid vexet, aut aliquod signū in febre, si malum lignum appareat. Aquosa ante partus erumpentia mala. Vterum gestantibus saluginosæ iuxta fauces fluxiones, malum. Ante partum rigorem habere, & partus circa dolorem, periculosi. Vterum gerentibus ex feruido vlcerē fluxiones, malum: conuulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excalescunt acutē. Sed & difficiles fiunt prægnantibus tumores circa tenuē intestinum, quales circa eminētias oculi vteri fiunt, erectæ ceruicis spirationem inducentes. Num tales tumores gemellorū partum significant? Num & conuulsionē tales tumores faciunt? Quæ suspiciosum efferunt spiritum in febris, abortiunt. Horrorem habentibus, lassitudine affectis, capite grauatis, menses erumpunt. Ad manum torpidæ, obaridæ, titis exortes, menses multos emittentes, suppuratæ fiunt. Alba de repente ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit: & ad femur impetus, in his tremor difficilis est. Ora feruido, aphtha appellato, vlcere affecta, vterum gestatibus aluos humectant. Prægnantes prægrotantes ante partus insuper rigent: Torpefactoriæ exolutiones difficiles quidem ex
- C** partibus cōtingunt & mentem emouentes, non tamen perniciosæ. Sed & mensium copiam præsignificant. Quæ in partu os ventriculi prædoluere, paulo post eijciunt. Horrores, lassitudines, capitis grauitates, colli dolores, menses extrudunt. Circa iudicationem tale siens cum tussicula rigorem insuper inducit. Quibus puellis erectæ ceruicis spiratio contingit vterum gestantibus, his, mammæ suppurantur, & menses apparere in principio, malum est. Infantiæ febres acutas turbulentas non bilioso os ventriculi dolenti soluunt. In sterilibus, & non parientibus sanguinis vomitus ad conceptionem prodest. Caligines mensibus multis comparentibus soluuntur. Quibus mulieribus ex febris dolor mammarum fit, sputatio cruenta non sæculē aborta, soluit dolores: Conuulsiones ex vtero affecto sine febre faciles

vomit

sunt, velut etiam Dorcadi. Quibus ex rigore febris lassatoria, menses decurrunt, collū in his dolorosum sanguinis eruptionem inducit. Vomitus minimè molestus est ex pituita ac bile permixtus, verū ne valde multus vomatur. At meraciores vomitione deteriores sunt. Prasinus autē vomitus, & niger, & liuidus malus est. Si verò etiā omnes colores idē vomuerit, perniciosum est. Celerrimum autem mortē significat liuidus, & male olens. Est etiam lethalis ruber vomitus, & maxime si cum necessitate dolorosa vomatur. Qui anxie se iactantes, citra vomitum exacerbantur, male habent, itēq; qui lancinantur citra vomitum. Parui vomitus biliosi sunt, tum aliās, tum si vigilauerint. In nigris vomitibus surditas non nocet. Pauci sientes, celeres, biliosi, meraci vomitus. mali sunt in alui subductione vberiore, & pertinaci lumborum dolore. Ex vomitibus anxietates, clangores, oculi concretionem lanuginosam habētes, furiosa. Acute insania correpti, voce intercepta, ita affecti moriuntur. In vomitu si quis siticulosus sit, & sitis exors fiat, malum est anxiosis vigilantibus. Abscessus iuxta aurem maxime sunt anxiosis. Aluo turbata suppressa, breui velit culicum puncturæ erumpunt, & ad oculos lachrymosus abscessus deuenit. In meracis vomitibus singultus, malus, mala etiam conuulsio. Similiter etiam in nimijs purgationibus ex medicamentis. Qui vomituri sunt, antea sputationes faciunt. Ex veratro conuulsio perniciosa. In omni purgatione redundante, frigiditas cum sudore, perniciosa est: & qui insuper vomunt, siticulosi in his, malum. Anxiosi, lumbos dolentes, aluo humectantur. Purgationes valde rubicundorum, nigrorum, à veratro, malæ sunt: & tum talibus exolutio, mala. A veratro vomere rubicunda, spumosa, pauca prodest: facit tamen duricias, & suppurationes magnas abducit. Sunt autem qui talia vomunt aliās & pectus dolorosi, & in rigoribus exudātes, & testes intumescunt, quod si cōtigerit insuper rigent, & gracilescent. Frequentes per eadem recidiuæ vomitoria, circa iudicationem nigrorum vomitum faciunt, sunt item tremulæ. Sudor optimus quidem est, qui febrem in die iudicatorio soluit. commodus autem est & qui leuat. frigidus verò, & circa caput solum ac collum siens, malus est. Nam & temporis diuturnitatem, & periculū significat. At frigidus in febre quidē acuta,
lethalis

sudor

- A** lethalis est. In mitiore verò, diuturnitatē significat. Sudor vnā cum febre fiens in acuto morbo, malus est. Vrina in febre albam habens & leuem subsidentiā firmatam, celerē dimissionē significat. Celerem etiam ea quæ ex indiscreta, pinguedinem quandam habens, exaquescit. At subrubra, & subsidentiā subrubram habens & leuem, si quidem ante septimum diē prodeat, septima die liberat. Post septimū verò, tardius, aut omnino post tempus aliquod diuturnius. & quæ in quarto die nubeculā subrubram habet, septimo liberat, si reliqua iuxta rationē habeant. Cæterū tenuis & biliosa, & vix tenuem ac exiguā subsidentiā habens, & quæ ad melius, ac deterius mutatur, diuturna est. Hæc autē diutius consequens, aut temporis diuturnitate circa iudicationē fiēte, periculo nō vacat. Aquosa verò & alba perpetuē, in diuturnis morbis difficulter iudicat, & secuta non est. Nubeculæ in vrinis albæ quidē & infernē, cōmodæ sunt. rubicundæ verò, & nigrae, ac liuidæ, difficiles sunt. Periculosa vrina est biliosa, non subrubra, in acutis: & quæ crassiores farinæ partes refert, albas habens subsidētiās, & quæ varia est colore ac subsidētiā, & maximē in fluxionibus de capite. Periculosa est & quæ ex nigra in tenuem biliosam transmutatur: & quæ ex subsidētiā diuellitur: & quæ ex cōpactis innatantibus, subsidentiā habet subliuidam, limosam. Num ex talibus præcordiū dolent? dextrum arbitror, aut etiam cum virore pallidi fiunt: & abscessus circa aurē dolentes? His paululum erumpens alius pernicioſa est. Vrinæ quæ derepente citra rationem paulatim concoquuntur, malæ sunt: & in summa, quæ citra rationem matura est, in morbo acuto, mala est. Mala est etiā valde rubicunda ex his, florulentia & ruginosam continens. Albaverò & diffusa pellucidavrina, mala est, maximē si in phreniticis compareret. Mala est quoque quæ post potum cito mingit, & præsertim pleuriticis ac peripneumonicis. Mala est & quæ ante rigorem oleosa mingitur. Malæ sunt & in acutis viridantis palloris, non existētes in colore. Pernicioſa est vrina nigram subsidētiā habens, & nigra. In pueris verò tenuis, magis quàm crassa. Verū in tenuibus vice versa quàm in crassis. Et grandinosa genituræ similis diffusa, eademque dolorosa. Pernicioſa etiam est omnis quæ latenter mingitur. At peripneumonicis pernicioſa est quæ in principio quidem

HIPPOCRATIS

cocta est, post quartum verò diem attenuatur. Pleuriticis v. D
 rina cruenta, caliginosa, cum subsidētia varia, indiscreta, lo-
 thalis est plerūq; in quatuordecim diebus. Lethalis est item
 in pleuriticis breui prasina, nigram subsidētiā habens, aut
 fursuraceam. Verū in febre ardēti stupefactorio modo de-
 tentis, pessima est vrina valde alba. Vrina cruda multo tem-
 pore manens, alijs signis salutaribus, abscessum & dolorē si-
 gnificat, & magis in partibus sub septo trāsverso. Si verò do-
 lores in lumbis oberrarint, ad coxā, & in febre, & sine febre.
 At quæ emittitur vrina pinguedinem habens in subsidētia,
 febrem significat. Cruēta verò in principio mīcta, diurnā,
 turbata, cum sudore, recidiuam. Alba velut iumentorū, capi-
 tis dolorem, pelliculosa, cōuulsionē. Quæ spūto similes sub- E
 sidentias, aut limosas habet, rigorem indicat: Quæ aranei te-
 lis similes, colliuationem. At in febribus erroneis nigre nu-
 beculæ, quartanā indicant. Decolores autē, nīgra innatantia
 in medio habentes, cum vigilijs & turbatione phrenitidem-
 puluerulentæ, cum spirandi difficultate, aquā inter cutē. Vri-
 na aquosa aut turbata friabili asperitate, alium liquidā fore
 significat. Verū tenuis valde vrina si densa fiat, num sudorem
 futurum indicat: iam verò factum, spumosa in seipsam confi-
 dens. In tertianis cum horrore velut nubeculæ nigræ, hor-
 roris inconstantis indicia sunt. Et pelliculosa vrinæ, & cum
 horrore subsidentes, conuulsoriæ sunt. Vrina bonam habens
 subsidētiā, derepentē non habens, dolorē & mutationem
 significat. At subsidētiā habens turbata desinēs, rigorem F
 circa iudicationem. Fortassis autē & in tertianam aut quar-
 tanam transitionem. In pleuriticis vrina subrubram ha-
 bens leuē subsidētiā, securam iudicationem significat.
 Cum leui virore ac pallore florulenta, albam subsidētiā ha-
 bens, etiam celerem. At rubicunda valde & florulenta, sub-
 sidentiam cum virore pallidam, leuē, sinceram habens, diu-
 turnum valde turbulentum morbum qui in alium transmu-
 tatur, non tamen perniciosum. Alba verò aquosa, subsidē-
 tiā crassas polentæ partes referentem, fuluam habens, do-
 lorem & periculum significat: & quæ cum virore pallida est,
 fuluam crassas polentæ partes referentem subsidētiā ha-
 bens, tempus & periculum significat. Vrinæ quæ in his qui
 iuxta aures abscessus habent, cito & modicē concoquuntur,
 malæ

A malæ sunt, & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum aliàs, tum cum capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quæ in his cū torpore exoluuntur, difficilia sunt non tamen perniciofa. Num & aliquantū mente mouentur?

Rhenum dolor repentinus, cum vrinæ suppressione, calculorum aut vrinarum crassarum mictionē significat. Tremores senioribus in febre fiunt, atque sic comparentes, fortassis calculos per vrinam ægris eijciunt. Vrinæ suppressio, & grauitas in imo ventre plerunque stillicidium vrinæ significat futurum. Sin minus alium morbum ex quo ægrotare solet. In billosis vrinæ interceptio, breui occidit. Vrina in febre densitatem habens diuullam, recidiuam aut sudorem significat.

B In febribus longis, tenuibus, erroneis, vrinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre aliàs aliarum vrinarum mictiones, morbum produciunt. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus nec commonefactis perniciosæ sunt. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbasses? Quibus vrinæ pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autem talibus ab initio, aut breui subsidentiam habet. Quibus vrinæ cito subsidentiam habent, hi cito iudicantur. Comitiali morbo laborantibus vrinæ tenues & crudæ, præter morem, sine repletionem, morbi inuasionem significant, tum aliàs, tum si quis dolor, aut cōuulsio, in summum humerū, aut collū, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum insomnium viderit. Parua cōparere, veluti sanguinis stillas, & vrinam & vomitum, & alui egestionem, penitus quidem malum est. Pessimum verò si propinquè inter se prodeant. Alui egestio optima est mollis, coherens ac compacta, subfulua, non valde graueolens, prodiens hora consueta, copia pro ratione ciborum ingestorum. Spissum autem fiat ad iudicationem. Commodum est & lumbricos rotundos exire simul vbi ad iudicationem tendit. In acutis spumosa, circumbiliosa alui egestio, mala est. Mala item valde alba. Adhuc verò peior est, quæ farinæ ac sterquilini speciem refert. Sopor in his malus est, & cruenta egestio, & vforum vacuatio præter rationem. Alui interceptio, parua nigra, velut caprarum stercora, ad necessitatem coacta emittens, nasus his erumpens, malum. Viscosa meraca, aut alba

*urinae in febre
reple*

*urinae in febre
reple*

*urinae in febre
reple*

*urinae in febre
reple*

alui

HIPPOCRATIS

alui egestio, mala est. Mala est & abundè multū fermentata, subpituitosa. Prava item ex compactis quibusdam innatantibus, subfidentia subliuida, purulenta, cum biliosa. Sanguinem splendidū egerere, malum est, tum aliās, tum si quis dolor affuerit. Spumosa circumbiliosa alui egestio, mala est. Sed & morbum regium ex talibus incurrunt. In biliosis alui egestionibus spumosa florulētia, mala est, maximè ei cui lumbi doluerint, & mente motus fuerit. Num autem his dolores? Tenuis spumosa alui egestio, aquosam cū virore pallidam habens subfidentiam, mala est. Māsa etiam purulenta & nigra cruēta mala, cum febre, & aliās, & varia, abunde bile colorata egestio, mala est, tantoque deterior quantum colore magis horrenda est, prāterquā in medicamentorū vsu. In hoc enim periculo vacat, si non copia excedat, & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoq; sicca, friabilis, decolor, tum aliās, tū si aluum humectet. Nigris verò antea egressis occidit. Liquida alui egestio, & aceruatim, & paulatim fiens, mala est. altera enim vigilias, altera exolutionē facere poterit. Liquida subtenuis alui egestio perfrigescēs, non sine febre, mala est. Rigores in his vesicam & ventrem corripunt. Aquosa verò valde non desinens in acutis, mala: & magis si etiam sitim non habuerit. Valde rubicunda egestio in alui profluuiio, mala est. Mala quoque valde cū virore pallida, aut alba, aut spumosa, aut aquosa, & parua, & viscosa, & levis, & cum virore subpallida, mala est. Et soporosis torpefactis liquida egestio, pessima est. Lethale autē & aluū sanguine manare, multa grumosa egestionē, itemq; alba ac liquida, cum ventre in tumorem eleuato. Egestio alui nigra velut sanguis, & cum febre, & sine febre, mala est. Mala item omnes variæ abundè ex bile coloratæ. Egestionē desinētes in spumosas meracas, omnes quidem exacerbat, cōuulsos autem etiam valde. Ex talibus abscessus iuxta aurem emergunt. At quæ valde liquida fiunt, & rursus compactæ, meracæ, stercoracæ egestionē, longitudinem morbi significant. Valde rubicunda in febre delyrium. Alba stercoracea morbo regio difficilis est, itemq; liquida quæ seposita ruborem capit. In sanguinis eruptionibus viscosa egestio nigris variegata, maligna est maximè autem valde albidis.

Valde alba egestio in febre, nō bene iudicat. Aluus turbulenta

A bulenta parvis frequētibus ad egerendum progressibus, maxillas intendit. Soluit etiam rubores in facie fientes. Stercoracea cum contentione egestio, alui afflictionē significat. Pituitosa verò acutē cum oris ventriculi dolore, dysenteria: fortassis autem & lumborum dolorem. Talibus alui incumtentio ad necessitatem liquida demittens, citius restitans, habet quid conuulsorium, Insuper rigere his perniciosum est.

Quibus nigra per aluum prodeunt, frigidum sudorē excludunt. Quibus aluus ab initio turbatur, vrina verò paucæ sunt, & progressu temporis aluus quidem siccatur, vrina verò tenuis redundat, his abscessus ad articulos fiunt. Progressus ad egerendum paulatim fientes, horrorē ac rigorem inducunt. & quibus larga sit egestio difficilimum est quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progressus paulatim fientes, pauca stercoracea subuiscosa habentes, cum præcordij & lateris dolore, morbum regium denotant. Num his suppressis hi cum virore pallidi fiunt? Arbitror autem & hoc sanguinem effundere. At dolores in lumbis, in his sanguinem fundentibus, sanguinem egerūt splendidum. Cum sopore, & capitis dolore, calefcere insuper, perniciosum est.

Viscosæ, biliosæ, magis abscessus iuxta aurem faciunt.

Quicumque tumores aluo humecta eleuantur, cum doloribus, malum. Aluo verò suppressa, & nulla alia re nouata, cito rumpuntur, & malignus est. Vomitiones in his malæ & fecinæ. Quibus & flammeis & valde rubicundis solutis, graueolens, larga, subrubra fit, hi ne insaniant timor est. Corpus squallidum aluum malè affectam significat, In his valde rubicundæ, instar purulentæ carunculæ, egestionis maximè prodeunt. Ad aluum biliosam mollem stercoracea egerentem, ardores comparentes, tumorem iuxta aurem faciunt.

Biliosas egestionis surditas sedat, & surditatem sedat biliosa alui egestio. Pustulæ serpiginosæ supra inguina, ad laterum mollitudinē ac pubem fientes, aluum malè affectam significant. Exolutio dolorem soluens, aluum maximè humectat. Iuxta sedem dolorosæ suppurationes aluū turbant.

Lethales egestionis sunt, pinguis, nigra, liuida cū graueo-
lentia, & biliosa habēs in se simile quiddam ciceri aut fabis fæsis, aut veluti floridos sanguinis grumos, & quæ odore si-
milis est egestionis infantium, & varia eademque diuturna,

Talis

*lethalis
egestio*

HIPPO. COACAE PRAENOTIONES.

Landesina Talis autem fuerit cruenta, ramētoſa, bilioſa, nigra, praſina, & ſimul, & permutatis vicibus. Lethalis quoq; omnis eſt quę ſenſum ægri fugiens exit. Qui potū difficulter deglutiunt ſpiritu tuſſiente, eructatio ſubtracta intro reuoluta dolorem ventris ſignificat. Malæ ſunt etiam egeſtiones valde rubræ æruginofæ in quartanis. Et tales ſanguinis fluxiones ſoporofæ ſunt. ex his conuulſione moriuntur, nigris antea egreſſis.

Exolutiones alui repentinæ præter rationem, in diuturnitate temporis conſumptis, vnà cū vocis tremula interceptione, pernicioſe habent. Tenues nigrorum egeſtiones horrificæ, meliores talibus ſunt. Tales proſunt maximè in ætate ante vigorem. Pruriginofæ affectiones omnibus nigrorum egeſtioneſignificant, & vomitum grumofum. Et tremulæ affectiones cū morſu ac capitis dolore, nigras egeſtiones ſignificant. Ante tales, vomitus prodit, & vbi vomuerūt, multæ tales inſuper detrahuntur. Quibus in alui turbatione exacerbat morbus, circa iudicationem nigra infernè prodeunt. Ex aluo diutine affecta, vomentibus bilioſis, cibum faſtidientibus, ſudor multus cum impotentia repentina, occidit. In medicamentorum uſu, in deſluxione, tenuis abunde ſanguis eliqueſcens, malum eſt. Duricies circa ventrem cum dolore, in febris cū horrore cibos auerſantibus, aluo parum ad purgationem humectata, non ſuppurantur. Vnà cum febre aluus turbata ſalſuginofò modo, ſoporofos, torpidos, non valde comitatur. Ex aluo liquida laſſatos, caput dolentes, ſiticuloſos, vigilātes, valde rubicunda egeſtione ſolutos, timor eſt ad inſaniā deuenturos eſſe, ſi difficulter ſpirauerint. Ad hoc vbi quis cum virore palleſcit, bene ſpirare noxiū non eſt aluo inſuper probè egerente. Aduſtæ egeſtiones contentioneſ habentes; aluum malè affectā ſignificant. Bilioſis aluus turbata, parua, frequēter egerēs, diſtenduntia cum paucis mucoſis, dolorem circa tenue inteſtinum hæc faciunt, & vrinam non facilè prodeuntem, ex talibus ad hydropem deſinunt. Linguae tremula quibusdam alui erupcionis futuræ ſignum ſunt. Quibus ardor fit, & ad egreſſas egeſtiones alui, inſuper exſudant, his febris exacerbatur.

Ex aluis liquidis perfrigeratio cū ſudore, mala. Ex aluis liquidis, ſanguis de gingiuis deſuens, lethalis eſt. Alui egeſtio pura ſuperueniens, ſoluit febrem acutam cum ſudore.

Hippoc

*ex gingiuis
ſanguis fluens*

A H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE CAPITIS VVL-

NERIBVS, IANO CORNARIO

SVMPTIBVS, IACO PHYSICO IN-

TERPRETE.



Vllum capitis vlnus leuiter con-
temni debet. Sape enim cutis sola
contusa ferro, aut alia aliquare, si
non diligēter, aut cum quadam cau-
tione curetur: veluti si sanguis con-
cretus non expurgetur: aut aliud
quiddam negligatur: vlcus incru-
descens non parum molestiæ exhibet, & aliquādo etiam febrē indu-

*Cutis capi-
tis laesa pe-
riculosa.*

cit: & medico quidē negotia, ægroto verò periculum nō mi-
nus affert. Verūm hoc multo magis contingit, si caluaria, &
cerebri mēbranz rūpuntur. Quare si non singula hæc diligē-
ter medicus curauerit, sape mortis causa existit. Et de his
quidem omnibus etiā alibi diximus, sed & nunc dicēdū est.

Primū igitur capite vulnerato interrogare oportet: per
quid vulneratū sit. Deinde quid homo fecerit, quum vulne-
ratus fuit. Postea qua parte vlnus inflictum sit. Nam homi-
num capita nihil inter se similiter habent, neq; futuræ capi-
tis in omnibus eodē loco consistunt. Verūm quisquis ex prio-
re capitis parte prominentiam habet: est autē prominentia,
rotunda oſis pars eminens præ alia: huius futuræ consistunt
in capite, velut litera græca tau T pingitur. Breuiorem enim
lineam ad prominentiam transfuersam constitutā habet: al-
teram verò lineā per medium caput, sed secūdum longitudi-
nem ad collū semper habet. Qui verò ex posteriore capitis
parte prominētiā habet, huius futurę etiam cōtrario prio-
ri modo cōsistunt. Breuior enim linea ad prominentiā trās-
uersa cōsistit: longior autem per mediū caput, secūdū longi-
tudinem ad frōtem semper cōstituta est. Quisquis autem ex
vtraq; capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiā
habet: huic futurę sunt similiter cōstitutz, velut litera græca

*Sutura ca-
pitis diuersa.*

*Prominen-
tia capitis
priori para-
te.*

H scrib

HIPPOCRATIS LIBER

Sutura ca- H scribitur. Cōsistunt autem longæ quidem lineæ ad utrâq; D
pitis H lita- prominentiam transuersæ. Breuis autem per medium caput
ta similes. secundum longitudinem ad vtranque longam lineam desi-
nens. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic su-

Alia x si turas habet velut litera græca x pingitur. Consistunt autem
miles. hæ lineæ, altera quidem transuersa ad tempora pertingens,
altera verò secundum longitudinem, per medium caput.

Os capitis
duplex.

Color ossis
capitis.

Duplex autem est os iuxta medium caput: durissima verò
ac dēlissima suprema ipsius pars existit, & infima quæ est ad
membranam. Consimilis est color ossis sub carne: cōsimilis
est color ossis infernè. Secedit autem à supremo ac infimo
osse, à durissimis ac densissimis, ad mollius, ac minus dēsum
& cōmunius, ad duplicatam laminam. Est autem duplicata E
lamina cauiissima, ac molliissima, & maximè antrofa. Est aut
& totum os capitis, excepta valde modica suprema ac infima
parte, spongiæ simile & habet os in seipso carunculas similes
multas humidas, & si quis ipsas digitis conterat, sanguis uti-
que ex ipsis prodierit. Sunt etiā in osse venulæ tenuiores ac
cauiiores, sanguine plenæ. Quod igitur ad duriciam, & mol-
liciem, & cauitatem attinet, sic habet. Quod verò ad crassitu-

Cur verti-
cis vulnus
ceteris peri-
culosius sit.

dinem ac tenuitatem, hoc modo. Vniuersi capitis os tenuissi-
mum est ac debilissimum, quod est circa sinciput: & carnē
paucissimam ac tenuissimam hac parte os in seipso habet: &
cerebrum hac capitis parte plurimum subest. Et quia hæc ita
se habent, ut & vulnera, & tela æqualia sint magnitudine, &
minora: & similiter vulneratus quis sit, & minus: os hac capi F
tis parte & magis cōtunditur, & rūpitur, & magis intrò con-
tusum cedit: & lethaliora, ac ad curādum, & ad effugiēdam
mortē, difficiliora sunt vulnera hac parte, quàm alibi in ca-
pite. & ut sint æqualia vulnera, & similiter vulneratus quis
sit, & minus: homo ubi etiā aliās ex vulnere moriturus est,
breuiore tēpore moritur, qui hac parte capitis vulnus habet,
quàm qui alia. Cerebrū enim & citissimè & maximè iuxta

Cerebri si-
tus.

Tempora
cur pericu-
losa.

sinciput sentit mala, quæ & in carne, & in osse fiunt. Sub te-
nuissimo enim osse, ac modica carne, cerebrū est hac parte:
& plurimū cerebrum sub sincipite iacet. Cæterum ex reli-
quis ossibus id quod circa tēpora est, debilissimum est. Cō-
missura enim est infernæ maxillæ ad caluariam, & motus in
tēporibus sursum ac deorsum, velut articuli: & auditus pro-
pe ipsum

Ape ipsum est: & vena per tempora extenta est, caua ac fortis.

Omni verò capitis osse robustius est os verticis: & quod est retro aures, robustius est quàm totum quod in anteriore parte est: & carnem ampliorem ac profundiorē in seipso hoc os habet. Et sanè his ita se habentibus, si quis & vulneribus, & telis, omnibus æqualibus ac similibus, & maioribus ac minoribus, similiter sit vulneratus, & magis: hac capitis parte os minus rūpitur, & contunditur: & si homo aliàs moriturus est ex vulnere, si in posteriore capitis parte vulnus habet, diutius durans tempore morietur. In longiore enim tēpore os suppuratur, & deorsum ad cerebrum transpuratur, propter ossis crassitudinem: & paucius etiam cerebrum hac

Bparte subest: & plures mortem effugiunt plerunq; ex his qui posteriore capitis parte vulnerati sunt, quàm qui anteriore. Sed & in hyeme diutius tēpore viuit homo quàm in æstate, quilibet etiam aliàs moriturus est ex vulnere, quacunque capitis parte vulnus habeat. At verò sedes telorum acutorum ac leuiorum, ipsæ in seipsis fientes in osse, & cum fissura, & cōtusione, ac intrō cessione: fiunt autem hæ similiter, & in anteriore & in posteriore capitis parte: ex his mors nō contingit secundum iustitiam, etiam si contingat. Sutura verò in vlcere si compareat, osse denudato, quacunque capitis parte vlcere fiente, debilissimus æger est ad resistendum vulneri ac telo, si in ipsam futuram telū incubuerit: & maxime omnium si telum in sincipite, iuxta debilissimā capitis partem incussum fuerit, & suturæ circa vlcus, si ita cōtingat, fuerint, & telum ipsas suturas contigerit. Vulneratur porro os in capite tot modis. Singulorum autem modorum plures species fracturæ in vulnere fiunt. Os vulneratum rumpitur, & ossi fissuram continenti ac ambienti necesse est contusionem accedere, si ruptum fuerit. Nam telum quod os rumpit, idem hoc etiam os, aut magis, aut minus cōtundit, id ipsum videlicet os, in quo fissuram rumpit. Atque hic vnus modus est, species autem fissurarum omnigenæ fiunt. Nam & tenuiores, & valde tenues conspicuæ fiunt. Quædam verò neque statim post vulnerationem, neque in diebus, in quibus dolorum vtilitas mors homini contingere potest. Rursus autem aliquæ fissuræ crassiores ac ampliores fiunt: quædam verò etiam valde amplæ. Et aliæ quidem in longiore modum

*Capitisque
parte durū
est os.*

*Varij lesio
nis modi.*

*Modus pri
mus.*

*Secundus
modus.*

rumpuntur, aliæ verò in breuiorem: & aliæ rectiores sunt, & D
aliæ etiam valde rectæ: aliæ verò curuiores & curuæ ac profundiores: aliæ autem ad infernam partem, & per totum os. Poterit autem & os in sua ipsius natura contundi, ita vt nulla fissura ad contusionem ossi accedat. Atq; hic secundus modus est. Species autem contusionis plures sunt. Nam & magis, & minus contunditur, & altius ac per totum os, & minus in altum ac per totum os, & in ampliorem & minorem tum longitudinem, tum latitudinem. Verùm harum specierum nullam oculis intuēti cognoscere datur, qualisnam specie existat, & quanta magnitudine. Neq; enim etiam si sint contusa, & malum factū sit, an cōtusa sint, oculis videre conspicuum fit, statim post vulnerationē: quemadmodum neque aliquæ fissuræ videri possunt, quæ rupto osse procul absunt. E

*Tertius
modus.*

Intrò etiam cedit os ex natura sua, vnà cum fissuris: aliàs enim nō intrò cesserit. Nā quod intrò cedit, abruppiturque ac frāgitur, intrò cedit ab alio osse, quod in sua ipsius natura manet. & sic sanè fissura adest intrò cessione. Atq; hic tertius modus est. Intrò autem cedit os per multas species. Nā & maior ossis pars, & minor intrò cedit: & magis ac profundius deorsum, & minus ac magis in superficie. Quin & sede teli in osse contingente, fissura utiq; ad sedem accesserit, & ad fissurā etiam contusionē magis aut minus accedere necesse est, si quidē & fissura accedat ea parte qua & sedes facta est: & fissura sit in osse continente & sedem, & contusionē. Atq; hic quartus modus est, in quo sedes teli fit in osse. Sedes autē vocatur, quum manēte osse in sua ipsius natura, telū quod in os incubuit, manifestum fecerit vbi incubuit. Verū in singulis modis plures species fiunt. Et de cōtusione quidē ac fissura, si ambo hæc ad sedem accedant: & si cōtusio sola fiat, iam dictum est q̃ multæ species contusionis, & fissuræ fiunt.

*Quartus
modus.
Teli sedes.*

Hæc autem sedes ipsa in seipsa, longior ac breuior fit, & curuior ac rectior, & orbiculatio: & multæ aliæ species talis modi sunt, prout etiam figura teli fuerit: & eadem etiā profundiores deorsum, & magis & minus, & angustiores, & ampliores, & valde amplæ, si dissectione intercisā fuerit. Quanta autem dissectio in longitudinē ac latitudinem fiat, in osse sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia in sua ipsorum natura manserint, & nō vnà cum dissectione intrò cesserint ex sua

A sua natura. Nam si ita contingat, intrò cessio fuerit, & non amplius ossis sedes. Si vero alia capitis parte vulneratur, & vlcus habet homo, & os carne denudatū est, quintus hic modus est: & hāc calamitatē vbi facta est, nulla re iuuare queas. Nam si passus est hoc malum, nō est quod ex ipso exquirere possis, an passus sit hoc malum, neq; qua capitis parte: & ex his fracturæ modis ad perforationem deuenit, tum si contusio ad visum incōspicua est, tū si aliquo modo manifesta fuerit: & fissura si incōspicua visui fuerit, & ad visum manifesta. Sed & si sede teli in osse fiēte, fissura ac cōtusio ad sedem accedat: & si contusio sola accedat ad sedē, absq; fissura: hæc quoq; ad perforationem deuenit. At verò os quod ex sua natura intrò cessit, parum perforatione opus habet: & quæ maximè intrò cesserunt, & maximè fracta sunt, & perforatione minimè opus habent. Neq; sedes ipsa in seipsa fiens, absque fissura ac cōtusione, perforatione indiget. Neq; dissectio ipsa si magna ac ampla fuerit. Dissectio enim & sedes idem sunt.

*Quintus
modus.*

B Caterum primum spectare oportet in vulnerato, qua capitis parte, & num in debilioribus vulnus habeat: & capillos considerare circa vlcus, an dissecti sint à telo, & an intus sint in vulnere: quod si est, periculū est os carne nudum esse. Itaque dicere oportet, os aliquam læsionem à telo habere. Atq; hæc longè prius considerasse ac dixisse oportet, anteaquam hominem contingas. Vbi verò iam cōtigeris, clarè nosse conari, an nudum carne os sit, aut non. & si quidem oculis conspicuum fuerit os nudum, bene habet: Sin minus, specillo cōsiderato. & si quidem inueneris os carne nudum esse, & non sanum à vulnere, eius quod in osse est dinotionem primum facere oportet, inspiciendo & quantū sit malum, & quo opere opus habeat. Oportet etiam vulneratum interrogare vt passus sit, & quo modo. Si verò non conspicuū fuerit os, multo adhuc magis interrogationem facere oportet, an habeat quid mali, aut non habeat: & si nudum est os, vt factum sit, & iuxta quem modum. Nam cōtusiones & fissuras in osse non apparentes, & tamen præsentēs, ex vulnerati responsione cognoscere primum conari oportet, an tale quid passum sit os, aut nō passum. deinde ratione & opere exquirere, citrà specilli admotionem. Specilli enim admotio nō indicat, an tale quid mali os passum sit, & an habeat quid in seipso, aut non

*Quæ consi-
deranda.*

passum sit. Sed sedem teli indicat specillum, & an intro cesserit os ex natura sua, & an vehementer fractum sit os : quæ D
Os quæ patitur. etiam oculis conspicua videnti cognoscere datur. Rumpitur autem os & obscuris fissuris, & manifestis: & cõrunditur obscuris contusionibus: & intro ex sua natura maximè cedit, quum alter ab altero sauciatur, de industria sauciare volens: aut quum ex altiore loco sit iactus, aut plagæ ictus, vter tandem fuerit, magis quàm ex plano loco: & si contineat manu telum, siue iaciat, siue percutiat: & si fortior debiliorem vulnerat. Ex his verò qui cadentes vulnerantur ad os, aut in ipsum os, is qui ex altissimo loco cadit, & in durissimum ac obtusissimū: huic periculum est vt os & rumpatur, & cõrundatur, & intro cedat ex sua natura. Ei verò qui ex plano magis loco cadit, & in molliorem, os minus hæc patitur, aut etiam non patitur. E
Cadentes de alto & cõtrid quid patiantur. Quæcunq; verò illabentia in caput tela, ad os, vulnerant, ex his id quòd ex altissimo loco illapsum est, & minimè ex plano, & quòd durissimū ac obtusissimum, & grauissimum ac minimè leue est, & quòd minimè acutum ac molle: hoc & ruperit os, & contuderit. & maximè sanè periculum est vt os hæc patiatur, quum & hæc fiant, & è directo aduersus telum, os sauciari contingat, siue ex manu percutiatur, siue iactum suscipiat, siue quid ipsi incidat, siue ipse collapsus saucietur ita vt quomodocunq; sauciatus, osse aduersus telum occurrat. Quæ verò tela ex obliquo os sauciant, minùs & os rumpunt, & intro ad caput contundunt, etiam si carne fuerit os denudatum. Nam quædam vulnera F
Telorum uarietas. ita inflicta, neque denudant os carne. Profectò ex telis maximè os rumpunt, & manifestis, & obscuris fissuris, & cõrundunt, & ex natura sua os intro cedere faciunt, quæ sunt rotunda, & orbiculata, & vndiquaque plana, & obtusa, & graui, & dura: & carnem hæc contundunt, & maturam faciunt, ac concidunt: & vlcera fiunt à talibus telis in obliquum, Sed & in circulum, subcaua, & suppurata magis fiunt, ac humida sunt, & diutiore tempore purgantur. Necessè est enim carnes contusas ac concisas: pus fieri ac consumi. At tela oblonga, multum tenuia, & acuta, & leuia, carnem magis dissecant quàm contundunt, & os eodem modo. Et sedem quidem inducit id ipsum quòd etiā dissecauit. Dissectio enim & sedes idem sunt. Verum non valde os contundunt talia tela, neque rump

A rumpunt, neq; ex natura sua intro cedere faciunt. Cæterum oportet supra conspectum tuum, quicquid tandem apparuerit in osse, etiã de omnibus his interrogationem facere. Nã magis & minus sauciati signa hæc sunt, si vulneratus soporẽ altiore incidit, & caligo offusa fuerit, & vertigo, & si ceciderit. Quum autem os carne denudatũ à telo fuerit, & circa ipsas futuras vlcus fieri cõtigerit, difficile est sedẽ teli deprehendere, quẽ in alio osse manifesta est, an insit in osse, aut non insit, & an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, asperior existens reliquo osse, & non satis clarum est vbi in ipso futura est, & vbi ossis sedes, si nõ valde magna sedes fiat. Accedit etiã ruptio ad sedem, plerũque & ipsa

B in futuris fiens, & sit etiam hæc ruptio rupto osse deprehensu difficilior, eo quod circa ipsam futuram ruptio fit, si rumpitur, vt plurimũ. Procliuẽ enim est hac parte os rumpi ac dissolui, propter ossis hac parte debilitatem ac raritatem, & propterea quod parata sit futura vt rumpatur ac dissoluatur. Nã reliqua ossa futurã ambientia ruptionis exortia manere possunt, eo quod robustiora sunt quã futura. Verũ ruptio circa futuram fiens, etiam dissolutio futuræ est, & non facile est deprehendere, neq; si à tali sede fiat in futura, vbi rupta fuerint ac dissoluta. Verũ difficilior est deprehendere fissurã ex contusione. Fallunt enim & mentem, & visum medici hæc futuræ, fissuræ speciem referentes, & reliquo osse asperiores existentes, nisi vehemẽter dissectæ fuerint ac dissolutæ. Dissectio autem & sedes idem sunt. Proinde si circa futuræ vlcus factum fuerit, & ad os telum incubuerit, animaduersionẽ habere oportet, ac inuenire quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similib. ac multo minoribus, & similiter & multo minus vulneratus, longẽ magis malum accipit, qui in osse in futuras telum recepit, quã qui nõ in futuras id recepit. Et pleraque horum perforare oportet. Verũ ipsas futuras perforare non oportet, sed secedendo in propinquo osse perforationem facere, si perfores. Porro de curatione vulnerum in capite, & quo modo deprehendere oportet affectiones in capite fientes non manifestas, ita mihi videtur. Vlcus in capite nullo humore humectare conuenit, ac ne vino quidẽ: neque cataplasmate integere, neque linamento curationem facere. Nequeverò comprimere oportet vlcus

*Sauciati
signa.*

*Capitis ul-
cus quĩ cus
retur.*

HIPPOCRATIS LIBER

in capite, si non in fronte fuerit, aut in loco pilis nudato, aut circa supercilium & oculū. Hic enim sientia vlcera, cataplas-
 matis ac deligatione magis opus habent, quā in alijs capi-
 tis partibus. Continet ac ambit reliquum caput totam fron-
 tem. partes autem vlcus ambientes, in quacunque tandē par-
 te vlcera fuerint, inflammantur ac intumescunt, propter san-
 guinis influxionem. Oporteret autem neque ea quæ in fronte
 sunt vlcera, per omne tempus cataplasmatibus integere ac deli-
 gare, sed postquam inflammatio sedata est, & tumor sedatus,
 à cataplasmatibus ac deligatione cessare. At in reliquo capite
 vlcus, neque linamentis, neque cataplasmatibus, neque deliga-
 tione curare oportet, si non & sectione opus habeat. Secare
 autem oportet vlcibus in capite ac fronte sientibus, qua
 parte os carne nudum fuerit, & læsionem aliquā ex telo ha-
 bere visum fuerit. Vlcera verò quæ non habent sufficien-
 tem magnitudinem longitudinis ac latitudinis, ad ossis in-
 spectionem, an quid mali passum sit à telo, & quale id pas-
 sum sit, & quantum caro contusa est, & quātam os læsionem
 habet: & rursus an illæsum sit os à telo, & nihil mali passum
 sit: & ad curationem, qualinam opus habet vlcus, & caro, &
 ossis affectio: talia sanè vlcera sectione opus habent. Si verò
 etiā os quidem carne fuerit denudatū, subcaua verò fuerint
 vlcera in obliquū, cavitatem quā plurimum refecare oportet
 vbi nō facile est medicamēto quocunq; peruenire. Sed & or-
 biculiora vlcera, ac plurimū subcaua, etiā ipsa refecare o-
 portet, circulo diuissim inciso secundum longitudinē pro ho-
 minis natura, vt longius fiat vlcus. At verò in capitis sectio-
 ne, reliquæ quidē capitis partes securitatē habent dum secā-
 tur. Verū tempora, & adhuc supra tēpora venā, quæ per tem-
 pora fertur, secare nō oportet. Cōuulsio enim corripit sectū.
 Et si quidem sinistra tempora secta fuerint, dextera cōuulsio
 corripit. Si verò dextera secta fuerint, sinistra cōuulsio ap-
 prehendit. Quum igitur vlcus in capite secas, ossium gratia
 carne denudatorum, scire cupiens an habeat os quid mali à
 telo, aut nō habeat, secare oportet vulnus tanta magnitudi-
 ne, quāta sursum opus habere visum fuerit. Secantē verò car-
 nē ab osse diducere oportet, quæ ad membranā, & ad os exi-
 stit. Deinde linamentū per totū vlcus adhibere oportet, quod
 vlcus quā amplissimum in posterum diem faciat, cum mini-
 mo do

*Vlcera quæ
 secanda.*

- A** mo dolore. vbi verò linamentum adhibuisti, cataplasmate
 vrere, quanto tempore etiā linamento, ita vt mazā ex tenui
 polenta in aceto subigas, aut coquas, & quā maximē visco-
 sam facias. Postridie verò vbi linamentum exemeris, inspe-
 cto osse quod passum est, si non conspicua tibi sit vulneratio,
 qualisnam sit in osse: neq; cognoscas an os aliquid mali in se
 habeat, aut non habeat: telum autem ad os peruenisse ac læ-
 sisse videatur: radere oportet specillo rasorio, secundū longi-
 tudinem ac profunditatem pro hominis natura. & rursus si
 etiam transversum sit os, ruptionum gratia ad visum incon-
 spicuarum, & contusionis obscuræ gratia, quæ non intrò ces-
 sit ex natura alterius ossis capitis. Indicat enim ipsa ratio ma-
 gis, si non etiam aliàs conspicuæ fuerint hæc affectiones, ex
 telo in osse existētes. Et si sedem teli in osse videris, tum ip-
 sam teli sedem radere oportet, tum ambientia ipsam ossa, ne
 sæpe ad sedem ruptio accedat, & contusio, aut sola cōtusio, &
 deinde lateant, quū non cōspicua existant. Postquam autem
 os scalpro raseris, si quidem ad perforationem tendere ossis
 sauciatio videatur, perforare oportet, & citra perforationem
 triduum nō excedere, sed in hoc perforare, tum aliàs, tum tē-
 pore calido, si ab initio curationem susceperis. Si verò su-
 spiceris os ruptū, aut contusum esse, aut ambo hæc: cōiectura
 facta quòd vehementer sauciatus sit, ex vulnerati verbis: &
 quòd à forti id contigit qui sauciauit, si alius ab alio vulne-
 ratus fuerit: & quòd telum quo vulneratus est, ex malefico-
 rum telorum ordine fuit: deinde q̄ vertigo & caligo ipsum
 corripuerit, & quòd in soporem profundiorē inciderit, &
 quòd ceciderit: His ita fientibus, si nō cognoscas an os ruptū
 sit, aut contusum, aut ambo hæc, neque aliàs videas: super os
 aliquid maximē nigri coloris, nigro medicamento liquato
 subactum, imponere oportet: & subextento linteo oleo im-
 buto super vlcus, & deinde mazæ cataplasmate appposito de-
 ligare, postridie verò exoluto ac expurgato vlcere deradere.
 Et si sanum non fuerit, sed ruptū ac contusum, reliquū quidē
 os rasum album erit, fissura verò & contusio, quæ nigrū me-
 dicamentum eliquatum in seipsam suscepit, in reliquo osse
 albo nigra erit. Cæterum hanc fissuram conspectam rursus
 secundum profunditatem radere oportet. Et si quidē radens
 fissuram hanc conspectam nigrā exemeris, & deleueris è con-

— XXI

. . . .

Cum os an
 ruptum sit
 ambigatur.

— XXII

HIPPOCRATIS LIBER

spectu sublatam, cōtusio quidem ossis, aut magis aut minus D
 facta fuit, quæ sanè etiam fissurâ à scalpro rasorio deletam ru
 pit. Verùm minus horrenda hæc est, & minus negotij exhi
 buerit, fissura deleta. Si verò in profundo sit, & dum raditur
 deleri nolit, ad perforationem deuenit hæc calamitas. Sed
 perforare oportet, ac de cætero vlcus curare. Cauere autem
 conuenit vt ne aliquid mali os contrahat ex carne, si malè cu
 retur. Nam & perforato ossi, & aliàs denudato, sed sano: & si
 læsionem aliquam ex telo habeat, & tamen sanum esse pute
 tur, periculum magis imminet vt suppuratum fiat, etiam si
 aliàs futurū non esset, si & caro os ambiens malè curetur, &
 inflammetur ac constringat. Ignescit enim, & multa flāma
 impletur. Et sanè os ex ambientib. carnibus in seipsum calo E
 rem & flammam, & quæcunque mala in seipsa habet caro,
 trahit, & ex his ita suppuratum fit. Malum est etiam humidā
esse carnem in vlcere, & putrescentem, & ad multum tempus
purgari. Quare suppuratum quidem quàm celerrimè vlcus
 facere oportet. Sic enim ambientes vlcus partes quàm mini
 mum inflammabuntur, & vlcus citissimè purū erit. Neesse
 est enim carnes concisas ac cōtusas à telo suppuratas fieri ac
 consumi. Postquam autem purgatum fuerit, siccius fieri vl
 cus oportet. Sic enim citissimè sanū fiet, sicca carne germi
 nante, & non humida. Et sic quoque vlceri caro non super
 increfcet. Eadem ratio membranæ circum cerebrum est. Sta
 tim enim osse perforato & exsecto, ac de membrana detra
 cto, ipsam denudatam membranam purā quàm citissimè ac F
 siccam facere oportet, vt ne vbi ad multum tempus humida
 sit, computrescat ac in tumorem attollatur. His enim ita fien
 tibus, periculum est ipsam putrescere. At verò os quod di
 scedere à quouis alio osse oportet vlcere in capite fiente, &
 sede reli in osse existente, aut aliàs osse plurimum denudato:
 discedit vbi plurimum exangue factum est. Resiccatur enim
 sanguis ex osse, & à tempore, & à plurimis medicamētis. Ci
 tissimè enim discesserit, si quis vlcus quàm citissimè purga
 rit, & de cætero & vlcus, & os, tum maius, tum minus resic
 cauerit. Quod enim citissimè resiccatum ac testaceum factū
 fuerit, ex hoc facto maxime dimittitur ab alio osse, quod san
 guinolentum ac viuum existit, & quum exangue ac siccum
 fiat, à sanguinolento ac viuo valde discedit. Quæcunque
 verò

XXIII.

XXIV.

A verò ossa intro contusa cedunt ex sua ipsorum natura, rupta aut etiam dissecta, valde ampla, talia minus periculosa sunt, vbi membrana sana fuerit: & quæ plurib⁹ fissuris & amplioribus intro rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad detractionem faciliora fiunt. & nullum ex talibus perforare oportet, neq; periclitari ossa auferre conando, priusquam sponte sua emergant, priore forma exoluta. Emergunt autem carne subnascēte. Subnascitur autem ex duplicata ossis lamina, & ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic verò quā citissimè & caro subnasci ac germinare poterit, & ossa emerferint, si quis vlcus quā citissimè suppuratum redditum, purum faciat. Et si per totum os ambæ partes intro cōtusa cesserint ad membranam, & superna ossis pars, & inferna, si quis similiter medeatur, vlcus celerrimè sanū erit, & ossa quæ intro cesserunt celerrimè emergunt ac reuertuntur.

B At verò puerorum ossa, & tenuiora & molliora sunt, ea de causa, quòd sanguinolentiora sunt, & caua, & neque antrofa, neque densa, neq; solida: & à telis æqualibus ac debilibus si similiter ac minus fuerint vulnerati, iunioris pueri vulnus, & magis & citius suppuratur, & in breuiori tempore quā senioris: & si aliàs ex vulnere moriturus est, iunior seniore citius perit. Cæterum si os denudatum carne fuerit, animaduersione habita cognoscere conari oportet, si oculis videre ac noscere non datur, an ruptum sit os, & an contusum, aut solum contusum: & an sede teli facta, adsit contusio, aut fissura,

C aut ambo hæc. Et si quid horū os passum fuerit, detractio sanguine, paruo terebello modicè & cum cautione, os terebrare oportet. Tenuius est enim os, & minus profundum iuuenibus, quā senioribus. Quicumq; verò ex vulneribus in capite moriturus est, & fieri non potest vt sanus fiat ac seruetur, ex his signis dinotionem morituri facere oportet, & quod futurum est prædicere. Patitur enim hæc. Quum quis os fractum, aut ruptum, aut cōtusum, aut quocunq; modo fractum intelligens, per errorem deliquerit, & neq; raserit, neq; perforauerit, veluti os non opus habeat, & vehit os sanū existat: ante decimumquartum diem febris corripiet vr plurimū in hyemē. In æstate verò post septimum diem febris corripit. & postquam hoc factum fuerit, vlcus colorem omittit, & ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflammatum est ex ipso

*Ossa fracta
& aqua minus periculosa.*

*Puerorum
ossa.*

*Morituri
signa.*

HIPPOCRATIS LIBER

emoritur, & viscosum fit, & apparet velut salsamentum, colore **D**
fulvum, sublividum. & os tunc corrumpi incipit, & fit valde
nigrum, postremum pallidum aut valde album euadens.
Quum verò iam suppuratum fuerit, in lingua pustulae obo-
riuntur, & despiens æger moritur, & convulsio plerosq;
corripit in altera corporis parte: si quidem in sinistra parte ca-
pitis vlcus habeat, in dextra corporis parte convulsio corri-
pit. Si verò in dextra capitis parte vlcus habeat, in sinistra
corporis parte convulsio corripit. Sunt autem & qui syderati
fiunt, atque sic pereunt ante septimum diem in estate, aut de
cimūquartum in hyeme. Similiter autem significat hæc si-
gna, & in iuniore, si vulnus existat. Quapropter ubi intellexis
sebrem inuadere hominē, & ex alijs signis aliquod ipsi **E**
accedere non cunctari oportet, sed os vsque ad membranam
perforare, aut scalprio rasorio deradere. Est enim & ad perfo-
rationem, & ad rationem, facile ac expeditum. Deinde reli-
qua sic curare, prout conducere visum fuerit, respectu ad id
quod fit habito. Quum verò in vulnere in capite, homine
terebello perforato, aut non perforato, osse autem denudato,
tumor rubicundus, ignis sacri speciem referens, accesserit in
facie, & in oculis utrisq;, aut altero: & si quis tumorem con-
tingat, doleat: & febris corripiat ac rigor: & vlcus ipsum
tum quod ad carnem attinet, tum quod ad os, bene habeat
ad aspectum: & ambientes vlcus partes bene habeant, exce-
pto tumore qui in facie existit: & aliud peccatum nullum tu-
mor habeat, quod ad reliquam victus rationem attinet: Hu- **F**
ius infernam aluum deorsum purgare oportet medicamen-
to, quod bilem ducit, & ubi sic purgatus fuerit, & febris di-
mittit, & tumor sedatur, & sanus euadit. Medicamentum ve-
rò dare oportet, ad vires hominis respiciendo, prout robore
validus fuerit. Caterum de perforationis ac terebrationis
vsu, ubi ea necessitas ingruat, ut necesse sit hominem perfo-
rare, sic statuendum est. Si ab initio assumptam curationem
administras, non oportet statim os ad membranam perfora-
re ac excindere. Non enim conducit membranam osse de-
nudatam esse, ad multum tempus male afflicta: sed postre-
mum ubi madore corrumpi ac putrescere ipsam periculum
est. Est & aliud periculum, si statim osse ad membranā per-
forato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranā per te-
rebellum

*Medelzhu-
ius.*

*Terebratio
nis modus
qui.*

A rebellum vulneres. Verùm terebrâtem oportet, vbi iam valde parum abest vt os sit perforatum, & os iam mouetur, à terebratione desistere, & sinere vt os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & à perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenue enim iam id quod restat sit. Reliqua verò curare oportet, prout vlceri conducere visum fuerit.

Terebrantem autem frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calefcens enim ex circumductione terebellum, etiam os exalfaciens ac resiccans adurit, & maius os perforationē ambiens discedere facit, quā aliās discessurum fuisset. Si verò etiam statim volueris vsque ad membranam perforare, &

*Terebra
aqua in
tingenda.*

B postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita vt posterior tardē ad curationem deuenias: terebello exsculpto statim os ad membranam perforare ac excindere oportet, & exempto sæpe terebello speculari: tum aliās, tum per admotum specillum, circumcirca ipsius terebelli viam. Nam multo citius perforatur os, si suppuratum iam ac transpuratum perforaueris. & sæpe contingit vt non profundum os sit, tum aliās, tum si ea capitis parte fuerit vulnus, qua tenuius magis quā crassum os ipsum existit. Quare cauere oportet, vt in terebelli admotione ne fallaris, verùm qua parte crassissimum os esse visum fuerit, in eam semper terebellum admotum adigito, ita vt frequenter consideres, ac commoueas os, & eiicere coneris. Postquam autem abstuleris, reliqua velut vlceri conferre visum fuerit curato.

HIPPOCRATIS COI CHIRVURGIAE OF-

FICINA,



Ut similia, aut dissimilia, à principio, à maximis, à facillimis, ab his quæ undiquaque penitus cognoscuntur: quæ & videre, & tangere, & audire licet: quæ & visu, & tactu, & auditu, & naribus, & lingua, & intelligentia sentire licet: quæ & quibus cognoscuntur, omnibus cognoscere licet. Quæ ve-

ro ad chirurgiæ officinam. Aegrotans. agens. ministri. instrumenta. lumen. ubi, quomodo. quot, quomodo. quando. corpus. vasa commoda. Tempus. modus. locus. Agens aut sedens, aut stans, moderatè ad seipsum, ad id quod tractatur, **E** ad splendorem lucis. Lucis igitur species duæ sunt, altera communis, altera artificialis. Communis, in nobis non est. Artificialis, etiam in nobis est. Vtriusque verò duplices usus sunt, aut ad lucem, aut sub lucem. Sub lucem, & modicus usus est, & moderatio manifesta. Ad lucem verò, ex præsentibus, ex conferentibus luminibus, ad splendorem conuertere oportet id quod tractatur, exceptis his quæ aut latere oportet, aut videre turpè est: ita ut id quod tractatur ex aduerso sit luci, qui verò tractat ex aduerso eius quod tractatur, verumtamen ut ne tenebras inducat. Sic enim & qui agit videre poterit, & quod tractatur non videtur. Ad seipsum verò, si quidem sedeat, pedes secundum rectitudinem sursum versus è directo ad genua sint, distantia autem parua in consistèdo intercedat. Genua autem superiora sint inguinibus modicè distantia, pro commoda cubiti positione ac appositione. Vestitus expedite, distinctè, equaliter, similiter, cubitis, humeris

Ad id verò quod tractatur, ultra & propè, & sursum ac deorsum, & hac aut illac, aut in medio. Ultra quidem & propè termini sunt cubitorum gibbi, ita ut in anteriorem partem non excedant genua in posteriorem costas. Sursum verò, ut non supra mammas, summas manus habeat. Deorsum ut non inferius quàm ut ubi pectus ad genua habet, summas manus angulares ad brachia figuret. & in medio quidem hoc modo se habet. Hac verò aut illac, ut non extra sedem: sed pro ratione conuersionis & corpus, & operantè corporis partem producat. Si verò stet, utrisque pedibus ex æquo insistere satis est.

Lux duplex.

Quæ chirurgus respicienda.

A est. Agere verò oportet ita vt altero pede inscendar, non eo qui est ad manum agentem, genu ad inguem sublato, velut in sede, sed & alij termini iidem sunt. At qui tractatur, reliqua corporis parte tractanti inserviat, aut stans, aut sedēs, aut decumbens, quo quàm facilius ita velut figurā habens perseueret, seruās subfluxionem, subsidentiā, euerfionem, decliuitatē. Sic quæ debet seruat, & figura, & forma eius qui tractatur in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequente. Vngues neque præminere oportet, neque deficere. Digitorū vertices ad vsum exercere, digitis quidem summis pleraque, indice ad magnum admoto. Tota verò manu prona, ambabus autem aduersis. Digitum extendere cogit

Vngues & digiti chirurgi quales esse debeant.

B magnum quiddam in medio digitorum positum, & oppositum facere magnū digitum indici. Morbum autem esse manifestum est, per quem etiā læduntur hi quibus ex natiuitate, & educatione, assuevit magnus digitus ab alijs contineri. Opera omnia exercere oportet vtrisque seorsim agendo, & ambabus simul. Similes enim sunt: ambabus cōiectando bene, pulchre, citò, non laboriosè, concinnè, expedire. Instrumenta quidem, & quando, & qualiter dicetur. Vbi oportet, vt ne quid impediāt opus, neq; impedimento sit inter accipiendum circa operatē corporis partem. Si verò alius det, paulò prius paratus sit, & faciat vbi iusseris. Qui verò circa ægrotantē sunt, id quòd tractatur exhibeāt prout visum fuerit. Reliquum autem corpus detineant, vt totum quiescat, tacentes, & præfecto obedientes.

Instrumenta in promptu sunt & ministri.

C Deligationis species duæ sunt, quæ facta est, & quæ adhuc fit. Quæ adhuc fit, citò, non laboriosè, expedire, concinna. Cito quidem perficiendo opera. Non laboriosè, facile agēdo. Expeditio verò ad omnia parata est. Concinnitas autē iucunda aspectu est. Ex quibus verò exercitationibus hæc cōtingant, dictū est. Quæ facta est, bene, pulchrè. Pulchrè quidē, simpliciter, distinctè: aut similia ac æqualia, æqualiter ac similiter: aut inæqualia ac dissimilia, inæqualiter ac dissimiliter. Species verò hæ sunt, simplex rotunda in orbem, ascia, lima, oculus, rhombus, & semisecta: ita vt species congrua sit speciei & affectioni eius quod deligatur. Eius verò quod bene deligatur, duæ sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum. & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curantibus

Deligatio duplex.

Ligationū species.

bus inferuit. Ad hæc igitur lex hæc est. In his autem maxi- **D**
Modi ligandi. ma deligationis vis est. Compressio quidē, vt incumbētia
 non abscedant, neq; penitus innitantur: sed sint quidem fir-
 mata, non autem coacta, & minus quidem extrema, minimē
Nexus. verò media. Nexus & filum procedant non deorsum, sed
 sursum, in exhibitione, & præparatione, & deligatione, &
 habitu postea sequente. Initia nō super vlcus iniicere oportet,
 sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum verò neque in
 semita, neque in opere, neque illic vbi inane est, vt ne in va-
 num iaceat. Nexum autem & filum, mollia non magna. Hoc
 tamen probè nosse cōuenit, quòd omnis deligatio ad decli-
 uia & acuminata fugit, velut in capite, ad partem supernam
 in tibia, ad infernam. Deligare oportet dextras partes, in **E**
 sinistras: & sinistras, in dextras: excepto capite. Hoc verò se-
 cundum rectitudinem. Verū cōtraria ex duobus initijs. Si
 verò ex vno, ad id quod simile est, ad subtilitatem: velut est
 media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi. Quæ vero mo-
 uentur, velut articuli, quæ quidem parte inflectuntur, quàm
 minimis ac expeditissimis linteis obuoluere oportet, velut
 poplitem: quæ vero circumtenduntur, expansis ac latis, velut
 est patella. Circundare quoque insuper oportet, compre-
 hensionis quidem gratia eorum quæ circa hæc sunt, appen-
 sionis vero vniuersi deligamenti, in quiescentibus & depres-
 sionibus corporis partibus, qualis est & supra, & infra genu.
 Conuenit autem in humero quidem, circūductio circum al-
 teram alam: In inguine vero, circum alterā lateris mollitu- **F**
 dinem: in tibia, supra suram. & quibuscunque sursum cōtin-
 git fuga, his infernè appensio conuenit: quibus autem deor-
 sum, vice versa. Quibus vero non est, velut in capite, his in
 æqualissima parte cōprehensiones facere oportet, & minimē
 obliquo deligamento vti. Nam stabilissimū postremum cir-
 cundatum, vel maximē vagabunda continet. Quibuscunque
 autem neque comprehensio, neq; appensio linteorum, com-
 modè se habet: his per fila appensiones facere conuenit, ex
Deligamenta qualia. iniiectione, aut confusione. Deligamenta sint pura, leuia,
 mollia, tenuia. Obuoluere verò oportet ambabus simul, aut
 vtrisque seorsim exercere. Conueniente autem deligatione
 vti, coniectura ad latitudinem ac crassitudinem partium fa-
 cta. Obuolutionis capita dura, æqualia, distincta sint. In
 quibus

- A** quibus autem futurum est vt decidant, ea peiora sunt, quam si cito decidant. Quædam verò sunt eiusmodi, vt neque comprimere, neque decidere oporteat. Quæ verò spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, hæc sunt. Subligatio, quidem in causa est, vt aut disparata attrahantur, aut expassa contrahantur, aut contracta diducantur, aut distorta dirigantur, aut vice versa. *Lintea quæ lia.* Præparare autem oportet lintea leuia, tenuia, mollia, pura, lata, non consuta, neque extuberantias habentia, & sana, vt extensionem ferant, & paulò præstantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiari: & ea quidem quæ disparata abscesserunt, ita vt sublimia sedem quidè contingant, non tamen comprimant. Initium autem sumere
- B** oportet ex sana parte, & ad vlcus desinere, quo id quidem quod subest exoletur, aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem, in rectum: obliqua *Deligatio qualis.* verò, obliquè, in figura doloris exortæ, in qua neq; constrictione, neq; discessio contingat: ex qua vbi translatio fit ad appensionem, aut positionem, non transmutent, sed similia habeant hæc, musculos, venas, nervos, ossa, & bene posita, & bene delecta. Appensa verò aut posita esse conuenit, in figura doloris exorte, quæ est secundum naturam. In quibus verò discesserint, vice versa. At quibus expassa sunt, contrahere oportet quod ad alia quidem attinet eodè modo: ex multo verò temporis spatio interposito contractionem facere oportet, & sensim progressu factò cōpressionem, primū minimè, deinde magis, ita vt terminus quod maximè facta sit, mutuus contactus fiat. Quibus verò contracta sunt, diducere: cum inflammatione quidem vice versa, sine hac autem, præparatione quidem eiusmodi, deligatione verò contraria. Distorta verò dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet eodem modo. Verum quæ quidem abierunt, ea reducere oportet, subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria verò contrario modo. Spleniorum lōgitudines, latitudines, crassitudines, multitudines. Longitudo, quāta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorum, crassitudo, vt triplices aut quadruplices sint. Multitudo, vt dum circundantur non excedant, neque deficient. Quidus verò ad directionem, in longitudinem circundando, latitudinem ac crassitudinem defectu coniectare oportet, ita vt non acervatim expleamus. At verò

HIPPOCRATIS

Linteorum verò linteorum subligationes duæ sunt, prima ex loco læso **D**
subligatio. ad supernas partes definit: altera ex loco læso, ad infernas.

Deligamē- Iuxta locum affectum maximè comprimere oportet: Mi-
ra qualia. nimè extremas partes: Reliqua verò pro ratione: Deligatio
autem multam sani loci partem occupet. Deligamentorū
multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, vt ne su-
peretur à loco læso, neque per ferulas illisio fiat, neque pon-
dus, neque circuncirca inclinatio, neque effœminatio deli-
gamenti contingat. Longitudo verò & latitudo, trium, aut
quatuor, aut quinque, aut sex, cubitorum quidem longitu-
do, digitorum autè latitudo. Et affulcimenti circumductio-
nes tot sint, vt ne comprimant. Mollia verò & non crassa
sint hæc omnia, pro longitudine & latitudine, ac crassitudi-
dine partis affectæ. Ferulæ porrò sint leues, æquales, iuxta **E**

Ferulae.

extremitates simæ, hinc atque illinc paulò minores deliga-
tione, crassissimæ autè ea parte qua extat fractura. Quæcūq;
verò partes incuruæ sunt & excarnes, in his quæ præminent
cauendæ sunt, velut circa digitos & malleolos, aut positione
aut breuitate. Affulcimentis autem fulcire ac firmare o-
portet, non comprimere primū. Ceratum molle, & le-
ue, & purum sit. In aqua spectatur caliditas, multitu-
do. Caliditas, vt supra suam ipsius manum medicus affun-
dat. Multitudo, ad laxandum quidem & attenuandum, plu-
rima optima est. Verū ad incarnandum ac molliendum,
moderata. Moderatio autè in perfusione ea est, quòd dum
adhuc attollitur pars, priusquam confidat, desistere oportet. **F**
Primū enim attollitur. Postea verò attenuatur. Positio
sit mollis, æqualis, sursum vergens, in eminentibus corpo-
ris partibus, velut calcaneo, & coxa, vt neque refrangatur,
neque euertatur. Canalem toti potius cruri quàm dimidio
adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere oportet:
& reliqua quæ lædere solent, manifesta sunt. Exhibitio ve-
rò & distentio, & restitutio, & reliqua secundum naturam
fiant. Natura in operibus est: operis actione quid illa velit
coniectandum est. Ad hæc autem ex quiescente, ex commu-
ni, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso, resti-
tuciones considerare oportet, velut in manus figura. Ex com-
muni verò, extensionem & inflectionem, veluti figura cubiti
ad brachium, quæ prope ad angularem accedit. Ex consuetu-
dine,

Ceratum.

Aqua.

A dine, quod non alias figuras magis ferre possunt, velut cura extētionem. In hac enim figura plurimum tempus facili-
durarint, nulla facta immutatione. In imutatione verò ex
distentione, similia hæc habent, ad habitum aut positionem,
musculos, venas, neruos, ossa, & bene posita, & bene detenta.

Distentio.

Distentio fit maximè circa maxima, & crassissima, ac æ-
qualia, & vbi ambo ossa laxa sunt. Secūdo loco vbi subiectū,
minimè vbi supernum. Si verò magis moderato fiat, detri-
mentū affert: pueris exceptis. Oportet autem ipsa paululum
accliuia habere. Directionis exemplum, æquiuocum, con-
iugatum simile, sanum. Defrictio potest soluere, ligare, in-
carnare, minuere. Dura, ligare. Mollis soluere. Multa, minue-
re. Moderata, crassescere. Deligare verò oportet, primū

Defrictio.

B vt is qui deligatur, dicat, maximè se cōpressum esse circa læ-
sam partem, minimè circa extremas: & firmatum se esse, non
compressum, copia linteorum, non robore: & hac die ac no-
cte paulò magis, postridie minus, tertia laxè. Reperiat autem
postridie in extremis partibus tumor mollis. Tertia ve-
rò die deligatum solutum gracilius sit, atque hoc per omnes
deligationes. Secunda verò deligatione an iustè deliga-
tum apparuerit discere oportet. Hinc autem magis & pluri-
bus comprimatur. Tertia adhuc magis, itemque pluribus.
Septima verò à prima deligatione soluta, inueniantur gra-
cilia ossa ac depressa. At verò in ferulas deligata, si gracilia
& pruritus exortia, & sine vlcere fuerint, linere oportet vsq;
C ad dies viginti à læsione. Si verò quid suspectum sit, soluere
in medio tempore, & ferulas tertio quoque die firmare.

*Deligatio-
nis modus.*

Appensio, positio, deligatio, vt in eodem statu sint custo-
dire oportet. Figurarum summa hæc est, consuetudines, na-
turæ singulorum mēbrorum species excurrendo, ambulando,
stando, decumbendo, ex opere, ex remittendo. Nam vsus
corroborat, ocium autem colliquat. Aut compressione, aut
copia linteorum. Quæcunque verò effuso sanguine sugilla-
tiones, aut contusiones, aut vulsiones, aut tumores inflam-
mationis exortes, ex vulnere oboriuntur, ad supernam par-
tem plurimum, ad infernam etiam parum deligare oportet,
ita vt manum aut crus non habeat in decliue, & initium su-
pra vulnus ponat, ac maximè firmet, minimè extremas par-
tes, medio modo medias, vltimā partē ad supernam corporis

Figura.

HIPPOCRATIS CHIRURGIAE OF.

partes distribuendo. deligatione, cōpressione. Sed & hæc co- D
pia magis quàm robore. Maximè autem his lintea tenuia;
tenuia, mollia, pura, lata, sana debentur, vtpote sine ferulis:
& vberiore perfusione vti oportet. At verò elapsiones aut lu-
xationes, aut tortiones, aut distantia disparata, aut auulsio-
nes, aut abruptiones, aut distortionem, veluti mutilationes ad
alteram partem vergentes, vnde quidem excesserunt, remit-
tendo deligare oportet: quò verò accesserunt, intēdendo de-
ligamentum, vt ad contraria vergant deligata, etiam prius-
quam fuerint deligata, paulò magis quàm vt ex æquo sint, &
deligamentis, & splenis, & appensionibus, & figuris, exten-
sione, defriktione, directione: & hic etiam vberiore perfusio-
ne. Cæterum imminutiones multam sanam partem occupā- E
do deligare oportet, vt ex influxione qua colliquata plus
quàm sua spōte imminuta sunt, alia delegatione permutata
ad augmentum declinent, & carniū efformationem faciāt.
Melius autem est, vt & superna pars simul deligetur, velut ti-
bia, & femorū, & alterum crus cum sano crure, quo simi-
lius sit, & similiter quiescat, & similiter alimētū excludant,
& suscipiant. Linteorum verò copia, non cōpressionem vtē-
dum est, remittendo primū id quod maximè opus habet,
& vtendo defriktionem incarnante, & perfusione absq; ferulis;

*Fulcimenta
quibus a-
pienda.*

Fulcimenta porro ac stabilimenta adhibere oportet, ve-
luti pectori, costis, capiti, & alijs quæ eiusmodi sunt: partim
pulsuum gratia, vt ne concutiantur: partim etiam distantia-
rum disparatarum gratia, circa iuncturas, in ossibus capitia, F
quo firmentur. Et in tussibus, aut sternutationibus, aut alio
motu, qualia sunt circa thoracem & caput stabilimenta. Ho-
rum omnium eadem sunt deligationis commodationes.
Qua enim parte lēiones sunt, maximè comprimendum est.
Supponere igitur oportet lanam mollem, affectioni conue-
nientem: deligare verò non amplius comprimendo, vt ne
pulsus concutiat: neque amplius quàm vt distantiam iun-
cturarum extremitates mutuò se contingant. Neque vt tus-
ses & sternutationes fiat, sed vt prohibeantur stabilimentū
adhibeatur, quo neque cogatur quid, neque concutiat.

HIPPO

AHIPPOCRATIS

COILIBER DE FRACTV-

RIS. ANNO CORNARIO

DICO PHYSICO IN-

TERPRETE,



Portet medicum & luxationum, & fractur-
rarum extensiones quàm directissimas fa-
cere. Hæc enim iustissima natura est. Si ve-
rò quid vel hac, vel illac inclinarit, ad pro-
nam partem vergere cōuenit. Minus enim
hoc peccatū est quàm ad supinam. Qui igitur
nihil præmeditati sunt, plerunq; nihil

*Quæ medi-
cus in his
præstare
debeat.*

peccant. Ipse enim qui deligatur, manū porrigit, vt qui ita à
iusta natura cogatur. Qui vero sapiētes sibi videntur medici,
hi sunt oimiriū qui peccāt. Studij igitur nō multi est manū
fractam tractare, & quilibet vt ita dicā, medicus hoc potest.
Verūm cogor plura de hoc scribere, quod sciā medicos esse,
qui sibi sapiētes esse videntur ex figuris manus in deligatio-
ne, ex quibus ipsos indoctos esse putare oportebat. Sed enim
multa in hac arte hoc modo iudicātur. Quod enim peregrini-
um est, quum nondum intellexerint an bonū sit, magis lau-
dant quàm familiare, quod iam bonū esse sciunt: & alienum
magis laudant quàm probè notū. Dicendum igitur, quænam
medicorū peccata de natura manus, tum dedocere, tum do-
cere velim. Nam & aliorū corporis ossiū doctrinā hic sermo
affert. Manū itaq; de qua nobis sermo est, quidam pronā de-
ligandam dedit, ille verò cogebar sic tenere velut sagittātes,
quū humerū iniiciunt, atq; ita habentē deligabat: hoc ipsum
illi secundum naturā esse existimans. & in testimoniū addu-
cebat, tum omnia cubiti ossa, quòd directionem inter se ha-
berent, tum coloris cōcordiam, quod ipsa per seipsam recti-
tudinē haberet, idque hoc modo & externa & interna parte.
Hoc modo etiā dicebat & carnes, & neruos, à natura, produ-
ctos esse, & artem sagittandi in testimoniū citabat. & hæc di-

*Medicos
imperitos
taxat.*

HIPPOCRATIS LIBER

cēns ac faciens, sapiens esse sibi videbatur. Verūm aliarū ar- D
 tium oblitus erat, & eorum quæ robore, & eorum quæ arti-
 ficijs operantur ac efficiunt: non animaduertens aliā in alio
 figuram secundum naturam esse, & in eodem opere aliās de-
 xtræ manus figuras secundum naturā esse, aliās sinistræ, si ita
 contingat. Alia enim figura in iaculatione secundum naturā
 est, alia in fundæ iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu,
 alia in quiescendo. Quot verò artes inuenire quis possit, in
 quibus non eadem figura manū naturalis est? & in vnaqua-
 que arte, aliter ad instrumentū quod quisq; habet, & ad opus
 quod perficere vult manus figurantur. Ei verò qui sagittandi
 artem exercet, hanc figuram alterius manus optimā esse con-
 sentaneū est. Cardiniformis enim brachij pars, in cubiti se- E
 de in hac figura innitens, ossibus cubiti & brachij rectitudi-
 nem facit, veluti tortū vnum esset. & refractio articuli fracta
 est in hac figura. Verisimile est igitur hoc modo minimè fle-
 xibilem & rigidissimum esse hunc locū, & non superari, ne-
 que remittere, dum à dextra manu nervus trahitur. & sic ner-
 uum quidē quā plurimū trahet, à firmissimo verò ac con-
 fertissimo emittet. Ex talibus enim sagittarū emissionibus,
 celeres & vehementiæ, & longinquitates fiunt. Deligatio-
 verò cum arte sagittandi nihil cōmune est. Nam & vbi deli-
 gavit, si manū ita habiturus esset, multos utiq; dolores ma-
 iores vulnere adderet: & si flectere iuberet, neque ossa, neq;
 nerui, neq; carnes in eodem permanerent, sed superata deli-
 gatione aliò transferrentur. Et quæ tandem est figuræ sagit- F
 tarij vtilitas? Et in hac parte fortasse non peccaret is qui sibi
 sapiens esse viderur, si ipsum vulneratū sibi manum exhibe-
 re permetteret. Alius porrò medicus supinam manum præ-
 bens, ita extendere iubebat, atq; hoc modo habentē deliga-
 bat, hanc figurā naturalem esse putans, coniectura ex colore
 facta: & ossa hoc modo secundum naturā esse existimans, eo
 quod os eminēs circa manus iuncturā, vbi parvus digitus est,
 ē directo esse apparet eius ossis, ex quo vnam homines me-
 tiuntur. & hæc testimonia adducebat, quod secundum natu-
 ram hoc modo figura se haberet. & rectè dicere putabatur.
 At verò siquidē manus supina extendatur, vehementer utiq;
 doluerit. Cognoscere autem poterit hoc quisq; sua manu ita
 extenta, quod dolorosa est hæc figura. Nā & debiliior vir, for-
 tio

*Modus a-
lius deligan-
di.*

A tiores ita manibus suis comprehensum, vt cubiti flexura supina frangitur, quocunq; voluerit duxerit. Neq; enim si gladium in hac manu habeat, eo vti poterit, adeo violēta hęc figura est. Deinde si vbi deligauit quis, in hac figura sinat, maior quidem dolor vbi obambularit, magnus autē etiam vbi decubuerit, sentietur. Quin & flectere manum si opus fuerit, omnino necesse est & musculos & ossa aliam figuram habere. Sed & citra reliquā perniciem, in hac figura hęc ignorabat. Os enim circa iuncturam manus eminēs, iuxta paruum digitum, hoc quidē cubiti est. Quod verò in flexura est, a quo vlnā homines metiuntur, id brachij caput est. Ille verò idem os esse, & hoc & illud putabat: itemq; multi alij. Est autē idē

B cum illo, is qui cubitus siue cubiti gibbus vocatur, in quē innitimur. Si quis igitur ita supinam manus habeat, tunc & os distortum apparet, & nerui à manus iunctura tendentes, ex interna parte & de digitis, distorti sūt. Tendūt enim hi nerui ad os brachij, vnde vlna mensuratur. Tanta sanē ac talia sunt peccata, & ignorantia naturæ manus. Si verò velut ego iubeo, manum fractam quis extēdat, os quidem quod est circa paruum digitum, ad cubiti flexuram tendens, in directum conuertet, rectitudinem verò habebunt nerui à manus iunctura ad brachij summas partes tendētes: & manus dum appensa excipitur, in consimili figura erit, in quali etiam erat dum deligaretur, ita vt neque ambulanti, neque decumbēti, vllus dolor aut fatigatio accedat. Desidere verò hominē ita oportet, vt ossis pars ad clarissimā præsentem lucē constituat, ne is qui extensionē tractat circa sufficientē directionem fallatur. Nam periti artificis manum admotam, ne os quidē eminēs in cōtactu latere poterit. Porro ex cubitu dīsibus vbi non ambo fracta sunt, facilior curatio est, si supernū os sauciatum est, etiam si crassius id existat: partim quòd sanū subtentum fundamenti loco ipsi est, partim quòd facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturam sauciari contigerit. Crassa enim est caro quæ supernē innascitur. Infernum verò os ex carne est, & non faciliē occultari potest, & vehemētiore extensione opus habet. Si verò hoc cōtritum non fuerit, sed alterum illud, vilior extensio sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extensione opus habent. In puero etenim vidi extenta magis quā oportebat. Verum pleriq; minus quā

*Cubiti ossa
si fracta
fuerint.*

oportet extenduntur. Conuenit autem facta extensione, vo- D
Deligatio. lis ad motis dirigere : deinde cerato illito non ita multo, vt
 ne deligamenta circumfluitent, ita deligare, vt summā manū
 non inferius cubiti flexura habeat, sed etiam paulo superius
 ne ad summā partem sanguis influat, sed intercipiatur. Post-
 ea linteo deligare, initio eius supra fracturam iniecto, ita vt
 firmet quidem, nō tamen admodū premat. Postquā autē cir-
 cundedit eodem loco bis aut ter, ad supernā partem deligās
 distribuat, quo sanguinis influxiones intercipientur, & illie
 desinat. Conuenit autem prima linteā non esse longa. Secū-
 dorum verò linteorū initium supra fracturam iniicere, ita vt
 semel circundet eodē loco, deinde deorsum distribuat, & mi-
 nus premēs, & magis traducēs, quo linteum ipsi sufficiens sit, E
 ad recurrendū eo vbi alterum desinit. Hic igitur linteā ad si-
 nistram, aut dextrā deligētur, aut ad vtrā partē cōtulerit ad
 fracturæ figuram, & in vtram declinare expedierit. Postea ve-
 rō splenia extēdere oportet modico cerato illita. Nam sic &
 mitius & stabilius se habēt. Deinde sic linteis deligare alter-
 natim, modo in dextrā, modo in sinistram: & plerunq; infer-
 nē initio facto, sursum ducere aliquādo etiam supernē deor-
 sum. Extremitatēs autē subaridas, & in acutū abeuntes, sple-
 nijs obuolutis curare oportet, ita vt copia opertiorū non
 totū acervatim, sed particulatim corrigat. Insuper autem cir-
 ca manus iuncturā siue articulum laxē circundare splenia o-
 portet aliās atq; aliās. Copia verò linteorum sufficiens pri-
 mū, dux partes sunt. Signa autē bene curati, & terminus re- F
 ctē deligati, hæc sunt: si interrogaueris ipsum an compressus
 sit, & si cōpressum quidē se esse dixerit, sed leniter, & maxi-
 mē circa ipsam fracturā. Huiusmodi ita facta esse perpetuū
 dicere oportet eum qui rectē deligatur. Signa verò medio-
 critatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est ipse sibi ip-
 si videatur non minus, sed magis compressus esse. Postridiē
 verò tumorem paruum, mollem, ad summam manum obor-
 tum esse. Mediocritatis enim factæ à te compressionis si-
 gnum hoc est. Desinente autem die minus compressus esse
 sibi videatur. Tertia verò die deligamenta laxa esse ipsi vi-
 deantur. Et si quid horum iam relatorum defecerit, nosce-
 re oportet deligationem moderata laxiorem esse. Si verò
 quid ex relatis abundauerit, nosse oportet ultra modum
 compress

A compressum esse. Et ex his coniectura facta, postea deligans aut laxabis, aut comprimes magis. Resoluere autem oportet tertia die, vbi extēderis. Et si primū moderatē deligasti, hāc deligationem paulo magis quā illā cōprimere oportet, & initia supra fracturā iniicere, quemadmodū etiā antea. Si qui dem enim hanc prius deligaueris, sanies ex hac ad extremi tates hinc atq; illinc exhauritur. Si verō aliquā aliam partē prius cōpresseris, in illā ex cōpressa exhauritur: Intelligen tia autē ad multa vtilis existit. Sic igitur semper incipere o portet & deligationē, & cōpressionem ex hoc loco. Reliqua verō iuxta rationem, ita vt quāto lōgius à fractura digressus fueris, minus cōprimas, nunquā quidem laxa omnino circū dādo, sed adhærentia. Postea verō pluribus linteis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, dicat se paulo magis cōpressum esse q̄ prius, & præsertim circa fra cturā. Sed & alia, & circa tumorem, & circa dolorem, & circa alleuationē, pro prioris deligationis ratione fiant. Postquam verō tertius iam aderit dies, laxiora esse ipsi videant deliga menta. Deinde soluere oportet, & rursus paulo magis com primendo deligare, & hoc cum omnibus linteis quibus deli gendus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quæ etiam in primis deligationum circuitibus contigerant. Vbi verō tertius aderit dies, & septimus à prima deligatione, si quidem rectē deligatus fuerit, tumor in summo manu, atq; hic non valde magnus erit: locus autem qui deligatur, in om nibus deligationibus tenuior ac gracilior cōperietur: Ve rūm in septimo etiam valde tenuis, & ossa fracta magis mo uentur, & facilius ad correctionem ducuntur. Et si hæc hu iusmodi fuerint, facta coaptatione velut ad ferulas adhiben das deligare oportet, paulo magis cōprimendo quā antea, si nō dolor aliquis maior fuerit ex tumore qui est in summa manu. Postquam autem linteis deligaueris, ferulas circum ponere oportet, & vinculis quā laxissimis circū dare, quie tis saltē gratia, vt ferularum appositio ad compressionē ma nus nihil faciat. Postea verō & dolor, & alleuatio, eodem mo do fiant, velut in primis deligationū circuitibus. At verō vbi tertio die laxas esse dixerit, tunc postea ferulas firmare opor tet, maxime quidem circa fracturam, sed & alia iuxta ratio nem, si quidem & deligatio magis laxa fuerit quā compri

*Ferula quā
do apponē
da.*

mat. Crassissimam autem ferulā esse oportet, qua parte ex- **D**
 tat fractura, non tamen multum, Et ad hoc studium vel ma-
 ximè adhibendum est, vt ferula ē directo magni digiti non
 ponatur, sed hac vel illac: imò neq; à directo parui digiti,
 qua parte os superminet in manus articulo, sed hac vel illac.
 Quod si ad fracturam conferat, hac parte aliquas ferulas po-
 ni, breuiores ipsas alijs esse oportet, vt ne perueniant ad ossa
 præminencia, iuxta manus articulum. Periculum est enim vl-
 cerationis, & denudationis neruorum. Oportet autem tertio
 quoq; die ferulis valde leniter firmare, hoc cogitantes, quòd
 ferulæ deligationis conseruandæ gratia apponuntur, non au-
 tem compressionis gratia alligantur. Si quidem igitur pro-
 bè noueris, quòd in prioribus deligationibus ossa sufficien- **I**
 ter sunt directæ, & neq; puritus infestent, neq; vlla aliqua vl-
 ceratio suspecta sit: ita cum ferulis deligatum sinere oportet
 donec viginti dies transgressus fuerit. In triginta enim die-
 bus vniuersis maximè ex toto cubiti ossa corroborant. Cer-
 tum tamen nihil est. Nam & natura à natura, & ætas ab æta-
 re valde differt. Postquam autem solueris, aquam calidam if-
 fundere oportet, & postea deligare, paulo minus comprime-
 do quàm antea, & paucioribus linteis quàm prius. Et postea
 tertio quoq; die soluere, ac rursus deligare, ita vt minus com-
 primas, & paucioribus linteis vtaris. At verò si vbi ferulis de-
 ligatus est, ossa nō rectè posita esse suspiceris, aut aliud quid
 vulneratū vexet, in dimidio temporis spatio, aut paulo prius
 soluere, & rursus deligare oportet. **F**
 Victus porro his quibus
 ab initio vlcera non facta fuerint, neq; ossa extra eminēt, suf-
 ficat aliquanto simplicior. Verum pauciore victu vtendū est
 ipsis, vsq; ad diem decimum, vt qui iam etiam quiescant: &
 obsonijs tenellis vtendum, quæ transiui mediocritatem ex-
 hibent. A vino verò & carnis esu abstinendum. Postea tamē
 sensim progressu facto reficiēdi sunt, Hic sermo velut lex ius-
 ta posita est de fracturarum curatione, & quomodo tractare
 oporteat, & quomodo euentus sequi, ex iusta tractatione,
 Quicquid verò non ita euentum habuerit, scire oportet, q̄ in
 tractatione quid defectuose, aut redūdāter factū est. **Quin**
 & hæc insuper in hoc simplici modo cōsiderare oportet, quæ
 non ita valde curare solent medici, & quidem quum omnē
 curationem, & totā deligationē corrumpere possint, si nō
 rectè

*Victus ho-
rum qualis.*

20101111

A rectè fiant. Si enim ambo ossa fracta fuerint, aut infernum so-
lum: is verò qui deligatus est, in fascia quadam manum exce-
ptam ac appensam habeat, & plurima fasciæ pars circa fractu-
ram existit, ita vt manus hinc atque hinc pendeat: hunc ne-
cesse est reperiri os ad supernam partem distortum habentè.
Si verò sic fractis ossibus, & summam manum in fascia ha-
bet, & partem iuxta cubiti flexuram: reliqua verò cubiti pars
non sit eleuata: hic ad infernam partem os distortum habere
comperietur. Proinde in fascia molli latitudinē habēte ma-
ximam cubiti partem, & manus articulum, æqualiter suspen-
dere ac eleuata gestare oportet. At verò si brachium fractum
fuerit, si quidem quis extentam manum in hac figura exten-
B dat, musculus brachij extētus deligabitur. Postquam autem
deligatus cubiti flexuram inflexerit, musculus brachij aliam
figuram habebit. Iustissima igitur brachij extensio hæc est.
Lignum cubitale aut paulo breuius, qualia sunt ligna quæ in
foramina ligonū immittuntur, suspendere oportet, hinc atq;
illinc catena deligatum. Hominem verò in alta quapiam se-
de collocatum, ita manu superincumbere oportet, vt lignum
id sub ala sit moderatè habens, vt homo vix sedere possit, &
ferè subleuatus sit, supposito postea alio quopiā fulcimento,
& coriaceo puluino vno aut pluribus subiectis, quo modera-
tam altitudinem habeat cubitus, ad rectū angulum obliqua-
tus. optimum quidem est corium latum ac molle, aut fasciā
latam circundare, & magnum aliquod pondus appendere,
C quod moderatè intēdere possit. Sin minus, vir aliquis robu-
stus in hac figura cubiti, circa cubiti flexuram deorsum co-
gat. At verò medicus erectus stans, & alterū pedem in altio-
re quopiam habens, aggressionem faciat, ita vt volis os diri-
gat ac componat: facile autem dirigetur. Nam hæc extensio
bona est, si quis ipsam rectè præparèt. Deinde deliget fascia-
rum principijs supra fracturā injectis: & reliqua omnia, quæ
admodum prius monuimus, tractet: & easdem interrogatio-
nes faciat. & ipsdē signis vtatur, an moderatè habeat, aut se-
cus. Et per tertium diem deliget, & magis comprimat. Et se-
ptima aut nona die cum ferulis deliget. Et si suspicionem ha-
beat, os non bene positum esse, intermedio tēpore soluat, &
vbi probè collocauit, rursus deliget. Corroboratur autē ma-
xime os brachij in xl. diebus. Postquam verò hos excesserit,

*Qui brachi-
um fractū
coaptetur.*

*Quoto tem-
pore brachi-
um fractū
coalescat.*

HIPPOCRATIS LIBER

soluere oportet, & minus comprimere, & paucioribus quoq; **D**
 linteis deligare. Caterum victū quendā exquisitiōē quā
 prius constituere oportet, & ad longius tēpus. Eius verò con
 iecturam facere oportet, ad tumoris qui in summa manu est
 robor respiciendo. Insuper autem & ad hęc animum aduer
 tere oportet: q̄ brachium à natura ad externam partem in
curuatum est, & distorqueri solet, si non bene curetur. Sed &
 alia omnia ossa, quæ à natura ad hanc partem distorta sunt,
 etiam dum curantur vbi fracta sunt, distorqueri solent. Vbi
 igitur tale quippiā in suspiciōē venerit, lassa insuper fascia
 brachium circūcirca complecti oportet, & circum pectus de
 ligare: & vbi quiescere volet, inter cubiti flexuram & costas,
 splenium quoddam multiplex conuolutum ac complicatum **E**
 supponere: aut aliud quid quod huic simile existat. Hoc em̄
 modo incuruatio ossis recta euadet. Cauere tamen oportet,

*Pes & ossa
 eius fracta
 quæ curantur.*

vt ne minus ad internam partem vergat. Pes verò hominis
 ex multis ac paruis ossibus compositus est, quemadmodum
 etiam summa manus. Franguntur quidem non ita valde hec
 ossa, si non vnā cum corpore, ab acuto aliquo aut graui vul
 nerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in vlce
 rationum parte refertur. Si verò quid è loco suo motū fuerit,
 aut digitorum articulus, aut aliud quoddam ex ossibus sum
 mi pedis, vnumquodq; in suum locum cogere oportet, quem
 admodum & ea quæ in manu sunt. Curare verò oportet cera
 to, & splenijs, & linteis velut etiam fracturas, exceptis feru
 lis, eodem modo comprimendo, & per tertium diem deligāp
 do. Interrogetur item is qui deligatur similiter, velut in fra

*Quoto tem
 pore hæc sa
 nescant.*

cturis, & de cōpessione facta, & an laxa sit deligatio. At ve
 rò sana fiunt in xx. diebus perfectè omnia, exceptis his quæ
 cum tibiæ ossibus communionem habēt, & cum ipsa è dire
 cto. Conducit autem hoc tempore decumbere. At non tole
 rant continentes morbum. Verum priusquā sani fiant obam
 bulant: & propterea plurimi non perfectè sanantur, sed dor
 lor ipsos sæpe meritò commouefacit. Totum enim corporis
 pondus pedes vehunt. Quum igitur nondū sani iter faciunt,
 articuli moti malè curantur, ideoq; aliàs atq; aliàs hi qui ad
 tibiā sunt, dolēt. Quæ verò cum tibiæ ossibus cōmunionem
 habent & maiora alijs sunt, & vbi hæc mota sunt, diuturnio
 rem medelam requirunt. Curatio tamen eadem est. Verum
 linteis

A linteis & splenijs pluribus uti oportet: Et in totū hinc atque illinc deligare, cōprimere item velut alia omnia, ea maximè parte qua emota sunt, & primas quoq; linteorū obuolutiones eodem modo facere. In vnaqua; verò resolutione, multa, calida aqua uti oportet. In omnibus em̃ circa articulos lesionibus, multa aqua calida affundenda est. Ceterū cōpressiones & laxationes in ijsdem tēporibus eadem signa ostendunt, quæ in superioribus: & religationes eodē fiant. Sani verò perfectè hi sūt in xl. maximè diebus, si decumbere sustinuerint. Sin minus, eadē patiuntur quæ prius relata sunt, & adhuc amplius. Porro quicunq; saltu de alto quopiam loco factō, in calcaneū vehementer se fulciuerunt, his ossa quidē disparantur, venulæ verò sanguinē effundunt, carne circa os cōrūsa, tumor autem accedit, & dolor multus. Os enim hoc parū non est, & supereminet quidem sub tibiæ rectitudinē, cōmunionem verò habet cum venis ac nervis principalibus. Tendo autem posterior huic ossi annectitur. Hos curare oportet cerato, & splenijs, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiam alijs quā optimis ac lenissimis. & si quidē mollis fuerit à natura cutis circū calcaneum, sic sinere oportet. Si verò crassa & dura veluti quidā habent, incidere oportet, æqualiter, & attenuare, ita tamē ut ne vulneretur. At verò talia bene deligare non cuiusvis est. Si enim deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligantur, ita ut aliquando circū pedem, aliquando circum tendinem, fasciæ circūdentur: hæ cōstrictiones calcaneū separant: qua parte contusio facta est. Atq; ita periculum est, ne calcanei os corrumpatur: & sanè si corruptum fuerit per omne ævum morbus durare potest. Nā & alia quæ non ex tali modo sunt, ipsum corrumpūt, sed in decubitu denigrato calcaneo, ex figuræ neglectu: aut in tibiæ vulnere fiente periculoso, ac diuturno, & communionem cum calcaneo habente: aut in femore: aut ubi ex alio morbo diuturnus decubitus contingit. Attamen & talibus diuturnæ ac molestæ affectiones sūt, & quæ sæpe refringantur, si nō bona diligentia, & multa quiete curentur. Quare etiā ea quæ ex tali modo corrumpuntur, supra aliquā læsionem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuosæ, mentem contingentes, paucis diebus durantes ac

*Qui de alto
desilunt.*

*Curatio.
horum.*

occidea

HIPPOCRATIS LIBER

occidentes. Fieri etiam possunt venarum sanguifluarū liuo- D
res, venarum nausæ, & cancerationes ex compressione. Fieri
autem possunt hæc absque alia corruptione. Atque hæc qui-
dem relata sunt, ubi vehementissimæ contusiones sunt. Plu-
rima tamen leniter circumcirca contunduntur, neque vllum
magnum curationis studium exigunt, sed rectè tamē tracta-
re oportet. Quū verò vehemens in fulciēdo illisio facta esse
visa fuerit, tūc sanè relata facere cōuenit, & deligationē plu-
rimam facere circum calcaneum obuolutam, ita ut aliquan-
do ad summas pedis partes, aliquando ad medias, aliquando
ad tibiæ partes, ex appposito lintea obuoluantur. Deligare in-
super oportet & vicina omnia, hinc atque illinc, velut etiam
prius dictum est, & vehementem compressionem non face- E
re, sed cum multis linteis. Præstat autem & veratrum biben-
dum dare eadem die, aut postridiē : & tertia die resoluerē ac
rursus deligare. Signa porro an recrudescant, aut non, hæc
sunt. Quum sanguis ē venis effusus, & denigrationes, & his
vicina, fiunt subrubra & subdura, periculum est ne recrudē-
scant. At si quidem febre careat, sursum purgans medicamē-
tum dandum est, velut dictum est : itemque si non continua
febre laboret. Si verò continua fuerit febris, medicamen-
tum dandum non est. Verūm & à cibis, & à sorbitionibus
abstinendum. Potu verò vtendum aqua, non vino, sed fauo-
rum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si verò non re-
crudescant, sanguis ē venis effusus. & denigrationes, & vici-
næ partes, cum virore subpallidæ fiēt, & non duræ. & bo- F
num est hoc testimonium in omnibus sugillatis, sanguine ē
venis subter cutem effuso, quod non recrudescant. Quæcun-
que verò cum duricia liuescunt, ea ut denigrescant, pericu-
lum est. Cæterum hoc studio habere oportet, ut pes ple-
runq; paulo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autē fieri
poterit in sexaginta diebus, si quieuerit. At verò tibiæ duo
ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius
est, illa verò parte nō multo tenuius. Cohærent autem inter
se iuxta pedem, & appendicem communē habent. Verūm in
rectitudine tibiæ non cohærent. Iuxta femur autē cohærēt,
& appendicem habent, & appendix discriminationem. Lon-
gius verò paulo alterum os est, quod secundum paruum di-
gitum est. Et talis quidem est natura ossium in tibia. Luxan-
tur aut

Tibiæ ossa.

- A** tur autem aliquando iuxta pedem ambo ossa, quandoque cum appendice, quandoque verò appendix tantum emouetur, quādoq; alterū tantū os. Hæc autē minūs molesta sunt, quā ea quæ in articulo manus existūt, si quiescere homines sustineāt. Curatio vero cōsimilis est velut illorū. Nam & repositionē ex extēsiōe, velut in illis facere oportet. Verū vehementiore extensione opus habēt, quāto fortius est ea parte corpus. Plerūq; tamē sufficiūt viri duo, alter hinc alter illinc extēdentes. Si verò nō satis robusti fuerint, facile est vehementiorē extensionē facere. Aut enim rotæ modiolū, aut aliud quid huic simile defodere oportet, & molle quiddā pedi circūdare, & postea latis bubulis loris pede deligato, principia lororū aut ad pistillū, aut ad aliud lignū alligare, atq; ita ligno in summū modiolū indito refringere, ita vt alij cōtra extēdant humeris & poplite apprehēsis. potest etiā superna corporis pars necessitate hac extensionis vrgeri, partim quidē si ita voles, ligno rotūdo leuigato altē defosso, partem quandā ipsius supereminētē intra crura iuxta ani & scorti intercapedinē applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui à pedibus extendunt. Deinde ad crus quod extenditur declinare non oportet, sed aliquem à latere asidere, qui nates retrudat, ne corpus circūtrahatur: partim verò si etiā circa alas hinc atque illinc ligna affigantur, manus autē extēta seruentur, apprehendat autem quis circa genu, atque ita cōtra extēdat: partim item si quis velit, alijs loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modio supra caput defosso, & loris ex ligno quopiā alligatis, & ligno ita in rotæ modiolū defixo, ad contrariā partem his qui à pedibus extendunt, adtrahere potest. Quin & si voles, pro rotarum modiolis trabem mediocrem sub lectum extēdes, deinde ad trabis hinc atq; illinc caput ligna fulciens ac refringens, lora ipsis alligata intendes. Si verò & hoc velis, asellis hinc atque illinc constitutis, in ipsis extensionē facies. Sunt autem & alij multi extensionum modi. Optimum autem fuerit, si quis in magna ciuitate medicum agit, vt lignū habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articulorum repositiones, ex extensione, ac vectium vsu. Satis autem est si lignum fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudine tale, quales columnæ quernæ

*Tibiæ ossa
quæ luxan-
tur.*

quernæ quadrangulæ sunt. Postquàm autè sufficienter ex- **D**
tenderis, facile iam est articulum reponere. Eleuatur enim
in directum supra pristinam sedem. Dirigere itaq; manuum
volis oportet, ita vt his partim in id quod eluxatum eminet
innitaris, partim ab altera parte infra malleolum renitaris.
Vbi verò reposueris, si quidem fieri poterit, extensum ita de-
ligabis. Si verò præ loris impediaris, his exolutis distentionē
facias, donec deligaueris. Deligare autem eodē modo oportet,
& fasciarum initijs similiter in id quod luxatum eminet
iniectis, & primis obuolutionibus plurimis suprà id factis,
imò etiam splenijs plurimis supra id impositis, & compres-
sione maximè isthic fiēte. Sed & hinc atque illinc multum
insuper deligare oportet. Magis autem hic articulus cōpres- **E**
sione opus habet, in prima deligatione, quàm is qui in manu
est. Postquàm autem deligaueris, sublimius reliquo corpore
deligatam partem habeat. Positum autem ipsius ita facere
oportet, quo quàm minimè pes dependeat. At verò attenua-
tionem corporis ita facere oportet, prout talem vel talem
vim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parum, aliqua multum
luxantur. In totum verò magis & longiore tempore, in vul-
neribus circa crura, quàm his quæ circa manus sunt, at-
nuare oportet. Nā & maiora & crassiora hæc quàm illa sunt;
& sanè etiā necessarium est quiescere corpus ac decumbere.
Verum postea deligare articulum tertia die, neque prohibet
quicquam, neq; vrget. & alia omnia similiter velut superius
relata curare oportet. Et si quidem quietè decumbet, suffi- **F**
cient quadraginta dies, si solùm in suum locum ossa rursus
desederint. Si verò quiescere nolet, non facilè quidem crure
vti poterit, & deligatione ad multum tempus vtī cogetur.
Quæcunq; verò ossa nō perfectè desident in suum locum, sed
aliquid deficit, progressu tēporis attenuatur coxa, & femur &
tibia. Et si quidē intro luxata fuerint, externa pars attenua-
tur. Si verò extra, interna. Plurima autem ad internam par-
tem luxatur. Postquàm verò ambo tibiæ ossa fracta fuerint,
citra exulcerationē, extensione vehementiore opus habent.
Extendere autem oportet quibusdam modis ex prædictis, si
magnæ emotiones fuerint. Sufficiunt etiam à viri fientes
extensiones. Plerumque enim suffecerint duo viri robusti, al-
ter hinc, alter illinc distendentes. Intendere autem oportet

*Tibiæ utra-
que ossa cū
fracta sunt.*

- A** in directū, secundū naturā, & secundum rectitudinē tibię ac femoris, siue tibię fractę, siue femoris ossa extēderis. Sed & deligare sic oportet vtriusq; extētis, vtrū tandē horū deligaueris. Nō enim eadē cruri & manui cōferunt. Nam vbi cubiti & brachij ossa fracta fuerint deligata, manus appensa excipitur. At si extenta deligaueris, figurę carniū alterantur inter flectendum in cubiti flexura. Fieri enim non potest, vt cubiti flexura ad multum tempus maneat extēta. Non enim sæpe in hac figura, sed in flexione esse consuevit. Quin & quum homines obambulare possint, vbi circa manum sauciati fuerint, opus habent flexione in cubiti flexura. At crus quum & in ambulando, & in stando consuevit, aliquando quidem extentum esse, aliquando verò ferè extentum esse, ad infernam partem secundum naturā: & sanè etiam ad hoc vt reliquum corpus vehat: propterea facile est ipsi extentum esse, vbi eius necessitatem habuerit. Quin & in cubilibus sæpe in hac figura est, vt videlicet sit extentum. Pōstquam autem vulneratum fuerit, necessitas animi propositum in seruitutem adigit. Impotētes enim fiunt ad se attollendum, adeo vt ne meminerint quidem, vt inflectant ac exurgant, sed quiescunt in hac figura decumbētes. Propter has igitur causas, neq; extensionis, neq; deligationis figura eadem, manul & cruri conducit. Si quidem igitur suffecerit extensio quæ per viros sit, nihil aliud laboris frustra insumere oportet. Imperitiam enim arguit. machinas adhibere vbi ipsi nō est opus. Si verò non sufficiens fuerit extensio per viros, etiam ex alijs necessarijs quædam adhibere oportet, si quæ commoda fuerint. Quum autē satis iam extenta fuerint, facile est dirigere ossa, & ad naturam reducere, manuum volis ac palmis corrigendo ac coaptando. Vbi verò direxeris, linteis deligare extēta, siue ad dextram partem, siue ad sinistrā, circumducere prima lintea conducatur. Initia autem ipforum supra fracturam iniiciantur, & circū hanc primæ quoq; obuolutiones circumducantur, deinde deligando sursum ad tibiā distribuuntur, velut in fracturis dictum est. Cæterum lintea latiora esse oportet, & lōgiora, eaq; multò plura circa crus quàm in manu. Vbi verò deligaueris, super planum quoddam & molle deponere conuenit, vt neq; hac, neque illac distorqueatur: neque repandum, neque gibbum fiat. Maximè autem cōfert puluin

HIPPOCRATIS LIBER

*Canales an
sint suppo-
nendi.*

puluinar, aut lineum, aut laneum non durum, laxū, per me- **D**
dium secundum longitudinē subiectum, aut aliud quid quod
huic simile existit. Nam de canalibus qui sub crura fracta
subijciuntur, quid consulam ambigo, an supponere ipsos cō-
ueniat, aut non: profunt enim, non tamen quantum putāt hi
qui ipsos supponunt. Non enim quiescere cogunt canales, ve-
lut illi putant. Nam neq; dum reliquum corpus aut hāc, aut
illāc vertitur, cogit canalis ut crus ne sequatur, si nō ipse ho-
mo huius rei curam habeat: Neque rursus absq; corpore crus
moueri canalis prohibet, vel in hāc, vel in illam partē. Quin
& crudelius est lignum subijcere, si non simul molle quiddā
in ipsum indatur. At utilissimum est in strato permutando,
& in progressibus ad aluum exonerandam. Licet igitur & **E**
cum canali, & sine canali, & bene, & malē rem moliri. Verū
vulgō persuasum est, etiam medicum minus delinquere, si
canalis subijciatur, etiam si minus hoc artem referat. Opor-
tet enim super plano quopiam ac molli cubare crus ipsum,
penitus in directum: alioqui necesse est deligationem su-
perari à distortionē, quā in positu contingit, quocunque &
quantumcunque tandem inclinari. Respondeat autem deli-
gatus eadem quā etiam prius dicta sunt. Nam & deligatio-
nem talem esse oportet, & tumorem ita attolli ad extremas
partes, & laxationes ita, & religationes per tertium diem: &
quod deligatur gracilius inueniri, & deligationes magis fa-
cere, & pluribus linteis, & circumdare pedem laxē, si nō vul-
nus valde propinquum genu fuerit. Extendere autem mo- **F**
deratē, & dirigere ossa, in vnaquaque deligatione oportet.
Si enim rectē curetur, & tumor secundum rationem proce-
dat: tum locus qui deligatur tenuior ac gracilior erit, tum
ossa adducta faciliora, & extensioni magis obedientia. Post-
quam autem septimus aut vndecimus aderit dies, ferulas ap-
ponere oportet, quemadmodum & in alijs fracturis dictum
est. Ceterum ferularum locationes vitare oportet, & se-
cundum malleorum rectitudinem, & supra tēdinem, qui est
in tibia pedis. At tibiæ ossa corroborantur in quadraginta
diebus, si rectē curentur. Si verō suspicionem habeas, os ali-
quod directione opus habere: aut de vlceratione aliqua ti-
meas, intermedio tempore soluere, & probē coaptata reli-
garē oportet. Porro si alterum tibiæ os fractum fuerit, ex-
tensione

*Ferulae quā
do apponen-
da.*

*Tibiæ ossis
coaptatione
quora*

A tensione quidem debiliore opus habet, non tamen deficere, neque segniter agere, in extendendo conuenit: & maximè quidem omnes fracturas in prima deligatione, quātum eius fieri debet, extendere oportet: Sin minus, quā citissimè. Quodcunque enim os non recto modo coaptatum deligans quis compresserit, locus maiori dolore vexabitur. Reliqua verò curatio eadem est. At verò ex ossibus his internum, tibia & prima tibia appellatū, molestiā maiore in curādo exhibet, & extēsiōne magis opus habet: & si non rectè coaptata ossa fuerint, occultari nō possunt. Est enim totum conspiciuum & carnis exors, & hoc factō lōgè tardius progredi eo crure poterint. Si verò externum os fractum fuerit, & multò facilius ferunt, & multò melius occultare possunt, etiā si non bene fuerit coaptatum. Est enim carnosum, & cito in pedes consistunt. Plurimum enim oneris interdum tibiæ os vehit. Nam simul & vnā cum ipso crure: & oneris secundum crus rectitudine, maiore laboris partem internum os suffert. Femoris enim caput supernam corporis partem sustinet. Hoc autē intra crus est, & nō extra, sed secundum tibiæ rectitudinem: & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudini magis appropinquat, & non externæ: & simul crassius est internum quā externum, quēadmodum etiam id quod in cubito est, secundum parui digiti rectitudinem, tenuius est & longius. In articulo tamōn inferno nō similis est ossis longioris cōstitutio. Inæqualiter enim cubiti gibbus siue flexura, & poples flectitur. Propter has igitur causas, externo quidem ossē fracto, celeres progressus fiūt, interno verò fracto, tardi. At verò si femoris os fractum fuerit, extēsiōne præ omnibus facere oportet, ita vt ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neq; enim si quis distantia ex vehementia extēsiōis ossa deligauerit, fieri poterit vt deligatio ipsa teneat, vt ita distent: sed coeūt inter se ossa, quā citissimè, vt intendentes ipsa remiserunt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quum sint hac parte carnes deligationem superabunt, non ab ipsa superabuntur. Magnum enim dedecus est ac detrimentum, femur breuius efficere. Nam si quidem manus breuior fiat, & occultari poterit, & nō est magnus error. At crus si breuius fiat, claudum hominem efficiet. Sanū enim crus lōgius est, & id redarguit. Quare vtilius fuerit, vt si quis

*Femoris os
fractum.*

*Curatio.**Femur fractum quoti-
dies coalescit.**Canalis
quātus esse
debeat.*

malè curādus sit, ambo potius crura fracta habeat, quàm al- D
 terum tantū: æquilibrium enim ipse sibi ipsi fuerit hoc modo.
 Postquam verò sufficienter extēderis, directione ac coapta-
 tione per manuum volas facta, eodē modo deligare oportet,
 velut etiam prius scriptū est, injectis etiam fasciarum initijs
 velut dictum est, & deligationis distributione sursum versus
 fiente: & deligatus eadem respondeat, velut etiam prius: &
 doleat eodē modo, & melius habeat, & similiter rursus deli-
 getur: & ferularum appositio eadem sit. Corroboratur autē
 femur in quinquaginta diebus. Insuper verò & hoc consi-
 derare oportet, q̄ femur gibbosum magis est ad externam,
 partem, quàm ad interuā, & magis ad anteriorem, quàm po-
 steriōrē. In has itaq; partes etiam distorquetur, si non probē
 curetur: & sanē iisdem partibus etiā ipse seipso magis excar-
 nis est, ut neq; occultari possit in distortionē. Si igitur huius
 modi quippiam suspectum habueris, machinari ea oportet,
 quæ in brachio distorto consulimus. Pauca insuper lintea
 circa coxam, & locum inter coxas & lumbos, cicundare o-
 portet, quo & inguina, & articulus circa intermediam crurū
 ac inguinam partē plechada appellatam, insuper deligetur.
 Nam & aliās confert, & ut ne extremæ ferularum partes læ-
 dant, si non ad deligata adhibeantur. Deficere autem opor-
 tet semper ferulas, à nuda parte, & hinc atq; illinc multum:
 & positionem ferularum semper ita providere conuenit, ut
 neque super os aliquod circa articulos natura prominens,
 neq; super neruum circa articulum fiat. Tumores verò iuxta
 poplitem, aut circa pedem, aut iuxta aliam quampiam par-
 tem, ex compressione eleuatos, multis lanis succidis probē
 carminatis, vino ac oleo resperſis, cerato sublito, deligare o-
 portet, & ubi preſſerint ferulæ, citius laxare. Graciles autem
 fieri poterint, si supra ferulas gracilibus linteis tumores deli-
 garis, ab infima parte initio facto, ad supernam proceden-
 do. Sic enim quàm citissimè tumor gracilis fieri poterit, &
 transcendit supra priores deligationes. Verum hoc deliga-
 tionis modo uti non oportet, si non periculum fuerit in tu-
 more, pustularū, aut denigrationis. Tale verò nihil fit, si non
 quis valde premat fracturā, aut suspensam habeat, aut manu
 scalpat, aut aliud quid quod irriter corpori allabatur. At ve-
 rō canalem si quis sub ipsum femur supponat, qui poplitem
 non

E

R

- A** nō excedat, læserit magis quàm profuerit. Neq; enim prohibuerit, quo minus & corpus, & tibia, sine femore moueatur. Noxius enim erit ad poplitem pertingens, & quod minimè oportet, id facere impulerit. Minimè verò oportet genu flectere. Omnè enim turbationē deligationibus inducit, & femore, & tibia deligata, quisquis genu flexerit. Necesse enim erit propter hoc, musculos aliàs atq; aliàs aliam figurā habere. Necesse est item ossa fracta moueri. Præ omnibus itaque faciendum, vt poples sit extentus. Videtur igitur canalis similiter prodesse, qui à coxa ad pedem vsque subiectus continueat. & aliàs circa poplitem, fasciam cum canali laxè circumdare oportet: quemadmodum infantes in cunis fascijs obuoluuntur. Deinde si femur ad supernam partem distorqueatur, aut ad latus, melius ita cōtineri poterit vnà cum canali.
- B** Cæterùm calcanei summi valde magnā curam habere conuenit, vt & in tibiæ, & in femoris fracturis, aptè se habeat. Si enim dependeat pes, reliqua tibia firmata, necesse est iuxta anteriorem tibiæ partē, ossa incurua esse. Si verò calcaneum quidem moderato altius fuerit firmatum, reliqua verò tibia aliquantulum eleuata, necesse est huic ossi, vt circa anteriorem tibiæ partem, moderato cauius appareat: atque hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnū. Sed & omnia ossa tardiùs corroborantur, si nō secundum naturam posita fuerint, itemq; ea quæ non in eadem figura quiescunt: & calli quoque debiliores ipsis obducuntur. Atque
- C** hæc quidem de his quibus ossa quidem fracta sunt, non autem extra eminent, neque aliàs vlcus factum est. Quibus vero ossa fracta sunt simplici modo, & non multifido, ita vt eadem die reposita sint, aut postridie in sedem suam recepta, & nullus timor sit fissorum ossium discessionis: aut etiā quibus vlcus quidem factū est, ossa verò fracta non extra eminent, neque modus fracturæ talis est, vt sint segmenta à fissis ossibus separata: tales spes est simplici modo curari posse.
- Et quidem sanè neque magni quippiam boni, neque mali faciētes, vlcera quidē curant aliquo purgatorio, aut picatum ceratum, vt emplastrum cruentis vulneribus idoneum, aut aliud quid ex his quæ facere solent, imponētes: Ego verò eos laudo qui splenia vino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deligant: Vbi verò vlcera pura facta fue-

*Calcanei in
his cura.*

rint, & iam coalescunt, tūc multis linteis deligare, & ferulis **D**
 dirigere conantur. Hæc quidem curatio boni aliquid facit,
 nihil autē magni mali: Ossa tamē non similiter in suam se-
 dem firmari possunt. Verū corpora aliquāto tumidiora ea
 parte fiunt, quā sit opportunū. fiunt autem & breuiora his
 quibus vtraque ossa, aut cubiti, aut tibiæ fracta sunt. Alij ve-
 rō rursus sunt, qui talia statim linteis curant, & hinc atque
 illinc linteis delignant, vlcus verō ipsum relinquunt, & per-
 frigerari sinunt. Deinde super vlcus purgatorium aliquod
 imponunt, & splenijs vino imbutis, & lanis succidis curant.
 Hæc curatio mala est, & verisimile est eos qui ita curāt, tum
 in alijs fracturis, tum in huiusmodi maximē imprudenter se
 gerere. Maximum enim est cognoscere quomodo initiū lin- **E**
 tei iniicere oportet, & qua parte maximē cōprimere: & quæ
 vtilitas contingat, si quis initium lintei rectē iniiciat, & qua
 maximē oportet parte premat: & quæ detrimenta inducan-
 tur, si quis non rectē iniiciat, neq; quā maximē oportet pre-
 mat, sed hinc atq; illinc id faciat. & dictum quidem est etiā
 in superioribus, quæ ex vtrisque eueniant. Testatur autem
 & ipsa hæc medicina. Necesse est enim ei qui ita deligatur,
 tumorem ad ipsum vlcus eleuari. Etenim si sanum corpus
 hinc atque illinc fuerit deligatum, in medio verō relictum,
 iuxta relictum vtrique spatium maximē intumuerit, ac deco-
 loratum reddetur, quo modo vlcus hæc nō perpetietur? Ne-
 cesse igitur est, vt vlcus quidem decoloratū sit, & labijs euer- **F**
 sum ac protuberans, verū lachrymosum & non suppurans:
 ossa verō etiam quæ discessura non erant, discedant: sed &
 pulsans, & febriens vlcus fuerit. Coguntur autē propter tu-
 morem cataplasmata insuper imponere, quod & ipsum in-
 commodum est his qui hinc atque illinc deligantur. Pondus
 enim inutile ad reliquum pulsum accedit. Postremū verō
 deligamēta resoluunt, vbi iam malum ipsis recrudescit, & de
 cætero citra deligationem curant. Neque verō minus, etiam
 si aliud quoddam eiusmodi vulnus acceperint, eodem modo
 curant. Non enim deligationē hinc atq; illinc factam, & vl-
 ceris perfrigationē, in causa esse putāt, sed aliud quoddam
 infortuniū. Attamen de hoc tam multa nō scripsissem, si non
 certo scirem incommodam esse hanc deligationē, & multos
 esse qui ita curent, & magni momenti esse hanc rem dedi-
 scere,

*Quid potis-
 simum in
 his.*

A scere, & testimonio hæc esse, quòd rectè scripta sint ea quæ prius scripta sunt, siue maxime premendæ sint, siue minimè ipsæ fracturæ. Oportet autem vt in summa dicam, his quibus non est futuri discessus ossis expectatio, eandem curationem adhibere, veluti his quibus os fractum fuerit, vlcus autem nõ habent. Nam & extentiones, & directiones ac coaptationes ossium eodem modo facere oportet, & consimilem deligationem. Super ipsum enim vlcus splenium tenue duplex, picato cerato illitum deligandum est, & circumlitæ partes cerato albo illinendæ. Verum lintea, & reliqua latiora, aliquatū fissa sint magis, quàm si nõ vlcus haberent: & id quo primum deligamus, multo latius sit ipso vlcere. Quæ enim angustiora sunt quàm vlcus, cinctum vlcus tenent, id quod fieri non conuenit, sed prima circumductio totum vlcus comprehendat, & linteum hinc atque illinc præmineat. Itaque secundum vlcus rectitudinem, linteum injicere oportet, & premere paulo minus, quàm si vlcus non haberent. Distribueri verò est deligatio, velut etiã prius dictum est. Lintea autem semper quidē mollis modi sint, magis tamen in talibus, quàm si vlcus non esset. Copia verò linteorum non minor sit prius relatis, sed etiam aliquantò amplior. Si verò deligatus fuerit, videatur is sibi lintea firmata quidē esse, nõ autem cõpressa: dicatq; super vlcus maxime firmata esse. Eadem autē tēpora esse oportet, ad hoc vt magis firmata esse videantur, & ad hoc vt magis laxa videãtur, quemadmodum etiã in superioribus dictū est. Deligatio etiam postea facienda per tertium diē, itavt omnia postea faciamus consimili modo, velut prius dictū est. præterquã quòd in totū, minus aliquatò hæc quã illa comprimenda sunt. Quòd si secundū rationem, quæ fieri par est, facta fuerint, gracilior quidē semper cõperietur vlcus pars, graciliores autē & reliquæ omnes, quæ à deligatione continentur: & suppuraciones citiores erunt, quàm in vlceribus aliter curatis: & quæcunque carunculæ in vulnere denigratæ sunt & mortificatæ, citius abrumpuntur ac excidunt in hac curatione, quàm in alijs: & ad cicatricem citius peruenit vlcus, si hoc modo quàm si alio curetur. At omniū horum causa est, quòd & locus circa vlcus gracilis sit, & quæ circumlitæ sunt gracilia omnia fiunt. In reliquis igitur omnibus consimiliter curare oportet, velut ossa sine vlcerationibus

*Ligationis
modus.*

*Ferularum
appositio.* fracta, Verū ferulas apponere non oportet. Et propterea lin- D
 tea his plura esse debent quā alijs, & quod minus compri-
 mantur, & quod ferulae tardius apponantur. Si tamen ferulas
 apposueris, nō secundum rectitudinem vlcis appones, sed
 ita vt laxae adhibeantur, prouidendo vt nulla magna ab ipsis
 constrictio fiat. Dictum autem hoc quoque est in his quae
 prius scripta sunt. Victus autem rationem exquisitiorem, &
 longiori tempore constituere oportet, his quibus ab initio
 vlcera fiunt, & quibus ossa extra eminent. & vt in summa di-
 catur, in vehementissimis vulneribus exquisitiore, eoquē
 diuturniore victu vti conuenit. Eadem etiam curatio vlcē-
 rum est in his quibus ossa quidem fracta sunt, sed vlcus ab
 initio non fuit. Verū inter medendum factum est, aut vlcē-
 re linteis magis compresso, aut à ferularum infessu, aut ab al- E
 lia quapiam causa. Cognoscuntur autē tales fracturae, an vl-
 cus subsit, & dolore, & pulsib. & tumor qui in extremis parti-
 bus est, talibus durus efficitur, & si digitum admoueris, attol-
 litur: sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid suspi-
 catus fueris, soluere oportet: & si quidem pruritus circa sub-
 ligationes fuerit, aut alia quapiam parte deligata, cerato pi-
 cato pro altero vti. Si verò horum nihil fuerit, verū ipsum
 vlcus irritatum, reperitur nigrum valde aut impurum: & fu-
 turum est vt & carnes suppurētur, & nervi insuper excidant,
 hos omnino perfrigerare nō oportet, neq; quicquā has sup-
 purationes vereri, sed curare in reliquis omnibus consimili
 modo, velut eos quibus ab initio vlcus factū est. Linteis verò F
 deligare incipere oportet valde laxis, à tumore qui in extre-
 mis partibus consistit, atq; ita deligationem distribuere sem-
 per sursum versus, nusquā quidem cōprimendo, sed maxime
 super vlcus firmādo, super alia verò minus. & prima quidem
 lintea haec munda sint, & nō angusta. Copia verò linteorum
 tanta sit, quāta est si cum ferulis deligatio fiat, aut paulo mi-
 nor. Super ipsum autē vlcus sufficiens est splenium cerato al-
 bo illitum. Siue enim caro, siue nervus denigratus fuerit, ex-
 cidet. Talia enim acribus curare non oportet, sed mollibus,
 velut ambusta. Deligare verò postea per tertiū idem conue-
 nit, ferulas autem nō apponere. Quiescere verò magis quā
 prius, & modico cibo vti. Scire verò expedit, siue caro, siue
 nervus sit, id quod excidet, q̄ hoc modo multo minus vltra
 depasci

*Linteorum
quantitas.*

A depascitur, & multo citius excidet, & multo graciliores circumfite partes erunt, quā si quis exolutis linteis, aliquid medicamentorum purgatoriorū super vlcus imponat. Quin & si exciderit id quod suppurasset, & citius carne repletur, & citius ad cicatricem peruenit, q̄ si illo aut alio modo curetur. Omnia sanè in hoc sita sunt, vt quis hæc rectè & moderatè deligare sciat. Conferunt insuper & figuræ quales esse oportet, & reliqua victus ratio, & linteorum aptitudo. Si verò recens vulneratis decipiaris, ossiū discessum non fore putās, quum tamē expectatio sit illa emersura esse, modum curationis timere non oportet. Nihil enim magni mali cōtigerit, si modo bonas ac innoxias deligationes manu facere noueris.

B Signum autē hoc est, si ossiū discessus in hoc curationis modo futurus est. Pus enim multū fluit ex vlcere, & gliscere ac turgere affecta pars videtur, Frequētius igitur deligare oportet, ob nimiam humiditatē, & quod aliās etiā febres fiūt. Et si quidē valde præmantur à deligatione & vlcus, & circumfite partes graciles fiunt. Quicunq; itaq; valde tenuium ossium discessus fiunt, hi nulla magna mutationē opus habēt, nisi vt laxius deligatio fiat, vt ne pus intercipiatur, sed facilè effluere possit. Sed & frequētius deligare oportet, donec os discesserit, & ferulas non apponere. Quibus verò maioris ossis discessus expectatur, siue hoc à principio prænoueris, siue etiam postea cognoueris, non amplius eadē curatione opus habet. Sed extensiones & directiones ita facere oportet, velut dictū

C est: splenia verò duplicata, latitudine quidē dimidio palmo non minora: quale tamē fuerit vulnus iuxta hoc coniectura facienda est: longitudine verò paulo quidem breuiora, quā vt bis circum fauciatum corpus circunduci possint, multo verò longiora quā vt semel. Copia verò tot sint, quot facere cōducit. Hæc in vino nigro austero madefacta, ex medio initio factō circūuolueri oportet, quemadmodū fascia ex duobus initijs deligatur: & deinde asciatim alternatione ipsorū facta, initia dimittere. Hæc & super ipsum vlcus adhibenda sunt, & ab vtraq; viceris parte, & ne comprimantur, sed saltem fulciēdi viceris gratia incūbant. Supra ipsum verò vlcus, ceratū picatum imponere oportet, aut aliquod ex emplastris cruentis vulneribus destinatis, aut aliud quoddam medicamentum, quod familiare ac idoneum sit humectationi adhū

Ossis maioris abscessus.

*Quid æstas
& hyems in
his poscat.*

bendæ. & si quidem æstatis tempus fuerit, vino madefacere splenia frequenter oportet. Si verò hyems, lanas succidas multas vino & oleo imbutas adhibeto. Oportet autem capræ pellem substernere, & defluções obseruare, vt facile effluere possint, ita vt meminerimus quòd hi loci in iisdem figuris multo tempore permanentes, intertrigines curatu difficiles faciunt. Qui verò deligatione sanari per aliquem ex relatis, aut referendis modis non possunt, eos magnam huc curam adhibere conuenit, vt fractam corporis partem commodè positam habeant secundum rectitudinem, animaduersione ad hoc habita, vt sursum magis quàm deorsum vergat. Si verò quis bene ac facile opus perficere velit, operæ precium est etiam machinamenta facere, quo iustam & non violentam extensionem pars corporis fracta habeat. Maximè verò in tibia machinamenta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui qui in omnibus tibiarum fracturis, & quæ deligantur, & quæ non deligantur, pedem summum ad lectum alligant, aut ad aliud quoddam lignum iuxta lectum defossum. Hi itaq; omnia mala faciunt, nihil autem boni, Neque enim ullam opem affert extensioni, hæc pedis alligatio. Nihilo enim minus ad pedem concedet reliquum corpus, atq; sic non amplius extenditur: neque rursus ad rectitudinem quicquam prodest, sed etià obest. Dum enim vertitur reliquum corpus, aut hac, aut illac, nihil prohibet vinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa, reliquum corpus sequantur. Imo si pes alligatus non fuisset, minus distorqueretur. Si verò quæ pilas duas ex corio Aegyptio confuat, tales quales gestant hi qui multo tempore in magnis compedibus vincti sunt: habeant autem pilæ hinc atq; illinc tunicas, ad vulneris quidam partes, profundiores: ad articulorum verò partes, breuiiores: Sint itè tumidæ ac molles, & congruentes ad hoc, vt altera supra malleolos, altera infra genu coaptetur. Habeat insuper utraq; duas utrinq; appendices à latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiiores velut anfas, ita vt alteræ sint ab utraque malleoli, alteræ ab utraque genu parte: & superna pila alteras tales habeat secundum eandem rectitudinem. Postea virgis corneis acceptis, æqualem inter se magnitudinem habentibus, crassitudine quidem digitali, longitudine verò vt flexæ appendicibus congruant, huc diligentiā adhibeas, vt extremæ virgarum partes

*Quis sine li
gatione cura
retur.*

*Hæc pilæ
quid sibi ue
liant.*

*Virgæ cor
neæ.*

confuat, tales quales gestant hi qui multo tempore in magnis compedibus vincti sunt: habeant autem pilæ hinc atq; illinc tunicas, ad vulneris quidam partes, profundiores: ad articulorum verò partes, breuiiores: Sint itè tumidæ ac molles, & congruentes ad hoc, vt altera supra malleolos, altera infra genu coaptetur. Habeat insuper utraq; duas utrinq; appendices à latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiiores velut anfas, ita vt alteræ sint ab utraque malleoli, alteræ ab utraque genu parte: & superna pila alteras tales habeat secundum eandem rectitudinem. Postea virgis corneis acceptis, æqualem inter se magnitudinem habentibus, crassitudine quidem digitali, longitudine verò vt flexæ appendicibus congruant, huc diligentiā adhibeas, vt extremæ virgarum partes

Ates non ad corpus, sed ad summas pilarum eminentias inni-
tantur. Oportet autem esse tria virgarum paria, aut etiam
plura, & aliàs alijs aliquanto longiores, & aliquanto breui-
ores ac minores, vt si vellis magis distendere possis. Locentur
autem virgæ vtræque hinc atque illinc à malleolorum vtraq;
parte. Hæc itaq; si bene machinatus fuerit, & extensionem
iustam exhibuerint, & secundum rectitudinem æqualem, &
vulnere nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si
quid tamen exprimeretur, partim ad pedem abducentur, par-
tim ad femur: & virgæ hinc atque illinc à malleolis accom-
modatiores erunt, vt tibiæ positio non impediatur, & vul-
nus probè impingat ac sustentetur. Neque enim impedi-
to est, si quis velit duas virgas superiores, ipsas inter se con-
iungere, & si quis leuiter quid superimponere velit, vt id
quod superimponitur, à vulnere eleuatum sit. Si quidem
igitur & pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recenter confutæ
fuerint: & virgarum intentio probè intenta fuerit, velut iam
dictum est, commodum erit machinamentum. Si verò quid
horū non rectè habuerit, læserit magis quàm profuerit. Con-
uenit autem & alias machinas, aut bene machinari, aut non
machinari: Turpe enim est & minimè artificiosum, in ma-
chinis struendis à machinis aberrare. Plerique porro medici
fracturas, & cum vlceribus, & sine vlceribus, primis diebus
lanis succidis curant, & nihil ab arte alienum ipsis hoc esse
videtur. & qui quidem à recens vulneratis coguntur, ex lin-
teorum inopia lanis vt, his plurimus veniæ locus patet. Non
enim habuerit qui in linteorum penuria, aliud quid multo
melius ad tales deligādas quàm est lana. Verū omnino mul-
tæ lanæ esse debent, & valde bene carminatæ, & nō asperæ.
Nam paucarum & malarum vires etiam modicæ sunt. Qui
verò ad vnum ad duos dies, lanis deligare iustū esse censent,
tertia verò ac quarta linteis deligātes premunt, ac extēdunt
tunc vel maximè, hi in re multi adeo ac magni in medicina
momenti, se imprudenter gerunt. Minimè enim tertia ac
quarta die omnia vulnera mouere oportet, & vt in summa di-
cam, etiam omnes specillorum admotiones vitare conue-
nit in his diebus, & alia quoque quibus vulnera irritantur.
In totum enim tertia ac quarta dies in plerisque vulneribus
recrudescantias pariunt, & quæ ad inflammationem ac im-

HIPPOCRATIS LIBER

mundiciam procedunt, & quæ ad febres deueniunt. Et hæc **D** res multi momenti est vt discatur, vt si qua alia. Cum qua enim ex vtilissimis in medicina rebus, non solum circa vulnera, verum etiam circa alios multos morbos, communionem non habent nisi quis etiam alios morbos vlcera esse dixerit, Habet enim & hic sermo aliquam verisimilitudinē. Multis enim modis alij alijs cognati sunt. Quicunque tamen iustum esse putant lanis vt, donec septem præterierint dies, deinde verò extendere ac dirigere & linteis deligare, hi non similiter imprudētes videri poterint. Nam & maximum inflammationis periculum præterijt, & ossa laxa ac apta post hos dies sunt. Longè tamen & hæc curatio superatur, ab ea deligatione quæ ab initio linteis fit. Ille enim modus preparat ac efficit vt septima die ferulis perfectè deligari possint. Hic autem modus multò tardior est. Sed & alia quædam de trimenta habet. Verum longum esset omnia scribere. Quibus verò ossa fracta & extra eminentia in suam sedem collocari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramenta facere oportet ad eum modum quem vestes habent illi quibus lapidæ vtuntur, alia latiora, alia angustiora. Esse verò conuenit tria, aut plura etiam, quò quis maximè congruis vtatur. Postea cum his vnà cum extēsiōe motionem aggredi oportet, ita vt ad inferiorem ossis partem subijcias ad superiorem verò partem ossis, superiorem ferramenti partem innitendo firmes, In summa, quemadmodum si quis lapidē aut lignum vehementer veste cōmoueat. Sint autē valida ferramenta quantum eius fieri potest, vt ne si ectantur. Hoc **P** magnum auxilium est, si & ferramenta idonea fuerint, & si quis velut conuenit commotionem faciat. Nam ex omnibus instrumentis quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria existunt, aselli circunductio, per vestes commotio, & cuneorum vsus. At sine horum vno aliquo, aut sine omnibus, nullū vehementissimum opus homines perficiūt. Non igitur spernenda est hæc per ferreos illos vestes commotio, aut enim hoc modo, aut nullo alio, in sedem suam collabentur. Si verò superna ossis pars immutata fuerit ac confracta, vt vesti adhibendo locus non sit commodus, sed acutum quid pro-
minet, tunc osse scalpendo derafo, securam vesti sedem facere oportet. Hanc autem per vestes commotionem & extēsiō

*Cum ossa
fracta &
extantia nō
redant.*

A tēſionem, eadem die aut ſecunda facere oportet. Non au- *Tertius,*
 rem tertia. Minimè verò quarta aut quinta. Nam etiamſi *quartus,*
 non reponas, ſed aliàs moleſtiam exhibeas in his diebus, in- *quintusque*
 ſtammationem induxeris: quāto magis ſi reponas. Conuul- *dies repositi-*
 ſionem tamen multo magis induxeris ſi reponas, quā ſi re- *tionem non*
 ponere omittas. Atque hæc probè noſſe conuenit. Si enim *admittit,*
 reponenti conuulſio acceſſerit, non multa ſalutis ſpes eſt.
 Commodum autem eſt rurfus eijcere os à ſua ſede, ſi hoc ſi-
 ri citra moleſtiam poſſit. Non in laxioribus quā oportu-
 num eſt, cōuulſiones ac diſtentiones accedunt, ſed in his quæ
 magis extenta ſunt. Cæterum de qua re nunc nobis ſermo
 eſt, in prædictis illis diebus moleſtiam exhibere nō oportet,
B & curā adhibere vt vlcus minimè inflammetur, & maximè
 ſuppuretur. Poſtquam verò ſeptem præterierint dies, aut pau-
 loplures ſi ſine febre fuerit, & vlcus non inflammātū ſit, tunc
 minus vetat vt reponere tentes, ſi ſperes obtenturum te eſſe.
 Sin minus non oportet frustra moleſtiam ſuſcipere & infer-
 re. Si igitur oſſa repoſueris in ſuam ſedē, iam ſcripti ſunt mo-
 di quomodo curare oportet, ſiue oſſa diſceſſura eſſe, ſiue nō,
 expectatio ſit. & ſi quidem oſſium diſceſſus expectatio ſit,
 eo quem dixi modo cum linteis, in omnibus talibus deliga-
 tionem facere oportet, ex medio linteo initio facto vt plu-
 rimū, velut ex duobus initio fascia deligatur. Coniectu-
 ram autem facere oportet iuxta vlceris formam, quo ſit quā
 minimum hians ac labijs protuberans & expaſſum. Alijs
C enim ad dextram deligare cōmodum eſt, alijs ad ſiniſtram,
 alijs ex duobus initijs. Quæcunque verò oſſa repoſitio-
 nem effugerunt, ea diſceſſura eſſe noſſe oportet: itemque
 ea quæ carnibus penitus nudata ſunt. Nudatur autem quo-
 rundam ſuperna pars, quorundam verò carnes circumcirca
 mortiferantur. Et quibuſdam quidem ex veteri vulnere ali-
 qua oſſa emarcuerunt: quibuſdam verò non, & aliquibus ma-
 gis, aliquib⁹ minus, & partim parua, partim magna. Propter
 hæc igitur relata, vno morbo dici nō poteſt, quando oſſa ſint
 diſceſſura. Aliqua enim ob paruitatem, aliqua ex eo quod in
 ſumma parte exiſtunt, citius diſcedunt: aliqua eo quod non
 diſcedunt, reſiccata & inarcida ſientia deſquamantur. Præ-
 terea differt curatio à curatione. In totum igitur oſſa ci-
 tiſſimè his diſcedunt, quibus citiſſimæ ſiunt ſuppuraciones
 & citiſſ

HIPPOCRATIS LIBER

& citissimæ ac optimæ carnis productiones. Subnascentes enim iuxta læsam partem carnes, plerunque ossa ipsa eleuant. Totus tamen ossis circulus, si in quadraginta diebus discesse- rit, bene discedet. Quædam enim ad sexaginta dies perue- niunt. Nā & rariora ossa citius discedunt, solidiora verò tardius. Alia autem minora: multo minore temporis spacio, alia aliter. Cæterum os extra eminens his de causis præsecare oportet, si reponi nō possit, & parum ablit vt reponi posse videatur, & fieri poterit vt auferatur, & si noxium fuerit, & de carnibus quid rumpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudum fuerit, tale auferre oportet. Reliqua siue præseces, siue non præseces, non multum refert. Hoc enim certo scire expedit, quòd ossa quæ carnibus perfecte priuantur, ac exar-
rescunt, omnia penitus discedent. A quibus verò squamæ dis-
cessuræ sunt, ea præsecare non oportet. Coniecturam vero eorū quæ discedent, ex constitutis signis facere oportet. Curare autem tales splenijs & vinosa curatione, velut etiā prius de discessuris ossibus scriptum est. Sed cauere decet ne primo tempore frigidus madescant. Rigorū enim febrilium periculum est. Periculū item cōuulsionum. Frigida enim semper cōuulsionem prouocant quandoque verò etiam vlcera. Nosse quoque id conuenit, necesse esse ibi corpora breuiora fieri, vbi ossa fracta ac immutata curantur, & quibus totus ossis circulus discessit. At verò quibus femoris aut brachij os extra eminet, hi non valde superstites euadunt. Nam & ossa magna sunt, & multū medullæ habent: & quæ simul vulnerantur, multa sunt & magni momenti, & nerui, & musculi & venæ. Et si quidem reposueris, cōuulsionem accedere solent. Si verò non reposita fuerint, febres acutæ, & bilio-
sæ, & singultuosæ oboriuntur, & denigrantur. Non minus autem superstites euadunt hi, quibus reposita non sunt, neque tentatum est vt reponerentur. Adhuc verò magis euadunt, quibus inferna ossis pars eminet extra, quàm quibus superna. Euadunt etiam quibus reposita fuerint, attamen raro. Nā & curationes à curationibus multū differunt, & naturæ corporum à naturis, ad facilitè tolerandum. Multum etiam differt an in interna brachij ac femoris parte ossa extra promineant. Multæ enim & periculosæ venarum extensiones in interna parte sunt, quarum aliquæ si vulnerentur, lethales sunt. Sunt
autem

- A** autem & in externa parte, verū minus. In talibus igitur vulneribus, qualia pericula immineant, ignorare nō oportet, & ad temporum occasiones prædicere. Si verò reponere hæc ossa cogaris, & reponendi aliqua tibi spes sit, & non multa ossis immutatio fuerit, & masculi non concurrerint: solent enim concurrere: vectis mollitio etiam his cum extensione, opem bene ferre poterit. Vbi verò reponis, veratrum molle bibendum dare oportet eadem die, si eadem die reposita fuerint. Sin minus, ne aggredi quidem oportet. Verū vlcus curare oportet velut in capitis ossibus fractis, & frigidi nihil adhibere, & cibos penitus auferre. & si quidē amara bile præditus natura fuerit, fauorum cremorem odoratū coctum, aut
- B** acerum mulsū dulce, in aquam instillato, eoq̃ue pro victu vtatur. Si verò amara bile præditus nō sit, aquæ potione vtatur. Et si quidem continua febre laborarit, ad quatuordecim dies vt minimū hoc victu degat. Si verò sine febre sit, septē diebus. Postea sensim progressu siente secūdm rationem ad vulgarem victum adducatur. Et quibus ossa nō reposita fuerint, eandem item medicamentū purgationem facere oportet, & vlcera curationem, eundem item exhibere victum: & dependentem de corpore partem non extendere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa vlcus. At ossiū discessus diuturnus est, velut etiam prius dictum est. maximè verò talia fugere oportet, si modo quis honestam fugam habeat. Nam & spes pauca sunt, & pericula multa. & si quis non reponat, artis expertus esse videri poterit: & si reponat, propinquius ad mortem quā ad salutem perduxerit. Cæterū luxationes & emotiones ossiū circa genua, multo mitiores sunt emotionibus ac luxationibus circa cubiti flexurā. Nam femoris articulus pro magnitudine expeditior est quā brachij, & iustam naturam solūm habet, eamq̃; rotundum. Brachij verò articulus & magnus est, & sinus plures habet. Ad hæc verò, tibiæ ossa longitudine inter se similia sunt, & externum os paululum, ne memorabili quidem modo excedit, nullum magnū impedimentum afferēs, à quo externus tendo circa poplitem enascitur. At cubiti ossa inæqualia sunt, & quod breuius est, multò crassius est: quod verò tenuius est, multū superat & excedit articulū. Dependet tamen & hoc ex neruis, iuxta communem ossium cōnexionem. Maiorem
- Luxatum
genu facile
reponitur*
- Tibiæ &
cubiti ossa
qualia.*
- autem

HIPPOCRATIS LIBER

autem partem connexionis neruorū in brachio os tenue ha- D
bet,quā crassum. Horum itaque articulorum & ossium fle-
xuræ cubiti natura huiusmodi est. & propter naturæ modū,
ossa circa genu sæpe quidem luxantur, facile autē rursus in-
cidunt ac reponuntur. Inflammatio verò nō magna accedit,
neque vinculum articuli. Luxantur autem plerunque in in-
ternam partem,aliquando etiam ad extremam, quandoque
etiam ad poplitem. Horum omnium repositiones non sunt
difficiles. Verū si quidem foras aut intro luxentur,hominē
in humili aliquo sedili sedere oportet,ita vt crus altiūs, non
tamen multò habeat. Extensio autem plerunque moderata
sufficit,ita vt ab altera parte tibia, ab altera femur in diuer-
sum extendatur. At ossa circa cubiti flexurā molestiora sunt, E
quā quæ circa genu sunt, & difficilius reponi possunt, etiā
ob inflammationē, si quis non statim reponat. Luxantur qui-
dem minus quā illa, verū difficilius reponuntur ac co-
aptantur. insuperq; inflammantur,ac collum acquirunt. Sunt
autem & horum plerunque parux inclinationes, aliquando
ad partem ad costas,aliquando ad externam,non vt totus ar-
ticulus sit emotus,sed manet quid iuxta ossis brachij cavi-
tatem,qua parte cubiti os excedēs habet. Talia igitur siue hac,
siue illac luxentur, facile est reponere: & sufficit extensio in
directum siens,secundum brachij rectitudinem, ita vt alter
iuxta manus iuncturam extendat, alter locū sub alis impe-
ctatur: Medicus verò altera manu ad emotum articulum ad-
mota, volis impellat. altera propē ad articulū injecta retru- F
dat. Obediunt autem tales luxationes,& nō tardē reponun-
tur, si quis antea quā inflammentur, reponat. Luxantur au-
tem plerunque magis ad internam partem: luxantur etiā ad
externam. Innotescit id ex figura: & talia sæpē etiam absque
vehementi tensione rursus incidunt. Oportet autem in his
quæ intro luxantur, articulum quidem ad naturam suam re-
pellere, cubitum verò magis in pronam partem vergentem
circunducere. Et plerunque sanē cubiti luxationes huiusmo-
di sunt. Si verò transgressus fuerit articulus, aut hac, aut illac,
supra cubiti os, quod ad brachij cavitatē excedit: fit quidem
raro hoc, si verò fiat, non ampliūs similiter extensio in dire-
ctum siens, talibus luxationibus idonea est. In tali enim ex-
tensione, os à cubito excedens, brachij transgressionem pro-
hibet.

Cubiti re-
aptatio.

- A** libet. Oportet itaque sic emotis extensionē tali facere, qualis prius descripta est, vbi quis ossa brachij fracta deligat, vt ab alia quidem in supernam partem tensio fiat, ab ipsa verò cubiti flexura, ad infernam cogatur. Sic enim brachium supra suum sinum maximè eleuabitur. Si verò eleuatū fuerit, facilis est restitutio cum volis manuū, ita vt emotā quidem brachij partem apprehendentes impellamus, os verò cubiti iuxta articulum retrudamus, vtraq; eodem modo, minus tamen. Atque talis extensio huiusmodi luxationis iustissima est. Poterit etiam reponi per extensionem in directū, verū minus, quàm hoc modo. At si in anteriorem partem brachiū luxetur: rarissimè autem hoc contingit. Sed quid repentina eluctatio nō eiecerit? Multa enim etiam præter naturam suā excidunt, etiam si magum quid sit quod prohibeat. Huic autem eluctationi magnū quoddam obstaculum est, & os crassius quod superexcedit, & multa neruorum extensio: attamē quidam sanè eluctantur. Signū autē his qui ita eluctati sunt. Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiam articulus ad contactum. Si quidem igitur non statim repositus fuerit, vehementes ac violentæ inflammationes, itemq; febriles fiunt. Si verò statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet autem linteum durum conuolutum (suffecerit nō magnum) imponere obliquum in cubiti flexuram, & de repente cubitum inflectere, & manum quàm maximè ad humerum adducere. Sufficiens igitur fuerit hæc repositio his qui ita eluctati sunt. Sed & extensio in directum, hunc repositionis modum coaptare potest: volis tamen manus in eminentem brachij partem iniectis, iuxta flexuram retro impellere oportet, ita vt aliquis infernè ijsdem in cubiti gibbū iniectis, ad cubiti rectitudinē retrudat. Efficax est etiam in hoc luxationis modo illa extensio quæ prius scripta est, quomodo ossa brachij fracta extendere oportet, vbi sunt deliganda. Postquam verò extenta fuerint, sic cum manuū volis iniectis coaptationes facere, velut etiam prius scriptū est.
- C**

*Brachium
antrorsum
luxatum
quale.*

Cæterum si in posteriorem partem brachium exciderit, rarè autē hoc contingit, hæc luxatio omnium maximè dolorosa existit, & febres continuas meracæ bilis paucorum dierum ac maximè lethales inducit: & tales extendere brachiū non possunt. Si igitur statim affueris, extēto cubiti gibbo co-

*Brachium
retrosum
luxatum.*

gere

HIPPOCRATIS LIBER

gere oportet, & sponte incidit. Si verò febris præuenerit, nō D
 amplius reponere oportet. dolor enim in cogendo augeſcet,
 Vt autem in ſumma dicam, neq; alium articulum febrienti
 reponere oportet, minimè verò cubiti gibbum. Sunt autē &
 aliæ læſiones ac moleſtiæ circa cubiti gibbum. Hoc enim os
 craſſius, ſi quando ab altero emotum eſt, neque flexi, neque
 extendi ſimiliter poteſt. Maniſtum autem ſit ex cōtractu,
 iuxta cubiti flexuram, circa venæ diſciſſionem ſupra muſcu-
 lum tendentem. Quibus autem tale accidit, his non amplius
 facile eſt ad ſuam naturā reducere. Neq; enim aliam vllam
 communem duorum oſſium connexionem emoram, ad pri-
 ſtinam naturam collocare facile eſt: ſed neceſſe eſt tumorem
 habere ipſam diſparationem. Quomodo verò deligare opor-
 tet in articulo, dictum eſt in deligatione circa malleolum. E
 Quibusdam autem os cubiti brachio ſubiectum frangitur,
 quandoque quidem chartilaginofa ipſius pars, ex quo tēdo
 retrò brachiū enaſcitur, & vbi hæc emota fuerit, febrile eſt
 ac malignum. Articulus tamen manet in ſuo locō, æqualiter
 enim baſis ipſius hac parte excedit. Quum autem abductus
 fuerit ea parte qua caput brachij excidit, vagabundus magis
 ſit articulus, quā ſi penitus ſit abruptus. Nam vt in ſumma
 dicam, omnia oſſa quæ frangūtur, minus noxia ſunt, quā ſi
 oſſa quidem non franguntur, venæ autem & nerui alicuius
 momenti in his locis contundantur. Viciniſ enim ad mor-
 tem accedunt hæc quā illa, ſi febris cōtinua acceſſerit. Pau-
 cæ tamen tales fracturæ ſiunt: quandoque verò hoc brachij F
 caput iuxta appendicem frangitur, atq; hoc quum vdeatur
 multò magis noxiū eſſe, lōgè mitius noxis circa cubiti gib-
 bum contingentibus exiſtit. Quomodo igitur ſingulas lu-
 xationes reponere, & præſertim curare oportet, ſcriptum eſt:
 & q̃ ſtatim reponere articulum maximè confert, propter ce-
 leritatem inflammationis neruorū. Nam etiam ſi elapſa ſta-
 tim reposita fuerint, ſimiliter tamen nerui diſtentionem fa-
 cere ſolent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quā fa-
 cere ſolent, tum inſuxionem impedire. Confert autem om-
 nia hæc ſimiliter curare, & quæ franguntur, & quæ diſparan-
 tur, & quæ luxantur. Omnia enim multis linteis, & ſplenijs,
 & cerato curare oportet, velut etiam alias fracturas. At ſigu-
 ram cubiti gibbi in his etiā omnino talem facere oportet,
 qualem

*Caput bra-
 chij fractū.*

- A** qualem in his quibus brachium fractum, & cubitus deligabatur. Communissima enim omnibus luxationibus, & emotionibus, & fracturis, hæc figura est. Cōmunissima item ad distentionem postea fiendam, & ad singula extendenda, ac inflectenda. Hinc enim viæ sunt ad vtrâque partes confimiles. Cōmodissima est etiam hæc figura ipsi ægroto, vt ipsum & gestet, & appensum excipiat. His adde si à callo apprehensus fuerit, si quidem extenta manus apprehendatur, melius fuerit si non adlit: multis enim impedimento erit, paucis adiumento. Si verò inflexa, magis quidem commoda fuerit, Verum longè commodior, si mediam figuram obtinens callo apprehendatur: & hæc quidem de figura. Deligare verò
- B** oportet, primùm lintei initio super ipsam læsam partem iniecto, siue fracta fuerit, siue emota, siue disparata, primas etiã obuolutiones super ipsam facere, ita vt maximè hac parte innitantur, minus verò hinc atque illinc. Deligationem autè communem facere oportet, & cubiti & brachij, vtriusq; multò plus quàm plerique faciunt, quo quàm remotissimè à læsa parte tumor hinc atq; illinc exprimatur. Circundetur insuper etiam acuta cubiti pars, siue læsio in hac fuerit, siue non, vt ne tumor ibi circa ipsam colligatur. Fugiendum verò est in deligatione, quantum eius fieri potest, vt ne circa flexurâ multa lintea coaceruata sint. Compressio autem quàm maximè circa læsam partem facienda est. Sed & reliqua compressio ac laxatio eadem adhibeatur, & iisdem temporibus
- C** singula, quemadmodum in ossium fractorum curatione antea scriptum est. Et religationes postea per diem tertiũ fiât. Videatur autè laxa esse deligatio tertia die velut etiam tũc. Et ferulæ conueniente tempore adhibeantur. Neque enim alienum hoc est, & in his quibus ossa fracta, & quibus non fracta sunt, si non febriant. Sint autem quàm laxissimæ partim à brachio extentæ, partim ad cubitum positæ: & nõ sint crassæ. Neesse est etiam inæquales ipsas esse inter se, vt vicissim permutentur qua parte conducit, coniectura iuxta inflexionem fiente. Quin & splêniorum appositionem eiusmodi facere oportet, velut de ferulis dictum est, ita tamè vt paulò tumidiora super læsam partem apponantur. Tempora verò ab inflammatione, & ab his quæ prius scripta sunt coniectare oportet.

*Schema.**Ferulæ quales in his ponenda.*

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE ARTICV-

LIS, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO IN-

TERPRETE.

*Humerorū
luxatio.*



Vmeri verò articulum vno modo luxari
noui, ad locū sub alis. Sursum autē nun-
quam, neq; ad externā partē. Non tamē
affirmauerim an luxetur, aut non, etiāsi
habeam quod dicā de ipso. Sed neq; in
anteriorē partē vnquā vidi, neq; vide-
tur mihi vnquā excidisse. Medicis tamē
videtur valde in anteriorē partē luxari, & maximē deci-
piuntur in his, quorum carnes tabes circa articulum & bra-
chium occupauit. Apparet enim in talibus caput brachij o-
mnino in anteriorē partē eminens. Atq; ego tale aliquan-
do non excidisse asserens, ob hanc rem apud medicos & vul-
gus malē audiui. Solus enim ipsis ignorare videbar, alij verò
omnes cognoscere. Nec potui ipsis persuadere, nisi admodū
difficulter, rem ita se habere. Si quis in brachio supernam
humero partem carnibus denudarit, denudarit autem qua
parte musculus sursum tendit. Nudarit autem tendinem, qui
sub alis, & iuxta clauiculam ad pectus est: apparuerit utique
caput brachij in anteriorē partē vehementer eminens,
etiāsi non sit elapsū. A natura enim prouum est brachij
caput in anteriorē partē, reliquū autem brachij os, ad
externam partē incuruū. Conuersatur autem brachium
cum scapulæ cauitate obliquū, quū iuxta costas fuerit por-
rectū. Quū verò ad anteriorē partē extēta fuerit tota
manus, tūc brachij caput ē directo est in scapulæ cauitate, &
non amplius in anteriorē partē eminere conspicitur. Ve-
rū de quo nunc est sermo, nunquā vidi in anteriorē par-
tem elapsū: non tamen affirmarim ne de hoc quidē, an ita
excidat, necne. Quū igitur exciderit brachium ad locum
sub alis, multi reponere nouerūt, utpote q̄ multis elabatur.

Eruditi

- A** Eruditi autem est omnes modos nosse, quibus medici id reponūt, & quo modo quis his modis quā optimē vtatur. Optimo verò horum modorum vti oportet, si fortissimam necessitatem videris. Optimus autem est qui postremus describetur. Quibuscunq; igitur frequēter humerus excidit, hi plerunque ipsi sibi ipsi ad reponendū sufficientes sunt. Immissis enim alterius manus digitis ac nodis in locum subalarē, articulum sursum cogunt, cubiti verò gibbum ad pectus adducunt. Eodem etiam modo medicus reponet, si ipse quidem sub alā, articulo magis intro elapso, subtentis digitis à costis diducat, ita vt capite suo in summum humerum iniecto, renitendi gratia, genibus verò iuxta cubiti gibbum ad brachium admotis, ad costas retrudat. Conducit autē eum qui reponit fortes manus habere: aut ipse quidē manibus & capite ita faciat, alius verò quidā cubiti gibbum ad pectus adducat. Est autē & humeri repositio, vt cubitus retrorsum ad spinā subducatur, deinde altera manu in summā gibbi cubiti partē iniecta retortio fiat, altera verò iuxta articulū retro innitatur. Hæc repositio, & ea quæ prius dicta est, quum non sint secundum naturam, tamen articulum circūagitantes incidere cogunt. Qui verò calcaneo reponere cōsūt, propinquum quid ei quod est secundum naturam cogunt. Oportet autem hominē humi supinum reclinare, eum verò qui reponit humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde apprehensam manum læsam, cum suis manibus extēdere calcaneo verò in subalarē locum iniecto, dextro in dextrū, sinistro in sinistrū, retrudere. Oportet autē in cauitatem sub ala rotundum quid congruens indere. cōmodissimæ verò fuerint pilæ valde parvæ ac duræ, quales multæ ex corijs consuuntur. Si enim nō eiusmodi quid inditum fuerit, calcaneū ad brachij caput peruenire nō potest. Dum enim manus extēditur, locus sub ala cauatur. Tendines enim qui hinc atq; illinc locū sub ala constringunt, contrarij sunt. Oportet autē aliquem ab altera parte eius qui extenditur confidentē, sanum humerum cōtinere, vt ne corpus circumtrahatur, dum læsa manus in alteram partē extenditur. Postea vbi pila sub alā subdita fuerit, molle lorum sufficiētī latitudine præditū, circum pilam circumdare oportet, ita vt quidem eo loro ex vtrisque initijs apprehēso sursum retrahat, à capite eius qui extenditur con-

*Humeri la-
xati repo-
sicio.*

*Alia re-
positio.*

HIPPOCRATIS LIBER

fidens, & pede ad summi humeri os ionitens. Pila verò quàm D
penitissimè & maximè intus ad costas sita sit, & non ad bra-
chij caput. Est & alia repositio, quum humerum alter sub-

Alia repositio.

dit. Maiorem tamen esse oportet eum qui humerum supponit, ita vt apprehensa manu, humerum suum acuminatum sub illius luxati alam supponat, & deinde aliquantum verset, vt velut sedi insideat, ea coniectura facta, vt homo ille circa humerum suum ex ala pendeat, ipse verò seipsum in huc humerum altiorè faciat quàm in alterū, brachium autem pendens ad pectus suum quàm citissimè cogendo adducat. In hac verò figura insuper concutiat vbi hominē sustulerit, quo reliquum corpus in aduersam partem brachio quod cōtinetur vergat. Si verò valde levis fuerit homo, puer aliquis levis insuper ex ipso retrorsum dependeat. Atque hæc omnes repositiones in palæstra v̄sitate sunt, eo quòd nō opus habēt aliorum instrumentorū importatione. Poterit tamen quis etiam

Alij repositionis modi.

alibi his vti. Sed & qui circum pistillum cogunt, propemodum secundum naturam reponunt. Oportet autem pistillum molli quadam fascia esse inuolutum: minus enim ita labarit: & inter costas ac brachij caput subter intrusum. & si quidem breue fuerit pistillū, collocare hominē in sedili aliquo oportet, quo vix brachium circum pistillum circundare possit. Sit autem potius longū pistillum, quo homo stans fermè circum pistillum dependeat. Postea brachiū quidem & cubitus circa pistillum porrigantur, ab altera verò corporis parte, quis manibus circa ceruicē ad claviculam circumiectis deorsum cogat. Hæc repositio moderatè secundum naturam est, & repositionem facere potest, si probè ipsam tractēt. Quin & per

Repositio per scalam.

scalam alia quædā huiusmodi repositio fieri potest, & adhuc melior, eo quòd corpus hinc atque illinc eleuatum, securius librando adæquari potest. Nam circum pistillum etiam si humerus fixus maneat, periculum tamen est ne corpus hac aut illac circumagatur. Oportet tamē & super scalam supernè rotundum quid deligatum esse, quod ad loci sub ala cavitatem congruum sit, & quod brachij caput ad naturam redire insuper cogat. Optima verò ex omnibus repositionibus talis est. Lignum esse oportet latitudine quidē quinque aut quatuor in totum digitorum, crassitudine verò duorum digitorum, aut etiam tenuius, longitudine autem bicubitali, aut paulò breuius.

Repositio optima.

A breuius. Sit autem altera parte summa rotundū, & angustissimū ac tenuissimum hac parte, habeatq; crepidinem paululum supereminētem, in extrema rotunditatis parte, sed nō ea quæ ad costas, verū ea quæ ad brachij caput existit, quo sub alam congrua sit, iuxta costas sub brachij caput subdita. Linteo autem vel fascia molli, lignū summa parte obuoluatur, quo leuius reddatur. Deinde subdito ligni capite quā penitissimē sub alam, inter costas ac brachij caput, totam manum ad lignum porrectam alligare oportet, iuxta brachiū, iuxta cubitum, & iuxta manus innēcturam, quo quā maximē sit quīeta. præ omnibus autem curandum est, vt summa ligni pars, quā penitissimē intra subalarē locum recipiatur, brachij caput trāsgressa. Postea inter duas columnas trabē trāuersam probē alligare oportet, & deinde manum cum ligno supra trabē transmittere, quo manus ab altera parte sit, corpus ab altera, trabs verò sub ala. & postea ad alteram partem manum deorsum cogere vñ cum ligno, circum trabē: ad alteram verò reliquum corpus. Trabs autem ea altitudine alligetur, vt reliquum corpus eleuatum summis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri lōgē optimus est. Iustissimē enim commotionem facit, si solum penitius intus ad brachij caput lignum fuerit. Iustissimæ item sunt inutrāque partem ad æquationem facientes librationes, & ad hæc ossi brachij securæ. Recentes itaque luxationes citius incidunt, quā quis putare possit, & priusquam extensæ esse videantur. Sed & veteres sola hæc repositio reponere potest, si non iam ob vetustatem, caro quidem in acetabulū deuenit, caput autem brachij in loco ad quem declinauit, semitam sibi ipsi iam fecit. Veruntamen etiam ita inueteratum brachij elapsū, mihi posse reponere videtur. Quid enim iusta motio nō nouerit? manere tamen in loco posse, nō ita mihi videtur, sed prout conuenit rursus luxabitur. Idem facit etiam si circum scalam, eodem modo velut dixi præparatam coactio transmissi brachij fiat. Abundē item sufficit circum magnam sedem Thessalicam coactionem facere, si recens fuerit luxatio. Præparatum autem esse oportet lignum, velut dictum est: hominem verò locare oportet in sede obliquum, deinde brachiū vñ cum ligno supra sedis reclinatorium transmittere, & ad alteram partem corpus deorsum

*Quæ in his
perpenden-
da.*

*Exemplo
comprobat.*

*Herba bre-
uis melior
pecoribus.*

cogere, ad alteram brachium cum ligno. Idem quoque fa- D
cit coactio supra biforem ianuam. His autem quæ forte præ-
sentia fuerint, utendum est. Nosse igitur expedit, quod na-
turæ à naturis multum differunt, ad hoc ut elabentia faci-
lè rursus incident: differt etiam acetabulum ab acetabulo,
quum aliud facilè transcendendi possit, aliud minus. Plurimum
item differt neruorum ligamentum, quum in quibusdam re-
missum sit, in quibusdam intentum. Nam humiditas homi-
nibus fit ex articulis, propter neruorum connexionem, si la-
xa fuerit, & intensiores facile ferat. Multos enim videas qui
adeò humidi sunt, ut quando velint, articuli ipsis citra do-
lorem excidant, & absque dolore restituantur. Differt e-
tiam habitus quidam corporis. Nam his quibus bene se ha- E
bet membrum, & carnosius, & minus excidit, & difficilior
incidit. Vbi verò ipsi seipsis tenuiores & magis excarnes fue-
runt, tunc & magis excidit, & facilius incidit. Argumen-
tum autem quòd hæc ita se habeant, hoc est. Robus enim
tunc magis femora excidunt ex acetabulo, quum tenuissimi
existunt. Fiunt autem tenuissimi boues ad finem hyemis.
Tunc igitur etiam maximè luxantur: si tamen & huiusmo-
di quiddam in medicina scribere conuenit. Verum conue-
nit utique. Bene enim Homerus didicit, quòd ex omnibus
pecudibus boues quàm maximè laborèt hoc tempore, & ex
bobus potissimum aratores, eo quòd hyeme operentur.
His itaque maximè excidunt articuli. Hi enim maximè at-
tenuantur. Nam reliqua quidem pecora breuem herbam P
depasce possunt, Bos autem non ita valde priusquam alta fiat.
Reliquis enim tenuis est labri prominentia, tenuis item su-
perna maxilla. Boui verò crassa est labij prominentia, crassa
ita & obtusa superna maxilla. Quapropter in breues herbas
subijcere non potest. Rursus solipeda animalia utpote utrin-
que dentata, & dentes inter se committere possunt, & sub
breuem herbam dentes subijcere queunt, delectanturque ta-
li herba magis quàm alta. Breuis enim herba in totum me-
lior ac solidior est quàm alta, adde quòd alta etià prius fru-
ctum effert. Ob hoc igitur ita cecinit,

*Haud secus ac bobus nigris gratissima ueris
Tempora proueniunt.*

quia

- A** quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & aliàs bos laxi
habet hunc articulū, magis quàm alia animalia: & ob id etiā
magis quàm alia pedē trahit, & maximè quum macilentus
est, & iam senex. Propter omnia hæc etiā maximè boui exci-
dit. Plura autē de ipso à me scripta sunt, eo quòd omniū an-
tea relatorum testimonia hæc sunt. Verùm de quo nunc ser-
mo est, excarnib. magis excidit, sicut etiā citius incidit, quàm
probè carnosus: & humidis ac excarnibus minus inflamma-
tur, quàm siccis ac carnosus: & in posterum tempus quoq; mi-
nus vincitur: sed & mucus amplior moderato subest, si non
adsit inflāmatio, & sic sanè lubricus fuerit. Mucosiores enim
omnino sunt articuli excarnibus quàm carnosus. Nam &
B ipse carnes eorum qui non rectè ex arte fame macerati sunt,
in macilentis mucosiores sunt, quàm in crassis. Quibus ta-
men cum inflammatione mucus subest, his inflāmatio vin-
culo factò articulum cōtinet: & ob id hi qui submucosi sunt
articuli non valdè excidunt, & exciderent vtique si non plus
aut minus inflammationis accessisset. Quibus igitur quum
articulus excidit, circumsitæ partes non inflāmantur, & sta-
tim citra dolorem humero vtī possunt, hi putāt quidē nihil
opus esse vt suis ipsorum curā gerant, medici tamē est vt con-
tra tales vaticinetur: talibus excidit rursus magis quàm his
quibus nerui sunt inflāmati. Atque hæc res in omnibus in
homine ita habet, & maximè circa humerum & genu. Maxi-
mè igitur etiam hæc excidunt. Quibus autem nerui inflā-
C mati sunt, hi humero vtī nō possūt. Prohibet enim dolor &
inflāmationis distentio. Tales igitur curare oportet cerato,
& splenijs, & linteis multis deligando. Sub alam verò lanam
mollem pura conuolutam subijcere oportet, ad cavitatē ex-
plendam, quo fulcimētum quidem sit deligationi, articulum
verò sustentet. At brachium plerunq; sursum vergens tenere
oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput à loco, in quem
excidit. Oportet autē postquam humerum deligaueris, bra-
chium ad costas adalligare, fascia quadam in orbem circum
corpus obducta. Fricare quoq; humerum oportet placide &
accuratè. Multarum autē rerum peritum medicum esse expe-
dit, & non minus frictionis. Ex eodē enim nomine, nō idem
euentus subsequitur. Nam & vincire potest frictio articulum
iusto laxiorē, & soluere articulū iusto duriorē. Verùm de fri-

*Curatio bo-
rum.*

HIPPOCRATIS LIBER

*Brachium
an excide-
rit signum.*

Atione in alio opere à nobis tractabitur. Talem igitur hume-
rum mollioribus manibus fricare cōuenit, cōfert enim, & aliàs
leniter. Articulū autē commouere non violenter, sed intan-
tum vt circa dolorem cōmoueat. Restituuntur verò omnes
articuli partim longiore, partim breuiore tēpore. An autem
brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam vbi
iustū corpus habent homines, manus itē ac crura, sano in exē-
plum vti oportet, ad non sanum : & non sano ad sanum, non
alienos articulos inspiciendo, (alij enim alijs magis extanti-
bus sunt articulis) sed ipsos eius qui affectus est, an dissimilis
sit sanus ægrotō. & hoc rectē quidē dictum est, multā tamen
erroneam intelligentiam talia habēt : & non satis est solum
sermonis doctrina artem hanc nosse, sed conuersatione etiā
versare oportet. Multa enī præ dolore, aut ex alia causa, quū
non exciderint ipsi articuli, tamē non possunt in similes fi-
guras restitui, in quales sanum corpus figuratur. Proinde &
talem figuram insuper intelligere ac cōsiderare oportet. Sed
& in loco sub ala, caput brachij multo magis incumbere vi-
detur, in luxato quā in sano. Quin & supernē iuxta super-
nam humeri partem, cauus apparet locus : & summi humeri
os extans conspicitur, vtpote articulo ad infernum locum di-
gresso, & est etiam aliqua erronea in hoc intelligentia, sed
postea de ipso scribetur. Est enim dignum de quo scribatur.
Præterea in luxato cubiti gibbus magis à costis distare, vide-
tur quā in altero. Si tamē quis vim afferens cogat, adducit
quidē, sed cum dolore. Sed & sursum ad aurē manum attol-
lere cubiti gibbo extento, non valde potest, velut sanam : ne-
que hāc & illac similiter diducere. Hæc igitur signa sunt hu-
meri luxati, repositiones item præscriptæ & curationes hæc
sunt. Operæ precii verò est discere, quomodo frequenter ex-
cidentes humeros curare oporteat. Multi enim à certamini-
bus iam prohibiti sunt, ob hanc calamitatem, quum aliās pe-
nitus fuerint inculpabiles. Multi etiam ad res bellicas inuti-
les fuerunt, & ob hanc calamitatem perierunt. Sed & pro-
pterea res digna est quæ discatur, quòd nullum nouerim qui
rectē medeatur, sed alios ne aggredi quidem sciam, alios cō-
tra quā conducit & sentire, & facere. Multi enim medici
humeros luxatos vsserunt, & iuxta supernam humeri partē,
& iuxta anteriore, qua parte caput brachij extuberat, & iu-
sta

- A** xta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæ igitur vſtiones, ſi quidem ſurſum brachium excidiſſet, aut in anteriorem aut posteriorem partem, rectè inuſtæ eſſent. Nunc verò quū deorſum excidit, eiſciunt magis hæ vſtiones quàm impediunt. A ſuperna etiam ſpaciſ amplitudine caput brachij excludunt. Verūn hæc ita vrere oportet. Cutem ſub ala *Excidētes humeri qui urantur.* digitis apprehenſam attrahere oportet, ſecundum ipſam maximè rectitudinem, ſecundum quàm brachij caput excidit. Deinde ita attractam cutem in vltiorem partem perurere. Ferramentis autem talia vrere oportet non craſſis, neq; valde caluis, ſed oblongis. Citius enim penetrant, & manu firmata tranſigi poſſunt, pellucidis item his vrere oportet, quò *Ferramenta qualia ad hunc uſum.*
- B** quàm celerrimè pro viribus penetrent. Nam craſſa tardè penetrantia, latiores cruſtarum elapſiones faciunt, & periculū eſt ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc eſſet, verūn turpius & ab arte alienius. Poſtquam autē in vltiorem partem peruſſeris, in plurimis ſatis eſt vt infernæ parti ſoli has cruſtas inuras. Quò ſi periculum eſſe non videatur ne cicatrices rumpantur, ſed multum ſpaciſ interpoſitum ſit, tenue quoddā ſpecillum per inuſta foramina trajcere oportet, cute adhuc attracta. Neque enim aliàs trajcere poſſis. Vbi verò traieceris, cutem dimittere. Poſtea inter cruſtas aliam cruſtā tenui ferramēto inſligere ac inurere, donec ſpecillum contingas. Quantum verò de cute ſub ala apprehēdere oportet, hinc coniectare licet. Glandulæ ſub ala ſunt ſicut etiā in alijs corporis partibus. Verūn in alio libro de tota glandularum natura ſcribetur, quòd ſint, & qualia in quilibet ſignificant ac poſſunt; glandulas igitur ſimul apprehendere non oportet, neque ea quę glandulis ſunt interiora. Magnū enim afferunt periculum. Sunt enim neruis maximi momēti vicina. Quantū verò extra glandulas eſt, eius quàm plurimam partem apprehēdere oportet. Nihil enim periculi eſt. Noſſe tamē hoc expedit, quòd ſi fortiter brachium extenderis, nihil cutis ſub ala apprehendere poteris, quòd ſanè attractu memorabile ſit. Diſtrahitur enim in extēſione. Nec verò neruos vlla machina vulnerare oportet. Hi enim proprii expoſiti ſunt ac extenti in hac figura. Si verò parum brachium eleuaris, multum quidē cutis apprehendes: Nerui verò quorum curam gerere oportet, intus vltra apprehenſionē

Glandulae periculosa.

Nerui non laedendi.

consistent. Nōne igitur in omni arte pro omnibus curandum est, ut in singulis figuræ iuste inueniantur. Atq; hæc quidem de loco sub ala, & sufficiunt hæc apprehensiones, si crustæ recte fuerint iustæ. Extra verò alam duo solū loci sunt, ubi quis crustas inurere queat huic affectioni auxiliantes. Vnam in anteriore parte, inter brachij caput, & tendinem iuxta alam. Et hac quidem parte cutem penitus perurere oportet, sed non altius. Vena enim crassa propinqua est, & nerui, quorum neutra igne calfaciēda sunt. Retrorsum autem alteram crustam inurere licet, multum supra tendinē, qui est iuxta alam, & paululum infra brachij caput. Et cutem quidē penitus perurere oportet. Verū neq; hic valde altam crustam facere. Inimicus enim est ignis neruis. Curare igitur vlcera per omnem curationem oportet, ita ut brachium nunquam vehementer extendas, sed moderatē, vlcereum saltem curandorum gratia. Minus enim ita perfrigeratur. Conducit enim omnes vstiones tegere, ut etiam leniter curentur, & minus disparentur, minusq; sanguinis erumpat: & minus conuulsio accedat. Vbi verò pura facta fuerint vlcera, & ad cicatrices deuenerint, tunc sanē penitus brachium semper die ac nocte costis alligatū esse oportet. Sed & quū sana facta fuerint vlcera, similiter ad multum tempus, brachium ad costas alligandum est. Sic enim maximē cicatrix iaduei poterit, & spatij amplitudo intercipiatur, in quam maximē luxatur brachiū. Quibuscunque verò humerus repositione fuerit destitutus, si quidem homines adhuc crescant, os brachij non similiter ut sanum coaugescit, sed augescit quidem, verū altero breuius aliquanto efficitur. Et qui mustellæ cubito præditi sunt, paruumq; ac macilentum brachium ex natiuitate habent, galeancones vocati, ob duplices has calamitates fiunt tales, tum si talis aliqua luxatio ipsos dum in vtero sunt corripuerit, tum ob aliam calamitatem, de qua postea aliquando scribetur. Quin & hi quibus dum adhuc infantes sunt, profundæ ac submersæ suppurationes circa brachij caput fiunt, omnes galeancones efficiuntur: & siue secti fuerint, siue vsti, siue sua spē ipsi eruperint, hæc ita se habere nosse oportet. Qui tamen ex natiuitate galeancones sunt, etiam si manu potentissimē ut possint, tamen neque ipsi extento cubiti gibbo, brachium ad aurem extendere ac eleuare possunt. Sed

multo

Ignis inimicus neruis.

Galeancones.

A multo minus hanc quā sanam manum. Quibus verò iam viris exciderit humerus, & repositus non fuerit, his superna humeri pars magis excarnis efficitur, & habitus hac parte tenuis fit. Quum tamen dolor cessauerit, non omnia ea similiter operari possunt, quæ eleuato cubiti gibbo à costis in obliquum operari oportet. Quæ verò transmoto brachio iuxta costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & ferram trahere poterint, securi item findere, & fodere, si non valde sursum cubiti gibbum attollant, sed & alia iuxta tales figuras operantur. At verò quibus summus humerus fuerit auulsus, his os auulsum extra eminens apparet. Est autem hoc velut *Humerus summus auulsus*, vinculum clauiculæ & scapulæ. Alia enim est hominis natura hac parte quàm aliorum animalium. Medici igitur in hoc vulnere maximè falluntur. Nam quū os auulsum emineat, superna humeri pars humilis & caua apparet, vt etiam velut humeri elapsi curam adhibeant. Multos igitur noui medicos aliàs nō malos, qui grauitè affixerunt, tales humores reponere conantes, ita excidisse rati, & non prius desistunt ipsi existimare se humerum reponere, quā vel desperarint, vel frustrati fuerint. His curatio quidem eadem quæ etiam alijs huiusmodi, ceratum, splenia, & lintea, & deligatio eiusmodi, deorsum tamen cogere os supereminens oportet, & splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maximè premere: & brachium ad costas adalligatum ad supernam partem tenere. Sic enim os auulsum maximè appropinquarit. *Curatio.*

C Hac tamē probè nosse expedit, & velut certa prædicere, si alioqui voles, quòd nullum detrimētum, neque paruum, neque magnum, humero contingit ex hoc vulnere. Sed locus turpior euadit. Neque enim hoc os in pristinam sedē similiter firmari poterit, velut natura exigit, sed necesse est plus aut minus tumidum esse ad supernam partē. Neque enim aliud vllū os in eundē locum restituitur, quod cum alio osse cōmunionem habet, & adhærens à veteri naturali sede auulsum fuerit. Paucis autem diebus summus humerus doloris exors fit, si probè deligetur. Clavicula porro fracta, si quidem penitus caulatim hoc contigerit, curatu facilius est. Si verò oblique, difficilius sanatur: & contraria in his contingunt, aliter quā quis putauerit. Nā quæ penitus caulatim fracta est, cogi *Clavicula fracta* magis

magis poterit vt ad naturam redeat. Et si diligens cura adhi- **D**
 beatur, partem quæ superior est, inferiorē fecerit figuris ido-
 neis. & deligatione cōueniente. Si verò perfectè non firmata
 fuerit, attamen supereminens ossis pars non valde acuta fit.
 At quorū os in longitudinem fractum fuerit, his similis os-
 sibus auulsis calamitas contingit, de quibus antea scriptum
 est. Neq; enim ipsum ad seipsum valde firmari solet, & sum-
 ma ossis eminētis, valde acuta fit. In vniuersum igitur nosse
 expedit, quòd nullum detrimentū neque humero, neque re-
 liquo corpori, ob clauiculæ fracturam accedit, si non insuper
 corruptio aliqua contingat. Raro autem hoc fit. Deformitas
 tamen circa clauiculæ fracturā accedit, primū turpissima,
 deinde verò minor fit. Coalescit autem clauicula cito, item- **E**
 quæ alia ossa laxa. Celerem enim calli obductionem talia fa-
 ciunt. Quum igitur recens fracta fuerit, vulnerati ad curatio-
 nem festinant, maius malum esse putātes quā est, & medi-
 ci quoque prompti sunt ad rectè curandum. Progressu verò
 temporis & vulnerati, vtpote qui neque dolent, neq; iter fa-
 cere, neque cibum capere prohibentur, negligunt: & medici,
 vtpote qui suis sedibus restituere nō possunt, aufugiunt, ne-
 que vulneratorum negligentiam ægrè ferunt. In hoc autem
 calli obductio acceleratur. Deligationis verò modus plerisq;
 cōsimilis est, vt cerato & splenijs, & mollibus linteis curatio
 fiat. Insuper autem & hæc curatio, & hæc animaduersio ha-
 benda est, & præsertim in hac aggressione: q̃ plurima sple-
 nia iuxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis **F**
 deligationibus maximè circa hanc partem premere. Sunt au-
 tem aliqui quibus complacuit plumbum graue insuper adal-
 ligare, vt supereminentem partem deorsum cogat. Fortassis
 autem neque intelligunt qui simpliciter deligant. Sed neq;
 hic modus ad clauiculam fractā pertinet. Neque enim fieri
 potest vt id quod eminet memorabili modo deprimat. Alij
 verò quidē sunt, qui quum cognouerint quòd hæc deligatio-
 nes erroneæ sunt, & nō secundum naturam supereminentia
 deorsum cogunt: deligant quidem ipsos splenijs & linteis v-
 tentes, velut etiam alij. Verū cincto homine fascia quadā
 qua parte maximè cingi solet, postquā splenia supra eminen-
 tes fracturas imposuerunt, ita vt isthic magna molle extube-
 rent, tunc initium lintei ad cincturam ex anteriore parte al-
 ligant,

Deligatio.

A ligant, atq; ita deligant in directum clauiculæ extendentes ac retrorsum ducentes, & isthic cincturæ circumdatum in anteriorem partem reducunt, & rursus in posteriorem. Aliqui verò non cincturæ linteum circumdant, sed circum inter fœmineum iuxta sedem, & per spinā linteum circumdantes, hoc modo fracturam comprimunt. Hæc itaque si quis inexpertus audit, prope secundum naturam esse videntur, verum si quis vtatur inutilia existunt. Neq; enim stabilia sunt, etiam si decumbat quis, quamuis ita vel maximè stabilitas cōtingat: atamen si decumbens aut crus inflexerit, aut ipse se inclinet, omnia deligamēta mouebuntur: & alioqui noxia est hæc deligatio. Nam & sedes intercluditur, & linteæ in hac angustia aceruata fiunt. & quæ rursus cingulo circumdantur, non ita valida facta cinctura circumdari possunt, vt nō cingulum sursum ascendere cogant, neque ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quam proximè verò quis rem conficere videri possit, etiam si non magna faciat, si quibusdam linteis cingulum circundet, plurimis autem linteis priorem deligationem perficiat. Sic enim maximè stabiles fuerint deligationes & mutuam inter se opem tulerint. Plurima igitur ex his quæ cōtingunt his quibus clauicula fracta est relata sunt. Insuper autē & hoc adintelligere oportet, quòd clauicula plerunq; frangitur ita vt os quod à pectore est, ad supernā partem emineat: quod verò à summo humero est, in infernam partem subsidat. Causæ verò horū hæ sunt, quòd pectus neque multo inferius, neq; superius procedere potest. Nam articuli in pectore motus paruus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spinæ, ex continuitate commissum est. Proximè quidem clauicula ad humeri articulum fluctuat. Cogitur enim frequētem motum habere, propter summi humeri connexionē, & alioqui vbi vulnerata est, ad supernam partem defugit ea pars quæ pectori adhæret, & non valde ad infernam partem cogi potest. Nā & à natura leuis est, & loci amplitudo ipsi supernè maior est, quàm infernè. At humerus, & brachium, & quæ his annexa sunt, à costis ac pectore facilè exolui possunt: & propterea multo superius ac inferius abduci queunt. Quum igitur fracta fuerit clauicula, os quod ad humerum est magis deorsum repit. Huc enim ipsum vnà cum humero & brachio defluere procliuus est quàm sursum ferri. Quum igitur hæc

ira

HIPPOCRATIS LIBER

ita se habeant, imprudenter se gerunt qui supereminentem D
 ossis partem deorsum cogere oportere putant. Nam infer-
 nam ad supernam adducendam esse manifestum est. Hæce-
 nim motū habet. Hæc est quæ à natura discessit. Clarū itaq;
 est aliter nullo modo ipsam cogi posse. deligationes enim ni-
 hilo magis appellant quàm repellunt. Si verò quis brachiū
 quàm maximè ad costas admotum sursum cogat, vt quàm a-
 cutissimus esse humerus videatur, perspicuū est quòd sic ada-
 ptari poterit ad os quòd à pectore est, vnde est diuulsa. Si
 quis igit legitima deligatione vtatur, celeris curationis gra-
 tia:& reliqua omnia frustra fieri putet, præter figuram rela-
 tā, is & rectè intellexerit, & celerrimè ac optimè curauerit.

Alia clauicula fractu Decumbere tamen hominem multū refert, & sufficiunt dies E
 quatuordecim si quieuerit, aut ad summum viginti. Si ta-
 men contrario modo clauicula fracta fuerit, quod non valde
 contingit, vt os quod à pectore est subsidat, quod verò à sum-
 mo humero est superemineat, alterique superster: nulla ma-
 gna curatione in his opus fuerit. Ipse enim humerus & bra-
 chium si demittatur, ossa inter se committere ac firmare po-
 test. & vilis quæpiam deligatio suffecerit, & pauci dies satis
 erunt ad callum obducendum.

Alia. Quòd si hoc modo fracta non fuerit, sed in obliquum hæc vel illac luxata, ad naturam redpcere oportebit, humero cū brachio sursum adducto, ve-
 lut etiam ante dictum est. Quum autem ad pristinā naturā
 resederit, reliqua curatio velox erit. Plerasq; igitur immuta-
 tiones ac luxationes, brachium si sursum cogatur corrigit. F
 Quæcunque verò luxationes ex supernis obliquè ad latus fi-
 unt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus
 decubuerit, iuxta medias autem scapulas aliquid altius sup-
 positum fuerit, quo pectus maximè in vtranque partem infle-
 xum sit:& brachium adducat quis ad costas porrectum. Me-
 dicus autē altera manus vola in brachij caput injecta retru-
 dat, altera ossa fracta componat. Sic enim quàm maximè ad
 naturam reduxerit. Verūm quod iam dictum est, supernum
 os facile ad partem subidere solet. Plerisque igitur vbi deli-
 gati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita vt ad ipsas costas cubi-
 ti gibbum habentes, hoc modo humerum ad supernā partē
 cogant. Quibusdam verò humerum quidem sursum velut di-
 ctum est, cogere oportet: cubiti autem gibbum ad pectus ad-
 ducere

- A** ducere: summam verò manum ad summum sanum humerū adhibere. Siquidem igitur decumbere sustinet, fulcimētum aliquod quod obfirmet apponere oportet quo humer⁹ quàm maximè superne maneat. Si verò obambulare volet, fundam ex fascia factam, & acutè gibbi cubiti parti circumdatam, de collo appensam gestare oportet. Cubiti porro gibbi articu- *Cubiti luxa-
tio.* lus ubi emotus aut luxatus est, ad costas, aut foras, acuta ipsi⁹ parte in brachij cavitare manente, extensione in directū facta, id quod eminet retrorsum & in obliquum repellere oportet. Vbi verò perfectè excidit, aut hanc aut illac, extensio in qua brachium fractum deligatur requiritur. Ita enim incurua gibbi pars non impedit. Excidit aut maximè ad partem versus costas. *Curatio.*
- B** Correctiones verò facere oportet quàm plurimum abducendo, & ut ne brachij caput cornicem contingat, sublimem circumducere ac inflectere, & non in directum cogere, simul autem contraria in vtranque partem detrudere, & in sedem compellere. Cōtulerit etiam in his gibbi cubiti inuersio, modò in supinā, modò in pronam partē. Curatio verò ex figura est, ut summam manum paulò altiorē cubiti gibbo habeant, brachiū verò ad costas. Sic etiam appensi exceptio, & positio, & gestandi facilitas, & natura, & vsus, in communi sunt, si modò non malè callus obducatur, *Curatio.* Obducitur autem cito. Curatio fit linteis iuxta legem articuli larem, ita ut acuta eius pars insuper deligetur. Recrudescit autem maximè cubiti gibbus febribus, doloribus, nausea & vomitu meracæ bilis, præsertim si retrorsum luxatus fuerit,
- C** ob torporē; deinde, si in anteriorem partem. Verū curatio eadem est. Repositio verò retrorsum luxati, ut extentum distendamus: Signum autem est, quòd extēdere ipsum nō possunt, sicut in anteriorem partem luxati, quòd inflectere nequeunt. Verū tunc durum quiddam inuolutum indere oportet, & circū hoc ab extensione derepētē inflectere. Disparationis autem ossium signum est manifestum ex contactu iuxta venam quæ in brachio finditur. At verò callus cito his obducitur. Ex natiuitate autem breuiora sunt ossa infra noxam. plurimū quæ proxima sunt, cubiti. deinde manus, postea digitorum. Verū brachium & humerus robustiora sūnt, propter inuersionem. At altera manus propter opera adhuc fortior est. Imminutio verò carniū fit, si foras excidit, intrinsecus:

HIPPOCRATIS LIBER

secus: Sin minus, in contrarium prout excidit. Cubiti verò D
gibbus si intrò, aut extra exciderit, extensio fit in communi
figura cubiti ad brachiū: fascia enim sub alā data, ipsam ex-
ceptam suspendere oportet: ad summum verò cubiti gibbū
iuxta articulum pondus appēdere, aut manibus deorsum co-
gere. Vbi verò articulus vltra eleuatus est, coaptationes ma-
nuum volis fiunt, velut etiam in manibus. Deligatio quoque
in hac figura, & exceptio appēsi, & positio. At si in posteriore
excidit partē, statim extētū palmis dirigere ac coaptare o-
portet. Simul autē in directione etiam alijs opus est. Si in an-
teriorē, circum linteum conuolutum iustæ mollis inflectēdo
simul directionē facere oportet. Si verò in alteram partē in-
clinarit, in directione simul vtrāq; facere oportet. Verū cu E
rationi cōmunis est figura & deligatio. Possunt autē ex dis-
tentione omnia in cōmuni contingere. At verò repositiones
aliæ ex supereleuatione reponūtur, aliæ ex extēsiōne, alię ex
circūuolutione. Hæ verò ex figurarū excessibus, aut hæc, aut
illac celeriter fiunt. Manus articulus aut intrò, aut extra lu-
xatur, plerūq; verò intrò. Signa autē facilia cognitu sunt. Si
enim intrò luxatus est, digitos inflectere non possunt. Si ex-
tra extēdere nequeūt. Repositio fit, digitis supra mēsam posi-
tis, vt ab alijs atque alijs in diuersum extensio fiat, & id quod
eminet, aut vola aut calcaneo retrudatur, & in anteriore par-
tem deorsum protrudatur. Infernē verò iuxta alterum os mo-
les aliqua conuoluta mollis supponatur, si supra eminet, ma-
nu prona locata: si infrā, supina. Curatio verò linteis fit. Tota F
porrò manus, aut intrò, aut extra, aut hæc, aut illac luxatur.
Maximē verò intrò. Quandoque autem & appendix emora
est. Quandoque verò alterū os disparatum distat. His exten-
sio foris facienda est, & quod quidem eminet retrudatur, al-
terum verò contra trudatur, duabus speciebus simul contin-
gentibus, & retrorsum, & in obliquū, aut manibus supra mē-
sam, aut calcaneo. Quæ verò recrudescunt ac deformia sunt,
tempore ad vsum corroborantur. Curatio fit linteis cum ma-
nu & cubito: & ferulæ vsque ad digitos ponuntur. At ferulis
hæc deligata frequentius quàm fracturas soluere oportet, &
perfusionem ampliore adhibere. Ex natiuitate autem ma-
nus breuior fit, & carnes imminuuntur maximē in contraria
parte ei in qua luxatio facta est. At adulto iam ossa manent.

Digiti

*Manus lu-
xatio.*

Repositio.

Curatio.

- A** Digiti verò articulus luxatus facilis cognitu est. Repositio *Digitus luxatus.*
 fit extēdens in directum, ita vt quod eminet os protrudatur, contrariū verò contra trudatur. Curatio fit fascijs ac lintheis. *Repositio.*
 Si verò nō reponantur, forinsecus callo obducitur. At si hi ex natiuitate, aut dum adhuc crescit homo, luxata fuerint ossa, *Curatio.*
 breuiora fiunt infra luxationē, & carnes imminuūtūr cōtraria maximē parte ei in qua luxatio facta est. In adulto verò ossa manēt. Maxillaverò paucis iam perfectē luxata est. Os *Maxilla luxatio.*
 enim quod à superiore maxilla prodit, cū eo osse subiugatū est, quod sub aurē annexum est, quōdque capita infernæ maxillæ concludit, ac dirimit, cū altero capite superius sit, altero inferius: & extremę infernæ genæ partes ita se habēt, vt altera ob longitudinē non facile accessum admittat: altera verò cornix est, & supra iugale os excedit. Simul autē & ambarū harum extremitatū neruosi tēdines existunt, ex quibus musculi dependent, qui tēporales ac manducatorij appellantur. Propterea autē appellantur, & propterea mouētūr, eo quod hinc dependent. Nā in edendo, & in loquendo: & in reliquo oris vsu, superna quidē maxilla quiescit. Est enim capiti connexa, & nō coarticulata. Inferna autē maxilla mouetur. Coarticulata enim est à superna maxilla, & à capite. Cur igitur in conuulsionibus ac distētionibus hic articulus distentus primus de se significationē præbeat: & cur plagæ tēporales periculosæ sint, ac soporē inducant, alio libro referetur. Quod verò non valde luxetur, causæ hæ sunt. Sed & hæc quoque causa est, quod non valde tales ciborum necessitates hominem apprehēdunt, vt magis quā potest, hiet. Excederit autem à nulla alia figura, quā si quis valde hiās maxillam in alterā partem diducat. Confert tamē ad hoc vt excidat, hoc ipsum. Quicūque enim nerui, & quicūque musculi circa articulos sunt, aut ab articulis ex quibus colligantur, horū quicūque in vsu sæpe mouentur, hi etiam maximē ad extensiones remittunt, quēadmodum etiam pelles mollissimæ multū remittunt. De quo igitur sermo est, luxatur quidē & excedit maxilla rārō: laxatur tamen sæpe in hiatibus, velut etiam aliæ musculorum ac neruorū immutationes hoc faciunt. Manifestū verò ex his maximē sit, vbi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriore partem, & in cōtrariam luxationi partem abducitur, & oris cornix circa supernam maxillā tumidior

HIPPOCRATIS LIBER

Repositio. sit, & infernas maxillas difficulter cōmittunt. Quæ verò re-
positio his conueniat, manifestum est. Oportet enim aliquē D
vulnerati caput detinere, & alterum infernā maxillam in-
trinsēcus ac extrinsēcus ad mentum digitis apprehēdere, &
primū maxillam aliquādiu hāc atq; illāc manu abducere, &
ipsum hominē iubere, vt maxillam laxā habeat, & simul ad-
ducat, ac quāmaximē remittat. Deinde repētē tribus figu-
ris simul laxare oportet, diligētī in hoc animaduersione ha-
bita. Nam & ex distortionē ad naturam deducere oportet, &
Curatio. infernā maxillam retrorsum protrudere, ita vt agrē hāc se-
quatur, & maxillas cōmittat, ac non hiet. Atq; hāc quidem
repositio est, & neque alijs figuris fieri poterit. Curatio verò
breuis sufficit. Splenium enim inecratum apponitur, ac laxo
deligamento deligatur. Securius autem hāc aggressio perfī E
citur, homine supino reclinato, & coriaceo puluinari plenissi-
mē factō capiti supposito, vt in ipsum innitens quāmini-
mū cedat. Insuper autem & caput vulneratī aliquis detine-
re debet. Si verò ambæ maxillæ luxatæ fuerint, curatio qui-
dem eadem est, verū hi os minus committere possunt. Nā
his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quod verò
distortæ non sint, maximē cognoueris ex dentium tum su-
periorum, tum inferiorum terminis, ē directō inter se cor-
respondentibus. His confert vt quā citissimē reponantur.
Repositionis autem modus prius dictus est. Si verò nō repo-
nantur, animæ periculum imminet, præ febribus continuis,
& torpido sopore. Soporiferi enim hi muscoli sunt, & dum F
alterātur, & dum intēduntur præter naturā. Solet etiam al-
uius his biliosa, meraca, pauca egerere. Et si vomuerint, mera-
ca vomūt. His igitur etiam moriuntur decima maximē die.
At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidem nō omnino cau-
latim hoc contigerit, sed cohaeret adhuc os, contractum ta-
men fuerit, dirigere quidem os oportet digitis circa linguā
obliquam subiectis, forinsēcus verò contra niti, prout cōtu-
lerit. Et si distorti fuerint dentes iuxta vulnus cōmoti, post-
quam os directum fuerit, dentes inter se coniugare oportet,
non duos solum, sed etiam plures, atq; hoc maximē auro, sin-
minus, lineo filo, donec os corroboret. Postea cerato, & sple-
nijs paucis, & linteis modicis deligare, nō nimīū firmis, sed
laxis. Nam hoc probē nosse expedit, quod deligatio per lin-
tea

A tea, maxillæ fractæ parū quidem contulerit, si rectè fiat: magnopere verò læserit, si prauè deligetur. Frequenter autè circa linguā explorare oportet, & multo tempore reniti ac digitis dirigere os confractum, optimūque esset si hoc semper fieri posset, sed fieri nequit. Si verò os penitè caulatim diffractum fuerit, raro autem hoc cōtingit: dirigere quidem os oportet velut dictum est. Vbi verò direxeris, dentes coniugare, quemadmodum antea dictum est. Magnopere enim contulerit ad quietem, & adhuc magis si quis rectè cōiungat, & velut oportet suturas consuat. At enim nō facile est omnem chirurgiam scripto exquisitè prodere, sed ex his quæ scripta sunt, formam & imaginem cōcipere oportet. Postea corio opus est Carthaginēsi. & si quidem iunior fuerit vulneratus, satis est squama inde detracta vti. Si verò adultior, ipso corio ita vt defecta inde particula trium digitorum latitudine, aut prout cōgrua fuerit, sublita prius è gummi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinēt summa sui parte, ad diffractam maxillæ partem, digiti aut paulo ampliore distantia à vulnere. Et hæc quidem particula ad infernā partem agglutinanda est, & habeat fissuram è directo menti quo acutam eius partem circuncirca complectatur. Alterum autem eiusmodi lorum, aut paulo latius, ad supernam maxillæ partē agglutinare oportet, tanta à vulnere distantia, quanta illa altera lori particula abfuit. Sit autem & hoc fissum, vt circuncirca aurem ambiat. Sint autem hæc lora acuta, quæ se cōmittuntur, & vbi ipsorum extremitates connectere ac colligare oportet. In agglutinatiōe verò, caro corij ad cutē vergat. Sic enim magis agglutinatum adhærescit. Postea extento hoc loro, magis autem eo quod circa mētum est quàm maximè, ne maxilla exacuatur, lora ipsa circa verticem connectere oportet, & deinde linteo frontem deligare, & superiniectū quid esse oportet, velut moris est, quo vincula quæta sint ac firma. Decubitus autē faciat in sanam maxillam, nō maxillæ, sed capiti innitens. Attenuandum verò est corpus vsque ad dies decē, deinde renutriendum nō tardè. Si enim primis diebus inflammatio non accesserit, in viginti diebus maxilla corroboratur, perfectè enim callo obducitur, quæadmodum etiam alia ossa rara, si nō corruptio infestarit. Verū de corruptionibus omnium ossium alia longa tractatio restat. Hæc exte-

HIPPOCRATIS LIBER

fio per agglutinamenta fiens, mitis est, & prompta ad mo- **D**
 derationem faciendam, & ad multas ac multis locis facien-
 das directiones accommodata. At medici non intelligentia
 æquæ ac manibus præpti, tum in alijs vulneribus, tum in ma-
 xillarum fracturis tales existunt. Varijs enim modis, & bene
 & male, maxillam fractam deligât. Omnis enim deligatio
 maxillæ sic fractæ, ossa ad fracturam magis vergentia incli-
 nat, quàm ad naturam ducit. Si verò inferna maxilla circa
 connexionem ad mentum diuulsa fuerit. Sola autè hæc con-
 nexio in inferna maxilla est. Verùm in superna multæ. Sed
 non volo sermone longius aberrare. In alijs enim morborũ
 speciebus de his dicendum est. Si igitur connexio ad men-
 tum disparata fuerit, ipsam coaptare cuiuslibet viri est. **E**
 Os enim quod eminet, ad internam partem digitis adnotis de-
 trudere oportet. Quod verò intrò vergit, ad externam par-
 tem digitis immisissis reducere. Hæc tamẽ extensione disten-
 dendo facere oportet. Facilius enim sic ad naturã redibunt,
 quàm si quis ossa inter se complicans cogere conetur. Vbi ve-
 rò coaptata fuerint, coniugare oportet dentes inter se hinc
 atque illinc, velut prius dictum est. Curare verò cerato, &
 splenijs paucis ac linteis. Deligationem autem breuem po-
 tius quàm variam hic locus maximè admittit. Nam vt æqui-
 libris non est, propè tamen ad æquilibrium accedit. At lintei
 obuolutionem facere oportet, si quidem dextra maxilla emi-
 ner, in dexteram. In dexteram enim fieri putatur, si dextra
 manus deligationi præit. Si verò altera maxilla eminuerit, **F**
 aliter deligationem ducere oportet. & si quidem rectè quis
 coaptationem adeptus fuerit, & velut cõuenit quietuerit, ci-
 ta curatio continget, & dentes illæsi manent. Sin minus, diu-
 turnior fiet curatio, & distortionem habebit. dentes autè læ-
 si & inutiles fiunt. Porro si nasus fractus fuerit, fracturæ mo-
 dus non vnus est. Verũ qui pulchris deligationibus gaudent
 citra intelligẽtiam, tum in alijs multis damnum incurrunt,
 tum in fracturis circa nasum vel maximè. Ex deligationibus
 enim hæc maximè varia est, & quæ plurimas ascias habeat,
 & interruptiones ac interceptiones cutis maximè varias rhõ-
 biformes. Sicut igitur dictũ est, qui nulla intelligentia præ-
 diti aggressioni studio tenentur, vltro se offerunt ad nasum
 fractum deligandum. Vna itaque altera quæ die lætatur me-
 dicus,

*Nasi fra-
 ctura.*

- A** dicus,gaudet quoq; is qui deligatur.Deinde cito quidē is qui deligatur,satiatur.Noxia enim & molesta est gestatio:satis autem est medico ostentasse,quòd nasum variè deligare nouit.facit autem talis deligatio omnia contra quàm conuenit.Partim enim qui propter fracturam simi fiunt,si supernè quis magis premat,firmiores nimirum fient.partimverò quibus nasus hac aut illac distorquetur, aut circa cartilaginem, aut superius,palàm est quòd neq; ipsis supernè deligatio proderit,sed etiam magis ledet.Non enim ita congruit splenijs altera nasi pars,quanquam neq; hoc faciant deligantes.Proximè verò deligatio resistere mihi videtur, si iuxta medium nasum circa acutam partem,contusa caro ad os fuerit, aut etiam os parum,& non multū contusum sit.Talibus enim nasus callo obducitur,& aliquanto asperior euadit.Sed tamen neq; his deligatio multo negotio opus habet, si modo etiā deligare oportet.Sufficit autem super cōtusionem splenium inceratum extendere.Postea velut ex duobus initijs deligatio fit,ita semel lintheum circundandum est.
- Curatio.* Optima tamen curatio est,per farinam triticeam hornam,lotam,viscosam,subactam,modicā, ita vt talia ex illa velut cataplasmate integantur. Si igitur triticea farina bona fuerit,& tractu facilis,ea ad omnia huiusmodi uti oportet. Si verò non facilis tractu sit, modicam mannā leuissimè tritam,& aqua dilutam,cum farina subigere oportet,aut gummi parum,similiter ammiscere. Quibuscunque igitur nasus fractus est,
- C** vt deorsum & in sinum vergat, si quidem ex anteriore parte iuxta cartilaginē subsidat, fieri potest vt aliquid quod ipsum dirigat in nares indatur. Si minus, omnia talia digitis in nares iniectis dirigere oportet,si id fieri datur.Sin minus,crassum specillum nō in anteriorem narium partem digitis indere oportet,sed qua parte nasus subsidit:extrinsecus autem ab vtraque parte nasum apprehendere, simulque cogere ac sursum ducere. Et si quidem valde in anteriore parte fuerit fractura, fieri poterit, vt aliquid intra nares indatur, velut iam dictum est, nimirum lintei rasura, aut aliud quid huiusmodi,linteo inuolutum, aut potius in corio Carthaginensi confutum, ea figura quæ congruat loco cui incumbet. Si verò vltius facta fuerit fractura, fieri non potest vt aliquid indatur. Si enim in anteriore parte mole-

HIPPOCRATIS LIBER

ita est gestatio, quomodo non sit in interiore? Primum igitur & intrinsecus conformando, & forinsecus non par-
 cendo, ad pristinam naturam reducere ac dirigere oportet. Val-
 de enim conformatur nasus fractus, maximè quidem eadem
 die: sin minus, paulo postea. Verùm segniter agunt medici,
 & leuius quàm conuenit primum contingunt. Inijcere e-
 nim manus hinc atque illinc iuxta naturam nasi quàm infi-
 me oportet, ex infernis sursum cogendo, & sic quàm maxi-
 mè erigere, vnam cum intena directione etiam extrinsecus
 dirigendo. Postea ad hæc nullus talis medicus est, si studium
 adhibere ac tolerare vult, velut ipsius digiti indices. Hi e-
 nim maximè secundum naturam sunt. Vtrunque enim di-
 gitum inijcere, eoquæ totum nasum firmare oportet, atque
 ita in quiete habere, si quidem fieri posset, semper donec
 corroboretur: sin minus, plurimo tempore velut dictum est.
 Quod si fieri nequeat, aut puer aut aliqua mulier hoc faciât.
 Molles enim manus esse oportet. Sic enim quàm optimè
 nasus curari poterit, vbi non in obliquum, sed ad infernam
 partem aequaliter subsidat. Ego igitur nullum vnquam na-
 sum vidi, qui sic fractus dirigi non potuisset, si statim ita co-
 geretur priusquam callus obduceretur, si modo quis rectè cu-
 rare velit. Verùm homines vt ne deformes fiât, multo quidem
 precio coemerint, studium autem adhibere non sciunt, si-
 mulquæ non tolerant, si non dolore vexentur, aut mortem
 timeant: quanquam breui tempore nasus callo obducatur.
 decem enim diebus corroboratur, si non corruptio insuper
 accedat. Quibuscunque verò os in obliquum frangitur, cu-
 ratio quidem eadem est. Verùm directionem non æqualem
 vtrunque facere oportet, sed quod inclinatum est, extrinse-
 cus cogendo ad naturam compellere, & in nares facta cõtre-
 ctatione, ea quæ intrò repunt impigrè dirigere, donec cor-
 recta fuerint: ita vt eius probè memineris, quòd si non sta-
 tim corrigantur, fieri non possit vt nasus non distortus fiat.
 Postquam autem ad naturam reduxeris, digitos plures aut v-
 num digitum ad locum ad mouere oportet, qua parte emine-
 bat, atque ita aut ipsum, aut alium quendam sustentare, do-
 nec vulnus corroboratum fuerit. Sed & in nares paruum di-
 gitum immittere oportet, & aliàs atque aliàs impellendo ea
 quæ inclinata sunt dirigere. At si quid inflammationis his
 accedat

Accedat, farina subacta vti oportet: & tamen incumbente etiam farina digitos similiter admoveere opus est. Si verò iuxta cartilagineum in obliquum fractus sit, necesse est summum nasum distorqueri. Talibus igitur in summam narē ali quid quod dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autem quis multa idonea inuenire, quæ neq; odorem habeant, neque aliās lenia sint. Ego verò quādoque pulmonis ouilli frustum defectū indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spongiæ inditæ humiditates suscipiūt. Postea Carthaginēsis corij squamā magni digiti latitudine, aut prout contulerit resectam, extrinsecus ad nasum inclinatum agglutinare oportet, & deinde hoc corij lorum prout contulerit extendere. Paulo tamen amplius extendere cōuenit, quo erectus & absolutē directus sit nasus. Longum autē sit hoc lorum, vt postea infra aurē abductū circum caput obducatur: & licet quidē lori extremitatem ad frontem agglutinare, licet etiā longius deducere, & deinde capiti obductum deligare. Hic modus simul iustam directionem habet, & simul ad mōderationē faciendā promptus est, vt si quis magis aut minus nasi inclinationē ad contrarium facere velit. Nam quibus in obliquū nasus frangitur, eos in reliquis velut relatum est curare oportet. Plurimis tamen insuper opus est, vt inclinatio nis in contrarium gratia, lorum ad summū nasum agglutinētur. Quibuscunq; verò cum fractura etiam vlcera adsunt, eos ea propter turbari non oportet. Verū super vlcera ceratum picatū imponere, aut ex emplastris aliquod cruentis vulneri bus idoneum. Facilia enim curatu talia sunt. Similiter etiā, si ossa discessura sunt. Primam directionē impigrē facere oportet nihil omittendo, & directionem per digitos etiā postero tempore, ita vt laxius quidem admoueas, admoueas tamen. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facili mē cōformari potest. Cæterum lorum agglutinatione ac in contrarium inclinatione vti omnino nihil prohibet, siue vlcera affuerint, siue inflammatio. Nullam enim molestiā exhibēt.

At verò si auri fracta fuerit, deligationes omnes inimicæ sunt. Neq; enim ita laxam quis circūdare poterit. Si verò magis premat, maius malum operabitur. Nam & sana auri deligatione pressa, dolore, & pulsatione, & febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidē omnino sunt quæ grauissima

*Auricula
fractura.*

sunt. Verum & alia pleraque omnia mala sunt. & abscessus inducunt, & mucum ampliorem suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His autem fracta auris minimè opus habet. Proximum tamen locum habet, si quid imponi debet, farina viscosa, quam neque ipsam grauem esse oportet. Contingere verò quàm maximè conducit. Bonum enim aliquando medicamentum est, etiam nullum adhibere medicamentum, & ad aures, & ad multa alia. Vellicationem insuper ac scalpturam vitare oportet. Corpus autem attenuare, & magis in quo periculum est ne auris suppuretur. melius est quoque aliud mollire. Si verò quis facillè vomat, ex moderata aliqua purgatione vomitum faciat. At si ad suppurationem deueniat, cito quidem aperire non oportet. multa enim ex his quæ suppurari videntur quæ doque resorbentur, etiam si nodum quis vllum cataplasma imposuit. Si verò quis aperire cogatur, celerrimè quidem sana sit, si in vltiorem partem perurat. Illud tamè certo scire expedit, quod mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit. Si verò non in vltiorem partem peruratur, tumidam partem non valde parua sectione incidere oportet. Sub crassiore enim cute pus reperitur quàm quis putauerit. Verum ut in summa dicam, alia quoque omnia mucosa, & mucos facientia, utpote quæ sunt viscosa, ad contactum sub digitis hac atque illac cito dilabuntur: & propterea sub crassiore cute medici talia inueniunt, quæ putarint. Nam & aliquas nervorum contortiones, ganglia appellatas, quæ sanè laxæ ac fluidæ sunt, mucosamque carnem habent, multi aperiunt, humorem in talibus se inueniuros esse putantes. Medicus quidem igitur sententia sua fallitur, verum rei huiusmodi nullum ex apertione accedit detrimentum. Qui verò aquosi loci sint, aut mucos pleni: & in qualibet locis singula si aperiantur mortem afferant, aut etiam alia detrimenta inducant, de his in alio opere scribetur. Quum igitur inciderit quis aurem, ab omnibus quidem cataplasmatibus, & ab omni linamentorum usu abstinere oportet. Curare autem vel emplastro aliquo cruentis vulneribus idoneo, vel aliquo alio, quod neque gravitatem, neque dolorem inducat. Si enim cartilago denudari inceperit, & subsidentia purulenta aut mucosa habuerit, molestum est: Fit autem & hoc propter illas curationes. Ceterum omnium eorum quæ recruduerunt, perustio in vltiore partem sufficientissima medela est. Verticula verò spinæ quibus

Auris incisa.

Curatio.

Verticula spinæ.

A quibuscunq; in gibbum trahuntur ex morbis, pleraq; vt soluantur fieri non potest. Insuperq; & quæ supra septi transuer si iuncturam ac connexionem gibba fiunt. Quæ verò infra, eorum aliqua soluunt varices in cruribus fientes. Magis autē hæ varices quæ in vena iuxta poplitem fiunt, quibuscunque gibbositas cōtigerit, eam soluunt. Fiunt autem & in vena circa inguina. Iam verò quibusdā etiā dysenteria diuturna soluit. Et quibus quidē gibba sit spina dum pueri sunt, priusquā corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus iuxta spinam coaugeri non solet. Sed crura quidē ac manus perficiuntur, illæ verò partes defectuosiores fiunt. & quibus supra sceptrū transuersum gibbositas est, his & costæ in amplitudinem augeri non solent, sed in anteriorem partē: & petus acutum fit, sed non latum: ipsiq; & difficulter spirant, & stridulam fauciu asperitatem habent. Nam vetriculi qui spiritum suscipiunt ac emittunt, minorē amplitudinem habēt. Sed & iuxta magnum verticulum ceruicem repandā habere cogūtur, vt ne caput ipsis pronum sit. Multam igitur angustiam faucibus exhibet etiā hoc os intro vergēs. Nam & his qui natura recti sunt, spirandi difficultatem hoc os inducit, si intro vergat, donec repressum fuerit. Ob talē igitur figurā eiusmodi homines eminentis gutturis, magis quā sanī apparent: & tuberculis circa pulmonem duris ac crudis plerūq; tales affecti sunt. Nam & gibbositatis occasio, & distētio plerisque propter tales collectiones fit, cum quibus vicini neque cōmunionem habent. Quibus verò infra septum trāsuersū gibbositas est, horum quibusdam morbi rhenū ac vesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines, & inguina diuturni ac ægrè curabiles, & neutri horum gibbositates soluunt. Coxæ verò his magis excor nes fiunt, q̄ his quibus supernè gibbositas contigit. Vniuersa tamē spina his longior est q̄ supernè gibbosis. Pubes verò & barba tardior ac imperfectior. Sed & infecundiores hi sunt quā superne gibbosi. At verò quib⁹ iam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam præsentis tūc morbi iudicatio nem gibbositas facit, per tempus tamē, aliquid ex iisdem significationem de se plus aut minus præbet, quemadmodum etiam in pueris. Minus autem malignè in totum talia se habent. & multi sanè iam facile ac sano modo gibbositatem su

*Spina gib-
bosa.*

stinuerunt, vsque ad senectutem: & maximè hi quibus ad car- **D**
nositatem ac pinguitudinem promoruum fuerit corpus. pauci
tamen talium sexaginta annos transgressi sunt. plerique ve-
rò breuioris vite sunt. Quibusdam etiam in latus, aut hac aut
illac, verticula obliqua fiunt. Et omnia aut pleraque talia, pro-
pter collectiones intra spinam fiunt. Quibusdà vnà cū mor-
bo etiam figuræ insuper conferunt, ad quas reclinari cōsue-
uerunt. Verùm de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur.
Illic enim de his quæ futura sunt, pulcherrimæ prænotiones
habentur. Porro quibus ex casu spina gibba sit, horum sa-
nè pauca superantur, ita vt dirigi possint. Nam quæ in scala
sunt extensiones, nihil direxerunt quod ego sciam. Utuntur
enim ipsa maximè hi medici, qui multitudinis famam aucu- **E**
pantur. Apud tales enim hæc in admiratione sunt, si aut pen-
dentem, aut proijci aliquem aut quæ his similia sunt videat,
& hæc celebrant semper, neque ipsis cura est quale quid eue-
niat ex hac aggressione, siue bonum id sit, siue malum. Medi-
ci tamen qui talia studio habent, quos sanè ego noui, imperi-
ti sunt. Inuentum equidem verus est, & laudo sanè vehemen-
ter eum qui primus excogitauit & hoc machinamentum, &
quoduis aliud secundum naturam inuētum. Nihil enim de-
spero, si quis rectè constructum concutiat, fieri posse vt quæ-
dam dirigantur. Ipse tamen omnia huiusmodi hoc modo cu-
rare erubui: propterea quòd impostorū magis tales sunt mo-
di. Quibus igitur prope ceruicem gibbositas fuerit, his veri-
simile est has in caput extensiones minus prodesse paruum **F**
enim pondus habet caput, & summi humeri deorsum vergē-
tes. Verùm tales verisimile ex magis dirigi posse, si in pedes
cōcutiantur. Ita enim maior propensio ad huiusmodi fieret.
Quibus autè magis inferius gibbositas est, hos par est vt ma-
gis in caput concutiantur. Si quis igitur concutere volet, re-
ctè sanè hoc modo præparare poterit. Scalam coriaceis aut
laneis puluinarib⁹ infernere oportet probè alligatis, paulo
amplius & in longitudinem, & in vtrâque partē, quàm quā-
tum corpus hominis occuparit. Denique hominem supinum
supra scalam reclinare, & postea pedes quidem alligare iux-
ta malleolos ad scalam non disparatos, vinculo quidem satis
valido, verùm molli, alligare verò etiam oportet infra & su-
pra vtrunque genu, itemque circa coxas. Circa laterum au-
tem

Atem mollitudinem, & circa pectus, laxas fascias circū dare, ita vt ne impediānt concussione. Manus verò ad costas extētas, ad corpus applicare, & non ad scalam. Vbi verò hæc præparaueris, scalam ita ad turrim aliquam altam, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autem in quo concussione facis, renitens sit. Eos verò qui extendunt probè doctos esse conuenit, quo æqualiter, & probè, & ex æquilibrio, ac derepente demittant, vt neque scala in alteram partem repēs ad terram deueniat, neque ipsi pronui sint. Quod si tamen à turri, aut malo defixo carchesium habente, quis demittat, adhuc melius preparabit, ita vt ex trochlea aut asello laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verū inuicundum est de his longius verba facere: attamen ex his structuris maximè quis concuti poterit. Si verò valde supernè fuerit gibbositas, & concutere sit opus, omnino in pedes id faciendum est, velut dictum est. Ita enim maior propensio ad hæc contingit. Et firmare quidem oportet iuxta pectus ad scalam fortiter deligando, iuxta ceruicē verò fascia quā laxissima, directionis saltem gratia. Sed & ipsum caput iuxta frontem ad scalam alligare oportet, manus autem porrectas ad corpus aligare non ad scalam. Reliquum verò corpus indeligatum esse oportet, nisi quantum satis est directionis gratia, alia atque alia laxa fascia circumdatum esse. Verū considerandum est ne concussione impediānt hæc vincula. Crura verò ad scalam quidem ne deligentur, sed inter se, ita vt secundum spinam in directum vergant. Atque hæc quidem hoc modo facienda sunt, si omnino opus fuerit in scala concussione fieri. Turpe tamen est & in omni arte, & nō minimè in medicina, multāturbam, & multā ostentationem, & multum rumorem concitare, deinde nullam vtilitatem asserere. Oportet autem primū spinæ naturam qualis est cognoscere. ad multos enim morbos ea opus fuerit. Nā quā parte ad ventrem vergit, verticula intus inter se paria sunt, & inter se ligata vinculo mucoso ac nervoso de cartilaginib. exorto vīq; ad medullam. Alij verò nerui nervosi perpetui annexi, hinc atq; illinc iuxta ipsa porriguntur. Verū venarū & arteriarū communitates, in alio sermone declarabuntur, quot & quales sint, & vnde proficiantur, & in quilibet qualia possint. Itemque quibus inuolucris ipsa medulla intecta sit, & vnde profect

*Spina natura perno-
scenda.*

HIPPOCRATIS LIBER

profectis, & vbi desinentibus, & quibus cū cōmunionem habentibus, & qualia potētib. At in vltiore parte in articulis verticula inter se cardinis in modum cōserta sunt. Nerui verò communes iuxta omnia, & in externis, & in internis partibus porriguntur. Et processus ossis ad externā partem, ab omnibus verticulis vnus de vnoquoq; tum à maioribus, tum à minoribus. In his autem processibus cartilaginum appendices, & ex illis neruorum progerminatio, cognata ac consimilis extremis neruis. Costæ verò annexæ sunt, ad internam partem magis quàm ad externam capitibus vergentes, ad vnumquodque autem verticulum adarticulatæ sunt. Curuissimæ autē sunt hominis costæ obtorto modo. Intermediā verò partem costarum & ossium de verticulis procedentium, E
expleant vtrinque muscoli, à ceruice initio sumpto, vsq; ad septi transuersi annexionē. Ipsa autem spina secundū longitudinem rectobliqua est, à sacro quidē osse vsque ad magnum verticulū, iuxta quod crurum annexio depēdet, gibbosa est. Nam & vesica, & genituræ, & intestini recti laxa pars, in hac parte constituta sunt. Inde verò vsque ad septi annexionem, in directum repāda est, & musculos ad nates habet solus hic locus, ex internis partibus, quos lumbarios vocāt. Ab hac autem parte vsq; ad magnū verticulū, quod suprā supernas humeri partes est, è directo gibbosa est, imò magis esse videtur quàm est. Nam spina media sui parte, altissimas ossiū propagines habet, hinc atq; autē illinc, minores. Ipse verò ceruicis articulus repandus est. Quibuscūq; igitur gibbositates iuxta F
verticula fiunt, his expulsio magna à connexionē abrupta, vnus aut plurium verticulorū, nō ita multis, sed paucis contingit. Neq; enim talia vulnera fieri facile est, neq; ad externam partem expelli facile est, si non ex anteriore parte, forti aliqua re per ventrē quis vulneratus fuerit: Sic autem vtiq; perierit: aut nisi quis ex alto loco delapsus, coxis aut humeris impegerit. Sed & hic vtiq; morietur, etiam si statim nō intereat. At ex posteriore parte ad internam, huiusmodi expulsionem fieri non est procliuē, si non in immensum graue aliquod onus irruat. Nam ex ossibus quæ foras enata sunt, vnumquodq; eiusmodi est, vt prius ipsum frangatur, quā magnam intrō inclinationē faciat, ita vt & ligamenta, & articulos inter se alternatos ac articulos violet. Præterea & spinalis

*conclusio
ad in
ra h
letalis*

- A** nalis medulla affligeretur, si ex modico loco inflexionē haberet, vbi verticulū tali expulsiōe exiluisset: & verticulum quod exiluisset, spinalem medullā vtiq; premeret, si non etiā abrumperet: At ea pressa ac intercepta, multarū & magnarū & nobilium partium torporē induceret. Quare neq; curæ foret medico, quomodo verticulū dirigat ac coaptet, quū multa & violenta alia mala adsint. Itaq; si tale contingat, palām est quoddā neq; concutiendo, neq; alio quodam modo, reponi pōssit, nisi quis dissecto homine, & manu in ventrem iniecta inquisitionem faciat, & ex interna parte ad externam manu retrudat. atq; hæc in mortuo quidē fieri possent, in viuo autem non ita. Cur igitur hæc scribo? Quia sunt quidam qui
- B** putant se curasse homines, quibus intro exciderint verticula articulos penitus transgressa: & sanē facillimam hanc distortionē esse, vt quis inde cōualescat, aliqui censent, eamque nulla repositione opus habere, sed sua sponte talia sanescere. Ignari autē multi sunt, & lucro hoc habēt quod ignorāt. Persuadent enim alios. Verū fallūtur hi hac de causa. Spina quæ in spina ipsa eminet, verticula ipsa esse putāt, quia vnūquodque ex his ossibus ad contactū rotundum apparet, ignorātes quoddā hæc ossa sunt ea quæ à verticulis enata sunt, de quibus paulō antē dixi. At verticula longē magis in anteriore partem absunt. Angustissimum enim ventrem ex omnibus animalibus homo habet, quantum ad magnitudinem attinet, à posteriore ad anteriorem partē, insuperq; etiā iuxta pectus.
- C** Quum igitur horum supereminētium ossium aliquod vehementer fractum fuerit, siue vnū, siue plura, ea parte humilior locus redditur, quā hinc atq; illinc: & propterea decipiuntur putātes verticula intro abiisse. Decipiunt autem insuper ipsos etiā figuræ vulneratorū. Si enim inclinare se conantur, dolent: quū ea parte qua vulnerati sunt, cutis sit circumtenta: & simul ossa fracta ita magis corpus affligunt. Si verò in repandum recuruantur, melius habēt. Nam & cutis iuxta vulnus laxior fit, & ossa minus affligunt. Sed & si quis ipsos contingat, ea parte repandi cedunt, & locus vacuus ac mollis hac parte ad contactum apparet. Hæc omnia relata insuper medicos decipiunt. Verū tales cito sani & illæsi sua sponte fiūt. Cito enim omnia eiusmodi ossa quæ laxa sunt, callo obducuntur. Obliquatur igitur spina etiā sanis iuxta multos

Spina obliquata.

modos,

modos. Nam & in natura, & in usu ita se habet. Sed & præse-
 nestute, ac dolorib. Nam hæc colligendi vim habent. At gib-
 bositates ex casibus contingentes plerumq; fiunt, si aut in co-
 stas innitatur ac impingat, aut in humeros cadat. Necessè est
 enim foris apparere in gibbositate vnum aliquod altissimū
 verticillū, minus verò ea quæ sunt hinc atq; illinc. Nō igitur
 profilit multū ab alijs, sed parum, quū singula, acervatim cō-
 cedāt. Propter hoc igitur etiā spinalis medulla eiusmodi di-
 stortiones, facillè fert, eo q̃ circularis ipsi distortio cōtingit,
 non angularis. Oportet autem fabricā instrumēti coacto-
 rij huiusmodi cōstruere. Licet equidē lignum robustū & la-
 tum, incisuram oblongam habens, defodere. Licet etiā pro li-
 gno, in pariete incisuram oblongā facere, quæ aut cubiti al-
 titudine, aut prout congruum fuerit, à paupimento extet. Post-
 ea columnā querneam, quadrangularem, obliquā ad parietē
 adijcere oportet, tanto spacio in medio relicto, vt aliquis
 pertransire possit, si forte opus sit. Et super columnā quidem,
 aut tunicas, aut aliud quid molle, quod tamē nō multum ce-
 dat, insternere oportet, homini verò fomentum adhibere. Si
 verò admittat, ipsum etiā lauare. Deinde pronū extentū re-
 clinare, & manus ipsius secundum naturā extensas ad corpus
 alligare. Postea verò loro molli satis lato ac lōgo, ex duobus
 perpetuis inter se aduersarijs loris constante, ex media ipsius
 parte, iuxta medium pectus quā proximè sub alas, bis cir-
 cundare oportet, & quod superest de loris vtriusq; iuxta alam
 circum humeros obuoluatur, & initia ipsorū ad lignū quod-
 dam pistilloforme alligentur, ita vt congruant secundū lon-
 gitudinem subiectæ colūnx, ad quā lignum illud pistillofor-
 me apponere, & retinendo extensionē facere oportet. Tali
 verò quodam allo vinculo & supra genua, & supra calcanea
 alligato, initia itē ad eiusmodi lignū alligare oportet. Post-
 ea autē alio loro lato ac molli & robusto fasciæ formā habē-
 te, longitudinemq; ac latitudinē sufficientē, partem inter co-
 xas & lumbos, quā proximè ad coxas, circumcirca fortiter
 deligare, atq; ita tum huius lori, tum aliorum duorū capita,
 ad lignū à pedib⁹ extās alligare. & postea in hac figura hinc
 atq; illinc, æqua simul inclinatione, simulq; in directū extē-
 sionē facere. Nullū enim magnū malū talis extensio induxe-
 rit, si cōmodè præparata fuerit, nisi quis de industria se extē-
 dendum

Andendum exhibeat. At medicus, siue alius quisquam fortis & nō imperitus, imposita manusvola supra gibbū, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animaduersione habita an in directum deorsum cogere oporteat, siue ad caput, siue ad coxas. Atque hæc coactio maximè innoxia est. Sed & si quis infideat super gibbum, & attollēdo se dum ille distēditur incuriat, innoxium est. Neque quicquā prohibet pede inscendere ac gestari supra gibbum, atq; ita sensum incutere. Ad hoc autem moderatè faciendum idoneus quis fuerit ex his qui in palestra adfueri sunt. Efficacissima tamē coactio est, si aut paries incisuram habeat, aut lignum defossum infra spinæ altitudinem incisum sit, quantum moderatè habere videatur, ita vt tabula tiliacea, aut cuiusdam alterius ligni, non tenuis, incisuræ indatur, & postea linteum quoddā multiplex, aut parū quoddā coriaceum puluinar, super gibbum imponatur. Quā paucissima tamē imposita esse cōducit, cauendi saltē gratia, vt ne tabula præ duricie dolorem aliquē importunè inducat. Sit autem gibbositas ē directō maximè incisuræ in pariete, quo qua parte maximè extat, ea quā maximè tabula imposita premat. Vbi verò imposita fuerit, aliquis extremā tabulæ partem deprimat, aut duo hoc faciant, si vnus nō suffecerit. alij verò corpus secūdū longitudinem velut dictum est extendant, partim hinc, partim illinc cōstituti. Potest etiam asellis extensio fieri, aut iuxta lignum defossis, aut in ipso ligno asellorū postibus constructis, siue erectos velis vtriq; paululum supereminentes, siue hinc atq; illinc iuxta ligni verticem. Hæ coactiones moderationem admittūt, vt & vehemētissimè, & moderatè fieri possint. Talem autem vim habent, vt si quis etiam ad perniciem tales necessitates adhibere velit, & nō ad curationem, tunc quoq; multum possint. Nam si quis secundum longitudinem hinc atq; illinc saltem sic extendat, & nullam aliam necessitatem addat, tamen sic etiam extensionem facere poterit. Sed & si non extendat, & tabula solum ita quis vtatur, etiam sic sufficienter deorsum cogere poterit. Bonæ autem sunt huiusmodi violentiæ, quibus & vehemētioribus & debilioribus vti licet, vsu ipsorum prout quisq; vult moderato. Et sanè etiam secundū naturam coactionem faciūt. Nam ea quæ extant, ad locū suum redire cogit depressio. Quæ verò

præter

præter naturam coiuerunt, ea extendunt extensiones secundum naturam. Proinde neque meliores his necessitates ego habeo, neque iustiores. Rectitudo enim extēsiōis iuxta ipsam spinam, infernè & iuxta os sacrum appellatum, nullam ansam habet: supernè verò iuxta ceruicē & caput, habet quidē ansam, sed in speciem Indecora est: & si hac parte extensio fiat redundans, etiā alias læsiones inducere poterit. Experimentum autē aliquando feci, vt homine supino extento virem nō inflatum sub gibbum subderem, & postea folle ex officina fabri in subiectum virem immisso inflarē. Verū res mihi nō successit. Quum enim bene extenderem hominē, vincebatur vter, & non poterat flatus aliquā coactionem facere. Sed & aliās hæc res prompta erat ad dilapsionē, nimirū quum in idem & hominis gibbositas, & vtris pleni incurua turgiditas cogatur. Quum autem rursus non valde extenderem hominem, vter quidem præ flatu incuruus turgebat, homo verò omnino magis quàm conducebat repandus fiebat. Scripsi autem hoc de industria. Pulchrum enim est etiā ea discere quæ in experimentum assumpra successu caruerunt, & cur successum non habuerunt. Quibuscunq; porro verticula intrò obliquantur, aut ex casu, aut graui aliqua re illapsa, his nullum quidem verticulum extat plerunque ita multum ab alijs. Si verò extiterit multum, aut vnum aut plura, mortē inducunt, velut etiam antea dictum est. Circularis etiam hæc & non angularis emotio existit. Vrinæ igitur talibus magis supprimuntur, itemq; alui egestio, quàm his qui extra gibbo si fiunt: & pedes ac tota crura magis perfrigerantur, & lethalia sunt hæc magis quàm illa quæ dixi. Sed & si superstitēs euadunt hi, magis profluam urinā habēt, & cruribus impotentiores ac torpidiores fiunt. Si verò etiam in superna parte magis repādi fiant, totius corporis impotētia ac torpor accedit. Atq; ego sanè nullam machinam habeo, per quā talia in idem restitui possint, si nō alicui concussio per scalam opem tulerit, aut etiā alia quædam eiusmodi curatio aut extensio, qualis est ea quæ paulò antea relata est. Ad coactionem vnā cum extēsiōne nullam habeo, quæ sanè fieri ita posset, velut in gibbo tabula coactionem faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere possit? Neque enim fieri hoc potest. Sed neque tusses, neque ster-

nutatio

*Verticula
obliquata.*

A nutationes vllam vim habent, vt extēſioni auxiliari poſſint.

Nec verò flatus immiſſio in vētrem quicquā efficere poterit. Quia & ſi magnæ cucurbitæ affigātur, attractionis nimirum gratia verticulorū intrò repētium, magno hoc mētis errore contingit. Propellunt enim magis quā attrahunt, & neq; hoc animaduertūt hi qui ipſas affigūt. Quāto enim magis ipſas quis adigit, tātō magis repandi fiunt hi quibus affiguntur, cute ſimul ſuſum coacta. Poſſem autē & alios cōcuſionū modos, quā hi ſunt quos antea retuli, exponere, quos ſanè affectioni magis conuenire quis putare poſſit, verū non valde ipſis fidem habeo, & propterea non ſcribo. In ſumma igitur de his quæ relata ſunt, ita aceruatim cōſtituere oportet, quòd ea quidem quæ in repādum emora ſunt, le-

B thalia ſunt ac noxia: quæ verò in gibbum, innoxia in totum, quantum ad mortem, & vrinæ ſuppreſſionem ac torporem attinet. Non enim riuos qui ſunt in ventre gibboſitas ad extērnā partem intendit, neq; fluidos eſſe prohibet. Repāditas verò ambo hæc facit, & ad alia multa hæc accedunt. Nā multò plures & cruribus & manibus impotentes fiunt, & corpore torpeſcunt, & vrinæ his ſupprimuntur, quibus gibboſitas quidem neque extra neq; intrò extiterit, verū in rectitudinem ſpinæ vehemēter concuſſi fuerint. Quibus verò gibboſitas extat, hi minus talia perpetiuntur. Multa verò etiam alia in medicina quis videri poterit, ex quibus ea quidem quæ fortia ſunt, innoxia ſunt per ſe totā morbi iudicationē

C inducētia: quæ verò debiliora, noxia, ita vt & diuturnos morbos progenerent, & cum reliquo corpore ampliorem cōmunionem habeant, Nam & coſtarum fractura eiufmodi quid perpetitur. Quibus enim fracta fuerit coſta vna, aut plures, velut plurimis frāgitur, ita vt oſſa ad internam partem non vergant, neq; denudata ſint, ex his pauci iam febricitarunt. Sed neque ſanguinem multi iam expuerunt, neq; ſuppurati multi ſunt, neque curatione medicamentorum ex illitis linamentis opus habent, neq; oſtium corruptiones accedunt, & victus vulgaris ſufficit. Si enim febris continua ipſos non corripuerit, etiam vaſa per inēdiam his vacua fieri deterius eſt, quā ſi nō vacua ſiant. Maiorem item dolorē ac febrem & tuſſim inducit. Moderata enim ventris repletio, coſtarum ſit directio. Verū vacuatio pendentes coſtas facit, & hæc

Coſtarū fractura inēdiā morat

HIPPOCRATIS LIBER

dependentia dolorem inducit. Extrinsecus autem vulgaris D
 deligatio talibus sufficit, ita ut cerato, & splenijs, & linteis,
 plana deligatio placide firmetur, aut etiā lanceum quiddam
 insuper opponatur. Corroboratur autem costa diebus vigin-
 ti. Celeriter enim his ossibus calli obducuntur. At confusa
 circa costas carne, aut ex plaga, aut ex casu, aut renisu, aut alio
 quopiam eiusmodi, multi iam multum sanguinem spuerūt.
 Rini enim in molli ad vnamquāq; costam extenta parte, &
 nerui, à principalissimis in corpore partibus gressus ha-
 bent. Multi itaq; iam tussiculosi, & tuberculosi, ac suppurati
 facti sunt, & linamentis opus habuerunt, & costa ipsis corrup-
 tionem sensit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa
 costas confusata, tamen dolor in ipsis sedatur, quā in
 his quibus costa facta fuerit: & in talibus vulneribus locus E
 dolorum recidiuus magis habet. Proinde aliqui tales noxas
 magis contemnunt, si costa ipsis fracta fuerit. Quin & cura-
 tione exactiore tales indigēt, si modò sapiant. Victum enim
 contractum esse conducit, & corpore quā maximè quie-
 scere, & à venere abstinere, edulijque pinguibus, & fauces
 exasperantibus, ac fortibus omnibus: Venamque in cubi-
 ri flexura secare, & quā maximè silere. Deligare verò lo-
 cum confusum conducit splenijs non multiplicibus, sed mul-
 tis & multò latioribus tota confusione, & cerato subline-
 re, & linteis latis cum fascijs latis ac mollibus deligare, &
 moderatè firmare, ut deligatus non valde se compressum
 esse dicat, neque rursus laxum. Initium autem sumere de- F
 bet qui deligat in ipsa confusione, atque isthic maximè fir-
 mare. facienda verò est deligatio velut à duobus initijs, de-
 ligandūque ut ne circumflua sit cutis circa costas, sed
 quilibris. Deligandum autem aut singulis aut alternis die-
 bus. Præstat autem & aluum mollire leui aliquo medica-
 mento, cibi saltem euacuandi gratia: & ad decem quidem
 dies attenuare. Postea verò corpus renutrire ac tenerum fa-
 cere. Quādiu verò attenuas, deligatione magis firmata ut-
 tendum est. Quum autem ad teneritudinem deducis, la-
 xiore. Et si quidem sanguinem ab initio expuerit, quadra-
 ginta dierum curationem ac deligationem facere oportet. Si
 verò sanguinem non spuat, sufficit viginti diebus ut pluri-
 mum curatio. Verū ex robore vulneris tempora coniecta-
 re oportet

A re oportet. Qui porrò tales contusiones neglexerint, etiam si aliud nihil maioris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiores carnem habet, quàm antea habebat. Vbi verò tale quippiam relinquitur, & curatione non probè exprimitur, deterius quidem est si iuxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neque enim caro ampliùs similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptiones ossis diuturnæ, multis iam ex huiusmodi occasionibus factæ sunt. Sed & si iuxta os non fuerit, verùm ipsa caro mucosa sit: attamen etiam sic recidiuæ, ac dolores, aliàs atque aliàs fiunt, si quis forte corpore agrotauerit. Quapropter deligatione uti oportet bona, simulque multum conueniente, quo ad ea humoris effusio, quæ in contusione facta est, resiccet ac resorbatur, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoque caro aurescat. At quibus ex neglectu vetustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his vltio medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, vsque ad os vrere oportet, non tamen ut os percalescat. Si verò inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie vrere oportet, cauere tamen ne in vltiorem partem peruras. Si verò ad os ipsum contusio esse videatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat: si quidem parua admodum fuerit, sic vrere oportet veluti dictum est. Si verò oblonga fuerit iuxta os contusionis eleuatio, plures crustas incutere oportet. Cæterum de corruptione costæ, vnà cum eorum qui linamentis opus habent curatione, dicitur. Si verò femoris articulus ex coxa exciderit. Excidit autem iuxta quatuor modos, intrò quidem sæpe, foras autem præ alijs sæpe. Verùm in posteriorem ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intrò exciderit, his longiùs apparet crus, si ad alterum comparatur, atque hoc merito, propter duas causas. Nam os quod à coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentum fit capitis femoris, & articuli ceruix in acetabulo vehitur: & nates forinsecus cauæ apparent, utpote quum intrò cesserit femoris caput. Et rursum summa femoris pars iuxta genu, extra repere cogitur. Tibia itè, & pes, eodem modo. Quum igitur foras repat pes, medici ob imperitiã, sanum pedem ad hunc adhibent, & nō hunc ad sanum: & propterea multò longius

Femoris articulus quatuor modis excidit.

HIPPOCRATIS LIBER

læsum crus apparet quàm sanum. Multis autem etiã alijs lo-
 cis talia sinistram intelligentiam habent. Nec verò flectere
 iuxta inguen similiter vt sanum possunt. Sed & si femoris ca-
 put in interfoemineo contingatur, palàm extuberare com-
 peritur. Signa igitur hæc sunt, in his quibus femur intrò ex-
 cidit. Quibus igitur articulus elapsus nō fuerit repositus, sed
 aut frustra tentatus est, aut neglectus, his & ambulatio per
 cruris circumuolutionem, velut in bobus fit, & plurima ve-
 xatio ipsi in sano crure contingit: & coguntur iuxta late-
 ris mollitudinem, aut iuxta elapsum articulum, mutili ac
 obliqui esse. Iuxta sanum verò crus, nates ad externam par-
 tem rotundæ esse coguntur. Si quis enim sani cruris pede
 extra ambularet, protruderet vtique reliquum corpus, vt ad
 læsum crus veheretur. Læsum autem vehere hoc non pote-
 rit. quomodo enim posset? Cogitur igitur sic sani cruris pe-
 de intro ambulare, & non extra. Ita enim maximè vehit sa-
 num crus, & suam ipsius, & læsi cruris, partem corporis vtrif-
 que incumbentem. Quum autem iuxta lateris mollitudinē,
 ac iuxta articulum cauentur, parui apparent, & baculo in-
 niti coguntur à latere iuxta sanum crus. Hæc enim parte ful-
 cimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in
 hac corporis pondus vehitur. Coguntur item se inclinare.
 Manum enim quæ est à parte cruris læsi, ad obliquum femur
 firmare coguntur. Non enim potest læsum crus vehere cor-
 pus, in crurum permutatione, si non detineatur dum ad ter-
 ram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi quibus
 intrò elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non
 præmeditante vt quàm facillimè sit figuratus. Sed ipsa hæc
 calamitas ex præsentibus ea quæ facilima sunt eligere do-
 cet. Nam & qui vlcus habent in pede aut tibia, non omnes
 crure valde ingredi possunt. & infantes sic iter faciunt, ex-
 tra enim ingrediuntur læso crure. Et duplex lucrum conse-
 quuntur. Duplici enim opus habent. Nam & corpus non si-
 militer vehitur in eo crure quod extra ingreditur, sicut in
 eo quod intrò. Non enim secundum rectitudinem ipsi in-
 cumbit pondus, sed multò magis ei quòd subingreditur. Ipsi
 enim è directo incumbit pondus, tum in ipsa ambulatione,
 tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanum crus
 celerrimè supponere poterit, si eo quod læsum est, exterius:
 sano

A sano interius ingreditur. Verùm de quo nunc sermo est, Bonũ est vt corpus ipsum sibiipſi facilimas figuras inueniat. Quibus igitur nondum perfectis ad augmentum, elapsus articulus non fuerit repositus, his femur decurratur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem augescunt, sed breuiora fiunt. Maxime autem femoris. Excarne item & emusculatum, ac effœminatum & tenuius totũ sit crus, simul quidem propter priuationẽ loci articuli, simul autem quòd eo vti non possunt, eo quòd secundum naturam litus non est. Vſus enim aliquis liberat ab effœminatione, liberat etiam aliquantum ab intercepto in longitudinẽ augmentum. Maxime igitur læduntur hi quibus dum in vëtre sunt, hæc articulus fuerit luxatus. Secũdo loco hi quibus valde infantibus idem contigit. Minimẽ verò hi qui perfecti sunt. Qualis igitur ambulatio perfectis contingat, dictum est. Quibus verò dum infantes sunt calamitas hæc incidit, plerique ad corporis directionem tardi sunt, imò male ad sanũ crus deuoluuntur, manu quæ est ad sanum crus, ad terrã se fulcientes. Sed & ex perfectæ ætatis hominibus quidã, quibus hæc calamitas contigit, ad ambulationem rectã cunctantur. Quicunq; verò infantes hac calamitate pressi, rectẽ educati fuerint, sano quidem crure in rectum vtuntur, verũ sub alani secundum sanum crus scipionem ferunt, aliqui etiam sub vtranque alam. Crus autem læsum eleuatũ habent, & tanto melius habent, quanto breuius ipsius læsum crus fuerit. Sanum autem crus nihilominus ipsis robustum est, quàm si ambo sana essent.

C Effœminantur tamen omnibus talibus carnes cruris, & plerunq; hoc magis perpetiuntur hæ quæ sunt ab externa parte, quàm quæ ab interna. Cæterum quidã fabulantur Amazonides masculam suam sobolem statim dum infantes sunt luxare, aliàs circa genua, aliàs circa coxas, quo nimirum claudi fiant, & masculum genus fœmineo insidias non struat. Vtuntur itaque his pro opificibus, ad coriaria, aut fabrilia, aut alia sedentaria opera. An equidem vera hæc sint, ego non noui: quod autem tales fiant, scio, si quis ipsos statim dum infantes sunt luxet. Iuxta coxas igitur magna differentia est, an extra, an intrò fiat luxatio. Iuxta genua verò, differentia quidem aliqua est sed minor. Modus autem vtriusque claudicationis propius est. Decurtantur enim magis hi quibus

*Osium co-
auctio.*

extra luxatio facta est. Recti autem minus stant, quibus in- **D**
trò luxatio contingit. Eodem modo etiam si iuxta malleolum
luxatio fiat, si quidem ad externam partem id contingat, mu-
tuli quidem fiunt, verum stare possunt. Si verò ad internam val-
gi quidem fiunt, minus autem stare possunt. At verò coauctio
osium talis fit. Quibus quidem circa malleolum tibiae os
excessit, his pedis quidem ossa minimè coaugescunt. hæc e-
nim proximè ad vulnus sunt. Verum tibiae ossa augentur qui-
dem non multo defectuosius, carnes tamen minuuntur. Qui-
bus verò iuxta malleolum manserit articulus secundum natu-
ram, iuxta genu autem excesserit, his tibiae os similiter coau-
gescere non solet, sed brevius fit. Hoc enim proximè ad vulnus **E**
est. Pedis autem ossa minuuntur quidem, sed non similiter,
velut paulo ante dictum est, quia articulus circa pedem saluus
est. Si verò ipso etiam uti possent, velut mutilo, minus adhuc
pedis ossa his minuerentur. At quibus circa coxam luxatio con-
tingit, his femoris os non similiter coaugescere solet: Hoc e-
nim proximè ad vulnus est: sed brevius sano fit. Tibiæ tamen
ossa non similiter his augmento destituuntur, neque ossa pedis:
atque hoc ea de causa, quod femoris articulus qui ad tibiā est, &
tibiæ articulus qui ad pedem est, in sua natura manet. Carnes
tamen minuuntur his totius cruris. Si verò uti crure possent,
adhuc magis ossa auferentur, velut etiam prius dictum est, ex-
cepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen minus
carnosi quam hi qui sunt, essent. Argumento autem quod talia ita se
habent, hoc est. Quicumque enim brachio elapso, mustellæ cu- **F**
bito præditi sunt, paruumque ac macilentum brachium habent, aut
ex natiuitate, aut etiam dum augescunt, priusquam perfecti eua-
dant, galeancones appellati, hi os quidem brachij breue ha-
bent, cubitum autem & summam manum paulo defectuosio-
rem quam sani, propter relatas causas, eo quod brachium vul-
nerato articulo proximum est, ut ideo brevius factum sit. Rur-
sus autem cubitus propterea non similiter calamitatē percipit,
quia brachij articulus qui est ad cubitum, in veteri natura ma-
net. Et rursus manus adhuc longius abest à calamitate quam
cubitus. Propter has igitur causas contingit, ut & ossa quæ non
coaugentur, non coaugescant, & quæ coaugentur, coaugescant. Cæ-
terum ad carnositatem & manui & brachio multum profuerit, si
quis manu laborando se fatiget. Quæcunque enim manuum
opera

A opera sunt; plurima ex ipsis Galea conones hac manu operari conatur, velut altera possunt, & nihilo defectuosius quam cum illa efficiunt. Non enim supra manus, velut supra pedes, corpus vehi necesse est. Verum leuia sunt ipsis opera. Propter vsum autem non minuuntur carnes Galea conibus, neque circa manum, neque circa cubitum. Sed & brachium propterea aliquam opem sentit ad carnositatem. Quum autem coxa eluxata fuerit ad internam partem à natiuitate, aut adhuc infanti, carnes ideo magis minuunt quam in manu, quod crure uti non possint. Quod autem hæc hoc modo se habeant, testimonium vnum quoddam in paulo posterius referendis habebitur. At quibus in exteriorem partem femoris caput excesserit, his crus breuius apparet, si ad alterum extendatur, atque id merito. Non enim super os fundamētum sit capitis femoris, sicut quum intro excidebat, sed iuxta os quod inclinatam naturam habet in carne humida ac cedente firmatur: & propterea quidem breuius apparet. Intrinsecus autem iuxta plechada, intermediam crurum ac inguinum partem, femur magis mutilum & ex carne sit. Nates autem extrinsecus incuruiores, utpote quum extra femoris caput elapsum sit. Sed & superius apparent nates, utpote cum caro quæ isthic est, femoris capiti cesserit. Summa verò femoris pars circa genu, intro reperi videtur. Tibia item & pes. Sed neque inflectere velut sanum crus possunt. Et signa quidem femoris extra elapsi hæc sunt. Quibus igitur perfectis iam elapsus articulus non fuerit repositus, his totum crus breuius apparet. In ambulatione autem calcaneo terram pertingere non possunt. Verum pectore pedis in terra consistunt ac progrediuntur, parum autem ad internam partem summis digitis vergunt. At crus læsum in his multo magis corpus vehere potest, quam quibus ad internam partem excidit, partim quod caput femoris, & ceruix articuli, quum natura obliqua sit, sub multam coxæ partem subsistit: partim quod summus pes non ad externam partem inclinat esse cogitur, sed propè est ad rectitudinem corporis, & tendit etiam interius. Quum igitur semitam ac callem acceperit articulus, in carne ad quam elapsus est, & caro viscositatem contraxerit, doloris exors progressu temporis sit. Quum autem doloris exors factus fuerit, possunt quidem absque baculo iter facere, si aliàs voluerint. possunt autem &

vehere corpus supra crus læsum. Itaque propter vsum, carnes **D**
talibus minus effœminantur, quàm illis de quibus paulo
ante dictum est. Effœminantur autem aut plus, aut minus.
Magisque adhuc effœminantur plerumque iuxta internam
partem, quàm iuxta externam. Plerique tamen ex his calcea
mentum sibi inducere non possunt, propter cruris inflexibi
litate. Quidam verò etià hoc possunt. At quibus dum ad
huc in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dū adhuc
augefcunt, vi elapsus, non fuerit repositus, aut etiam præ
morbo hic articulus excesserit, ac luxatus fuerit: multa enim
huiusmodi fiunt: talium quibusdam si corruptionem sen
serit femur, suppurationes diuturnæ & linamentis indigen
ges fiunt, & aliquibus ossium denudationes. Similiter autem **E**
& quibus corruptionem femoris os sentit, & quibus non sen
tit, multo brevius fit, & velut sanum coaugefcere non solet.
Tibiæ tamen ossa breviora quidem fiunt quàm alterius ti
biæ, sed paululum, ob causas antea relatas. Ambulare verò ta
les possunt, & quidam ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus
elapsus articulus repositus non est. aliqui verò etiam toto
pede consistentes progrediuntur, declinant tamen inter am
bulandum propter cruris breuitatem coacti. Hæc autem hoc
modo fiunt, si diligenter educati fuerint in figuris, & rectè
in quibus oportet, priusquam ad iter faciendum corroborati
fuerint. diligenter item & rectè, postquam corroborati
fuerint. Plurima autem diligentia opus habent hi, quibus
dum maximè infantes sunt, hæc calamitas cõtigerit. Si enim **F**
neglecti fuerint dum infantes sunt, inutile penitus, & omni
augmento priuatum, totum crus euadit, & carnes totius cru
ris magis minuuntur quàm sani. Multo tamen minus his mi
nuuntur quàm illis quibus intro excidit, propter vsum & la
borem, ita vt statim crure vti possint. velut etiam paulo an
te in Galeanconibus dictū est. Sunt autem aliqui, quibus par
tim statim à natiuitate, partim præ morbo, amborū crurum
articuli exciderunt ad externam partem. His igitur ossa qui
dem easdem affectiones habent ac perpetiuntur. Carnes ta
men minimè effœminantur. Sed & Satis carnosæ crura sũt,
præterquam si quid sanè circa internā partem paululum de
ficiat. Propterea verò satis carnosæ sunt, quia vtrisque cru
ribus similiter vtuntur. Similiter enim fluctuant hac atque
illac

A illac inter ambulandum:& vehementer eminentibus nati-
bus hi videntur,propter articulorum excessum. Si verò ossa
ipsis corruptionem non senserint, neque gibbosi supra co-
xas fiant:nonnullos enim etiam talia corripunt. Si igitur
tale quid non contigerit,satis sani de cætero durant. Totum
tamen corpus hi minus augescens habent, capite excepto.
At verò quibus in posteriore partem femoris caput excide-
rit:paucis autem excidit:hi crus extendere non possunt,ne-
que iuxta articulum elapsum,neq; ita valde circa poplitem.
& multo minus quàm hi quibus iamdudum id contigit. Hi
enim magis & circa inguen, & circa poplitem, articulū ex-
tendunt. Illud tamen insuper intelligere oportet: Et enim

B commodum,& magni faciendum,& plerisq; ignotum: Quòd
neq; sani articulum circa poplitem extendere possunt,si non
simul extendant etiam articulum circa inguen,præterquam
si pedem valde sursum attollant.Sic enim poterint. Hi itaq;
neq; inflectere articulum circa poplitem similiter possunt,
sed multo difficilius,si non etiam articulum circa inguen in-
flexerint. Multa verò etiam alia circa corpus huiusmodi fra-
ternitates ac cognationes habent,& circa neruorum disten-
tiones,& circa musculorum figuras,plurima,& pluris facien-
da vt cognoscatur, quàm quispiam putauerit. Item circa in-
testini naturam, & totius ventris, & circa vterorum errores
ac distentiones.Verum de his alibi nobis sermo erit cognat-
us his quæ nunc dicuntur.Sed de quo nunc sermo est,neque

C extendere possunt, velut iam dictum est, & breuius crus ap-
paret,atque hoc ob duas causas, & quòd non extenditur, &
quòd ad natium carnem elapsum est. Natura enim ossis co-
xæ ea parte est,qua & caput & ceruix femoris existit. Vbi ve-
rò luxatum fuerit, pronum ad externam partem natium de-
fertur.Inflectere tamen possunt,si dolor non prohibeat,& ti-
bia & pes moderatè recta apparent, & neq; hæc, neque illac
multum inclinata.Iuxta inguen verò caro insuper aliquanto
mollior esse videtur,præsertim ad contactum, vt pote articu-
lo ad alterā partem elapso. Ad ipsas autem nates si attrecte-
tur femoris caput,aliquanto etiā magis extuberare videtur.
atque hæc quidem signa sunt,si cui in posteriorem partē fe-
mur excidit.Cui igitur iam perfecto elapsum non fuerit, re-
positum,hic ambulare quidem potest, vbi tempus interces-

ferit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnem versari **D**
adsueuerit. Cogitur tamen vehementer se inflectere circa
inguina, dum iter facit, atque hoc ob duas causas. tum quòd
multo breuius crus fit, ob ea quæ antea dicta sunt: tum quòd
multum valde abest ab eo, vt calcaneo terram contingat. Si
enim conareretur vel paululū pede illo vehi, ita vt nihil aliud
habeat quo se firmet, retro sane corruerit. Magna enim fue-
rit momenti inclinatio, & coxis multum in posteriore par-
tem supereminentibus super pedis gressum, & spina insuper
ad coxas vergente. Vix autem pectore pedis terram attrin-
git, & ne sic quidem, nisi ipse seipsum circa inguina infle-
ctat, & altero crure circa poplitem insuper se inflectat. Ob
hæc autem cogitur, vt manū quæ est secundum læsum crus, **E**
ad supernam femoris partem in singulis gressibus firmet.
Cogit igitur aliquantum hoc ipsum, vt circa inguina infle-
ctatur. Nam in permutatione crurum in ambulando, corpus
supra læsum crus vehi non potest, si nō insuper firmetur crus
per manum ad terram, nimirum quum non sub corpora arti-
culus subsistat, sed ad posteriorem partem iuxta coxā extet.
Absq; tamen baculo tales iter facere possunt, si aliàs adfueue-
rint, eo quòd gressus pedis in vteri rectitudine manet, & nō
ad extremam partem inclinatus est. Quapropter nihil opus
habent baculi fulcimento. Quicumque tamen pro femoris
per manum apprehensione, supposito sub alam, quæ ad sini-
strum crus est, scipione inniti volunt, hi siquidem longiorē
scipionem supposuerint, cretiores quidem iter facient, pede **F**
autem ad terram non innituntur. Si verò pede inniti vo-
lent, breuior ipsis baculus faciendus est, & ad inguina, vt se
inflectant necesse fuerit. Cæterum carniū imminutio-
nes etiam his secundum rationem fiunt, velut antea dictum
est. Qui enim eleuatū habent crus, & nihil laborant, his
etiam maximè minuuntur. Si verò plurimo vtuntur ingres-
su, his minimè minuuntur. Sanum tamen crus nihil inde vti-
litatis consequitur, sed etiam deformis fit, si læso crure ad
terram innitentes vtantur. Illi enim simul inseruiens, & ex-
tra prominente coxa esse cogitur, & citra poplitem se infle-
ctere. Si verò quis læso crure non ad terram vtatur, sed ele-
uatū habeat, & scipioni innitatur, sic sanum crus robu-
stum fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitationes
ipsum

A ipsum corroborant. Possit aliquis dicere, extra medicinam talia esse. Quid enim opus est de his quæ incurabilia iam facta sunt, amplius tractare? At hoc facere multum refert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere. Non enim fieri potest, ut inter se dirimantur. Oportet enim curabilia ita tractare, ut ne incurabilia fiant, ea intelligentia ut quàm maximè prohibeamus, ne ad hoc deuantant ut incurabilia reddantur. Oportet autem & incurabilia cognoscere, ut ne maximè lædant. Prædictiones autem splendide sunt ac gloriosæ ex cognitione, quod & qualiter & quando, singula desinent, siue eo vertantur ut incurabilia fiant, siue curationis spem exhibeant. Quibuscunque verò ex natiuitate, aut dum adhuc aliàs augescunt, ita elapsus fuerit articulus, & non repositus, siue ex violentia elapsus sit, siue præ morbo: Multæ enim huiusmodi luxationes fiunt in morbis: Qui verò sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribetur: Si itaque elapsus non fuerit repositus, femoris quidem os breue fit, affligitur autem totum crus, & augmento destituitur, & multo magis ex carne fit, eo quod ipso non utantur. Nam & articulus circa poplitem his affligitur. Nervi enim ob ea quæ antea dicta sunt intenduntur. Quare articulum circa poplitem extendere non possunt hi quibus hoc modo coxa excidit. Ut enim in summa dicam, Omnia quæ in corpore ad usum facta sunt, si quis moderatè ipsis utatur, & in his laboribus exerceat, ad quos singula sunt adsueta, sic quidem sana sunt, & augescunt, & probè consenescent. Si verò quis non utatur, sed quiescat, morbosiora fiunt, & non augescunt, & cito consenescent. Inter hæc autem non minimè perpetiuntur hoc & articuli, & nervi, si quis non ipsis utatur. Propter has igitur causas, magis in hoc luxationis modo quàm in alijs affliguntur. Totum enim crus & in osium, & in carniū natura, augmento destituitur. Tales igitur ubi iam in viros euaserunt, eleuatum ac inclinatum crus hoc habent, altero verò vehuntur baculo iuuitentes, aliqui vno, aliqui duobus. Quibus porro in anteriorem partem femoris caput elapsus fuerit: pauci autem hoc contingit: hi extendere quidem crus perfectè possunt, inflectere autem se minimè hi possunt circa inguen. Affliguntur autem etiam, si circa poplitem se inflectere coguntur. Longitudo

*Articulus
cum repositus
non fuerit.*

Femur antrosum et lapsum.

gitudo verò cruris confimilis apparet, & circa calcaneum
 quidem valde. Verùm summus pes aliquanto minus in an- D
 teriorem partem prominere solet. Totum autem crus recti-
 tudinem habet secundum naturam, & neque hanc, neque il-
 lac vergit. Caterùm hi statim dolore corripuntur maxi-
 me, & vrina imprimis supprimitur, aliquanto magis quàm
 in alijs luxationibus. Caput enim femoris proximè his in-
 cumbit ad præcipuos nervos, & circa inguen quidem extu-
 berantes videntur, & locus extensus apparet, Verùm circa na-
 tes rugosior, & maximè excarnis. Atque hæc quidem quæ re-
 lata sunt, signa sunt eorum quibus ita femur excidit. Qui-
 buscunque igitur viris iam factis, hic articulus elapsus, non
 fuerit repositus, hi vbi dolor ipsis sedatus fuerit, & articulus E
 in eo loco in quem excidit, versari adsueverit, statim ferè re-
 cti ambulare possunt, absque baculo, & valde quidem recti,
 vtpote quum ad læsum crus, neque circa inguen, neque circa
 poplitem, facile se flectere possint. Propter inguinis itaque
 inflexibilitatem, rectiore toto crure in ambulando vtuntur,
 quàm quum sani essent. Sed & aliquando ad terram pedem
 trahunt, vtpote quum supernos articulos non facile infle-
 ctant, & toto pede ingrediantur. Nihilo enim minus hi cal-
 caneo ingrediuntur, quàm anteriore pedis parte. Si verò ma-
 gnis gressibus progredi possent, etiam valde calcaneo infi-
 stentes progredierentur. Nam & sani quāto minoribus gres-
 sibus iter faciunt, tanto magis calcaneo ingrediuntur, alte-
 rum pedem deponentes, contrarium eleuantes. Quibus F
 cunque itaque hoc modo excidit, adhuc etiam magis calca-
 neo terram contingunt, quàm anteriore pedis parte. Ante-
 rior enim pedis pars, vbi reliquum crus extensum fuerit, nō
 similiter in anteriorem partem inflecti potest, sicut vbi crus
 fuerit inflexum: Neque rursus sinuari pes potest crure infle-
 xo, sicut vbi crus fuerit extētum. Sana igitur natura hoc mo-
 do est, veluti dictum est. Quum verò elapsus articulus repo-
 situs non fuerit, sic iter faciunt, velut dictum est, ob prædi-
 ctas has causas. Magis tamen ex carne crus fit quàm alterum,
 & iuxta nates, & circa suram, & iuxta posteriorem rectitudi-
 nem. At verò quibus dum adhuc infantes sunt, articulus sic
 elapsus, nō fuerit repositus, aut etiam à natiuitate ita habue-
 rint, & his femoris os aliquāto magis minuitur, quàm tibiæ
 aut ped

A aut pedis ossa. Et minimùm quidem in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes ramen vndiq; minuuntur, maximè circa posteriorem rectitudinem, quemadmodum etiã priùs dictum est. Quicunq; igitur rectè educati fuerint, hi vbi augeſcunt, crure vt poſſunt, breuiore aliquantũ exiſtẽte quàm altero, ita tamẽ vt baculo innitantur ea parte qua læſum crus eſt. Non enim abſque calcaneo, pedis pectore admodum vt poſſunt, vt in id innitantur, quemadmodum in alijs claudicationibus aliqui poſſunt. Cauſa verò cur non poſſint, ea eſt quæ paulò ante relata eſt. Ob id igitur baculo inſuper opus habent. Qui verò neglecti fuerint, & crure ad terram non vtuntur, ſed eleuatum id habet, hiſ minuuntur quidem oſſa,

B vbi augeſcunt, magis quàm hiſ qui eo vtuntur. Minuuntur autem & carnes magis multò quàm hiſ qui vtuntur. Verùm circa articulos in directũ mutilatur hiſ crus aliquãto magis, quàm quibus alio modo luxatio facta eſt. Quo igitur in ſumma dicatur, Articuli excidentẽs ac qui luxantur, inæqualiter inter ſeipſos excidunt ac luxantur, aliquãdo multò plus, aliquando multò minus. Et quibus quidẽ multò plus luxati aut elapſi fuerint, hiſ omnino difficiliùs reponuntur. Et ſi repoſiti non fuerint, maiores & maniſeſtiores mutilationes ac aſſiſtiones tales habent, & oſſium, & carnum, & figurarum. Vbi verò minus exciderint & luxati fuerint, tales faciliùs quàm alij reponi poſſunt. Si verò fruſtra tentati, aut neglecti fuerint, minores ac miuùs noxiæ mutilationes hiſ ſiũt, quàm

C illis de quibus paulò antè dictum eſt. Reliqui igitur articuli etiam valde multum differunt ad hoc vt aliquando minor, aliquando maior luxatio fiat. Verùm femoris & brachij capita, quàm ſimilimè inter ſe vtraq; excidũt. Nã capita prout rotunda ſunt, ſimplicem & caluam rotunditatem habet. Orbiculatiores autem ſinus ſunt, qui capita excipiunt, capitibus tamen iſſis congruentes. Quapropter fieri non poteſt vt dimidium articuli ex iſſis elabatur. Nam ob rotunditatis circunferentiã, aut ad externã, aut ad internã partem luxari poterit. Sed de quo nunc ſermo eſt, perfectè excidunt, nam alioqui non excidunt. Attamen & hi aliquando plus, aliquando minus, à naturali ſtatu proſiliunt, & femur aliquanto magis quàm brachiũ patitur. Nam aliquæ etiã ex hiſ luxationibus quæ à natiuitate ſiũt, ſi parũ elapſæ fuerint, ad naturalẽ ſtatum

tum reduci possunt, & maximè articuli circa pedē. Quicum- D
 que à nativitate mutili fiunt, pleriq; ex his curabiles sunt, si
 non valde magna emotio facta fuerit, aut etiam præauctis
 iam pueris contigerit. Optimum igitur est ut talia quàm ce-
 lerrimè curentur, priusquàm valde magnus ossium defectus
 fiat, & priusquàm admodum magnus carniū defectus circa ti-
 biam contingat. Modus itaque mutilationis nō vnus est, sed
 plures. Plurima quidem eluxata non sunt penitus, sed per fi-
 guræ consuetudinē, in quadam pedis interceptione mutila-
 ta. Animaduertendum autem in horū curatione est, ut tibiæ
 circa malleolum os, quod extrinsecus est, ad internā partem
 detrudatur ac dirigatur, & calcanei os quod è directo illi
 subiaceret, ad externā partem retrudatur, quo ossa quæ eminet E
 sibiipsis occurrant iuxta medium ac obliquum pedem. Digi-
 ti verò aceruati vnā cum magno digito ad internā partē in-
 clinentur, atque ita circuncirca cogantur. Probè autem deli-
 gare oportet cerato resinato, & splenijs, & linteis mollibus
 nō paucis, neq; nimis compressis, atq; ita deligationis circū-
 ductiones facere, velut etiam manibus directo pedis fiebat,
 quo pes paulò magis ad valgum vergere videatur. Soleam
 etiā quandam facere oportet, aut ex pelle nō nimis dura, aut
 è plumbo, eamq; insuper alligare non ad corpus positam, sed
 vbi iam postremis linteis deligare voles. Quū verò iam deli-
 gatus fuerit, vnus alicuius lintei ex his quibus deligatur, ini-
 tium, ad deligamēta quæ infra pedem sunt assuere oportet,
 è directo parui digiti, & postea sursum extendere, ita ut mo- F
 deratè habere videatur, atq; sic supra suram circundare, quo
 sic extantum ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi
 quis ceramingat, ad naturā iustam adducere oportet, ita ut
 & inclinata, & distenta præter naturam, & manibus sic diri-
 gamus, & similiter deligatione adducamus autem non vio-
 lenter, sed leniter. Assuere verò ita oportet lintea, ut condu-
 cat ad reparationes ac appensiones faciēdas. Aliæ enim clau-
 dicationes alia reparatione ac appensione opus habent. Cal-
 ceum insuper plumbeum facere oportet, extra deligationem
 adalligatum, qualem modulum crepidæ chiæ habebunt. Ve-
 rum nihil ipso opus est, si quis & manibus rectè direxerit, &
 linteis rectè deligauerit, & appensiones ac reparationes per
 assuta lintea rectè fecerit. Atque hæc quidem est curatio, &
 neque

- A** neque sectione, neq; ystione, neque alia varietate quicquam opus habet. Citius enim talia medicinæ obtēperant, quàm quis putarit. Deuincere tamen tempore oportet, donec in iustis figuris corpus auctum fuerit. Vbi verò calcei ratio habenda est, Arhylæ lutigradæ, calceamēti ita appellati species, accommodatissimæ existunt. Hoc enim calceamentū minime à pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiam creticus calceamentorum modus. At verò quibus tibiæ ossibus luxatis, ac vlcere inducto, articuli circa pedem penitus eminent, siue intrò vergant, siue extra, tales reponere non oportet, sed permittere vt quicumque velit medicus reponat. Illud enim clarè scire oportet quòd homo morietur, si repositi permanserint. Sed & vita paucorum dierū his cōtinget. Pauci enim ex ipsis septimū diem transgrediuntur. Conuulsio enim est quæ ipsos occidit. Sed & cancerari contingit tibiā ac pedē. Hęc ita futura esse certo scire oportet. Et neq; veratrum mihi videtur profuturū esse, & eadem die datum, & rursus epotum: proximè autem si quicquam huiusmodi facit, non tamen mihi hoc videtur. Si verò repositi nō fuerint, & ne tentati quidem ab initio, pleriq; ipsorū superstites euadunt. Sic autem & tibiā & pedem coaptari oportet, prout ipse volet, modò non sint dependentia, aut commota. *Curatio.*
- B** Curatio verò facienda est cerato picato, & splenijs vino imbutis paucis nō valde frigidis. Frigiditas enim in talibus cōuulsio nem accersit. Idonea etiam sunt folia betarum, aut rufsilaginis, bechij appellatæ, aut alicuius alterius huiusmodi, in vino nigro austero semicocta ac imposita. Et facienda est curatio super vlcus, & super partes adiacentes. Et cerato tepido ipsum vlcus illinendum. Si verò hyemis tēpus fuerit, etiā lanæ succidæ vino ac oleo tepidis imbutæ supernè ipsum madesfaciant. Deligatio verò nulla, neque vllum cataplasma adhibendum est. Probè enim nosse conuenit, quòd compressio ac omnis oneris gestatio, talibus omne malum affert. Accommodata autem sunt ad talia, & ex emplastris aliqua quæ cruentis vulneribus destinata sunt, quibus videlicet ex ipsis cōfert, vt lanæ superimpositæ vino madesfiant, & multo tempore sinantur. Quæ verò ex illis cruentis emplastris, paucissimis diebus incumbere debent, & quæ resina comprehenduntur forinsecus adiecta, nō similiter vt illa idonea sunt: diuturna enim
- C**

Tibia ossa luxata.

*Luxatio r
ulcere
Gata 3^o
di cap 9. a
ca finis.*

nim fit horum vlcerum purgatio, quum multo tempore ma-
dore abundant. Quosdam tamē ex his deligare, bonum est.
 Verū illud clarē nosse oportet, quōd necesse est hominem
 turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernā partē
 retractus est: & ossa luxata, extra eminentia apparēt. Neque
 enim vllum ex talibus ossibus plerunque denudatur, nisi le-
 niter aliquantum: neque abscedit, sed tenuibus ac debilibus
 cicarricibus circumducitur: atq; hoc si multo tempore quie-
 uerint: Sin minus, periculum est ne vlcusculum immedicabi-
 le relinquatur. Verū de quo sermo est, qui sic curantur, ser-
 uantur. Si verō repositus fuerit articulus ac permanferit, mo-
 riuntur. Eadem ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus ar-
 ticulum vlcere factō emineant, siue ad internam manus par-
 te, siue ad externam. Clarē enim nosse id oportet, quōd is
 morietur intra paucos dies tali morte, qualis antea dicta est,
 cui reposita ossa permanferint. Quibus verō reposita nō fue-
 rint, neque repositio tentata est, hī multō plures superstitēs
 manent. Curatio autem eiusmodi etiā talibus cōmoda est,
 qualis iam dicta est. Figuram verō claudicationis turpē esse
 necesse est, & digitos manus debiles ac inutiles. Sin enim ad
 internā partem ossa luxata fuerint, digitos inflectere nō po-
 test. Si verō ad externam, extendere nequit. Quibus verō
 tibiæ os factō vlcere, circa genu eminuerit foras, siue ad ex-
 ternā partem siue ad internā, his si quis reponat, adhuc prō-
 prior mors adest quā alijs, etiam si etiam illis prompta ade-
 rat. Si verō omīssa repositione medearis, spes quidem salutis
 hoc solo modo existit. Verū periculoriosa hæc ossa sunt, quā-
 to superiora ac robustiora sunt, & a fortioribus elapsa. At
 si os femoris quod ad genu est, vlcere factō elapsū fuerit
 & repositū permanferit, mortē adhuc violentiorē citius in-
 duxerit quā prius relata. Si verō repositum non fuerit, lon-
 gē magis periculosum est quā priora. Sola tamē hæc salu-
 tis spes est. Eadē verō ratio est, & de articulis circa gibbū cu-
 biti, & de cubito ac brachio. Quæcunque enim ex his luxa-
 ta, vlcere factō eminuerint, ea omnia si reposita fuerint mor-
 tem inducunt: non reposita, spem salutis: claudicationem ve-
 rō superstitibus. Lethaliores autē sunt superiores articuli, si
 reponantur. Sed & si non reponantur, periculosiores ijdem
 sunt. Si verō alicui superiores articuli luxati, factō vlcere e-
 mineant

Os tibiæ
 eminens.

Os femoris
 quā peri-
 culosum.

- A** mineant, hi & si reponantur celerrimam mortem inducunt: & si non reponantur, periculiosiores sunt. Curatio verò iā re- Curatio.
lata est, quæ mihi accommodatissima esse videtur. At verò quibus a. iculi digitorum aut pedis, aut manus luxati, facto vl-
cere eminuerint, osse nō fracto, sed circa ipsam connexionē
auulso, his si repositi permanferint, adest quidem periculum
conuulsionis, si non bene curati fuerint: attamen operæ pre-
cium est vt repositio fiat, cum prædictione quod multa cu-
stodia ac cura opus habet. Reponere verò facillimum est, ef-
ficacissimūq; ac artificiosissimum per vecticulū, velut etiā
antea dictū est in fractis ac eminētibus ossibus. Postea quie-
scere quā maximè conuenit, & decumbere, ac paucō cibo
- B** vi. Melius est & pharmaco sursum purgante leui aliquo vi.
Vlcus verò curare oportet, aut cruentis emplastris quæ ma-
desūt, aut polyophthalmi siue buphthalmi folijs impositis,
aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autem valde
frigidum adhibere. Minimè igitur primi articuli periculosi
sunt. Superiores autem periculosiores. Reponere verò opor-
tet eadē die aut postridie: Tertio ac quarto minime. Quarto
enim die maximè recrudescere solent. Quibus autem nō sta-
tim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi oportet.
Quicquid enim intra decem dies repositum fuerit, omne id
continetur. Si verò reposito osse conuulsio accedat, articulū
statim eiicere oportet, & calida quā sapissimè humectare,
& totum corpus, & præsertim circa articulos, calidè & leni-
ter ac molliter tractare. Verū inclinatum magis quā ex-
tentum totum corpus esse oportet. Expectandū tamē est ar-
ticulos circa digitos qui reponuntur abscessuros esse. Plerū-
que enim ita contingit, si vel quæuis inflāmatio subsit. Qua-
re si non propter vulgi imperitiā, modico verēda esset ac-
cusatio, nullum penitus reponere oportebat. Atque ad hunc
modum periculosa sunt ossa, circa articulos eminentia foras,
si reponantur, quemadmodum dictum est. Quæcunque verò
circa articulos digitorum penitus refecātur, ea plerunq; in-
noxia sunt, si nō quis in ipsa vulneratione ex animi deliquio
lædatur. Et curatio vulgaris talibus vlceribus sufficit. Sed &
quæ nō circa articulos sed iuxta aliam quandam ossium re-
ctitudinem refecantur, & hæc innoxia sunt, & adhuc alijs cu-
ratu faciliora. Ex quæ iuxta digitos ossa fracta extra eminēt,

non ad articulum, & hæc si reponantur, innoxia sunt. At re- **D**
 sectiones ossium perfectæ circa articulos, & in pede, & in ma-
 nu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad iuncturâ manus,
 plerisq; quibus refecantur innoxia sunt, si non statim animi
 deliquiû euertat, aut quarta die febris cōtinua accedat. Cor-
 ruptiones tamen carniū contingunt, & in vulneribus san-
 guifluis fientibus, & vehemētibus cōstriktionibus, & in ossiū
 fracturis magis quàm oportet compressis: & alijs vinculis
 violentis intercepta plerisq; decidunt. Et pleriq; ex talibus
 superstites euadunt, & quibus femoris pars aliqua & carniū
 & ossis decedit, & quibus brachij pars (Minus autem si cubi-
 ti aut tibiæ pars deciderit) & amplius facillè ferentes super-
 stites euadūt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones sta- **E**
 tim fiunt, & denigrationes, his abruptiones corporis celeres
 circūcirca fiunt, & decidentia cito decidunt, vt cū ossa iam
 antea remiserint emollita. Quibus verò dum ossa sana sunt,
 denigrationes fiunt, carnes quidem etiā his cito moriuntur,
 ossa verò tardè abscedūt, qua parte termini sunt denigratio-
 nis, & ossis nudatio extat. Oportet autē partes corporis que-
 cunq; infra terminos denigrationis sunt, quim iam penitus
 mortuæ fuerint, & doloris exortes, iuxta articulum auferre,
 prouidendo vt ne vulneret. Si enim is cui resectio fit, dolore
 affectus fuerit, & corpus nōdum mortuū fuerit ea parte qua
 refecatur, magnum periculum est ne præ dolore animi deli-
 quium incidat. Talia verò animi deliquia multos iam euesti-
 gio peremerunt. Femoris itaque os tali modo denudatum o- **F**
 ctogesimo die abscedere vidi. Tibia tamen huic homini cir-
 ca genu vigesima die ablata fuerat, aut vt mihi videbatur e-
 tiam citius. Non enim simul, sed ad maiore prouidentiam fa-
 cere quid mihi visum fuit. At tibiæ ossa ex eiusmodi deni-
 gratione circa mediā tibiā, sexagesimo die mihi deciderūt,
 quæcunq; ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidem & cu-
 ratio à curatione, ad hoc vt ossa denudata citius aut tardius
 decidant. Differt etiam cōpressio à compressione, prout ve-
 hementior aut debilior fit, ad hoc vt citius aut tardius nerui
 denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac venæ. Nam
 quæcunq; non vehementer intercepta moriuntur, ex talibus
 quædā ad ossium denudationes non perueniūt, sed magis in
 superficie decidunt. Propter has igitur causas, non vnum nu-
 meri

Ameri nomen tēpori poni potest, in quāto singula ex his iudicantur. Assumere verò valde oportet tales curationes. Sunt enim magis horrēdi aspectus quā curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solū iudicant, & circa victū diligentia adhibere oportet vt pro viribus febris exors sit, & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autem hæ sunt, vt neq; sublimius eleuatum sit, neq; deorsum repat. Sed magis præterea sursum vergat, donec perfectè fuerit circumcirca abruptū. Nam in hoc tempore sanguinis eruptionū periculum imminet. Ob id igitur vulnera deorsum repentia facere non oportet, sed vice versa. Alioqui vbi tempus ampliùs accesserit, & vlcera pura facta fuerint, non ampliùs hæ figuræ cōmodæ sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. Temporis enim progressu quibusdam horū oſis dissections fiunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamen oportet, vt tales per tempus à dysenteria corripiantur. Nam in plerisq; denigrescentibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex vlceribus. Accedit autem iudicatis iam denigrationibus ac sanguinis eruptione. & procedit quidē large ac vehementi impetu, sed nō ad multos dies durat, neque lethalis est. Neq; enim valde cibum auersantur tales, neque aliàs vasa vacua facere conducit. Femoris porrò luxationē circa coxam hoc modo reponere oportet, si ad internam partē elapsum fuerit. Bona quidem ac iusta & secundum naturam hæc repositio est, & sanè etiam aliquid ostentationis habēs, si quis talium rerum iactatione superbire velit. Ex pedibus hominē ad transversam mediæ domus trabē suspendere oportet, vinculo forti, sed molli ac lato, ita vt pedes quatuor digitorū spatio, aut minus, inter se distantes habeat. Sed & supra genua latum ac molle lorum circumdatum esse oportet, quod itē ad trabem illam extendat. Crus autem læsum duobus digitis ampliùs quā alterum extentum esse oportet. A terra verò absit caput ad duorum cubitorum spatium, aut paulò plus, aut minus. Manus autē iuxta latera extentæ, aliquo molli sint alligatæ. Omnia verò hæc supino iacenti ipsi præparentur, vt quā breuissimo tēpore pendeat. Postquā verò suspensus fuerit, virum peritum & non debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, vt cubitum inter caput femoris elapsum, & interfemineū locum-

*Femoris
luxati re-
positio.*

HIPPOCRATIS LIBER

que inter anum ac pudendū ponat, & postea altera manu ad D
 illam interpolatā coniuncta, rectus astans ad suspensū corpus,
 derepente se appēdens sublimis quā æquabilissimè depen-
 deat. Hæc repositio omnia quibus secundum naturam opus
 est exhibet. Nam & ipsum corpus suspensum sua ipsius gra-
 uitate extensionem facit: & is qui appendet, vnā cum exten-
 sione, femoris caput super acetabulum eleuari cogit, simulq;
 cum cubiti osse, velut cum veste molitur ac cogit, vt ad pri-
 stinam naturam relabatur. Oportet autem vincula omnino
 bene constructa esse, & curare vt fortissimus sit is qui se ap-
 pendit. Quēadmodum igitur etiā antea dictum est. Magna
 est differentia naturarum in hominibus, ad hoc vt vel facilè,
 vel difficulter repositio fiat. Et cur magna sit differentia di- E
 ctum est antea, vbi de humero egimus. Quibusdam enim fe-
 mur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica
 extensione, quantum manibus directio fieri potest, & ex leui
 cōmōtione. Multis autem qui crus iuxta articulū inflexerūt,
 iam facta circūagitatione rursus incidit. At multò plura vul-
 gari cuilibet apparatus non obtemperant. Quapropter scire
 quidē oportet de singulis optima in omni arte, vtī verò his
 quæ singulis vicibus idonea visa fuerint. Relati igitur sunt
 extensionum modi etiā in superioribus, vt quis vtī possit ex
 his qui fortè affuerint. Oportet enim in cōtrarias partes fie-
 ri extensionē vehemēter, in alteram, cruris: in alterā, corpo-
 ris. Si enim probè extensio facta fuerit, femoris caput supra
 pristinā sedem eleuabitur. Et si quidē ita super eleuatum fue- F
 rit, ne prohibere quidē facile sit, quo minus ipsum in suā sedē
 insideat. Quare omnis iam vectis molitio ac directio suffi-
 cit. Sed enim in extēsiōne deficiūt, & ob id maiore turbatio-
 nem exhibet repositio. Oportet igitur non solū iuxta pedem
 vincula alligata esse, sed etiā supra genu, quo non magis cir-
 ca articulum sit deligatio in extēsiōne, quā circa coxæ ar-
 ticulum. Sic igitur extensionē ad pedis partē præparatam fa-
 cere oportet. Sed & in alterā partem extensionē, non solūm
 ex deligatione circa pectus & alas, in contrarium extendere
 oportet, sed etiā loro longo, duplicato, robusto, leni, circa in-
 terfœmineum inserto, & à posteriore parte ad spinam porre-
 cto, ab anteriore verò ad clauiculam tendente, ibiq; ad alte-
 rum initiū alligato, ita coactionē facere oportet, vt alij hinc,
 alij

A alij illinc extensionē faciant, ita tamen vt lorum circa inter-
foemineum, non super femoris caput porrectū sit, sed inter ca-
put & interfoemineū. Verūm inter extendendū pugno ad fe-
moris caput quis innixus, id ad exteriorē partē propellat. Si
verò is qui trahitur eleuetur, iniecta manu, & cum altera ma-
nu cōiuncta, simul deorsum trahat, simulq; ad externā partē
cogat. Alius verò quispiam partē femoris ad genu, placidē ad
internam partē dirigat. Dictum autem est etiā antea, operæ-
precium esse vt si quis in vrbe populosa medicinā exerceat,
lignū possideat quadrangulare sex cubitorum, aut paulo mi-
nus latitudine bicubitali: crassitudo autē sufficit dodranta-
lis. Id secundū longitudinē hinc atq; illinc sectionē incisam
B habere oportet, vt ne altior quā oportet machinatio fiat. de-
inde postes aselli breues, robustos, vtrinq; inaptatos habere.
Postea sufficit quidē in dimidia ligni partē, nihil tamē verat
etiā per totum, velut fossas longas quinq; vel sex, quatuor di-
gitorū spacio inter se distantes, incisas esse: & satis est vt sint
hæ & latitudine & profunditate triū digitorū. Habere etiā
in medio hoc lignū debet excauationē profundiorē qua-
drangulā trium digitorū, quo in hanc excauationē, vbi opus
esse visum fuerit, lignū cavitati congruū infigatur, quo su-
perne sit rotundū. In figendū autem hoc est, si quādo condu-
cere visum fuerit, inter caput femoris & locū inter anum ac
pudendū. Hoc lignū erectum stans prohibet ne cōcedat cor-
pus, dū à pedibus extēditur: Quādoq; enim hoc ipsum lignū
C sufficit pro extensione in contrariū supernē faciēda. Aliquā-
do etiā dum hinc atq; illinc crus extēditur, hoc ipsum lignū
hac vel illac laxum incūbens cōmodum ad hoc fuerit, vt in-
star vectis, caput femoris ad externam partem extrudat. Ob
hoc enim etiam fossæ incisæ sunt, quo in quibuscunq; ex ip-
sis cōgruū id facere fuerit, vectes ligneus immissus mollitio-
nē faciat, aut circa articularū capita, aut ad ipsa penitus ca-
pita infixus, vnā cū extensione, siue ad externā partē, siue ad
internam, molitionē facere expedierit: siue etiam rotundum
vectē esse conducat, siue latū. alius enim alij articulo condu-
cit. Cōmoda autē est in omniū articularum cruris repositio-
ne, hæc per vectes molitio vnā cū cōcussione. Verūm de quo
nunc sermo est, teretē ac rotundum vectem esse conuenit. Ex
his machinis ac coactionibus, nō videtur mihi fieri posse vt

vllius articuli repositio frustra tentetur. Inuenire tamē quis **D**
 possit etiam alios modos repositionis huius articuli. Si enim
 lignū hoc magnū, habeat in medio à lateribus duos postes
 pedales, eius altitudinis, quæ cōferre videtur, alterum hinc,
 alterum illinc. Deinde lignū trāsuerſum, velut scalæ gradus,
 postibus impositū sit: atque ita sano crure inter postes trans-
 misso, læsum crus suprà gradum adaptatū habeat. Verū ad al-
 titudinem, & ad articulum qua parte excidit facilē quiddam
 adaptare oportet. Gradum enim moderato altiozem face-
 re oportet, & stragulum multiplex prout congruum fuerit,
 sub corpus subextēdere. Deinde lignum moderatam latitu-
 dinem ac longitudinē habens, sub crus ad malleolum vsque
 extētū esse oportet, quod vltra femoris caput, quantum eius **E**
 fieri potest porrigatur, & ad crus alligetur quotiescūq; opus
 fuerit, vt moderatē habeat. Postea dū extenditur crus, siue li-
 gno pistilloformi, siue aliqua alia ex his extensionibus, crus
 simul circū gradū vnā cū alligato ligno, deorsum cogere o-
 portet, ita vt aliquis supra articulū iuxta coxam hominē de-
 tineat. Hoc enim modo simul & extēſio femoris caput su-
 per acetabulū attollet, simulq; mollitio femoris caput in pri-
 ſtinā naturā detrudet. Hæ omnes relatæ necessitates ac coa-
 ctiones fortes sunt, & omnes calamitate superiores, si quis re-
 ctē ac bene præparet. Quemadmodum autē etiam antea di-
 ctum est, à longē debilioribus extēſionibus, & viliori appa-
 ratu plerisq; rursus incidit. At verò si ad externā partē fe-
 moris caput luxatū fuerit, extensiones quidē hinc atq; illinc **F**
 facere oportet, eodē modo velut dictū est. Verū molitionē
 cum veste lato, vnā cum extēſione facere cōuenit, ab externa
 parte ad internā cogendo, ita vt ad ipsas nates, & paulo supe-
 rius vestē adhibeas. Ad sanam verò coxā iuxta nates aliquis
 manibus renitatur, vt ne cedat corpus: aut alio quopiam hu-
 iusmodi veste submisso, & ex fossa conueniente fulcito con-
 tra obnitatur. Partē autē femoris luxati quæ ad genu est, ab
 interna parte foras placide abducatur. Cæterū suspēſio in hoc
 modo luxationis articuli non conuenit. Cubitus enim eius
 qui se appendit, caput femoris ab acetabulo propellit. Moli-
 tionem tamen cū ligno subiecto, ita quis adaptare possit, vt
 huic luxationis modo conueniat, si forinsecus adhibeat. Sed
 qd opus est plura dicere? Si em̄ rectē extēſio fiat, & rectē per
 vestes

A veces molitio contingat, qui articulus hoc modo elapsus nō reponi possit? At si in posteriorem partem femur exciderit, extensiones & diuersum tensiones ita facere oportet, velut dictum est, ita tamen vt super lignum multiplex stragulum infernatur, quo molliſſimum sit, & homo pronus reclinetur ac sic extendatur. Verū vnā cum extensione, etiā tabula deorsum cogere oportet eodē modo veluti gibbositates, ē directio natium tabula collocata, aut magis ad infernam quā ad supernā coxarū partem, & incisura in pariete ad tabulā excipiendā non recta sit, sed paululum decliuſ ad pedū partem. Hæc repositio maximē secundum naturā est huic luxationis modo, & simul fortissima. Suffecerit autem fortassis pro tabula, vt aliquis infideat, aut manibus innitatur, aut inscēdat derepente, simulq; cum extensione incūbat. Nulla verō alia ex relatis repositionibus secundū naturā est huic luxationis modo. Si verō in anteriore partem elapsus fuerit, idē quidem modus extensionū faciendus est. Verū virū & manibus validissimū, & aliās peritissimum, vola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu insuper iniecta, simul luxationem deorsum propellere, simulq; femoris partem quæ ad genu est ad anteriorem partem compellere oportet. Hic enī modus repositionis, huic luxationi maximē secundum naturā est. Sed & suspensio finitimum quid secundum naturam habet. Oporteret tamen eum qui se appendit peritum esse, vt ne cubito articulum excutiat, sed circa medium inter anum ac pudendum locū, & iuxta os sacrū se appendat. Laudatur etiā is qui per vtrē hunc articulū reponere conatus est. Et iam sanē aliquos vidi, qui præ imperitia, etiā extra & retro luxatos, per vtrē reponere conabant, non animaduertentes q̃ magis ipsum eiicerent q̃ reponerēt articulū. Nam qui primus excoGITauit, haud dubiē ad intrō elapsos articulos, per vtrē repositionem tētauit. Nosse igitur oportet q̃ alia multa vtre sunt potiora. Oporteret autē virem non inflatum infra femora ponere, quantum fieri potest supremē ad locū inter anum ac pudēdum adductum: & facto à patelis genu initio, femora per fasciam vsq; ad mediā femorum partē deligare. deinde in partem vtris solutam felle ex officina fabri immisso inflare, & vtrē cogere vt distēdatur. Hominē verō in latus decumbere oportet, & læsum crus superne habere. Atq; hic quidē est ap-

HIPPOCRATIS LIBER

paratus: sed pleriq; peius præparât quàm ego nūc dixi. Non enim deligant femora ad multā partem, sed solum genua, & non insuper extendunt. est autē insuper extēsiō quoq; facienda. Attamē aliqui iam reposuerant, facile rem assequuti. Non autē ita facile est coactionē hoc modo perficere. Nam & vter, dum inflatur, rudissimas partes suas ad articuli caput non habet, quod maximē emoliri oportet: sed inferius ipso, medius ipse locatus est circa media femora, aut adhuc inferius: & rursus femora ipsa natura sunt curua. Supernē enim carnosā sunt, & inter se sociata. Infernē verò sicca, vt etiam natura femorum vterem ab opportunissimo loco repellat. Si verò quis paruum vterem imponat, fieri non potest vt paruum robur articulum cogat. Si itaq; vtre vti velis, femora inter se ad multā partem colliganda sunt: & vnā cum corporis extensione vter inflandus est. Crura verò ambo deligāda sunt vsq; ad finem in hoc repositionis modo. At verò in vniuersa arte hoc plurimi facere præ omnibus oportet, vt id quod ægrotat sanum facias. Si verò multis modis fieri possit sanatio, vt eum qui minimē molestus est eligas. Nam & virum bonum, & artis peritum, hoc declarat, qui populo imponere non studeat. Verūm de quo nunc sermo est. Tales quædam sunt familiares extensiones corporis, vt ex his quæ adsunt expedita ac facilis reperiri possit. Nam si vincula ex loris mollia ac lenia non affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici aut domestici, fascijs aut pāniculis laneis ea maximē parte amplius obuoluere oportet, qua vincula detentionē factura sunt, atque ita vinculis deligare. Deinde in lecto robustissimo & ex presentibus maximo, hominē bene extendere oportet, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut à pedibus, ad limen ianue, intus aut foris prout cōmodum fuerit firmētur. Ad alteros autem lecti pedes lignū quadrangulare transuersum obijciatur, ita vt à pede ad pedem pertingat. Et si quidem tenue fuerit lignum, ad pedes lecti deligetur. Si verò crassum, non est opus. Deinde initia vinculorum, & eorum quæ à capite sunt, & eorum quæ à pedibus, vtraq; alligentur ad pistillū, aut ad aliud huiusmodi lignum: ita vt è directo corporis sint, aut paulò superius. Moderatē verò extendantur ad pistilla erecta consistentia, quorum alterum ad limen, alterum ad lignum obiectum firmetur, atque sic refractis pistillis extensio fiat.

Sufficit

A Sufficit autem scala quæ robustos gradus habet, sub lectum extenta, pro limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad conuenientes gradus hinc atq; illinc firmatis, ita vinculorum extensio fiat. Porro reponitur femoris articulus etiam hoc modo, si ad internam, & ad anteriorem partem luxatus fuerit. Supra scalam in terram defixam hominē collocare oportet. deinde sanum crus placidē externum deligare, vbi commo- dum fuerit ex sinistro verò vas testaceum aqua plenum, aut sportulam lapidibus refertam appendere. Alius repositio- nis modus, si ad internā partē luxatus fuerit: inter duas colū- nas trabē moderata altitudine deligare oportet. Præmineat autem vna pars trabis pro magnitudine natiū. & vbi stra-
B gula circū pectus hominis deligaueris, ipsum hominē supra præminentem trabis partem collocato, & deinde pectus ad columnam lato aliquo vinculo alligato. Postea sanum quidē crus detineat aliquis, vt ne circumagatur. Ex laeso verò appē- datur pondus quantum congruit, velut etiā prius dictū est. Primum igitur scire expedit, quòd omnium ossium cōmissu- ræ plerunq; sunt caput & acetabulum. In quibusdam verò & locus acetabuli formam refert, & oblongus est. Quidam ve- rò loci leuiter sinuosi sunt. Semper autem reponere oportet omnes articulos elapsos, maxime quidem statim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, quàm celerrime. Nam & ei qui repo- nit, facilius ac citius reponere contingit, & ægroto multo mi- nus doloris affert repositio priusquam intumuerit. Omnes
C etiam articulos vbi reponere voles, præmollire ac commo- uere oportet. Sic enim facilius reponi solent. Circa omnes autem articulorum repositiones hominem attenuare oportet, maxime circa maximos articulos & repositu difficilimos minimum circa minimos & faciles. At verò si digitorum ar- ticulus, siue primus, siue secundus, siue tertius in manu exci- derit, idem ac æqualis repositionis modus est. difficilius ta- men semper maximi articuli reponuntur. Excidunt autem quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquū vtrin- que maxime quidem superne, minimè autem in obliquū, in vehementi motu. Vtrinq; autē in ea parte in quam excide- runt, velut crepido est. Si quidē igitur ad supernā aut infer- nam partem exciderit articulus, eo quod leuior est hic locus quàm à lateribus, & simul parua facta est transgressio, facile

*Digitorū
articuli.*

HIPPOCRATIS LIBER

est reponere. Modus autem repositionis sic habet. **D**igitum summum aut deligamēto aliquo, aut alia quapiā huiusmodi re obuoluito, vt ne vbi summū digitum apprehensum extendis, elabatur. Quum autem obuolueris, alter quispiā manum supra iuncturam apprehendat, alter digitū obuolutum, atq; ita vterque ad seipsum probè extendat, simulq; elapsum articulum ad sedem suā detrudat. Si verò in obliquum excidit, extensionis quidem idem modus est. Vbi verò iam visus fuerit tibi articulus lineam transgressus esse, simul cum extensione statim ad locum suum detrudere oportet, ita vt alius quidam ex altera digiti parte obseruet ac repellat, vt ne rursus illic elabatur. Moderatè quoque repositionem faciunt vimineæ texturæ, sauræ id est lacertæ appellatæ, ex palmis cōtextatita vt dum digitum hinc atque illinc distendis, altera manu lacertam, altera manus iuncturam apprehendas. Postquam autem reposueris, deligare oportet linteis quàm citissimè tenuissimis inceratis, cera neque valde molli, neque valde dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis autē & liquefcens eliquatur, & digito calefiente deperit. Soluendus autem est digiti articulus tertia aut quarta die. In summa, si inflammatus fuerit, frequētius soluendus est: sin minus, rarius. De omnibus articulis hæc dico. Restituitur digiti articulus decima quarta die. Idem verò est curationis modus digitorum manus ac pedis. Circa omnes autem articulorum repositiones attenuare oportet ac fame macerare vsq; ad septimū diem: & si inflammati sint, frequētius soluere: sin minus, rarius. Quietem verò semper habere oportet afflictum articulum, & quàm optimè figuratum positum esse. Genu porro propter expeditam ac facilem naturam, mitius est quàm cubiti gibbus. Quare etiam facile excidit. Excidit autem sæpe intrò. Sed & extra, & in posteriorem partem. Repositiones autem fiunt ex repētina cōflexione aut exalcitratione: aut conuolutam fasciæ molem in poplitem ponito, & circū illā corpus ita ad flectendū gēua in terrā dimittito. Potest etiā vbi in posteriorem partem excidit, moderata extensione reponi, veluti cubiti gibbus. Si verò hac aut illac excessit, ex cōflexione aut exalcitratione reponitur. Carterum directio ex moderata extensione omnibus cōmunis est. Si verò non inciderit, hi quibus in posteriorem partem excidit, flectere

- A** Stere nō possunt: Sed neq; alij ita valde: minuitur autem femoris & tibiæ anterior pars. Si verò intrò, valgiore sūnt. Minuuntur autem externæ partes. Si verò extra, magis varijs ac detorti, minus claudi sūnt. crassiore autē ossē vehūtur, & internæ partes minuuntur. At si ex natiuitate, aut in augmento hæc sūnt, iuxta priorē rationem res se habet. Cæterū articuli circa malleolos luxati extensione vehementi opus habent, aut manibus, aut alijs huiusmodi: & simul directione vtrūq; præstare. Cōmune autem hoc est omnibus. At verò luxationis articulorum in pede, velut eas quæ in manu sūnt sanabis. Qui verò cum tibia cōmunionem habent, & ex natiuitate elapsi sūnt, aut etiā in augmento luxati, eandem cū manu repositionem expetunt. Quicūq; verò factō saltu ex supernis, calcaneo innitentes se firmarunt, sic vt ossa disparata sūnt, & venæ humores effuderint, & nerui contusi sūnt: si grauitè hæc acciderint, periculum est ne corruptione accedente per omnem vitam affligātur. obtorta enim sūnt ossa, nerui autem inter se cōmunionem habent. Quin & quibus fractis, aut ex vulnere, vel in tibia, vel in femore: aut neruis exolutis qui his cōmunicant: aut ex negligenti decubitu, calcaneum fuerit denigratū, etiā his maximæ recrudescētiæ ex talibus sūnt. Quandoq; etiā ad corruptionē accedunt febres acutæ, singultuosæ, mentē percellētes, citā mortem inducētes, & insuper venarū sanguifuarum liuores. Signa recrudescētiū sūnt, si effuso sanguine sugillata, & denigrata, & vicina his, subdura ac subrubra fuerint. Si enim cū duricia luescant, periculum est ne denigrescant. Si verò subliuida sūnt, aut etiā liuida mollia & diffusa: aut cū virore subpallida ac mollia: hæc in omnibus talibus bona sūnt. Curatio si febris absit, veratro in potu dato fit: sin minus nō, sed potu si opus sit, fauorū cremor decoctus, aut acetum mulsum dulce detur. Deligatio conuenit qualis in articulis. Ad contusiones autem magis quā ad omnia, linteis pluribus ac mollioribus vtendū est, & minus comprimēdum, & plurima insuper calcaneo aboluenda. Figura si velut deligatio postulat, vt ne ad calcaneum exprimatur Ferulis vtendum nō est.

*Luxationis articu-
lorum pes-
dis.*

Quibus verò aut ipse pes solus excesserit, aut cum appendice, excidit quidē magis ad internam partem: his si non rursus incidat, attenuatur progressu temporis & coxa,
& femur,

HIPPOCRATIS LIBER

& femur, & tibix pars luxationi opposita. Repositio est ve- D
lut iuncturæ ad manum. Extensio autem vehemens. Curatio
pro lege articularum. Recrudescit, sed minus quàm manus
articulus siue iunctura, si quieuerint. Victus parcius quiescen-
tibus expedit. Quæ verò ex natiuitate, aut in augmento
fiunt, iuxta priorem rationem.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE VLCERI-

BVS, ET ANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO IN-
TERPRETE.

E

*Quæ ulcera
curentur.*



Lcera vniuersa, nisi vino, humectare
non oportet, si non in articulo fuerit
vltus. Nam siccum sano propius est, &
humidum non sano. Est enim vltus hu-
midum: quod verò sanum est, siccum.
Præstat autem absque deligatione si-
nere, præterquam quod cataplasma
imponitur: quanquam aliqua vlcera

neque cataplasma ferre possint, magis autem recentia quàm
vetustiora, & quæ sunt in articulis. Modicus cibus, & aqua,
quàm maxime omnibus vltceribus conducunt, & magis re- F
centioribus quàm vetustioribus, & si quod aliud vltus in-
flammatum est, aut inflammationem minatur, & si pericu-
lum est corruptionis: & vltceribus ac inflammationibus in
articulis: & vbi conuulsionem fieri periculum est: & vulne-
ribus in ventre. Maxime verò omnium, fracturis in capite ac
femore, & si cui alij parti fractura contigerit. Stare autem vl-
ceri minime cōducit, præsertim si quis in crure vltus habeat:
imò neque sedere, neque ambulare. Verum osium & quies
maxime conferunt. At verò recentia vlcera omnia, tum ip-
sa, tum circumlitæ partes, minime inflammationem incur-
rent, si quis quàm citissime suppuret, & pus ab osculo vlce-
ris non interceptum supprimatur: aut si quis auertat, vt om-
nino non suppurentur, præterquam necessario, eoquæ pau-
cissimo

*Vulnus om-
ne quiescem
poscit.
Vlcera ne
inflammen-
tur.*

- A** cissimo pure, & sicca sint quàm maximè ex medicamèto nou molesto. Igneum enim feruorem hoc inducit, vbi horror & pulsatio accesserit. Inflammantur enim vlcerata tunc quum ad suppurationem tendunt. Suppurantur autè alterato sanguine ac calefacto, donec putrefactus talium vlcerum pus fiat. Quum verò cataplasmate opus esse visum fuerit, non ipsum vlcus cataplasmate integere oportet, sed circumfìtas partes, quo pus decedat, & quæ indurata sunt, mollescant. Cæterum ex vlceribus si quod acuto specillo incisum aut dissectum fuerit, cruentis vulneribus aptum medicamētum suscipit. & resiccatorium quoddam, quod prohibet suppurationem. Si qua caro ex telo contusa & dissecta est, eam curare oportet,
- B** quo quàm celerimè suppuretur. Nam & minus inflāmatur, & necesse est carnes contusas ac dissēctas, putrescere ac pus fieri, & eliquari ac consumi: & postea nouas carnes naſci. Omni recēti vlceri, præterquàm in ventre, cōducit frequenter sanguinem defluere facere, prout opportunū esse visum fuerit, & ab ipsīs partibus vlcus complectentibus, tum aliàs, tum si in tibia vlcus fuerit, aut in digito pedis aut manus, magis quàm si alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim defluente gracileſcētia, sicciora sūt ac minora. Prohibet enim hoc maximè talia vlcerata humectari. Deinde verò in omnibus. Putredo sanguinis ex sanguinis trāsmutatione fit. Confert autè post sanguinis defluxionē in talibus vlceribus, etiā spongiam deligare densam, mollem, cōcisam, sicciorē quàm humidiorē: aut super spongiam supernè folia multa ponere. At oleum, & quæcunque mollia, aut oleosa sunt medicamenta, talibus vlceribus non conducunt, si non valde iam ad sanitatem tendant. Neq; vlceribus ex recenti vulnere oleum conducit, neque mollientia, neq; adiposa medicamenta, tum aliàs, tum quòd vlcus ampliore purgatione opus habet. Vt autem in summa dicā, oleo illitio faciēda est, & in æstate, & hyeme, in his ad quæ talibus medicamentis opus habemus. Depurgatio ventris deorsum plurimis vlceribus confert, & in vulneribus quæ sunt in capite, & in ventre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculum est, & in his quæ confuta sunt, & in exedentibus ac serpentibus, & aliàs inueteratis vlceribus. At vbi deligare voles, pharmaca non prius imponere oportet, quàm vbi valde siccū feceris vlcus. Tūc verò apponere

*Pus.**Sanguinis defluxio in his quid faciat.**Oleum quibus inuult.**Purgatio ventris confert his.*

HIPPOCRATIS LIBER

ponere oportet, vlcus autem saepe spongia detergere, & rur-
sus linteam siccum ac purum saepe adhibere, atque sic imposi-
to medicamento quod conferre videtur, deligare, aut non

Tempus ca- deligare. Plerisque vlceribus tempus calidius commodius
lidus qui- est hyeme. exceptis his quæ in capite sunt ac ventre: magis
bus vulneri- verò æquinoctij tempus. Vlcera quæcunque probè & pro-
bus prosit. ut oportet purgata sunt, semper ad sicciorẽ modum germi-
nationem faciunt. Hæc autem plerunq; carne non superex-
crescunt. Si vndecunq; tandem os discesserit, aut vstum, aut
sectum aut alio modo, horum vlcerũ cicatrices cauiore sũt.

Vlcera quæ Vlcera non purgata, non cõmitti solent etiam si adducan-
non coeunt. tur, neque sua sponte coeunt. Vbi circumscritæ vlceris partes
inflammatae sunt, quandiu durat inflãmatio, vlcera coire nõ
solent. Sed & vbi circumscritæ partes denigratae fuerint, & san-
guinis putredine, aut etiam varice, influxionẽ sanguinis ex-
hibente, neq; hæc coire solent, si non circumscritas vlceris par-
tes sanas feceris. Ex vlceribus rotunda si subcaua fuerint, ex-
cidere oportet vndiquaque in orbem ea quæ discesserũt, aut
omnia, aut ex dimidio circuli, secundum longitudinem na-

Ignis sacer turæ hominis. In omni vlcere igne sacro accedente, cor-
ulceris. pus purgationem facere oportet, in vtram partem vlceri con-
tulerit, siue sursum, siue deorsum. Cui tumor obortus fuerit

Tumor circa circa vlcus, vlcere nõ inflammato, huic postea temporis pro-
ulcus gressu tumor puris subsidentiã habet. Quodcunque vl-
cus ex inflammatione tumidum non sedatur, dum alia quæ
simul inflammari ac tumescere coeperunt sedantur, etiã hoc
non coalescere periculum est. Quæcunq; verò ex casu, aut
alio quopiam modo dissecantur, & cõtunduntur, & intume-
scunt, ita vt vicinæ circuncirca partes suppuratae, pus de tu-
moribus per vlcus egerant: in talibus quicquid cataplasmate
opus habere visum fuerit, non super ipsum vlcus cataplasma
ponere oportet, sed super circumscritas partes, quo pus decedat,
& indurata molliantur. Postquàm autem mollita fuerint, &
inflammatio sedata, spongijs super ea quæ abscesserunt deli-
gatis compescito, initio à sana parte facto, atq; ita proceden-
do. Supernè verò super spongiã folia sint multa. Quum ve-
rò compesci non poterit caro quæ humida existit, in causa est
vt hãc eiicias. Si sub profunda carne vlcus fuerit, ex vtrisque,
& ex deligatione, & ex eo quod insuper compressit, hoc fa-
nè

- A** né incuruū subattollitur, & si quis id fecerit specillo, si fieri poterit ad fluxionem accommodatum ab ore vlcus refecare oportet, vbi commodum tempus esse visum fuerit, atq; ita citationem adhibere, qualicumq; tandem indigere videbitur. Plerumque verò in omni vlcere quod ventrem habet, in directum ad visum conspicua sunt omnia, tumore non presente. Et si quidem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida ac putrida, hoc vlcus & complectentes vlcus partes, aspectu nigra subliuida erunt. Et in excedentibus vlcerebus, qua parte phagedena affuerit, vehemētissimeq; depascitur ac cedit, ea parte circūscita vlcere pars colorem habebat nigrum, subliuidum. Cataplasma tumorum & inflammationis in circūscitis partibus sunt, verbascum coctum, & trifolij folia cruda, & ligustri folia cocta, & polium. Si verò etiā purgari opus habuerit vlcus, omnia quidem etiam hæc purgāt: Sed & fisci & oleæ folia, & marrubium. Coquere autem oportet hæc omnia, & maximè viticem, & fici ac oleæ folia: & mali punice folia similiter coquere oportet. Crudis verò his vtēdum est. Maluæ folia terito cum vino, & rute folia, & origani viridis. Omnibus his lini semen torrefactum ac tustum quam leuissimè, ammiscere oportet. Vbi verò periculum est ignē sacrū in vlcerebus oboriturū esse, isatidis folia trita cruda cum lini semine imposito, aut lini semen solani aut isatidis succo subactum imposito. Quum autem vlcus purum quidem fuerit, verū inflammatum est & vlcus, & circūscitē itidem inflammatae partes, lentem vino coctam, ac leuiter tritā, oleo modico subactā imposito, ac deligato: & rubi canini folia in aqua cocta, leuiter trita imposito, linteo tenui subextento, puro, vinoq; ac oleo madefacto. Et vbi committere ac coalescere vlcus voles, rubi canini folia velut lentem præparato. Nasturtium item sauridion à lacerti similitudine appellatum, vinum, & lini semen tenuiter tritum commiscuntur. Et hæc, lini semen, & vitex crudus, & alumē melium: hæc aceto subacta. Vuam albam immaturā per colum in vas eris rubri expressam, per dies ad solem exponito, noctu autem tollito, vt ne irroretur. Per dies verò indefinenter terito, vt æqualiter siccetur, & de æueo vase quā plurimum assumat. Tāto autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinem deuenierit. Postea & hūc succum, & mel quā optimum

Ignem sacrum quæ prohibeant.

HIPPOCRATIS LIBER

*Medicamē
ta varia ad
ulcera.*

optimum, & vinum dulce, in æneam ollam infundito, ita ta
men vt prius resinam terebinthinam in vino coquas, donec D
dura fiat instar mellis cocti, & postea resinā eximas, & vinum
affundas. Sit autem plurimus vuz immaturæ succus. Secūdo
loco vinum. Tertio mel. Myrrham etiā stacten quā opti
mam leuiter tritam, eodem vino paulatim affuso diluito, &
postea ipsam per seipsam cum vino saepe agitādo coquito, &
vbi ad bonam crassitudinem deuenisse videbitur, ad vuz im
maturæ succum affundito, & nitrum optimum torrefactum
sensim ad pharmacū ammisceto, & flori æris minus quā ni
tri. Hæc postquam miscueris, coquito non minus tribus die-
bus, lig is ficulneis nō multis succensis, aut prunis, vt ne tor-
reatur, & vbi hoc pharmacum illinitur, omnia quæ imponū-
tur sicca sint, & vlcera non humectentur. Vtēdum autem est E
hoc pharmaco ad vlcera inueterata ac recentia, & ad pu-
dendi: & capitis ac aurium vlcera. Aliud ad eadem vlcera.

Fel bubulum siccum, mel quā optimū, vinum album in
quo cocta sint loti ramēta, thus, myrrha æqualis, crocus equa-
lis, flos æris similiter. Ex liquidis autem vinum sit plurimū,
deinde mel, paucissimū verò fel. Aliud. Vinū, mel oleū
cedrinum. Sicca verò sint, flos æris, myrrha, malicoriū siccū.

Aliud. Flos æris tostus dimidia parte, myrrhæ duę partes
dimidiæ, croci partes tres, mel modicū, cum vino hæc torren-
tur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula
sicca q̄ leuissimè terito, deinde mixta ad solem calidissimū,
affuso vuz immaturæ succo, donec viscosa fiant, per tres dies F
terito. postea vino, austero, nigro odorato, paulatim affuso di-
luito. Aliud. In vino dulci albo, ilicis radices coquito, & vbi
probe habere visum fuerit, de vino defuso duas partes sumi-
to, & amurcæ olei quā siccissimæ partem vnā. Postea agi-
tādo coquito, vt ne torrescant, lēto igne donec ad bonā cras-
situdinem deueniant. Aliud. Reliqua quidem eadem sint.

*Alumen
melium.*

Verūm pro vino, acetum sit album acerrimum, in quo tinctę
sint succidę lanę. Postea ammixta amurca coquito, & succum
caprifici affundito, & alumen melium, & nitrum ac æris flo-
rem, vtraque tosta ammisceto. Hoc magis priore vlcera pur-
gat. Verūm prius non minus resiccat. Aliud. Lanæ suc-
cidas paucissima aqua tingito, deinde vini tertiam partē ad
aquam misceto, ac coquito donec bona prouenerit crassitu-
do. Ex

Ado. Ex his recētia vulnera quàm citissimè suppurari possunt.

Aliud. Aron siccum inspergito ac adaptato. Aliud. Fici dum succulenta est corticem viridem, in vino tritum immittito: & sine vino: ipsum etiam cum melle. Aliud. Ad acetum in quo cocta sunt loti ramenta: sit autem acetum album: amurcam oliuarum, & picis serum crudum ammisceto, & illinito, & instillato, & deligato sicca. Hoc recentia vulnera auertit, ne suppurentur: aut aceto abluito, & vino imbuta, spongia extergito. Aliud. Plumbum tritum cum spodio cyprio leuigatū inspergito. Et loti ramenta inspergito. & squamam æris, & chalcitidē cum ære, & solam per se, & cum lori ramentis. Et aliàs vbi siccis opus fuerit, talibus vtendum est,

B & spodio Illyrico trito cum ramentis, & ipsis solis ramētis, & flore argenti solo quàm leuissimè trito. & aristolochiā rasam ac tritam leuiter, inspergito. Aliud ad cruenta vulnera. Myrrha, thus, galla, ærugo, flos æris tostus, Alumen Aegyptium tostum, cœnāthe, lanarum sordes, plumbago. Horū singulorū æquale pondus diluitur cum vino velut superius, & reliqua præparatio fit eodem modo. Aliud. Acetum quàm acerrimum album, mel, alumen Aegyptium, nitrum optimū leuiter tostum, felis parum, simul coquito. Hoc carnem superexcrecentem consumit, & cauat, & non morder.

Aliud, Herba est paruis folijs prædita, cui nomen est Parthenium microphyllum. Hæc verrucas de pudēdo aufert: & chalcitis ex insula Melo cruda, & elaterium tenue siccū ad-

Cstringit: & malicorium tenue siccum eodem modo. Maximè autem replet caua, pura, herba Lagopyrus nomine: est autem tritico similis vbi arescit, folio paruo velut olea, sed longiore: & marrubij folium cum oleæ folijs.

Aliud. Carissæ siccissimæ internam partem pinguem, mellis speciem referentem duabus portionibus, cum seminis lini tosti non admodum, ac triti quàm tenuissimè parte vna. Aliud. Caricæ partem internam, & florem æris tenuem modicū, & fici succum. Aliud. Caricæ partem internam, chamæleonem nigrum, bubulum fel siccum. Aliud. Reliqua quidem eadem sint. Verū sicca, nasturtium tenue crudum, irio, utrūq; pari pondere: caricæ verò partes duæ, sint, & seminis lini partes duæ, cum fici succo. Quum autem aliquo horum phar-
corum vteris, splenia aceto imbuta supernè imposito, &

*Parthenium
microphyllum*

Lagopyrus

HIPPOCRATIS LIBER

spongia super splenia imposita deligato, & paulò magis ap- **D**
 primito. Si verò circūsitæ partes inflāmatæ fuerint, quicquid
 conferre visum fuerit circūponito: Si liquido vti volēs, etiā
 caricum pharmacum illinito, & velut suprā scriptum est deli-
 gato eodem modo. Est autem ex his pharmacum factum, ve-
 ratro nigro, sandaracha, squama æris, plumbo vsto, cū multo
 sulphure, auripigmento, cantharide. Ex his prout visum fue-
 rit cōponito, ac vtor. Diluuntur oleo cedrino, Postquā verò
 satis fuerit illitū, pharmacū ei jcito, & aron coctum, tritū im-
 ponito: aut siccum, tritū, oleo subactum. Et si sicco Carico vti
 volēs: liquida remouere oportet, & pharmacum inspergere.
 Facit autem siccum ex veratro solo constans ac sandaracha.

Aliud liquidum. Herba est cuius folium simile est aro- **E**
 neta, verū albū, lanuginosum, ad hæderæ folij magnitudi-
 nem. Hæc herba cum vino imponitur. Aut ilicis partem eam
 quæ est circum truncum, cum vino tritam imponito. Aliud.
 Vuæ immaturæ succus, acetum acerrimum, flos æris, nitrum,
 succus caprifici. Ad vuæ immaturæ succum alumen injcito
 tenuissimè tritum, & in vas æris rubri immissum ad solem
 exponito ac agitato, & vbi ad bonam spissitudinem deuenie-
 rit, tollito. Sicca ad cruenta vulnera hæc faciunt. Vera-
 trum nigrum tenuissimè tritum inspergitur, quandiu ali-
 quid humoris inerit ac depascentis. Deligatio verò eadē est
 quæ in emplastris. Aliud. Salis grana siccissima in æneam **F**
 ollam aut fictilem nouam immittito, magnitudine maximè
 æqualia, non magna: & mel optimū dupla salis mensura pro
 cōiectura facta, ad salem affundito: deinde ollam prunis im-
 ponito, & dum totū combustum fuerit finito. Postea exterfo
 ac expurgato per spongiā vlcere inspergito, & velut prius
 deligato, & paulò magis comprimito. Postridie verò qua par-
 te non adhæserit pharmacum inspergito, comprimito ac de-
 ligato. Vbi verò pharmacum discedere volēs, acetum calidū
 affundito, donec discedat, & rursus eadem facito, si opus fue-
 rit extersione per spongiā facta. Aliud siccum mordax.

Myfi quàm leuissimè tritum inspergito ea quæ humida
 sunt ac putrida: & florem æris tenuem non penitus leuiter
 tritum. Aliud siccum similiter mordax. Vbi spongia ex-
 terfisti, lanas quàm maximè succidas in testa exurito, face
 admota donec totas combusseris. hoc pharmacū leuiter tri-
 tum

A tum inspergito, & eandem deligationem adhibeto. Aliud siccum ad eadem vlcera. Chamæleo niger, alumen fici succo subactum, subigito autem tostum, & anchusam misceto.

Aliud. Anagallis & alumen Aegyptium tostum. Aliud. Puluillum inspersilem Orchomenium inspergito. Cæterum ad nomas proserpendo depascentes, alumen Aegyptium tostum, itemq; Melium facit. Verum nitro tosto insperso prius præparare ac spōgia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autem oportet, donec flammæ speciem induat.

Ad vetera vlcera in tibijs sientia. sunt autē sanguinolenta & nigra, meliloti florem tritum, melle subactum, cataplasmatismis modo vtere. At verò supra nervos dissectos, myrti sylvestris radices contusas ac cribratas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinquefolium: est autem alba & lanuginosa, & altior à terra, quàm nigrū quinquefolium: in oleo tritum deligato, & tertia die exoluito. His autem medicamentis in hyeme potius quàm æstate vtendum est. Medicamenta mollientia, quæ etiā cicatrices pulchras faciunt. Scillæ internam partem mucosam terito, & resinam de picea, cum recenti adipe suillo, & oleo modico, resināq; ac cerusa modica. Et adipem anserinum, ac suillum recentem purum, & oleum modicū, & scillam, & ceram albißimam. Aut scillam, oleum albū, resinæ parum, cerā, adipem, suillū veterem ac recentem. Facit & oleum, & ærugo, & scilla, & resina. Sint autem duæ partes veteris adipis ad recētem. De reliquis autem

C quantum opportunum esse visum fuerit. Adipem recentem liquefactum in aliam ollam defundito, & plumbaginē leuissimè tritam ac cribratam commisceto ac coquito, & primū agitato. Coquito autem donec destillatū in terram congeletur. deinde tollito, ac reliquum diffundito, præter lapidē subsidentem: & resinā inijcito ac agitato, & modicū oleum cedri num, & quod prius diffusum ac ablatū fuit ammisceto. Porro in omnibus mollibus in quibus resinam ammisces, vbi pharmacū ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam immittito ac agitato. Aliud. Adeps suillus vetus & nouus, & cera, & oleū: Sicca verò, loti ramenta, thus, plumbago: thuris videlicet pars vna, plumbaginis vna, & ramentorū loti vna. Sint autem adipis veteris partes duæ, ceræ vna, & noui adipis vna. Aut adipem solum veterem suillum, & cum ipso adi-

HIPPOCRATIS LIBER

pem caprinum recētem, quāminimē cum membrana, sed D
 purgarum, parum terito aut contundito, & oleum affundito,
 & plumbum cum spodio inspergito, & ramentorū loti dimi-
 dium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cærulea,
 oleum. De Ambustis. Illicis radices coquere oportet tene-
 ras. Quarum si cortex crassissimus est ac viridissimus, conse-
 ctum in tenues partes, vino albo affuso, lento igne coquito,
 donec ad bonam crassitudinem deueniat, ut illini possit. Po-
 test & in aqua coqui eodē modo. Aliud non mordax. Suil-
 lum adipem solū veterem liquefactū illinito. Supernē ve-
 rō scillæ radicem dissectam imposito ac deligato. Postridie
 verō fouetō ac perfundito, & adipem suillum veterem liqua-
 to, & ceram ac oleum ammisceto, thus item, & loti ramenta, E
 ac minium. hoc ubi illeueris, ari folia in vino ac oleo cocta
 apponito ac deligato. Aliud. Postquā suillo adipe illeue-
 ris vetusto, hastulæ regiæ radices in vino coctas ac tritas su-
 perillinito. Aliud. Adipem suillum veterem liquato, & re-
 sinam ac bitumen ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignem
 calefacta, imposito ac deligato. Quū in dorso ex plagis,
 aut aliās vlcus factum fuerit, scilla cocta, trita, ac linteo illita
 deligato. Postea verō adipem caprinū, & recentem suillum,
 & spodiū, & oleū, & thus illinito. Tumores in pedibus sien-
 tes, & sponte, & non sua sponte, in quibus neq; tumores, ne-
 que inflammatio, à cataplasmatibus sedatur: & si quis spon-
 gias deliget, aut lanas, aut aliud quid super sanam partem, postea
 intumescunt sua sponte, ac inflammantur; influxio sanguinis F
 per venas in causa est, si cui nō contusio causa est. Et si alicu-
 bi alia in corporis parte tale quid fiat eadē ratio est. Verū
 sanguinem detrahendū oportet, de venis præsertim influenti-
 bus, si conspicuæ fuerint. Sin minus, pertundere tumores
 oportet, profundioribus ac frequentioribus vulnusculis impa-
 ctis: Sed & in alijs omnibus quæ pertūdīs, sic facere oportet,
 atque hoc acutissimis ac tenuissimis ferramentis. Quū ve-
 rō sanguinem detrahis, specillo ne valde premas, ut ne con-
 tusio accedat. Aceto autem perluito, & grumum sanguinis in
 hiatibus ne relinquito: & illito cruentis vulneribus destina-
 to medicamēto, lanas succidas, carminatas, molles deligato,
 vino & oleo resperfas. Et pertusam partem æger ita habeat,
 ut refluxus sit sanguinis, non defluxus: & omnino nō hume-
 tēt:

*Dorsi ul-
cus*

*Pedum tu-
mor.*

A cter:& parum cibi capiat,& aquam bibat. Si verò vbi solueris, fissuras reperiens inflammatas, cataplasma ex vitice ac lini semine imposito. Si verò vlcera fuerint fissuræ ac eruperint, ad rem respiciens, & quod opus fuerit adhibens, de cætero curato.

At vbi varix inest in tibia, aut conspicuus, aut in carne, & tibia est nigra, & videtur opus habere sanguine ab ipsa defluente: talia nequaquam pertundere oportet. Plerunque enim magna vlcera ex fissuris fiunt, propter varicis influxum. Verùm varicem ipsum aliàs atque aliàs com-

Varices tibiae.

pungere oportet, vbi opportunum esse visum fuerit. Cæterum quum venam secueris, postquam sanguinem dimiseris, & fasciam solueris, & non sistatur, in contrarium, partem habeat, quò refluxus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, vt pote sanguine retrò fluente, atque ita tempus longius aut breuius decumbens expectet. Postea ipsum sic habentem deligato, nullo grumo existente in fissura. Deinde splenium duplum vino imbutum apponito, & super ipsum lanam puram oleo imbutam. Nam etiam si influxus sanguinis fuerit violentus, suppressio sit influentis. Et si grumo in fissura manente sic inflammetur, suppuratur. Pransum autè & potum plus aut minus venam secare ~~fieri~~ oportet, & aliquantum calefactum:& die calidiore quàm frigidior. Si verò influat sanguis, cucurbitam affigere oportet, & si ablata cucurbita, multum sanguinis, aut serosus sanguis fluat, cito priusquam repleatur rursus affigere & quod restat extrahere. Sin minus,

C grumi in fissuris inherant, & deinde ex ipsis inflammata vlcera fiunt. Aceto autem omnia talia perluere oportet, & postea non humectare, neque in fissuras decumbere. Verùm aliquo medicamento cruentis vulneribus destinato fissuras illinere. Et quum infra ganu, aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti erecto, si stare potuerit, affigantur.

HIPPOCRATIS

COILIBER DE FISTV-

LIS, ANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

HIPPOCRATIS LIBER

*Causa &
origo fistu-
lae.*



Istulae sunt quidem ex contusio-
nibus & tuberculis, sunt autem &
ex remigatione ac equitatione,
quum in natibus congregatus fue-
rit sanguis prope sedem. Putre-
scens enim distribuitur ad molles
partes nimirum quum & intestinū
rectum sit humidum, & caro mol-
lis, in quam distribuitur, donec tu-

berculum eruperit, & deorsum ad rectum intestinum com-
putruerit. Postquam hoc factum fuerit, in fistulam abit, ac
sanie manat, & stercus per ipsam fluit, & flatus, & abomina-
tio multa. Ex contusionibus itaque fit fistula, ubi aliquis cir-
ca rectum intestinum locus contusus fuerit ex plaga, aut ex
casu, aut vulnere, aut equitatione, aut remigatione, aut quæ-
cunque talia sunt. Congregatur enim sanguis. Putrescens au-
tem suppuratur: à suppurato verò ea quæ de tuberculis dicta
sunt patitur. Primum igitur quum tale quoddam tuberculum
nascens senserit, crudum quæ citissime secare oportet, prius-
quam suppuretur ad rectum intestinum. Si verò iam egrotan-
tem ex fistula assumpseris, aliam recentem accipe, & ho-
mine supino reclinato, diductis cruribus altero huc, altero il-
luc, caulem immitte donec offendas ac impinguas, & fistulae
profunditatem per caulem metire. & feseleis radicem tenuis-
simè tritam, aqua affusa ad dies quatuor macerato, eamque
aquam trium cyathorū mensura, melle ammixto eger bibat
ieiunus. Cum hac etiam ascaridas purgato. Quicunque verò
relicti fuerint nō curati, moriuntur. Postea linteū byssinum
tithymalli magni succo imbutū, flore eris tosto trito insper-
so, in penicilli figurā intorque longitudine fistulae æqualem,
filo per summū penicillū trāsmisso, & rursus per summū cau-
lem: & homine supino reclinato, adhibito catoptere instru-
mento sedem expandente, corrosam recti intestini partem
inspicio, & sic caulē immittito: & ubi in intestinum incide-
rit, apprehensum retrahito, donec penicillus fuerit intrusus,
& superiori ac inferiori parti adæquatus. Postquam verò fue-
rit intrusus, glandē corneam in intestinum indito, & podice
ex terra cimolia oblito finito. Vbi verò ventrem exonerat,
eximito, ac rursus indito, donec ad quintū diem peruenierit.

Sexta

Medela.

- A** Sexta autē eximito, extrahens penicillū ex carne, & alumen terito, eoq; glandem expleto, & in intestinū indito ac finito, donec alumen liquidum fiat. Podicē verò myrrha illinito. donec coaluisse visus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipiro, & ad palmi longitudinem quinquuplicato, & pilum equinum circumdato. Deinde facto specillo stanneo in summa parte perforato, & initio lini compilati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistrae manus digitum indicem in sedē indito: vbi verò specillum contigerit digitū, inflexa summa specilli parte, initium lini quod est in specillo per digitum adducito: & specillum quidē rursus extrahito, lini verò initia bis aut ter connectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea verò dimissum negocia sua obire iubeto. Ceterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantum augere oportet, ac intorquere semper singulis diebus. Si verò linum crudum computrescat, priusquam fistula corrodat, aliud linum ad pilum inuēte, immitte ac connecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, quod non putrescit. Postquam verò fistula computruerit, spongiam mollem in tenuissima frusta concisam apponere oportet, deinde in fistulam quidem, florem æris tostum multum per specillum immittere. Spongiam verò melle illinere, & subiecto digito indice sinistrae manus, vltra protrudere: & appositam alterā spongiam deligare, eodem modo velut in hæmorrhoidibus.
- C** Postridie verò exoluere, & aqua calida abluere, & cum spongia per sinistrae manus digitum fistulam purgari conari: & rursus æris florem immittere, ac spongiam deligare. Atque hæc facere oportet per dies septenos. In his enim maximè tunica fistulae computrescit. de cætero verò donec sanata fuerit spongiam deligare. Nam dum per hunc modum fistula à spongia cogitur ac explicatur, neque rursus concidere poterit, neque alia ipsius pars sanabitur, alia verò rursus complebitur, sed in seipsa tota sana erit. Versū in hac curatione multa aqua calida proluere oportet, & fame macerare. Si verò non corrosa fuerit fistula, specillo immisso secato donec diduxeris, & æris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, & polentam aqua subactā superimponito, & betarum folia diligato. Vbi verò excide-

*Medela alia
tera quā
Celsus sum
psit.*

Curatio fistulae.

Medela alia.

rit æris flos, & fistulæ vlcus purum fuerit, velut prorem cu- D
 rato. Si verò in loco si vbi fieri id non possit, & profunda
 etiam sit fistula, flore æris, & myrrha, & nitro in vrina dilutis
 colluito: & in fistulæ osculum plumbeam glandem indito,
 vt ne coalescat. Collutio verò facienda est, pennæ fistula ad
 vesicam alligata, & fistula intro immissa, atque sic collutio-
 ne infusa. Verùm sanus non fit, si non secetur. Si intestinum
 rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat & febris, & fre-
 quenter ad exonerandum aluum desideat, & nihil egerat, &
 præ inflammatione sedes exiisse videatur, & aliquando vri-
 næ stillicidium corripiat: hic morbus fit, quū pituita ex cor-
 pore ad intestinum rectum decubuerit. Conferunt autem ca-
 lida. Quum enim hæc adhibentur, pituitam attenuare ac cō E
 sumere possunt, & simul acrimonia sua salsam pituitā aquo-
 sam reddere, vt non sit ardor, neque morsus aliquis in inte-
 stino. Curare itaque oportet hoc modo. Aegrum in cali-
 dam aquam collocato, & trita grani cnidij grana sexagintā,
 in vini hemina, & olei hemina dimidia diluto, tepefacito, &
 infundito. Hæc & pituitā educunt & stercus. Si verò in aqua
 non sedet, oua cocta in vino nigro odorato, ad sedem appo-
 nito, calido quopiam infernè substrato, aut vesica aqua cali-
 da plena. Aut lini semen tostum, mollitum, tritum pari farl-
 na, in vino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmat-
 is modo calidissimè imponito. Aut ordeum & alumen Aegy-
 ptium tritum misceto, & glandem oblongam efformato, &
 ad ignem tepefaciens digitis effingito, deinde summè tepi- F
 dam effectam in sedem indito. Forinsecus autem cerato ob-
 linito, & allium in vino nigro diluto coctū pro cataplasma-
 te imponito. Postquā verò exemeris, in aquam calidam collo-
 cato: & solani succum, & anserinum ac suillum adipē, & chry-
 socollam, & resinam, & ceram albam commisceto, simulque
 liquefacito, & cum his illinito. & quandiu inflammatio du-
 rauerit, allium coctum cataplasma adhibeto. Et si quidem ad
 hæc à dolore liberetur, satis fit. Sin minus, bibat peplum, me-
 conium album appellatum, aut aliud quoddam quod pitui-
 tam purgat. Et quam diu durat inflammatio, edulijs leuibus
 nutriatur. Vrinæ stillicidium ex his incidit. Vesica ex in-
 testino recto calefscens, caliditate pituitam adducit: à pituita
 verò urinæ stillicidium fit. Si quidem igitur vnà cum mor-
 bo

*Intestinum
 rectum in-
 flammatum*

Curatio.

*Stranguria
 quare his su-
 perueniat.*

- A** bo sedetur, solet enim plerunque ita fieri, satis est. Sin minus, medicamenta ad vrinæ stillicidium destinata exhibe-
Sedis pro-
cidentia.
 ro. Si verò sedes elabatur, fomento per mollem spongiam
 adhibito, & cochleæ muco illito, è manibus deligatum sus-
 pendito ad modicum tempus, & redibit. Si vero amplius
 excidat, & non maneat intus, laterum mollitudines praein-
 gito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, & vbi se-
 dem intro protruxisti, spongiam mollem aqua calida, in qua
 loti ramenta cocta sunt, imbutam imponito. Sed & de aqua
 ipsa ad sedem affundito, spongiam verò exprimito. deinde
 fasciam per media crura supextentam, circa vmbilicum de-
 ligato. Vbi verò aluum exonerare volet, inter tabulas an-
 gustissimas insidens id faciat. Si verò puer fuerit, intra mu-
 lieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem ventrem exo-
 nerat, crura extendat. Sic enim minimè sedes exciderit. At
 si intestinum rectum humidum fiat, & sanies defluat, fece vi-
 ni vsta & aqua ex myrti decocto abluito, & adiantū siccum,
 tusum, cribratum inspergito. Si verò sanguis profluat, ablu-
 tione ex iisdem facta chalcitidem, & cupressi, aut cedri, aut
 pini, aut terebinthi ramēta, inspergito, pari mensura de his
 ad chalcitidē ammixta. Forinsecus autem ceratum crassum
 oblinito. Quum sedes siue rectum intestinum exciderit, &
Sedis proci-
dētis varia
medela.
 in loco suo manere noluerit, silphium optimum ac densissi-
 mum derafum tenuè inspergito: & sternutatorium medica-
 mentum ad nares apponito, & hominem ad iram exacerba-
C to. Aut vbi aqua calida abluisti, malicorium, & alumen, in vi-
 no albo trita, ad sedem affundito. deinde panniculos apponi-
 to, & femora per dies tres colligato, & ieiunet. Vinum autē
 bibat dulce. Si verò neq; sic retro cedat, miniū mixtum cum
 melle illinat. Intestinum rectum si procidat, & sanguis pro-
 fluat, de ari radice detractum corticem in aqua coquito, de-
 inde tritum farina ammixta calidum imponito. Aliud. Vi-
 tis sylvestris, quam aliqui psilothrion vocant, radices tenerri-
 mas derafas in vino nigra meraco austero coquito, deinde
 tritas tepidè imponito. Sed & farinam ammisceto, & in vi-
 no albo ac oleo subigito, & tepidè imponito. Aliud. Cicu-
 tæ semen vino albo odorato instillato terito, deinde tepidè
 imponito. Si verò inflammatum fuerit, hæderæ radicem in
 aqua coctam, leuiter tritam, ammixta farina optima, in vino

HIPPOCRATIS LIBER

albo subactam imponito, & oleū ad hæc ammiscero. Aliud. D

Mandragoræ radicem maximè viridem, sin minus, siccam: viridem itaq; lotam ac concisam, in vino diluto coquito, ac imponito: siccam verò tritam similiter imponito. Aliud.

Cucumeris peponis internam partem leuiter tritam imponito. Si verò dolor fiat, & inflammatum non sit, nitrum rubrum assato, ac leuiter terito, & alumen ac salem torreto ac leuiter terito, & pari mensura singula misceto. deinde ad picem optimam ammisceto, & linteo illita apponito ac deligato. Aliud. Capparidis folia viridia trita, in marsupium coniecta adalligato: & ubi vrere videberis auferto, ac rursus apponito. Si verò folia non affuerint, corticem radicis capparidis contusum, vino nigro subactum, eodem modo alligato. Hoc

etiam ad splenis dolorem bonum est. Ex his cataplasmatibus quæ quidem frigefaciunt, fluere prohibent: quæ verò molliunt ac calefaciunt, diffundunt: quæ in sese trahunt, siccant & attenuant. Porro hic morbus fit, quum bilis & pituita ad hos locos decubuerit. At recto intestino inflammato medicamentum in quod resina, & oleum, & cera, & plumbago, & adeps calidissimus commiscetur, illinere oportet. E

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE HÆ-

MORRHOIDIBVS, IANNO COR-

NARIO MEDICO NOTABILIS.

SICO INTER.

PRE.

*

*Causa hæ-
morrhoidi.*



Æmorrhoidum morbus hoc modo fit. Quum bilis aut pituita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem qui in venis est calefacit. Calescentes autem venæ ex vicinis venulis sanguinem attrahunt: & ubi replentur, interna sedis pars intumescit, & capita venarum supereminent: & partim dum à stercore exeunte comprimuntur, partim

- A** tlm dum à coaceruato sanguine coguntur, sanguinem ei-
culantur: atque hoc maxime quidem vnà cum stercore, aliquā-
do verò etiam sine stercore. Curare autem oportet hoc mo-
do. Primùm equidem nosse oportet in quo loco sint hæmor-
rhoides. Rectum enim intestinum & secans, & refecans, &
consuens, & vrens, & putrefaciens, etiam si grauissima hæ-
esse videantur, nihil læseris. Iubeo autē preparari ferramen-
ta septem aut octo, magnitudine palmi, crassitudine specilli
crassi, ex summa parte reflexa ac lata, velut in obolo paruo.
Et vbi priore die purgatorio medicamento purgasti, ea qua
rem aggredieris vrito, & homine supino reclinato, & pului-
nari sub lumbos subiecto, sedem quam maxime per digitos
B foras extrahito: ferramentaque candentia facito, ac vrito,
donec resiccaueris, & hos ita vt ne contingas. Vrere enim
oportet, & nullam hæmorrhoidem sine vstione sinere, sed
omnes exurere. Cognosces autem hæmorrhoidas non dif-
ficulter. Supereminet enim in internam recti intestini par-
tem, velut vitz acini, liuida, & simul vt sedes extrahitur,
sanguinem eiaculantur. Detineant autem aliqui ipsius ca-
put & manus, dum vritur, vt ne moueatur: & dum vritur
vociferetur, sedes enim magis inde eminet. Postquā verò vs-
seris, lentes ac eruum coquito, & ex aqua trita imposito, ad
quinque aut sex dies. Septima verò die spongiam mollem in
tenuissima frusta concidito. Sit autem latitudo spongiæ vn-
diquaq; sex digitorum. deinde super spongiam linteum te-
nue, ac leue, spongiæ æquale, melle illitum imposito, & po-
stea subiecto digito indice sinistræ manus, mediam spogiam
C in sedem quā penitissimè protrudito. deinde supra spon-
giam lanam apponito, quo in sede quieta permaneat. Et la-
terum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciā ex cin-
gulo submittito, quam per media crura receptam, ad cingu-
lum circa vmbilicum deligato. At pharmacum de quo dixi,
ad densam ac robustam carnem faciendam ac producendam
deligatur, & non minus quā viginti diebus hæc deligare o-
portet. Sorbenda autem est semel in die farina, aut milium,
aut fursurum decoctum: & aqua bibenda. Si verò ad aluum
exonerandam desideat, aqua calida proluo. & tertio quoq;
die lauet. Alia curatio. Extractā quā maxime sedē, aqua ca-
lida pfundito. deinde summas hæmorrhoidū partes præseca-
to. Phar

Curatio
qua.Curatio
alia.

HIPPOCRATIS LIBER

to. Pharmacum autē ad sectionē præparatum sit hoc. In ærē
 vas mingito, & in vrinā, æris florem tostum, tritū, leuem in
 spergito, deinde diluito, ac vas agitato, & in sole siccato. Vbi
 verò siccatum fuerit, eradito, terito, & leuigatū ad anum ap-
 ponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spongiam supra de-
 ligato. Alius modus Adnascitur ad venā sanguifluam ex-
 tuberantē, velut mori fructus. & si quidem valde extra fuerit
 extuberantiā, carnis tectoriū circum ipsam nascitur. Hominē
 igitur flexis genibus in duo mortaria siue excisos lapides lo-
 cato, ac videto. Cōperis enim inflatas partes inter nates cir-
 ca sedem, sanguinē verò intrinsecus procedere. Si itaq; mol-
 lis sit, & sub tectorio cedat extuberantiā, digito ipsam aufer-
 re oportet. Nihilo enim plus difficultatis hæc res habet, quā
 si quis dū ouicula excoriatur, digitum inter cutem ac carnē
 adigat. Atque hæc interim dum loqueris, ægro non animad-
 uertēte facito. Postquā autē extuberantiā abstuleris, necesse
 est sanguinis cursus ex tota detractiōe promanare. Itaq; vi-
 no austero in quo gallę maceratę sunt, cito abluere oportet:
 & vena sanguiflua vnā cum extuberantiā peribit, & tecto-
 rium sedabitur, & quanto vetustior affectior fuerit, tanto fa-
 ciliior sanatio erit. Si verò penitius intus delituerit extube-
 rantia, per catoppterem inspicito, & ne à catopptere decipiaris
 videto. Cum enim aperitur, extuberantiā explanat: dum verò
 rursus cōtrahitur, rectē ostendit. Aufferre autē oportet, vera-
 tro nigro in anum sublito: deinde tertia die auferre, ac vino
 austero infuso colluere. Cæterum quòd sanguis non fluit,
 quum abstuleris extuberantiā, mirari nō oportet. Neq; enim
 si in articulis disseces manus aut crura, sanguis pfluat. Si verò
 supra aut infra articulos secueris, cauas ac sanguifluas venas
 comperies: & difficile fuerit vt expedite sistas. Sic etiam hæ-
 morrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantię detra-
 ctionem seces, sanguis profluat. Si verò ipsam extuberantiā
 in connexu abstuleris, non profluat. Si quidem igitur ita se-
 datur, bene habet: Sin minus, vrito, cauendo vt ne contingas
 ferro, sed propē ad motis ferramenti resiccato, & florem æ-
 ris ex vrina apponito. Alius modus curationis hæmorrhoi-
 dum. Clysterem facere oportet, velut arundinem sepiariā,
 phragmiten appellatam, & in ipsum ferramētum probē cō-
 gnū adaptare. Deinde indita in sedē clysteris fistula, fer-
 rament

Alia.

*Alia cu-
ratio.*

- A** ramentum candens immittere, ac frequenter eximere, quo magis calefieri sustineat, & neque vlcus ex calore habeat, & venæ resiccatae sanæ fiant. At verò si neq; vrere, neq; resecare voles, vbi multa calida aqua proluisti, & sedem euersam extraxisti, myrrham tritam, leuigatam, & gallam, & alumen Aegyptiū vstum, vna & dimidia ad reliqua parte, & melantheriæ tantundem accipe, atque siccis his vttere. Hæmorrhoids enim ab his medicamentis decedet, velut coriū combustum, Hæc facito donec omnes extirpaueris. Et dimidia chalcitidis vstæ pars idem efficit. Si verò glandulis sanare voles, sepiæ testam, plumbaginis tertiam partem, bitumen, alumen, florem æris modicum, gallam, æruginem modicam, commisceto & mel coctum affundito, & formatam ex his glandem oblongiorem apponito, donec extirpaueris. Muliebrem hæmorrhoidem hoc modo curato. Multa calida aqua proluito. In aqua verò odorata, velut est myrica trita coquito. Deinde spumam argenti tostam, & gallam misceto, & vinum album, & oleum, & anseris adipem affundito, omniaque simul trita, post factam prolutionem illinenda dato. Proluere verò oportet sede quàm maximè extracta.

*Muliebri
hæmor-
rhois.*

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE VISV,

C IANO CORNARIO ME-
DICO PHYSICO IN-
TERPRETE.

*



Culi corrupti sponte quidem cærulei fientes, derepente tales fiunt. & vbi facta fuerint, non est talium sanatio. Qui verò maris speciem referunt, paulatim per multum tempus procedendo corrumpuntur. & sæpe alter oculus in multo tempore postea corruptus est. Huius caput purgare oportet, & venas vrere. Et si quis ab initio curatus fuerit hoc modo,

*Visus cor-
ruptus qualis.*

Medela.

do, malum sedatur, & in deterius non procedit. At qui colo- **D**
rem inter cæruleum ac marinum medium referunt, si qui-
dem puero tales fiant, ubi senior sit, sedantur. Si verò senio-
ri septimum annum egresso fiant, melius videt magna val-
de & splendida: & videt quidem procul, sed non clarè: & si
quid valde ad oculum admouerit, etiam hoc videt, aliud au-
tem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis
vstio. Sanguinem verò his detrahare non conducit, neq; cæ-
ruleo, neque maris speciem referenti. Et visum oculorum,
oculo sano existēte, in iunioribus hominibus, tum formellis,
tum masculis, quicquam faciendo nihil iuueris, quandiu ad-
huc augefcit corpus. Quum autē non ampliùs augefcit, ipsius
oculi palpebras intuitus radendo attenuato, & si opus esse **E**
visum fuerit, etiam ferramentis non admodum candenti-
bus intrinsecus inurito. Quum verò palpebras oculi raseris,
lana milefia, crispa, pura, circumfufum obuoluta, radito,
ipsam oculi coronam vitando, vt ne ad chartilaginē vsque
peruras. Signum autem sufficientis rasuræ est, si non am-
pliùs splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta aut aquosa.
Tunc verò liquido aliquo medicamēto, in quo flos æris est,
defricare oportet. Postea autem ubi & rasionis, & vstionis
crustæ exciderint, & vlcera purgata fuerint ac germinauē-
rint, fissuram per sinciput secare oportet, & quum sanguis
defluerit, medicamento cruentis vulneribus idoneo illi-
nere. Deinde verò & huius, & omnium caput purgare ope-
raprecium est. Palpebræ si crassiores quàm pro natura **F**
fuerint, ex inferna parte carne quantum potes quàm expē-
ditissimè resecta, postea palpebram inurito, non candenti-
bus ferramentis, vitando naturam pilorum: aut flore æris
tosto tenui adstringito. Quum autem crusta exciderit, ve-
lut reliqua curato. Quum palpebræ scabie laborant, &
pruritus habet, floris æris glebulam ad cotem terito, & ex
ipso palpebram defricato. Et tunc squamam æris quàm te-
nuissimè terito, deinde vnae immaturæ succum excolatum
affundito, ac leuiter simul terito. & postea reliquum suc-
cum in vase æris rubri affundens, paulatim terito, donec
crassitudo fiat velut allij intritum. & ubi resiccatum fuerit
Nyctalops medicamentum, leuiter trito vtē. **Nyctalops** medica-
quā curatur. mentum bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & cer-
uicem

*Palpebra-
rum cura-
tio.*

*Palpebræ
curatio.*

*Nyctalops
quā curatur.*

A uicem eius quàm maximè scarificato, & fame ad multū tempus premito. Vbi verò remiserit, vnum aut duo frusta, prout maxima deuorare potest, de hepate bubulo crudo in melle tincto exhibeto. Si cui oculi dum sani sunt visum corrumpant, huic sectione & insuper excoriatione, in sinciput facta, os exscindere, & aquam auferre oportet, sicque curare: & ita sani fiunt. Ad lippitudinem annuam ac popularem conducit purgatio capitis, & ventris inferni. Et sic corpus habeat, sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert. Conferunt & cucurbitæ circa venas affixæ. Cibus modicus & aquæ potus. Decumbat autem ager in tenebris, procul à fumo, & igne, & alijs splendidis, atque hoc in obliquum, modo in dextram, modo in sinistram partem. Caput verò ne humectet, neque enim conducit. Cataplasma si dolor nō adest, verū velut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum tumores sint doloris exortes. Verū post acria medicamenta, quæ ad dolorem illinūtur, postquam dolor sedatus fuerit ac separatus, post medicamenti illinitionem, tunc cataplasmata imponere cōducit, si quod commodum fore visum fuerit. Nec verò ad multum tempus contentè intueri confert. Lachryma enim prouocatur, quū non possit oculus ad splendida officio suo fungi. Sed neque ad multum tempus claudere oculos conducit, maximè si fluxionem calidam habeat. Lachryma enim suppressa, calefacit. Si verò fluxio non sit, cum puluillo sicco subliationem facere conducit.

*Medela cū
quis sanis
oculis nō ui
det. illis anni
Lippitudi-
nis curatio*

*splendida
oculis nō
sent. i. de
sals. i. f.*

HIPPOCRATIS

COI, LIBER APHORIS-

MORVM,

HO CORNA-


RI

CO PHV-

SA

TER-

Vita



Ita brevis, ars longa, tempus præceps, experimētum periculofum, iudicium difficile. Oportet autem nō ſolū ſeiſpſum exhibere quæ decet facientem, ſed etiā ægrotum, & præſentes, & quæ externa ſunt. **II.** In perturbationibus alui, & vomitibus ſponte ſientibus, ſi quidem qualia purgari oportet purgentur, confert, & leuiter ferunt: Sin minus, vice verſa. Sic & vaſorum vacuatio, ſi quidem talis fuit, qualis fieri debet, confert, & bene ferunt: Sin minus, vice verſa. Inſpicere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conuenit, aut non. **III.** In exercitantibus boni habitus ad ſummum progreſſi periculofſi ſunt, ſi in extremo fuerint. Non enim manere poſſunt in eodem, neque quieſcere. Quum verò non quieſcant, non amplius in melius augeſcere poſſunt. reliquum eſt igitur vt in deterius. Ob has igitur cauſas bonam habitudinem non tardè ſoluere confert, quo corpus rurſum renutritionis principium ſumat. Neque verò collapſiones ad extremum ducere oportet: periculofum enim eſt. Sed qualis natura eſt eius qui perferre debet, ad hoc ducere conuit. Similiter autem & euacuationes ad extremum ducentes periculofæ ſunt. & rurſus renutritiones in extremo exiſtentes, periculofæ ſunt. **IIII.** Tenuēs & exacti victus, & in longis ſemper affectionibus, & in acutis, vbi non expedit, periculofſi ſunt. & rurſus victus ad extremam tenuitatem progreſſi, difficiles ſunt. Et repletiones ad extremum progreſſæ difficiles ſunt. **V.** In tenui victu delinquentes ægrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum quod committi poterit, magis magnum committitur in tenui quàm in paulò pleniore victu. Quapropter etiam in ſanis periculofus eſt valde tenuis, & conſtitutus, ac exactus victus, quoniam delicta grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exactus victus periculofus eſt magis quàm paulò plenior. **VI.** Ad extremos morbos, exactæ extremæ curationes, optimæ ſunt. **VII.** Vbi igitur peracutus eſt morbus, etiam extremos labores habet, & extremè tenuiſſimo victu vbi

A uti necesse est. Vbi non, sed pleniore victu uti licet, intantum subdescendendum est, in quantum morbus extremis mollior fuerit. **VIII.** Quum in vigore fuerit morbus, tunc tenuissimo victu uti necesse est. **IX.** Simul autem coniectare oportet, an aeger ex victu durare possit ad morbi vigorem: & vtrum ille prius deficiet, & ex victu durare non possit: aut morbus prius deficiet ac obtundetur. **X.** Quibus igitur statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est. Quibus vero vigor posterius, his ad illud, & paulo ante illud tempus subtrahendus est. Antea vero mitius aeger victu tractandus est, quo durare possit. **XI.** In exacerbationibus subtrahere victum oportet. Nam apponere noxa est. Ex quibus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus subtrahere oportet. **XII.** Exacerbationes & constitutiones indicabunt morbi, & tempora anni, & circuituum inter se collata incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per amplius temporis intervallum fiant. Sed & ex apparentibus indicia fiunt, velut in pleuriticis, si sputum statim appareat incipiente morbo, ipsum abbreviat. Si vero posterius appareat, producit. & urinæ, & alui egestionem, & sudores apparentes indicant & aegre & facile iudicandos, & breues & longos morbos. **XIII.** Senes facillime ieiunium ferunt. Deinde æstate consistentes. Minimè adolescentes: omnium verò minimè pueri, inter hos ipsos qui ipsi seipsis alacriores fuerint. **XIV.** Qui crescunt, plurimum habent innatum calorem: plurimo igitur opus habent alimento. Sin minus, corpus consumitur. Senibus autem modicus est calor: quapropter paucis fomitibus opus habent, à multis enim extinguuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non similiter acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus.

XV. Ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: Quapropter in his temporibus alimenta plura exhibenda sunt. Nam innatum colorem ampliorem tunc habent, alimento igitur ampliore opus habent. Signum sunt ætates, & athletæ. **XVI.** Victus humidus omnibus febricitantibus conferunt. Maximè verò pueris, & alijs ita ali adfuetis. **XVII.** Et quibus semel aut bis, & plus aut minus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dandum verò etiam aliquid est tempori, & regioni, & ætati, &

consuetudini. xviii. Aestate & autumnno cibos difficil- D
limè ferunt: hyeme facillimè, deinde vere. xix. His qui
in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere:
sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

xx. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mo-
uere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neq; alijs
irritamentis, sed sinere. xxi. Quæ ducere oportet, quò
maximè repunt, eò ducere oportet, per conuenientes locos.

xxii. Concocta medicamentis aggredi oportet, & mo-
uere non cruda, neque in principijs, si non turgeant. Plurima
verò non turgent. xxiii. Quæ prodeunt non multi-
tudo æstimare oportet, sed quandiu prodeant qualia oportet,
& facillè æger ferat. Et vbi opus est, vsque ad animi deli-

quium ducere oportet: & hoc facere, si sufficiat æger. E

xxiiii. In acutis affectionibus rarè etiam in princi-
pijs medicamentis vti oportet: atque hoc facere diligenti
prius æstimatione facta. xxv. Si qualia oportet purga-
ri, purgètur, cõfert & facillè ferūt. Cõtraria verò difficulter.

SECTIO SECVNDA.

IN quo morbo somnus laborem facit, mortale: Si verò
somnus profit, non lethale. ii. Vbi somnus delyriũ
sedat, bonum est. iii. Somnus, vigilia, vtraq; modũ ex-
cedentia, malum. iiii. Non satietas, non fames, neque
aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

v. Lassitudines spõtanæ denũciant morbos. vi. Qui-
cunque aliqua corporis parte dolentes, plerunque dolores
non sentiunt, his mens ægrotat. vii. Quæ multo tem-
pore attenuantur corpora, lentè reficere oportet. Quæ verò
breui, breui. viii. Si ex morbo cibum capiens quis nõ
fiat validus, significat quòd corpus vberiore alimento vtitur.
Si verò cibum non accipiente hoc contingat, nosse oportet
quòd euacuatione opus habet. ix. Corpora quocunque
quis purgare voluerit, fluida facere oportet. x. Non pu-
ra corpora quãto plus nutries, tanto magis lædes. xi. Fa-
cilis est repleti potu, quàm cibo. xii. Quæ relinquin-
tur in morbis post iudicationem, reciduiam faciunt.

xiii. Quibuscunque iudicatio fit, his nox grauis ante
exacerbationem. Quæ verò sequitur plerunque tolerabilior
est. xiiii. In alui fluxionibus, mutationes egestionum
profunt

A profunt, si non ad prauas mutantur. xv. Vbi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, excretiones cōsiderare oportet. Si enim biliosæ fuerint, corpus simul ægrotat. Si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire. xvi. Vbi fames, non oportet laborare. xvii. Vbi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, morbum facit. Ostendit autem sanatio. xviii. Eorum quæ aceruatim & velociter nutriunt, veloces etiam egestionem fiunt. xix.

Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis. xx. Quibus dum iuuenes sunt, ventres humidi sunt, his senescentibus resiccantur. Quibus verò dum iuuenes sunt, ventres siccissimi sunt, his senescentibus humectantur. xxi. Famen vini potus soluit.

xxii. Quicumque morbi ex repletionem fiunt, euacuatio sanat. Et quicumque ex euacuationem, repletio. Et aliorum contrarietas. xxiii. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. xxiiii. Septimæ quarta index est. Alterius hebdomadæ octaua principium est. Consideranda verò est vndecima. Hæc enim quarta est secundæ hebdomadæ. Consideranda rursus decima septima. Ipsa enim est quarta quidem à decima quarta, septima verò ab vndecima. xxv. Aestiuæ quartanæ plerumque sunt breues. Autumnales verò longæ, & maxime quæ ad hyemem pertingunt. xxvi. Febrem in conuulsione fieri melius est, quàm conuulsionem in febre. xxvii. His quæ non secundum rationem leuant, non oportet credere, neque valde timere ea quæ praua sunt præter rationem. Pleraque enim ex talibus inconstantia sunt, & non valde permanere, neque morari solent.

C xxviii. Febricitantium non omnino leuiter, permanere, & nihil minui corpus, aut etiã magis quàm pro ratione colliquari, malum est. Illud enim morbi longitudinem, hoc verò debilitatem significat. xxix. Incipientibus morbis si quid mouendum videtur, moue: vigentibus verò, quietem agere melius est. xxx. Circa principia & fines, omnia debiliora sunt. Circa vigores verò, fortiora. xxxi. Ex ægritudine bene cibum accipienti, nihil augescere corpus, malum est. xxxii. Plerumque omnes malè habentes, ab initio cibum bene capientes, & nihil augescentes, ad finem rursus cibos fastidiunt. At ab initio quidem valde ci-

HIPPOCRATIS LIBER

bum auersantes, postea verò bene cibum capientes, melius D
liberantur. xxxiii. In omni morbo valere mente, & be
ne se habere ad ea quæ exhibentur, bonum. cōtrarium verò,
malum. xxxiiii. In morbis minus periclitantur, quo-
rum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori morbus magis
affinis fuerit, quàm hi quibus non affinis in aliquo horum
existit. xxxv. In omni morbo partes circa vmbilicum
& pectinem, crassitudinē habere melius est. At vehemens te-
nuitas & eliquatio, praua est. Periculosa verò talis est etiam
ad infernas purgationes. xxxvi. Sana habentes corpo-
ra, dum medicamentis purgantur, cito exoluuntur. Itemque
qui prauo cibo vtuntur. xxxvii. Qui bene habent
corpore, eos operosum est medicamentis purgare. E

xxxviii. Paulò deterior & potus & cibus, verum iu-
cundior, melioribus quidem, sed iniucundioribus præferen-
dus est. xxxix. Senes iuuenibus plerunq; minus agrotant.
Quicumque verò ipsis fiunt morbi diuturni, vt plu-
mum commoriuntur. xl. Raucedines & grauedines, in
valde senibus non concoquuntur. xli. Qui exoluuntur
sæpè & fortiter, absque manifesta causa, derepente moriun-
tur. xlii. Syderationem fortem quidem soluere, im-
possibile est: debilem verò, non facile. xliii. Ex his
qui strangulantur, & submerguntur, nondum autem mor-
tui sunt, non reconualescunt quibus spuma circa os fuerit.

xliiii. Crassi admodum secundum naturam, magis
cito moriuntur, quàm graciles. xlv. Iuuenibus comitia-
libus liberationem faciunt mutationes, maximè ætatis, &
regionum, & victuum. xlvi. Duobus doloribus simul
fientibus, non secundum eundem locum, vehementior obscu-
rat alterum. xlvii. Circa generationem puris dolores
& febres magis cōtingunt, quàm factò iam ipso. xlviii.
In corporis motu, quum incœperit dolere, quiescere statim
lassitudinem eximit. xlix. Adsueti consuetos labores
ferre, etiamsi fuerint debiles, aut senes, non adsuetis forti-
bus ac iuuenibus facilius ferunt. l. Ex multò tempore con-
sueta, etiamsi deteriora fuerint, inconsuetis minus molestare
solent. Oportet igitur etiam ad inconsueta transmutatio-
nem facere. li. Multum & repente euacuare, aut replere,
aut calefacere, aut frigefacere, aut omnino quomodocunque
corpus

A corpus mouere, periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod verò paulatim fit, tutum est, tū aliàs, tum si ex altero ad alterum transitus fit. **LII.** Omnia secundū rationem facienti, si non secundum rationem fiant, nō transire oportet ad aliud, mente eo quod visum est ab initio.

LIII. Quicumque ventres humidos habent, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt quàm hi qui siccos habent. Verum ad senectutem deterius degunt. Resiccantur enim plerunque senescentibus. **LIIII.** In corporis magnitudine iuuentutem quidem degere, liberale est, & non indecorum. Senectutem verò degere, inutile, & deterius paruitate.

SECTIO TERTIA.

B Mutationes temporum maximè pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua, iuxta rationem hoc modo. **II.** Naturam aliæ quidem ad ætatem, aliæ verò ad hyemem, bene aut male se habent. **III.** Morborum alij ad alia tempora, bene aut male se habent: & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus. **IIII.** In temporibus quum eadem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. **V.** Austri auditum grauantes, caliginosi, caput grauantes, torpidi, dissoluentes. Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur. Si verò Aquilo fuerit, tussis, fauces, alui duræ, vrinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet. **VI.** Quum æstas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. **VII.** In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si quidem annus ampliùs talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, plerunque tales etiam morbos expectare oportet. **VIII.** In constantibus temporibus, si tempestiuè tempestiua reddantur, morbi constantes & iudicatu facilimi fiunt. In inconstantibus autem inconstantes, & qui difficulter iudicantur. **IX.** In autumno morbi acutissimi, & omnino mortiferi. Ver autem saluberrimū & minimè lethale. **X.** Autumnus tabidis malus. **XI.** De temporibus si quidem hyems sicca & aquilonaris fuerit, Ver autem pluuiosum & australe, necesse est æstate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maximè mulieribus, & viris natura humidioribus. **XII.** Si verò hyems australis, &

HIPPOCRATIS LIBER

pluuiosa, ac clemens fiat, Ver autē siccum & aquilonare, mu- D
 lieres quidem quibus partus ad ver instat, ex omni occasione
 abortiunt. Quæ verò pariunt, impotentes ac morbosos pue-
 ros pariunt, ita vt aut statim pereant, aut tenues ac morboſi
 viuant. Alijs autem dysenterix, & lippitudines sicca fiunt.
 Senioribus verò defluxiones breui perimentes. x 111. Si
 verò æstas sicca fiat & aquilonaris: Autumnus autem pluui-
 osus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tusses, &
 raucedines ac grauedines: quibusdam etiam tabes. x 1111.

Si verò aquilonaris & aquarum exors autumnus fuerit,
 his quidem qui humiditas naturas habent, & mulieribus com-
 modus erit. Reliquis verò fient lippitudines sicca, & febres
 acuta, & grauedines. Quibusdam verò etiam atra biles. E

xv. Ex anni verò constitutionibus, in summa siccitates
 pluuiosis salubriores sunt, & minus lethales. xvi. Morbi
 in pluuiosis quidem plerunque fiunt, febres longa, & alui
 fluxiones, & putredines, & comitiales, & syderationes, & an-
 gina. In siccitatibus verò, tabes, lippitudines, arthritides, v-
 rinæ stillicidia, & dysenterix. xvii. Quotidianæ verò
 constitutiones, aquilonares quidem corpora compingunt, &
 robusta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius au-
 dientia faciunt, & ventres resiccant, & oculos mordent, & si
 circa thoracem aliquis dolor prius est, magis affligunt. Au-
 strales autem corpora dissoluunt, & humectant: & grauem
 auditum, ac capitis grauitatem, & vertigines faciunt. In ocu-
 lis autem & corporibus egrum motum, & ventres humectat.

xviii. Secundum tempora vere quidem & prima æsta- F
 te, pueri, & qui his ætate cohærēt, optimè degunt, & maximè
 sani sunt. Aestate verò & autumnno aliquandiu, senes. Reliquo
 autumnno & hyeme, mediam ætatem habentes.

xix. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus
 fiunt. Quidam tamen magis in quibusdam ipsorum, & fiunt
 & exacerbantur. xx. Vere insanix, & atra biles, & comi-
 tiales, & sanguinis fluxiones, & angina, & grauedines, & rau-
 cedines, & tusses, & lepræ, & impetigines, & vitiligines, &
 pustula: vlcerosa plurimæ, & tubercula, & morbus articula-
 ris. xxi. Aestate verò & quidam ex his, & febres con-
 tinuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vo-
 mitus, & alui profluvia, & lippitudines, & aurium dolores,
 & oris

- A** & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulæ sudorosa. **xxi.** Autumno autem & ex æstiuis multi, & febres quartanae, & erronæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & urinæ stillicidia, & intestinorum leuitates, & dysenteria, & coxendices, & angina, & anhelationes, & voluuli, & comitiales, & insanix, & atra bilis. **xxii.** Hyeme verò pleuritides, peripneumonia, grauedines, raucedines, tussēs, dolores, pectorum, laterum ac lumborum, capitis dolores, vertigines, syderationes. **xxiii.** In ætatibus autem talia contingunt, paruis ac recens natis pueris feruida oris vlcera, vomitus, tussēs, vigilia, tumores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. **xxv.** Ad dentitionem verò accedentibus, gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluua, & maximè vbi dentes caninos producant, tum crassissimis pueris, tum his qui duos ventres habent. **xxvi.** Senioribus autem fientibus, tonsilla, verticuli in occipitio intro, luxationes, anhelationes calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ, tumores glandularum circa aures oblongi satyriasmī appellati, strumæ, & alia tubercula, maximè verò predicta. **xxvii.** adhuc verò senioribus, & ad pubertatem accedentibus, pleraq; ex his, & febres diuturnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones. **xxviii.** Plurimæ verò affectiones pueris iudicantur, partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatem accedentibus. Quæ verò permanserint pueris affectiones, & non exolute fuerint circa pubertatem, aut scemellis circa mēsum eruptiōes, diuturnæ fieri solent. **xxix.** Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, comitiales, & alij morbi, maximè verò prædicti. **xxx.** His verò qui hanc ætatem excesserunt, anhelationes, pleuritides, peripneumonia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alui profluua diuturna, bilis sursum ac deorsum effusiones, dysenteria, intestinorum leuitates, hæmorrhoides. **xxxi.** Senibus autem spirandi difficultates, & defluxiones cum tussi, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articularum dolores, nephritides, vertigines, syderationes, mali habitus, pruritus totius corporis, vigilia, alui, oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucedines, auditus grauitates.

HIPPOCRATIS LIBER

SECTIO QVARTA.

D

P Rægnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & vsque ad septimum. Minus verò has. Iuniores autem & seniores fortius vereri oportet. **II.** In medicamentorum vsu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. **III.** Si qualia oportet purgari, purgentur, confert & facile ferunt. Contrario verò difficulter. **IIII.** Medicamentis purgare oportet æstate quidem superiores magis: hyeme verò inferiores. **V.** Sub eanem, & ante canem, operosæ sunt medicamentorum purgationes. **VI.** Graciles, & facile vomentes, sursum purgare oportet, vitantes hyemen. **VII.** Difficulter vomentes, & moderate carnosos, deorsum, vitantes æstatem. **VIII.** Tabescentes autem, vitantes superiores. **IX.** Atrabiliarios verò plenius inferiore. Eadem ratione contraria apponens.

E

X. Purgare oportet in valde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est. **XI.** Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neq; à medicamento, neq; aliàs soluitur, in hydropē siccum firmatur. **XII.** Quibus alui intestinorum leuitate affecti, eos hyeme sursum purgare malum est. **XIII.** Ad veratrum, his qui non facile sursum purgantur, ante potionem corpora humectare oportet, ampliore cibo ac quiete.

XIIII. Vbi biberit quis veratrum, ad motus quidem corporum magis ducere oportet, ad summos autem & quietem minus. Declarat autem nauigatio, quòd motus corpora turbat. **XV.** Vbi volueris magis ducere veratrū, corpus moueto. Vbi verò sistere, somnum facito, & ne moueto, **XVI.** Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Conuulsionem enim inducit. **XVII.** Sine febre existenti cibi fastidium, & oris ventriculi morsus, & vertigo, & os amarescens, medicamento sursum purgante opus habere significat.

XVIII. Dolores supra septum transversum, qui purgatione opus habent sursum versus purgatione indigere significant: qui verò infra, deorsum. **XIX.** Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur non sitiunt, non cessant priusquam sitierint. **XX.** Non febrientibus si fiat tormentum, & genuum grauitas, & lumborum dolor, deorsum me-

dica

A dicamento purgante opus habere significat. **xxi.** Egestiones alui nigrae, velut sanguis niger, sua sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, pessimae sunt: & quāto plures fuerint peiores colores, tanto magis malū est. Cum medicamēto verò melius, & quāto plures fuerint colores, nō malū est. **xxii.** Quibuscunque morbis incipientibus, si atra bilis, aut sursum aut deorsum prodierit, lethale est. **xxiii.** Quibuscunque ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulnerib⁹, aut aliās attenuatis, atra bilis, siue qualis sanguis niger subierit, post tri die moriuntur. **xxiiii.** Dysenteria si ab atra bile inceperit, lethalis est. **xxv.** Sanguis sursum quidem qualiscunque fuerit, malus est. deorsum verò bona sunt nigra subeuntia.

B **xxvi.** Si à dysenteria occupato, veluti carnes subierint, lethale est. **xxvii.** Quibus in febribus sanguinis multitudo erumpit vndecunque, his in refectionibus alui humectatur.

xxviii. Quibus biliosae sunt egestiones, surditate fiente cessant. Et quibus surditas, biliosis egestionibus fientibus cessat. **xxix.** Quibus in febribus sexta die rigores fiunt, difficulter iudicant. **xxx.** Quibus exacerbationes fiunt, quacunque tādē hora febris dimiserit, si post tri die eadem quā antea hora corripuerit, difficulter iudicant. **xxxi.** Delassatis in febrib⁹ ad articulos, & circa maxillas maximē, abscessus fiunt. **xxxii.** Quibuscunque resurgentibus ex morbis, si quid doluerit, isthic abscessus fiunt. **xxxiii.**

Sed & ante morbum quid doluerit, isthic morbus incumbit. **xxxiiii.** Si à febre occupato, tumore non existente in faucibus, suffocatio derepente contingat, lethale est.

xxxv. Si à febre occupato collum repente obuersum fuerit, & vix deglutire poterit, tumore non existente, lethale est. **xxxvi.** Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & vndecima, & decimaquarta, & decima septima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos iudicant. Qui verò non sic fiunt, dolorē significāt, & longitudinem morbi, & recidivas. **xxxvii.**

Frigidi sudores cum acuta quidem febre fientes, mortem significant: cum mitiore verò, morbi longitudinem. **xxxviii.** Et vbi in corpore sudor est, illic morbum esse declarat. **xxxix.** Et vbi in corpore frigiditas aut calliditas, isthic

HIPPOCRATIS LIBER

morbus est. XL. Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. XLI. Sudor multus ex somno, citra manifestam causam fiens, corpus multo alimento uti significat. Si verò cibum non capienti hoc fiat, significat quòd euacuatione opus habet. XLII. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens: frigidus maiorem calidus minorem morbum significat. XLIII. Febres quæcunque non intermittentes per tertiam fortiores fiunt, magis periculosa sunt. Quocunque verò modo intermiserint, quòd sine periculo sint significant. XLIV. Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. XLV. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis fiunt, hi pluribus cibis utuntur. XLVI. Si rigor incidat febre non intermittente ægroto iam debili, lethale est. XLVII. Excreationes in febribus non intermittētibz, liuidæ, & cruentæ, & graueolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probè secedētes, bonæ, & per alui egestionem, & per urinas. Si verò nō aliquid ex conducentibus excernatur per hos locos, malū est.

XLVIII. In non intermittētibz febribus, si externæ quidem partes frigide fuerint, internæ verò ardeant, ac sitim habeant, lethale est. XLIX. In febre non intermittēte, si labium aut palpebra, aut superciliū, aut oculus, aut nasus distorqueatur: aut non videat, aut non audiat, æger iam debilis existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. L. Vbi in febre non intermittēte difficultas spirandi, & delirium fit lethale est. LI. In febribus abscessus qui non solvuntur ad primas iudicationes, longitudinem morbi significant.

LII. Quicunque febribus, aut alijs ægritudinibus, ex voluntate lachrymatur, nihil absurdū est. Qui verò nō ex voluntate, absurdum. LIII. Quibus circa dentes in febribus viscosa adherent, his fortiores febres fiunt. LIV. Quibus plerunque tussis sicca, parum irritantes, in febribus ardentibus, hi non ita valde siticulosi sunt. LV. Ex glandularum tumoribus febres omnes malæ sunt, exceptis diarijs. LVI. Febricitanti sudor oboriens febre non remittēte, malum. Morā enim trahit morbus, & multam humiditatem significat.

LVII. A convulsione, aut distentione nervorum vexato, febris accedens morbum solvit. LVIII. A febre ardente occupato,

A occupato, rigore accedente, solutio fit. **LIX.** Tertianæ exacta in septem circuitibus ad summum iudicatur. **LX.**

Quibus in febribus aures obsurduerunt, his sanguis è naribus effusus, aut alius exturbata, morbum soluit. **LXI.**

Febrientem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidiuare solet. **LXII.** Quibus in febribus morbus regius sit ante septimum diem, malum. **LXIII.** Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

LXIII. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decimaquarta accedit, bonum, si non præcordium dextrum durum fiat: sin minus, non bonum.

LXV. In febribus circa ventrem æstus vehemens, & cordis siue oris ventriculi morsus, malum. **LXVI.** In febribus

B acutis conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.

LXVII. In febribus, ex somnis, timores aut conuulsiones, malum. **LXVIII.** In febribus spiritus offendens, malum. Conuulsionem enim significat. **LXIX.** Quibus vrinæ crassæ, grumosæ, paucae, non sine febribus, vbi copia ex

quis successit, tenuis prodest. Tales autem maximè prodeunt his quibus ab initio, aut breui subsidentiam habent. **LXX.**

Quibus in febribus vrinæ conturbatae, velut iumentis, his capitis dolores, aut adsunt, aut aderunt. **LXXI.** Quibus

septima dies morbi iudicantur, his nubeculam habet vrina, quarta die rubram, & alia secundum rationem. **LXXII.**

C Quibus vrinæ pellucidæ, albæ, malæ. Maximè autem in phreniticis comparent. **LXXIII.** Quibus præcordia eleuata, permurmurantia, lumborum dolore accedente, his alui

humectantur, si non flatus erumpant, aut vrinæ copia prodeat. In febribus autem hæc. **LXXIII.** Quibus spes est

abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu vrina multa, & crassa, & alba prodiēs, qualis in febribus laboriosis

quarta die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. **LXXV.** Si

quis sanguinem aut pus mingat, rhenum aut vesicæ vlcerationem significat. **LXXVI.** Quibus in vrina crassa existen-

te, carunculæ paruæ, aut veluti pili simul exeunt, his de renibus excernuntur. **LXXVII.** Quibus in vrina crassa ex-

istente, furfuracea quædam simul minguntur, his vesica scabie affecta est. **LXXVIII.** Qui sua sponte sanguinè mingunt,

his

HIPPOCRATIS LIBER

his in rheinibus venæ ruptionem significat. **LXXIX.** Qui- **D**
bus in vrina, arenosa subsidunt, his vesica calculo laborat.

LXXX. Si quis sanguinem mingat, & grumos, & vrinę stil-
licidium habeat, & dolor incidat in imum ventrem, & ani ac-
scorti intercapedinem, partes circa vesicam affectę sunt.

LXXXI. Si quis sanguinem & pus mingat, & squamas,
& odor grauis sit: vesicę exulcerationem significat.

LXXXII. Quibus in vrinaria fistula tuberculum nascitur
his suppuratione facta & eruptione, solutio fit. **LXXXIII.**
Mictio noctu multa fiens, medicę alui egestionē significat.

S E C T I O Q V I N T A.

I. **C**onuulsio ex veratro lethalis est **II.** Ex vulnere
conuulsio lethalis est. **III.** Sanguine multo effuso **E**
conuulsio aut singultus accedens, malum.

IIII. Ex superflua purgatione, conuulsio aut singultus
accedens, malum. **V.** Si quis ebrius repente voce pri-
uetur, conuulsus moritur, si non febris corripuerit, aut vbi
ad horam qua crapulę soluantur peruenit, loquatur.

VI. Quicunq; à distentione antrorsum ac retrorsum cor-
ripiuntur, in quatuor diebus pereunt. Si verò has effugerint,
sani fiunt. **VII.** Quibuscunq; morbi comitiales ante pu-
bertatem fiunt, transmutationē habent. Quibuscunq; verò
vigintiquinque annos natis fiunt, his plerunq; cōmoriuntur.

VIII. Quicunque pleuritici fientes, in quatuordecim
diebus non repurgantur, his ad suppurationem transitio fit.

IX. Tabes maximè fit ætatibus, ab anno decimo octauo,
vsque ad trigessimum quintum. **X.** Quicunque anginam
effugiunt, his ad pulmonem vertitur, & in septem diebus
moriuntur. Si verò has effugerint, suppurati fiunt.

XI. Qui tabe infestantur, si sputum quodcunq; tussien-
do reiecerint, grauē olet, dum prunis iniicitur, & capilli de
capite defluunt, lethale est. **XII.** Quibuscunq; tabe la-
boratibus capilli de capite defluerint, hi alui profluuium ac-
cedente moriuntur. **XIII.** Quicunque sanguinem spu-
mosum spuunt, his ex pulmone eductio fit. **XIIII.** A ta-
be occupato, alui profluuium accedens, lethale est.

XV. Quicunq; ex pleuritide suppurati fiunt, si in quadra-
ginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fue-
rit, liberantur. Si verò nō, ad tabem transeunt. **XVI.** Cali-
da freq

Ada frequenter ea vtenibus, has noxas inducit, carniū effœ-
minationem, neruorum inpotētiam, mentis torporem, san-
guinis eruptiones, animi deliquia. Hæc quibus mors. xvii.

Frigida verò cōuulsiones, antrorsum ac retrorsum disten-
tiones, nigrores, rigores febriles. xviii. Frigida inimi-
ca ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ. Calida
verò grata. xix. Quæcunque perfrigerata sunt, excale-
facere oportet, præterquàm à quibus sanguis erumpit, aut
erupturus est. xx. Vlceribus frigida mordax, cutem obdu-
rat, dolorem nō suppurantem facit, nigrefacit, rigores febr-
les inducit, conuulsiones, distentiones. xxi. Quandoque
verò in distentione sine vlcere, iuueni carnosō, ætate media,
B frigidæ multæ affusio, caloris reuocationem facit. Calor au-
tem hæc soluit. xxii. Calida suppuratoria est, non in o-
mni vlcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit,
attenuat, dolores eximit, rigores, conuulsiones, distentiones
mitigat, capitis grauitatem soluit. Plurimum autem confert
ad ossium fracturas, maximè denudatas. Ex his autem maxi-
mè his qui in capite vlcera habent, & his quæ à frigiditatē
moriuntur, aut vlcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi,
pudendo, vtero, vesicæ. His calida grata est & iudicās. Frigi-
da verò inimica & occidens. xxiii. In his frigida vti
oportet vnde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super
ipsas partes, sed circa ipsas vnde fluit. Et quæcunq; inflamma-
tiones, aut flammei ardores, ad ruborem & suberuentum co-
Clorem ex nouo sanguine tendunt, ad eas ipsas. nam veteres
nigrefacit, & ad sacrū ignem non exulceratum: nam exulce-
ratum lædit. xxiiii. Frigida velut nix, glacies, pectori
inimica sunt, tussis mouent, & sanguinis eruptiones, ac de-
fluxiones inducunt. xxv. Tumores in articulis, & dolo-
res absque vlcere, & podagricas affectiones, & conuulsiones:
Horū plurima frigida multa affusa leuat, & attenuat, & do-
lorem soluit. Torpor enim dolorem soluit. xxvi. Aqua
quæ cito calescit, & cito perfrigeratur, leuissima est. xxvii.
Quibus bibendi appetētiæ noctu valde sitientibus, si ob-
dormierint bonum est. xxviii. Menses ducit aroma-
tum suffitus. Multis autem modis etiā ad alia commodus ef-
fet, si nō capitis grauitatem induceret. xxix. Prægnan-
tes medicamentis purgare oportet, si turgent humor quarto
mense,

HIPPOCRATIS LIBER

menſe, & uſque ad ſeptimum. Minus uerò has. Iuniores uerò **D**
& ſeniores fortius uereri oportet. xxx. Mulierem uterum
gerentem ab aliquo acuto morbo corripi, lethale eſt. xxxi.

Mulier uterum gerens ſecta uena abortit, & magis ſi ma-
ior fuerit fœtus. xxxii. Mulieri ſanguinem uomenti,
menſibus erumpentibus ſolutio ſit. xxxiii. Mulieri men-
ſibus deficientibus, ſanguinem ex naribus fluere, bonum eſt.

xxxiiii. Mulieri uterum geſtanti ſi alius multum flu-
xerit, periculum eſt ut abortiat. xxxv. Mulieri quæ ab
uteri ſtrangulationibus vexatur, aut difficulter parit, ſternu-
tatio accedens, bonum. xxxvi. Mulieri menſes deco-
lores, & non eodem tempore ſemper ſientes, purgatione
opus eſſe ſignificant. xxxvii. Mulieri uterum geſtanti, **E**
ſi mammae repente graciles ſiant, abortit. xxxviii. Mu-
lieri uterum geſtanti, ſi altera mamma gracilis ſiat, gemellos
geſtans alterum abortit. Et ſi quidem dextera gracilis ſiat, ma-
ſculum: ſi uerò ſiniſtra, fœmellam. xxxix. Si mulier quæ
neque prægnans eſt, neque peperit, lac habet: menſes ipſius
deſecerunt. xl. Mulieribus quibuſcunq; ad mammæ ſan-
guis colligitur, inſaniam ſignificat. xli. Mulierem ſi ve-
lis cognoscere, an prægnans ſit, ubi dormire uolet, aquam mul-
ſam bibendam dato. Et ſi quidē tormen habuerit circa ven-
trem, prægnans eſt. Si uerò non, prægnans non eſt. xlii.

Mulier prægnans ſi quidem maſculum geſtat, bene colora-
ta eſt. Si uerò fœmellam, malè colorata. xliiii. Si mulie-
ri prægnanti ignis ſacer in utero ſiat, lethale eſt. xliiii. **F**

Quæcunq; præter naturam tenues exiſtentes, uterum ge-
ſtant, abortiunt priuſquàm craſſeſcant. xlv. Quæcunq;
uerò moderatè corpus habentes, abortiunt bi-meſtres & tri-
meſtres, ſine cauſa manifeſta, hiſ uteri acerbula muco plena
ſunt, & non poſſunt fœtum continere præ grauitate, ſed ab-
rumpitur. xlii. Quæcunq; præter naturam craſſæ exiſten-
tes, non concipiunt in utero, hiſ omentum oſculum uteri com-
primunt, & priuſquàm attenuentur, non concipiunt. xlvii.

Si uterus in coxam incumbens, ſuppuratus fuerit, neceſſe
eſt curationem ex medicamentis, per linamenta ipſi adhibe-
re. xlviii. Fœtus maſculi quidem in dextris, fœminæ
uerò in ſiniſtris magis. xlix. Ut ſecundæ excidant, ſter-
nutatorio indito, nares & os apprehendito. l. Mulieri
menſes

- A** menses si cohibere voles, cucurbitam quàm maximã ad mamas appone. **L I.** Quæcunq; vterum gestant, his osculum vterorum clausum est. **L II.** Mulieri vterum gestanti si multum lac ex mammis fluat, debile fœtum significat. Si verò solidæ fuerint mammæ, saniozem fœtum significat.
- L III.** Quæ corrupturæ sunt fœtus, his mammæ graciles fiunt. Si verò rursus duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt.
- L IIII.** Quibus os vterorum durum est, his necesse est osculum vterorum clausum esse. **L V.** Quæcunq; in vtero habentes, à febribus corripuntur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariūt & periculose, aut abortum faciētes periclitantur. **L VI.** In fluxu muliebri, cōuulsio & animi deliquium si accedat, malum est. **L VII.** Mensibus pluribus prodeūtibz morbi fiunt, & nō prodeuntibus, ab vtero morbi contingunt. **L VIII.** Ex intestino recto, & vtero inflammato, vrinæ stillicidium accedit, & ex rhenibus suppuratis vrinæ stillicidiū accedit. Verūm ex hepate inflammato, singultus accedit. **L IX.** Si mulier in vētre non concipit, velis autem scire an cōceptura sit, vestimentis circumtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus tibi procedere videatur ad nares & ad os, scito quod ipsa non propter seipsam infœcunda est. **L X.** Si mulieri vterum gestati purgationes prodeunt, impossibile est fœtū sanum esse. **L XI.** Si mulieri purgationes non prodeunt, neq; horrore, neque febre accedente: verūm cibi fastidia ipsi accidunt, hanc in ventre habere existimato. **L XII.** Quæcunq; frigidos ac densos vteros habent, non concipiunt: & quæcunque humidos habent vteros, non concipiunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæcunque siccos magis & adustos. Præ inopia enim alimenti corrumpitur semen. Quæcunque verò ex vtrisque temperamentum habeat moderatum, tales fœcundæ fiunt. **L XIII.** Similiter autem in masculis. Aut enim propter corporis raritatē, spiritus extra fertur, vt semen non deducat: aut propter densitatē, humor non procedit foras: aut propter frigiditatem non concalefcit, vt ad hunc locū cōgregetur: aut propter caliditatem, hoc idem contingit. **L XIV.** Lac dare caput dolentibus, malū. Malum etiam febricitantibus, & quibus præcordia eleuata per-

murmur

HIPPOCRATIS LIBER

murmurantiæ, & sticulis. Malum & quibus biliosæ alui egestiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multæ egestio facta est. Conuenit autem exhibere tabescentibus, non valde multum febricitantibus, & in febribus longis, debilibus, nullo ex prædictis signis præsentē, sed præter rationē consumptis. **LXV.** Quibus tumores in vlceribus apparent, non valde conuelluntur, neque insaniunt. His autem de repente dissipatis, retrorsum quidem conuulsiones & distensiones fiunt: antrosum verò, insanix, lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi magis fuerint tumores. **LXVI.** Si in vlceribus fortibus ac prauis, tumor non appareat, magnum malum. **LXVII.** Tumores laxi boni, crudi mali. **LXVIII.** Dolenti posteriorem capitis partem, vena recta in fronte secta prodest. **LXIX.** Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput. Verum & viris magis posteriore corporis parte quam anteriore, velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cutis rara est. Indicat autem pilus. **LXX.** Qui à quartanis corripuntur, non ita valde à conuulsionibus corripuntur. Si verò prius corripiantur, & quartana insuper accedat, cessant. **LXXI.** Quibus cutis circumtenditur arida ac dura, hi sine sudore moriuntur. Quibus verò laxa ac rara, cum sudore moriuntur. **LXXII.** Morbo regio laborantes, non ita valde flatuosi sunt.

SECTIO SEXTA.

- I** **N** diuturnis intestinorum leuitatibus, ructus acidus accedens, qui prius non erat, signum bonum. **II.** Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, morbosius sani sunt: quibus verò vice versa, salubrius. **III.** In longis intestinorum leuitatibus, cibi fastidium malum, & cum febre peius. **IIII.** Vlcera circumglabra maligna sunt. **V.** Dolores in lateribus, & in pectoribus, & in alijs partibus, an multum differunt, considerandum est. **VI.** Rheum affectiones, & quæ circa vesicam consistunt, operose sanantur in senibus. **VII.** Dolores circa ventrem fientes, sublimes quidem leues sunt, non autem sublimes, fortiores. **VIII.** Hydropicis fientia vlcera in corpore, non facile sanantur. **IX.** Latæ pustulæ non valde pruriginosæ sunt. **X.** Caput dolenti & circumdolenti, pus, aut aqua, aut sanguis fluens per

A per nares, aut os, aut aures, soluit morbum. **x i.** Atrabilia-
rijs, & Phreniticis, hæmorrhoides accedentes, bonū. **x i i.**
Hæmorrhidas sananti diurnas, si non vna seruata fuerit,
periculum est hydropē aut tabem accedere. **x i i i.** A sin-
gultu detento, sternutationes accedentes soluunt singultum.

x i i i i. Ab hydropē detēto, vbi aqua in venis ad vētrem
confluit, solutio fit. **x v.** A profluuiio alui longo correpto,
vomitus sponte accedens, soluit alui profluuium. **x v i.** A

pleuritide aut peripneumonia occupato, alui profluuium ac-
cedens, malum. **x v i i.** Lippientem alui profluuiio corripi,
bonum. **x v i i i.** Vesicam dissectam habenti, aut cere-

Bbrum, aut cor, aut septum trāsuersum, aut tenue aliquod in-
testinū, aut ventriculū, aut hepar, lethale est. **x i x.** Vbi
dissectum fuerit os, aut cartilago, aut neruus, aut genæ pars
tenuis, aut praputium, neque augetur, neque coalescit.

x x. Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturā,
necesse est suppurari. **x x i.** In insaniētibus, varicibus aut
hæmorrhoidibus accedentibus, insanix solutio fit. **x x i i.**
Quicumque dolores ex dorso ad cubitos descendunt, venæ
sectio soluit. **x x i i i.** Si timor & tristitia multo tempore
perseueret, atrabiliarium hoc signum est. **x x i i i i.** Si ex
intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

x x v. Item sacrum ab externis intrò conuerti, non bo-
num: ab internis verò extra, bonum. **x x v i.** Quibus in fe-

C bribus ardentibus tremores facti fuerint, mentis emotio sol-
uit. **x x v i i.** Quicumq; suppurati aut hydropici, secantur,
aut vruntur, hi purè aut aqua acervata effluente omnino mo-
riuntur. **x x v i i i.** Eunuchi non laborant podagra, neq;
calui fiunt. **x x i x.** Mulier non laborat podagra, si nō mē-

ses ipsi defecerint. **x x x.** Puer non laborat podagra, ante
veneris vsum. **x x x i.** Oculorum dolores meri potus, aut
balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamenti

potio soluit. **x x x i i.** Balbi ab alui profluuiio lōgo maxi-
mè corripuntur. **x x x i i i.** Acidum ructū habētes, nō ita
valde pleuritici fiunt. **x x x i i i i.** Quicumq; calui sunt, his

varices magnæ nō fiunt. Quibuscunq; verò caluis varices ac-
cedūt, hi rursus hirsuti sunt. **x x x v.** Hydropicis tussis ac-
cedens, malum. **x x x v i.** Vrinæ difficultatē soluit venæ
sectio. Secare verò oportet internas. **x x x v i i.** Ab angina

HIPPOCRATIS LIBER

detento tumorem fieri foris in collo, bonū est. xxxviii. **D**
 Quibuscunq; occulti cancri fiunt, eos nō curare melius est.
 Si enim curantur, citius moriuntur. Si verò nō curentur, mul-
 tum tempus perdurant. xxxix. Conuulsio fit aut à re-
 plerione, aut euacuatione. Sic autē & singultus. xl. Qui-
 buscunque citra præcordium dolores fiunt, absq; inflamma-
 tione, his febris accedens dolorem soluit. xli. Quibuf-
 cunq; suppuratum quid in corpore existens, significationem
 de se non præbet, his propter puris aut loci crassitudinem,
 sui significationem non exhibet. xlii. Morbo regio la-
 borantibus hepar durum fieri malum est. xliii. Qui-
 cunque splenici à dysenteria corripitiuntur, his longa accedēte
 dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorum leuitas, & **E**
 pereunt. xliiii. Quibuscunq; ex vrinæ stillicidio vol-
 uulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre acce-
 dente vrina satis fluxerit. xlv. Vlcera quæcunq; annua
 fiunt, aut diutiore tempore durant, necesse est os abscedere,
 & cicatrices cauas fieri. xlii. Quicunq; gibbosi ex an-
 helatione, aut tussi fiunt, ante pubertatē pereunt. xlvii.
 Quibuscunq; venæ sectio, aut medicamentum conducit, his
 verē venam secare, aut medicamentum purgans exhibere
 conuenit. xlviii. Splenicis dysenteria accedens, bo-
 num. xlix. Quicunq; podagrici morbi fiunt, hi sedata
 inflammatione, in quadraginta diebus restituntur. l.
 Quibus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est febrem,
 & bilis vomitum accedere. li. Quibuscunque sanis de- **F**
 repente dolores fiunt in capite, & statim voce intercepta ia-
 cent, ac stertunt, in septē diebus pereunt, si non febris appre-
 hendat. lii. Considerare verò oportet etiam sub oculis
 apparitiones in somnis. Si enim albæ partis quid subappa-
 ruerit, non commissis palpebris, si id non ex alui profluuiio,
 aut medicamenti potione fuerit, malum signum & valde le-
 thale est. liii. Desipiētē cum risu quidem fientes, secu-
 riores sunt: cum studio verò serio, periculosiores. liiii.
 In acutis affectionibus, quæ cū febre fiunt, luctuosæ respira-
 tiones, malum. lv. Podagricæ affectiones vere & autū-
 no vt plurimum mouentur. lvi. Atrabiliaris morbis
 periculosi humorū à loco ad locum decubitus, aut syderatio-
 nem corporis, aut conuulsionem, aut insaniam, aut cæcira-
 tem si

*non syderatio
 sed plexus intelligit*

Atem significant. LVII. Syderationes verò maximè fiunt, ætate à quadragesimo anno vsq; ad sexagesimum. LVIII.

Si omentum exciderit, necesse est putrefieri. LIX. Quibuscunq; à coxendicum morbo vexatis, coxa excidit, & rursus incidit, his mucii accedunt. LX. Quibuscunque à coxendicum morbo diuturno vexatis, coxa excidit, his crusta bescit, & claudicant, si non vsi fuerint.

SECTIO SEPTIMA.

In acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. II. Ex osse ægrotante, caro liuida, malum. III. Ex vomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. IIII. Ex sudore horror, non bonum. V. Ex infania, dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. VI. In morbo diuturno cibi fastidiū, & meracæ alui egestionis, malum. VII. Ex multo potu rigor, & delyrium, malum. VIII. Extuberculi intus ruptione, exolutio, vomitus, & animi deliquiū fit. IX. Ex sanguinis fluxu delyrium, aut etiam conuulsiō, malum. X. Ex voluulo vomitus, aut singultus, aut conuulsiō, aut delyrium, malum. XI. Ex pleuritide peripneumonia, malum. XII. Ex peripneumonia phrenitis, malum. XIII. Ex ardoribus vehemētib; conuulsiō, aut distentio, malum. XIIII. Ex plaga in caput, stupor, aut delyriū, malum. XV. Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum. XVI. Ex puris sputo, tabes, & fluxus, malum. Postquā verò sputum supprimitur, moriuntur. XVII. Ex hepatis inflammatione singultus, malum. XVIII. Ex vigilia cōuulsiō, aut delyriū, malum. XIX. Ex ossis denudatione, ignis facer. XX. Ex igne sacro, putrefactio, aut suppuratio. XXI. Ex forti pulsū in vlceribus, sanguinis eruptio. XXII. Ex dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio. XXIII. Ex meraca alui egestionē, dysenteria. XXIIII. Ex ossis dissectione delyrium, si ad vacuum vsque processerit. XXV. Ex medicamenti potione conuulsiō, lethale. XXVI. Ex dolore forti partiū circa ventrem, frigiditas extremarum partium, malum. XXVII. Mulieri vterum gerenti, tenesmus accedens abortire facit. XXVIII. Quodcunque os præsectum fuerit, aut neruus in corpore, neque augetur, neque coalescit. XXIX. Si à pituita alba

HIPPOCRATIS LIBER

detento, vehemens alui profluuium accedat, soluit morbum. **D**

xxx. Quibuscunq; spumosa alui egestionem sunt in alui profluuijs, his de capite pituita defluit. **xxxi.** Quibuscunq; febricitantibus, in vrinis subsidentiæ crassiores potentæ partes referentes sunt, longum morbum significant.

xxxii. Quibus verò biliosa subsidentiæ, ab initio tenues, acutum morbum significant. **xxxiii.** Quibuscunq; disparatæ vrinæ sunt, his vehemens turbatio in corpore est. **xxxiiii.** Quibus in vrinis bullæ superstant, rhenû affectiones significant, & morbum fore longum. **xxv.**

Quibus pingue est id quod superstat, & aceruatum, his rhenum affectiones, easq; acutas significat. **xxvi.** Quibus verò iam nephriticis ex rhenibus affectis prædicta signa **E** accidunt, doloresq; circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta. Si verò dolores magis circa internos locos fiant, etiam abscessus magis intus fore expecta. **xxvii.** Quicunq; sanguinem vomunt, sine febre quidem, salutare est: verum cum febre, malum. Perfrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. **xxviii.** Defluxiones in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur. **xxix.**

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & vrinæ stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scorti intercapedinem, & imum ventrem ac pectinem, partes circa vesicam ægrotare significat. **xl.** Si lingua derepente impotens fiat, aut aliqua corporis pars syderata, atrabiliarium tale existit. **xli.** Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. **xlii.** Si febris non à bile habeat, aqua multa calida in caput affusa, febris solutio fit. **xliii.**

Mulier ambidextra non est. **xliiii.** Quicunq; suppurati vruntur, si quidem pus purum fluat & album, euadunt. Si verò subcruentum, & carnosum, ac graueolens, pereunt. **xl v.** Quicunq; hepar suppuratum vruntur, si quidem pus purum fluat, & album, superstites euadunt. In tunica enim pus his inest. Si verò velut amurca fluat, pereunt. **xlvi.** In doloribus oculorum, vbi merum bibendum dedisti, & multa calida lauisti, venam secato. **xlvii.**

Hydropicum si tussis vexet, desperatus est. **xlviii.**

Vrinæ stillicidium, & vrinæ difficultatem, vini potus & **venæ**

A venæ sectio soluit. Secare verò oportet internas.

L I X. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore accedens, bonū. Foras enim vertitur morbus. **L.** Quibuscunque corruptum fuerit cerebrum, in tribus diebus pereunt. Si verò has effugerint, sani fiunt. **L I.** Sternutatio fit ex capite, percalescente cerebro, aut vacuo quod est in capite perhumescente. Aër enim qui intus est, foras erumpit. Strepitum verò edit, quia transitus est ipsi per angustum.

L I I. Quibuscunque hepar circumcirca dolet, his febris accedens soluit dolorem. **L I I I.** Quibuscunque sanguinem de venis auferre conducit, his verè venam secare conuenit.

L I I I I. Quibus inter ventrè & septum transversum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, nō habens exitum ad neutrum ventrem, his per venas ad vesicam conuersa pituita, morbi solutio fit. **L V.** Quibus hepar aqua repletum, ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, & moriuntur.

L V I. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum æquali mensura aquæ ammixta potum soluit.

L V I I. Quibus in vrinaria fistula tubercula fiunt, his supuratione facta & eruptione, soluitur dolor. **L V I I I.** Quibus cerebrū concussum fuerit ex aliqua causa, eos statim voce priuari necesse est. **L I X.** Corporibus humiditas carnes habentibus, famem inducere oportet. fames enim corpora ficcet.

L X. Vbi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calefcit, aut color alius ex alio mutatur, longitudinem morbi significat. **L X I.** Sudor multus calidus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat, forti quidem supernè, debili verò, infernè.

L X I I. Febres non intermittentes, si per tertiam fortiores fiant, periculosæ sunt. Quocunque verò modo intermiserint, sine periculo esse significat. **L X I I I.** Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

L X I I I I. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus vtuntur.

L X V. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem robur, ægroto verò morbus est.

L X V I. Quæ per vesicā prodeūt inspicere oportet, an qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè similia his sunt ea morbosiora sūt. Quæ verò similia sanis, ea minimè morbosa.

HIPPOCRATIS LIBER APHORIS.

LXVII. Et quibus alui egestionibus, si stare permiseris, & **D**
non moueris, substituntur veluti ramenta: si paucae fuerint, mo-
dicus morbus est: si multae, multus. His confert subpurgare
aluum. Si verò non purgata aluo, sorbitiones dederis, laedes. &
quanto plures dederis, magis laedes. **LXVIII.** Quibuscū-
que cruda deorsum secedunt, ex atra bile sunt: si plura copio-
siore: si pauciora pauciore. **LXIX.** Excreationes in fe-
bribus non intermittentibus liuidae, & cruentae, & graueo-
lentes, & biliosae, omnes malae sunt. At probe secedentes, bo-
nae, & per aluum, & per vesicam. & ubi sanè quid secedens
constiterit non purgatum, malum. **LXX.** Corpora quo-
cunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet. Et si qui-
dem sursum, sistere aluum. Si verò deorsum, humectare. **E**

LXXI. Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, morbus.

LXXII. In non intermittentibus febribus, si externae
quidem partes frigidae fuerint, internae verò ardeant, & fe-
bris habeat, lethale est. **LXXIII.** In febre non intermit-
tente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distor-
queatur: aut non videat, aut non audiat, æger iam debilis
existens: quicquid horum fiat, propinqua mors est.

LXXIII. Ex pituita alba, hydrops accedit. **LXXV.**
Ab alui profluuiio, dysenteria, **LXXVI.** A dysenteria, in-
testinorum leuitas accedit. **LXXVII.** Ex corruptione, ab-
scessus ossis. **LXXVIII.** Ex sanguinis vomitu, tabes, &
puris purgatio sursum. Ex tabe, fluxus ex capite. Ex fluxu, al-
ui profluuium. ex alui profluuiio, suppressio purgationis sursum **F**
versus. ex suppressione, mors. **LXXIX.** Qualia etiā sint in
vesicæ ac alui egestionibus, inspicere oportet, & in his quæ
per carnes excernuntur, & sicubi alibi à natura recedat cor-
pus, si parum, paruius est morbus: si multum, multus: Si verò val-
de multus si recessus, lethale hoc est. **LXXX.** Quicumque
supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita valde sani
fiunt. Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætati, mor-
bus affinis fuerit. **LXXXI.** Quibuscunque in ægritudini-
bus oculi ex voluntate lachrymantur, bonum. Quibus verò
citra voluntatem, malum. **LXXXII.** Quibus in febribus
quartanis sanguis ex naribus fluxerit, malum est. **LXXX-
III.** Sudores in diebus iudicatorijs fientes, vehementes
& veloces periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte velut
guttae, &

A guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde ac multi. Necessè est enim talem sudorem prodire cum violentia, & doloris excessu, ac exprestione diuturna. LXXXIII. Ex morbo diuturno, etiam alui defluxus, malum. LXXXV. Quæcunque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ ignis non sanat, ea incurabilia putare oportet.

HIPPOCRATIS COI EPISTOLAE,

B IANUS CORNARIO MEDICUS
DICO PHYSICO INTERPRETE.

Rex regum magnus Artaxerxes, Peto gaudium.



C Orbus pestilens appellatus, inuasit exercitus nostros: & quum nos sæpe multa fecerimus, nihil adhuc remissit. Quare magnopere, & per omnia tibi à me data dona, te rogo, ut aut aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte actionem, aut aliquod alterius viri mederi potentis consilium, celerrimè ad nos mittas. Propulsa oro hoc malum. Multa enim anxietas populum corripuit, quæ spiritum magnum ad densum habet. Non beligerantes debellamur: quum hostem habeamus bestiam illam ouilia deuastantem. Sauciauit multos: ægrè curabiles fecit: amara spicula immittit. Cōsiliij inops sum. Non amplius habeo quod cum viris natura prudentibus consultem, Solue hac omnia, neque nos bono tuo consilio destituas. Vale.

Petus, Regi regum magno Artaxerxe gaudium.

Naturalia auxilia pestilentis morbi popularem grassationem non soluant. Qui enim ex natura fiunt mor-

HIPPOCRATIS

Hippocratis laus

bi: eos ipsa natura iudicans sanat. Qui verò ex populari gra- **D**
 fatione: eos ars curat, artificiose iudicans corporum mutatio-
 nem. Hippocrates autem medicus curat hoc malum. Et ge-
 nere quidem est Dorienſis: ex ciuitate verò Co, patre Hera-
 clida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnoſidici, qui Nebri,
 qui Soltrati, qui Theodori, qui Cleomittada, qui Chriſami-
 dis. Hic diuina natura præditus eſt, & ex paruis ac vulgarib.
 ac magna ac artiſicioſa, medicinā euexit. Eſt igitur diuinus
 Hippocrates nonus quidem à Criſamide rege: decimus autē
 & octauus ab Aefculapio: vigefimus verò à Ioue: ex matre
 verò Praxithea Phæzaretes filia, ex familia Heraclidarum.
 Quare ex utroque ſemine à dijs ortum habet diuinus Hip-
 pocrates: ut qui à patre quidem Aſclepiades eſt, à matre verò **E**
 Heraclides. Didicit autē artem, tum à patre Heraclida, tum
 ab auo Hippocrate. Verū ab his quidem primū, velut ve-
 riſimile eſt, in re medica initiatus eſt, quantum ſanè credibi-
 le eſt hos nouiſſe. Vniuerſam vero artē ipſe ſeipſum docuit,
 diuina natura uſus, & in tantum animi induſtria progenito-
 res tranſgreſſus, quantum etiam artis præſtantia eoſdem ſu-
 perauit. Tollit autem non beſtiarum genus, ſed ferorum ac
 agreſtium morborum, per magnam terræ ac maris partem
 Aefculapij auxilia, quemadmodum Triptolemus Cereris ſe-
 mina diſpergens. Proinde iuſtiſſimè in multis terræ locis di-
 uinos honores etiam ipſe conſequutus eſt, & iſdem donarijs
 cum Hercule & Aefculapio ab Athenienſibus dignus factus
 eſt. Hunc ipſum accerſe, & auri atque argenti quantum vo- **F**
 luerit, ipſi dare iube. Hic enim non vnum modum curatio-
 nis huius morbi nouit. Hic eſt ſanitatis pater, hic ſeruator:
 hic dolorum curator. In ſumma, hic diuinæ ſcientiæ prin-
 ceps eſt. Vale.

*Rex regum magnus Artaxerxes, Hyſtani-
 di Hellespont præfecto.*

Hippocratis medici Goi ab Aefculapio originem ducen-
 tis, gloria artis etiam ad me peruenit. Dato igitur ipſi
 auri quantum voluerit, & reliqua abundè, quibus opus habet
 & ipſum ad nos mittito. Nam optimatibus Perſarum æqua-
 lis erit. Et ſi quis alius bonus vir eſt in Europa, cum domus
 regiæ

A regia amicum facito, nihil diuitijs parcens. Viros enim inuenire, qui consilio præsent, non est facile. Vale.

*Hystanis Helleponti præfectus, Hippocrati ex
Aesclepiadis prognato gaudium.*

Magnus rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos præfectos, iubens tibi argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quæcunque voles, dare, & breui ad se mittere. Fore enim te optimatibus Persarum æqualem. Tu itaque cito adsis. Vale.

B *Hippocrates medicus, Hystanidi Helleponti præfecto gaudium.*

Ad epistolam quam misisti, à Rege venisse adserens, remitte Regi quæ dico, quàm celerrimè scribens: Quòd & victu, & vestitu, & domo, & omni ad vitam sufficienti opulentia fruimur. Persarum autem diuitijs vti, fas mihi non est: neque barbaros homines à morbis liberare, qui hostes sunt Græcorum. Vale.

Hippocratis Demetrio sanitatem.

Persarum rex nos accersiuit, ignarus quòd apud me maior est sapientiæ ratio, quàm auri. Vale.

*Regi regum meo magno domino Artaxerxæ, Hy-
stanis Helleponti præfectus gaudium.*

C **Q**uam misisti epistolam, iubēs demittere ad Hippocratem Coum ab Aesculapio originem ducentem, demissi, Sed & ab ipso responsum tuli, quod scriptum tradidit, & ad domum tuam transmittere iussit. Itaque eius latorem ac nuncium Gymnasben Dieutythen ad te misi. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes Cois hæc dicit.

Date meis nuncijs Hippocratē medicum malignis moribus præditum, & in me, & in Persas petulanter se gerentem. Sin minus, cognoscetis, etiam primi peccati pœnam vos duros esse. Urbem enim vestram deuastatam, & insulam distractam, in pelagus conuertam, vt in posterum tempus nemo sciat, an in hoc loco fuerit insula, aut vrbs Cos.

Visum est populo, respondere nuncijs ab Artaxerxe missis. Coi nihil indignum facient, neque Merope, neque Hercule, neque Aesculapio. Quapropter omnes ciues nō dabunt Hippocratem, etiam si pessima morte sint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epistolas scripserint, & terrā ac aquam à patribus nostris petiuerint, populus non dedit: quum eos ipsos se impetentes, similiter velut alios homines, mortales esse videret. Et nunc idem responsum dat. A Cois discedite: quoniam Hippocratem in manus vestras non dāt. Renunciate igitur ipsi vos nuncij, quòd neque dei ipsi, nostri negligentes erunt.

Senatus populusq; Abderitarum Hippocrati gaudium.

Nunc maximè vrbi nostræ in periculo versatur vir noster, ô Hippocrates, qui & præsentì tempore & futuro semper gloria vrbi sperabatur. Neq; nunc, ô vos dei omnes, nobis inuideatur. hic præ multa quæ derinet ipsum sapientia ægrotat, vt timor non vulgaris sit, si Democritus mente motus fuerit, reuera urbem nostram Abderitarum pessum ituram esse. Etenim oblitus omnium, & primùm suiipsius, vigilans & noctu & interdiu, & singula parua ac magna deridens, & totam vitam nihil esse putans, vitam transigit. Ducit aliquis uxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legatum agit, eligitur, abrogatur, ægrotat, vulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios mœstos ac tristes, alios gaudentes videt. Quin & de his, quæ apud inferos sunt, hic vir perscrutatur, & hæc scribit. Et idolis aërem plenum esse dicit. Et volucrum voces intentis auribus explorat. Et sæpe noctu exsurgēs, solus cantilenas sensim canenti similis est. Et se aliquando in rerum immensitatem proficisci dicit. & Democritos esse similes sibi ipsi innumera biles. Et corpus vnà cum mente corrumpens viuìt. hæc timeamus ô Hippocrates, ob hæc perturbati sumus. Quapropter nos serua, & patriæ nostræ cōsulturus cito adsis: neq; nos contempseris. Nam neq; ira viles sumus: & in nobis testimoniū situm est. Ob ipsum enim conseruatum, & gloriam, & pecunias,

A nias, & doctrinæ famā consequeris : quanquam doctrinæ ratio multo potior apud te est, quàm fortunæ. Attamen & huius bona multa ac luculenta tibi à vobis obuenient. Etenim animæ Democriti gratia, etiam si vrbs aurum esset non nostræ voluntati responderet, aut quacunque tandem re illi carendum esset. Leges nostras putamus ægrotare ô Hippocrates, leges præuaricari. Adsis optimè vir, curaturus virum insignem. Non medicus, sed conditor, sacrationem tota Ioniæ murum nobis circundabis. Ciuitatem, non virum curabis : & Senatum ægrotantem, & ne claudatur periclitantē, aperies. Ipse legislator, ipse iudex, ipse princeps, ipse seruator, & horū artifex aduenies. Ob hæc te exspectamus ô Hippocrates, atque hæc etiā fient vbi veneris. Vna ciuitas nō ignobilis, imò tota Græcia rogat te, serua corpus sapientiæ. Quin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinā, ab hac præuaricatione liberari supplicantem. Cognata equidem res est omnibus, velut apparet, sapientia. Verum his qui propius ipsam complexi sunt, velut nobis, etiā longè amplius. Et, sicut probè nosti, gratificaberis etiam futuro seculo, si non destitueris Democritum propter veritatem, cuius primas se ratum esse sperat. Tu enim & genere, & arte cōiunctus es Aesculapio. Hic verò Herculis est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quemadmodum omnino audiuiisti, cuius cognomē vrbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. Quum igitur videas ô Hippocrates, & populum, & virum insignem, ad stupiditatem diffluentem : festina, rogamus, ad nos. Heu vt etiam bona redundantia morbi existunt. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generose peruenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne mentis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum vulgus Abderitarum, quod mansit absque eruditione, communem sanensensum habet. Imò nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum iudicandum, qui prius desipuerunt. Adsis igitur cum Aesculapio patre. Adsis cum Herculis filia Epione. Adsis cum Aesculapij filijs, qui ad Ilium militarunt. Adsis nunc pæonias adferens morbi medelas. Nunc terra radicibus, & herbis, & auxiliaribus floribus, insanixque medicamentis fœcunda est. Fermè igitur nunquam fertilius producent, neque terra, neque montium cacumina, quàm nunc proferunt

proferunt ea, quæ pertinent ad Democriti sanitatem. Vale. D

Hippocrates Senatui populoque Abderitarum gaudium.

Cuius vester Ameleffagoras venit in Co, & erat tunc in illa die Virgæ assumptio, & annua festiuitas, ac publicus, velut nostis, conuentus, & pompa sumptuosa fiebat, quâ mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum deducere. Quâdoquidem autē & ex verbis, & ex aspectu, Ameleffagoras festinare videbatur, credens, velut erat, rem ipsam virgere: epistolâ vestram legi, & admiratus sum quod ob unum hominem, velut si unus homo esset ipsa ciuitas, turbati estis. Et beati profecto sunt populi, qui sciunt bonos viros sua esse munimenta, & non turres, neque muros, sed sapientium virorum sapientia consilia. Ego verò, qui credo artes quidē esse Deorum dona, homines autē naturæ opera: (& ne ægrè feratis viri Abderitæ) non vos puto, sed ipsam naturam me vocare, ad conseruandum ipsius opus, quod periclitatur, ne præ morbo collabatur. Quare præ vobis ego nunc, naturæ ac Dijs obediens, festino agrotantē Democritum sanare: si quidē sanè & hoc morbus est, & non potius error vobis tenebras offundit: id quod opto, atque vtinā sit hec vberius vestræ beneuolentiæ, signū, quod etiam ad suspicionem turbamini. Argentū autem mihi venienti, neque natura, neque Deus promittere poterit. Quare neque vos viri Abderitæ cogatis: sed liberæ artis etiam opera libera esse sinatis. Qui verò mercedē capiunt, hi scientias seruire cogunt, velut captiuas faciētes ipsas ex priore libertate. Deinde, velut veri simile est, mētiri etiā poterint, velut de magno morbo: & negarint, velut de paruo: & polliciti non venerint, & rursus venerint non vocati. Misera est profecto humana vita: quā per totam ipsam intolerabilis auaricia, velut hybernus vêtus, distributa est ac penetrauit. Ad quā vtinam potius omnes medici conuenissent, quod grauiorem insania morbum curarent: quoniam quū morbus sit, & affligat, etiā laudatur. Ego verò arbitror etiam animæ morbos omnes vehementes esse insanias, quæ opiniones quasdam ac imaginationes rationi inducunt. A quibus qui per virtutem depurgatus est, sanus euadit. Quod si ego omnino ditescere voluissem, viri Abderitæ, non vtiq; decem talentorum gratia ad vos profiscerer: sed ad Magnum

- A** Magnum accessissem Persarū regē, vbi totæ ciuitates humanis opibus refertæ mihi obtigissent: sanassem autē illic ipsorum pestem. Verū denegaui, inimicam Græciæ regionem à malo morbo me velle liberare. Et ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassem. Habuissem autē ignominiā ipsas à rege diuitias, & opulentiam patriæ inimicā. Hæc verò mihi adfuissent, velut ei qui vrbiū Græciæ deuastator esset. Non sunt diuitiæ, vndiquaque lucrari. Magna enim sunt sacra virtutis, quæ à iustitia non occultantur, sed manifesta existunt. Aut nō æquale peccatum esse putatis, hostes seruare, & amicos mercede sanare? At non hoc modo se res nostræ habent, à Abderitæ. Non capio fructum ex morbis, neq; libenter audiui Democritum mente motum esse. Qui siue sanus est, amicus est: siue ægrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsum grauib; ac solidis moribus præditum esse, & vrbis vestræ ornamentum. Valete.

Hippocrates Philopæmeni gaudium.

- L** Egati, qui vrbis epistolā mihi reddiderūt, etiā tuā traderunt. Et valde gauisus sum, & hospitium, & reliquū vitum te promittēte. Veniemus autē bona fortuna, & meliore spe, velut arbitramur, accedemus, prout in literis est declaratum: quum nō insaniam, sed quandā excellentē mentis sanitatem vir ille declaret, dum neq; liberorū, neq; vxoris, neq; cognatorū, neq; rei familiaris, neq; omnino alicuius curā gerit: sed & diu & noctu apud seipsum cōsistit, & priuatim vitā degit, plerunq; in antris & solitudinibus, aut sub arborū vmbis, aut in mollibus herbis, aut apud frequētia aquarū fluentia. Contingunt igitur talia plerunq; atra bile percitis. Taciturni enim aliquādo sunt, & solitarij, ac deserti amātes, & rerum familiarium cōspectū auersantur, alienū putātes. Nec verò dissimile vero est, etiā his qui circa disciplinas versantur ab vna erga sapientiā adfectione, alias curas exclusas esse. Quēadmodū enim famuli ac ancillæ in domibus tumultuātes, & seditionē agentes, vbi derepente ipsis hera cōparuit, consternati cōquiescunt: sic etiā reliquæ in anima cupiditates malorum sunt hominibus ministræ. Postquā autē sapiētia cōspectus seipsum ingesserit: reliquæ affectiones velut famulæ discedunt. Non autē omnino insani antra & quietē experit: sed

sed etiā hi qui humana negocia contemnunt, ob tranquillitatis cupiditatē. Quum enim mens ab externis curis vexata, corpus reficere voluerit, tūc cito ipsum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circūcirca veritatis regionē collustrat, in qua non est pater, nō mater, non vxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non fortuna, non omnino quicquam ex his, quæ tumultū inducunt. Omnia autē perturbātia, exclusa stant præ timore: & neq; appropinquare audēt præ reuerentia corū, quæ isthic habitāt. Habitant autē illam regionē, & artes, & virtutes omnis generis, & Dei, & dæmones, & senatus, & consilia. Et magnus polus in illa regione, stellis multū mobilibus coronatus est: in quam fortassis etiā Democritus. præ sapiētia transmigravit. Deinde quum nō videat amplius eos qui sunt in vrbe, vtpote procul profectus: insanix morbo laborare putatur, propter solitudinis amorē. Student autem Abderitæ argenti amorem & studium detegere, & in se manifestum facere, eo quod Democritum non intelligunt. At tu hospitium nobis o amice Philopœmea præpara. Non enim volo perturbatæ vrbi molestiam exhibere, quum veterem te proprium hospitem, velut nosti, habeam. Vale.

Hippocrates Dyonisio gaudium.

A Ut in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me venire o amice festina. Per summā enim necessitatē abeundum est mihi in Abderam, Democriti causa, ad quē ægrotantem vrbs me accersuit. Ceterū admiranda est hominū, o Dionysi, per cōsensum adfectio: velut vna anima cū ciue cogrorāt. Quare mihi vidētur etiā ipsi curatione opus habere. Ego verò neq; morbū ipsum esse puto, sed immodicam doctrinam: quæ reuera nō est immodica, sed ab idiotis putatur. Nā nunquam nociua est virtus immodica. Excellentia verò, morbi opinionē de se præbet, propter iudicantiū imperitiā. Vnusquisq; enim ex his, quæ ipse nō habet, iudicat, id quod in alio abundat, superfluū esse. Sic sanē etiā timidus fortitudinē immodestiā putat, & avarus magnanimitatem. Et oīs defectus, virtutis moderationē excedere putatur. Illū igitur ubi viderimus, cum prænotione hinc cōtingente, & ubi sermones eius audiuimus: melius cognoscemus. Tu verò, o Dionysi, studio habe ut ipse accedas. Volo enim te in patria mea cōmorari

- A** rari donec rediero:quo & rerum nostrarum,& in primis vrbis nostræ curâ geras.Nam haud scio,quomodo ex casu contigit,vt saluber sit annus,& pristinam naturâ habeat.Quare neq; multi infestabunt morbi:attamen venito. Inhabitabis autem meam domum nimis quàm opportunam,nimirum quum & vxor apud parentes maneat propter meam profectiorem. Attamen & illius res inspecta, quo pudicè degat, & non ob viri absentiam,alios viros approbet.Honestaequidem ab initio fuit,& parentes bonos habuit.Patrem autem mirificè virilem,& malos valde odio habentem,egregiè senem. Attamen semper opus habet mulier moderatore.Habet enim à natura in se lasciuia:quæ,nisi quotidie refecetur,velut arbores
- B** in materiae multæ effusionem,exuberat. Ego verò amicum parentibus diligentiorē puto ad vxorē custodiendam. Nō enim,velut illis,etiam huic cohabitat benevolentiaē adfectio,per quam sæpe vmbra admonitioni obtenditur.In omnibus autem rebus prudentior est alienitas ab adfectione,vt quæ minimè à benevolentia infringatur. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

- Q** uum apud te Rhodi esseni Damagete,vidi nauē illam cui solis inscriptio erat,penitus pulchram,& in puppi probè instructā,& sufficiētem carinā habentē.Habebat & trāstra multa.Et tu laudabas etiā in ipsa nauigandi præstatiā,quæ velox esset,& tuta,& ad inferuiedum artificiosa. Et insuper prædicabas probū in ipsa nauigationis cursū.
- C** Hæc mitte nobis:verū si fieri potest,nō remis, sed alis ad remigium instructā.Vrget enim res ipsa & amice, vt valde cito in Abderā nauigē.Volo enim ægrotantē curare urbē,propter vnum ægrotantem Democritum, si vnquam viri fama ad aures tuas peruenit. De hoc patria dicit,quod insania afflictus sit.Ego autem cupio, imò magis opto,nō reuera ipsum insanire, sed illos ita putare.Ridet,inquiūt,semper,& ridere nō cessat in oībus negotijs. Et hoc ipsis insaniae signū esse videtur.Quare tuis in Rhodo amicis dicito,vt semper moderatē se gerāt,& nō multū rideant,neq; multum tristes sint: sed inter ambo hæc modū teneant, vt alijs comis esse videaris, alijs sollicitus,de virtute cogitās. Et pfecto mali quiddā dū ad singula ille ridet. Si enim immodestia malū est:ea sanè ppetua

HIPPOCRATIS

tua longè peior est. Et dicam sanè ad ipsum: Democrite, & si quis ægrotat, & occiditur, & mortuus est, & obsidetur, & quoduis malum ingruit: singula quæ fiunt, materiam risus tibi præbēt. Non autem repugnas deo, si, quum duo sint in mūdo, Gaudium & Tristitia, tu alterum ipsorū eiecisti? Beatus profectò fueris (Verum impossibile est) si neque mater tibi ægrotat, neque pater, neque postea liberi, aut vxor, aut amicus, sed propter tuum risum conseruantur, penitus felix es. At si dum ægrotant, rides: dum moriūtur, gaudes: & si quid mali audieris, exhilararis: pessimus es ò Democrite, & procul sanè à sapientia. Si verò putas hæc ipsa neque mala esse, certæ atrabile percitus es Democrite, periclitans ne & ipse Abderita sis, prudentior autē sit ipsa ciuitas. Cæterum de his exactius illic dicemus Damagete. At verò naus etiam hoc tempus, quo hæc tibi scribo, remoratur. Vale.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

COgitans ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dormiens, sub ipsius auroræ initium somniū mihi oblatū habui, ex quo puto nihil valde periculosi fore. Mirabiliter enim expergefactus sum. Videbar mihi videre Aesculapiū ipsum corā, & iā ad ipsas Abderitarū portas aderamus. Aesculapius autem non vt imagines eum aliās ostēdunt, mitis ac blandus apparebat: sed habitu concitato, & aspectu horrendo. Sequebātur autē ipsum dracones reptilium generis immanes, longum tractū ducentes, & horribile quiddam velut in desertis ac saltibus subfibilantes. Sequebantur & socij, pyxides medicamentarias probè obsignatas gestantes. Deinde porrexit mihi manum deus: quā vbi libētissimè apprehendissem, rogabā vt simul mecū peregeret, & ne me in medēdo destitueret. Verū is: Nihil, inquit, in præsens me opus habes: sed hæc immortalium ac mortaliū cōmunis dea te peregrinū deducet. Et ego cōuersus video mulierē pulchram ac magnā, simpliciter ornatā, splēdidam, cuius oculorū circuli puro lumine micabāt, vt stellarū fulgorē putares. Et deus qui dem disparuit. Mulier verò illa apprehēsū me manu, lento gradu benigniter per urbē ducebat. Et vbi prope domū essemus, in qua hospitium mihi paratū esse putabā, velut spectrū disparuit, hoc saltem dicens: Cras te apud Democritum de-

Aprehendam. Cū verò iam se illa cōuerteret: Rogo, inquā, optima scēmina, quānā es, & quo nomine vocari debes? Veritas, inquit illa. Cæterū quē accedentē vides (& derepētē altera quādā mihi apparuit) neq; ipsa mala videtur, audacior autē aspectu & cōcitatior: Opinio, inquit, appellatur, & habitat apud Abderitas. Ego igitur vbi de somno surrexissem, mihi ipsi somnium interpretatus sum, quòd non indigeret medico Democritus, quādo sanè ipse medendi Deus discessisset, velut qui medendi occasionem & materiam nō haberet, Sed ipsa quidem veritas, q̃ Democritus sanus sit, apud Democritum manet. Opinio verò, q̃ Democritus ægroter, reuera apud Abderitas habitat. Atq; hæc vera esse, mi Philopœmen, **B**credo, & sunt sanè. Et non contemno somnia, maximè vbi etiam ordinē conseruāt. Medicina autē & vaticinatio valde cognatæ sunt: quandoquidem & pater ambarū artium vnus est Apollo progenitor noster, & præsentēs & futuros morbos prædicēs, & ægros & ægrotaturos sanans. Vale.

Hippocrates Crateuæ gaudium.

Scio te, ô amice, optimum radicifecam esse, & propter tuam ipsius exercitationē, & propter progenitorum gloriam, adedò vt in hac facultate Crateuæ proauo minimè cedas. Proinde nunc, si vnquā aliās, herbas collige, quor & quales poteris: vrget enim necessitas: atque hæc mihi trāsmitte, ad virum toti ciuitati cōparandum, Abderitam quidem verum Democritum. Aegrotare enim ipsum dicunt, & purgatione valde opus habere, vt qui insania sit correptus. Non vtemur fortassis medicamentis, quēadmodum etiam credo. Attamen vndiquaque instructum esse oportet. At verò rem herbariam apud te sæpe admiratus sum, quemadmodum etiam vniuersorum naturam ac constitutionem, & sacerrimū terræ fundamentum, ex qua animalia, & plantæ, & alimenta, & medicamēta, & fortuna, & ipsæ diuitiæ exoriuntur. Neq; enim aliās haberet vbi consisteret Auaritia, neque sanè Abderitæ nunc decem talentis inescassent me, pro medico mercenarium declarantes. Si verò possis Crateua amaram auaritiæ radicem exscindere, vt nullæ ipsius reliquæ restent, probè scito, quod hominum vnà cum corporibus etiam animas ægrotantes purgassemus. At hæc quidem vota sunt. Tu

verò, quod fieri potest, nobis mōtanas maximè & in altis col-
 libus nascentes herbas radicitus rescia. Sunt enim aquosiori-
 bus solidiores & acriores, propter terræ densitatem, & aeris
 tenuitatem. Nam quod attrahunt, frigidius est. Conare ta-
 men vt etiam de his quæ circa stagna nascuntur, & de palu-
 stribus, & fluuiatilibus, aut fontanis flores colligas: quas sa-
 nè debiles, & exolutas ac dulcis succi esse scio. Omnia autem
 medicamenta quæ succi & liquores fluidi sunt, in vitreis va-
 sis ferantur: quæ verò folia, aut flores, aut radices sunt in fi-
 ctilibus nouis probè obturatis: vt ne ventis perflata, medica-
 menti vigorem velut in animi deliquium collapsa, amittât.
 Cæterum statim nobis hæc mittito. Nam & tēpus anni con-
 gruū est, & necessitas dictæ insanix vrget. Ab omni equi-
 dem arte aliena res est dilatio, verū maximè à Medicina, in
 qua dilatio est animæ periculum. Curationum verò animæ
 sunt temporum opportunitates, quarum obseruatio finis est.
 Spero quidem sanum esse Democritū, etiam citra medelam.
 Si verò aliquis error naturæ, aut temporis, aut alterius alicu-
 ius causæ contingat: multa enim nos qui mortales sumus, la-
 tent, vtpote non omnino per veritatem corroboratos, ad id
 quod obscurum est, omnem vim congregatam esse oportet.
 Non enim contentus est is, qui in periculo versatur, his quæ
 possumus: sed concupiscit etiam ea, quæ nō possumus. Et fer-
 mē semper ad duos fines militamus, alterum hominis, alte-
 rum artis. Quorum alter obscurus est, alter scientiæ determi-
 natus. Opus est autem in vtrisque his etiam fortuna. Incerta
 enim est coniectura eorum, qui in purgationibus cautè pro-
 cedunt. Nam & stomachi adflictionē veremur, & medicatio-
 nis congruentiam, ad naturā ignotam cōiectamus. Nō enim
 vna & eadem est omnium natura, & aliud semper sibi ipsi de-
 cernens adsimilat ac familiare facit. Aliquādo verò totū per-
 dit. Sed & herbis multa reptilia venarum immittunt, & hia-
 tu suo internæ ipsarum teneritudini adflictionem pro auxi-
 lio inspirant. Et huius rei ignorantia erit, nisi sanè nota ali-
 qua, aut macula, aut odor ferus & grauis rei factæ indicatio-
 nem fecerit. Deinde ipsa ars propter fortunæ casum, à rectè
 faciendi proposito aberrat. Stabiliiores autē semper sunt pur-
 gationes per veratrū, quibus etiā Melampus in Proeti filia-
 bus, & Anticyreus in Hercule vti esse narrantur. Minimè ve-
 rò

A rō vtemur nos vllo aliq, ex his in Democrito: sed contigerit opto illi sapientia, efficacissimorū ac medicatissimorum pharmacorum finis. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

H Ocerat illud Damagetes quod cōiectabamus: nō infan-
nit Democritus, sed super omnia sapit, & nos sapiētio-
res effecit, & per nos omnes homines. Remisi autē tibi ami-
ce reuera Aesculapeam nauem: cui cum solis signo etiā sani-
tatis insigne apponito. Nam reuera secundo numine vela fe-
cit: & illa die in Abderam nauigauit, qua scripsērā ipsīs, me
peruenturū esse. Omnes igitur ante portas cōgregatos inue-
B nimus, nos, velut verisimile est, expectantes, nō viros solū,
sed etiā mulieres: insuperq; senes & pueros, per deos, tristes,
itemq; infantes. Atq; hi quidem sic habebāt, velut ob Demo-
critum insanientē. Ille verō syncere tūc in philosophādo ex-
cellebat. Postquā autē me vidissent, visi sunt mihi paululum
ad seipsos rediisse, & bonas spes ostentabāt. At Philopœmen
me ad hospitiiū dūcere gestiebat, & hoc ab illis cōprobaba-
tur. Ego verō, ō viri Abderitæ, inquā, nullū mihi maius ope-
ræ precii est, quā Democritū videre. Illi verō hoc audito,
collaudarūt, & gauisi sunt, & cōpendio duxerūt me per forū,
partim sequētes, partim præcurrētes, alij ab vtraq; parte: Ser-
ua, clamātes, auxiliare, medicare. Et ego adhortabar ipsos vt
cōsiderent, tanquā fortassis nihil esset mali: aut si quid esset,
C modicū id esset, & correctu facile, cōfusus horis anni Etesijs.
Et simul hæc dicens ibam. Neq; enim procul erāt ades: imō
neque tota ciuitas. Aderamus igitur: propinquæ enim muro
erāt, & me placidæ eò deducūt. At retro turrim collis erat al-
tus, lōgis ac dēsis populis nigris vmbrosus, vnde Democriti
habitaacula cōspiciebantur. Et ipse Democritus sub ampla ac
humilima platano sedebat, in veste crassā citra humeros de-
sinente solus, discalceatus, super lapidea sede, valde pallidus
ac macilentus, promissā barba. Iuxta ipsum verō à dextra, te-
nuis aqua per decliuē collē decurrens leniter resonabat. Erat
autē delubrū quoddā super illū collem, quantū equidem cō-
iectura assequor, Nymphis dicatū, sponte enatis vitibus cir-
cundatum. Ipse verō cum multo ornatu super genibus librū
habebat. Sed & alij quidem ex vtraque parte adiacebant. Ac-

cumulata erant etiam animalia multa per totum resecta. Et **D**
 ipse aliquando concitatè incumbens scribebat, aliquando
 quiescebat, diu multumque se continens, & in seipso medi-
 tans. Deinde non longè post, his peractis, exsurgens deam-
 bulabat, & viscera animalium inspiciebat, & depositis ipsis di-
 gressus, rursus desidebat. At Abderitæ circumstantes me tri-
 stes, & non procul à lachrymantibus oculos habentes: Vides,
 inquit, Hippocrates Democriti vitam, quàm insanit, & ne-
 que quod vult nouit, neque quod facit. Et quidam ex ipsis ad-
 huc ampliùs ostendere volens ipsius insaniam, alta voce plo-
 rauit instar mulieris ob filij mortè lamentantis. Deinde rur-
 sus cum gemitu eiulauit, personam agens viatoris, qui aliquid
 ex his quæ portabat, amisit. Verùm Democritus cum hæc au-
 disset, partim ridebat, partim cachinnis explodebat, & nihil **E**
 ampliùs scribebat. Caput autem frequenter cōcutiebat. Ego
 verò: Vos, inquam, o Abderitæ, hic manete: ipse verò ubi &
 verbis, & corpori viri propior factus fuero, videroque ac au-
 diero, cognoscā adfectionis veritatē. Et hæc loquutus, placi-
 dè descendebam. Erat autem locus ille asper ac decliuus. Ita-
 que vix me suffulciens penetraui. Cùm autem appropinquas-
 sem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex numinis adflatu &
 cum concitatione scribentē. Stabam igitur isthic expectans
 tempus quietis ipsius. Ipse verò paulò post, intermisso scri-
 bendi impetu, & stilo scriptorio deposito, respexit ad me ac-
 cedentem, & Salue, inquit, hospes. Et ego: Plurimum & tu,
 inquam, Democrite vir sapiētissime. At ille, verecundans ar- **F**
 bitror, quòd nō nomine me compellasset: Te autem, inquit,
 quo nomine vocabimur? Ignorantia enim tui nominis, cau-
 sa erat, cur te hospitem appellarem. Hippocrates, inquā, Me-
 dicus est mihi nomen. Is verò: Asclepiadarum, inquit, no-
 bilitas, & magna sapientiæ tuæ in re medica gloria multum
 celebris, etiam ad nos peruenit. Quid autem negocij, o ami-
 ce, te huc perduxit? Imò potius præ omnibus confide. Vi-
 des autem quòd hæc sedes folijs instrata non est iniucunda,
 viridis adhuc ac mollis, & ad insidendum lenior inuidiosis
 fortunæ sellis. Cùm autem confedissem, rursus inquit. Pri-
 uatūmne, aut publicum negocium agens huc peruenisti? Dic
 apertè. nam nos, quantum poterimus, adiuvabimus. Et ego:
 Quæ vera causa est, inquam, tui gratia huc venio, vt sapien-
 tem

Atem virum conueniam. Habet autem causam patria, cuius legatum ago. Ille verò: Hospitio itaque, inquit, primùm vtere nostro. Ego verò per omnia virum pertentans, etiam si iam mihi manifestum esset, ipsum nō insanire: Philopœmenem, inquam, nostri ciuem vestrum? Etiam, inquit, valde: Damonis filium dicis, qui habitat apud Hermaidem fontē? Hunc ipsum, inquam, cuius ego sum ex patribus peculiaris amicus. At tu Democrite potiore me hospitio excipe, & primùm sanè quid sit hoc, quod hic scribis, dicito. Ille verò vbi paululum se continisset: De insania, inquit. Et ego, ô rex Iupiter, inquam oportunè profecto scribis contra ciuitatem. At ille: Qualem, inquit, ciuitatem Hippocrates? **E**go verò: Nihil, inquam, ô Democrite, sed haud scio quomodo hoc verbum mihi excidit. Verùm quid de insania scribis? Quid enim, inquit, aliud quam quid sit, & quomodo in hominibus generetur, & quomodo alleuetur. Nam animalia hæc, quæ vides, inquit, huius gratia refeco, non quòd odio habeam opera dei, sed bilis naturam ac sedem quærens. Nosti enim quòd hæc furoris hominū causa est, vbi nimium redundarit. In omnibus equidem à natura inest: sed in quibusdam minus, in quibusdam amplius. At immodestia ipsius morbi sunt, ipsa velut materia, aliquando bona, aliquando mala subiacente. Et ego, Per Iouem, inquam ô Democrite verè hæc & sapienter dicis. Quare beatum te iudico, qui tanta quiete frueris. Nobis autem huius participes esse nō permixtum est. Interrogante verò illo: Cur ô Hippocrates, permixtum non est? Quoniam, inquam, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut vsuræ, aut morbi, aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut eiusmodi quædā opportunitatem nobis commodam eripiunt. Hic sanè vir ille ad solitam adfectionem delatus est, & valde effusè risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid verò, inquam, Democrite rides? vtrum bona quæ dixi, aut mala? Ille verò adhuc magis ridebat. Et Abderitæ de colle id videntes, partim capita sua cædebāt, partim frontem. Alij verò capillos euellebant. Nam, velut postea dixerunt, ampliorem quàm aliàs solitus esset, risum effuderat. At verò, inquam, sapientum optimè Democrite, cupio causam huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus visus sum, aut ea quæ dixi: quo

HIPPOCRATIS

hoc cognito, à causa desistam, aut tu reprehensus, intempesti- **D**
uos risus coërceas. Ille verò: O Hercules, inquit, si me repre-
hendere potes, curationem perficies, qualem nullam vnquā,
ô Hippocrates. Et quomodo non reprehendaris, ô optimè?
Aut nō absurdum te esse putas, dum rides hominis mortem,
aut morbum, aut mētis emotionem, aut insaniam, aut atram
bilem, aut cædem, aut aliud quid peius? Aut vice versa nu-
ptias aut festiuitates, aut liberorum procreationem, aut my-
steria, aut magistratus, aut honores, aut aliud quid omnino
boni? Nam quorum misereri oportet, ea tu derides, & ob
quæ latari conueniebat, ea itidem derides, adeò vt neque bo-
num, neque malum apud te sit discretum. At ille: Hæc quidē,
inquit, rectè dicis, ô Hippocrates: sed non nouisti risus nostri **E**
causam. Vbi verò cognoueris: satis scio quòd meum risum,
meliorem legatione medelam ac curationem, tuæ patriæ &
tibi ipsi auferes, & alios prudentes facere poteris. Et pro hoc
fortassis me vicissim medicinam docebis, vbi cognoueris
quanto studio circa res nullo studio dignas versantes, & ea
quæ nullius precij sunt facere conantes, omnes homines vi-
tam consumunt, risu digna tractantes. Ego verò: Dic, in-
quam, per deos, nunquid vniuersus mundus ægrotare se non
animaduertit? & non habet quo legationem demittat ad
sui curationem? Quid enim extra ipsum esse poterit? Ille ve-
rò excipiēs: Multę, inquit, sunt mundorum infinitates, & ne-
quaquam, ô amice, diuitem naturam malignè extenuēs. At
hæc quidem, inquam, Democrite suo tempore docebis. Ve- **F**
reor enim ne fortè dum infinitatē recenses, ridere incipias.
Scias autem nunc, de tuo risu rationē vitę te reddere debere.
Ille autē toruē me intuitus: Duas, inquit, risus mei causas esse
putas, bona & mala. Ego autē vnum hominem rideo, demen-
tia quidem plenū, rectis autem actionibus vacuum, in omni-
bus consilijs pueriliter ac stultè se gerentē, nullius vtilitatis
gratia labores nunquā absoluendos tolerantem, fines terræ
& infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus penetrantē,
argentum & aurum quærentem, & nunquā ab his adquiren-
dis interquiescentem: sed semper circa plura adipiscenda tu-
multuantem, quo ipse inferior non sit, & neq; pudeat si non
felix appelletur. Rideo itē ipsum eo q̃ hiatum terræ effodit
manibus eorum perquirens, qui partim à laxa irruente terra
oppres

A oppressi sunt, partim diutissimè in hac necessitate detenti, in supplicio velut in patria permanent, argentum & aurum inquirentes, vestigia pulveris ac ramenta perscrutantes, arenam aliam aliunde eruentes, & terræ venas excindentes, ad opulentiam semper glebas conflantes, ex matre terra hostilem terram, quum tamen eadem sit, faciētes, & hanc admirantes pedibus calcant. Quanto verò risu dignum est, quòd ærumnosam & occultam terram amant, manifestam contumelia afficientes? Alij verò canes emunt, alij equos: alij multam regionem circūscribentes, propriam sibi inscribunt: & multis imperare volentes, neque libiipsis imperare possunt. Vxores ducunt, quas paulo post eiiciunt. Amant, **B** deinde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant: deinde adultos eiiciunt. Quæ est illa vana ac absurda diligentia, nihil ab insania differens? Bellum intestinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant: occidunt homines: terram fodientes, argentum quærunt. Argento reperto, terram emere volunt. Empta terra, fructus vendunt: fructibus diuenditis, rursus argentum accipiunt. In quot mutationibus versantur? in quanta malicia? dum opes non habent, opes expetunt: dum habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbè agentes video. Intendo risum, dum infelicitè agentes cerno. Veritatis enim Legēs transgrediuntur: contentionis studio hostilem inter se litem habent, & cum fratribus, & parentibus, & ciuibus: atque ad hæc, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, vbi mortuus est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam vitam degentes, amicorum ac patriæ penuriam contemnunt. Res indignas & inanitates diuitiarum loco habent: pro vniuersa opulentia statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, vt loqui videatur. Eos verò qui verè loquuntur, odio habent. Res insuper non faciles expetunt. Nam continentem habitantes, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia peruertunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudare videntur. Vincuntur autem quotidie à perulantia, ab avaritia. Ex omnibus adfectionibus ægrotant. Theriæ verò vitæ omnes sunt. Cur verò meum ritum reprehendisti ô Hippocrates? Non enim quispiam suam ipsius

dementiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum
 ipsi sibi sobrii esse videntur: alij verò amantes, quàm ipsi gra- D
 uiore morbo laborent: alij naugantes: alij eos, qui circa agri-
 culturam occupati sunt. Non enim concordant neque arti-
 bus, neque operibus. Ego verò: Hæc quidem, inquam, vera
 sunt Democrite: neque alius aliquis conuenientior sermo
 esse poterit: ad mortalium miseriam declarandam, verum
 ipsæ res sanciant necessitatem, & domesticæ dispensationis,
 & nauium fabricationis gratia, reliquæ item vitæ, in qua
 necesse est hominẽ esse. Non enim ad ocium natura ipsum
 genuit. Ex his autem rursus ambitio effusa, multorum rectè
 sentientem animam decepit, qui omnia quidem rectè ac se-
 rio agere student, velut re certa ac stabili futura. Non autem E
 ita validi sunt, vt obscuritatem præuidere possint. Si enim
 quis ô Democrite vxorem ducens, separationem aut mor-
 tem timeret: aut quispiam liberos educans, ipsorum interit-
 um: imo neque in agricultura, & nauigatione, & regno, &
 magistratu, & omnibus quæ sunt in vita, vllus vnquam de
 errore præsumpsit, sed vnusquisque horum bona spe alitur,
 deteriorum verò ne meminit quidem: nunquid igitur risus
 tuus his minimè conuenit? At Democritus: Valde, inquit, tar-
 do ingenio præditus es, & longè à sententia mea abes ô Hip-
 pocrates, qui tranquillitatis & perturbationis modum non
 consideras, præ ignorantia. Si enim hæc ipsa prudenti men-
 te disponderent: & ipsi facillè liberarentur, & meum risum le-
 uarent. Nunc autem, velut rebus in vita firmis, dementes il- F
 li superbiunt, ob ratiocinationis expertem mentem, inor-
 dinatum impetum suum ægrè discentes. Sufficiens enim ad-
 monitio ipsis esset, omnium rerum vicissitudo, quæ subitis
 mutationibus irruit, & derepentè omnigenam circumrota-
 tionem inducit. At ipsi, velut hæc firma sit ac stabilis, obli-
 ti adfectionum assiduè incidentium, aliter alias ea, quæ tri-
 stitiam inferunt, cupientes, & quæ non conferunt, quæren-
 tes, multis calamitatibus inuoluuntur. Si verò quis iuxta
 propriam facultatem omnia facere cogitaret: stabilem sanè
 vitam custodiret, seipsum cognoscens, & sui ipsius compara-
 tionem clarè considerans, & non cupiditatis studium in in-
 finitum extendens: sed opulentam naturam, & omnium nu-
 tricem, per sufficientiam intuens. Quemadmodum autem
 in optimo

A in optimo corporis habitu, adfectionum periculum manifestum est: ita successuū fortunæ magnitudo periculosa est. Insignes autem palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alij vero velut proximorum facta non videntes, à proprijs malefactis pereunt, tam manifesta, quàm obscura non prævidentes, quum longam vitam exemplum habeant eorum, quæ sunt, & quæ non sunt, ex quibus etiam futurum considerare oportebat. Hæc sunt quæ mihi risus materiam præbent, ô dementes homines, prauitatis pœnas pendentes, auaritiæ, insatiabilitatis, inimicitia, insidiarum, doli, inuidentiæ (difficile est enumerare multiplices malorum versutias: sunt enim infinitæ) & in his dolosis versutijs vicissim conuersantes, & malignè sentientes. At virtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mendacij enim studium exercent, voluptatem consecretantur, legibus non obediētes. Quidam verò ex ipsis prævidentiam in hominibus esse negat, vt qui neq; visus, neque auditus participes sunt. Solus autem sensus hominis recta intelligentia lucidus, & præsens & futurum prævidet. In omnibus displicentiam habent, & rursus ad eadem accedunt. abnegata nauigatione, nauigant. reiecta agricultura, rursus agrum colunt. eiecta vxore, aliam inducunt. genitos sibi liberos sepeliunt: & his sepultis, alios generant, ac rursus ^{ducunt.} ~~Senectam optant: ad ipsam autem peruenientes, gemunt,~~ in nullo rerum statu constantem mentem habentes. Principes ac Reges priuatum prædicant: priuatus autem regnum appetit. Qui Reipub. magistratum gerit, artificē laudat, velut extra periculum constitutum: artifex autem illum, velut per omnia potētem. Rectam enim virtutis viam, puram & leuem. ac inoffensam, non vident, quam nemo ingredi audet. Feruntur autem in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incedentes, lapsantes ac offendentes: plerique vero excidentes, anhelantes velut si quis persequatur, litigātes, modo posteriores existentes, modo præcedentes. Et quidam ipsorum petulanti alierſi cubilis corrumpendi amore ardent, per impudentiā inducti, alios auaritiæ morbus infinitus consumit, alij mutuo insidias struunt, alij ab ambitionis studio in aērē sublatis, per maliciæ grauitatem in profundū perniciēi præcipites deferuntur. Quidam destruunt, deinde rursus ædificant: largiuntur, deinde pœnitentia ducti, amicitia iura tol-

lunt, malefici per inimicitiam cognationis iura bello impet-
 rentes. Et horum omnium causa est Avaricia. Qua in re hi à
 pueris ludentibus differunt? apud quos consilium quidem iu-
 dicio caret: quod verò se forte fortuna obtulit, id iucundum
 est. At verò in desiderijs quid brutis animantibus reliqui fa-
 ciunt, quàm quòd intra sufficientiam feræ ipsæ se cõtinent?
 Quis enim leo aurum in terram occuluit? Quis taurus vbe-
 rioris alimèti gratia depugnauit? Quam pardalim vnquam
 insatiabilitas cœpit? Sinit quidem aper, sed vsque ad aquæ ap-
 petentiam. Lapus autem, deuorato necessario alimèto obla-
 to, quiescit. Si dies ac noctes coniungat homo, non sentit cõ-
 uiuandi satietatem. Et annuorum quidem temporum ordo,
 terminus est brutis ad coitum: at homo perpetuo infano li-
 bidinis cœstro stimulat. Quæso te Hippocrates, non ridere
 debeo plorantem propter amorem, eo, quòd commodo suo
 exclusus est? maxime verò si quis periculorum contemptor
 sit, & per præcipitia, aut pelagi profunditates feratur, risum
 non extendam? Non ridebo autem eum, qui nauem multis
 mercibus onustam demersit, deinde mari indignatur, quòd
 ipsam plenam submersit? Ego quidem nequaquàm mihi ride-
 re videor. Vellem autem potius aliquid molesti contra ipsos
 excogitare. At neq; medicinam pro his esse oportebat, neq;
 aliquem præonia pharmaca præparantem; atq; huius rei do-
 cumentum præbeat tibi tuus ille progenitor Aesculapius,
 qui dum seruaret homines, fulminis ictus gratiam accepit.
 Non vides quòd & ego malicie pars sum, dum insanis? B
 sam inquirens, animalia macto ac refeco? Oportebat autem
 ex hominibus causam perscrutari. Non vides quòd etià ipse
 mundus odio in homines plenus est? Infinitas enim contra
 ipsum afflictiones accumulauit. Totus homo ex natiuitate
 morbus est. Dum educatur, inutilis est, & alienum auxilium
 implorat. Dum crescit, proteruus, insipiens, pædagogus opus
 habens. Dum in vigore est, audax est. Dum decrescit, misera-
 bilis, ubi labores suos imprudenter recolit ac iactat. Ex ma-
 ternis enim vteri inquinamentis talis prodijt. Et propterea
 alij indignatione ac immodica ira pleni, in calamitatibus ac
 pugnis versantur: alij semper in adulterijs & corrupendis
 puellis: alij in ebrietatibus: alij in rerũ alienarũ cupiditati-
 bus: alij in suis prodigedis. Vtinam facultas esset nobis, vni-
 uersorum

A uerforum habitationes reuelare, & nullum rerū in ipsis velamentum dimittere, atque ita ea, quæ intus aguntur, videre: videremus utique alios edentes, alios vomentes, alios supplicij torquentes, alios pharmaca miscentes, alios insidias construcentes, alios supputantes, alios gaudentes, alios plorantes, alios amicos accusantes, alios propter ambitionem amentes. Quamquam sint quædam actiones profundiores, quæ in animo occultantur. Et ex his quidā sunt iuuenes, quidam senes: petentes, negantes, pauperes, opulenti: fame pressi, luxu grauati: sordidi, vincti, alij delicijs diffuentes, famulitium magnum alentes: alij trucidantes, alij sepelientes: alij ea quæ habent contemnentes, & speratis possessionibus inhiantes: alij

B impudentes: alij parci: alij inexplebiles: alij occidentes: alij vapulantes: alij superbientes, alij vana gloria elati. Et ex his aliqui apud equos spectatores consistunt: aliqui apud viros, aut canes, aut lapides, aut ligna, aut æs, aut picturas. Et aliqui legationibus, aliqui militiæ, aliqui sacerdotijs præsent. Et alij coronas gestant, aliqui armati sunt, aliqui occiduntur. Singuli verò ex his feruntur, partim ad pugnam naualem, partim ad militiam, partim ad rusticationē: alij ad onerarias naues, alij ad forum, alij ad concionem, alij ad theatrum, alij ad fugam, alij aliò. Et rursus, quidam ad voluptatem delicatiorē, ac intemperatiam: quidam ad ocium ac socordiam. Quum igitur tot indignas ac infelices animas videamus: quomodo non vitam ipsarum eiusmodi intemperantia præditam risu exhibearimus? Quin & valde timeo neq; medicinam tuam ipsis placere. Nam præ intemperantia omnia ipsis displicent. & insaniam sapientiam putant. profecto suspicor pleraque in sceleribus tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut propter ingratitudinem. Aegrotantes enim simul ut seruantur, causam dijs aut fortunæ attribuunt. Plerique verò suæ naturæ hoc adscribentes, benefactorem odio habent, & parum abest ut indignè ferant, si debiliores esse putentur. Sed & plerique artis ignorantiam in seipsis habentes, & imperiti existentes, id quod melius est, purgant. Inter stultos enim fiunt suffragia, & neque ægroti attestari volunt, neque eiusdem artis artifices testimonium præbere. Inuidia enim obstat. Non autem inexpertus es tu talium nugarum: imò probè scio, ob hæc te sæpe in memorabilibus adfici

HIPPOCRATIS

ad afflictionibus accersitum fuisse, & neque causam, aut in- D
uidiam libenter derisisse. Veritatis enim neque cognitio
vlla est, neque vllum testimonium. Hæc autem cum dice-
ret, subridebat, & mihi, ô Damagete, diuina specie appare-
bat, & velut qui priorem suam formam exuisset. Et ego: O
magnifice Democrite, inquam, magna xenia & hospitali-
tatis tuæ munera, in Co mecum auferam. Multa enim me sa-
pientiæ admiratione impleuisti, Discedo enim veritatis tuę
præco, qui humanam naturam inuestigasti ac consideraſti.
Quum autem mentis meæ reuelam à te acceperim, ab eo
nunc tempore hoc expetente, itemque corporis curatione.
Cras verò, & deinceps, hoc loco rursus conueniemus. Atque E
hæc loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cum ve-
rò quidam accederet, haud scio vnde, tradebat ipsi libros. Et
ego concitatus festinaui, & ad Abderitas in specula me ex-
spectantes: Viri, inquam, pro legatione vestra ad me, magna
sit vobis gratia. Vidi enim Democritum virum sapientissi-
mum qui solus potentissimus est homines prudentes facere.
Hæc habui Damagete, quæ de Democrito valde magna ani-
mi læticia tibi recensere volui. Vale.

Democritus Hippocrati felicitatem.

F
Accessisti ad nos velut insanos, ô Hippocrates, veratrum
nobis daturus, persuasus à viris stolidis, apud quos la-
bor virtutis insania iudicatur. Tunc autem de mundi dispo-
sitione, & de pontis ac altis celestibus scribebamus. Cum ve-
rò horum naturam cognouisses, quod omnia valde commo-
dè essent creata, & quod procul ab insania ac desipientia
abessent: meam quidem naturam laudasti: desipientes au-
tem & crudeles ac furiosos illos iudicasti. Nam quæ simula-
chris per aërem vagantia nos decipiunt, quæ sanè mundus
esse comprehenduntur, & vicissitudinem habentia creata
sunt: ea mens mea, naturam perscrutata, verè in lucem pro-
duxit. Cuius rei testes sunt libri à me conscripti. Oportebat
igitur te, ô Hippocrates, cum viris eiusmodi moribus præ-
ditis minimè congredi ac conuersari, quorum mens super-
ficiaria & inconstans est. Si enim ab illis persuasus, mihi, ve-
lut insano, veratrum bibendum dedisses, prudentia insania
facta

A facta fuisset : & artem tuam reprehendissent velut quæ insan-
 iæ fuisset causa. Veratrū enim sanis datum, menti tenebras
 offundit. Insanis autem valde prodesse consuevit. Arbitror
 equidem, si non deprehendisses me scribentem, verū re-
 cumbentem, aut fortè deambulantem, & mecum colloquen-
 tem, & nunc quidem indignantem, nunc verò ridentem, ob
 ea, quæ mente reuoluam, & familiaribus me alloquentibus
 non attendentem, sed cogitatione instantem, & mirum in
 modum speculantem: putassem sanè Democritum, iuxta oculo-
 rum iudicium, ex his, quæ vidisses, insanix imaginem præ
 se ferre. Oportet igitur Medicum non solum visu adfectio-
 nes iudicare, sed etiam re ipsa: & rythmos ac consonantias
B vt plurimum indagare: & vtrum incipiat morbus, aut me-
 dium teneat aut desinat, perscrutari: & differentia, ac anni
 tempore & ætate obseruata, adfectionem curare: itemque to-
 tius corporis naturam considerare. Ex his enim omnibus
 facile morbum inuenies. Porro remisi ad te de insania tra-
 ctationem à te conscriptam. Vale.

Hippocratis Coi, de insania scriptum.

Quemadmodum in libello de morbo sacro dixi, Insa-
 nienti necesse est præ humiditate cerebrum, in quo
 animæ sunt opera, moueri: vbi videlicet humidius
 quàm pro natura fuerit. Eo verò commoto, neq; visum, neq;
C auditū quiescere: sed aliàs alia & videre, & audire: & linguā
 talia loqui, qualia singulis vicibus viderit ac audierit. Quan-
 diu verò cerebrum quieuerit, tandiu etiam homo sapit. Fit
 autem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusque verò co-
 gnitio sic contingit. Etenim qui à pituita insaniunt, quieti
 sunt, & non vociferantur, neque tumultuantur. Qui verò à
 bile, percussores sunt, & malefici, ac non quieti. Et si quidem
 assidue insant, hæ causæ sunt. Si verò terrores & timores
 fuerint, à transmutatione fiunt, cerebro à bile calescente
 quæ ad ipsum per venas sanguinarias procedit. Cum autem,
 bilis discesserit rursus in venas, etiam corpus quiescit. Tri-
 statur autem & angitur homo, & præter temporis rationem
 obliuiosus fit, dum cerebrum à pituita perfrigeratur, & præ-
 ter solitum morem compingitur. Postquam verò cerebrum
 derep

HIPPOCRATIS

derepente à bile calefactum fuerit, sanguine in prædictis ve- **D**
 nis efferuescente : insomnia vident horrenda, & facies velut
 in vigilante flammescit, & oculi rubescunt, & mens aliquid
 mali operari cogitat. Atque hoc in somno homo patitur.
 Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quie-
 scit. Porro in quinto popularium morborum libro quendam
 recensui, cui fiebat vocis interceptio, ignorantia, frequen-
 tes delirationes, & reuersiones. Lingua autem dura, &, nisi
 collutione vsus esset, loqui non poterat, & plerunque etiam
 valde amara. Venæ sectio exsoluit, aquæ potus, aqua mulsa,
 veratrorum potiones. Hic vbi modicum tempus superuixis-
 set, mortuus est. Erat & alius quidam, quem, vbi noctu ad
 conuiuium progredieretur, timor tibicinæ corripiebat, vbi **E**
 audiret ipsam tibia canentem. Interdiu verò audiens, nihil
 patiebatur.

Hippocrates Democrito felicitatem.

Artis Medicæ recta facta, ô Democrite, plerique è vul-
 go hominum non omnino laudant, verum Dijs sæpe
 attribuunt. Si verò natura reluctata perdiderit eum, qui cu-
 ratur : medicos reprehendunt, numen prætereuntes. Et ego
 sanè mihi videor, maiorem reprehensionem quàm honorem
 artis me assequutum esse. Ego enim ad finem Medicinæ nō
 perueni, etiam si iam senex sim. Neque enim ipsius inuentor **F**
 Aesculapius, sed & ipse in multis à seipso dissensit, quem-
 admodum nobis scriptorum libri tradiderunt. Proinde epi-
 stola à te ad nos missa, veratri medicinam reprehendebat.
 Inductus equidem sum, ô Democrite, velut insanienti ve-
 ratrum daturus, non perscrutatus qualis quis tandem esses.
 Vbi verò tecum congressus, cognoui nō per Iouem desipien-
 tiæ opus, sed fermè omni laude ac commendatione dignum,
 valde laudaui naturam tuam, optimumque naturæ ac mun-
 di interpretem te iudicaui. Eos verò qui me induxerunt ad
 te, velut insanientes reprehendi. Nam ipsi medicamento
 opus habebant. Quandoquidem igitur casus nos in idem
 coniunxit, rectè feceris si ad nos frequentius literas dederis,
 & libros à te cōscriptos impertiueris. Misi autem etiam ipse
 tibi de veratri vsu libellum. Vale.

Hippocr

A

Hippocratis de ucratri usu libellus.

HIs qui non facillè sursum purgantur, ante potionē corpora præhumeſtare oportet vberiore alimēto & quiete. Vbi verò quis bibit veratrum, ad motus corporum magis ducere, quàm ad ſomnos. Declarat autem nauigatio, quòd motus corpora turbat. Cùm veratrum magis ducere voles, corpora moueto. Veratrum periculofum eſt ſanas carnes habentibus. Quicumq; in pharmacorū potionibus non ſitiunt, ſum purgantur, non ceſſant purgari prius quàm ſitierint.

Conuulſio ex veratro, lethale. In nimia purgatione, conuulſio aut ſingultus ſuccedens, malum. In turbationibus ventris

B & vomitibus ſpontaneis, ſi quidem qualia purgari oportet, purgentur, conducit, & leuiter ferunt. Sin minus, vice verſa.

Quemadmodum autem in prænotionibus dixi, purgatio ſurſum verſus commodat ei, in quo ſine febre eſt cibi faſtidium aut ſtomachi punctura, aut vertigo, aut os amarum, & in ſumma doloribus ſupra ſeptum tranſuerſum: at deorſum verſus, vbi ſine febre eſt tormen, lumborum dolor, genuum grauitas, menſes ægrè prodeuntes, dolores in partibus ſub ſepto tranſuerſo. Vitare verò oportet in pharmacorum potionibus eos, qui bona habent corpora, maximè autem nigros, & humida carne præditos, ſed & ſubſiccōs, & balbos, ac blæſos. Quicumque verò inflammata in principio morbi, velut in libello de priſana dixi, ſtatim medicamen-

C to ſoluere aggrediuntur, hi de eo quidem quod diſtentum eſt ac inflammatum, nihil auferunt. neque enim remittit qui crudus eſt adfectus. Ea verò quę morbo reſiſtunt, & ſana ſunt, conſumunt. Corpore verò debili ſiente, morbus ſuperat & immedicabile malum habent. Caterùm veratrum his dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandum eſt pectore ſuppuratis. Neque medicamenta danda ſunt decoloratis, raucoſis, lienofiſ, exanguibus, ſpirituofiſ & ſiccum tuſſientibus, ſiticuloſis, flatuoſis, & his qui præcordia, & latera, ac dorſum diſtenta habent, & torpentibus, & obſcure videntibus, & quibus aurium ſonitus ſunt, & vrinæ meatus impotentibus: neque item morbo regio laborantibus, aut ventre debilibus, aut his qui ſanguinis eruptiones aut tubercula habent. Si verò medicandum eſſe videbitur,

veratro

HIPPOCRATIS

veratro securus sursum purga, deorsum verò non. Optimum D
autem his est victus rationem cōstituere. Quemadmodum
autem in predictionibus dixi, non sunt medicamenta danda
his qui nigra euomunt, neq; cibum auersantibus, neque de-
lyris & parum dormientibus, neque dolore vexatis, neq; vi-
sum temerarium inclinatum habentibus, neque tumefactis,
neque vertiginosis, neq; decoloratis, neque his qui in febre
æstuosi sunt ac confracti. Sicut autem de ptisana dixi, Sesa-
moides sursum purgat. potio eius est drachma dimidia in
aceto mulso trita. Commiscetur etiam veratris tertia potio-
nis pars, & minus suffocat. Purgat item quartanas diurnas
& diurna febris lipyria vexatos: & eos, in quibus non est si-
tis, neque excretio. Hos verò non ante tres hebdomadas. E
Aliquando etiam pleuriticos ac voluulosos. Et sicut in mulie-
ribus morbis dixi, purgandum est etiam si vteri purgatio-
ne opus habuerint.

Hippocrates ad Thessalum filium.

AD cognoscendam Geometriam & numerorum scien-
tiam, mi fili multum studij adhibeto. Nō enim solum
vitam tuam illustrem, & ad multa commodam, in humana-
rum rerum statu efficient: sed etiam animam acutiorē &
clariorem reddent, ad omnium, quorum vsus in medicina
expetitur, vtilitatem consequendam. Etenim Geometriæ co-
gnitio, quæ multiformis ac varia est, & omnia cum demon-
stratione trāsigit, vtilis erit & ad ossium situs, & ad exarticu-
lationes, & reliquum membrorum ordinem. Nam ad multi-
plicem horum adfectionem, & articulorum luxatorum repo-
sitione, & ossium contritorum resectione, & perforatione,
& compositione, & exemptione, & reliqua curatione, maio-
re industria vtetur quisquis nouerit qualis est locus, & quale
est os, quod ex eo eluxatum est. At verò numerorum ratio,
& ad circuitus, & ad transmutationes febrium præter ratio-
nem fientes, & ad iudicia ægrotantium, ac securitatis in mor-
bis, sufficiens erit. Præclara enim res est; tale ministerium
in medicina habere, quod tibi partes intentionis ac remis-
sionis, cum ex parte inæquales fuerint, facile cognobiles
exhibet, citra errorem. Quapropter ad huiusmodi experien-
tiae

Atque facultatem peruenire sedulo stude. Vale.

Democritus Hippocrati, De natura humana.

OMnes homines artem medicam nosse oportet, ô Hippocrates. Est enim res honesta simul ac utilis ad vitam: & ex his maximè eos, qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent. Nam sapientiæ cognitionem medicinæ sororem ac contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab adfectibus liberat: medicina verò morbos à corporibus aufert. Augescit autem intelligentia, præsentē sanitatē: cuius prouidentiam habere, honestum est, eos qui rectè sentiunt.

B At ubi corporis habitus ægrotat: neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim præsens animam vehementer obscurat, intelligentiam ad adfectionem per consensum ducens. Cæterum naturæ humanæ descriptio, eiusmodi speculationem habet. Cerebrum quidem supremam corporis partem custodit, & securitatis tutelam sibi commissam habet, intra membranas nervosas cohabitās. Super quod duplicatorum ossium naturæ necessariæ firmata, dominum mentis custodem, ipsum cerebrum tegunt. Pilorum decor est, cutem ornare. Oculorum verò vis visiva in multiplici tunica latitatus, ob humoris instantias sub frontē medellam collocata est, & est videndi causa. Pupilla verò synœra, palpebrę marginem opportunitatis custodem sustinet.

C Duplices autem nares olfactum dinoscentes, oculorum vicinitatem dirimunt. Mollis verò labiorum contactus os circumplicans, verborum sensum, exactamque articulationem gubernans exhibet. Mentum autem in extremitatem desinens, ac lyræ simile, dentium clavis coaptatū est. At sermonum receptacula aures, opifex aperuit: in quibus dum est sermo, non certus temeritatis minister existit. Loquelæ mater lingua, animæ nūcius, gustum custodiens, munitis dentium septis custodita est. Guttur autem & Gula inter se cōiuncta, vicina sunt. Illud enim in viam spiritus: hæc in profundum ventris, alimētum demittit, largè id propellens. Regium verò cor, cono ac pineæ nuci simile, irā nutriens, aduersus omnes insidias thoracem induit. Frequenter autem flatuum ca-

HIPPOCRATIS

uernæ, aëre per ipsas erumpente, vocis causam flatū pariunt. **D**
 Quod verò sanguinem suppeditat, & in alimētum transmutat, cum apicibus sæpe vena caua circumfluum, hepar est, concupiscentiæ causa. Viridis autem bilis iuxta hepar manens, vbi superëbullijt, humani corporis corruptio est, & nocius ac inutilis corporis humani inquilinus. Veruntamen vice versa dormit, nullum negotium exhibens. Inter hæc autem medius omnia suscipiens venter chorum ducit, & accumbit: concoctionem gubernans. Obnoxia verò ventris compositioni, per opificium conuoluta, circum ventrem euoluuntur intestina, adsumptionis & excretionis causæ. Gemini autem rhenes in coxis firmati, & pinguedine intesti, ab vinarum excretionem non sunt alieni. At dominus totius ventris, qui **E**
 Omentum vocatur, totum ventrem complectitur, solo splene excepto. Consequenter, neruosa vesica in coxa osculum firmatum habens, venis complicatis, vinarum excretionis causa est. Huic autem vicina mater puerorum, vehemens illud malum, infinitarum ærumnarum in muliere causa, vterus ipse latitat. Pylorus autem siue lanitor, ex coxarum recessu emergens caro, neruis adstringitur. Verum de plenitudine naturæ ventris effundit, ex opificij prouidentia. Porro extra corpus penfiles domum incolūt, ad generationem destinati, conditores testiculi, multis tunicis præditi. Iucundum ex venis ac neruis plicamentum est pubes, quæ vinarum effusionē facit, & ad coitus ministerium à natura creata est, & pubertatis appetētiā tegit. Crura verò & brachia, **F**
 & extremæ partes his annexæ, totum ministerij principium coaceruat habentes, tutum neruorum ministerium perficiunt. At verò incorporea in recessibus natura, omnifaria viscerum genera fabricauit. Quæ sanè mors instans, celeriter à ministerio quæta reddit.

Hippocrates Cous, Demetrio regi gaudium.

NOs equidem etiam prius, ô Rex, studio habentes naturæ humanæ partes in summa considerare, has conscrip-
 ptas quemadmodum voluisti demisimus. Nunc autē ea, quorum maxime studiosos esse oportet prudentes, partim à pri-
 ribus

- A**ribus transsumpta, partim nunc per nos ipsos comperta, tibi conscripsimus. Quæ si tu priorum morborum signis fientibus sequutus, & iisdem sæpe usus fueris: per omne vitæ tempus morborum exors esse poteris. Duo sunt morborum vniuersorum animalium genera, alterum secundum genus, alterum secundum adfectionem, inter se dissimilia. At verò concupiscentias iuxta alimentum, ex subcontrarijs cognosces, dum ea quæ euacuantur, indicant ea quæ plena sunt: & quæ implent, coniecturam præbent eorum quæ vacua sunt. Morbos autem omnes ex subcontrarijs constitutos cognosces, & morbos à morbis fieri. In conuulsionibus febris succedens, sistit morbum: capitis autem dolores, sanguis ex auribus
- B**erumpens, aut ex naribus. Conuulsiones omnibus morbis atræ bilis succedentes, atram bilem sedant. Et in summa, radix humanorum morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt. Quum enim ori velut cucurbita medica incumbat: contingit, ut ipsum omnium eorum, quæ ingeruntur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autem animum aduertere, & peculiariter viuere, ubi te ipsum præparaueris in has partes, quo morbi accidentes nullum augmentum capiant, per curam diligentem & per bonum ordinem apud te fientem: ita ut neque rei venereæ intemperantia, neque diuerforum eduliorum incontinentia, neque somnis immodicis, in exercitato corpore utaris: sed signa in corpore contingentia sequaris, & vniuscuiusque corporis occasionem conserues:
- C**quo morbum irruere parantem vites, & medelis, quas ego perscribo, utens, à morbis exors perseueres, Vale.

Decretum Atheniense.

Visum est ac decretum Senatui & populo Atheniensi. Quandoquidem Hippocrates Cōs Medicus, & ab Aesculapio originem ducens, magnam beneuolentiam vñ cum salute Græcis ostendit, quando etiam peste à Barbaris in Græciam proficiscente, discipulis suis ad locos dimissis, indicauit quibus medelis uti oporteat, & accedentem pestem secure effugere, quo medicina Græcis data, ipsorum ægrotos tutò seruaret. Sed & scripta sua de arte medica ex-

HIPPOCRATIS

acta edidit, multos esse volens Medicos qui seruare possent. **D**
 Et Persarum rege ipsum accersente, & honores optimatibus
 Persarum æquales promittente, & dona quæcunque tandem
 ipse Hippocrates vellet offerente, Barbari promissiones
 contempsit, eo quòd hostis & communis inimicus Græcis
 esset. Quo igitur appareat, populum Atheniensium sem-
 per ea quæ vtilia sunt Græcis consultare: & vt gratiam con-
 dignam Hippocrati pro benefactis referat: visum est po-
 pulo, ipsum publicè magnis mysterijs initiare, quemadmo-
 dum Herculem filium Iouis: & coronare ipsum corona au-
 rea mille aureorum: & ipsam coronam Quinquatrijs ma-
 gnis Mineræ festis, in certamine gymnico per præconem
 proclamare. Et licere omnibus Coorum liberis, vt Athe- **E**
 nis pubescant, quemadmodum liberi Atheniensium: quan-
 doquidem patria ipsorum huiusmodi virum genuit. Esse ve-
 rò Hippocrati, & vitam, & victum prouisum in Pritaneo per
 omnem vitam.

Oratio Hippocratis ad aram consistentis.

O Vos multi & multarum vrbiũ habitatores, in magna
 dignitate constituti, communi nomine Thessali, om-
 nibus hominibus amara necessitas incumbit, vt quæ à fati-
 statuta sunt ferant. Quapropter ego nunc cedens cū mea so-
 bole, oleæ ramulis coronatus, ad Mineræ aram supplex
 confisto. Quis sim, ignorantibus dicere oportet. Hippo- **F**
 crates, ò viri, medicus Cous, non per piam & honestam
 causam, me ipsum & liberos meos vobis commendo. Co-
 gnoscitis me ò plebs. Nam profectò vos estis viri mihi fa-
 miliares, inter quos, vt verum dicam, inter plerosq; vestrum
 & in multis vrbibus vestris cognitus sum, vt in summa di-
 cam. At verò nomē meum longè vterius, quàm formæ meæ
 aspectus, processit. Atque hæc causa ex arte mea sanitatis ac
 vitæ ortum habuisse videtur, quòd nō solum hominibus ve-
 stram regionem habitantibus, sed etiam multis Græcis vobis
 vicinis cognitus sum. Iam verò qua de causâ tantum nego-
 cium opere peragendum adsumpsi, referam. Athenienses ma-
 le habebunt, ò viri Thessali, qui Metropolim ac patriam no-
 stram

A stram Co deuaſtantes, in ſeruitutem redigunt ea, quæ libera ſunt ex progenitorum adquiſitione, priuatim ſibi parta facientes: neque cognationem reueriti, quæ iſſis eſt ab Apolline & Hercule, quæ ſanè ad Aenium & Sunium filios illorum peruenit, neque Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille communis & vobis & nobis bene faciens deus, in illos contulit. At vos per Iouem ſupplicationibus tolum, & per cognatos deos, egredimini, vindicate, liberate, propriæ virtutis memores, & nihil ad gloriam veſtram ſpectans intermittentes.

Oratio Legati Theſſali filij Hippocratis, ad Athenienſes.

B

C Onuenire arbitror viri Athenienſes, conſtitutum apud vos, qui non omni multitudini cognitus eſt, primū indicare quis ſit, & vnde ſit: poſtea verò reliquam orationem perſequi. Mihi equidem pater eſt Hippocrates: qui quantam in medicina facultatem habeat, vos nouiſtis. Nomen autē eſt Theſſalus. Cognitus verò & ego ſum nō in poſtremis, neque paucis veſtrū. Patria verò mihi eſt Cos: quæ quomodo vobis cognata ſit ab antiquo, alij dicunt, qui in recensenda hiſtoria ſunt præſtantiores. Veni autem miſſus à patre, quatuor beneficia à nobis in vos collata prolaturus. Primum quidem vetus quoddam, tempore progenitorum noſtrorum commune in omnes Amphictyonas, quorum vos non minima pars eſtis. Alterum verò illo adhuc maius, & ad plurimos Græcorum progreſſum. Atque hæc quidem vrbis & progenitorum meorum eſſe apparebunt. Tertium autem patris proprium eſt, & tantum, quantum nemo vnus vir, & vobis & multis Græcis contulit. Poſtremū verò ex quatuor cōmune eſt patris & meū, & quod non ad plures, ſed ad vos ipſos peruenit. Quod quidem priorum beneficiorum comparatione exiguum videri poterit: verū ad aliorum beneficia collatum, magnū eſt. Et ſanè huiusmodi beneficia ſic ſe habent, quemadmodū eſſe dixi, vt ſummatim dicam. Oportet autē non ſolum dicere, ſed etiā demonſtrare quòd vera ſunt. Principiū igitur ſermonis, ipſum miniſteriorū noſtrorum principium faciam.

*Exordium
d docilitate*

Amphictyones

Narratio

HIPPOCRATIS

*Crisæi.
Pythicum
templum.
Locri.*

Vetustissima verò primùm referam: in quibus fortassis longiora ac altius repetita me dicere deprehenderitis. At quisque vetus dici expetit. Erat enim tēpus quando Crisæa gens erat, & habitabat quidem circa pythicum templum: terram verò habebat, quæ sanè nunc Apollini consecrata est. Appellatur autē Crisæus quidem campus, iuxta quem Locri habitant, & cui Melæna adsunt: Cirrhæus verò mons, cui Phocæses adiacent. Hi porrò Crisæi cum essent aliquādo populosi, & fortes, & opulēti, his bonis ad malum vñ sunt. Per insolentiam enim multa horrenda ac iniqua facta perpetrarunt, in deum impietatem exercentes, Delphos in servitutem redigentes, vicinos deprædantes, agricolas spoliantes, vxores ac liberos abducentes, & corpora ipsorum constuprantes. Quæ de causa Amphictyones ira commoti, & exercitu in terram ipsorum inducto, & ipsis pugna deuictis, regionem deuastarunt, & vrbes expugnarunt. Vbi sanè illi, qui multa & impia perpetrarunt, miserè accepti sunt, non minores pœnas persoluentes, quàm ipsi alijs intulerunt. Felicissimiverò ex ipsis fuerunt, qui intra manus hostium perierunt. Secūdo loco, qui manu capti sunt, & qui ad aliam regionē ac vrbes trāsuerūt, sua enim mala ob oculos nō habuerunt. Qui verò ex captiuis ithic manserunt, infelicissimi fuerunt, quicunque in sua ipsorum regione torquebantur. Nam cum vxoribus & liberis, agros & vrbes igni tradi videbant. His verò adhuc peius degebant hi, qui intra mœnia perseuerabant, quando relata mala partim videbant, partim percunctabātur, plura veris audientes. Sic enim fieri solet. Et sanè malam salutis spem habebant. Erat autem ipsis vrbs propè hunc locum maxima, vbi nunc certamen equestre peragitur: cuius muros extruxerant, & eos qui ex alijs vrbibus transfugerant, exceperant. Inutilia verò eiecerant, & necessaria importauerant. Et cogitabant obsidionem sustinere, bona spe prædicti, neque manuum pugna, neque longi temporis obsidione, vrbem capi posse. At verò Amphictyones, tum alia deuastarunt, tum ad hanc vrbem præsidio constructo, & ad expugnationem præparato, reliquum exercitum per vrbes dimiserunt. Temporis autē progressu, cum pestis in exercitū illapsa esset, & milites ægotarent: quidam verò etiā morerentur: alij verò, propter morbum

*Crisæorum
calamitas
quanta.*

*Pestilentia
obsidentium
summa.*

A morbum, praesidium reliquissent: Amphictyones turbabantur. Et alij alia consultabant. Solet autem in rebus communibus sic ferè fieri. Tandem verò afflictionem molestè ferentes, & de bello desperantes, Deo rem commiserunt: & quid facere oporteret, interrogauerunt. Ille verò bellum gerere iussit, & ad victores fore promittebat, si ad Co profecti, cerui filium in auxilium adducerent, cum auro: atque hoc festinabundi, vt ne Crisæi prius in adyto tripodem depraedarentur. Sin minus, urbem capi non posse. Ipsi verò, his auditis, & ad Co profecti, oraculum proposuerunt. Cùm autem Coi dubitarent, & oraculum non intelligerent: surrexit vir genere quidem Asclepiades, progenitor autem noster. Medicus verò Græcorum eius temporis omnium confestione optimus: nomen autem ipsi erat Nebrus: qui oraculum dicere inquit, vt ad seipsum venirent. Nam Deus, inquit, admonuit vos, vt profecti ad Co, cerui filium in auxilium adducatis. Cos equidem hæc est. Ceruorum autem filij Nebri appellantur, hoc est, hinnuli. Nebrus autem est mihi nomē. Quod verò aliud auxilium potius contigerit exercitui ægrotanti, quàm medicus? Et profectò non videtur mihi id consequens esse, quòd in tantum diuitijs Græcos omnes superantes, Deus ad Co proficisci iusserit, & aureum numisma petere. Verùm hoc oraculum in meam domum progreditur. Chrysos enim, hoc est aurum, vocatur masculus meus filius natu minimus. Est autem omnino & corporis specie, & animi virtute, quantum patri dicere licet, inter omnes ciues præcellēs. Ego quidem igitur, nisi vobis aliud videatur, & ipse proficiscar, & filium mecum adducam, naue quæ quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministerijs medicis ac bellicis referta, quo in vtranque partem auxilium feramus. Et hic quidem dixit: illi verò approbauerunt, qui missi fuerunt. At Nebrus hic etiam virum Calydonium apud se educatum, in nauem adsumpsit: de quo statim, vbi res tulerit, dicemus. Cùm igitur peruenissent hi viri ac castra, Deus gaudebat. Nam & mortes militum cessabant, & cum diuina fortuna equus Eurylochi (qui belli dux erat, Theffalus genere, & ex Heraclidis ortum ducens) canalem, per quem aqua in urbem ducebatur, vngula percussisset, vbi in pulvere volitari voluisset: Nebrus aquam medicamentis infecit,

*Apollinis
responsum*

Nebru

Chrysos

Calydonius

Eurylochus

vnde ventres Crisæorū corrupti sunt:& sanè multum contu- **D**
 lit ad hoc vt ciuitas caperetur. Atque hinc iam animi obsiden-
 tium elati sunt, velut deo iam manifestè auxilium ferente.
 Cùm autem impetus facerent,& præmia proponerēt his qui
 primi muros conscendissent: certamen erat fortissimum, &
 vrbs capiebatur. Primus enim muros conscendit Chrysus,&
 turrin occupauit. Sequebatur autem ipsum euestigio vir ille
 Calydonius, sub communi scuto auxilium ferens, de quo an-
 tea dixi. Et Chrysus quidem hasta percussus cecidit ex sum-
 ma turri: percussus est autem à Mermode Lyci fratre, qui la-
 pidibus obrutus mortuus est, cum in adytum irrupisset tripo-
 dem deprædaturus. Hi igitur ciuitatem sic cœperunt:& Ne-
 bri auxilium cum Chryso, & secundum medicam, & secun- **E**
 dum bellicam facultatē rectè successit:& deus vera dixit, &
 quæ promiserat fecit. Quæ de causa Amphictyones Apollini
 quidem templum consecrarunt, quod nunc est in Delphis:&
 certamen gymnicum ac equestre prius non peragētes, nunc
 peragunt:& Crisæorum regionem vniuersam dicarunt Deo
 contributori, reddentes ea quæ dedit in eo quòd oraculum
 dedit. Et Nebri filiū Chrysum in circo equestri sepelierunt:
 & Delphis publicè ipsi parentare præceperunt. Asclepiadis
 verò in Co attributa est prudentia vaticinandi, quemadmo-
 dum his qui mittuntur ex vrbibus ad sacrum Amphictyonū
 concilium: atq; hoc Nebri gratia. Calydonijs autem ab illo
 viro & illo ministerio, etiam nunc in Delphis primæ vatici-
 nandi partes, & alimenta dantur. Verū redeo ad nostra. Nam **F**
 quod vera dico, hinc clarū est. Cùm enim pater & ego acce-
 sissimus, Amphictyones hæc renouarunt, & attribuerunt, &
 in columna descripta in Delphis dedicauerunt. Atque huius
 quidem sermonis finis clarè ostendit, nostros progenitores
 esse vestros benefactores. Ceterū hoc relicto, alium de ijs-
 dem, non eundem sermonem, adsumam. Cùm enim magnus
 ille rex cum Persis & alijs Barbaris bellū gereret contra Græ-
 cos, qui aquam & terram non dedissent: patria nostra maluit
 in totum pessundari, vt ne contra vos, & eos qui vobiscum
 sentirent, hostilia arma sumeret, & in nauibus militarem
 expeditionem mitteret. Sed abnuuit, honestum quid & di-
 gnū patribus meditata, qui Gigantes & Heraclidæ esse di-
 cuntur. Visum igitur est in ipsis, cum quatuor essent muri in
 insula,

*Chrysus
 primus mu-
 ram consec-
 dit.
 Mermodes*

*Templum
 Apollinis.
 Equestre
 certamen.*

*Chrysi se-
 pulchra.*

*Persarum
 rex.*

- A** insula, omnes relinquere, & ad montes cōfugere, & salutem tutari. Vnde sanè quid non mali obuenit? dum regio fuit deuastata, & corpora libera mancipata, & hostili lege occisa, & vrbs & alia munimenta, ac templa, ad fauillam exusta. Insuper autem & filia Lygdamis Artemisæ, circa patrum victoriam datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. Atenim, velut apparet à dijs non sumus neglecti: verum tempestatibus ingentibus exortis, & naues Artemisæ omnes in periculo fuerunt, & multæ perierunt: & in exercitum ipsius multa fulmina inciderunt, quum insula nostra paucis fulminibus impeteretur. Dicitur etiam spectra Heroum mulieri conspecta esse. Quorum sanè omnium timore perterrefacta, ab immedicabilibus cœptis destitit, amara confessione facta, quæ & relatu amara est. Quare omittatur. Attribuam autem & hic progenitoribus meis propriissime minimè falsa, quodd neque contra vos, neque contra Lacedæmonios, aliosque Græcorum socios, Coi voluntaria arma sumperint: & quidem quum multi tum insulas, tum Asiam habitantes, cum Barbaris in bello coniuncti fuerint, nulla violentia coacti. Equidem præfecti vrbs tunc fuerunt Cadmus & Hippolochus. Verum autem est, & Cadmum & Hippolochum meos progenitores esse. Nam Cadmus, qui & Senatū regebat, matris meæ progenitor est: Hippolochus verò ex Asclepiadis, quartus à Nebro, cuius auxilio Crisæi sunt deuastati. Nos autem ex virili genere Asclepiadæ sumus. Quare & hoc bonum à progenitoribus nostris profectum amplectimini. Redeo ad Cadmum. Hic sanè vir adeò commodi Græcorum studiosus fuit, vt cum regio ab Artemisæ obsidione liberata esset, isthic relicta vxore ab sobole, abiuerit cum his qui eadem sentirent in Siciliam, quo Gelonem & fratres eius prohiberet, ne amicitiam cum Barbaris contraherent contra Græcos. Perpetrauit & alia multa egregia facta, quæ longius producere non est tempestiuum. Atque hæc quidem & huiusmodi multa sunt publica progenitorum nostrorum in vos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicendi facultas. Venio autem iam ad hoc, vt beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam: quod hoc modo recensens, vera dicere cognoscat. Cùm pestis ex Barbaria adflueret, quæ su-

*Artemisia
Lygdamis
filia.*

*Cadmus.
Hippolochus.*

Gelon.

*Pestilentia
Illyrica.*

pra Illyrios ac Pæonas sita est, & cum malum in hanc regionem venisset: harum gentium Reges ad famam medicam, quæ vera erat, & undique processerat, & ad patrem meum, nuncios miserunt in Thessaliam (illic enim pater meus & prius, & nunc domum habet) vocantes ipsum ad auxilium ferendum. Et non solum argentum, & aurum, & alias opes se missuros esse receperunt: sed etiam reportaturum esse quæcunque ipse vellet, si auxilium tulisset. Ipse vero quum interrogasset quales motus partiales fieret, & æstus, ac ventos, & caligines perscrutatus, itemque alia quæ habitus ex præsentis statu commovere solent: cum sanè omnia didicisset, illos quidem retro discedere iussit, & nullam sibi facultatem esse ad illorum regionem proficiscendi, pronunciauit. Verum ipse quam citissime Thessalis denunciare studeuit, quibus modis malum accedens canerent: medelam conscriptam per vrbes proponebat. Me verò in Macedoniam demisit. Cum regibus enim Heraclidarum, qui isthic imperium obtinent, paterna nobis intercedit amicitia. Et ego quidem ibam à Thessalia eo, quo me pater iussit, auxilium his qui isthic essent laturus. Iniunxit autem mihi ut

Dracon

Thessali

frater.

Polybius.

etiam vrbi vestræ opem ferrem. At fratrem meum Draconem ex Pagasis profectum, in Helespontum navigare iussit, consimili consilio instructum, quali etiam ipse utebatur. Non enim omnes loci eadem auxilia ferunt, eo quòd non omnis ambiens nos aër similis est. Polybium verò, qui filiam ipsius, meam autem forem habet, & alios discipulos, ad alios aliorum conuentus & vias profecturos emisit, quo quam plurimis opitularetur. Postquam autem ipse res in Thessalia perfecit, ad vicinas gentes auxiliū laturus proficiscebatur, & ad pilas profectus, Dorienſibus, & alijs, simulque Phocenſibus auxilium tulit. Et quum sanè ad Delphos peruenisset, supplicationem Deo pro Græcis fecit: & sacrificio facto, iter ad Boëtos arripuit. Et cum ipsis opem tulisset, similiter ad vos progressus est, & sufficientia vobis ad salutem, quæ sanè nunc ego produco, ex animo penitus dixit. Arbitror autem multos vestrum nosse, quòd vera dico. Non enim ita diu est, sed nonus hic est annus, quando abiui, & in Peloponesum missus sum, isthic habitantibus opem laturus. At verò undiqueque nobis, & verbis, & re ipsa, dignus

Agnus honor contigit, vt minimè pœniteat nos, quòd non hunc cum quæstu ex Illyricis ac Pæonibus oblato permutauimus. Verum præ reliquis ciuitatibus magna sunt quæ à vobis data sunt. Nam & respublica vestra alias excedit. Athenæ enim altius quiddam sunt alijs vrbibus, quàm ad gloriam attinet. Et corona illa aurea in vestro theatro patri imposita, ad summam emulationem ac felicitatem ipsum euexit. Sed & hoc beneficium superastis, dum & patrem, & me publicè Cereris & Proserpinæ mysterijs ac sacris initiastis. Atque hæc quidem tria sunt beneficia, quantum ego verbis consequi potui, & fracta voce proferre, vrbis, & progenitorum, & patris mei, in vos simulque multos Græcos. Quantum nunc

Bdicere aggrediar, quod, velut antea dixi, in vos ego & pater meus collocauimus. Cùm enim Alcibiadem emitteretis in Siciliam, multa quidem potentia, non autem ita multa, velut admiranda: & sermo in concione incidisset de Medico, quem exercitum sequi oporteret: pater meus progressus, me ad curanda corpora vestra se daturum esse promissit, proprijs sumptibus instructum, & citra mercedis exactionem, quàm diu classis abesset, paruipendens suam vtilitatem, vt qui sibi persuasisset, hoc in vestrum commodum cessurum esse. Ego enim non solum res meas insumebam, id quod faciebam vobis inseruiens: sed etià ad alia magna opera destinatus fui. Et hoc minimū est ex his, quæ sum dicturus. Decreuit enim pater ob me filium fortunæ fluctibus agitari, & in terra aliena, & in mari, & in periculis bellicis, & in ægritudinibus, quæ his qui erroneam vitam degunt, magis accedere solent, quàm his qui ordinatæ vitæ rationem habent. Nouit enim beneficium beneficio metiri: & non, velut qui aliquid emisset, contractu ex manu in manum facto semel, discedere. Et hic quidem talia præstitit. Ego verò, vt qui filius illius sim, nihil studij & artis prætermisi, auxilium ferens, & periclitatus vobiscum, si quando occasio tulisset. Et ad hæc ambo præstanda. neque morbus, neque afflictio, neque timor in mari, & intra hostium manus, me prohibuit. Testes autem huius rei non alios aliquos, sed vos ipsos habeo. Quare si quis contradicere volet, is nihil cunctatus exurgat. Verum non puto me mentiri. Cùm autem hæc præstitissem ad annos, tres

& aurea

HIPPOCRATIS

& aurea corona coronatus, & adhuc pulchrius laudatus: do- **D**
 mum redij ad nuptias, quo & artis, & generis nostri successo-
 res producerem. Et quæ quidem à ciuitate, à progenitori-
 bus, à patre, & à me, vobis obtigerunt, hæc sunt. Dictum
 est autem & quæ nos à vobis oblata tulimus. Arbitror autē
 multos è vobis admirari, quæ de causa hæc à me ex tam lō-
 ginquo principio repetita sunt. Quo igitur & vos cognosca-
 tis, & mihi ea quæ cupio, contigant: tempestium est vt
 hoc dicam. Pater meus, o viri Athenienses, & ego petimus
 vos (sic enim liberos & amicos loqui decet, quod id quod
 petunt ab amicis liberis consequantur) contra patriam no-
 stram hostilia arma ne sumatis. Si verò oportet, quemad-
 modum fortassis oportet eos, qui sua ipsorum causa pro- **E**
 gressi sunt, etiam rogamus, vt ne nos, qui eiusmodi & tam
 magna beneficia in vos priores contulimus, seruorum loco
 habeatis. Insuper autem (nam & sic dicere conueniet) sup-
 plicamus, vt ne nostra faciatis vobis ipsis in bello captiua, si
 contigerit vt multo inferiores superetis. Verum & hoc con-
 siderate, quod fortuna aliàs alia cito versat: & aliquando
 magni paruis opus habuerunt: & fortes per debiles salutem
 adepti sunt. Puto autem clarum esse, vt ne clarissimum di-
 cam, quod ob vnum virum non ciuitas, sed multæ gentes
 iam quandoque vtilitatem in rebus bellicis cōsequutæ sunt.
 Et vbi ars in precio est, neque nos contemnere poteritis.
 Nam neque ita viles ac contemnendi sumus, quemadmo-
 dum in vobis testimonium situm est. Verum ab initio qui **F**
 dem dei, vnde genus nostrum esse gloriamur, Aesculapius
 & Hercules in hominum vtilitatem prognati sunt. Et hos
 propter virtutem, quam hîc exercuerunt, omnes deorum
 loco habent. Vrbs autem mea, & ego qui ad vos verba fa-
 cio, ad tales originem nostram referimus, quemadmodum
 sanè hominum traditiones habent. Vnde profecto etiam
 pro Græcis ambo hac parte, & in omni bono, ad ipsos tu-
 tandos stetisse apparebimus. Non enim fabula sunt res ad
 Troiam gestæ, sed factæ, in quibus Cos cum insulis suis non
 minima, sed maxima ad ferendum auxilium existit. Sic ve-
 rò etiam Aesculapij filij, non arte solum, sed etiam armis,
 Græcis auxilium tulerunt. Machaon equidem animam in
 Troade

*Aescula-
 pius, Her-
 culesque ho-
 mines uti iu-
 uarent, po-
 tiſſimum
 nati sunt.*

A Troade deposuit, quando, velut scriptores de his prodentes dicunt, ex equo in Priami urbem venit. Proinde neque eo quod contribules, neque eo quod ex auxiliatorum numero, auxiliares etiam ipsis Græcis sumus, nos iniuria adfeceritis. Non in longum extendam sermonem, res Crisæorum, aut Persicas iterum repetendo, quando & ipsas audiuitis, & in manibus magis sunt, quam ea quæ pauloante relata sunt. Quin & sic cogitare, minimè pium esse benefactores iniuria adficere. Nos autem benefactores Te, facta ipsa clamant. Ex quibus patribus prognati esse videbimini (quemadmodum fabulatores dixerunt) si iniuria adficere, quam benigni esse malueritis? Neque enim amarulentius

B quicquam dicere volo. Illi enim, ô viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias rependerunt. Alijs autem multis, beneficio adfecti, vicissim auxiliati sunt. Deficiat profectò me dies longiùs narrantem, si recensere velim quot hominibus quanta bona obuenerint, qui nihil de vobis bene meriti fuerunt. Circumspicite vos ipsos, & me nullo dicente, considerate qualia perpetretis. Mala res est potestas, ô viri Athenienses. Non enim quæ sua sunt, mensura disponere nouit. Sed & vrbes quasdam & gentes iam perdidit. Si verò ad alios velut in speculum respexeritis, videritis ipsi quæ facitis, & ego vera dico. Quin & lex noua est: Quicumque felici rerum successu confusus, non etiam ad rerum difficultates respicit: Non est hoc vestrum viri Athenienses. Multum enim

C etiam sic Deum tentaretis. Nullam vobis iniuriã intulimus. Si verò etiã intulimus: non armis, sed verbis iudicemur. Deprecamur autem vos etiam hoc, vt ne faciatis nos alijs gratiam debere, qui nobis auxilium ferent. auxiliũ enim nobis ferent, si rectè fecerint, & qui intra Thessaliã, Argos, Lacedæmonia, Macedoniam, sunt reges, & sicubi alij Heraclidæ, aut Heraclidarũ cognati habitant. Præstat citra violentiam, quàm vi coactos facere quæ iusta sunt. Non dico de insolenti aduersum vos rebellionem: verum hoc vobis manifestum facio, quod multi nostri curam gerunt, aut certè curam habebunt, nisi vndiquaque de terra periit, benignos adhuc esse homines. Ego quidem igitur, exiguæ enim mihi sunt ad dicendum vires, vtpote qui aliarum rerum studio sim addictus,

I HIPOCRATIS EPISTOLAE.

dictus, hic definam. Rogo autem vos per hospites nostros, & per eos qui nobis consiliarij esse cōsueuerunt, & per Deos, & Heroas, ac gratias, quæ hominibus ab hominibus contingunt, ut inimicitias quidem vestras aduersum nos deponatis: ad amicitiam verò vos conuertatis. Si enim non in vestra ciuitate hæc consequemur: haud scio quo progressi, eorum, quæ cupimus compotes siemus.

HIPOCRATIS COI OPERVM

quæ ad nos extant omnium finis, Iano

Cornario medico physico
interprete.

*



LVCDVNI,
EXCVDEBAT
PETRVS FRADIN,

M. D. LIII.

*ag. ref. in vesicis quibus solent
generari fagi seu ubi ualeat
ad oleas & ad agricolas si in
natura sunt loco solent. sed ille
vesice debent reponi per quos
duos dies in alio loco humido
ut facilius et magis eorum
aque generetur. ut in capla nico.*

PANDIMIGLIO

21 DIC. 1970

LEGATORIA - ROMA

